

HIPPOCRATIS COI

MEDICORVM OMNIVM

LONGE PRINCIPIS, OPERA

quæ ad nos extant omnia.

PER IANVM CORNARIVM

MEDICVM PHYSICVM LATINA

lingua conscripta.

INDEX RERVM AD CALCEM OPERIS

uniuersi annexus est fecundissimus.

*Ex Bibliotheca Cantuarij Dni Regis
Domus 2^æ Magbrij*




BASILEAE, M D XLVI

Cum gratia & privilegio Imp. Maiestatis ad annos V

HYPOCRAS
MEDICORUM

THE
SOCIETY

OF
THE



THE
SOCIETY

AVGVSTISSIMIS AC PRVDENTISSI-

MIS, HONESTISSIMISQVE VIRIS, SENATV POPV

loq Imperialis urbis Augustæ Vindelicorum, Ianus

Cornarius Medicus Physicus, s. d.



ON alienum, nec ab re esse arbitror, Augustissime Augustæ urbis Senatus, hoc in loco, hac instituta ad amplitudinē tuā, in Hippocratis Coi medicinæ principis scriptorum, à me in Latinā linguam translatorum editionem, præfatione, paulo altius repetere, qualis fuerit nostro hoc ævo rei medicæ, & simul etiam aliarū artium ac studiorum status: qualis factus sit progressus: quantum accesserit incrementi: & quid de toto hoc studiorum genere sit sperandum. Nam & necessariam esse Hippocratis librorum editionem, lectionem, ac cognitionem, inde clare constabit: & me hæc uel peractorum laborum gratia, meminisse iuuabit: & qui ista legent, non inutilem cōsequentur huius narrationis cognitionē: & Amplitudo tua, spero, harū rerū memoria iucunde afficietur, & si quid præsidij ac opis ad hæc studia cōseruanda opus fuerit, (sicut reuera uestram, urbium Imperialium opem desiderāt ac implorant) huc libenter incumbet, quo literæ unicum totius uitæ ornamentum durēt ac uigeant, in Germania nostra, ne si hæc corruant ac iaceant, uere ne uita uocari mereatur, haud secus q̃ neutrum corpus Medicis dicitur, quod neq̃ sanum, neq̃ ægrotum appellari potest. Talis autem futura uita mihi uidetur, ut miti ac familiari nobis similitudine, res omnium tristissima, & perpetua nocte obscurior adumbretur, si horum studiorum lux extinguatur, si literarum decus deturpetur, si robur illud, quod & pacem, & rerum publicarum ac priuatarum tranquillitatem retinet, elanguescat. Quum itaq̃ primū animum ad Medicinæ studia adijcerem, magna erat bonorum et professorum, & librorum penuria: adeo ut Hippocrates & Galenus medicæ sectæ optimæ, rationalis illius, principes, ne nominibus quidem suis iustis, in scholis satis notī essent, quum uulgo Hippocras & Galienus à plerisq̃ omnibus appellaretur. Itaq̃ quū essem adolescens uiginti natus annos, ex Petri Mosellani, uiri & eruditi, & imprimis sua ueloquēti facundia ornati auditoribus: (Nam neq̃ hunc, neq̃ alium ullum unquam priuatum præceptorem habui, post prima grammaticæ rudimēta) in literis utriusq̃ linguæ eō progressus, ut non modo grammatica docerem, sed etiam Poetas ac Oratores Græcos publicè enarrarem, plurimū mox ab initio, ab honestissimæ artis discendæ proposito decidebā. Auertebant enim me barbari scholarum magistri, & non multo expositoribus suis potiores scriptores, quibus tum medicorū scholæ pro optimis autoribus utebātur, Auicenna, Rasis, Albucasis, Auenzoar, Mesuas, & alij non citra tædium nominandi, Arabicum hominum genus. His accedebant practices scriptores superioris sæculi ac illius quoq̃, gens per omnia inepta, sordida, ac impura, & tam spurcè latine loquens, ac tam infeliciter id quod docere uult tradens, ut penitus desperarem ex tam putidis libris fore posse, ut unquam ad medicinæ cognitionem peruenirem, eam uidelicet quam ex Hippocratis aliquot libellis, aphorismis dico, pro-

gnostico, et eo qui De uictus ratione in morbis acutis inscribitur, olfecissim: & quam mihi ex Galeni aliquot libellis latinè itidem extantibus delineassim. Erant autem hi Leonici interpretatione, De febrium differentijs libri duo, & Copi uersione sex libri De locis affectis inscripti. Et his interpretibus tum extabant quoq; Hippocratici illi libelli. Ac in philosophia quidem eo tempore extabat sua lingua Plato, Aristoteles, Theophrastus, Xenophon, & Plutarchus, magno erga bona studia Aldi Manutij beneficio. Verum in medicina nihil Hippocratis ac Galeni ipsorū lingua habebatur, præter Hippocratis aphorismos, quos Philippus Melanchthon mihi communicauerat, & unam Galeni methodum, quam Romæ si recte memini, excusam, apud amicum quēdam uideram. Hic ego dum ambiguus quid facerem sæpe mecū cogitarem, tandem illud statui, quod præsens esset boni consulendum esse, donec aliquando dies meliora proferret. Proinde relictis magna ex parte Arabibus illis scriptoribus, & ex practicis quoq; paucis aliquot, melioribus ut fieri solet in malorum electione, assumptis: uidebantur autem tales esse, Bertrutius, Gatinaria, Guainerius: his ad prædictos libellos Hippocratis ac Galeni additis ac collatis, sed magno interposito intervallo, aliquot annis medicinæ studia sectatus sum, donec cum his simul magister magnus artis uenter persuasit mihi, ut artis periculum facerem, quod iam per annos uiginti quinque facere pergo, ab eo tempore quo primum animum ad medicinæ studia, uelut dixi, adieci. Quanto uero meo commo-
modo hoc fecerim, aut etiam aliorū utilitate, non est quod multum iactem, Diligentiam meam & fidem, tum in docendo qualiacunq; didici, tum in curando qualia ars præstare potuit, multis cognitam esse scio. Opes uelut studiorū impedimenta, non anxie quæsiui, & eas quoq; quæ contingere potuissent, contempsi. Hoc nondum scio an commodum, aut potius incommodum dici debeat, quod totum istud studiorum priorum genus, per totos nouem annos à me tractatum, relinquere ac quasi dediscere coactus fuerim, quū iam magnam Europæ partem, rerum medicarum experiendarum gratia peruagatus, Basileam peruenissem. Et quod quidem incommodum hoc sit, tot horas male collocasse in studijs dediscendis, nemo non intelligit, etiam ex his quibus non dediscenda, sed amplectenda esse illa adhuc hodie uidentur. Quod uero commodum sit, totam barbarā medicinam à me esse relictam, & græcam assumptam, productam, & non parum per me etiam auctam, & ampliata, nondum persuasum esse scio plerisque, qui adhuc cum Gryllo grunnire malunt, & glandibus uesci frugibus optimis reptis. Profecto horum ingenia uel ineptissima, & iudicia uelut nihil sani habentia auersatus, tum mox toto pectore ad Hippocratem Græcum, ac Galenum, itemq; Paulum me contuli, paulo ante Venetijs ex Aldi itidem officina allatos: quibus etiam alienis ad tempus utebar, atq; in his ita uersabar, ut uel totum Hippocratem ad latinos transscribere me posse non desperarem, si tam magni laboris præmium alicunde affulsisset: nedum de Galeno ac Paulo ambigerem, quos faciliores esse, uel leuiter græca scientibus constat: si quis modo non penitus rudis eos autores aggredi conetur. Et extant libelli duo Hippocratis eo anno à me conuersi, alter de aere, aquis, & locis: alter de flatibus inscriptus, qui animum meum studiofis fatis declararunt, quantum uoluerim

uoluerim medicinam illinc adiutā. Nec deerant nobis inhortatores ad rem tentatā strenue obeūdam, inter quos magno erga optimā studia merito præcipue mihi nominādus est Des. *ERASMVVS* Roterōdamus, cuius etiā scripta ad me epistola extat, qua me ad cōstanter prosequendū id quod in Hippocratē medicinæ principē orsus essem inhortatur. Ad idem me institutū Frobenius ac Episcopus, qui prius etiam aliquot mihi cōmentationum fuere autores, tantum non cogeāt: digni profecto propter sua in doctos homines merita, ut ab omnibus bonis uiris aduersus *ὁμοτέχους* æmulos instar ignauorum fucorū insidiantes libris ipsorū sumptibus & industria in lucē editis, foueantur & tueantur. Quū igitur hæc mea tunc fuerit uoluntas, & nō omnino desperata etiam præstandi facultas, Cur, inquit aliquis ex illis, ad tot annos dilatum est, quod propter cōmunem utilitatē, si ita est ueluti ipse dicis, q̄ primū inuulgari oportuerat. Fatebor sanè hic quod res est. Primū quidem uoluntatē meam remorata est maxima operis difficultas. Nam ut glossas & uoces penitus obsoletas omittamus: ut dicēdi genus breue illud, & quo uelut per ænigmata, innuere magis q̄ significare sententiam uoluit, ne producamus: adeo ut ne Galenus quidē se ex omnibus extricare ualeat: ut nihil etiam dicamus de lectione uaria, ac subinde à plurimis priscis Hippocratis expositoribus mutata, & tēporis insuper iniuria corrupta: uel ipsa uetustatis reuerendi senis maiestas deterrere posset, ne quis familiarius uersare doctissima, & per omnia grauissima scripta audeat. Quod uero tantæ grauitatis, maiestatisq̄ scriptor sit Hippocrates, idemq̄ optimus methodi doctor, etiam Plato testatum de ipso reliquit, cuius uerba ex Phædro adscribere non pigebit. Fieri ne posse putas, inquit Socrates, ut quis animæ naturam pro dignitate consideret, absq̄ uniuerſi naturæ? Si quidē Hippocrati Asclepiædarum generis credere oportet, inquit Phædrus, neq̄ corporis, citra hanc methodum. Bene, inquit Socrates, amicissime Phædre Hippocrates dicit. Oportet tamen insuper ad Hippocratē, etiam rationē expendere, & an cōsona est uidere. Ita sentio, respōdet Phædrus. Proinde de natura cōsiderare, inquit Socrates, quid tādē dicit Hippocrates, & ratio uera? Nōne hoc modo? De cuiuscunq̄ rei natura cōsiderare oportet, primū simplex ne sit, an multarum specierum, id in quo artifices esse uolumus, & alios ut tales sint facere. Deinde si simplex est, uim ipsius considerare, quam à natura habeat, ad hoc ut in aliud faciat quid, aut quam ut ab alio patiatur. Si uero plures species habuerit, his enumeratis, id quod in una, hoc in singulis considerare, quid nam à natura facere solet, aut quid ab alio pati. Cōsequens, inquit Phædrus, hoc est ò Socrates. Proinde methodus, ait Socrates, absq̄ his similis est itineri cæci. Hactenus Plato. Et nō sunt quidem hæc ita ad uerbum in Hippocrate, sed talis est omnino doctrinæ methodus libri De natura hominis inscripti, ut de nullo alio loqui hic uideatur Plato: quanquā similis methodus etiam in alijs huius uiri scriptis genuinis esse uideatur. Quare quum hactenus reperti sint, qui Platonē, qui Aristotelem, qui Theophrastum, qui reliquos Græciæ philosophos ac scriptores, ad latinos cōuertere aggressi sint, & aliquid operæ precij præstiterint, in Hippocrate nemo hoc feliciter tentauit, ex toto, ut ne in minutissimis quidem libellis aliqui satis aptos artifices se declarauerint. Nō igitur nihil est quod et nos de difficultate

huius scriptoris queramur, qui hactenus omnes ex æquo à se auertit: etiam si nunquam ex toto à nobis desperatum sit, fore ut aliquādo omni difficultate superata, latinus à nobis factus Hippocrates legatur. Accessit ad hanc difficultatem alia remora ex temporum infelicitate. Quum enim per uiginti ferme iam annos medicina Græca reuiuiscere cœperit: reducti sint Hippocrates, Galenus, Aetius, Paulus, Dioscorides: & hi non sua solum lingua, sed latini etiam magna ex parte (uno Hippocrate hactenus saltem excepto) tum per doctos aliquot uiros, tum per nos quoque facti, tamen ea est sæculi infelicitas, ut nemo tantæ artis, quæ ipsam etiam uitā, qua nihil homini preciosius esse potest, conseruat: pretium agnoscat. Vidimus ardens primum studium multorum circa linguas addiscendas: deferuit hoc paulatim. Vidimus maximum studiosorum concursum ad discendam theologiam, quum primum in Germania sincerior pietatis doctrina illucesceret: Durauit hic aliquot annis. Transitū est ad studium iuris ciuilis: Nec puto ullo unquā tempore tot fuisse studiosos, qui leges Imperatorias sequerentur, aut doctorum titulis insignirentur. Sola Medicina ubiq; contempta iacet, frigent gymnasia, torpent professores, ars ipsa in *ἄγνη* *χρὴσις* abiit, & non nisi apud delyras anículas, & recutitos Apellas, & eos qui multorum periculis de sua ignorantia experimenta faciunt, eius usus quaeritur: paucis quibusdam bonis medicis non in usum publicum, sed in priuatum sibi thesaurum, uerā medicinæ studia possidentibus. Quanquam ego quidem grauiorem adhuc, ac similem timeam optimæ arti ruinam, si continget ut altius aliquando euehatur, qualem uidelicet Christianæ religionis studium pertulit, & qualem iuris scientia minari uidetur. Sicut enim dum p̄j aliquot uiri euangelium Christi purum ac sincerū reducere conati sunt, factum est ut apud plerosque Christus penitus fabula factus sit, & parum adhuc in paucorum cordibus hæreat: Ita ex magna iuris scientia eo peruenitur, ut ius sit in armis ac uisum, ut sint qui quiduis sibi licere adstruant, adulterare, scortari, prædari, prodere, rapere, agere, capere, & cœlum ac terram miscere, modo apex sit in iure scripto, qui ut ipsorum cupiditatibus inseruiat cogi possit: quomodo summum ius summam iniuriam esse, iuxta uetus adeo uerbum, atque ita omnem optimarum legum doctrinam, usum ac necessitatem intercidere, nemo non sentit. Atque utinam non similis casus maneat rectissimū medicinæ studium, si quando etiam hoc ad summum adductum fuerit: & ex scholæ umbra, ad publici exercitiij theatrum productum. Sed quis prohibere potest malos, ut ne sui similes sint, in quocunq; studiorum genere peruertendo? & ea quæ ad multorum salutem inuenta sunt, partim per ignorātiā, partim ex malitiā, ad perniciem abutendo? Propter tales cessandum à nobis non est, ut non optima faciamus, doceamus, ac in lucē proferamus, & artem per se optimam ad summū statum euehamus. Nos certe ut quod possumus huc conferremus, & ut & ocij, & negocij nostri ratio publice omnibus constaret, sæpe in partialibus editis libellis promissum, sæpe repositū, sæpe repetitum Hippocratem nostrum latinum tandem etiam his infelicissimis temporibus, quibus præter ea quæ iam relata sunt, omnia perpetuo metu consternata grauantur, insidijs pertentantur, prodicionibus obtinentur, bello expugnantur, incendijs consumuntur, edere uolumus

lūimus, atq; hunc inæstimabilibus laboribus, & non leui sumptu ac rei familiaris iactura, perpetuis quindecim annis absolutum. Non quod hos totos in hoc solum opus impenderimus: hoc enim uere esset suo sibi iumento malum accersire: sed quod nunquam hanc curam reiecerimus huius quoque operis absoluendi, dum illa partim de Græcis plurima translata, partim à nobis scripta ac commentata, in publicum emisimus, non omnino nulla nostra priuata utilitate: Fatendum enim & prædicandum quoque hoc est, quū & magnorum principum, & præclararum urbium, magnificentiam ac liberalitatem simus expectati, & ad hæc præstanda, quasi fomite quodam coacti, ac prouecti. Superauimus autem hanc operis difficultatem, tum sæpe repetita Hippocratis lectione, tum locorum subinde alibi ab ipso Hippocrate repetitorum collatione, tum perlecta denuo tota Galeni græca ac latina editione, eo studio ut totum aliquando editurus sim Galenum, aliqua parte ex mea translatione, & reliquis itidem uersionibus ad ueram Græcam lectionem correctis. Et profecto longum esset hic declarare, quibus rationibus inductus, multa ex lectione Aldini, plurima præter lectionem Frobeniani exemplaris, à nobis ad multa manuscripta exemplaria collati ac editi, in hac nostra latina Hippocratis conuersione mutauerimus. Statuimus autem huc impendere quinquennium plus minus, ut si deus uitam tamdiu prorogarit, totius nostræ conuersionis ratio, ac aliqua expositio extet, in diurnaliorum siue coniecturarū libris, tot à me scribēdis, quot omnino existunt libri Hippocratis scriptorum. Interim tamen hunc præcipuum nobis fuisse scopum, studiosos omnes non cælabimus, quem etiam pro iustissima lege Galenus agnoscit, dum sic scribit. Hæc, inquit, Lex mihi in exponendo ac interpretando obseruatur, ut uniuscuiusque scripta ex illo ipso declararentur, & non uanis opinionibus, & pronunciata citra demonstrationem sententia, quisque quicquid uelit deblateret. Hanc legem nobis in scopum, in Hippocratis libris latine conscribendis proposuimus, & omnes obscuros locos, collatione ad alios facta, ubi hoc fieri potuit, exposuimus, reddidimus ac expressimus, multis immutatis, non paucis reiectis, plurimis apposis, quæ nec in impressis, nec manu scriptis codicibus ita habentur: sed tamen ut alicubi uestigia ueræ lectionis etiam ex illis odorati simus. Quorum omnium iusto opere à nobis ratio reddetur. Atque hætenus suffecerit protulisse me studiorum nostræ æui statum, progressum ac augmentum, & præcipue rei medicæ, Cuius primum, summum ac maximum authorem, tandem ego latinis hominibus non minorem, sed aliquanto, nisi penitus fallor, meliorem quàm græcis extat legendum produco, edo ac publico. At ne ego mihi tanti beneficii publici gratiam expetere uidear, aut ne tanti auctoris ac operis patronum præstare me posse, aliunde confidere puter: ad te augustissime Senatus Augustæ confugio. Tuæ amplitudini hanc auctoritatem defero, Tuæ erga literas & literatos benignitati hanc gratiam deberi confiteor, quod Hippocrates latinus noster publice extat, habetur, legitur: quod rebus mortalium iuuandis opus expositum est, ultra duo milia annorum ab omnibus in latina lingua desideratum. Nec uero uideri possum aut uelut ignotus, aut temere, ad tantorum uiro-
rum præsidium confugisse, dum in publice recepto illo more dedicandorum

ac consecrandorū librorum, ad uos uiri Augustenses me recipio. Nam quum uestra respub. per omnem non modo Europam, sed orbem terrarum celeberrima sit, à bonis legibus, à probatis ac grauibus moribus, à seuera in malos animaduersione, à clemēti erga bonos benignitate, à pientissīmo religionis cultu, ab ingenti erga literas & bona studia fauore, à doctissimis cōsilioq; ac prudentia prāstātissimis uiris, uideri nō debeo temere magis q̃ recto iudicio, ad tam augusti senatus, ad tantorū uirorum tutelam, Hippocratis & pariter meū opus attulisse. Nec ignotus ego uobis esse possum, cuius scripta ac opera tot principes uiros, tot claras urbes fouere ac tueri nondum, quod sciam, pœnituit. Hic non referam quibus uiris semper respub. uestra floruerit. Non recensebo Fuggaros, non Paungartneros, non Ilfungos, non Vuelleros, non Herebrotios, non alias magnas familias principum opes adæquantes, & simul pietate, prudentia, fortitudine, magnificentiaq; ac summa liberalitate prāstantes. Non dicam de Monopoliorum apud uos extantum utilitate, per quā sit ut Germania ab hominibus sub polo Antarctico habitantibus, & ab ipsis Antipodibus mercimonia, in quotidiano usu habeat. Non dicam de plebis sedula opera, & laudatissimis operibus, unde linei generis, biliciorum, triliciorum, quadriliciorū uariis texturis, multiplicibus tincturis, non modo Germania, sed omnes exteræ etiam nationes redundant. Nec dicam de urbis magnitudine, splendidis extructionibus ac ædificijs, & populositate, quæ ut peculiare laudes urbium suut, ita & loci optimū situm, & terræ, ac nascentiū omnium copiam ac ubertatem coarguunt. Verū studium uestrū circa literas, bonas artes, pietatem ac rectam religionē conseruandam nō tacebo. Quū enim uideretis studiorū omnium fluctuationē, sursum deorsum omnia iactari, in præcipiti omnes linguas, artes, ac disciplinas consistere, nullo unquā tempore plures in omnibus scriptores extitisse, partim sua magnifice iactantes, partim aliorum & ueterum quoq; scripta dāmnantes: Vos optimos semper apud omnes recte sentiētes habitos autores Græcos, magna copia per occasionem nuper ad eō uobis oblatos non neglexistis, sed uelut rem reipub. imprimis utilem, eorum opera ac libros comparastis, coemistis, ac pro ingenti thesauro, uelut reuera est, reposuistis, habetis, possidetis; non tamen ut priuatam utilitatem hinc uobis quæretis, sed ut publicum bonum iuuetis, ut si opus sit, inde rebus humanis subsidium afferatis. Neque enim quicquam ad respub. optime instituendas ac retinendas, utilius est bonorum uirorum bonis scriptis. Sicut cōtra mera pestis est, quæ ex malis malorum libris hauritur. Recte enim artes, boni mores, optimæ disciplinæ traduntur ac seruantur in bonis libris. At sine rectis artibus, sine bonis moribus, sine optimis disciplinis, & in summa, sine literis uita non est uita censenda, uelut supra ab initio dixi, & uetus illud chaos, rudis indigestaq; moles reducit. At uos sanē in illo librorum Græcorum thesauro uestro, non unius alicuius liberalis artis aut disciplinæ autores habetis, sed ex tota philosophia, medicina, mathesi, ac Theologia optimos, & eos neq; hactenus typis excusos, neq; multis adeo adhuc uisos, immo ne nominibus quidem plerisque omnibus notos, & fortassis nusquam alibi extantes, uelut ex indice cognoui, quem multarū rerum usu ac experientia clarus medicus apud uos Geryon Seilerus ad me misit.

immo

Immo nō modo indicem hic amicus noster misit, sed quæ uestra est uiri Augusti-
 steñ. erga recta studia benignitas, de Vobis eorum librorum etiam usum mihi
 promisit, multa simul de uestra magnanimitate, ac magnifica uoluntate mecum
 loquutus, ac mihi pollicitus. Quāquam autem antea mihi uirtutum uestrarum
 gloria non ignota esset: (Qui enim ignota esse possit, quæ per totū orbem de-
 cantata est?) tamen eo referente plura cognoui, & propius introspexi, q̃p̃ antea
 ex auditu & aliorum scriptis intellexeram. Accessit ad huius narrationē uir ex-
 cellenti iuris scientia, & eximia prudentia præditus Claudius Peutingerus, clā-
 riss. Iurisconsulti Cōradi Peutingeri filius, nō modo in paternis uirtutibus refe-
 rendis, sed in maximis etiam rebus ac negotijs, pro patria obeundis ac geren-
 dis, non iam spem, sed ipsam rem præstans. Cum hoc uiro ante paucos annos
 mutua aliqua cognitio mihi intercessit, quæ sanè iudiciū de Vobis meum con-
 firmavit, & in id consiliū me adduxit, & breuiter effecit, ut nō dubitauerim Hip-
 pocratem hunc latinum meum ad Vos deferre, Vobis inscribere ac dedicare,
 ære ac libra uestrum facere. Cæterum erunt fortassis qui uel hoc nomine
 Hippocratem à nobis latine conscriptum impetent, quod præstiterat græcum
 legere, ac satis fuerat græcum extare. His sanè larga data est eius rei faciendæ e-
 tiam per me copia. Nam & Græcum exemplar per me editum ex Frobeniana
 officina, non paucis locis melius ac correctius est quàm Venetū. Et si uere Hip-
 pocratis studiosi sunt illi, non poenitebit ipsos uel ambo coemere, habere, ac le-
 gere, immo etiam plura inquirere, quo tandem emendatissimus sua lingua lo-
 quens Hippocrates habeatur. Quin & ego semper ita sensi, melius esse quos-
 uis scriptores in sua lingua, qua ipsi scripserunt legere, quàm optime etiam in a-
 liam translatos. Sed quid facient hi qui Græcum non intelligunt? Antea osten-
 di huius autoris difficultatem, breuitatē, & ænigmati similem obscuritatem.
 Quādiu uero expectandum nobis est hoc sæculum, in quo medicinæ studiosi
 ex æquo omnes ad legendum ac intelligendum Hippocratem Græcum suffi-
 cient? Esse autem Hippocratem talem rei medicæ autorem, ut sine ipso res me-
 dica integre consistere non possit, & sæpe aliàs dixi, & nunc non minus asse-
 uerantissime affirmo. Totus enim Galenus omnem suam doctrinam, ad Hip-
 pocraticam methodum, uelut ad amūssim direxit. Idem fecerūt & ante, & post
 Galenum, optimi quique tum medici, tum philosophi, ut ineptissimos pari-
 ter ac indoctissimos se esse declarauerint, qui unquam ab Hippocrate descia-
 uerunt, aut ipsius dogmata impetiuērunt, quorum multos adeo in libris suis
 hinc inde, ex omni occasione Galenus reuellit, ac explodit. Demus autem hoc
 sæculum spem nobis iniicere de futuris. Nam reuera nullum antea fuit, in quo
 per omnem fermē Europam pariter utriusq̃ linguæ cognitio in tantū aliquan-
 diu floruisse. At quid uetat, aut quid adeo obfuerit, hanc etiam accesssionem
 linguæ latinæ contingere, ut Hippocrates latinus pariter & Græcus legatur?
 maxime quum etiam Græcus ex nostra latina interpretatione clarior euadat,
 & expositionis Græci uicem latinus supplere possit. Verum mihi, uelut antea
 quoq̃ dixi, uidentur omnia nunc ingenia, omnes artes ac disciplinæ in sum-
 mo ac præcipiti stare: atq̃ utinam sic retinerentur, non retro ut ruerent, & es-
 set aliqua saltem spes in paucis, qui in posterum suis magistris discipuli euades-
 rent

INDEX LIBRORVM IN HOC

VOLUME CONTENTORVM.

Hippocratis uita ex Sorano	folio 1	Liber tertius	218
Hippocratis Iusiurandum	3	Liber quartus	228
Lex Hippocratis	4	De affectionibus	245
De arte liber	5	De internis affectionibus	258
De ueteri medicina	10	De uirginum morbis	286
De medico	20	De natura muliebri	287
De decenti ornatu	23	De morbis mulierū, liber primus	309
Præceptiones	27	Liber secundus	350
De natura hominis	30	Notha ad finem primi libri de morbis	
De salubri diæta, Polybi	37	mulierum adiecta	383
De genitura	39	De sterilibus	386
De natura pueri seu foetus	43	De morbis popularibus, lib. I.	397
De carnibus	55	Liber secundus	410
De septimestri partu	61	Liber tertius	421
De octimestri partu	64	Liber quartus	434
De superfœtatione	66	Liber quintus	444
De exsectione foetus	72	Liber sextus	455
De dentitione	74	Liber septimus	467
De corporum resectione	75	De uictus ratione in morb. acut.	489
De corde	ibidem	De iudicationibus	510
De glandulis	78	De diebus iudicatorijs	514
De ossium natura	81	Aphorismi	517
De locis in homine	88	Prænotiones	533
De aere, aquis, & locis	104	Prædictionum, liber primus	542
De flatibus	117	Liber secundus	549
De medicamentis purgantibus	125	Coacæ prænotiones	563
De diæta siue uictus ratioe, lib. I.	124	De uulneribus capitis	590
Liber secundus	136	Chirurgiæ officina	598
Liber tertius	148	De fracturis	602
De insomnijs	156	De articulis	621
De alimento	161	De ulceribus	658
De humidorum usu	164	De fistulis	665
De humoribus	167	De Hæmorrhoidibus	667
De morbo sacro	172	De uisu	669
De morbis, liber primus	180	Hippocratis epistolæ	671
Liber secundus	194		

FINIS.

HIPPOCRATIS COI VITA

EX SORANO, ~~IANO~~ CORNARIO

Medico Phÿfico interprete.



IPPOCRATES genere Cous fuit, Heraclidæ & Praxitheæ filiæ Phenæretes filius. Ad Herculem autē & Aesculapiū originem generis sui referebat, ab alteroq; se uigesimū, ab altero decimū nonum se numerabat. Eius autē genealogiæ Erato sthenes mētionem facit, & Pherēcydes, & Apollodorus, Arius item Tarsensis. Cæterū parentis sui Heraclidæ discipulus fuit, deinde Herodici, & ut quidā tradunt, Gorgiā Leontinum rhetorem audiuit, & Democritū philosophum Abderiten. floruit temporibus Peloponesiacis, natus (uelut Istomachus in primo de Hippocratis secta tradit) primo octogesimę Olympiadis anno. Soranus uero Cous: qui Coorū bibliothecas perscrutatus est, addit, sub Abriadæ monarchia, Agriani mensis septima & uicesima die, in qua etiam usq; in hūc diem Coos Hippocrati omnia sacra facere tradit. Porro quū in arte medica totoq; disciplinarū orbe exercitissimus esset, functis uita parentibus, ex patria discessit, ut quidē maligne de eo Andreas in eo quē de Medicinæ origine scripsit libro prodit, propterea quod publicam Cnidiorū bibliothecā igne cōcremasset. Alij autem eo proposito eum patriam reliquisse dicūt, ut rei medicæ effectus & successum per multos locos cognosceret, & in his uarijs modis exercitaretur. Quemadmodū uero Soranus Cous narrat, Somnus deus eum per somniū admonuit, quo se ad Thessalorum regionē inhabitandam conferret. Cæterum per omnē Græciam Medicinæ gloria omnib. admiratiōi fuit, adeo ut etiam à Perdiccā Macedonū rege, qui tabe laborare putabatur, uocatus publice sit, ad ipsūq; unā cum Euryphōte, qui ipso ætate maior erat, peruenit, animiq; hūc regis affectū esse certis signis deprehendit. Post mortem enim Alexādri parentis, unam ex pellicū eius numero Phylam nomine Perdiccas deperibat, ad quā quū rem ipsam Hippocrates detulisset, postea ex illius cōspectu omnino illum mutari obseruauit, atq; ita morbo depulso regem cōseruauit. Vocatus est & Abderam quo præsens ipse Democritū ab insania liberaret, atq; eo sanato à tota urbe pestem depelleret. Quin & in Illyricum plurimasq; barbaras terras peste ingruente, & illarum gentiū regibus ipsum ad se uocantibus, quū à legatis ipsorū qui uenti in illis regionibus uigerēt, didicisset, ipsos re infecta dimisit. At uero quum prudenti ratiocinatione pestem in Atticā grassaturā præuidisset, futurū id prædixit, & tum ciuitatū, tum discipulorū curam gessit, intantūq; Græciæ amator fuit, ut quum ipsius nominis celebritas usq; ad Persas diuulgaretur, atq; ea gratia ab Artaxerxe per Histanidem Helleponti præfectū, magnis muneribus & precibus ut ad ipsum ueniret inuitaretur, ob honestatē, argentiq; cōtemptum, ac Græciæ amorē, regi id denegarit, quemadmodū & hoc ex epistola eius ad illum manifeste ostēditur. Propriam porro patriam liberauit, quū Athenienses ei bellū illaturi essent, Thessalis ad auxiliū ferendū rogatis. Quapropter splendidos honores apud Coos cōsequutus est: imo & apud Thessalos Argiuosq; & Atheniēses, qui eum Eleusinijs sacris secundū ab Hercule publice initiarūt,

& ciuē conscripserunt, atq; in Prytaneo alimēta tum ipsi, tum posteris eius de-
derunt. Liberaliter autem & minime inuidiose studiosos artem edocuit, decen-
ti iureiurādo prius adstrictos. Vita functus est apud Larissæos, quādo & Des-
mocritus obijisse traditur, atq; alij quidē nonagesimo ætatis suæ anno, alij octo-
gesimo quinto, alij centesimo quarto, quidā uero cētesimo nono, decessisse tra-
dunt. Sepultus autem est inter Gyrtonē & Larissam, ubi usq; in hūc diem mo-
numentū eius cernitur, in quo sanē ad multū tempus examen apum mellifican-
tium erat, quo melle ad infantum oris ulcuscula iuxta tumulum illito, nutrices
ea facile persanabant. Porro in multis imaginib; uelato capite pingitur, ut qui-
dam aiūt pileo, quod nobilitatis signū est; nam hoc modo etiam Vlysses Pilea-
tus cernitur: Alij autem pallio uelatū dicunt, atq; ex his aliqui decoris gratia id
fieri asserunt, quādoquidem caluus erat: aliqui uero ob capitis imbecillitatē id
fieri perhibēt, aliqui autē significanter id ab eo factū uolunt, nimirū quod prin-
cipem rationalis animæ sedem probe munitā & contactam esse oporteat. Alij
signum peregrinationes amantis esse ferunt; alij uero rursus obscuritatem scri-
ptorū ipsius per hoc significari cōtendunt. Alij postremū in testificationē id fie-
ri uolūt, quod etiam sanitatis tēpore ea quæ lædere possunt cauere debeamus.
Quanquam quidam affirmant, quod in administratione rerum gerendarū, ne
quid à circumfluo pallio manus ipsius impedirētur, id ipsum complicatū in ca-
put reijcere cōsueuerit. Cæterū de scriptis ipsius multa dissensio est, quare sit ut
quum alia alij opineantur, nō facile sit de ipsis certum quid pronuciare, ob mul-
tas præsertim causas quæ iudicij certitudinē obfuscant: uelut est primum qui-
dem cognomen. Secundo quod dictionis characterē possibile sit seruare. Ter-
tio quod unus & idem modo robustiore, modo remissiore dictione per ætatē
utatur: neq; desunt etiam aliæ præter has causas, si referre libeat. Pecuniarum
autem penitus contemptor fuit, moribusq; sanctis, ac Græcorū amator, quare
etiam gentiles suos summa diligentia curauit, adeo ut à peste omnes ipsorū ci-
uitates liberarit, quemadmodū supra dixi. Vnde & splendidos honores nō a-
pud Coos tantum, sed & apud Argiuos & Athenienses est cōsequu-
tus. Filios à morte reliquit duos, Thessalum & Draconem,
discipulorum uero magnū numerum. Clari-
ssimi uero ipsius filij fuisse
perhibentur.

HIPPOCRATIS COIIVSIV=

RANDVM, IANO CORNARIO ME=

dico Physico interpretē.



POLLINEM medicum, & Aesculapiū, Hygeamq; ac Panaceam iuro, deosq; omnes iteq; deas testes facio, me hoc iusiurandum, & hanc cōtestationem cōscriptā pro uiribus & iudicio meo integrè seruaturū esse. Præceptorem sanè qui me hanc edocuit artem, parentum loco habiturū, uitam cōmunicaturum, eaq; quibus opus habuerit impertiturū: eos item qui ex eo nati sunt pro fratribus masculis iudicaturū, artēq; hāc si discere uoluerint, absq; mercede & pacto edocturū: præceptionū, ac auditionū, reliquaq; totius disciplinæ participes facturum, tum meos, tum præceptoris mei filios, imò & discipulos qui mihi scripto cauerint, & medico iure iurando addicti fuerint, alij uero præter hos nulli. Cæterum quod ad ægros attinet sanandos, diatani ipsis cōstitutam pro facultate & iudicio meo cōmodam, omneq; detrimentū & iniuriā ab eis prohibebo, Neq; uero ullius preces apud me adeo ualidæ fuerint, ut cuipiam uenenū sim propinaturus, neq; etiā ad hāc cōsiliū dabo, Similiter aut neq; mulieri talum uulua subditiū, ad corrumpendum conceptū, uel foetum dabo. Porro præterea & sanctè uitam & artem meam conseruabo. Nec uero calculo laborātes secabo, sed uiris chirurgiæ operarijs eius rei faciendæ locum dabo. In quascūq; autē domos ingrediār, ob utilitatem ægrotantium intrabo, ab omniq; iniuria uoluntaria inferēda, & corruptione cum alia, tum præsertim operū uenereorum abstinebo, siue muliebria, siue uirilīa, liberorum ue hominū aut seruorum corpora mihi cōtigerint curanda. Quæcūq; uero inter curandū uidero aut audiero, imò etiam ad medicandum non adhibitus, in cōmuni hominum uita cognouero, ea siquidem efferre non cōtulerit, tacebo: & tanquā arcana apud me cōtinebo: Hoc igitur iusiurandum mihi integrè seruanti, & non confundenti, cōtingat & uita & arte feliciter frui, & apud omnes homines in perpetuum gloriā meam celebrari. Transgredienti autem & peieranti, his contraria eueniant.

HIPPOCRATIS COILEX,

IANO CORNARIO MEDICO

Physico interprete.



EDICINA omnium artium præclarissima est, Verū propter ignorantiam eorum qui eam exercēt, & ob vulgi ruditatem, quod tales pro medicis iudicat & habet, iam eō res deuenit, ut omnium artium lōgè uilissima censeatur. At uero hoc peccatū ob hanc potissimū causam mihi cōmitti uidetur. Soli namq; Medicinæ nulla pœna in rebus publicis statuta est, præterquā ignominia, uerū hæc ipsa non afficit, neq; cōtingit eos qui ex cōposito personam ipsius induerunt, Similimi enim huiusmodi Medici sunt personis quæ in tragœdijs introducuntur. Quemadmodum enim illi figuram quidem & habitū ac personam eorū quos referūt habent, illi ipsi autem uerè non sunt, Sic & Medici fama quidem & nomine multi, re autē & opere ualde pauci. Quisquis enim Medicinæ scientiam sibi uere cōparare uolet, eū his ducibus uoti sui cōpotem fieri oportet, Natura, Doctrina, Loco studijs apto, Institutione à puero, Industria, & Tempore. Primū quidem igitur omnium Natura opus est. Natura enim repugnāte, irrita omnia fiunt. Si uero natura ad optima uiam demonstrēt, artis Doctrina facile cōtingit, quam sanè cū prudentia sibi cōparare oportet, ita ut à puero institutio accedat, atq; id in Loco à natura ad disciplinā apto. Amplius autē & Industriā adhibere oportet: eamq; ad multum omnino tempus, quo disciplina ipsa insita, feliciter & cū profectu fructus suos producat. Qualis enim eorū quæ terra producit cōsideratio est, eiusmodi etiam disciplinæ Medicinæ per omnia similiter existit. Natura enim nostra, uelut ager est, dogmata præceptorū, uelut semina sunt. Institutiōi à puero cū eo cōuenit, quod opportuno tēpore semina in aruū cadere oportet. Locus autem in quo disciplina cōtingit, est uelut ambiens aer, à quo è terra nascētibus nutrimentū accedit. Industria autē, cultura est. Tempus postremū hæc omnia corroborat, ut perfectè enutrientur. His igitur ad artem medicam allatis, & uera ipsius cognitione comparata, tandem per urbes obambulando, nō sermone tantum sed & opere medicos haberi conuenit. Imperitia uero malus thesaurus est & infelices opes his qui eam repositam habēt, & insomniū, aut potius somnium diurnum, & maxime uerum, alacritatis fiduciaq; ac ueræ exultationis expers, timiditatisq; & audaciæ nutrix. Timiditas equidem impotentia, Audacia uero Ignorantiam artis significat. Duo enim sunt, Scientia & Opinio, quarum altera quidem scire facit, altera uero ignorare. Cæterum res sacræ sacris hominibus demonstrantur, prophanis id fas non est, prius quàm scientiæ orgijs initientur.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE ARTE, IANO COR-

NARIO MEDICO PHYSICO INTERPRETE:



VNT quidam qui artē putant, reliquas artes turpiter incessendo dehonestare, atq; id quidem ueluti putāt non trāsigunt, ut ego sanē assero, sed propriā cognitionē ac scientiam ambitiosē ostētant. Mihi uero inuenire aliquid eorū quā nōdum inuēta sunt, quod ipsum notum quā occultū esse prāstet, scientiā uotum ac opus esse uidetur, Similiterq; & semiperfecta ad finē perducere & absolverē. At uero uerbōrū inhonestorum arte ad ea quā ab alijs inuenta sunt confundenda, promptū esse, nihil quidem corrigendo: eorū uero qui aliquid sciūt inuenta apud ignaros calumniando, non sanē scientiā uotum aut opus esse uidetur: sed proditio magis naturā suā, aut ignorātia artis. Solis enim artis ignaris hoc ipsum factum cōuenit, qui cōtentiosē quidem gestiunt ac conātur, nequaquā uero possunt malicie sufficere, ad hoc ut aliorum opera quā quidē recta sunt, calūnientur, quā uero nō recta sunt, reprehēdant. Eos quidem igitur qui in alias artes hoc modo irruunt, quibus hāc curā sunt, quorūq; id interest, & prāstare hoc possunt, prohibeant. Prāsens uero sermo his qui medicinam eo modo inuadunt aduersabitur, confidēs quidē & animatus propter utilitatem eorū quos infectatur: copiosus uero ob artē, quā prāstat & auxiliatur: potens autē ob sapientiā, qua est eruditus. In uniuersum itaq; nulla uidetur mihi ars esse quā nō existat, absurdū enim est aliquid esse putare quod nō est, quoniam eorū quā nō sunt, quānam substantia cōspecta aliquis denūciare possit quod sint: Si enim nō existentia uidere non datur, quēadmodū existētia, haud equidem scio quomodo quis mēte cōcipere queat ea quā nō sunt, quēadmodum ea quā sunt, quā certe oculis uidere est, mētēq; intelligere quod sunt, uerum ut ea nec uideas nec intelligas, nō similiter cōtingere potest. Sed existētia quidē semper uidentur ac cognoscūtur: nō existētia autem, neq; uidētur neq; cognoscūtur. Cognoscūtur itaq; demonstratis iam artibus, & nulla est ars quā nō ex specie quadā rerū uideat, arbitrorq; sanē ego etiā nomina artib. ex speciebus accipi & imponi. Absurdū enim est existimare ex nominibus species rerū germinare & prouenire, Immo etiā impossibile existit. Nomina enim lege quadā naturā indita sunt, Species autē rerum non lege sancitā sunt, sed naturā germina existūt, atq; hāc quidē si quis ex prādictis non ad plenū intelligat, in alijs sermonib. fortassis clarij edocebitur. De Medicīna uero, utpote de qua hic institutus est sermo, claram demonstrationē faciam, & primū sanē definiā quod sentio, Medicīnā esse morbos ab aegris in totū tollere, & morborū uehementēs impetus obrūdere, & eorū qui à morbis uicti sunt curationē nō aggredi, quum id in confesso sit, quod Medicīna tales sanare non possit. Quomodo igitur hāc Medicīna faciat, & quali omnino facultate prāstet, de hoc iam reli-

quum sermonem instituam. Cæterū in artis demonstracione simul etiā sermones illorū qui eam dehonestare cōtendūt, quatenus quisq; eorū sibi quid trāsēgisse uisus est, reuellam. Principium itaq; sermonis hoc erit, cui omnes assensu ros scio. Quod quidem aliqui à medicīna curati sanitati restituūtur, cōfidentur, Quod uero nō omnes, ob hoc iam ars ipsa uituperatur: aiūtq; hi qui eam peius incessunt, q̄ hi qui à morbis apprehenduntur, eosq; euadūt, fortunæ ope euadant, & non auxilio ipsius artis. Ego uero non priuabo quidem ipse fortunam tanquam nihil operæprecij faciat, puto enim morbis qui male curātur ut plurimum infortunīū accedere: qui uero bene, eos bonā fortunā nancisci. Postea uero interrogo: quomodo possibile est sanatos aliud q̄ artē causari, siquidē eius usu & ministerio sunt sanati? Nudā enim fortunæ speciem eos respicere ac se qui noluisse, ex hoc apparet, quod seipsos arti cōcrediderunt, quare à gratia fortunæ referēda liberi sunt: ab ea uero quæ arti debetur minime se uēdicare possunt, quo minus ei sanitatē acceptū ferāt. In hoc enim quod se ei cōmiserunt ac cōcrediderunt, palām est ipsos speciē eius esse cōtemplatos, Vim uero eius patrato opere cognouerunt. Dicit sanē hic aduersarius, quod multi iam ægri etiā citra medicorum usum sint sanati: & ego id dicentibus credo. Videtur autem mihi omnino fieri posse, ut & qui medicis non usi sunt, in medicīnā inciderint, non tamen ut scierint quod in ipsa rectū fuerit, & quod nō rectum: alioqui contigisset ut seipsos eodē penitus modo curassent, quo curati fuissent, si medicos adhibuissent. & hoc tandem magnū signum est substantiæ ipsius artis, Nempe Artem esse, & quidem magnā, quando sanē etiā hi qui eam esse non putant, per ipsam seruati apparent. Valde enim necessarium est nosse, eos qui medicis etiam nō sunt usi, si ægrotauerunt & cōualuerunt, quod aut facientes aliquid, aut nō facientes sanati sunt. Aut enim inedia, aut edacitate, aut uberiore potu, aut siti, aut balneis, aut illuuiē, aut laboribus, aut quiete, aut somnis, aut uigilia, aut his omnibus promiscue utentes, conualuerunt. Et sanē propterea quod opem senserunt, ualde necessarium est ipsos nosse, quod fuerit aliquid quod opem tulerit. Et rursus si quid detrimenti acceperūt, necesse est & detrimentum nosse, & quod fuerit aliquid quod damnū dedit ac læsit. Non enim quicuis cognoscere potest ea quæ cōmoditate & detrimento sunt disparata. Si igitur is qui ægrotauit, siue laudare siue uituperare nouerit quid ex diætā, per quā conualuit, omnia hæc Medicinæ esse cōperiet, & sunt nihil minus ea quæ damno fuerūt, quàm ea quæ opem tulerunt, in testimoniū arti, quod Ars ipsa sit. Quæ enim profuerunt, ob rectum usum profuerūt, Quæ uero nocuerūt, ob id quod non recte usurpata sunt, nocuerūt. Atqui ubi rectum, & non rectum, utrunq; suum finem habet, quomodo quis hoc artē esse neget? Hoc enim ego artis expertus esse dico, ubi neq; rectū neq; non rectum aliquid existit. Vbi uero utrūq; horum inest, quomodo hoc nō artis opus, sed potius inartificialitatis existat? Amplius autē si ex pharmacis purgātibus, & aliū sistentibus solū, tum Medicīna, tum Medici sanationē facerēt, infirmus sanē sermo meus meritō iudicaretur. Nunc uero hi qui inter medicos maxime laudati sunt, & diætā, & alijs medicaminū formis sanant, quas ne idiota quidem artis ignarus si audiat, nedum Medicus, artis esse negare queat. Vbi igitur nihil neq; in ipsis bonis medicis, neq; in arte medica inutile est, Sed in plurimis eorum quæ ex terra nascuntur,

& eorum etiam quæ fiunt, species & formæ insunt medelarum & pharmacorum: non est quod amplius aliquis eorum qui sine medico cõualuerunt, casum spontaneum uero sermone uehere possit tanquam causam suæ sanationis. Spontaneum equidem nihil esse adparet ac deprehenditur. Omne enim quod fit, propter quid fieri cõperitur, atque etiam in singulis adeo propter quid fieri uidetur, Spontaneum uero nullam substantiam habere cõperitur, sed nudum tantum nomen. 90
 Medicina autem tum ex his quæ propter quid de industria excogitata sunt, esse adparet, tum substantiam amplius habere conspicitur. Quare his quidem qui fortunæ sanitatem acceptum ferunt, artique derogant, hæc quæ dixi respondere quis possit. Cæterum eos qui ob morientium calamitatem, artem demoliri contendunt, miror quamam memorabili ratione commoti, Intemperantiam quidem 95
 morientium causam mortis non statuunt, Scientiam uero eorum qui medicinam exercent, accusant: tanquam sanè Medici quidem ea quæ non conueniant imperare possint, Aegri uero quæ imperata sunt transgredi non possint. Atqui longe magis rationi consentaneum est, ægros non posse facere quæ imperantur, quam medicos non cõuenientia iubere. Medici namque sana mente sanoque 100
 corpore rem aggredientes, & præsentia cõsiderant, & de præteritis similiter iuxta præsentia ratiocinantur, intantum etiam ut aliquando palam gloriari soleant ægri, se illorum opera sanitati restitutos esse. Aegri uero neque qua parte laborent, neque ob quam causam laborent, neque quid ex præsentibus futurum sit, neque quid ex horum similibus fiet scientes, medici imperio subiaccet, dolentes quidem ob 105
 præsentia, timētes autem futura: & pleni quidem morbo, inanēs autem ciborum, ea quæ morbo grata sunt, quæ ad sanitatem faciunt assumere malunt, mori quidem non amantes, sed tolerare tamen non potentes. Hoc modo autem affectos, utrum uerisimilius est, hos à medicis imperata facere, an alia facere quæ medici non iusserunt: aut medicos tales quales superiori sermone declarauimus, non cõuenientia imperare? Nonne multo magis hos quidem quæ cõueniant iubere: 110
 illos autem temere & impotenter nolle obedire: atque sic inobediētes in mortem incidere? Quæ sanè qui non recte cõsiderant, causas ad hos qui inculpabiles sunt, referunt: eos uero qui maxime accusandi sunt, à culpa liberant & defendunt. Porro sunt item quidam qui ob eos qui uictis à morbis curam adhibere nolunt, medicinam ipsam reprehendunt, dicuntque quod morbi quos sanare aggrediuntur illi, per seipsos fuissent sanati, Qui uero auxilio opus habent, eos non continent. Oportebat autem inquirere, si quidem ars erat, omnibus æquè morbis sanitatem afferre. Qui igitur hæc dicunt, si medicis indignarentur, quod ipsorum talia dicentium, non ut delirantium curam habeant, merito sanè succensuerint magis, quam quod illa reprehendunt. Si quis enim ab arte potestiam in ea quæ non 115
 proficitur, aut à natura facultatem in ea ad quæ nata non est, exigat: is ignorat in saniam dementiæ potius quam ignorantia cõuenire. Quorum enim instrumentorum siue naturæ, siue artium facultatem obtinemus, per ea sanè opifices esse possumus, per alia uero minime licet. quum igitur homo morbo afficitur qui uehementior est quam medicinæ instrumenta, ne sperare quidem oportet ut à medicina exuperetur. Exēpli enim gratia, Interea quæ in medicina urēdi uim habent, ignis extreme urit, uerum eo minus etiā alia multa. An uero ex eis præstātiora leuiiores morbos curare non possint nondum satis cõstat, ualētissimos autem morbos 120

130 potentissima etiam instrumenta curare non posse, quomodo non sit manifestum? Quae enim ignis non efficit, quomodo ea quae ab illo non sunt domita non ostendant, quod alia arte opus habeant, & non ea in qua ignis instrumentum existit? Idem sentio & de alijs instrumentis quaecumque medicinae opus adiuuant, quorum omnium singulatim successum si non assequitur Medicus, uim affectionis accusare oportet, mea quidem sententia, non ipsam artem. Qui igitur eos reprehendunt qui uictis a morbo manu adhibere recusant, hortantur etiam ut ea quae non conueniunt attingant, non minus quam ea quae contingere interest artis, quod quum faciunt, his quidem qui nomine medici sunt admirationi sunt, ab his uero qui arte praestant deridentur. Nec uero adeo desipientes huius artis experti sunt: neque uitorum peratoribus neque laudatoribus indigent, sed ratione, ad quam sane actiones operificum absolutae, plenae sunt, & quae ab ea destitutae, mancae. Amplius uero etiam defectus aliquos quidem operificibus imputare oportet, aliquos uero ipsis operibus. Quae quidem igitur ad alias artes pertinent aliud tempus, aliumque sermonem requirunt, Quae uero ad medicinam, qualia sunt, & quomodo iudicanda, partim quidem superiori sermone ostendimus, partim uero praesenti oratione docebimus. Sunt enim his qui hanc artem probe norunt, morbi partim non in obscuro positi, et non multi; partim non in manifesto loco haerentes, & multi sunt. Qui enim ad interna uertitur, in obscuro siti sunt, Qui uero ad superficiem corporis erumpunt aut tumescunt, manifesti sunt. exhibent enim sese ut tum uisu, tum tactu, & soliditas & humiditas ipsorum percipiatur, & qui calidi sint quique frigidi sentiantur, qui sane singulorum aut praesentia aut absentia tales existunt. atque horum quidem omnium in omnibus certas ac infallibiles medelas esse oportet, non ob id quod faciles sint, sed quod certo inuento constant, Neque uero a qui busuis uolentibus inueniuntur, sed ab his qui uolunt itemque possunt. possunt autem quibus tum disciplina non eminus sed prope & largiter contingit, tum, natura non infelix liberaliter accessit. Ad manifestos quidem igitur morbos hoc modo artem diuite facultate praedita esse oportet, Neque uero ad minus manifestos eam inopem ac dubiam haerere conuenit. Sunt autem morbi minus aperti, quique ad os, quique ad uentriculum sunt conuersi. Habet autem corpus non unum uentriculum sed plures, Duo enim sunt qui cibum suscipiunt & demittunt, alique praeter hos plures, quos norunt hi quibus haec res curae fuit. Quaecumque enim membra carnem in orbem circumsitam habent, quam musculum adpellant, ea omnia uentriculum habent. Omne enim incoctum & quod non coaluit, siue pellicula siue carne coctum gatur, cauum est. Impletur autem dum sanum est flatu, dum aegrotat sanie. Habent itaque brachia tale carnem, habent & scemora, habent furas. Quin & in macilentis & excarnibus partibus eiusmodi caro inest, similiter ut in carnosissimis esse demonstratum est. Nam & qui thorax appellatur, in quo hepar continetur, & capitis circulus, in quo cerebrum concluditur: ipsumque adeo dorsum, ad quod pulmo uertigit, horum membrorum nullum est quod non & ipsum uacuum sit, ac multis segmētis plenum ac quasi discriminatum existat, quae parum abest ut uasa existant, quorum tamen aliqua habentem laedunt, aliqua uero etiam profunt. Praeter haec autem & uenae multae, & nerui non in carne sublimes, sed ad ipsa ossa producti ligamentum sunt articulorum: ipsi etiam articuli in quibus ossium quae mouentur commissurae inuoluuntur, & horum nullum est quod non subspumosum sit, & circa se forulos ha-

beat, quos sanies prodit, quæ deductis ipsis, multa & magno multorū micore egreditur. Ex prædictis itaq; omnibus nullum est quod oculis conspicienti uidere ac cognoscere cōtingit, quapropter etiam obscura mihi appellata sunt: & ab arte quoq; obscura esse iudicata sunt, non tamen quod obscura permāneant & nos uincant, sed quantum possibile est cognoscantur & superentur: possibile autem est quantū ægrorum naturæ ad considerandum conferunt, & quantum eorū qui perscrutaturi sunt naturæ ad perscrutandū aptæ sunt. Cum multo enim labore, & non modico tēpore præ oculis uidentur & cognoscuntur. Quæcunq; enim oculorum cōspectum effugiunt, ea mētis oculis obtinentur & superantur. Quæcūq; uero ob id quod nō statim cognoscantur ægri mala perpetiuntur, ea non ad medicos curātes ipsos, tanquā ad ipsorum autores referenda sunt, sed ad naturam ipsius ægri, itidemq; ipsius morbi. Medicus enim quum nō possit malum neq; uisu assequi, neq; audiendo ex aliorum narrationib. cognoscere, ratiocinatione ipsum persequitur. Etenim ipsi quoq; ægri qui obscuro morbo laborāt, si conentur medicis de morbis suis narrare, ex opinioe magis q̄ scientia narrāt. Nā si sciuiſſent, in ipsos sanè medicos nō incidissent, quū eiūsdē sciētiæ sit morborū causas nosse, & morbos ipsos omnib. medicamētis quæ auſcercere morbū prohibēt, curare posse. Quādo igitur neq; ex ægri narrationib. ad infallibilē certitudinē peruenire possit, aliō certe respicere medicū necesse est. Quare huius tarditatis nō ars ipsa, sed corporū natura causa existit. Hæc enim malū sentiēs, mederi magnopere gestit, cōsiderans tamen ne temeritate magis q̄ cōsilio, & ut facilitate magis q̄ uiolentia medeatur. Medicus uero si quidē suffecerit ad cognoscendū, sufficiet etiam ad sanādum. Si uero is in quo morbus cognoscitur, superetur, ob id sanè quod serius medicum accessit, aut ob morbi celeritatē peribit. Si enim ex æquo processerit morbus cum medicina, uelocior nō est. Si uero præoccupauerit, uelocior omninō existit, præoccupat autē tum propter corporum angustiam, in qua nō in conspectu inhabitant morbi, tum propter ægrorū negligentiam. Differunt enim & cunctantur, atq; ubi iam a morbis ipsis apprehensi sunt, tum demum curari uolunt ac experunt. Quare artis potentiam magis ex merito admiremur, si quem ex clandestino morbo ægrū restituat, quā si impossibilibus & desperatis opem ferre moliat. Nequaquā uero in ulla aliqua iam inuentarum artium tale quiddam inest, Sed quæ ex eis igne opificiū exercent, igne nō præſente, ocioſæ sunt. Vbi uero illum contigerunt, operosæ. Quæ item tractabili rerum materia artem suā exercent, ueluti aliæ quidem lignis, aliæ corijs, aliæ sculpendo tum ære, tum ferro, alijsq; similibus rebus earum quā plurimæ. Opera porro quæ ex hac materia, & cum huius materiæ instrumentis fiunt, tametsi facile retractari ac corrigi possint, tamen non magis uelocitate quā uelut decet perficiuntur, neq; defunctorie transiliūtur, uerum si quod instrumentum desit, interim quiescūt, quanquā etiam illis cunctatio & tarditas ad opus commodius absoluendum impedimento sit, Attamen opus laudatur & præfertur. Medicina uero aliquibus quidem ex suppuratione thoracis, aliquibus uero iuxta hepar & rhenes, alijs autem per omnes corporis uentriculos ægrotantibus, eorum omnium inspiciendi potētia priuata est: quod ipsum apud omnes in confesso existit, alias tamen facultates coadiutrices adinuenit. Vocis nimirum

rum claritatē & tarditatē, itemq; fluxiones quæ singulis locis per quos exitus eis dantur, destillare cōsueuerunt, quārū modo odores, modo colores, deinde etiam pōderatam tenuitatem ac crassitiem obseruat, ex eisq; signa tum eorum quæ ægri iam perpetiūtur, tum quæ perpeti possint, colligit. Quum uero hæc significationē de se præbeant, neq; ipsa natura uoluntaria dimittat, uires amplius ac necessitates medicina ipsa inuenit, quibus natura coacta indemnis tamen cōcedat. Natura autē stimulata & impulsā, artis peritis quæ faciendā sunt demonstrat. Cogit autem partim coalitū in nobis calorem, pituitā per ciborum ac potuum acrimoniā diffundere, quo intelligat quid sibi uisum sit de illis, quæ ut uiderētur ipsa machinata est: partim uero spiritū uelut delatorem, tum uis arduis, tū cursibus accusare ac prodere cogit. Quin & sudores per prædicta ducens ac excludens, humorum calidorum exhalationem perficit. Sunt præterea quæ per uescam pergressa magis morbum ostendere possunt, q̃ quæ per carnem exhalārūt. Inuenit igitur & tales potiones itēq; cibos, qui calidiores aliās calefacientib. existentes, illaq; & eliquāt, & profluere faciunt, quæ sanē nō profluxissent si nō hoc modo tractata fuissent. Alia itaq; ex alijs, & alia per alia prodeunt, quæ corpus pergressa morbum ipsum produnt, ut nihil miri sit ipsis seriū fidē haberi, & medendi conatus ac aggressiones tardiores esse, quā sic per peregrinas interpretationes ad medendi sciētiam ac cognitionem medicū perueniant ac erudiātur. Quod igitur & rationes in seipsa plenas & ad ferendū auxiliū abūdantes habeat medicina, & quod morbis qui corrigi nō possunt merito auxiliares manus negat, aut si fortē opem ferre molita est, citra culpam eam exhibet, id ipsum tum iam habitus sermo manifestū facit, tum etiam artis peritorū demonstrationes palām documentū præbent, quas sanē ex operibus iucundius q̃ ex sermonibus ostendunt: utpote qui dicendo nō magnopere exercitati, multitudini fidē sinceriorē ex his quæ uideat q̃ quæ audiat facere malint.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE VETERI MEDICINA, IANO CORNARIO Medico Physico interprete.



VICVNQVE de medicina dicere aut scribere aggressi, dicēdi scopum sibi ipsis ac fundamētum supposuerūt, calidū aut frigidū, aut humidū aut siccū, aut aliud quodcūq; uoluerint, rem in cōpendium cōtrahentes, principiū causæ, tum morborū, tum mortis, hominibus omnibus idem, unū aut duo proponentes, hi in multis quidem quæ dicūt manifestō errasse deprehēduntur. Iustior autem querela est de arte, quæ omnes in maximis utuntur, & bonos artifices maxime colūt. Sūt autem opifices alij uiles, alij longe præstātes, qđ sanē si nō esset omnino medicina, neq; in ipsa obseruationes essent, neq; quicq; inuentorū, non utiq; extaret, sed omnes æqualiter eius ignari et inexperti essent, et per fortunā omnes ægrotorū res gubernarētur. Nunc uero res nō sic se habet, sed quemadmodū aliarū omnium artū opifices multū inter se differūt, tū manu, tū mente, sic etiā in medicina. Quapropter nō cēseo ego ipsam inani fundamēto indigere, uelut obscura & dubia, de

de quibus si quis dicere conetur, necesse est fundamento uti. Velut si quis de sublimibus in aere rebus, aut de subterraneis dicat, & quomodo habeant sciat, tamen neque dicenti, neque audientibus manifestum satis fuerit verane sint an secus, Neque enim est ad quod quis se conferat, cuique innitatur ut veritatem cognoscat. Medicina autem iam ab antiquo existit, & principium & uia inuenta, per quam inuenta & multa & probe habentia coperta sunt, per multum adeo tempus, & reliqua deinceps inueniuntur, si quis sufficiens sit, & iam inuentorum gnarus, ex his ad perquirendum procedat. Quicumque uero his reiectis ac omnibus reprobatis, alia uia aliaque forma inquirere conatur, & quid inuenisse gloriatur, falsus est & fallitur. Impossibile enim id est, uerum ob quas necessitates impossibile sit, ego demonstrare conabor, docens ac demonstrans quod ars existat. Ex hoc autem patrum fiet, impossibile esse aliquo alio modo inueniri. Videtur autem mihi maxime, de hac arte dicturum oportere uulgo ac plebeiis hominibus, nota dicere, Neque enim de alio quopiam, neque querere neque dicere conuenit, quod de affectibus, ex quibus illi ipsi agrotant. Ipsos quidem igitur suas ipsorum affectiones condiscere, quomodo fiunt ac desinunt, & quibus occasionibus augescunt ac deficiunt, quum idiotae sint non est facile, uerum ab alio inuenias ac proditas, proclive. Nihil enim libentius quisque recordatur quam quae sibi ipsi accidisse audit. Si quis autem idiotarum sententia destitueretur, & audientes non afficiet, ille etiam ueritatis compositum non fiet, & propterea neque fundamentum neque scopo opus habet. Etenim Ars medica neque inuenta ab initio fuisset, neque quaesita, Nihil enim ea opus erat agrotantibus hominibus, si eadem diata uterentur, & assumerent quae sani edunt ac bibunt, imo etiam alterius diatae usus eis profuisset, si non alia fuissent his meliora. Nunc autem ipsa necessitas homines coegit Medicinam inquirere ac inuenire. Quoniam agrotis eadem in cibo assumuntibus quae sani solent, non fuit utile, uelut neque nunc utile existit. Quin ut rem altius expendamus, neque ipsam sanorum dietam ac alimoniam qua nunc utuntur, inuentam fuisse censeo, si suffecisset homini idem cibus ac potus, qui boui ac equo, & omnibus alijs praeter hominem, ueluti sunt ex terra nascentia, fructusque ac herbae & foenum. Ex his enim nutriuntur, & augescunt, & illasi degunt, non indigentes alia diata. Quanquam ego sane ab initio etiam hominem tali uictu usum esse putem. Quae uero nunc inuenta sunt edulia, multa arte excogitata & multo tempore producta esse mihi uidentur, quum multa & grauiora, ex forti ac ferino uictu homines paterentur, qui intemperatus, & magnas uires habens ingerebatur, qualia sane etiam nunc ex ipso paterentur, doloribus uehementibus & morbis obnoxij, & breui etiam morti. Verisimile est autem haec mala tunc minus perpeffos ipsos esse, propter consuetudinem: quamquam etiam tunc uehementer afflicti sint, & consentaneum est plurimos & debiliore natura praeditos perijisse, eos uero qui uictum illum superare poterant longiori tempore durasse ac restitisse. Quemadmodum etiam nunc ex ualidis edulij alijs qui facile liberantur, aliqui cum multis doloribus ac malis. Ob hanc itaque necessitatem etiam illi mihi uidentur quaesiuisse uictum naturae conuenientem, & inuenisse hunc, quo nunc utimur. Ex tritico igitur macerato, & a cortice purgato, molitoque ac cribrato, & subacto ac assato, panem fecerunt, Ex ordeo uero mazam, aliaque multa ex hoc excogitantes, coxerunt, & assarunt, & miscuerunt, fortiaque & intemperata, debilibus temperarunt, effingentes omnia iuxta hominis naturam ac uires

res, quæ quidem fortiora essent, ab ipsa natura nō posse superari, si ingesta essent, existimantes: ab his ipsis quoque dolores & morbos ac mortes oriri iudicantes: cōtra ab his quæ natura domare posset, alimentū & augmētum & sanitatem. Porro inuento huic quod nam iustius aut magis conueniens nomē quis imposuerit quàm medicinæ, quandoquidē ad hominis sanitatem alimētumque ac salutem inuētum est, in permutationem illius uictus ex quo dolores & morbi fiunt. Si uero ars ipsa esse non putatur, nihil absurdi est. Nam cuius nemo ignarus est, sed sciētes omnes, ob usum & necessitatē, eius nō conuenit aliquē artificem appellari. Atqui inuentū ipsum & magnū & multæ artis ac cōsiderationis existit, Quinetiā in hunc usque diem exercitiorū & reparādarum uirium curam gerentes, semper aliquid amplius adinueniūt, iuxta eandem uiam inuestigantes quod quis edens ac bibens maxime superet, ac seipso fortior euadat. Consideremus itaque & cōfessam ab omnibus medicinā, eam uidelicet quæ propter ægros inuenta est, an & nomē & artifices habeat, & ipsa dominari ipsis uelit, & unde tandem initium sumpsit. Mihi equidē, uelut in principio dixi, nemo ne quæsiuisse quidem Medicinā uidetur, si idem uictus & ægrotis & sanis cōuenisset. Itaque usque in hunc diem hi qui medicina nō utuntur Barbari ac Græcis cōfines, eodem modo quo sani uictitant ad uoluptatē, & à nulla re quā concupiscunt abstinēt, neque quicquā deuitant. Cæterum qui Medicinam quæsiuerunt ac inuenerunt, eādem cū illis de quibus superiori sermone dictū est, sententiam habuerunt, & primū quidem ex his ipsis cibis copiam detraxerunt, & pro multis paucos statuerūt. Quum uero ipsis aliquādo hoc ad aliquos ægros sufficeret, palamque fieret quod prodesset, nō tamen omnibus, sed essent quidā ita habentes, ut neque modicos cibos superare possent, imbecilliore sanē quopiā tales indigere illis uisi sunt, sorbitionesque inuenerūt, pauca ex fortibus multa atque permiscentes, & robur ipsum temperatura ac coctura detrahētes. Quod si qui neque sorbitiones superare possent, his detraxerūt etiam ipsas, & ad potiones peruenerunt, obseruaruntque ut & hæc tum usu, tum copia moderate haberent, & neque plures quàm oportet, neque meraciores & intemperatiores, neque defectuosiores offerētes. Probe autē nosse oportet quibus sorbitiones in morbis nō conducūt, Nam statim ubi hoc fecerint exacerbātur ipsis febres ac dolores, & manifestū fit, quod assumptū morbo quidem alimentū ac incrementū præbet, corpori uero tabes & infirmitas existit. Quicūque uero homines in hac affectione existentes siccum cibum assumunt, aut mazam, aut panē, etiam si ualde modicū, decuplo magis & manifestius læduntur, quā si sorbitione uisi essent, ob nullam aliam causam quàm fortitudinē edulij ad affectionem, in quo sorberē conducit, edere autē non. Si enim plura comederit, plus utique lædetur: si uero pauca, dolebit tamen omnino. Omnes itaque dolores causæ ad idem reducuntur, nimirum fortissima edulia maxime & manifestissime hominē lædere, siue sanus sit, siue ægrotus. Quid igitur aliud cogitasse uideri queat hic appellatus Medicus, & confessus artifex, qui ægorū dietam ac uictum adinuenit, quā ille qui ab initio omnibus hominibus uictū quo nunc utimur, ex agresti illo ac ferino reperit ac subornauit. Mihi equidem uidetur idem modus, & unum quoddā ac simile esse inuentū. Hic enim ea quæ natura humana sana superare non potuit incidentia & ingesta, propter feritatē intemperantiæque: ille uero qualicūque tan-

dem

dem unusquisq; affectione teneretur, ut superare non posset, eadem detrudere quæsiuit ac instituit. Quid hoc ab illo differt: præterquam quod multiplicior & uarietior ac maioris negotij est hæc species. Verum principiū fuit illa quæ prius est producta. Si uero quis cōsideret quæ sit ægrotorū diætā, cōparatione ad sanorū diætā factā, is inueniet hæc ægris nocentiorē quā eam quæ ferarum est & aliorū animalū sanis. Etenim uir laborans morbo neq; difficili & intolerabili, neq; rursus leui & despicibili, si panem aut carnē, aut aliud quid ex his quæ sanī edentes iuuātur, comedere uolet, nō multum, sed multo minus q̄ sanus poterat, contingat autē ut nec sit qui eū delinquere admoneat. Alius contra sanus naturam habens nō omnino debilem, neq; rursus fortem, si comederit quid eorum quæ bos aut equus comedens iuuatur, & edat sanē eruū aut ordeum, aut aliud quid huiuscemodi, non multum, sed multo minus q̄ potest. Sanus utiq; qui hoc fecerit, minus & dolebit & periclitabitur q̄ ægrotus ille, qui panē aut mazam intempestiue ingessit. Hæc itaq; omnia signa sunt, quod ipsa ars medica uia ac methodo quæ sita inueniri possit. Si quidem igitur simpliciter, uelut aliqui putāt, quæ fortiora sunt nocerent, quæ debiliora prodesse & nutrerēt, tum ægrum, tum sanum, facilis sanē res erat, Multum enim de securo detrudere oportebat ut ad debilissimū deduceretur. Nunc autē non minus delictum, nec minus lædit hominē, si pauciora & defectuosiora q̄ satis est assumatur. Fames enim magnā potentiā in naturam hominis habet & sanādi & debilitandi & occidendi. Multa uero etiam alia mala, diuersa quidem ab his quæ ex repletione fiunt, nō minus autem grauiā, uacuationis sunt, quapropter multo uarietior est, & maiorē diligentiam requirit. Oportet enim modum aliquem coniectare. Modum autem neq; pōdus, neq; numerum aliquem, ad quem referas cognoscas: certitudinem enim exactam nō reperiēs aliam quā corporis sensum. Quapropter operosum est ita exacte cōdiscere, ut parum in alterutrā partem delinquas: quanquā ego etiam eum medicum uehementer laudari, qui parum delinquat. Certitudinē autem exactam raro uidere contingit. Quare pleriq; Medici eadem quæ mali gubernatores in seadmittere mihi uidentur. Etenim illi quum in tranquillitate gubernātes delinquūt, non fiunt manifesti: quum uero deprehenderit ipsos uentus magnus & tempestas, palām iam cōspicui sunt omnibus hominibus, quod ignorātia & culpa erroris sui nauem perdiderunt. Sic sanē etiam mali & plurimi medici, quū curant homines nihil graue patientes, in quos si quis etiā maxime delinquat, nihil graue faciat. Sunt autem multi tales morbi, & multo sæpius q̄ graues hominibus accidunt. In talibus sanē delinquētes, non fiunt manifesti idiotis hominibus. Vbi uero obtigerit magnus & fortis & periculosus morbus, tunc ipsorum delicta & ars omnibus in cōspicuo sunt. Neq; enim lōge absunt singulorū poenæ ac cruces, sed breui adsunt. Quod aut non minores afflictiones ab intempestiua uacuatione quā a repletione hominibus cōtingant, probe discemus si in sanis rem experderimus. Sunt itaq; aliqui ipsorū quibus semel in die cibum capere cōducit, & hoc propter utilitatem sic obseruāt. Alij etiam prandent, propter eandē necessitatem, sic enim ipsis cōducit: Sed & quidam nō propter utilitatem, sed aut ob uoluptatem, aut ob alium aliquē casum alterutrū faciunt. Plurimorū enim hominū nihil interest utrū tandem faciant, siue semel tantū edant, siue etiam prandant

deant, hac cōsuetudine uti. Sunt autē quidā qui nō possint extra utilitatē faciētes facile degere, sed cōtingit utriusq; ipsorū, per diē unū atq; eū nō ociose permutantibus, immēsa afflictio. Alteri enim si prāsi fuerint, idq; eis nō cōducatur, statim graues & corpore segnes fiūt, itemq; mente pigri, hiatuq; ac osecitatione & dormitatiōe & siti pleni. Si uero etiā insuper cōenauerint, & flatus, et tormina, et aluus effringitur. et multis magni morbi principiū hoc fuit, si eosdē cibos quos semel insumere cōsueuerunt, bis assumant, & nihil his amplius. Alteri uero si prandere cōsueuerunt, idq; ipsis conducatur, & non pransi fuerint, mox ubi tempus prāterierit, statim impotentia uehemēs, tremor, animi deliquiū, postea oculi pallidi, urina crassa & calida, os amarū, & uiscera pendere ipsis uidentur, uertigo, iracundia, tristitia. hęc autē omnia ubi cōenare tentauerint. deinde autem pransuri cōsumere non possunt quæ prius cōenarūt. atq; hęc ipsa cum tormine ac strepitu descēdentia aluum cōcludunt, ipsiq; ægre dormiūt insomniāq; conturbata ac tumultuosa habent, plerisq; uero etiam horum hoc magni morbi principiū fuit. Cōsiderare porrō oportet ob quas causas hęc ipsis acciderunt. Et sanē puto his qui semel cibū sumere cōsueuerunt, quod nō expectauerūt iustū tempus, donec ipsorū uenter pridie ingestos cibos perfecte cōsumpsisset & exuperasset, euacuatusq; esset ac quiescisset, sed in feruētē adhuc & fermentatū nouos ingesserunt. Eiusmodi autem uentres multo tardius concōquunt, & maiori opus habēt cessatione ac quiete. His uero qui prandere assueti fuerunt, quod nō ubi citissime alimēto corpus indigebat, & iam priora consumpta erant, nec habebat aliquā amplius fruitionē, statim ipsi nouum alimentum suppeditatū est. deficit autem & cōsumitur præ fame. Nam omnia quæ tales homines perpeti dixi, fami imputo. Dico autē etiam alios omnes homines, qui duos aut tres dies in ediam pertulerint, eadē passuros esse, quæ de imprāsis dixi. Ceterum tales naturas quæ cito & fortiter eiusmodi delictis offenduntur, imbecilliores alijs esse censeo, proximus est autē imbecillis languenti: uerū imbecillior est languens, & plus laborare cōtingit ipsum, ubi iustum tempus nō est assequutus. Quum itaq; eiusmodi exacta certitudo circa artem existat, difficile est semper quod rectissimū est assequi. Multæ autem species in Medicina ad tantam certitudinem perueniunt, de quibus dicitur. Non censeo itaq; propter hoc artem uelut nō existentem, neq; probe inuestigatam, ueterem oportere reijci, quod non habeat circa omnia certitudinem exactam. Verum multo magis propterea quod propinqua est recto, simulq; ratione possit ad ipsum peruenire, admirari oportere censeo ea quæ ex multa ignorātia sunt eruta et inuenta, quod probe et recte adinuenta sunt, & non à fortuna aut casu. Porrō ad eos qui nouo modo artem ex scopis ac fundamentis suppositis quærunt, sermonem reducere uolo. Si enim calidū est aut frigidum, aut siccum, aut humidum, quod hominē lædit, & oportet recte medentem auxiliari, calido quidem in frigidū permutato, frigidum uero in calidū, siccum in humidum, humido in siccum: cōtingat mihi homo non fortis naturæ, sed ex debilibus, hic autē triticum edat quod ex area sustulit crudum & non elaboratum, & carnes crudas, & bibat aquam. Hoc uictu utens satis scio quod multa & grauiā perpetietur; Nam & doloribus uexabitur, & corpus debile euadet, & uenter corrūpetur, & multo tempore uiuere non poterit. Quod igitur auxiliū præparare oportet sic habenti

habētī: calidū an frigidū, uel siccū, uel humidū: simplex enim est quodcūq;
 ex istis. Si enim id quod ipsum lēdit aliquod ex his est, cōtrario soluere oportet
 ac liberare, quemadmodū ipsorum sermō testatur. Atqui cētissimū & manife-
 stissimū medicamentū est, uictū quo utebatur auferre, & pro tritico panē dare,
 pro crudis uero carnibus cōctas, in superq; uinū propinare. His permūtatis im-
 possibile est nō fieri sanum, nisi penitus fuerit tēpore ac uictū corruptus. Quid
 itaq; dicemus: Num quod ipsi à frigido afflicto calida hæc oblata auxiliū tuler-
 unt, aut contrā? Equidē opinor me multā hæsitationē interrogato præbiturū
 esse. Nam qui panē ex tritico parauit, calidū, aut frigidū, aut siccū, aut humidū
 abstulit: panis enim & in ignem & in aquā datur, & multis alijs elaboratus est,
 quorū singula propriam uim & naturā habent, & aliqua quidē à natura in ipso
 existentia abiicit, alijs autē temperatur ac permiscetur. Sed & hoc scio, q̄ in cor-
 pus hominis refert, panis purus, aut cui nihil fursurū decessit, & ex tritico nō
 decorticato, aut decorticato, & inulta aqua subactus, aut cōtrā, & superassatus
 aut crudior, aliq; præterea infinita. Similiter etiam de maza, et singulorū adeo
 uires magnæ, alteraq; alteri nihil simile habet. Quicūq; autē hæc nō considerās
 nō nouit, haud scio quo modo ille affectiones in hominē cognoscere possit: ab
 unoquoq; enim horū afficitur & alteratur homo, uel hoc, uel alio modo, & ex
 his omnis uita & sano, & ex morbo cōualescēti, & ægroto. Nihil igitur utilius
 neq; magis necessariū q̄ hæc cognouisse: quod & probe & conuenienti ratio-
 cinatione inuestigātes, iuxta hominis naturā hæc primī inuentores inuenerūt,
 iudicauerūtq; artē dignā quæ deo adscriberetur, quemadmodū etiam est rece-
 ptū. Nō enim siccū neq; humidū, neq; calidū, neq; frigidū, neq; aliud quicq; ex
 his putauerūt hominē lædere, neq; aliquo horū homini opus esse opinati sunt,
 sed quod in unoquoq; forte & humana natura potētius est, quodq; nō possit
 superare, hoc ipsum lædere duxerūt, & hoc auferre quæsiuerūt. fortissimū autē
 est inter dulcia, dulcissimū, inter amara, amarissimū, inter acida, acidissimū. &
 in omnibus adeo rebus uigor ipse ac summū. Hæc enim & in hominē inesse ui-
 derūt, & hominē lædere. Inest enim in hominē & amarū, & salsum, & dulce, &
 acidū, et acerbū, & fluidū, & alia infinita, omnigenas facultates habētia copiāq;
 acrobur. Atq; hæc quidē iuxta ac inter se tēperata, neq; cōspicua sunt, neq; ho-
 minē lædūt. Vbi uero qd horū secretū fuerit, atq; ipsum in seipso fuerit, tūc &
 cōspiciū est, & hominē lædit. Quin & ex cibis quicūq; nobis incōmodi sunt,
 & ingesti hominē lædunt. horū unusquisq; aut amarus est & meracus ac intē-
 peratus, aut salus, aut acidus, aut alius quis intēperatus & fortis: & propterea
 turbamur ab ipsis, quemadmodū etiam ab his quæ ex corpore excernūtur. Om-
 nia autē quæ edit aut bibit homo, talia edulia palam est minime hoc intēpera-
 to, & dissidente ac excedente succo participare, uelut sunt panis & maza & his
 similia, quibus aduetus est homo plurimis & semper uti: exceptis his quæ ad
 uoluptatem ac delicias cōdiuntur ac præparātur: & ab his plurimis in hominē
 ingestis turbatio ac secretio corporis facultatū minime contingit. Verū robur
 & augmentū, ac alimētum præsertim, per nihil aliud contingit q̄ quod probe
 temperatū est, & nihil habet intemperatū, neq; forte, sed totum unum factū est
 & simplex & non forte. Et ualde sanē dubito ego, quonā modo hi qui talem ser-
 monem proferunt, & artem ex hac uia ad scopum abducūt, curaturi sint homi-

240 nes, quemadmodū proponunt. Non enim est ipsis, uelut ego opinor, inuētum
 quid, ipsum in seipso calidū, aut frigidū, aut siccum, aut humidū, quod nulla
 alia specie cōmunicaret. Verum arbitror eosdem potus ac cibos ipsis esse, qui-
 bus omnes utimur. Apponūt autem alij quidem, quòd sit calidus, alij frigidus,
 alij quòd siccus, alij humidus. Quoniā illud sanè dubium est, imperare ægroto
 calidum quid assumere: statim enim interrogabit quid sit illud, ut nugas produ-
 cere necesse sit, aut ad aliquid eorum quæ sunt cōfugere. Si autem est calidum
 quoddam acerbum existens, aliud uero calidū fluidum, aliud calidum tenue,
 sunt enim & alia calida etiam alias uires subcōtrarias sibi ipsis habentia, quod
 igitur ipsorum assumere oportebit: calidum & acerbū, an calidum & fluidum,
 250 aut simul frigidū & acerbū. Nam & hoc est, itemq; frigidū & fluidum. Etenim
 quod ego scio, totum cōtrarium ab utroq; ipsorū euenit, idq; nō solum in ho-
 mine, sed etiam in corio ac ligno, & alijs multis rebus quæ magis stupidū sen-
 sum habent quàm homo. Non enim calidū est quod magnam uim habet, sed
 ipsum acerbum & fluidū, & alia quæ à me relata sunt, tum in homine, tum ex-
 tra hominem, siue edantur, siue bibantur, siue forinsecus illinātur, aut quomo-
 260 docunq; formata adhibeantur. Frigiditatē autem & caliditatem ego omnium
 facultatum minime potētes esse in corpore existimo, ob has sanè causas. Quo
 equidem tempore ipsa inter se permixta simul frigidū ac calidum fuerint, non
 lædunt. Temperamentū enim & moderatio cōtingit frigido à calido, & uicis-
 270 sim calido à frigido. Vbi uero seorsim utrunq; secretum fuerit, tunc affligit. In
 hoc itaq; tempore quum frigidum intus generatur, & citò hominē affligit, pri-
 mum propter hoc ipsum adest calidū inde adeò ex homine ipso, nullo alio au-
 xilio, neq; præparatione opus habens. atq; hoc & in sanis hominibus & in æ-
 grotis operatur. Itaq; si quis sanus hyeme corpus perfrigerare uelit, aut frigi-
 280 dæ lotionē, aut alio quopiam modo, quanto id amplius fecerit, si modo nō om-
 nino corpus congeletur, ubi uestimēta acceperit, & sub tegmen uenerit, magis
 & amplius corpore calescit. Rursus si quis fortiter cal fieri uelit, aut calido lau-
 cro, aut multo igne, inde uero eandem uestem habens in eodem loco conuersa-
 290 ri, in quo perfrigeratus, multo apparebit frigidior, & lōge horridior, quàm ali-
 quis qui præ æstu uentilationem admisit, & sibi ipsi frigus præparauit, atq; sic
 ex hoc modo recreatus est. Nam qui hoc facit, decuplo maiorem æstum ac ar-
 dorem percipit, quàm is qui nihil tale facit. Verū sunt adhuc testimonia mul-
 300 to maiora. Quicunq; per niuem aut aliud frigus iter facientes, excellenter frige-
 scunt aut pedibus aut manibus aut capite, ubi se cōtinuerint in noctem, quum
 cooperti fuerint & in tepore extiterint, ab æstu & pruritu uexātur, quibusdam
 etiam bullæ uelut ambustis ab igne exurgūt, neq; prius hoc patiūtur quàm cal-
 fiant: adeò prompte utrunq; ipsorū ad alterum accedit. possem & alia innume-
 310 ra recensere. Cæterū circa ægrotos, nōne quibus rigor contingit, his acutis-
 sima febris relucet: sed non adeo fortiter, uerū pauco tempore quiescēs, & aliās
 ferè innoxia, & quo tempore affuerit, percalida, & per totū corpus penetrans,
 desinens maxime in pedes, ubi sanè rigor & frigus ualidissimū diutissime du-
 320 rauit. Rursus quum sudor prodierit & febris decesserit, multo magis frigescit
 æger, quàm si ne apprehendisset quidē ab initio. Cui igitur breui adeò contra-
 rium accedit, cuiq; uis adimitur sua sponte, quid nam ab hoc magnū aut graue
 fiat

fiat: aut quid opus est multo ad hoc auxilio? Verum dixerit aliquis, Qui arden
 ti febre febricitant, itemq; peripneumonijis, & alijs fortibus morbis, nō cito ex
 calore liberantur, neq; adest hic frigidū aduersus calidū. Atqui ego hoc ma
 ximum signū esse puto, quod nō propter calidū simpliciter homines febrici
 tent, neq; hoc sit simpliciter afflictionis causa: sed est & amarū ac calidū idē,
 & calidū ac acidū, & salū ac calidū, & alia infinita, & rursus frigidū cum
 alijs facultatibus cōiunctum. hæc itaq; sunt quæ lædunt, simul adest autem &
 calidū robore participans, nimirū ducens & exacerbans & augens simul cum
 illis, uerū nullam potētiam, maiōrē quā conuenit uidelicet, habens. Atq; hæc
 quidem sic se habet. Signa porro primū quidem manifestissima producemus,
 quorum omnes iam sæpe experiētiam sumpsimus. Itaq; quibuscūq; nostrum
 grauedo innascitur, & fluxus per nares mouetur, hic ut plurimum acrior est eo
 qui prius erat, & quotidie ex narib. prodibat, & tumescere facit nasum, & exu
 rit calentē & extreme ignitum. si uero manum admouēas, & diūtius perseuera
 uerit, etiam exulceratur locus minime carnosus & durus existens. Sedatur au
 tem aliquo modo ardor in naribus, nō quum fluxus prodit, & inflāmatio con
 sistit: sed postq̃ fluxus crassior & minus acris, cōcoctusq; & magis permixtus
 priore fuerit, tunc sanē iam etiā ardor cessat. Rursus aut alijs ex frigidityte ipsa
 sola manifeste grauedo fit, nullo alio accedēte. Omnibus autē liberatio hæc est,
 ut ex frigidityte quidem affecti percalfiant, ex ardore uero perfrigerentur, atq;
 hæc breui accedunt, & cōcoctione nulla opus habent. Reliquæ autē omnes flu
 xiones quas propter humorū acrimonias & intēperantias ego fieri sentio, resti
 tuuntur & curantur, ubi temperatæ fuerint & concoctæ. Rursus quæcūq; flu
 xiones ad oculos uertuntur, ut fortēs & omnigenas acrimonias habentes, exul
 cerant quidem palpebras, erodunt autē aliquorū genas, & sub oculis partes,
 ad quascūq; tandem influxerint, rumpūt etiam & peredunt eam quæ oculum
 ambit tunicam. dolores autem & ardor, & inflāmatio extrema adsunt aliquan
 diu, donec fluxiones fuerint cōcoctæ, & crassiores redditæ, & lemæ ab ipsis ex
 titerint. Fit autē concoctio, ex permixtione, tēperaturaq; mutua, & quasi coctu
 ra. Quinetiam fluxiones in fauces delabētes, ex quibus raucedines fiunt, angie
 næ, erysipelata, peripneumoniæ: Omnes hæc primū quidem falsæ et humidæ
 acresq; descendunt, & in talibus morbi firmantur. Vbi uero crassiores & ma
 turiores factæ fuerint, & ab omni acrimonia liberatæ, tūc iam & febrēs, & alia
 hominem lædentia soluūtur. Oportet autem utiq; causas uniuscuiusq; ea pu
 tare, quæ quum adsunt, talem modū fieri necesse est, quū permūtantur in aliud
 temperamentū, cessare. Quando igitur ab ipsa caliditate sincera, aut frigidityte
 fluxiones cōtigerint, & nulla alia facultate participauerint, sic sanē sedabūtur,
 ubi ex frigido in calidū permūtata fuerint, & ex calido in frigidū. Permu
 tantur autem eo quē dixi modo. Amplius porro etiam alia quæcūq; mala ho
 mo patitur, omnia à facultatum potentijs proficiuntur. Itaq; quū amaritudo
 quædam diffusa fuerit, quā bilem flauā appellare solemus, quales statim anxie
 tates & æstus & impotētia occupāt. Verū ubi liberati fuerimus ab illa & pur
 gati, aut sponte, aut per medicamētum, si modo tempestiue quid ipsorum fiat,
 manifeste & à doloribus & à calore liberamur. Quanto autem tempore eadem
 eleuata fuerit, & cruda & meraca ac intemperata, nulla arte neq; dolores, neq;

339 febres sedare possis. Et quos quidem acuta acrisq; ac æruginosa bilis affligit,
 quales mox rabies, & morsus uiscerum ac pectoris, & desperatio? Non se-
 dantur autem hæc priusquam eadem expurgetur & prosternatur, & alijs per-
 340 misceatur. Concoqui autem & permutari, attenuariq; ac crassescere in humo-
 rum speciem, per multas & omnigenas species contingit. Quapropter & iu-
 dicationes, & numeri temporum, in talibus multum possunt. Hæc uero om-
 nia minime contingit calidum aut frigidum perpeti. neq; enim hoc putresce-
 re neque crassescere poterit. Quid autem ipsum esse diceremus? & tempera-
 345 mentum ipsorum est, uerūtamen inter ipsa mutuo uim habens, quoniam nuli
 alij permixtum calidum, desinit esse calidū, quàm frigidum: sic rursus non per-
 mutatur alio frigidum quàm calido. Reliqua omnia in homine, quanto pluri-
 bus miscentur, tanto mitiora ac meliora fiūt. At uero homo omnium optime
 dispositus est, ubi concoquit & in quiete est, nullam peculiarem uim præ se fe-
 350 rens. De his igitur uideor mihi abunde demōstrationem fecisse. Porro Medici
 quidam itemq; Sophistæ dicūt, quod impossibile est medicinam cognosce-
 re, eum qui non nouit quid sit homo, & quomodo primum factus & compa-
 ctus sit. Ego uero ea quæ alicui sophistæ aut Medico, de natura dicta sunt aut
 scripta, minus censeo medicæ arti conuenire quàm pictoriæ. Iudico autem de
 natura aliquid manifestum ac euident cognoscere, ex nulla parte aliunde con-
 355 tingere quàm ex Medicina, atq; hoc tunc condiscere possibile est, ubi quis ip-
 sam medicinam totam recte comprehenderit. Verum quatenus illi prodide-
 runt, multi mihi cognouisse uidētur. cognouisse autem dico, narrationem sci-
 licet hanc, Quid est homo, & ob quas causas nascitur, & reliqua diligenter.
 Atqui mihi necessarium esse uidetur, ut omnis Medicus de natura sciat, & o-
 360 mnistudio annitatur ut cognoscat, si modo aliquid eorum quæ fieri debēt re-
 cte præstare uelit, Quid est homo ad ea quæ comeduntur ac bibuntur compa-
 ratus, & quid cuiq; ab unoquoq; cōtinget ac accidet, & non simpliciter sic exi-
 stimare, quod malum edulium est caseus. Dolorem enim affert repleto ex ip-
 so. Sed quem dolorē, & propter quid, & cui parti intra hominem existenti in-
 commodum existit. Nam & alia multa edulia ac pocula natura mala sunt, & af-
 365 ficiunt hominem non eodem modo. Proferatur autem mihi uerbi causa ali-
 quid, uelut Vinum meracum multū potum hominem aliquo modo debilem
 reddit, & omnes qui uiderint hoc fatentur & cognoscunt, quod hæc est uis ui-
 ni, & quod ipsum est causa, & in quas in homine partes maxime possit noni-
 mus. Talem itaq; ueritatē etiam de alijs ostendere uolo. Etenim caseus: quan-
 370 doquidem hunc in exemplum adsumpsi: non omnes homines lædit, sed sunt
 qui ex ipso repleti, ne tantillum quidem offendūtur, immo gracilibus mirabi-
 liter etiam conferre proditur. Sunt autem qui difficulter sum mouentes ipsum
 ab eo liberantur. Horum uero naturæ differunt, differuntq; etiam iuxta hoc
 quod est in corpore caseo contrarium. Nam à caseo excitatur & commouetur,
 375 in his quibus eiusmodi humor multus in corpore existit, & quo magis hic po-
 tens est, eo magis uerisimile est ipsos male affligi. Si uero toti humanæ naturæ
 malus esset, omnes utiq; læderet. Hæc autem si quis nouisset, non incurreret
 ea neq; sanè pateretur. In refectionibus conualescentium ex morbis, insuperq;
 in longis ægritudinibus, multæ cōturbationes & præuaricationes fiunt, par-
 tim

tum sua sponte, partim à quibuslibet temere admissis. Noui autē medicos mul-
 tos uelut idiotas, qui ubi illi die aliqua noui quippiā fecissent, uelut si lauissent,
 aut deambulassent, aut quid alienum comedissent, atq; hæc omnia melius es-
 set adhibuisse quàm non, nihilominus tamen causam alicui ex his contribue-
 bant, ueram quidem causam ignorantes, & fortassis id quod cōmodissimum
 erat damnantes. Quod ipsum certe facere nō oportet, sed scire quid balneum
 intempestiue adhibitū operetur, quid item fatigatio & lassitudo. Nunquam e-
 nim eadem afflictio ab his prouenit, neq; etiam ex repletionē, neq; ex cibo tali
 uel tali. Quisquis igitur hæc nō cognoscet, quomodo singula se habeāt ad ho-
 minem comparata, is neq; cognoscere quæ ab ipsis fiunt potest, neq; recte uti.
 Cæterum & hæc cognoscere oportere mihi uidetur, nimirum quæ affectio-
 nes homini ex facultatibus ac potentijs, quæ item ex figuris adueniunt. Quod
 autem dico tale est, Nempe facultatē quidem esse, humorum summas uirēs
 ac robur nosse. Figuras autem dico quæ in ipso homine insunt, Aliæ enim ca-
 uæ sunt, & ex amplitudine in arcum coactæ, aliæ expansæ, aliæ solidæ & ro-
 tundæ, aliæ latæ & pensiles, aliæ extentæ, aliæ longæ, aliæ densæ, aliæ raræ
 & hiantes, aliæ spongiformes ac molles. Quæ igitur ex his trahere ad sese alli-
 cereq; humiditātē ex reliquo corpore maxime possunt? Num cauæ & expas-
 sæ, an solidæ & rotundæ, aut cauæ & in arcum ex amplitudine coactæ? Equi-
 dem puto tales esse, quæ ex cāuitate & amplitudine in arcum sunt coactæ, Id
 quod ex manifestis forinsecus condiscere oportet, partim quidem quod ore
 hians nihil sanè humoris attraxeris, ubi uero labra foras produxeris, cōtra-
 xerisque ac cōpresseris, insuperq; fistulam admoueris, facile sanè attraxeris
 quicquid uoueris. partim uero quod cucurbitæ quæ corpori adponi solent,
 ex amplitudine in angustiam arcuatæ ad hoc factæ sunt, ad trahendum uideli-
 cet & alliciendum ex carne. Sunt autem & alia multa eiuscemodi. Verum in-
 tra hominem natura & figura talia, sunt uesica, & caput, & uterus in mulieri-
 bus: atq; hæc manifeste maxime trahūt, & semper plena sunt attractæ humi-
 ditatis. At uero cauæ & expansæ figuræ, influentem quidem humorem ma-
 xime omnium susceperint, non autem similiter attraxerint. Solidæ autem &
 rotundæ, neq; attraxerint, neque susceperint: dilabitur enim & non habet se-
 dem, in qua maneat. Spōgiformes uero & molles, uelut lien, pulmo, & mama-
 mæ, ubi admotæ maxime fuerint & adhæserint, ebibunt, duræque fiunt ac au-
 gescunt humore accedente, maxime pulmo. Non enim in uentriculo inest,
 in quo humorem extrinsecus contineat ipse uentriculus in quo est humor, ut
 quotidie exhauriatur: sed quū biberit & susceperit ipse in seipsum humorem,
 & uacua & rara ac parua penitus explentur, & pro raro ac molli, durus ac den-
 sus euadit, & neque concoquit, neq; dimittit. Atq; hæc patitur propter figu-
 ræ naturam. Quæcūq; autem flatum & reuolutiones operantur in corpore, ea
 in cauis ac amplis, ueluti uentre ac pectore, strepitum ac sonitum facere solent.
 Etenim quod non sic repleant ut stent, sed habent transmutationes & mōtus,
 necesse est ut ab ipsis & strepitus & manifestæ commotiones fiant. Quæcūq;
 uero carnosæ sunt & mollia, in talibus torpores & excrementia, uelut in truci-
 datis fiunt. Cæterum quum inciderit flatus in latum ac renitens, & aliquid ipsi
 restiterit, idq; natura fuerit neq; forte, ut aduersus uiolentiam durare possit,

& nihil mali pati: neq; molle & rarū, ut excipere ac cedere queat: uerū tenerum, & floridum & sanguineū ac densum, uelut hepar, quod propter densitatē quidē ac latitudinem resistit ac nō cedit, status uero subiens augetur ac fortior euadit, & aduersum reluctans maxime impetū facit. propter teneritudinem autem & sanguineitatē, absq; doloribus esse non potest, & propter has causas dolores acutissimi ac frequentissimi circa eum locum contingunt, suppuratio nesq; ac tubercula plurima. Fiūt etiam circa septū trāuersum fortiter, sed multo minus. Distentio enim septi trāuersi lata est & renitēs, natura autem neruosi & robustior, quapropter minus dolore affligitur. fiunt tamen & dolores, & tubercula circa ipsum. Multæ uero etiā aliæ & extra & intra corpus figurarum species sunt, quæ magnopere inter se differūt, quod ad affectiones pertinet, tum ægroto, tum sano. uelut capita parua aut magna, colla tenuia aut crassa, longa aut breuia, uentres longi aut rotundi, pectoris & costarum latitudines aut angustia, & alia infinita, quæ omnia nosse oportet quatenus differant, quo causas singulorum cognitās probè obserues. De potentijs autem humorum perspectū habere oportet, quid singuli ipsoꝝ in homine facere possint. quemadmodū etiam prius dictum est, quomodo cognationes inter se habeāt. Quod dico tale est, An uidelicet dulcis humor in aliam speciē mutetur, non à contemperamēto, sed ipse desciscens & immutatus ab eo, qualis primū fuerat, amarus, aut falsus, aut acerbus, aut acidus. Sit sanè acidus. Ergo acidus humor reliquos præcellens, maxime incommodus fuerit: si utiq; dulcis, omniū commodissimus existit. Id quod si quis forinsecus quærens cōsequi possit, is semper quod melius est ex omnibus eligere queat. Optimum autem est, quod longissime ab incommodo abest.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE MEDICO, IANO CORNARIO MEDICO
Phyfico interprete.



Hic liber Medici gubernatio est, & præceptū quomodo officinam medicam instruere oportet. Medici equidē gubernationem esse putamus, ut uideat quo bono colore, & bona ac carnosa corporis habitudine præditus sit, iuxta existētem in ipso naturā. Vulgus enim existimat eos qui non sic bene dispositū corpus habent, neq; alijs bene prospicere posse. Deinde ut opinionē capter apud ipsum uulgus uestitu decoro, & ungētis odoratis, non suspectū odorem ad omnia habētibus. Inde enim ægros iucūde affici cōtingit. Postea animaduertere ipsum oportet ut animū habeat modestum, nō solum quod ad taciturnitatē attinet, sed etiam circa reliquam uitam probe cōpositum. Maxime enim ad opinionē ac autoritatē cōparandam cōducit, bonis ac honestis morib. præditū esse. Nam quū talis fuerit, omnib. uenerandus ac humanus iudicabitur. Prōptitudo enim temeraria, & facilitas cōtemnentur, etiā si ualde cōmoda existant. Scopū autē præfigere oportet potestātē facultatum suarū. Nam eadem ab ijsdem nō abūdantib. boni cōsulantur. Figurā faciei habeat meditabūdā ac subtristem, nō tamē amarulentā.

Contu

cōtumax enim esse uidebitur & homines odio habens. Qui uero in risum exolutus est, ac nimum hilaris, onerosus iudicatur. Hoc itaq; uitandū est uel maxime. Iustum autē ad omnem cōuersationem esse conuenit. Iustitia enim multum auxiliatur. Non exigua autem cōmercia agris cum medico sunt. Nam se ipsos medicis subditos faciunt, & omni hora uxoribus, uirginibus, & opibus maximi precij, illi occurrunt. continenter igitur ad omnia hæc se habere oportet. Animo itaq; ac corpore sic dispositū esse cōuenit. Porro præcepta ad artem medicam, per quæ artificiosus esse uidebitur, ab initio considerabimus ex quo primum homo discere incipit. Quæ igitur in officina medica curantur, ferē ad discētes pertinent. Primū quidem locum domus habere oportet, qui sanē talis sit, ut neq; uentus ad ipsum accedens molestus sit, neq; sol neq; splendor infestet. Lux enim splendida medentibus quidē non est molesta, non similiter autem ægrotantibus. Itaq; talem splendore penitus fugere oportet, per quem oculos ægrotare cōtingit. Tale igitur præceptū de luce obseruetur. Deinde ut nequaquā faciem aduersam splendori habeat. Infestat enim uisum debilem. Omnis autem occasio sufficiens est ad debiles oculos cōturbandos. Luce itaq; hoc modo utendū est. Sellæ autē æquales altitudine sint quantū eius fieri potest, ut in ipsis ægri collocentur. Aeramēto exceptis instrumētis, nullo utatur. Ornatus enim onerosus mihi esse uidetur, talib; uasis uti. Aqua exhibenda est agris potabilis & pura. Exterforijs utendū est puris ac mollibus, ad oculos quidem, linteis, ad uulnera uero, spōgij. hæc enim per se probe auxiliari uidentur. Omnia autē rite fabrefacta ad usum esse oportet, magnitudine, grauitate, ac tenuitate. Quæ uero offeruntur omnia cōsiderare oportet ut conferant, maxime si ægrotæ parti adhibebuntur. Talia autē sunt, ligamenta & medicamenta, & lintea circa uulnus, & cataplasmata. hæc enim longissimo tēpore circa ægrotantes locos sunt. At uero ablatio horū, refrigeratioq; ac mūdificatio & aquarum affusio, pauco tempore absoluūtur. Diligenter autem considerare quid horum faciendum sit oportet, & ubi magis aut minus ea adhibere cōuenit. Vtrorūq; enim usus opportunus, itemq; negligētia, magnā differentiā habet. Est autem propria & genuina medicinæ deligatio, ex qua æger opem sentit. Maxime autem profunt duo hæc, quibus utendū est, comprimere uidelicet ubi oportet, & remissē deligare. Iuxta horæ uero tempus, quādo integere oporteat & non, uidendum est, ut neq; debili, neq; fortiore alterutro horum utaris. Concinnas autem deligationes ad spectaculum cōparatas, & nihil iuuantes, reprobare oportet. Onerosæ enim sunt & omnino petulantes, sæpe uero etiam damnū dederrunt. Quærit autem æger non ornatum, sed auxiliū. Cæterū in chirurgijs quæ per sectionem aut uestionē fiunt, uelocitas ac tarditas æqualem laudem merentur. Est enim utriusq; usus. Nam in quibus per unicam sectionē chirurgia absoluitur, uelocem dissectionē facere oportet. quum enim contingat eos qui se cantur dolere, id quod dolorem affert, quāminimo tempore adesse cōuenit, quod ipsum cōtinget ueloci sectione facta. Vbi uero multas sectiones fieri necesse est, tarda chirurgia utendum est. Velox enim continuum & multum dolorem inducit. Tardus uero & intermittēs, requiem aliquam his qui curantur exhibet. Idem de instrumentis quoq; dici potest. Gladiolis enim acutis ac latis uti, non in omnibus similiter præcipimus. Nam partes quædā sunt corporis, quæ

quæ celerem sanguinis fluxum habent, & non facile est eum sistere, Tales autem sunt uarices, & quædam aliæ uenæ. Itaq; in talibus angustas sectiones facere oportet, neq; enim possibile est ut fluxus in his sistatur. Conducit autem aliquando à talibus sanguinis detractionē facere. At uero ad locos non periculosos, & circa quos nō tenuis est sanguis, latoribus gladiolis utēdum est; sic enim sanguis prodierit, aliter nequaquā. ualde autem turpe est nō contingere à chirurgia quod uelis. Cucurbitarū porrò duo modi cōmodi existunt. Quando enim fluxus procul ab apparente carne cōpactus fuerit, circulum ipsius breuem esse oportet, ipsamq; nō uentrosam, sed prolixam parte ad manū uergente, non grauem. Quæ enim talis est, in directum trahet, & serosos humores se paratos ac distātes probe ad carnē adtrahet. Maiore autem dolore per carnem disperso, in reliquis quidem cōsimilem cucurbitā esse oportet, sed circulum magnum. Sic enim ex plurimis partibus id quod dolorē facit educere comperies, ad locum cōuenientem. Neq; enim magnū esse circulum putant, si nō ex pluribus locis caro cōprehendatur ac cōtrahatur. At si grauis sit, ad supernos locos repit, inferne autē magis detractionē facit, ut sæpe morbi relinquantur. Lati istaq; circuli, unā cum incumbētibus fluxionibus, & longe distantibus à supernis locis, multa simul adtrahūt de alia carne. Contingit igitur humiditatē inde detractā, apponi collecto inferne sub cucurbita seroso humori, & quæ quidem infestant, relinqui: quæ uero nihil, molestant, detrahi. Magnitudinem porrò cucurbitæ quæ cōmoda sit, iuxta corporis partes quibus admouere oportuerit, coniectare oportet. Vbi uero scarificationē subter cucurbitam adhibere uelis, sanguinem scarificandorum locorū conspicuū esse oportet, aliàs neq; circulū adtractum scarificare ac pertūdere oportet. Debiliior enim est caro loci dolore affecti. Scalpris autē incuruis, in summo non ualde angustis utendum est. Aliquando enim serosi ac saniosi humores uiscosi ac crassi ueniunt; periculum igitur est ne in fissuris substēt, ubi artæ fuerint incussæ. Porrò uenas in brachijs, funiculorū apprehensionibus cōstringere oportet. Caro enim cōtegens in multis nō probe coaptata est uenæ: ubi enim lubrica fuerit caro, nō cōtingit sectiones utrorūq; iuxta seipsas fieri. Nam uenā cōtectam insufflari cōtingit, & sanguinis fluxum impediri, multis uero etiam propter hoc pus cōgregatur. Quæ propter duo nocumēta talis chirurgia inducit, secto quidem dolorem, secanti uero multam ignominia. Idem in omnibus uenis fieri præceptū est. Hæc quidē igitur necessaria sunt in officina medica instrumēta, & circa quorum usum artificiosum esse oportet addiscētem. Volsellis autē tum dentium, tum uuarū, quilibet uti potest. simplex enim usus ipsorū esse uidetur. Cæterum de tuberculis & ulceribus quæ maiorū morborum sunt, amplius uidendū est. Tubercula enim quidem deprehendere & dissoluere posse, maxime artificiosum habetur, itemq; collectiones ipsorum impedire. Consequens est, ea in conspicuū & q̄ breuissimum locū contrahere, & cōpagem ipsam æqualem per totum tuberculū facere: ubi enim inæqualiter se habuerit, periculū est ut rumpatur, & ulcus ægre curabile reddatur. exæquare itaq; oportet, similiterq; totū maturū facere, & neq; prius diducere, neq; sinere ut spōte rumpatur. Quæ uero maturū facere æqualiter possint, in alijs libris relata sunt. At uero ulcera quatuor uias habere uidentur. Vnam in profundum, hæc autē sunt fistulosa, & quæ sanie plena sunt;

acintus excauata. Alteram in altum, quæ uidelicet carne superexcreſcūt. Tertia uia eſt in latitudinē, atq; hæc ſunt quæ appellantur ſerpiginofa. Quarta uia eſt quæ ſola ſecundum naturam motus eſſe uidetur. Carnis itaq; calamitates hæ ſunt, omnes autem cōmunem rationem habent ad hoc quod iſtis cōducit: & ſigna quidem horum in alijs relata ſunt, itemq; qua utendum ſit curatione, per quæ autem concretū diſſoluatur, ſimiliterq; id quod carne excreſcente repletum, aut cauum factum eſt, aut quod in latitudinem iter fecit, de his omnibus in alijs ſcriptis noſtris abūde dictum eſt. Amplius uero de Cataplaſmatis ſic res habet. Linteorū quæ imponūtur ac induntur alicubi in morbo, uſus exactus eſſe uidetur, & eſt ſanè ulceri cōueniens linteolorū impositio. Verū cataplaſmate per ambitū ulceris utaris. Nam hic uſus cataplaſmatis & artiſcioſus eſt, & multū prodeſſe poteſt. Videtur enim ulceri opitulārī uis eorū quæ circū ponātur. Lintēū autem cōterendū eſt ac emolliendū. Verū partibus extra uulnus circūſiſtis cataplaſma pdeſt. Talem igitur iſſorū uſum eſſe oportet. Porro de temporū occaſionibus, quādo ſingulis horū utendum eſt, & quomodo præſcriptorū uires cōdiſcere oporteat, in præſens relictū eſt. Talia enim lōge præſtatiſſima in ſtudio Medicinæ ſunt, & procul in arte iam progreſſi exiſtūt. Hiſ cōſequens eſt chirurgia uulnerū in militia acceptorū, circa extractionē telorū. Nam in urbanis cōuerſationibus modicus horū uſus exiſtit. Raro enim per omne tēpus ciuiles ac hoſtiles expeditiones fiunt. huiuſmodi aut ſæpe ac frequētiffime circa externas militias fieri ſolent. Qui igitur hac chirurgia uti uolet, eum militare oportet, & externos exercitus ſequi. Sic enim exercitatus fieri poterit ad eiufmodi uſum ac neceſſitatē. Quod uero circa hæc artiſcioſiſſimū eſſe mihi uidetur, referetur. Etenim ſigna exquirere ac inuenire telorū in corpore exiſtentium, maxima artis & chirurgiæ huc pertinentis pars exiſtit. Vbi enim hoc cognitū fuerit, nō relinqui poteſt uulneratus ex ignorantia neglectus, quū non cōuenienter tractetur. Solus autē iſ qui ſignorū expertus eſt hanc chirurgiam rite aggreditur. Verū de his omnibus in alijs ſcriptum habetur.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE DECENTI ORNATV, IANO COR
nario Medico Phyſico interprete.



NON ſine ratione faciunt, qui ſapientiam ad multa utilem eſſe prætendunt, eam uidelicet quæ inter homines exiſtit. Multæ enim ad ſuperfluam curioſitatē factæ apparent, dico autem eas quæ de nulla re utili diſſerūt. Aſſumi autē utiq; poſſunt etiam harum partes ad illas, uel propterea quod neq; ocioſitas eſt, neq; malicia. Ocium enim & ignauiā maliciam quærunt, & ad eam diſtrahūtur, uigilantiā uero & mens ad aliquid intentata, trahunt ad ſe quid eorū quæ ad uitæ honeſtatem pertinent; etiam ex diſputationibus nihil utile tractātibus. Gratioſior eſt enim ſapientia, & ab alijs quibuſdam in artem cōſtituta, artem uidelicet ad parandum honeſtum ornatum ac opinionem. Omnes enim nō cum turpi lucro & turpitudine conſiſtunt. Et illis methodus quædam eſt artiſcialis quæ operatur: quod


si non innocenter fiat, raptores sunt, adoleſcētes enim in ipsos incidunt, uerum
 in uigore constituti, propter uerecūdiā, uidentes ipsos idiotas ducunt, Senes
 uero propter amarulentiā, legislationē in ipsos cōstituunt, ex ciuitatibus uide-
 licet expulsionē. Hi enim sunt qui fora frequētant, ruditate ac inscitia sua impo-
 nentes, & in circulis ciuitatū uersantes. Cognouerit autē quis ex uestitu & alijs
 lineamētis. Quāuis enim fuerint splendide ornatī, multo magis fugiendi sunt,
 & à cōspiciētibz odio habendi. Qui uero cōtrario modo se gerunt, frugi ho-
 mines iudicandi sunt, quibus nō est excogitatus apparatus, neq; superflua cu-
 riositas. Ex uestitu enim cognosces, & decēti in ipso ornatu ac frugalitate, non
 ad superfluitatē parato, sed magis ad bonam opinionē, & meditationem, ani-
 mumq; intra se cōpositum, & ad profectiōē. Imò quocūq; uestitu ac ornatu,
 tales sunt minime diffuentes, non curiosi, amarulenti ad occurſus & obuiam
 itiones, appositi ad respōsiones, graues aduersus resistentes, ad sui similes soler-
 tes, & familiares, ac affabiles, tēperati ad omnes, ad seditiōes taciturni, ad ta-
 cendum animo obfirmato & cōtinentes, ad tempus appositi, & ad occasiōē
 arripiendam accōmodati, ad uictum frugales & cōtenti, patiētes ad temporis
 expectatiōē, ad sermones expediti, omne demōstratum proferentes, suauilo-
 quentia utentes, gratijs affectū, & gloria horū omnium corroborati ac fortifica-
 ti, ad ueritatem ac demōstrationem audentes ac cōfisi. Principalissimū quidem
 igitur horum omnīū prædictorum est Natura. Nam si hæc affuerit his qui arti-
 bus animū applicant, per omnia prædicta penetrare poterunt. Incognita enim
 utilitas, tum in sapientia, tum in arte adhibita, ad principiū capiendum edoce-
 ri potest. Natura autē defluit & cōfunditur cum sapientia, ad cognoscēdum ea
 quæ ab ipsa natura facta sunt. Etenim in utrisq; sermonibus multi cōuicti, nul-
 latenus utrisq; rebus usi sunt ad demōstrationem, postquā igitur quispiā ipso-
 rum expēderit ad ueritatē ea quæ retulimus, nullatenus naturæ bona ipsis pro-
 cedent. Cōperiuntur itaq; hi non consimili cum illis uia progressi, quapropter
 denudati, omnem induūt maliciā ac ignominia. honestus est enim ex opere
 quod quis edoctus est sermo. Quicquid enim artificiosē factum est, ex ratione
 prolatum est ac productū. Quicquid autē artificiosē dictū est, non aut factum,
 methodi inartificialis demōstratiuum existit. Nam putare quidem non autem
 facere, ignorantia & inartificialitatis signū est. Opinio enim maxime in Medi-
 cina in crimē uertitur eā adhibētibus: his uero qui ea in se usi sunt, perniciē as-
 fert. Etenim si sibiipsis in sermonibus persuaſerint, & opus ex disciplina se sci-
 re putauerint, quemadmodū aurum adulterinū in igne iudicatū, tales seipsos
 esse demonstrant. quanquā talis prædictiō nihil cōmouet ad prudentiam eos
 qui sunt eiusdem generis. quod autē rectus sit finis, cognitio manifestum facit.
 Tempus porro etiam artē faciem ac peruiam facit, aut in cōsimilem uiam inci-
 dentibus processus manifestos facit. Quapropter singula prædicta suscipere
 oportet, & sapiētiam transferre ad medicinā, & medicinā ad sapiētiam. Medi-
 cus enim philosophus, est deo æqualis, Neq; enim multa est inter ipsas differe-
 rentia. Nam omnia quæ ad sapiētiam requiruntur, insunt in medicina: argenti
 cōtemptus, reuerentia, uerecūdia, habitus submissus, autoritas, iudiciū, quies,
 obuiam itio, mundicia, doctrina, cognitio ad uitam utilium ac necessariarū pu-
 rificationū, alienitas à mercimonijs, alienitas à superstitione, præminētia diuini-

na. Habent enim quaecumque habent ad coercendam intemperantiam, inscientiam, auaritiam, concupiscentiam, rapinasque ac impudentiam. Haec enim est cognitio accedentium, & usus eorum quae ad amicitiam pertinent, & quomodo ad liberos, ac quascumque res se gerere oporteat. quatenus igitur cum hac societate habet, sapientia quaedam est. Nam & plurima ex his etiam medicus habet. Etenim scientia de dijs uel maxime animo ipsius implexa est. Etenim in alijs affectionibus, & in symptomatis accidentibus, Medicina erga deos ualde reuerenter se habere cõperitur. Medici uero deis cõcedunt. Non enim est potestas in ipsa redundans. Nam & hi multa quidem aggrediuntur, multa uero etiam per seipsa ipsis superantur. Quae uero nunc possidet Medicina, hinc exhibebit. Quae enim uia ipsius sit in sapientia, haecenus dictum est. Nam & illis ipsis hoc modo se res habet. Quae uero putant, & cõsistentur ac profitentur, sic habent. Quae circa corpora adsunt & adueniunt, quae sanè per omnem ipsam artem procedunt, dum illa transformantur aut transmutantur. Quae item per chirurgiam sanant. Et quae auxilijs & medelis aut uictu curantur. Summa uero horum omnium tendat ad horum cognitionem. Quum igitur relata omnia tali modo se habeant, cõuenit ut Medicus comitatem quandam sibi adiunctam habeat. Austeritas enim & sanis, & aëgris, difficile accessum praebet. Maxime uero adseruare ipsum seipsum cõuenit, ut ne multas corporis partes ostendat, neque cum imperitis multa fabuletur, sed necessaria. Hoc enim uiolentia esse cõsuevit, ad curationis prouocationem. Facere autem nihil horum debet ualde curiose, neque ex imaginatione. Haec uero omnia cõsiderato, quo tibi praeparata sint ad abundantiam, prout opus fuerit. Sin minus, instante necessitate semper penuria fuerit. Procurare autem oportet haec in medicina, cum omni submissioe: de frictione, & illitione, & perfusione, ad manu cõcinnitatem: de linamentis uulgis, de splenis, de ligamentis, de his quae pro temporis cõstitutione requiruntur, de medicamentis ad uulnera, & ocularia, et ex his ea quae ad singula genera pertinent: quo tibi praeparata sint & instrumeta, & machinae, & cõsequenter ferrum. Nam in his penuria detrimetosa est, & artem mancā facit. Sit autem tibi alter apparatus simpliciter ad peregrinationes instructus, ad manus proptus. Expeditissimus autem per methodi rationem. Neque enim fieri potest ut medicus omnia percurrat. Firma item memoria teneto medicamenta, & simplices facultates, & descriptas, si modo tales extant. Sint & in memoria tibi morborum curationes, & harum modi, quotuplīciter & quomodo in singulis se habent. Hoc enim principium est in Medicina, & medium, & finis. Praeparata quoque tibi sint malagmatum genera ad singulos usus. Potiones quae incidere possunt, ex descriptioe praeparatae iuxta genera. In proptu sint & quae ad medicationem pertinent ad purgationes, sumpta de locis congruis, & parata eo quo cõuenit modo, iuxta genera, & magnitudines, ad uetus statem ferendam curata. Recetia uero iuxta temporis occasionem: & alia iuxta rationem. His autem tibi praeparatis hoc cõmodi erit, ut ubi ad aegrotum introieris, animo incertus non sis, quum appositè habeas singula ad id quod faciendum est. Antea uero hoc cognitum habeas quod facere oportet, quā ad aegrum ingrediaris. Pleraque enim neque ratiocinatione, sed auxilio rerum opus habent. Itaque euentum ex experientia prius discernere oportet. Est enim hoc gloriosum, & facile cognosci potest. In ingressu uero meminisse cõuenit & sessionis, & habitus submissi, amictus cõpositi, auctoritatis, breuiloquentiae, ut nihil cum perturbatione facias, affessus,

diligentia, responsionis ad ea quæ occurrunt, & ad tumultus fientes compe-
 scendos constantia apud teipsum, increpationis ad turbas castigandas, prom-
 ptitudinis ad ministeria. Et ad hæc memor sis primi apparatus. Sin minus, res-
 liqua citra errorem fiant, quæ ad præptitudinem parandam præcipiuntur. In-
 gressu utere frequenter. uisita diligētius, his quæ a deceptis per errorē fiunt oc-
 currens, ut mutetur. Facilius enim cognosces, simulq; expeditior eris. Instabi-
 lia enim sunt quæ in humidis cōsistunt. Quapropter etiā facile & à natura, & à
 fortuna transmutantur. Neglecta enim ea quæ circa tēporis occasionem admini-
 strare oportebat, impetū suo progressa occupant acperimunt. Non enim est
 quod opein ferat. Multa enim sunt quæ simul mali aliquid faciunt. Nam quod
 singulatim iuxta consequentiam fit, magis opportunū & frequentius est. Obs-
 seruare autem oportet ægrotorum quoq; peccata, per quæ multi saepe mentiti
 sunt, in assumendis his quæ ingerēda exhibētur, postquā exosas potiones non
 accipiētes, aut pharmacis datis, aut alia curatiōe adhibita, perēpti sunt. Et factū
 quidē hoc nō ad ipsorum confelsionē uertitur, uerū Medico culpa imputatur.
 Cōsiderare uero oportet etiā decubitus, quosdā ex ipsis iuxta anni tēpus, quosdā
 iuxta genera. Quidā enim in altis sedibus, quidā in subterraneis ac tenebro-
 sis decubunt. Strepitus quoq; & odores, maxime uini, deterior enim hic est: fu-
 gere ac trāsmutare oportet. Et omnia hæc facere placide, expedite, cū ministe-
 rio, ita ut pleraq; ægroto occultes, et hilari ac sereno uultu ipsum cōsoleris: quo
 à suis illū cupiditatib. auertas, simul cū amarulentia & cōtraria instantia incre-
 pando, simulq; cum cōmonefactione ac dexteritate suscipiendo ac cōsolando,
 nō tamē ut quicquā futurorū aut præsentīū ipsis indices. Pleriq; enim ob hāc
 causam, in utrālibet partē compulsi sunt, propter relatā uidelicet prædictiōnē
 præsentīū aut futurorū. Sit autē ex discipulis aliquis præfens, qui instet ut præ-
 ceptis nō amarulētē utatur, & quod mādātū est faciat. Deligito autē ex ipsis eos
 qui iam in arte progressum fecerūt, quo ea quæ utilia sunt addāt, aut secure of-
 ferant, ut & in interuallis nihil te lateat. At uero imperitis nunq̃ quicquā procu-
 randū committes. Sin minus, eius quod male factū est, uituperiū in te recidet, si
 non ambigueres habeat, ex quibus id quod recta methodo tractatū est, proce-
 det, & uituperationē tibi nō afferet. Sed & qd̃ factū fuerit, ad genus referetur.
 Proinde omnia hæc prædicto in his quæ fiūt, his quibus ea cognouisse propo-
 sitū est. His igitur ita habētibus, ad bonā existimationē ac decentē ornatū, et in
 sapiētia, & in medicina, & in alijs artibus: oportet medicū distinctis partib. de
 quibus diximus, semper utrisq; amictum, ea cōseruare ac custodire, & tradere
 ac facere. Quū enim apud omnes homines indycta sint, cōseruantur. Et qui per
 ipsa procedunt, celebres sunt à parentibus & liberis. Et si quidam
 ipsorum non multa cognitione præditi sint, ab ipsis
 tamen rebus ad intelligentiā deueniunt.

HIPPOCRATIS COI PRÆ

CEPTIONES, IANO CORNARIO MEDICO
Phyfico interprete.



TEMPVS est in quo occasio est, Occasio uero in qua tempus
nō multū. Medela tempore, aliquādo etiam occasione cōtin-
git. Hæc sanè nosse oportet, & nō ratiocinationi prius pro-
babili intentū curā aggredi, sed exercitationi cū ratione. Ra-
tiocinatio enim memoria quædam est, quæ cōponit ea quæ
per sensum sunt percepta. Imaginatiōe enim cōcepta est eui-
denter. Sensus aut̃ perpeffus iam delegator est eorū quæ sub
iacēt ac obueniunt, ad ipsam cogitationē. Qui uero sensus sæpe mala perpeff-
sus est, & suscepit, quibus, quādo, qualiter, læsus sit obseruās, & in seipsum re-
ponens recordatur. Collaudo quidē igitur etiā ratiocinationē, si quidē ex for-
tuita occasiōe initiū faciat, & delationē in morbū ex apparētibus persequatur.
Si enim ex his quæ palām perficiūtur, ratiocinatio initiū fecerit, in mentis po-
tētia esse cōperitur, ita ut ipsa ab alijs singula assumat. Proinde statuēdū est, na-
turam à multis ac omnigenis rebus moueri ac doceri, ita ut uiolentia quædam
subsit. Mens autē ubi ab ipsa accepit, uelut dixi, postea ad ueritatē perducit. Si
uero non ex euidenti aggressione, uerū ex probabili rationis figmēto, sæpe gra-
uem & molestā inuehit affectiōē. Tales aut̃ inuiam uiam arripiūt. Quid enim
tandē erat malī, si mercedē auferrent hi qui medicinæ opera male administrāt?
Nunc uero ægrotis qui extra culpam sunt, nō sufficiens esse apparet uiolentia
morbī, nisi Medici quoq; imperitia accedat. Et de his quidē hæc dicta satis sint.
At his quæ ex sola ratione perficiūtur, frui nō datur: uerum his quæ ex operis
indicatione. Fallax enim est & ad errorē procliuīs affirmatio, quæ fit cū garruli-
tate. Quapropter in uniuersum his quæ fiūt inhærere oportet, & circa hæc uel
maxime uersari, si quis facilem ac minime delinquentē habitū, quē sanè Medi-
cinā appellamus, sibi cōparare uolet. Valde enim magnā utilitatem afferet, tum
ægotātibus, tum horū artificib. Nō tamen cunctandū est & ab idiotis inquis-
rere, si quid cōferre uisum fuerit ad curationis occasiōē. Sic enim arbitror uni-
uersam artem cōmonstratam esse, eo quod ex unoquoq; sine obseruatio facta
est, & cōsonantia in idem cōcurrerit. Attēdere igitur oportet fortuitæ occasio-
ni, quæ plerūq; se offert, atq; hoc cū utilitate ac leni progressione potius, q̃ cū
promissione, & excusatione ea quæ fit cū actione. Vtilis est autē & uaria præ-
destinatio eorū quæ ægrotō offerūtur. Non enim asseuerare oportet, quod ali-
quid solū exhibitū proderit. Omnes enim affectiōes, propter multas casuum
circūstantias ac mutatiōes, mora quadā diutiorē adhærēt. Et hoc sanè admoni-
tione opus habuerit, ad diligētē considerationē faciendā. Si enim à mercede
inceperis: cōducit enim hoc uniuerso negotio: ægrotō quidē huiusmodi cogi-
tationē inducis, q̃ uidelicet nō ipso relicto abibis. Si uero non pacisceris, q̃ ip-
sum negliges, & de quibusdā in rem præsentem nō admonebis. Curare igitur
oportet de cōstituenda mercede. Inutilē enim esse putamus eiusmodi ægroti
ipsius cogitationē, multo aut̃ magis in morbo acuto. Morbi autē celeritas tem-
poris occasiōē nō præbens ad reuersionē, nō impellit bonū Medicū ad quæ-

rendū suam cōmoditatē, sed ut magis existimationis suae rationē habeat. Itaq; tūc melius est ut seruatis exprobet, q̄ ut letaliter affectos praeōturbet. Quāq; aliqui aegroti id expetūt, hospitij ius, & facilem malī depulsionē producētes, dīgni quidem qui negligātur, non tamē qui affligātur. Quapropter his te meritō opponēs, cū bolidis iactu in maris turbati fluctibus iter faciētib. Qui enim bonus Medicus est, is per louē fide magis q̄ duricia medetur. Quare in principio totam affectionē indagare oportet, & quaedam suggerere conducentia ad curationē, curareq; aegrotū, & nō negligere. At uero remunerationis exigēdā acerbitatē, absq; preparatē ad disciplinā cupiditate, hortor ut ne ualde inducas, sed & ad opulentia & facultates respicias. Quādoq; uero etiā gratis cures, ita ut gratitudinis memoriā potiorē, q̄ praesentē existimationē auferas. Si uero occasio ferendae opis se obtulerit, & peregrino, & egeno, maxime talibus opituleris. Si enim affuerit erga homines amor, adest etiā amor erga artem. Quidā enim aegrotantes ubi perceperūt affectionē circa se non esse in tuto, per Medici probitatē ac mansuetudinē gloriantur sanitati restitutos se esse. Laudabile est autē, aegrotū quidem curam gerere, gratia sanitatis: sanorū uero curā suscipere, ea gratia ut sine morbis degant. Sed & sanorum cura habēda est, gratia boni ac decori ornatus. Qui igitur in profundo ignoratiae artis uersantur, praedicta minime perceperint. Nam hi quū sint nō initiati, miserabilesq; ac subito exaltati: fortunae tamen indigi, a diuitibus quibusdā, ex angustijs remissionē acquirūt, semperq; ob opera gloriātes, & in deterius dilabētes deliciantur, artis sinceritatem negligentes, ob quā bonus Medicus, qui ab artis cōiunctione socius artis appellatur, in uigore esse possit. Hic autē medelas citra delictū facile perficiens, nihil horū transilierit, nō praefacultatis inopia. Non enim infidus est uelut in iniustitia. Nam ad curationē hi nō accedunt, ubi affectionē perniciosam esse uident, uitātes aliorū medicorū superinductionē, laudātes aegrotos propter praeui auxilij odiū. At aegrotātes afflicti natant in utraq; improbitate, eo quod potiori in arte curationi seipsos nō cōmiserūt ad finē usq;. Remissio enim morbi alicuius magnū aegrotō refugium praebet. Quapropter sanā affectionē cupiētes, eundem usum semper admittere nō uolunt, medici uarietati se assimilātes. Sūptuum equidē opulentia aegroti carent, morū improbitate adorātes, & ingrati fientes. Quū autem cōsequi possunt ut ditentur, de mercede assueuerant affirmant, sani esse uolentes, quāstū nimirū ex usura, aut agricultura affore producentes, & postea de ipsis quāstū facere negligentes. Et de huiusmodi quidē declaratione haec sufficiāt. Remissio enim & intēsio aegrotātis, medicam administrationē requirunt. Nec uero indecore se ille geret medicus, qui in rei praesentis angustia circa aegrotū aliquem, & imperitia tenebras offundente, alios quoq; accelerare iusserit, quo ex cōmuni cōsideratione, res circa aegrotū inquirantur ac cognoscātur, & illi cooperatores fiant ad auxilij ferēdi facultatem. Nam in afflictionis assiduitate, augescēte affectione, ob cōsiliij inopiā, plurima ad rem praesentem effugiūt. In eiusmodi igitur tēporis occasione confidendū est. Nunquā enim ego tale quid decerno, quod ars ipsa iudicat. Et de hoc nunq; contendere oportet affirmādo, ac mutuis inter se cōuicijs decertādo. Hoc enim iure iurādo affirmare possim, q̄ Medici ratiocinatio nunq; alteri inuidere poterit. Imbecillis enim hoc modo apparuerit. Sed haec magis expedite faciūt hi qui circa fore-

fia negotia ac quaestus uersantur. Quanquā neq; falsō hoc cognitū fertur, quōd
 in omni copā, inopia inest. At uero cū his omnibus magnū signum substantiā
 artis apparuerit, si quis recte medicans, ab eiusmodi cōpellatione nō destiterit,
 iubens aegrotos mente nō turbari, in eo quod ad salutis tempus peruenire ge-
 stiunt. Hoc enim nō inutile esse ducimus, & hoc sanē praeicipiens nō peccabit.
 Ipsi enim aegroti propter dolorificam affectionē desperātes, seipsos uita exuūt.
 Qui uero agrū sibi cōmissum habet, si artis inuenta demonstrauerit, cōseruans
 nō mutans naturā, praesentē auferet remunerationē, aut contrā, fidem suam sta-
 tim amitteret. Hominis enim bonus habitus natura quaedam est, quae motū non
 alienum ex natura acquisiuit, sed ualde cōgrua est, & spiritu, & calore, & humo-
 rum cōcoctione undiquaq; & uniuersa uictus ratione, & alijs omnibus cōpo-
 sita ac cōstructa; si nō aliquis ex natiuitate, aut ab initio defectus fuerit. Si uero
 etiam quis fuerit, is si exilis est, conandū est ut subiectae naturae assimiletur, prae-
 ter naturam enim est id quod imminutū est, etiam per tēpus. Porro fugiēda est
 & frictio per lintea sudaria, propter parandā medendi autoritatē, Itemq; odor
 curiosē ascitus. Propter multā enim peregrinitatē, in calūniā incidēs: propter
 modicā uero, decentem ornatū cōsequeris. In parte enim dolor modicus: in to-
 to, multus. Gratiitudinē autem qua hominibus cōplaceas, non tollo. Digna es-
 nim est medico praesidio. At uero appositionis per instrumēta, & indicationis
 eorum quae significant, & eiusmodi rerum memoriā adesse oportet. Si uero eti-
 am uulgi gratia uelis dissertationē ad audiendū te facere, non ualde gloriose id
 captes: nō tamen cum testimonio ac ostētatione poetica. Impotētiam enim in-
 dustrii laboris ostendit. Auersor enim ad alium usum trāsferri industriam cum
 labore partā, quae propterea in seipsa sola gratiosae sectae electionē habet. Con-
 sequeris enim instar fuci promptam cū comitatus deductione elationē. Optan-
 da est & eiusmodi dispositio quae aliena sit ab eo qd quis grandis iam natu dis-
 scat. Hoc enim praesentū quidē nihil perficit, absentū uero tolerabilis memo-
 ria existit. Fit itaq; omnia tentans infortunū, cum recēti pernīcie, quae negligit
 decorum, & in praefinitis terminis, & in professione, & in maximis iuramētis
 deorum gratia factis: dum Medicus praest morbo, cū assidua lectione, instru-
 ctioneq; imperitorū fugitiuorū, ita ut sermones trāslatitios imitetur, qui etiam
 antea q̄ in morbo incertus animo esset, collecti fuerunt. Talium igitur ubi etiā
 praefectus essem, nō sanē in collectitia curatione id facerē. Verū confidenter au-
 xilium peterem. Cognitionis enim decorae scientia in his dispersa est. Quū igitur
 hi necessario sint inscī ac imprudētes, hortor eos ut cōmodam habeāt exer-
 citationē, post dogmatū cognitionis penuriā. Quis enim multitudine dogma-
 tum sectionē se uere cognoscere posse sperarit, citra exercitationis constantiā?
 Quapropter hoc admoneo, ut dicentibus quidē attendant, facientibus autem
 incubant, & cōtractam uictus rationē non diu praescribant. Aegrotantis enim
 diuturnam cōcupiscentiā erigit indulgētia quoq; in morbo diuturno. Si quis
 cæco animū aduertat, uelut res magni timoris cauendus est, & gratia desperan-
 da, per quam unitas cōstat. Aeris repentina turbatio uitanda est. Vigor ætatis
 omnia habet gratiosa, Decrepita uero ætas, uice uersa. Obscuritas linguæ non
 satis claræ sit, aut propter affectionē, aut propter aures, ita ut priusquam priora
 enūciar, alia adhīciat: aut priusquā id quod mēte cōcepit dicat, alia insuper co-

gitet. & quæ quidem citra affectionem uisibilem appellatam, contingit linguæ obscuritas, his maxime qui artium studio tenentur accidit. Aetati etiã quum paruum est aliquando subiectum, ualde magna uis inest. In morbo tranquillitas, longitudo significat. Iudicatio uero est morbi exolutio. Parua causa medelis exsoluitur, nisi quid circa locum principalem affectum fuerit. Quandoquidem affectio per consensum à tristitia inducta uexat, quidam sanè ex alterius consensu uexantur. Vociferatio affligit. Fortis laboris studium subterfugiendum est. Maritus locus ad sanitatem commodus est.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE NATURA HOMINIS IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.



VICVNQVE de natura humana amplius differentes audire cõsueuit, q̃ eius ad medicinã pertinet, huic nō est cōmodum hunc meū sermonē audire. Neq̃ enim omnino ex toto aerem dico hominē esse, neq̃ ignē, neq̃ aquam, neq̃ terram, neq̃ quicquā aliud, quia nō manifestū est unum in homine esse, sed uolentibus tamē hæc dicere permitto. At uero talia dicētes mihi nō recte rem cognoscere uidentur. Sententiam enim eandem omnes ineunt, uerū non eadem dicūt, sententiæ tamē epilogum eundem faciunt. Aiunt enim unū quid esse, quodcūq̃ tandem est, & id ipsum esse unū ac totū, iuxta nomina autē non consentiunt. Etenim alius ex ipsis aerē esse, hoc unū ac totū dicit, alius ignē, alius aquā, alius terrā, & addit unusquisq̃ ad sermonē suum testimonia ac signa, quæ nullius momēti existūt. Quia enim eadē sentētia omnes utūtur, dicūt autē non eadē, manifestū facit q̃ neq̃ cognoscūt ipsa. quod ex eo uel maxime quis cognouerit, qui ipsorū disceptionib. interfuerit. Nā quū iisdē uiri inter se disceptāt, iisdē auditorib. præsentibus, nunq̃ ter cōsequenter idem homo uincit in eodē sermone, sed modo hic, modo alius superat, cuiuscūq̃ fuerit lingua maxime fluida ac populo grata. Atqui iustū erat, ut is qui de rebus se recte cognoscere pronūciaret, semper sermonē suū uictorē statueret, siquidē uera cognosceret, ac recte sentiret ac iudicaret. Verū huiusmodi homines uidentur mihi seipsos oppugnare in uerbis sermonū suorum, præsultitia, & Melissi sermonē approbare. De his igitur sufficiūt mihi quæ retuli. At uero ex Medicis quidā dicunt, q̃ homo sanguis solū est, alij ex ipsis bilem aiunt hominē esse, aliqui pituitam, epilogū autē & ipsi omnes eūdē faciunt. Vnum enim quid esse dicūt, quodcūq̃ cuiq̃ ipsorū nominare uisum est, & id ipsum unū existēs, speciem ac uim trāsmutare, coactū à calido ac frigido, fieriq̃ & dulce, & amarū, & albū, & nigrum, & omnigenū quid aliud. Mihi uero neq̃ hæc sic se habere uidētur. Plurimi quidē igitur talia quædā, & amplius his proxima pronūciant. Ego autē dico, si unū esset homo, nunquā sanè doleret. Neq̃ enim esset unde doleret unū existens. Si uero etiã doleret, necesse esset & quod mederetur ac sanaret unū esse. Nūc uero plura sunt. Multa enim sunt in corpore existentia, quæ quū mutuo præter naturā calfiunt & frigeſcunt, siccāturq̃ & humectātur, morbos pariunt. Quare multæ quidē species morborū sunt, multa

taq; etiā medela ipsoꝝ existit. Atq; ego sanè cenſeo eum qui hominē sanguinē
 ſolum eſſe dicit, & nihil aliud, demōſtrare debere, ipſum nō trāſmutare ſpecieꝝ,
 neq; omnigenū fieri, uel ſaltē horam aliquā anni, aut hominis ætatē, in qua ſan-
 guis ſolus in homine ineſſe appareat. Veriſimile eſt enim unū aliquod eſſe tem-
 pus, in quo appareat ipſum in ſeipſo unū exiſtens. Eadē cenſeo etiam de eo qui
 pituitā ſolam eſſe dicit, & qui bilem. Ego enim demōſtrabo ea quæ hominem
 eſſe dixerō, & iuxta receptū morem, & iuxta naturā, quòd ſemper ea ipſa ſimilia
 ſint, & in iuvene, & in ſene, & tēpore frigido æque ac calido. Exhibebo in-
 ſuper ſigna, & neceſſitates oſtendam, per quas unūquodq; augeſcit ac minui-
 tur in corpore. Primū quidem igitur, neceſſe eſt generationē fieri non ab uno,
 Quomodo enim unū exiſtens, aliud quid generarit, ſi nō alicui miſceatur? De-
 inde neq; generarint, ſi nō eiꝝdē generis exiſtentia miſceātur, & quæ eandem
 uim habeant, neq; ſanè nobis ſimilia perficerētur. Et ruruſ, Si nō calidū ac fri-
 gidū, & ſiccū ac humidū, moderate ac æqualiter inter ſe haberēt, ſed alterū alte-
 rum multū præcelleret, & fortius debiliore præſtaret, generatio fieri nō poſſet.
 Proinde quomodo ueriſimile eſt, ab uno quid generari, quum neq; à pluribus
 generetur, niſi habuerint temperamētum inter ſe probe conueniens? Neceſſe
 itaq; eſt tali exiſtente natura, cum aliorum omnium, tum humana, non unum
 eſſe hominē, ſed ſingula quæ ad generationē eiꝝ conferunt, uim quandam in
 corpore habere, eam uidelicet quā contribuerūt. Et ruruſ neceſſe eſt ſecedere
 ſingula in ſuam ipſoꝝ naturā, homine moriente, humidū nimirum ad humi-
 dum, ſiccum ad ſiccum, calidū ad calidum, frigidū ad frigidum. Talis autem &
 animalium eſt natura, & alioꝝ omnium, generāturq; ſimiliter omnia, & occi-
 dunt ſimiliter omnia. Cōſtat enim natura ipſoꝝ ex his prædictis omnibus, &
 deſinit iuxta prædicta, in id unūquodq; unde eſt cōpactum ſecedens. At ue-
 ro corpus hominis habet in ſeipſo ſanguinē, & pituitam, & bilem duplicem,
 flauam uidelicet & nigram. atq; hæc ſunt ipſi corporis natura, & per hæc & æ-
 grotat, & ſanus eſt. Sanus equidem maxime eſt, ubi temperamētum hæc inter
 ſe habuerint moderatū, tum facultate, tum copia, & ubi maxime fuerint per-
 mixta. Aegrotat autem quū horum quid minus aut amplius fuerit, aut ſeparat-
 tur in corpore, & nō fuerit reliquis omnibus cōtemperatum. Neceſſe eſt enim
 quum quid horum ſecretū fuerit, & per ſe ſteterit, non ſolum eum locum unde
 ſeceſſit morbidum fieri, ſed etiā eum in quo ſtat, & in quem propter nimiam
 copiam diffuſum eſt, dolore ac morbo uexari. Etenim quum quid horū extra
 corpus effluerit amplius quā redūdat, euacuatio ipſa dolorem exhibet. Rur-
 ſus itaq; ſi idem intus fecerit euacuationē, & tranſitionem, ac ab alijs ſecretio-
 nem, geminatum dolorem exhibere neceſſe eſt, uelut dictum eſt, nempe & un-
 de ſeceſſit, & ubi receptū redundat. Dixi porro, quæcūq; hominem eſſe dixe-
 ro, ſemper demōſtraturum me eſſe, quòd talia ſint & iuxta receptū morem ac
 opinionem, & iuxta naturā. Et dico ſanè eſſe ſanguinē, & pituitā, & bilem fla-
 uam ac nigram: & horum primū quidem iuxta receptam opinionē nomina di-
 ſtincta eſſe dico, & nulli ipſoꝝ idem nomen eſſe. deinde ſpecies iuxta naturam
 ſeparatas eſſe, & neq; pituitam ſimilem eſſe ſanguini, neq; ſanguinem bili, neq;
 bilem pituitæ. Quò enim modo hæc inter ſe ſimilia ſint, quorum neque colo-
 res ſimiles uidentibus apparēt, neq; ad manuum tactum ſimilitudo aliqua eſſe

deprehenditur. Neque enim similiter calida sunt, neque frigida, neque sicca, neque humida. Quum itaque intantum inter se discrepent, tum specie, tum facultate, necesse est ipsa non unum esse, quandoquidem neque ignis & aqua idem sunt. Quod autem hæc omnia non unum sunt, sed unumquodque ipsorum uim & naturam suam habet, uel hinc cognoscere licebit. Si enim homini alicui medicamentum dederis, quod pituitam ducit, pituita tibi uomet, & si pharmacum dederis bilem ducens, bilem tibi uomet. Eadem ratione & bilem atram purgabit, si medicamentum exhibueris quod bilem atram ducit. Quod si ipsi partem aliquam sauciaris, ut uulnus fiat, effluet ipsi sanguis, atque hæc omnia faciet tibi totam diem ac noctem, & hyeme & æstate, donec spiritum in sese trahere potens fuerit, potens autem erit donec aliquo horum cogenitorum fuerit priuatus. Cogenita autem sunt prædicta. Quomodo enim non congenita essent? Primum etenim manifestum est hominem in seipso hæc omnia semper habere, donec uiixerit. Deinde nata sunt ex homine hæc omnia habente. Postea nutrita sunt in homine hæc omnia habente, quæ uidelicet ego nunc dico ac demonstro. Qui uero dicunt, quod unum est homo, uidentur mihi hoc consilio uisi esse. Nimirum quum uiderint eos qui medicamenta hauserunt in superpurgationibus interisse, alios quidem bilem uomentes, alios pituitam, unumquodque horum hominem esse putauerunt, quod uidissent his purgatum interisse. Et qui sanguinem dicunt hominem esse, eodem consilio utuntur. Nam quum uident iugulatos homines, & sanguinem ex corpore ipsorum effluentem, hunc ipsum animam in homine esse putant, atque his testimonijs sanè omnes utuntur in sermonibus suis. Atqui primum quidem in superpurgationibus, nemo unquam mortuus est bile sola purgatus. Verum quum quis pharmacum biberit, quod bilem deducit, primum bilem uomet, deinde pituitam, postea per uim etiam atram bilem, postremum moribundus etiam sanguinem purum uomet. Eadem perpetiuntur à medicamentis pituitam ducentibus. Primum enim pituitam uoment, deinde bilem flauam, postea atram, morientes autem sanguinem purum, & in hoc mox uitam finiunt. Etenim pharmacum ubi corpus intrauerit, primum quidem ducit id quod ex omnibus in corpore existentibus, sibi maxime secundum naturam familiare fuerit, deinde uero etiam alia trahit ac purgat. Quemadmodum ex terra nascentia & in ipsam plantata ac seminata, ubi in terram peruenerint, unumquodque trahit id quod naturæ suæ familiare in terra existit. Inest autem in terra & acidum, & amarum, & dulce, & salsum, & omnigenum. Primum itaque plurimum eius trahit in seipsum, quod sibi ipsi iuxta naturam maxime familiare fuerit, deinde trahit etiam reliqua. Huiusmodi sanè quiddam etiam pharmaca in corpore faciunt. Quæcumque enim bilem ducunt, primum meracissimam bilem purgant, postea uero mixtam. Et rursus pituitæ pharmaca, primum meracissimam pituitam ducunt, postea mixtam. Et iugulatis primum quidem sanguis calidissimus & ruberrimus profluit, deinde pituitosior ac biliosior. Porro pituita in homine hyeme augetur. Hæc enim hyemi maxime secundum naturam cõuenit ex omnibus in corpore existentibus. Frigidissima enim existit. Signa autem quod pituita frigidissima est hæc sunt. Si enim pituitam & bilem & sanguinem contingere libuerit, pituitam sanè frigidissimam esse conperies, quamuis uiscosissima sit, et per uim maxime post bilem atram trahatur, quæ uero per uim trahuntur calidiora sunt, à uolentia coacta, sed tamē supra hæc

hæc omnia, frigidissima esse apparet pituita ex sua ipsius natura. Quod autem hyems corpus pituita repleat, inde cognoscere datur, quod homines pituitosissima & spuunt & emungunt hyeme, et tumores laxi albiſſimi fiunt maxime hoc tempore, itemq; reliqui morbi pituitosi. Cæterū uere pituita quidem adhuc fortis in corpore manet, sed sanguis augetur. Nam & frigora remittūt, & imbres superueniūt. Sanguis autem iuxta hæc augetur, ab imbris uidelicet & calidiorū dierū tepore. Hæc em̄ anni pars maxime iuxta naturā ipsi cōuenit, ut quæ calida & humida existat. Signa aut̄ hinc colligere licet. Quod homines uere & æstate maxime dysenterijs corripiuntur, & sanguis ex narib. ipsis fluit, & calidissimi ac ruberrimi. At uero æstate sanguis adhuc uiget, & bilis in corpore eleuatur, & usq; in autūnum porrigitur. In autūno uero sanguis modicus fit, contrariū enim eius naturæ id tēpus existit. Bilis aut̄ per æstatē ac autūnum corpus possidet, id quod inde cognoscere potes: quod homines sua spōte hoc tēpore bilem uomūt, & in medicamentorū potionib. biliosiora purgantur. Manifestū fit & febribus, & hominū caloribus. Pituita aut̄ æstate debilior seipsa est. Contrariū est enim naturæ eius id tēpus, calidū enim est & siccū. Sanguis uero autūno paucissimus fit in homine, Siccus enim est autūnus, & hominem iam frigefacere incipit. Atrā porro bilis autūno et plurima & fortissima est. Postq; aut̄ hyems apprehēderit, bilis flaua perfrigerata modicafit, & pituita rursus augetur, tum ob pluuiarū copiam, tum propter longitudinē noctiū. Corpus quidē igitur humanū hæc omnia semper habet, uerū pro tēporis circūstantia, aliquādo plura seipsis fiūt, aliquando pauciora, singula tum iuxta partē ac copiam, tū iuxta naturā. Quēadmodū enim annus omnis omniū particeps est, & caliditatū & frigiditatū, & siccitatū ac humiditatū, Neq; enim quicquam horū ne minimo quidē tempore cōsisteret ac duraret, citra omnia ea quæ in hoc mūdo insunt, uerū si unū aliquod deficeret, omnia sanē abolerentur: ex eadem enim necessitate omnia cōsistunt & mutuo alūtur: Sic etiam si quid ex homine deficeret ex his quæ ipsi cōgenita sunt, nō sanē uiuere posset homo. In anno autem aliquādo quidē hyems maxime uiget, aliquādo uer, modo æstas, modo autūnus, Sic etiā in homine, aliquādo pituita præualet, aliquādo sanguis, aliquādo bilis, primū quidē flaua, deinde etiā nigra appellata. Quorū omniū euidentissimū testimoniū hinc habes. Si enim eidem homini idē pharmacū quater in anno dare uelis, uomet tibi hyeme quidē pituitosissima, uere aut̄ humidissima, æstate biliosissima, autūno nigerrima. Itaq; quū hæc sic se habeant, quicūq; morbi hyeme augetur, æstate desinere solent, quicūq; uero æstate augetur, hyeme finire cōsueuerunt, nisi certo dierū circuitu discedant, de circuitu autem rursus dicam. Quicūq; aut̄ morbi uere fiunt, ad autūnum eorū discessum fore expectare oportet, Quicūq; postremū autumnales morbi sunt, eorū discessum necesse est uere fieri. Quicūq; uero morbus hæc tempora transgressus fuerit, eum annum fore scire oportet. Porro Medicum sic aduersus morbos instare oportet, prout unumquodq; horum in corpore præualet, iuxta tempus si bijsi maxime natura conueniens existens.

Addititia sunt hæc, non genuina Hippocratis, ut ait Galenus.

Quin & hæc insuper ad illa nosse oportet, q; quoscūq; morbos repletio parat,

euacua

euacuatio sanat: & quicūq; ex euacuatione fiunt morbi, repletio sanat. quicūq; uero à labore fiunt, quies sanat. qui autem ab ocio gignūtur, labor sanat. In summa Medicum scire oportet, opponere se cōtrarium instantibus & morbis, & naturis, & temporibus, & ætatibus, & distendentia soluere, & soluta distendere, Sic enim uel maxime morbum sedauerit, & mihi sanè hoc ipsum sanatio esse uidetur. Morbi partim ex diætis, partim ex spiritu, quem adtrahētes uiuimus, fiunt. Vtrorūq; cognitionē sic facere oportet. Quando ab uno morbo multi homines corripīuntur eodem tempore, causam ad id quod communissimum est, & quo maxime omnes utimur, referre oportet. Est autem hoc spiritus & aer quem inspirando trahimus. Manifestum est enim iam, quod diætā uniuscuiusq; nostrum, causā non est, quum morbus omnes cōsequenter contingat, & iuniores, & seniores, mulieresq; ac uiros, & tam uinolentos quā aquā potores, & tam mazam edentes, quā pane uescētes, & tam multū laborantes, quā parū. nequaquā igitur diætā causā fuerit, quum homines diuersa uictus ratione utentes ab eodem morbo corripīuntur. Quū uero omnis generis morbi sūt eodē tēpore, palām est uictus singulos singulis causas esse, & curam sanè facere oportet ex cōtrario instādo aduersus morbi causā, quemadmodum & alibi à me relatum est, & uictus rationem permutare. Conspicuum est enim diætā qua homo uti cōsueuit, non esse ipsi cōmodā, aut in totum, aut magna ex parte, aut unū saltem quoddā ex ipsa: quod ubi cognoueris trāsmutare oportet, habitacū cōsideratiōe naturæ hominis, & ætatis, & speciei, horæq; anni & modi ipsius morbi, curationē facere, aliquādo detrahēdo, aliquādo apponēdo, & quemadmodū iam dudū à me dictum est, ad singulas ætates, & horas, & species, ac morbos respiciēdo, tum in exhibēdis pharmacis, tum in cōstituenda diætā. At uero quū unius morbi popularis grassatio consistit, manifestum est diætā non esse culpabilem, sed quē trahimus spiritū in causā esse: palām q; est insuper eum ipsum spiritū siue aerem morbosā aliquā exhalationē habere. Eo itaq; tēpore homines in hūc modum cōmonefacere oportet, Nimirū ut diætā nō permutent, quia morbi causā nō existunt, uerū ut uideāt quo corpus habeāt q̄ minimæ molis ac debilissimū: detrahēdi insuper sunt cibi ac potus quibus uti cōsueuerunt, idq; paulatim facere oportet. Nam si quis cito diætā permutet, periculū est etiā à permutatione aliquid in corpore nouatū iri. Quapropter uictu solito quidē utendū est, ubi hominē nihil lædere uidetur. prouidēdum uero ut q̄ paucissimus aeris influxus in corpus ingrediat, & uille ipse q̄ peregrinissimus existat. Regionum etiam locos in quibus morbus cōsistit, quantum eius fieri potest, permutare oportet, & corpora attenuare: sic enim minime multo ac denso spiritu homines opus habuerint. Porro quicūq; morbi à fortissima corporis parte fiunt, grauissimi existūt. Etenim si isthic ubi initium sumpserint permanserint, necesse est fortissima parte laborante, totum corpus laborare. Et si à ualidissima ad quādam debiliorem transferint, difficulter soluuntur. Quicunque à debilioribus partibus ad fortiores transferint, commodius solui possunt. Nam influētia à ui ipsarum facile consumuntur. Venæ crassissimæ sic se habēt. Quatuor paria ipsarum sunt in corpore. & unum quidem à capite retro per ceruicem, forinsecus ab utraq; spinæ parte ad coxēdices & in crura progreditur, deinde per furas & malleolos forinsecus

secus ad pedes peruenit. Oportet igitur uenæ sectiones, in doloribus dorsi ac coxendicū, de poplitibus facere & de malleolis forinsecus. Alterum par principium ex capite iuxta aures habet per ceruicē, & sphagitides appellantur, hoc est iugulares. deferunturq; utrinq; iuxta spinam intrinsecus ad lumbos, in testes ac femora, & per poplites ex interna parte, deinde per suras ad malleolos intrinsecus & in pedes. Quapropter in doloribus lumborū ac testium, uenæ sectionem de poplitibus ac malleolis facere intrinsecus. Tertiū par uenarum ex temporibus per ceruicem sub scapulas tendit, & ad pulmonem deferitur, altera quidem à dextris ad sinistram partē, altera uero à sinistris ad dextram, & dextra quidem sub mammā abit & in splenem, & in rhenē, sinistra uero in dextram partem tendit à pulmone sub mammā & in hepar, & in rhenē. Vtraq; autem in rectum intestinū ac podicem definit. Quartū par à priore capitis parte & oculis, sub ceruicem ad clauiculas deuenit, deinde super brachia superne in flexuras, postea per cubitos in manuum iūcturas ac digitos. deinde à digitis rursus, per cubitos ac manus superne in flexuras, & per brachiorum infernam partem ad alas, unde superne à lateribus altera in lienē peruenit, altera in iecur, postea supra uentrem utraq; in pudendum definit. Et crassissimæ quidem uenæ sic se habent. Sunt autem & ex uētriculo uenæ per corpus multæ & omnigenæ, per quas corpori alimētum accedit, ferunt autem à crassis uenis, in uentriculum ac reliquum corpus, & ab externis & ab internis, & inter se mutuo distribuūt internæ extrinsecis, ac uicissim extrinsecæ internis. Venæ igitur sectiones iuxta prædictum sermonem facere oportet. Enitendum est autem ut sectiones, quàm longissimè à locis faciamus, ubi dolores fieri, & sanguis colligi solet. Sic enim mutatio minime magna de repente fiet, & cōsuetudinem remouebit, ut non amplius in eundem locum colligatur. Quicūq; pus multum spuunt, citra febrem, & quibuscūq; in urina pus multum subsidit, citra dolorem, & quibuscūq; alui recremēta cruenta, uelut in dysenterijs, & tardè ac diutine prodeuntia, uelut in iuuenibus quinq; & triginta annorū, atq; etiam senioribus, his omnibus ex eadē causā morbi fiunt. Necesse est enim hos labori deditos, ac exercitatiois studiosos, & corpore operarios in iuuetute fuisse, postea uero relictis laboribus, molli carne & multum à priore differente carnosos redditos esse, & corpus multum discrepans habere, ut id quod prius extitit, cum eo quod nunc adepti sunt, nulla parte cōsentiat. Quum igitur morbus aliquis corripuerit sic dispositos, euestigio quidem effugiūt, postea autē à morbo progressu temporis corpus colliquescit, & serosi ac saniosi humoris species per uenas, qua parte maxime amplæ fuerint, fluit. Siquidem igitur in inferiorē uentriculum processerit, ferè qualis in corpore inest, tale etiam recremētum prodit. Quū enim de alijs sit uia, non multo tempore hæret in intestino. Quibuscūq; autem in pectus in fluxerit, suppurati fiunt. Nimirum purgatione accliuī existēte, & multo tempore in pectore immorās putrescit, & purulenta redditur. quibuscūq; uero eadē serosi humoris species in uesicā proruperit, à loci caliditate, calida & alba fit, & segregatur, & quod quidē rarissimū est, superstat, crassissimū uero infrā mergitur, qđ sanè pus appellatur. Fiūt autē & calculi pueris, propter huius loci caliditatē itemq; totius corporis. Viris autē calculi nō generātur, propter corporis frigiditatē. Nā id pbe nosse oportet, qđ homo primis dieb. calidissimus est

est sui respectu, ultimis frigidissimus. Necesse est enim augescēs & ad uitium procedens corpus calidū esse. Vbi autem inceperit marcescere corpus, delabens in ocium, frigidissimū euadit. Et iuxta hanc rationē, quanto amplius primis diebus homo augescit, tanto calidior existit, & quanto plus ultimis diebus marcescit, tanto frigidiores esse necesse est. Sani autem fiunt sua sponte illi prædicto modo dispositi ac affecti, plurimi quidē ab hora qua liquefcere incipiunt, quinto & quadagesimo die. Qui uero hoc tempus transgressi fuerint, anno finito sua spōte cōualescunt, nisi quid aliud mali grauioris hominē infestet. Quicūq; morbi sensim ex modici temporis causa fiunt, & quorū causæ cognitu faciles sunt, securissimi appellari possunt. Curationē itaq; ipsorū instituire oportet, ut causæ morbi nos opponamus. Sic enim soluitur utiq; id quod morbum in corpore fecit. Quibuscūq; arenosa aut tofi in urinis subsident, his initio tubercula circa crassam uenam enata sunt, & suppurata. Postea uero tuberculis nō cito effractis, tofi ex pure coalti sunt, qui per uenam foras exprimūtur unā cum urina. Quibuscūq; uero cruentæ urinæ sunt, his uenæ laborant. Quibuscūq; autem in urina crassa existente, carūculæ paruæ capilliformes simul prodeunt, eas à rhenibus prodire nōsse oportet, & ab arthriticis. Quibus uero pura urina est, & aliàs atq; aliàs uelut furfures in urina innatant, horum uesica scabiosa existit. Febres plurimæ à bile fiunt. Species ipsarū quatuor sunt, præter eas quæ ab occultis doloribus generātur. Nomina ipsarū sunt: Continens, Quotidiana, Tertiāna, Quartana. Cōtinēs itaq; appellata, à plurima ac meracissima bile prouenit, & iudicationes q̄ breuissimo tēpore facit. Corpus enim nullo tēpore perfrigeratū cito colliquescit, nimirū à multa caliditate calfactū. Quotidiana uero post continētē à plurima bile generatur, & præ reliquis celerrime discēdit, uerū longior est cōtinente, quāto à pauciore bile prouenit, & propterea q̄ requiem habet in ipsa corpus, In cōtinente uero nō quiescit ullo tempore. Tertiāna autem longior est q̄ quotidiana, & à pauciore bile gignitur. Quāto uero longiori tēpore in tertiāna corpus quiescit q̄ in quotidiana, tanto diuturnior hæc febris est quā quotidiana. At uero quartanæ reliquæ iuxta eādem rationem habent, sed tertianis diuturniores sunt, quanto pauciore bilis parte participant, unde caliditas augetur, & propterea quod corpus in ipsis plus perfrigescit, id qd' ab atra bile ipsis contingit superflue adeo ut aggre frigus depelli possit. Atra enim bilis inter omnes corporis humores uiscosissima est, & sedes diuturnissimas facit. Quod autem quartanæ febres atræ bilis participes sint, uel hinc condiscere licet. Autumno enim maxime homines à quartanis corripiuntur, & in ætate à quinq; & uiginti annis, usq; ad quadagesimū quintum, Hæc autem ætas præ omnibus alijs maxime à bile atra infestatur, & autumnī tempus omnium anni temporū ad eandem aptissimum est. Quicūq; autem extra hoc tempus & ætatē à quartana corripitūtur, pro certo scire oportet eam febrem non fore diuturnam, nisi quid aliud grauioris mali hominem infestauerit.

DE SALVBRİ DIAETA LIBER

IANO CORNARIO MEDICO PHYSICO INTERPRETE.

*Additius est ad librum De natura hominis, Polybi**Hippocratis discipuli, ait Galenus.*

LDIOTAS & priuatos homines hac diaeta uti oportet. Hyeme quidem comedere quàm plurima, bibere autē quàm paucissime. Sit potus uinū quàm meracissimū: cibi, panis, & obsonia assata omnia. Oleribus quàm paucissimis hoc tēpore utendum est, Sic enim corpus maxime siccū ac calidum red-detur. Vbi uero uer apprehēderit, tunc sanē potū ampliōrē assumere oportet, uinum dilutius & paulatim: cibis quoq; mollioribus ac paucioribus tum utendū est: & ablato panē, mazam exhibere, & iuxta eandem rationem obsonia detrachere, & ex assatis omnia cocta facere. Oleribus uero paucis tūc uti oportet, donec ad æstatem perueniat homo, cibis molliorib. utēdo, & obsonijs coctis, & oleribus, tam crudis quàm coctis, simili terq; potibus q̃ dilutissimis ac plurimis, ita tamē ut paulatim nō de repēte his utatur, ne uidelicet magna mutatio fiat. At uero æstate maza molli nutriatur, et potu aquoso ac multo, obsonijs omnib. coctis. Sic autē his ubi æstas fuerit uti oportet, ut frigidum sit corpus & molle. Tempus enim calidū est & siccū, & fa-cit corpora æstuosa ac squallida. Quapropter tali studio auxiliari oportet. Iuxta eandem uero rationem, quemadmodū ex hyeme ad uer, sic ex uere ad æsta-tem deducendus est, cibo quidē detracto, potu uero aucto. Sic quoq; cōtra-ria faciendū ex æstate ad hyemē perducatur. In autūno uero rursus cibi plures exhibendi sunt & sicciores, & obsonia iuxta eandem rationē, potus uero pau-ciores & meraciores, quo etiā hyems bona fiat, & homo in ipsa utatur potibus meraciorib. ac paucis, cibis uero quàm plurimis ac siccissimis. Sic enim & ma-xime sanus fuerit, & minime frigore impetetur. Nam tempus hoc ualde frigi-dum ac humidum existit. Porro habitibus corporū carnis & mollibus ac ru-bris, plurimo anni tēpore siccioribus diætis uti conducit. Humida enim est ip-sorū natura. Verū duros & graciles, fuluosq; ac nigros, humidiorē diæta ma-iore tēporis parte uisitare oportet. Corpora enim talia sicca existunt. Sed & iu-uenibus corporibus, mollioribus & humidiorib. diætis uti cōfert. Nā ætas ip-sorū sicca est, & corpora cōpacta sunt. Seniores autē sicciorē uictus modo, ma-iore tēporis parte degere oportet. Corpora enim in hac ætate humida sunt, & mollia ac frigida. Opōrtet igitur & ad ætatē, & ad tempus anni, & ad corporū species ac habitus, diætās constituere, ita ut cōsistentibus & caloribus, & frigo-ribus nos opponamus, Sic enim maxime sani fuerint. Quin & ambulandum hyeme quidem uelociter est, æstate autē leniter, nisi per solis æstum iter facien-dum sit. Oportet autē & carnosos citius ambulare, graciles uero tardius. Bal-neis quoq; multis æstate utendū est, hyeme paucioribus, Gracilibus autem ma-gis expedit lauari, quàm carnosis. Vestes autē puras induere hyemē oportet oleo imbutas ac sordidas, æstate. Cæterū pingues, & qui graciles fieri uolunt, omnes labores ieiuni facere debent, & cibos assumere anhelantes adhuc ex fa-

tigatione, & nō refrigerati, præpoto uino diluto, & non ualde frigido, & obsonia præparata assumere ex sesamis, aut cōdimentis hortensibus, & alijs huiusce modi. Sint autem obsonia pinguiā quæ offeruntur, sic enim à quā paucissimis impleri poterint. Sed & semel in die cibum sumere, & illotū manere, & stratum durum habere, & nudum deambulare oportet, quantum eius maxime fieri potest. Quicūq; uero graciles sunt, & pingues fieri uolunt, tum alia his quæ dixi contraria facere, tum ieiunos nullum laborem subire oportet. At uero uomitibus, & alui per infusa elotionibus hoc modo utendum est. Sex menses hybernos uomendū est, Hoc enim tempus pituitosius est æstiuo, & morbi circa caput fiunt, & regionem eam quæ est supra septū transuersum. Quum uero æstas ac calor fuerit, infusis utēdum est. Hora enim hæc æstuosa est, & corpus biliosius, & lumbi ac genua grauantur, & calores oboriuntur, & in uentre tormina fiunt. Quapropter corpus perfrigerare oportet, & quæ in sublime eleuantur, inferne subducere ex istis locis. Sint autem infusa pro crassioribus ac humidioribus saliora & tenuiora, pro siccis uero & gracilibus ac debilioribus, pinguiora ac crassiora. Crassa autē & pinguiā infusa sunt quæ ex lacte fiūt, & cicerū decoctū, & alia huiusmodi. Tenuia uero & salia, sunt muria & aqua marina, & eiuscemodi. At uero uomitus sic facere oportet. Quicūq; homines crassi ac pingues sunt, & non graciles, ieiuni uomāt à cursu aut ambulatione cita, iuxta meridiem. Sit autē dimidia hemina hyssopi in aquæ congio cōtriti, atq; hoc ebibat affuso aceto & adiecto sale, quo iucundius euadat. Bibat autē primum sensim ac lentius, postea amplius & citius. Qui uero graciliores sunt ac debiliores, à cibis uomitum faciant hoc modo. Lotus calida præbibat meri heminā, deinde cibos omnigenos edat, & neq; dum cibum sumit, neq; à cibo bibat, sed contineat se donec quatuor stadia quis percurrat, deinde uina tria permixta ipsi in potu offerantur, austerum, dulce, ac acidum, primū quidem meracius, & paulatim, & per multū temporis spatium. deinde uero dilutius, & citius, & multum. Quicūq; autem bis in mēse uomere cōsueuit, huic melius est ut cōsequenter in duobus diebus uomat, q̄ per quintum & decimū. Verum aliqui penitus cōtrarium faciunt. Quibuscūq; uero cōmodum est reuomere cibos, aut quibus alui non probum transitum habent, his omnibus cōducit sæpe in die comedere, & omnigenis edulijis uti, & obsonijs uarijs modis præparatis, uinūq; bibere duplex aut triplex. Qui uero reuomūt cibos aut aluos habent humectas, his omnibus cōtrarium huiusmodi facere cōducit. Cæterū puerulos infantes per multum tempus in aqua calida madefacere oportet, & uinū bibendum dare aquosum, & non penitus frigidū. Dandum est & id uinum quod minime uentrem eleuet ac inflat. Hæc autē facere oportet, ut & cōuulsionibus minus corripiantur, & maiores fiant, ac meliorē calorem adipiscantur. Mulieres porro siccioris modi diætā uti oportet. Nam et cibi sicciores ad muliebriū carniū molliciem cōmodiores sunt, & meraciores potus præstabiliores sunt ad uteros ac fœtū nutrimenta. Qui exercitijs utūtur, hyeme currere ac luctari debent. Aestate uero luctari quidem parum, currere autem minime, sed multū deambulare secundum uentum ac frigus. Quicūq; ex cursibus fatigati fuerint, eos luctari oportet. Qui uero ex lucta fatigātur, eos currere expedit. Sic enim laborans, fatigata corporis parte uel maxime cal fieri cōponi q; ac recreari queat. Quoscūq; exerci

tijs utentesalui profluuiā corripitū, & recrementa ciborū speciem referētia ac cruda habent, his exercitiorum non minus q̄ tertiam partē detrahare oportet, & ciborum dimidiū saltem exhibere. Palam est enim quod uentriculus cōfouere nō potest, quo ciborū multitudo cōcoquatur. Sint aut̄ his cibi, panis quāmaxime affatus in uinō intritus, & potus quāmaxime parcissimī ac meracissimī, & deambulationibus à cibo ne utantur. Oportet autē sub hoc tempus semel duntaxat in die cibum sumere. Sic enim q̄ maxime cōcalescit uētricus, & ea quæ ingesta sunt exsuperauerit. Fit hic profluuij alui modus maxime his corporib: quæ densam carnem habent, quum ad carnū esum homo cogitur, natura eiusmodi existente. Venæ enim densatæ cibos ingestos nō suscipiunt. Est aut̄ hæc riatura acuta, & in utraq; partem uertitur, & ad modicum tempus uiget bona habitudo in talibus corporib. At uero rariore ac hirsutiores corporū species ac habitus, tum carniū esum suscipiunt, tum labores magis tolerant, & bonæ habitudines ipsis fiunt diuturniores. Quicūq; postridie cibos eructant, & præcordia ipsis eleuātur, utpote cibis crudis & incōctis existentibus, his longiori quidem tēpore dormire cōducit, uerū & alijs laboribus corpora ipsorū cogere oportet, Vinum autē meracius & amplius bibant, & cibis paucioribus sub id tempus utantur. Palam est enim quod uentriculus præimbēcillitate ac frigiditytate, ciborū multitudinē concoquere nō potest. Quoscunq; uero sitis corripuerit, his & cibi & labores detrahendi sunt, & uinū bibant aquosum & q̄ frigidissimum. Quibuscūq; autem dolores fiūt ex uisceribus, siue ex exercitijs, siue ex aliquo alio labore, his quiescere cōducit cibis abstinentes, potione autē utātur, quæ quāmaxime parcissimē in corpus assumpta, plurimā urinam ducat, quo uenæ uisceribus insitæ nō distendantur repletæ. Ex talibus enim tubercula oboriūtur, ac febres. Quibuscūq; uero morbi à cerebro fiunt, torpor primum caput occupat, & frequenter mingit ager, & reliqua uelut in urinæ stillicidio perpetitur, atq; hæc sanè ad dies nouem patitur. Et si quidem erumpat per nāres aut aures aqua siue mucus, à morbo liberatur, & urinæ stillicidiū sedatur. Mingit autem multum, & citra dolorem, idq; album, donēc uiginti præterierint dies, & capitis dolor hominē relinquit. Intendenti autē oculos splendor occultatur. Porro uirum prudētem id secum reputare oportet, quod res preciosissima est sanitas, & proinde scire ut ex suo ipsius consilio in morbis utilitatem percipiat.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE GENITVRA, IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.

Hic a Galeno Polybi esse perhibetur.

Et quidem omnia corroborat. Verū genitura uiri prouenit ab omni humido, quod in corpore existit, ita ut id quod robustissimū est secernatur. Argumētum autem eius, q̄ robustissimū secernitur, hoc est: q̄ a Veneris usu paucula adeo remissa, imbécilles reddimur. Habet autē res hoc modo. Venæ & nerui ab omni corpore in pudendum uergūt, quibus dum aliquantulū terūtur, & calescūt ac implentur, uelut pru-

ritus incidit, & ex hoc toto corpori uoluptas ac caliditas accedit. Quū uero pudendum teritur, & homo mouetur, humidū in corpore calefcit, ac diffunditur, & à motu cōquassatur, ac spumescit: quemadmodū etiā aliī humores omnes cōquassati spumescūt. Sic autē in homine ab humido spumefcente, id quod robustissimū est ac pinguisimū secernitur, & ad medullam spinalem uenit. Tendant enim in hanc ex omni corpore uia, & diffundūt ex cerebro in lūbos, ac in totū corpus, & in medullā: & ex ipsa medulla procedūt uia, ut & ad ipsam humidum perferatur, & ex ipsa secedat. Postquā autē ad hanc medullam genitura peruenerit, procedit ad rhenes, hac enim uia rēdit per uenas: et si rhenes fuerint exulcerati, aliquādo etiā sanguis simul defertur: à rhenibus autē trāsit per medios testes in pudēdū. Procedit autē nō quā uia, uerū alia ipsi uia est illi cōtigua. Et sanē qui somnia ueneria habent, propterea per somnum geniturā effundūt, quum humidū in corpore diffusum & calfactū fuerit, & siue ex labore, siue alia quapiam re spumauerit, dum ab ipso secernitur, coitus imaginē repræsentat. Habet enim humiditas hæc similiter ut in coeuntibus. Sed non est mihi de his qui per somnū semē emittūt, & de toto morbo quid est, & quæ operatur, & quare coitus locū expleat, sermo. atq; hæc quidē de hoc dicta sufficiūt. Cæterū eunuchi propterea non coeūt, quia genituræ trāsitus ipsis sublatus est. Est enim per ipsos testes uia eius, & nerui tenues ac crebri ex testibus in pudendū tendunt, quibus & eleuatur, & demittitur: atq; hi nerui in exsectione dum castrātur, rescinduntur, quapropter nō sunt utiles eunuchi. Nam neruis ipsorū extritis, genituræ uia obturata est. Callus enim obducitur testibus, & nerui duri ac torpētes à callo facti, pudendum neq; rēdere, neq; laxare possunt. Quibuscūq; uero iuxta aures uenæ sectæ sunt, hi coeunt quidem & geniturā emittunt, uerū modicam & debile ac infœcūdā. Nam plurima genituræ pars à capite iuxta aures in spinalem medullam procedit. Ipse autē transitus, cicatrice sectioni indurctus, cōsolidatus est. At uero pueris uenulæ tenues & repletæ existētes, genituræ transitū impediunt, & pruritus ipsis non similiter accedit, & propterea neq; conquassatur in corpore humidū, ad genituræ secretionē. Quin & uirginibus quousq; iuuentulæ fuerint, menses non procedunt, propter eandem causam. Postquam autem adoleuerint & uirgo & puer, uenæ in pudendum pueri tendentes, itemq; uirginis in uterū, amplæ fiunt præ augmento, & oscula ipsarum aperiuntur, & uia ac transitus per angustias contingit, & humidum tunc etiam agitationem habet, Nam spatiositas ipsi tūc ab agitatione ac cōquassatione contingit: & puero sanē procedit genitura ubi plene puber fuerit ob hanc causam, itemq; uirgini menses. Atq; hæc mihi sic demonstrata sunt. Porro geniturā dico à toto corpore secerni, & à solidis, & à mollibus partibus, & ab humido omni in toto corpore. Sunt autem humidi species quatuor, Sanguis, Bilis, Aqua, & Pituita. Tot enim species cōgenitas homo in seipso habet, & ab his morbi fiūt, aut etiam ex morbis discretionēs. Et hæc quidē dicta sunt à me, de genitura, unde fiat, & quomodo, & quare, & quibus genitura nō est, & quare non est, & de mensibus uirginū, & quod mulieribus incoitu, dum confricatur ac teritur pudendum, & uterū mouetur, uelut pruritus in ipsos incidat, et quod reliquo corpori uoluptas ac caliditas accedat. Emittit autē & mulier à corpore genituram, aliquādo in ipsum uterum, qui sanē inde humidus euadit: aliquādo foras

foras, si uterus magis quā opportunū est hiarit. Et delectatur mulier ubi coire inceperit per omne tēpus, donec uir semen emiseric. Et si quidem appetit uiro comisceri, prius quā uir emittit, & de cetero nō similiter delectatur. Si uero nō appetit, simul cum uiro delectari desinit. & habet res hoc modo, quemadmodū si quis in feruētē aquam, alteram frigidā infundat, illa feruere cessat. Sic genitura uiri in uterū illapsa, caliditatem & uoluptatē mulieris extinguit. Exilit autem uoluptas & caliditas simul cū genitura in uteros illabente; deinde desinit. quemadmodū si quis in flammam uinū infundat, primū quidē contingit flammam exilire, & per modicū tempus augeri, ad uini infusionē, deinde desinere. Ita etiā mulieri caliditas exilit ad genituram uiri: deinde desinit. Ceterū multo minus delectatur scēmina quā uir in coitu, & uir etiā tempore lōgiore. Propterea aut quod uir magis delectatur, secernitur ipsi de repētē ab humido, fortioriurbatione ac agitatione quā mulieri. Habet aut & hæc res hoc modo. Mulieres si cum uiris coeant, magis sanæ sunt: si nō, minus. Nam & uteri simul humidi fiunt in cōmixtione: qui enim sicci sunt magis quā conuenit, fortiter cōtrahuntur; ubi uero fortiter cōtrahuntur, dolorem corpori afferūt: & simul coitus sanguinem cālfaciens ac humectans, uiam faciliore mensibus facit. Mensibus autem non procedentibus, corpora scēminarū morbosa fiunt. Quapropter autē morbosa fiāt; in muliebribus morbis referetur. Et de his quidē hæctenus. Postquā autem coiuit mulier, si quidem conceptura nō est intra seipsam, pro more foras procedet genitura ab utrisque, ubi scēmina uolet. Si uero cōceptura est, nō procedit foras, sed manet in utero genitura. Nam uteri susceptam & cōclusam in sese continent, osculo nimirū ipsorū præ humiditate cōtracto ac concluso, simulque permiscentur, tum quæ à uiro uenit, tum quæ à muliere emissa est. Quod si scēmina partus perita sit; & cognouerit quādo genitura non exciderit, sed intus māserit, sciet qua die intra seipsam cōcepit. Habet aut & hoc sic. Quādoque quidē fortius est semē à muliere emissum, aliquando uero debilius. Similiter etiā quod uir emisit. Et est tum in uiro scēmineū itēque masculū semen, tū itidem in muliere. Fortior autē masculus scēmina est. necesse igitur est ipsum à fortiore semine generari, habetque res hoc modo. Si ab utrisque semē fortius pderit, masculus erit partus: si uero debile, scēmina nascetur. Vtrum autē multitudinē ac copiam præualuerit, iuxta illud ipsum partus nascetur. Si enim multo plus fuerit debilis seminis quā fortioris, superatur forte, & debili permixtū, in scēminā transit. Si uero plus fuerit fortis seminis quā debilis, superatur debile, & in marem transit. Quemadmodū si quis ceram & adipē misceat, & de adipē tamē plus coniiciat, eaque ad ignem liquefaciat, Quādiu quidē liquida fuerint, nō apparet utrū tandem horū superet, ubi uero cōgelata fuerint, tunc iam cōspiciūm est, quod adeps ceram copia exuperat. Sic habet etiā masculi ac scēminę genitura. Quod uero & in scēmina, & in uiro, genitura scēminea sit ac mascula, ex manifestis factis cōiectare licet. Multæ enim mulieres iam scēminas pepererūt ex proprijs uiris, uerū ad alios uiros transgressæ, masculos genuerunt. Et uiri illi ipsi apud quos mulieres scēminas pepererūt, ad aliarū mulierum mixturā progressi, masculos genuerūt. & quibus masculus sexus gignebatur, alijs scēminis permixti scēmineam sobolem genuerūt. Atque hæc sanē ratio declarat tum uirū, tum scēminā, & scēmineā, & masculam geniturā habere. Nam apud quos uiros, scēmi

nas pariebant, superabatur fortius semen à copia debilioris, & gignebatur fœ-
 mellæ. Apud quos uero masculos pariebāt, superabatur debilius, & gigneban-
 100 tur mares. procedit autē nō semper ab eodē uiro genitura fortis, sed neq̃ semper
 debilis, sed aliàs alia, atq̃ sic etiam in muliere res habet, ut minime mirandū sit,
 easdem fœminas, eosdēq̃ uiros, sobolem masculā & fœmineā producere. Ha-
 bet autē & in brutis genituræ fœmineæ ac masculæ ratio eodē modo. Et in ipsa
 genitura egreditur & fœmineū, & masculinū, ab omni corpore, & à debilibus
 110 debilis, & à fortibus fortis: et necesse est sic in partū distribui. Et ex quacūq̃ cor-
 poris uiroi parte plus prodierit in geniturā, q̃ mulieris, partus ille magis similis
 erit patri. Vnde cūq̃ uero à corpore mulieris plus uenerit, magis asimilabitur
 matri. Est autē impossibile, partū per omnia matri similē esse, & patri nihil: aut
 uice uersa, neq̃ alteri quicquā similem esse: sed utriq̃ necesse est in aliquo simi-
 115 lem esse, siquidē ab utriq̃ corporibus semen in partum procedit. Vter autem
 tandem plus contulerit ad similitudinē, & à pluribus corporis regionibus, illi
 magis similis est. Cōtingitq̃ aliquādo ut filia nata maiori ex parte, magis simi-
 lis sit patri quā matri, & filius natus aliquādo magis similis est matri q̃ patri.
 Atq̃ hæc tam multa à me relata declarāt superiore sermonē, Quod & in mulie-
 120 re, & in uiro, tum mascula, tum fœminea genitura existat. Cōtingit autē & hoc.
 Quādoq̃ partus tenues & debiles generātur, ex patre & matre crassis ac robu-
 stis: & si quidē multis iam generatis pueris tale quid cōtingat, manifestū est q̃
 fœtus in utero ægrotauit, & ab utero quid de suo ipsius incremento foras pro-
 diuit, utero nimirū amplius hiāte: & propterea debilis factus est. Vnūquodq̃
 125 autem animal iuxta propriū robur ægrotat. Si uero omnes pueri nati debiles
 fuerint, uteri ipsi in causā sunt, angustiores q̃ oportet existētes. Si enim nō ha-
 buerint spatiositatē, in qua fœtus nutriri possit, necesse est ipsum tenuem fieri,
 utpote qui nō habeat satis amplū locū ad incrementū capiendum. Si uero ha-
 beat satis amplū locū, & non ægrotet, uerisimile est ex magnis parētibus ma-
 130 gnam sobolem generari. Habet autē res hoc modo, Quemadmodū si quis cu-
 cumerē qui iam defloruit, sit autē adhuc tenellus, & in cucumerario adhuc ad-
 hæreat, ponat ac immittat in uas angustū, æqualis ac similis euadet cavitati ip-
 sius uasis. Si uero quis eundē in uas amplū indet, quod uerisimile sit cucumeris
 capax esse, sed nō ualde multo maius q̃ pro cucumeris natura, æqualis itidem
 ac similis erit cucumis uasis ampli cavitati. Nam in augescendo cum uasis cavi-
 135 tate contendit, & fermē omnia nascētia sic habent, quo modo quis ipsa cogat.
 Sic sanē & in puero se res habet. Si enim spatiositas ipsi cōtingerit in augescen-
 do, maior euadet: si uero angustia, minor. At uero mutilum in utero puerū, sen-
 tio aut cōtusum ex matris uterū gestantis plaga, aut eiusdē lapsu, aut alio quo-
 140 piam uiolento affectu matri accidente, mutilatum esse. Qua uero parte mater
 plagas acceperit, ea puer mutilatur. Si uero amplius contundatur fœtus, ita ut
 pellicula ipsum cōtinens rumpatur, perditur fœtus. Quin & alia huiusmodi
 causā pueri mutilātur. Quum in utero iuxta locū in quo mutilatus est fœtus,
 145 angustia fuerit, necesse est corpus quod in angustia mouetur mutilari, iuxta il-
 lum locum. Quemadmodū etiam arbores quacūq̃ in terra sunt, & nō habent
 satis amplū locum, uerū à lapide, aut aliqua alia re impediuntur, quum emer-
 gunt obliquæ ac tortuosæ sunt, aut hac parte crassæ, altera tenues. Sic accidit
 etiam

etiam circa puerum, si in utero iuxta aliquam corporis partem, angustior altera uteri pars altera fuerit. Cæterum quòd ex mutilatis hominibus sani & integri gignantur pueri, ut plurimum contingere solet. Habet enim mutilatum, numero omnia quæ sanū. Vbi uero morbus aliquis ipsis, & humido ipsorum acciderit, à quo semen prouenit (quatuor sanè quum species sint humidi, quæ naturaliter in corpore existunt) geniturā non totam exhibēt, debiliorem autem, iuxta mutilatam partem. Quare nihil miri mihi uidetur, si etiam mutilentur, quemadmodum parens. Et hæc mihi de hoc dicta sufficiāt. Redibo autem rursus retrò ad sermonem quem dicere reliqui.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE NATURA PVERI SIVE FOETVS, IANO CORNARIO Medico Physico interprete.

Et de hoc Galenus dubitat Hippocratis ne an Polybysit.



I genitura ab utriusque permanferit in utero mulieris, primum quidem simul miscetur, utpote muliere non quiescente, coæceruaturque ac crassa per calorem euadit. Deinde spiritum concipit, nempe in calido existens, & postea matre spirante. Deinde ubi spiritu repleta fuerit, uiam hic ipse sibi ipsi foras facit, & per mediam genituram spiritus erumpit. Quum autem spiritui calido uia foras facta est, rursus alius frigidus à matre inspirat, atque hoc facit per omne tempus. Calescit enim utpote in calido existens, & frigidum spiritum concipit à matre spirante. Omnia autem quæ calescunt spiritum habent. Spiritus autem erumpit & sibi ipsi uiam facit, ac foras procedit. Id autem quòd calescit rursus in seipsum aliū spiritum frigidum trahit, per fissuram unde nutritur. Atque hoc contingit etiam in lignis, & in folijs, cibisque ac potibus, si fortiter calefiant. Eius rei notionem ligna ardentia exhibent: omnia enim ligna hoc faciunt, maxime uero subuiridia. Emittunt enim spiritum iuxta sectionem. Spiritus autem quum foras procedit, circum caesuram uolutatur, id quod semper fieri uidemus. Manifesta igitur est ratiocinatio de spiritu, quod calidus existens in ligno, attrahit alterum frigidum à quo nutritur, & à seipso dimittit. Nam si non alterum pro eo quem à se dimittit attraheret, non uoluntaretur spiritus foras prodiens. Omne enim calidum frigido moderato nutritur. Et ubi per calfactum fuerit humidum quod est in ligno, in spiritum mutatum foras procedit, & qua parte foras exit, ea ipsa calidus qui inest adhuc in ligno, alterum frigidum spiritum eius loco attrahit, à quo nutritur. Idem faciunt & folia uiridia. Quum enim inceduntur spiritum concipiunt, deinde erumpit spiritus & uiam facit, forasque prodit & circumuolutatur, procedens autem strepitum facit, qua parte inspirationem præbet. Quin & legumina & frumenta, & arborei fructus nuncum generis calefacta spiritum habent, qui fissura facta foras prodit, & si humida fuerint, ampliorem spiritum emittunt, & rimam maiorem faciunt. Et quid multis uerbis opus est? Omnia quaecumque calefiunt, spiritum emittunt, & aliū frigidum uicissim eius loco attrahunt, à quo nutrimentum sumunt.

30 Atq; hæc necessitates ea gratia à me productæ sunt, ut cognoscatur quòd genitura in utero calfacta spiritum habet, & emittit. Simul autè & à matre spirante, genitura spiritum habet. Quum enim mater frigidum attraxerit ex aere in seipsam, fruitur eo etiam genitura. Calida autem est, utpote in calido existens, & tunc sanè spiritum habet, ac emittit, atq; ipsa genitura inflata pelliculam acquirit. Circū tenditur enim quod forinsecus circum ipsam est, continuumq; euadit, utpote viscosum existens. Quemadmodum in pane dum torretur, tenue quiddam pelliculæ specie in superficiem abscedit ac extat. Calescens enim panis & inflatus eleuatur, qua parte uero inflatur, isthic pelliculæ species excitatur et cōsistit. Genituræ autè calfactæ ac inflatæ ex toto, pellicula forinsecus circū datur. Verum iuxta medium genituræ, spiritui transitus extra ac intrò fit per pelliculā, & hac parte tenuitas pelliculæ à genitura distat, & paucissimū quid de genitura inest. Ipsa autè reliqua genitura rotunda est in pellicula. Atqui geniturā quæ sex diebus in utero manlit, & foras prolapsa est, ipse uidi, & qualis tū animo meo obseruabatur, ex illis ipsis reliquorū coniecturam facio. Ut uero ego uiderim genituram sex dierum existentē enarrabo. Mulieris nobis familiaris famula cantrix magnæ existimationis ex uiroꝝ cōsuetudine erat, quam in uentre concipere nō cōueniebat, ut ne minoris existimationis redderetur. Audierat autem cantrix ipsa, qualia mulieres inter se dicunt, quòd quando mulier cōceptura est in uentre, genitura non egreditur, sed intus manet. Auditis autem his atq; intellectis, hoc semper obseruauit, & quum quādoq; sentiret genituram non exeuntem, dominæ exposuit, & sermo statim ad me peruenit. Ego uero quum audissem, iussi ipsam ad terram saltare, & postquam septies iam exsilisset, genitura in terram profluxit, & strepitus factus est, atq; illa conspecta ipsa ammirata est. Qualis autem erat ego referam: uelut si quis ouo crudo externam testam circum circa adimat, in interna uero pellicula inclusus liquor pellucescat. Modus quidem talis erat, & ut abunde dicam, ruber erat liquor & rotundus. In pellicula uero fibræ quædam albæ ac crassæ inesse uidebātur, cum cruore crasso & rubro obuolutæ: circum autè pelliculam foris cruenta uestigia instar sugillatorum; iuxta medium uero tenue quid eminebat, quod mihi umbilicus esse uidebatur, & per illum sanè spirationē extra & intrò primū facere apparebat: quin & pellicula genituram ambiens ac cōplectens, tota ex illo tendebatur. Talem sanè ego geniturā sex dierum existentē uidi. Referam autem & aliam dinotionem, omni cupienti de hoc scire, qui mihi paulo post hanc manifeste apparuit, & testimonio esse potest omni meo sermoni, quòd uerus est, quantum homini de huiusmodi re dicere datur. Atq; hæc mihi de hoc dicta sunt. Quòd genitura in pellicula est, & spiritum habet intrò & foras, & augetur à matre sanguine in uterum descendente. Menfes enim nō prodeunt, ubi mulier cōceperit intra seipsam, si puer sanus fuerit, & permanere debet, nisi in quibusdam primo mense modicam sui indicationē faciant. Verū sanguis à toto corpore mulieris descendens, in orbem forinsecus pelliculā circūstat. Simulq; cum spiritu sanguis intra per pelliculam trahitur, qua parte perforata est, & à genitura distat, cōgelaturq; & futuro animali augmentū præbet. Quū autem tempus accesserit, rursus aliæ pelliculæ intra primam pelliculam tenues & multæ circūtenduntur, eo modo quo prima pellicula facta fuit. Sunt autè & hæc ab umbilico extenæ, & inter se

mutua

mutua ligamenta habent. Quū uero iam hoc factum est, ex descēdente à matre sanguine & cōgelato, caro fit. Iuxta mediam autē carnem umbilicus distat, per quem spirat, & alimentū ac incrementum capit. At uero mulier quum uterum gerit, à mensibus nō prodeuntibus propterea nō dolet, quōd sanguis non conturbatur, acruatim abire solitus singulis mēsis, sed procedit sensim & modice citra dolorem, quotidie in uterū ipsum, & quod inest intus in utero augescit. Singulis autē diebus ea gratia procedit, & nō semel per mensem, quōd generitura in utero existens semper à corpore trahit, prout uires, tum ipsa, tum spiratio habet. Et primum quidem modica spiratio fit, & sanguis modicus à matre procedit. Quum uero spiratio amplior redditur, magis sanguinē trahit, & uberior is in uterum descendit. Atqui uterum nō gestantibus, ubi menses non prodierint, propterea dolor oboritur. Primum quidem sanguis in corpore singulis mensibus turbatur ab huiusmodi necessitate, quōd mensis à mense multum differt, & secundum frigiditatē, & caliditatem. atq; hoc percipit mulieris corpus, humidius enim est quā uirile. Vbi aut turbatus est sanguis, & uenas impleuit, ab ipso descendit, qualis ab initio naturæ fuit. Quare si quidem euacuatur à sanguine mulier, in uentre cōcipit. si uero repleta fuerit, non. Nam uacuis uteris, & uenis à sanguine factis, mulieres in se fœtus concipiunt. Etenim post menstrui sanguinis purgationē mulieres in uentre cōcipiunt. Causa iam dicta est. Quando autem conturbatus & secretus sanguis foras non procedit, sed in uteros, uteri autem nō hiauerint, tunc sanè à sanguine diutius immorante uteri calefcentes, reliquo corpori calorē transmittunt, quādoq; etiā sanguinem in uenas corporis distribuunt, ut & uenæ repletæ doleant, & tumores laxos producant. Quandoq; etiā periculū est ne claudicatio ex hoc inducatur. Aliquando & uesicam obsident, premūtq; ac claudunt uesicam, & urinæ stillitium inducunt. Aliquādo pleni quoq; sanguinis existentes uteri procidunt, aut ad coxēdices, aut lūbos, & dolorem exhibēt. Aliquādo ubi sanguis quinque aut sex menses in uteris moram traxit, putrefactus pus fit, & quibuscūq; pus per pudendum exit. Sunt etiā quibus circa inguen uelut tuberculū fit, illicq; suppuratum exit. Sed & alia multa huiusmodi mala mulieribus fiunt, ubi lunares purgationes non procedunt. Sed quid opus est ea hic recensere? Referentur enim in muliebribus morbis. Verum iam repetito eo quod reliqui, sermonem absoluiam. Quum autē generatur caro, tunc pelliculæ augescēte in utero sanguine, etiā ipsæ augentur ac sinuantur, et præsertim externæ. Et sanguis à matre descendens, quem sanè caro spirans attraxerit, in incrementū cedit, & si utilis non sit, in sinus pellicularū secernitur: & ubi sinuatæ factæ fuerint, ac sanguinem susceperint, tunc iam secunda appellatur. Et tantū de hoc mihi dictum sit. Cæterum caro augescens à spiritu articulatur, & abit in hac unūquodq; simile ad simile, densum ad densum, rarum ab rarum, humidū ad humidum, & unūquodq; in propriā regionē abit, iuxta cognationē, ad id à quo genitū est. et quæcūq; à densis genita sunt, dēsa sunt: et quæcūq; ab humidis, humida: et reliqua iuxta eandē rationē fiūt in incremēto. Et ossa durescūt à calore cōglutinata. Et sanè ramificātur uelut arbor, & tū interna, tum externa corporis, adhuc melius articulatur: Ipsumq; caput distantia acquirat ab humeris, et brachia ac cubiti à lateribus: et crura inter se disparatur: & nerui exiliūt circū naturas articularū:

720 & os per se diducitur, & nasus, & aures eminent in carne, ac perforatur. & oculi implentur humore puro, & pudentum conspicuū fit utrum tandem sit: & uiscera coarticulatur: & iam etiam supernis partibus spirationem facit, tum ore, tum naribus: & uenter inflatur, & intestina inflata supernè, per umbilicū spiritum assument, ac disperdunt: & in podicē uia fit à uentre ac intestinis foras, & in uescicā uia foras. Atq; hæc omnia à spiritu coarticulantur, Nam inflata disparantur omnia, iuxta cognationē. Etenim si uelis fistulam uescicæ alligare, & per fistulam inmittere in uescicā, terram & harenani, & plumbi tenuia ramenta, in superq; infusa aqua in fistulam inflare, primū quidem illa aquæ permiscetur, deinde uero temporis progressu inflata secedet, & abibit plumbum ad plumbum, harena ad harenā, terra ad terram. Et si quis ipsa arefieri permittat, & diffracta uescica cōtempletur, inueniet simile ad simile progressum esse. Sic sanè etiam genitura & caro coarticulatur, & unūquodq; in ipsa simile ad simile abit. Atq; hæc mihi de hoc dicta sunt, & factus iam est puer, & ad hoc peruenit foemella quidē in quadraginta & duobus diebus ut longissime, primā coagmentationē ac coarticulationē accipiēs. Masculus uero ut longissimè, in triginta diebus. Ut plurimū enim hoc tēpore, aut paulo breuiore, aut paulo longiore, articulationi ipsis cōtingit. Nam & purgatio fit à partu ut plurimū, in foemellis quidē, diebus quadraginta & duobus: atq; hæc tardissima est, & perfecta. Vacauerit autem periculo, etiā si in uiginti quinque diebus purgetur. In masculo uero purgatio fit diebus triginta: atq; hæc tardissima est, & perfecta. Citra tamē periculū fuerit, etiā si in uiginti diebus mulier purgetur. Postremo autem tēpore purgatio q; paucissima procedit, & in iuniorib; paucioribus diebus purgantur, in senioribus uero pluribus. Cæterū maxime laborāt ac dolent in partu, & partus purgationibus mulieres primiparæ, & quæ rarius pariunt magis dolent, quàm quæ sæpius. Atqui purgationes à partu mulieribus ea gratia fiūt, quod primo tēpore usq; ad dies quadraginta duos in foemella, in masculo uero ad dies triginta, paucissimus sanguis in augmentum pueri descendit. Ab hoc autem tempore copiosior, donec pariat. Oportet itaq; purgationē reddi in toto puerperij tempore, & foras exire ac respondere pro dierum ratione ac proportionē. Principium autem huiusmodi purgationis tale mulieri fit. Dum ex partu laborat, conturbatur sanguis mulieri, & à forti pueri motu uehementer calefcit. Conturbatus autē, primus quidē foras prodit. Deinde puer, post puerū uero, mucus crassus sanguinolentus, & deductio cōtingit huic, quemadmodū aquæ effusæ in mēsa. Postea post illum per omnes dies purgatio procedit, usq; ad prædictū tēpus, copia atticæ heminae unius & dimidiæ primū, aut paulo plus minus uel, pro eius tēporis ratione, donec desinat. Procedit autē sanguis uelut à uiscina, si sana est, & sana futura est mulier, & statim cōgelatur. Si uero mulier sana nō est, neq; sana futura est, purgatio paucior procedit, et specie deterior, & non cito cōgelatur. Id uero hoc modo habet. Si mulier uterū gestans morbū habuerit nō cognatū, in puerperij purgatione perit. Si uero nō purgetur in priorib; diebus uterū gerens, statim sana existens, aut etiā non, cōmouetur aut ipsa purgatio siue à pharmacis, siue sua spōte de repēte, iuxta dierū rationē procedet, quibus nō una uice, pcedit. Si enim nō purgetur mulier à purgationib; partus, morbus magnus ipsam corripit, & periculū uitæ incurret, nisi cito curetur, et quis conue

conuenientē ipsi purgationē inducat. Hæc propterea produxi ut ostenderem quod in pueris membrorū discretio longissima cōtingit, in foemella in quadraginta duobus diebus, in masculo in triginta. Argumento est purgatio à partu, quæ in foemella fit in quadraginta duobus diebus, in masculo in triginta, ut tardissime cōtingat. Repetam autē iterum eandem rem iisdem uerbis, maioris lucis ac declarationis gratia. Dico enim rationē rependi, quod genitura in utero existenti paucissimus sanguis à matre in uterū uenit, si foemineam geniturā habeat, in quadraginta duobus diebus, in his enim coarticulantur puerorū membra: ab hoc uero tēpore copiosior sanguis uenit. Et in masculo rursus iuxta rationem dierum triginta. Quod uero hæc uera sint, etiam alterum testimonium adest, hoc modo habens. Primis diebus ubi genitura in uteros illapsa est, paucissimus sanguis à muliere in uteros uenit, deinde copiosior. Si em̄ aceruatim & multus semel ueniret, genitura spirationem habere nō posset, sed sanguine multo accedente suffocaretur: Repēditur autem in purgatione uice uersa, purgatio enim puerperij in primis diebus plurima procedit, deinde paucior, donec desinat. Multæ autē mulieres puerum masculū iam perdiderunt paulo ante trigessimū diem, & inarticulatus apparuit. Qui uero posterius perditū sunt, aut simul cū trigesimo die, omnes articulati apparuerunt. In foemella itidē iuxta rationem quadraginta duorū dierum habet, Nam ubi his absolutis perditur, articulatio membrorū apparet. Siue autē prius siue posterius perdetur puer, iuxta hanc rationē apparet. Nam & secundū rationē, & necessitatē, articulatio cōtingit in foemella, in diebus quadraginta duobus, in masculo, in triginta. Testimonium enim præbent abortus puerorū, & à partu purgationes. Quod autē foemella posterius cōformatur ac coarticulatur, causā hæc est: quod genitura foeminea debilior est ac humidior q̄ mascula, & iuxta hanc rationē necesse est posterius cōformari foemellam q̄ masculum, atq; ea gratia etiam purgatio diuturnior est in foemella quàm masculo. Redibo autem rursus retrō undē digressus sum. Postquā iam articulatus fuerit puer, speciebus membrorū ipsius augescētibz, tunc & ossa duriora fiunt, & cauantur, atq; hæc à spiritu fiunt. Caua autem existentia trahunt ad sese à carnibus quod in sanguine est pinguisimum: & progressu temporis ramificantur rursus extremitates ossium, quemadmodum arboris extremitates postremū ramos spargunt, sic & in puero digiti manuum ac pedum inter se disparantur. In ipsis autem extremitatibus ungues enascuntur. Desinūt autem uenæ hominis omnes in digitos manuum ac pedum. Et crassissimæ quidem sunt uenæ totius corporis, uenæ capitis, deinde crurum, & brachiorum ac cubitorū. In pedibus autem & manibus, tenuissimæ ac densissimæ & plurimæ uenæ sunt. Nerui item tenuissimi ac densissimi & plurimi, & ossa magnitudine minima, atq; hæc maxime in digitis manuum ac pedum existunt. Verum ex digitis, utpote ossa densa ac parua habentibus, uenas itidē ac neruos, sic etiā ungues tenues ac densi nascūtur, & intercipiūt ac cōcludūt uenarū extremitates, ut ne amplius augescāt, neq; altera alteri præmineat: ut nihil miri sit ungues in extrema corporis parte densissimos esse, ex densissimis enim cōstant. Simul autē cū unguibz, etiā capilli in capite radicātur. Cæterū pilorū natura hoc modo se habet. Oriūtur equidē maximi ac plurimi, quæ corporis parte cuticula rarissima est, et ubi pilus moderatū humorē in alimentū habet

210 beret; & ubi cuticula posterius rara fit, ibi etiam pili posterius nascuntur, uelut in
 mento, & pube, & sic ubi alia pili nascuntur. Simul enim ut genitura prodit, etiam
 caro rarefcit, & cuticula & uenae aperiuntur magis quam priori tempore. Nam dum
 adhuc puer est, & uenae tenues existunt, non procedit per ipsas genitura, eadem
 215 ratio de mensibus uirginum est. Simul autem ut uia fit & geniturae, & mensibus uirgi-
 nibus, etiam pilos emittit pubes, tum pueri, tum uirginis, rara nimirum cuticula red-
 dita, simulque pilus moderatam humiditatem in alimentum habet, & non paucior.
 Sic uero & in mento uiri contingit. Rara enim fit cuticula, procedente in ipsam de
 capite humiditate. Simul enim & in coitu, simulque interiecto tempore, pilus mo-
 220 deratam humiditatem in alimentum habet, & tunc maxime, quum tempus con-
 tingit humiditati de capite descendenti in coitu, ad mentum a pectore distans. Si-
 gnum autem eius quod in rarissimis cuticulae partibus pili enascuntur: si quis
 uelit inurere cutem, & pustulam tantum facere, eamque sanare, cutis densa reddita
 per cicatricem pilos non producet. Quicumque uero Eunuchi dum pueri sunt sunt,
 225 propterea neque in pube, neque in mento pilos producant, leuesque toti existunt,
 quod uia geniturae non facta, cuticulam non rarefacit per totam superficiem. Inter-
 cepta est enim ac conclusa geniturae uia, quemadmodum paulo ante a me relat-
 est. At uero Mulieres leues fiunt, & mento, & corpore, quod in coitu ipsarum hu-
 miditas non similiter agitata uelut uiri, cuticulam raram non facit. Quicumque autem
 230 calui fiunt, hi sane pituitosi sunt, & pituita in capite ipsorum simul cum coitu agi-
 tata & calfacta, ad cuticulam allabens pilorum radices exurit, & defluunt pili. Ve-
 rum Eunuchi propterea calui non fiunt, quod uehementem motum non faciant,
 neque pituita in coitu calfacta pilorum radices exurit. Caeterum canes ob id fiunt
 quod longo tempore pertranseunte in homine humiditate, albidissimum eius se-
 235 cernitur, & ad cuticulam allabitur, & pilus albidiores humiditatem trahens
 albidior fit quam priori tempore, itemque ipsa cuticula, praesertim ubi canes sunt,
 albidior alia euadit. Et quicumque ex natiuitate canum quid in capite habent, et-
 240 tiam illis cuticula summa ubi canes sunt, reliqua albidior existit. Illic enim albidissi-
 ma est humiditas. Habet autem res hoc modo. Qualemcumque humiditatem ca-
 ro attraxerit, siue albam, siue rufam, seu nigram, tali colore etiam pilus inficitur.
 245 Atque haec de hoc dicta sunt. Redibo autem rursus ad sermonem relictum. Quum
 itaque extremitates corporis pueri foras ramos sparserint, & ungues ac pili ra-
 dices egerint, tunc iam etiam mouetur, & tempus ad hoc fit, masculo quidem
 menses tres, foemellae uero quatuor. Sic enim ut plurimum contingit. Sunt au-
 250 tem aliqui pueri qui ante hoc tempus mouentur. Mouetur autem primum masculus,
 quia fortior est quam foemella: & primum quoque conformatur masculus, nam a for-
 tiore & crassiore genitura fit. Quum autem mouetur foetus, tunc sane lac indica-
 tionem sui, matri praebet. Mammae enim attolluntur, & papillae gliscunt ac tur-
 gent. Lac uero non prodit: & in mulieribus densam carnem habentibus, lac poste-
 255 rius significatione de se praebet ac prodit, in rarum uero carnem habentibus, prius.
 Lac autem ob huiusmodi necessitatem fit. Quum uteri tumidi praeparati sunt, uen-
 trem mulieris comprimunt: eius autem pleni ubi compressio contigerit, pinguis-
 simum de cibis ac potibus foras profilit, in omentum ac carnem. Quemadmodum si quis
 corium illinat multo oleo, & imbibere permittat, & ubi imbibit, corium ipsum
 260 premat, oleum utique exilierit foras ex corio compresso. Sic etiam si uenter pingui-
 tudinem

tudinem in se habeat à cibus ac potibus, comprimaturq; ab uteris, pinguitudo
 profilit in omentū ac carnem. Et si raræ carnis mulier fuerit, citius percipit eius
 persultationem: si non, posterius. Quin & pēcora prægñatīa si nō agrotent, ab
 eodem potu ac cibo pinguiora propterea fiunt. Similiter autē & mulier. Et à pin-
 guitudine calfacta ac alba existente, quod edulcatū est à caliditate, quæ ab ute-
 ris accessit, expressum uenit in mammās, & in uteros quoq; parum uenit, per
 easdem uenas. Tendūt enim & in māmās & in uteros uenulæ hæ, & cōsimiles
 aliæ. Et ubi peruenerit in uteros de lacte, puer ipso paululum fruitur, Mammæ
 uero suscepto lacte impletæ attolluntur. Et ubi peperit mulier principio motus
 facto, lac in māmās ipsas procedit, si lactauerit. Sic enim res habet. Dum mama
 mæ lactant ac exuguntur, uenulæ in māmās ampliores fiunt, ampliores autem
 factæ, à uentre pinguitudinē trahentes, in māmās distribuunt. Nam & uir si
 multū coeat, uenæ ampliores redditæ, Venerem magis inducūt. Habet autem
 & hoc eō modo. Alimentū & augmentum puerorum fit, ubi ea quæ à matre ue-
 niunt, in uteros procefferint, & prout mater habet iuxta sanitatē aut debilita-
 tem, sic & puer habet. Quemadmodū etiam quæ in terra crescunt, à terra nu-
 triuntur, & prout terra habuerit, sic etiam nascētia in terra habent. Etenim se-
 men ubi deiectū fuerit in terram, humiditate quadam ab ipsa impletur. Habet
 enim in se terra ominigenū humorem, ut nascētia nutrire possit: impletū autem
 humore semen, inflatur & intumescit, & uis quæ in semine leuissimā est, ab hu-
 more condensari cogitur, condensata autē à spiritu uis, & humore folia produ-
 cente, semen rumpit, & primū folia foras emergunt. Vbi uero emerferint, quū
 non amplius ab humore in semine existente folia nutriri possint, rumpitur in-
 ferne semen, itemq; folia, & semeni à folijs coactū, uim suam ad inferna demit-
 tit, quæ uidelicet in ipso restat propter grauitatem, & fiunt radices ex folijs dis-
 tentæ. Postquā autem planta iam firmiter radices inferne egerit, & alimentum
 à terra sumit, tunc sanè totum euanescit, & in plantam cōsumitur, præter corti-
 cem, qui solidissimus existit. Rursus autē cortex in terra putrefactus progres-
 su temporis euanius fit, & quædā folia ramos producūt. Ex semine itaq; tanq̃
 ex humido nata planta, donec quidem tenera & aquosa fuerit, in augmentum
 superne ac inferne procedens, fructū excludere non potest. Non enim uim ha-
 bet fortem ac pinguem, ex qua semen condensari queat. Vbi uero solidior fa-
 cta est, & progressu temporis radices egerit, tunc iam & uenas habet amplas;
 tum ad supernam, tum ad infernam partem: & tunc sanè nō amplius aquosum
 ex terra trahit alimentū, sed crassius & pinguius ac copiosius, quod calfactum
 à sole efferuescit in extremitates, & fit fructus iuxta cognationē, ex qualī etiam
 generatus est. Multus autē ex modico propterea fit, quòd singula ex terra na-
 scentia maiorem uim ex terra, q̃ ex eo unde generata sunt, trahunt, & efferue-
 scunt non secundū unum, sed secundum multa. Quū autem fructus prodierit,
 à planta sua nutritur. Planta enim à terra trahens, fructui trāsmittit. Sol autem
 fructum coquit, & solidū facit, quod aquosius in ipso est, ad sese trahens. Atq;
 hæc mihi dicta sunt de his quæ ex semine nascūtur à terra & aqua. Cæterum ex
 plantarijs ab arboribus arbores fiūt, hoc modo. Ramus uulnus habet, qua par-
 te ab arbore defractus est, in infima ad terrā parte, unde radices prodeunt. Pari-
 gitur autem, & in terrā demittitur, hoc modo. Quum planta quæ in terra exis-
 tit

ſcit, humorē acceperit à terra, tumefcit & ſpiritū habet, quæ uero pars ſupra ter-
 ram eminet, nondum. Spiritus autē & humor cōdenſans in inferna plantæ par-
 te uim, quātum eius grauiſſimū eſt, in infernam partē erūpit, & ex ipſo radices
 teneræ fiunt. Poſtq̃ autē in infernam partem receptus fuerit, tūc iam ex radice
 humorē trahit, & parti ſupra terrā emineti trāſmittit: & tunc ſanè rurfus ſuper
 na pars intumefcit, ac ſpiritū habet, & quantū ex ui in plāta leue ineſt, idipſum
 congregatū germinat, ac folia producit, & iam in ſupernā partem augmentum
 facit, itēq̃ in infernam. Sic itaq̃ contrariū contingit circa germinationē, in his
 quæ ex ſemine, & in his quæ ex plantarijs proueniūt. Ex ſemine enim prius fo-
 lium emergit, deinde radices in infernam partem demittūtur. Verū arbor pri-
 mū radices agit, deinde folia acquirit, propterea q̃ in ſemine ipſo humoris co-
 pia ineſt, & in terra quū totum inſit, alimentū ineſt primū folio ſufficiens, unde
 foliū nutritur donec radicetur. Verū in ramo non ſic fit. Non enim gignitur ex
 altero, unde folium primum alimentū habeat, ſed ipſe ramus eſt, & uelut arbor
 habet, & multa eius pars ſupra terrā eminet. Quare quū ſupra terrā exiſtat, hu-
 more impleri non poteſt, niſi ex inferna parte magna quædā uis procedens, in
 ſupernā humorem diſtribuat. Et plantariū primo neceſſe eſt ſibi ipſi alimētum
 ſufficere à terra in radices, deinde ubi ſic à terra attraxit, ſurſum diſtribuere, &
 folia ad germen & augmentū concitare. Quū autem augmētum cepit planta, à
 tali neceſſitate ramos ſpargit, quam referam. Quū plus humoris ipſi acceſſerit
 ex terra attracti, erūpit præ multitudine, quā parte q̃ plurimus fuerit, et hac par-
 te plāta ramos emittit, augetur autē & in amplitudinē, & in ſupernā, & in infer-
 nam partē, propterea q̃ inferna terræ pars hyeme quidem calida eſt, æſtate au-
 tem frigida. Atq̃ hoc propterea cōtingit, q̃ terra humida eſt in hyeme, præ æ-
 qua de cœlo delabente, & cōprimitur in ſeiſſam, utpote humore grauiore exi-
 ſtente: denſior autē ab hoc ipſo eſt, & nullam tranſpirationē habet. Non enim
 amplius magna raritas ipſi ineſt: & propter hoc inferna terræ pars hyeme cali-
 da eſt. Nam & ſimū denſius accumulātū, intus calidius eſt, q̃ quod rarū exiſtit,
 & aliàs humecta ac cōpreſſa, à ſeiſſis cōcaleſcunt, & breui à calore ualde exuſta
 putreſcūt, neq̃ enim permeat ſpiritus per ipſa, nimirū quum denſa exiſtunt. Si
 uero ſicca fuerint, ac rarè poſita, multominus caleſcūt ac putreſcūt. Atq̃ ſic ſanè
 frumentum ac hordeum humidū ac madefactum, intus calidius eſt, q̃ ſi ſiccum
 ſit, & rarè poſitum. Et uestes pelliceæ colligatæ ac fortiter cōpactæ, à ſeiſſis cō-
 buruntur, uelut ego uidi, quemadmodū ab igne exuſtæ. Sed & alia ſi quis uelit
 conſiderare, Omnia quæ comprimūtur à ſeiſſis, calidiora reperiet, quàm quæ
 rarè poſita ſunt. Nō enim habent unde frigiditatē inſpirent à uentis. Sic etiam
 inferna terræ pars quū plena ſit, & ipſa à ſeiſſa cōprimatur, nimirum grauis ac
 denſa exiſtens, ab humiditate in hyeme caleſcit, nullam enim caliditatis perſpi-
 rationem habet. Sed ubi de cœlo aqua cadit in ipſam, quum ſpiritus prodierit
 ab ipſa in terra, non ulterius penetrat, utpote terra denſa exiſtente, ſed ſpiritus
 retrò ad aquā abit: et propterea fontes ac marinæ aquæ, hyeme calidiores ſunt,
 & auctiores q̃ æſtate, quia ſpiritus dum exhalat, retrò abit ad aquam, quū ter-
 ra denſior exiſtat, & per ſe ſpiritū non tranſmittat. Et aqua multa exiſtens quæ
 cōtigerit, ea perrumpens procedit, & uiam ſibi ipſi ampliorē facit q̃ ſi modica
 exiſtat. Aqua enim in terra nō conſiſtit, ſed ſemper in decliue procedit. Si autē
 ſpiritum

spiritum ab aqua prodeuntē terra per se hyeme trāsmittat, paucior aqua ex ipsa procederet, & fontes hyeme magni non essent. Atq; hæc omnia in hoc dicta à me sunt, quod terræ inferna pars calidior esse apparet hyeme, q̃ æstate. Nunc autē dicere uolo, q̃ æstate frigidior q̃ hyeme, inferna terræ pars esse uidetur. Terra æstate rara est & leuis, nimirum sole uehemētius irruente, & ab ipsa humiditates ad sese attrahēte. Habet autem terra in se semper aquam plus aut minus. Spiritus autem omnes nobis sunt ab aqua. Id quod sic se habere, unde coniectare possis demonstrabo. Etenim ab omnibus fluminibus ac nebulis spiritus semper procedunt. Est autē nebula aqua in aere cohærens & continua. Et tunc sanè terra rara est ac leuis æstate, & aqua in se habet, & aqua in decliue fluit, procedente autem aqua, semper inde alius ex alio spiritus exhalat. Qui uero exhalat, per terrā abit leuem ac raram existentē, & frigiditatem terræ inducit, & ipsa aqua simul perfrigeratur. Habet autē sic, Quemadmodū si quis aquam in utre existentem fortiter cōprimat, & per puncturam acus, uel paulo maiorem, perspirationem aquæ faciat, & ipsum utrem in sublimi suspendat, nullus spiritus per foramen procedat, sed aqua, non enim habet spatiositatem per quam aqua spiritum emittat. Sic sanè se habet etiam hyeme aqua in terra. Si autem aquæ in utre locum satis amplum feceris, & utrem in sublimi suspēderis, spiritus per foramen procedet. Locū enim spiritus habet ab aqua mota, procedendi per utrem, & propterea per foramen spiritus trāsit. Sic sanè se habet etiam æstate aqua in terra. Satis amplū enim locum habet, nimirū terra rara existente, & sole ab ipsa humorē ad se trahente, & pertransit spiritus, utpote qui frigidus existit, ab aqua per ipsam raram existentē ac leuē. Ob hoc itaq; inferna ipsius pars æstate frigida existit, & aqua ipsa adhuc magis q̃ spiritus, qui in terra frigidus existit, & ipsa in seipsam, & in terram, spiritū emittit. Sed & aqua quæ hauritur in puteo spiritū semper mouet, uelut flabellū, atq; hoc ipsum aquæ frigiditatē inducit. Quæ uero nō hauritur æstatē, sed stans densa existit, nō similiter spiritū in se à terra suscipit, neq; in terrā à seipsa distribuit, & simul à sole, & aere in puteo non disperso, sed stante ac firmato, primum superficies ipsius calefit, deinde alia eius pars ad aliam deorsum caliditatē distribuit, & propterea aqua quæ æstate nō hauritur, calidior est ea quæ hauritur. Quin & fontes ualde profundi æstate semper frigidi existūt: & aqua hausta hyeme, terra calida existente, ex tali fonte, statim quidem calida est, ubi uero tempus progressum fuerit, frigida est ab aere uidelicet frigiditate existente talis facta. Perflatur enim à uento, & spiritus per ipsam pertrāsit. Quemadmodū etiā aqua quæ æstate hauritur, ubi hausta fuerit, statim frigida est, calida autē fit postea, propterea quod terra rara existente, & spiritu in ipsa existēte, perfrigeratur: Vbi autē hausta tempus accesserit, stabilis fit, & calida cōspicitur. Calefit enim ab aere calido existente, quem admodum & aqua quæ nō hauritur in puteo æstate, ob hoc ipsum calida redditur. Atq; hæc à me de hoc dicta sunt. Repetam autē rursus q̃ æstate inferna terræ pars frigida est, hyeme uero calida: Superna autē uice uersa. Et oportet arbori non duo calida simul accedere, neq; duo frigida simul, si sana esse debet. Verū si quidem ex superna caliditas accesserit, ex inferna frigiditatē ipsi accedere oportet, & uice uersa, si ex superna parte accedat frigiditas, ex inferna caliditatē ipsi contingere oportet. Et radices ubi attraxerint, arbori transmittūt, & arbor

uicissim radicibus. atq; sic & frigidi & calidi cōseruatio cōtingit. Quemadmodum homini ingestis cibis in uentrē, qui dum cōcoquuntur calfaciūt, perfrigerationem à potu facere oportet. Sic & arbori contrariū rependi oportet, ex inferna parte ad supernā, & uicissim, & augetur arbor & in supernam, & in infernam partē, propterea q̃ alimentum ex inferna & superna ipsi accedit. Et quantum diu quidem uehementer tenera fuerit arbor, fructum nō producit. Nō enim est in ipsa pinguis uis, neq; crassa, quæ ad fructū conferre possit. Progressu autem temporis uenæ in ipsa dilatata, pingue ac crassam influxionē ex terra in ipsam faciunt, sol autem ipsam diffundens, ebullire facit utpote leuem existentē, in extremitates, & fructū producere. & tenuem quidem humiditatē à fructu sol auferit, crassam autē concoquens & calfaciēs edulcat. At uero arbores nō fructiferae, in se pinguitudinē tantam non habent, quantum eius in fructū est expendendum. Omnis autē arbor quum per tempus solida facta fuerit, & ex inferna parte radices firmarit, iam penitus cōstanter augetur definit. Quicumq; uero in arbores, ab alijs arboribus oculos indiderunt, et arbores in arboribus enatae uiuunt, & fructificant nō similem fructū arboribus, quibus insitæ sunt, id ipsum tali modo cōtingit. Oculi primū quidem germinat. Alimentū enim habet primum ab arbore, ex qua ablatus est, deinde ab ea in quā insitus est. Vbi autē germinauerit, sic in arbore radices tenues à se demittit, & primū humore fruitur in arbore, in quā insitus est, existente, deinde tēpore accedente, demittit radices in terram, per eam in quā insitus est, & fruitur humore, quē à terra trahit, et alimentum inde ipsi cōtingit, ut nō mirū sit, insitas arbores, alios fructus producere. à terra enim uiuūt. Hæc mihi de arboribus & fructibus dicta sunt ea gratia, q̃ indignū mihi factū uidebatur, & ne poteram quidē, hanc tractationē semiperfectam relinquere. Redibo nūc rursus retrō ad illū sermonē, cuius gratia à me hæc de istis relata sunt. Cēleo enim terræ nascētia omnia uiuere ex terræ humore, & qualem terra humorē in seipsa habet, talem etiā nascētia ex ipsa habere. Sic etiā puer uiuit de matre in uteris, & quali mater sanitate prædita est, talem etiā puer habet. Qd̃ si quis cōsiderare uelit ea quæ de his dicta sunt, ab initio usq; in finē, inueniet naturā omnē consimilem esse, & ex terra nascentiū, et hominū. Et hæc mihi de hac dicta sunt. Cæterū puer in uteris existēs manus apud genas habet, caput autē prope pedes: & non datur probe ac certo cognoscere, etiam si puerū in utero uideas, utrum caput sursum habeat, an deorsum. Verum ex umbilico pelliculæ tentæ sunt ipsum cōtinentes. Nunc autē referam dinotionem, quam paulo ante me demonstraturum dixi, quantum humanæ menti possibile est manifestum existentē, omni qui de hoc cognosse uelit, q̃ genitura in pellicula est, & quod iuxta medium ipsius umbilicus est, & per illum sanē, primo spiritū in seipsam trahit, & foras emittit, & quod ex umbilico pelliculæ tentæ sunt. Sed & aliam pueri naturam, quam dixi, sic totam habere usq; in finē reperiet, quomodo uidelicet à me in his sermonibus declaratū est, si quis testimonijs, & oculari bus inspectionibus à me producendis uti uelit. Etenim si quis oua uiginti aut plura, quo pulli ex ipsis excudantur, gallinis duabus aut pluribus subicere uelit, & singulis diebus à secunda exordiando, usq; ad ultimā qua excudetur pulus ex ouo, subtrahere, confringere, ac uidere, inueniet omnia se habere iuxta meum sermonem, quomodo uolucris naturam, ad humanam cōferre oportet.

Quod

Quod em̄ pelliculæ ex umbilico tētæ sunt, et reliqua quæ de puero dicta sunt, sic se habere in ovo uolucris reperiēs, ab initio in finē. Atqui si quis nōdum uidit, mirabitur in uolucris ovo umbilicum inesse. Atq; hæc sic habēt, & sic à me relata sunt. Quando uero mulieri partus appropinquat, tūc puero se mouētē, & manibus ac pedibus calcitrante, pelliculam quandam internā rumpi contingit, rupta autem una, etiam aliæ debiliore uim habent, & rūpuntur primū quidem illi contiguæ & cohærētes, postea extrema. Quum autē ruptæ fuerint pelliculæ, tūc foetus à uinculo exoluitur, & agitatus foras procedit. Neq; enim amplius robur habet pelliculis amissis, neq; uteri amplius puerum continere possunt, pelliculis uelut dixi amissis, & ab ipsis abruptis. Cohærēt enim pelliculæ etiam uteris, ubi circum puerū obuoluuntur, nō adeo ui ualida ac multa. Quando autē procedit puer, uiolat & dilatat uteros in exitu, utpote teneros existentes. Procedit autem in caput, si secūdum naturam prodierit. Grauiissimæ enim sunt ipsi supernæ partes, si ex umbilico perpēdantur. Quum autē in uteris est, magis cōtinens existit usq; ad pellicularum rupturā simul cum decimo mense, quando partus matri propinquat, & adest. Si uero uiolentam affectionē perpetiatur puer, etiā ante præfinitū tēpus ruptis pelliculis prodit. Quin & si alimētū à matre prius puero defecerit, etiā sic partus matri prius aduenit, & ante decimum mensem puer prodit. Cæterū quæ longius q̄ decem mensium tempus uterū gestare sibi uisæ sunt: nam hoc iam sæpe audiui, illæ ipsæ hoc modo quē dicturus sum deceptæ sunt. Quum uteri spiritū acceperint in seipsos, à uentre flatum exhibente, eleuātur ac intumescūt, cōtingit enim hoc, Vidētur sanè sibi mulieres tunc cōcepisse. Præterea si menses non procedentes, congregati fuerint in utero, & diutius manserint, semper perfluunt in uteros, aliquando unā cum flatu à uentre, aliquādo etiam calefcētes, & sanè tūc quoq; in utero habere mulieres sibi uidētur, nimirū mēsisbus non prodeūtibz, & uteris eleuatis. Deinde aliquādo menses sua sponte erumpūt, aut alijs superueniētibus à corpore in uteros, & priores protrudentibus, & flatus egreditur, & multis iam statim post mensium purgationē uteri hiant, & ad pudendum uertūtur, & tunc uiris permixtę, ad se geniturā concipiūt, eadem die aut omnino in paucis. Existimāt autem inexpertæ harum rerū ac rationum, etiā illo tempore se in utero habuisse, quando menses nō prodibant ipsis, & uteri erant eleuati ac tumētes. Quod autem nō diutius q̄ decem mēsisbus contingat uterum gestare, ego demonstrabo. Alimentū & augmentū quod à matre descēdit, non amplius sufficiens est puero, ubi decē menses præterierint, & foetus auctus fuerit. Trahit enim quod dulcissimum est in sanguine ad sese, simulq; etiam lacte modice fruitur. Quum autem hæc ipsi rariora ac pauciora sint, & puer plenus ac maturus existat, copiosius alimentū desiderans calcitrat, ac pelliculas rumpens, initū partus matri inducit. & hoc perpetiuntur magis mulieres primiparæ: deficit enim pueris alimentum, ut ad decimum usq; mensem sufficere nō possit. deficit autem per hunc modum. Sunt quædam mulieres quibus sufficientes menses purgantur, quædam quibus pauciores: hoc ipsum si semper fiat, in natura, & genere, maternum ipsis existit. Quæ uero menses paucos demittūt, hæc etiā pueris postremo tempore, ubi iam maturi fuerint, alimētum rarius exhibentes, ipsos calcitrare faciunt, ut & ante decimū prodire festinēt. Modicus enim sanguis à iuuen-

culis ac nouellis matribus procedit : ut plurimum uero cōtingit tales mulieres etiam sine lacte esse, quæ paucos mēses demittunt. Sicciore enim sunt, & densiorem carnem habent. Huic autem rationi, quod uidelicet deficiente alimento prodit puer, etiam si nō aliqua uiolenta affectio ipsi accidat, etiam hoc testimonio esse potest. Volucris ex oui luteo nascitur, hoc modo. Incubante matre ouū calefcit, & quod in ouo inest à matre mouetur, calefcens autem id quod in ouo inest, spiritum habet, & alterum frigidū ab aere per ouū attrahit. Ouum enim adeo rarum est, ut spiritum qui attrahitur sufficientē ei quod intus est transmittat : & augetur uolucris in ouo, & coarticulatur modo eodem ac cōsimili uelut puer, quemadmodū iam antea à me relatū est. Nascitur autem ex luteo oui uolucris, alimentum uero & augmētum habet ex albo, quod in ouo est. atq; hoc iam omnibus manifestū factum est, qui animum aduerterunt. Vbi autem deficit alimentū pullo ex ouo, nō habens id sufficiens unde uiuat, fortiter mouetur in ouo uberius alimētum quærens, & pelliculæ circum dirūpuntur, & ubi mater sentit pullum uehementer motum, putamen ex calpēs ipsum excludit. atq; hæc fieri solent in uiginti diebus, & manifestū est quod ita se habent. Vbi enim excusa est uolucris, nullus humor in oui testis inest, qui sanè memorabilis existat, expensus est enim in pullū. Sic etiam ubi auctus fuerit puer, mater nō amplius sufficiens alimentū ipsi exhibere potest. Vberius itaq; præsentē alimentum puer quærens, calcitrando pelliculas dirūpit, & à uinculo exolutus simul foras prodit. atq; hæc ut longissime in decem mēsisibus fiunt. Et secundū hanc rationē etiam pecoribus ac feris partus aduenit, in tempore quo singula pariūt, non tardius. Etenim unicuiq; animali necesse est tempus esse, in quo alimētum fœtui rarius erit, & deficiet, et partus adest. Et quæ quidē paucius alimentū præbent, citius pariūt. Quæ uero uberius, posterius. Atq; hæc mihi de hoc dicta sunt. Porro diruptis pelliculis, si pueri momentū in caput inclinatū prædominabitur, uelut si pueri momentū in caput inclinatū prædominabitur, si autē obliquus, aut in pedes procedet : cōtingit enim hoc sæpe si momentū huc inclinarit, siue præ uterorum spaciositate, siue si mater in labore ex partu primū non quieuit : & si sic procedet, mulier difficulter pariet. Multæ aut uel ipsæ perierunt, uel puer, aut simul matres unā cum fœtibus. Cæterum ex parietibus ac puerperis maxime laborant primiparæ, propter inexperience dōlorum, & dolent quidem totū corpus, maxime uero lumbos ac coxēdices. Nam coxendices ipsarū disparantur. Verum expertæ iam partus, minus primiparis dolent. Quæ uero multoties pepererunt, multo minus dolent. Si porro in caput processerit puer, caput primū foras prodit, deinde alia mēbra consequuntur, postremus autē umbilicus. Ex umbilico autem secunda tenta est. Post hæc aquositas & mucus sanguinolentus tum à capite, tum à reliquo corpore secretus, præ uolentia & dolore ac calore, atq; hic uiam fruit purgationi à partu cōsequenti. Post exitum autē eius mucī crueti, purgatio fit per tēpus antea relatū. Et tum mammae, tum reliqua mēbra quæ humidiora sunt, mulieribus rūpuntur, minime quidem in primo partu, postea uero prout plures pariunt, ita amplius rūpuntur, euacuatis uenis præ partus purgatione. Atq; hæc à me de hoc dicta sunt. Gemelli autem fiunt ab uno coitu, hoc modo. Vteri sinus frequentes & curuos habēt, alios remotiores, alios propinquiore pudendo. Et animalia quæ multa gignunt, plures sinus habent, q̄ ea quæ

quæ pauca. Similiter autem habent & pecora, & fera, & uolucres. Vbi itaque contigerit genituram findi, & in duos sinus peruenire, & uteri genituram susceperint, & sinus alter ad alterum non hauerit, nec dimiserit, segregata genitura in utroque sinu pelliculas induit, & uiuificatur eodem nodo quo unus foetus, quapropter uero id fiat diximus. Quod uero ab uno coitu gemelli gignantur, hoc testimonio constat. Est canis, & sus, & alia animalia, quæ ab uno coitu pariunt & duo, & plura, & unūquodque animal in utero, in sinu ac pellicula existit: atque hæc ipsi fieri uidemus, & hæc omnia eadem die ut plurimum pariunt. Sic autem & mulieri ab uno coitu gemelli facti, uterque in sinu & pellicula est, & eadem die utrumque parit, & alter prius foras procedit, & pellicula ipsius siue secunda. Quod autem gemelli, foemella & masculus generatur, hoc causæ esse sentio. In muliere & in uiro, & in omni animali, in singulis & debiliore, & fortior genitura inest, & non semel ac simul genitura procedit, sed & bis & tertio bullit ac eiacularur: & non est possibile omnem esse fortem, tum quæ prius exiuit, tum quæ posterius. In utrum autem sinum, crassiores ac fortiores genitura ingredi contigerit, illic masculus gignitur. In utrum uero rursus humidiorem ac debiliorem, illic foemella generatur. Si uero in utrumque fortis ingreditur, ambo masculi fient. Sin debilis, ambo foemellæ. Atque hic sermo sic relatus totus finem habet.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE CARNIBVS, IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.



Et o ad hunc usque sermonem communibus sententijs utor, tum aliorum qui me præcesserunt, tum etiam meis. Necessè enim est commune principium sententijs supponere eum qui uelit hanc de arte medica tractationem componere. Verum de rebus sublimibus in aere ac cælo, neque opus habeo dicere, nisi quod quantum ad hominem & reliqua animantia, quæ sunt, & nata sunt, pertinet, demonstrabo, & quæ anima sunt, & quod sanitas, & quod morbus, & quod in homine malum ac bonum, & unde moritur. Nunc autem ipse meas sententias profero. Et uidetur sanè mihi id quod calidum uocamus, immortale esse, & cuncta intelligere, & uidere, & audire, & scire omnia tum præsentia, tum futura. Huius igitur plurima pars, quum turbata essent omnia, in supernam circūferentiam secessit. Et uidentur mihi ipsi ueteres Aethera nominasse. Altera pars inferna, appellatur Terra, frigidum quid & siccum, & multis motionibus obnoxium, & in hac sanè multum calidi inest. Tertia pars aeris, medium locum occupauit, calidum quid ac humidum existens. Quarta uero pars terræ proximum locum coepit, humidissimum quid ac crassissimum. Hæc itaque quum turbata essent, & in orbem circūuoluerentur, multa calidi pars in terra conclusa est, alibi maior, alibi minor, alibi ualde pauca, alibi copia multa: & temporis progressu terra à calido arefacta, hæc conclusa in ipsa putredines faciunt ueluti tuniculas, & quantum quidem ex putredine

terræ pingue fuit, & minimum humoris habuit, id ipsum per multum tempus
 calefcens, celerrimè exustum est, & in ossa mutatū. Quæ uero glutinosiora fue-
 runt, & frigiditate participarunt, ea calefacta exuri nō potuerunt, neq; uero li-
 quida fieri, propterea speciem alieniorem ab alijs acceperunt, & nerui solidi fa-
 cti sunt. Neq; enim multū frigiditatis ipsis inerat. Verū uenæ frigiditatis mul-
 tum habebant, atq; eius frigidi quantum circūcirca glutinosissimum erat, à ca-
 lido exassatum, membrana euasit, frigidū uero quod erat, à calido superatum,
 dissolutum est, & ob id liquidū factum. Iuxta eandem autem rationē etiam fau-
 ces, & stomachus siue gula & uēter, & intestina in podicē usq; caua facta sunt.
 Quū enim frigidum semper calecat, quantū eius circumcirca glutinosum es-
 rat, exassatum est, & membrana tunica facta est. Quod uero intra frigidū erat,
 colliquatum est, & factū est liquidum. Non enim erat in ipso neq; pingue, neq;
 glutinosum multū. Iuxta eandem rationē etiam uesica. Multum frigidū quod
 ipsam circūcirca concludit, à calido calfactū, dissolutum est, & euasit liquidum,
 quū neq; pingue, neq; glutinosum in ipso esset: quod uero supererat, tunica
 euasit. Sed & de alijs quæ caua sunt eodem modo res se habet. Vbi enim plus
 glutinosi quàm pinguis erat, mēbrana tunica facta est. Vbi uero pinguis plus
 quàm glutinosi, ossa facta sunt. Eadem ratio & ossium est. Vbi quidem nō ine-
 rat glutinosi, uerum pinguis & frigidi, citius exusta sunt propter pinguitudi-
 nem, atq; hæc ossa durissima & rigidissima existunt. Vbi uero pingue & gluti-
 nosum similia sunt, hæc ossa antrosa sunt. Et de his quidē sic habet. Frigidum
 quidem congelat, Calidum autē diffundit, in multo uero tempore etiam exsic-
 cat. Vbi aut pinguitudinis aliquid affuerit, citius exurit et siccatur. Vbi uero glu-
 tinosum affuerit frigidus, citra pinguitudinē, exuri nō uult, sed tēpore calefcens
 congelatur. Cæterum cerebrum sedes & metropolis est frigidi ac glutinosi. Ca-
 lidum uero pinguis sedes & metropolis est. Quod enim calefcit primum om-
 nium quū diffunditur pingue fit. Et propterea cerebrum, quia minimū pingui-
 tudinis habet, plurimū uero glutinositatis, à calido exuri nō potest, sed tempo-
 re tunicam, membranam crassam accipit, circum membranā uero ossa, quan-
 tum calidum superauit, & in quibus pinguitudo erat. Sed & medulla spinalis
 appellata, à cerebro descendit, & non est in ipso, neq; pinguis, neq; glutinosi
 multū, quemadmodū & cerebro. & propterea neq; nomen medullæ iuste pos-
 sidet. Nō enim est alijs medullæ similis, quæ in alijs ossibus inest. Sola enim mē-
 branas habet, quas alia medulla nō habet. Signa porro horum manifesta sunt.
 Si quis enim neruosa & glutinosa, itēq; alia assare uelit, alia quidē cito assantur;
 Verum neruosa & glutinosa assari non uolunt, minimum enim pinguitudinis
 habent. Pinguisimū autem & unguinosum celerrime assatur. At uero uiscera
 sic mihi cōstituta esse uidētur: nam de uenis prius à me dictū est. Cor multū glu-
 tinosi ac frigidi habet, & à calido calfactum, caro euasit dura & uiscosa, & mem-
 brana circum ipsum, & cauū factum est, non quemadmodū uenæ: & situm est
 in capite uenæ cauiissimæ. Duæ enim sunt cauæ uenæ à corde, alteri nomen est
 arteria, alteri uena caua, iuxta quā cor sitū habet. Et plus habet calidi arteria, q̃
 uena caua, & spiritum condit ac conseruat. Verum præter has duas uenas, etiā
 aliæ in corpore sunt. Cauissima autē uena, ad quā cor sitū est, per uentrē omnem
 transit, & per septum trāuersum, & in utrūq; rhenem finditur, & in lumbis fin-
 ditur

ditur, & exiit tum in alias partes, tum in crus utrunq; Sed & supra cor ad ceruicem, partim in dextram, partim in sinistra, & tunc in caput ascendit, & in temporibus finditur utrinq;. Possunt autē & numero maximæ uenæ dici, Verum in summa, à uena caua, & ab arteria, aliæ uenæ per totum corpus fissæ sunt, cauiissimæ autem sunt prope cor, & ceruicē ac caput, & infra cor usq; ad coxendices. Et calidum plurimū in uenis ac corde inest, & propterea spiritum cor habet, utpote quod omniū intra hominē membrorum calidissimū existat. Procliue est autem condiscere, quod spiritus calidus est. Cor & uenæ cauæ semper mouentur, & plurimū calidi in uenis inest, & propterea spiritum cor trahit, ex omnibus in homine maxime calidum existens. Potest etiam aliter cognosci. Si quis ignem in domo accendere uelit, quū uentus non inspirat, flamma mouetur aliquando magis, aliquādo minus. Sed & lucerna accensa & ardens, eodem modo mouetur, modo magis, modo minus, uento nullo mouente, quem sanè nos spirātem cognoscere possumus, & alimentū calido frigidum existit. Cæterum puer in utero cōprimens labra ex utero matris fugit, et tum alimentū, tum spiritum, cordi intrō trahit, ubi sanè mater respirarit. Est enim hoc calidissimū in puero, & hoc calidum etiam reliquo corpori, & alijs omnibus partibus motum præbet. Si uero quis interroget quomodo hoc quis sciat, quod puer in utero trahit & fugit; illi sic respōdendum est. Pueri nascūtur stercus in intestinis habentes, & ubi nati fuerint celerrime uentrem, tum homines, tum pecora exonerant. Atqui nō haberent stercus, nisi in utero suxissent, Imō neq; mammam statim ut natū est sugere nosset, si nō in utero suxisset. Et de motu cordis ac uenarum sic habet. Porro pulmo iuxta cor ita natus est. Cor ex humido quod glutinosissimū erat calfaciens cito exsiccauit, ueluti spumam, fecitq; antrosum, & uenulas multas in ipso. Venulas autem ideo fecit. Quantum enim in glutinoso inerat frigidi, id ipsum quidem à calido colliquatum est, & liquidum euasit. Ab ipso uero glutinoso, tunica facta est. At uero lecur sic cōpactum est. Quum unā cum calido multū humidi cōclusum esset, citra glutinosum ac pingue, frigidum superauit calidum, & cōgelatum est. Huius signū hoc est. Quando quis uictimam mactat, donec calidus fuerit, liquidus est sanguis, postquam autem perfrigeratus est, congelatur. Si uero quis ipsum conquasset, & fibras eximat, non congelatur, fibræ enim frigidæ sunt & glutinosæ. Splen autem hoc modo constitutus est. Cum calido & glutinoso cōclusum fuit, calidum quidem plurimum, frigidi autē minimum, tantum solummodo quantū ad glutinosi compactionem satis erat: sunt autē id fibræ in splene existentes, & propter has fibras, mollis est splen, & fibrosus. Rhenes porro sic producti sunt. Parum glutinosi, parum calidi, multū frigidi cōclusum fuit, & ab hoc congelatū est, & durissimum uiscus euasit, et minime rubrū, quia non multum calidi simul cōstitit. Eadem de carnibus ratio est. Frigidum quidem cōstituit & compegit ac fecit carnem, glutinosum autē in foramina transiit, in foraminibus autem his humidū est, uelut in uenis magnis. Calidum autē in toto corpore est, plurimum uero & humidū in corpore est, & frigidi multū in humido: tantum autē est frigidi, quantum congelare humidū ac liquidum potest, sed superatur à calido, quare etiam ab ipso diffunditur. Quod uero humidū calidum est, hac demonstratione confirmatur. Si quis corpus hominis fecet, ubicūque uelit, sanguis calidus fluet,

& quādiu sanè calidus fuerit, liquidus erit, postquam uero refrigeratus est, tum ab intrinseco frigido, tum extrinseco, pellicula fit & mēbrana, & si quis hac pellicula detracta, modico tēpore sinat, aliam pelliculam factā uidebit, si uero quis hanc semper adimat, alia rursus pellicula à frigido generatur. Cæterū ea gratia plura dixi, ut ostenderem, quòd extremū corporis ad aerem conuersum, necessario pelliculam induit, præ frigido & uentis impetentibus. At uero articuli sic generati sunt. Quum ossa facta essent, quæcūq; quidem ex ipsis pingua erant, celerrime exusta sunt, quemadmodū etiam prius dictū est superiore sermone. Quantū autem ex ipsis glutinosum erat, id ipsum exuri non poterat, sed medio inter ustum & siccātū loco cōtentum, à calido in neruos, & saliuam ac mucum transiuit. quantū autem ex glutinoso liquidissimū erat, hoc calfactum crassius redditū est, utpote liquidū existens, & ex hoc saliuā facta est, uerum ex illo glutinoso unguēs producti sunt. Etenim ab ossibus & articulis semper liquidissimum ipsorū discedens, glutinosum redditur, & à calido siccatum ac arefactū, foras in unguēs delegatur. Dentes autē posterius generantur ex hac caussa. Ex ossibus capitis ac maxillarum incremētum fit glutinosi, & quod ex pingui inest, à calido siccatum exurit, & fiunt dentes reliquis ossibus duriores, quia nihil frigidi inest. Et primi quidem dentes nascūtur à uictu in utero, & postquam natus fuerit, puero lactēti à lacte. Vbi uero hi exciderint à cibis & potibus, excidunt autem, ubi ad annos primi alimenti peruenerint, quibusdā etiam prius, si à morbido alimento nati fuerint. Plurimis uero quum septē annos impleuerunt. Qui uero postea enascuntur simul cōsenescunt, nisi præ morbo perforentur. Cæterum dentes propterea posterius alijs nascūtur. In maxilla uenæ sunt, & hæ huic ossi soli inter omnia ossa, ex inferno uentre alimentū præbent. Ossa uero tale augmentū dant, qualia existunt, sed & alia omnia tale augmentum reddūt, qualia ipsa existūt. Etenim uenæ ex uētre ac intestinis, in quæ cibi ac potus colligūtur, postquā hi fuerint calfacti, tenuissimū ac liquidissimū trahunt, crassissimū autem & fex isthic relinquitur, cōputrescitq; & fit stercus in inferioribus intestinis. Tenuissimū uero trahūt uenæ ex uētre ac intestinis, quæ supra ieiunum intestinū existunt, atq; hoc calfactis iam cibis. Vbi autē ieiunum in testinū transierint, & in inferiora intestina collecti fuerint, stercus fiunt. At uero alimentū ubi accesserit, unūquodq; talem speciē unicuiq; reddit, qualia sanè erant. Singula enim ab alimēto irrigata augmentum capiunt, calidum, & frigidum, & glutinosum & pingue, & dulce & amarū, & ossa & alia uniuersa quæ in homine insunt. Et ob id dentes posterius nascūtur. Dictum autem à me prius est, quòd solæ ex ossibus maxillæ, ipsæ in seipsis uenas habent: & ob id alimentū amplius in ipsas quàm in alia ossa trahitur, & quia uberius alimentū, & densiorem influxum habent, augmentum ipsæ à seipsis tale pariunt, quales sanè ipsæ existunt, atq; hoc donec homo integer augeat: augeat autem ubi conspicuus euadit, conspicuus uero fit maxime à septennio, usq; ad decimū quartum annum. & in hoc tempore, tum maximi ex dentibus, tum alij omnes nascuntur, postquam exciderint hi qui ab alimento in utero nati sunt. Augeat autem & in tertium annorum septenarium, in quo adolescēs fit, usq; ad quartum & quintum septenarium. Quin & in quarto septenario dentes enascuntur, plerisque hominibus duo, qui sapientiæ dentes appellantur. Porro capilli sic

sic nascuntur. Ossa sunt & cerebrum à quibus tale augmentum uenit, utpote glutinoso circumcirca existente, quemadmodum & nervis, et pinguitudinis nihil inest. Si enim pinguitudo affuisset, ex calido sanè exusta esset. Fortassis autem mirabitur quis quod etiam sub alis & in pube pili multi, & quibusdam in toto corpore existunt. Verum hic sermo de eo est, quod ubicumque in corpore glutinosum est, ibi pili à calore fiunt. Auditus autem inde contingit, foramina aurium ad os durum & siccum lapidi simile pertingunt. Iam uero ad ipsum os est cavitās antropha. Strepitus autem ad durum firmatur, os autem cauum resonat per durum. Pellicula uero in aure iuxta os durum tenuis est, uelut aranei tela, & omnium pellicularum siccissima. Quod autem id quod siccissimum est maxime resonat, multa signa sunt. Quum igitur plurimum resonuit, maxime audimus. Et sunt quidam qui de natura scribentes prodiderunt, quod cerebrum est quod sonum edit, hoc autem fieri non potest. Ipsum enim cerebrum humidum est, & membrana siue tunica circum ipsum humida est & crassa, itemque circum tunicam ossa. Nullum igitur humidum resonat, sed sicca, resonantia autem auditum faciunt. Olfacit porro cerebrum humidum existens, aridorum odorem unā cum aere, per corpuscula chartilaginosa ipsum trahens. Cerebrum enim in cavitatē nasi pertingit, atque hac parte non est ante ipsum os aliquod, sed chartilago mollis uelut spongia, neque caro, neque ossiculum, & ubi quidē cavitās nasi sicca fuerit, ipsum seipso exactius arida olfacit. Aquā enim non olfacit, humidior est enim quam cerebrum, nisi sit putrefacta. Putrefacta enim aqua crassior fit, & alia omnia. Quum uero nares humectae fuerint, olfacere non possunt. Non enim aerem attrahit cerebrum ipsum ad seipsum. Similiter etiam ubi cerebrum ipsum de seipso plurimum liquefecerit, in palatum, & fauces, & pulmones, ac reliquum uentris: cognoscunt autem hoc homines, & ex capite destillare dicunt, destillat autem & in reliquum corpus. Et est modus eius calidus. At uero uisus propterea contingit: à cerebri membrana uena in utrumque oculum per os descendit: per has duas uenulas, quod est glutinosissimi tenuissimum de cerebro percolatur, & propterea ipsam circum ipsum oculum tunicā talem facit, quale est ipsum oculi pellucidum, quod ad aerem uergit, ad quod uenti ac flatus irruunt, eadem planè ratione quemadmodum de alijs membranis ac tunicis dixi. Sunt autem multae hae tunicae praeter oculos pellidae, quales ipsi existunt. Huic enim pellucido lumen & omnia splendida relucet, per hoc igitur relucens uidet: quod uero non splendidum est, neque relucet, per hoc non uidet. Verum reliquum quod circum oculos est album, caro est. Quae uero pupilla oculi appellatur, nigra apparet, ob id quod in profundo est, & tunicae circum ipsam nigrae sunt: tunicam autem appellamus id quod uelut pellicula inest. Est autem non nigra si quis inspiciat, sed alba ac pellucida, humidum uero oculi, glutinosum existit. Saepè enim uidimus, in oculo rupto exire humorem glutinosum, & si quidē adhuc calidus fuerit, liquidus est. Postquam uero perfrigeratus est, siccus euadit, uelut thus transparens. Atque hoc & in hominibus & in brutis similiter habet. Ceterum oculum molestia afficit omne quod inciderit, et uenti irruentes, & alia quae splendidiora sunt, quam ipse est. Et si quis interroget respondere licet, propterea quod consimilis coloris existunt. Quemadmodum os, & lingua, & reliquus uenter, humida sunt. Sermonis porro facultas inde est. Totum corpus spiritu intro trahit, plurimum uero in cavitates sibi ipsi accumulatur. Is autem qui per inane foras currit, strepitum facit.

caput enim resonat, lingua uero articulatur, occurrens in faucibus, obturansque ac pellens ad palatum & dentes, claritatem eius facit. Si autem lingua semper occurrens non articuletur, non posset homo clare differere, sed singula à natura unam uocem haberent. Huius signum est. Muri ex natiuitate differere non possunt, sed unam tantum uocem sonant, etiam si quis spiritum efflans sermonem proferre conetur. Manifestum autem hoc est. Homines ubi uoluerint magnam uocem edere, attrahentes spiritum forinsecum, eum foras propellunt, & magnam uocem edunt, prout spiritus durat, postea uero uox contabescit. Sed & citharcedi, quum ipsos uocem intendere oportuerit, spiritum quam plurimum intro trahentes pronunciationem extendunt, & uociferantur ac uocem magnam edunt, prout spiritus durarit. Vbi uero spiritus defecerit, desinunt. Ex quibus manifestum est quod spiritus est qui uocem edit. Vidi autem iam quosdam qui sibi ipsis manu illata guttur penitus praefecerant, atque hi uiuunt quidem, uerum nullam uocem edunt, nisi quis guttur cōstringat, hi autem sermonem proferunt. Manifestum uero & hoc est, quod praefecto gutture spiritum attrahere intro in cauitates non possunt, sed per praefectam partem exhalat. Sic sanè res de uoce ac sermone se habet. Porro uita hominis septem dierum est. Primum etenim postquam genitura in uteros peruenit, in septem diebus habet quaecumque corpus habere debet. Mirari autem quis possit, quomodo ego id sciam. Verum multa ego uidi hoc modo. Meretrices publicae quae saepius de seipsis periculum fecerunt, ubi cum uiris rem habuerint, sciunt quando in uentre concipiant, & postea conceptum intra se perdunt. Postquam autem iam perditus est, elabitur uelut caruncula. Hanc carunculam in aquam coniectam si cōspicatus consideraue- ris, omnia membra habere reperi- es, & oculorum regiones, & aures, & manus & manuum digitos, & crura, & pedes & pedum digitos, & pudendum, & reliquum totum corpus manifestum. Satis etiam manifestum est harum rerum peritis, quod mulier quum in uentre concepit, statim horret, & calor, & dentium stridor cōsequitur, & conuulsio occupat tum articulos, tum totum corpus, & uterum segnitie ac torporis. Et quae purae sunt, hoc perpetiuntur. Quae uero crassae et mucosae hoc perpetiuntur, pleraque ex his mulieribus non percipiunt, nec cognoscunt. Certe quatenus mihi ostenderunt, hoc ipsum se cognouisse, eatenus scio ac prodo. Quod uero uita hominis septem dierum sit, etiam ex hoc manifestum redditur. Si quis in septem diebus nihil edere aut bibere uelit, plerique quidem in ipsis moriuntur. Sunt autem qui ipsos transmittunt, & tamen moriuntur. Sunt etiam quidam qui persuasi sunt ut ne desperarent seipsum fame cōfici- entes, sed comederent ac biberent: uerum uenter non amplius suscipit. Ieiunum enim intestinum in his diebus concreuit, moriunturque etiam illi. Sed & ex hoc coniectare licet, hominis uitam septem dierum esse. Puer septimestri partu natus, pro ratione natus est, & uiuit, & ratione talis habet, ac numerum ad hebdomadas ac septenarium exactum. Octimestris autem natus nullus unquam uiuit. Nouem uero mensium & decem dierum partus fit, & uiuit, et habet ad hebdomadas numerum exactum. Quatuor enim denarii hebdomadam, dies sunt ducenti et octoaginta. In denarium autem hebdomadam septuaginta dies incurrunt. Habet autem et septimestris partus tres denarios siue decadas hebdomadam, & in unaquaque decade septuaginta dies. Tres uero hebdomadam decades, ex toto sunt dies ducenti ac decem. Quin et morbi acutissimi

mi sic hominibus fiunt, præteritis diebus hebdomadis dimidiæ, aut unius, in quibus iudicantur, & moriuntur aut sani euadunt: & tertij generis in undecim diebus, hoc est una & dimidia hebdomadē: & quarti in duabus hebdomadis: & quinti in duodeuiginti diebus, hoc est duabus & dimidia hebdomadis. At uero alij morbi non habent ut certa sententiā pronūciari possit, quanto tēpore homines ab ipsis sani euadant. Ad eundem modū etiam ulcera magna in capite ac reliquo corpore: quarto die inflammarī incipiūt, in septem autem inflammatio sedatur, aut etiam quatuor & decem, aut duodeuiginti. Si quis autē diligenter medeatur, & uulnera in capite magna in hoc tēpore nō sedentur, homines moriuntur. Cæterū inexpertus quispiam mirari queat, q̄ septimestris puer nascatur. Ego quidem igitur hoc ipsum uidi, & quidem frequenter. Si quis autē hoc deprehendere uult, facile est obstetrices adire, quæ parietibus adsunt, & ex ipsis percunctari. Est autē & aliud signum. Pueri septem annis præteritis dentes explent. Et in septem annis sunt & ratione & numero exacte hebdomades trecentæ ac sexagintā. Necelsitatem autem naturæ, quapropter in septem hæc singula dispenſentur, ego alijs locis declarabo.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE SEPTIMESTRI PARTV, IANO COR
nario Medico Physico interprete.



SEPTIMESTRES autē nascūtur diebus centum & octoginta duobus ac dimidio, & insuper accedente diei particula. Si enim primi mensis dies quindecim supputaueris, deinde quinque mensium, dies centū quadraginta septem ac dimidium: In unde sexaginta enim diebus q̄ proximē duo menses perficiuntur. his igitur sic habētibus, ad septimū mensem supersunt dies nō plures q̄ uiginti. Et est tota summa dimidij anni, unā cum aliquantula diei partē. Quū itaq; ad hoc perfectionis principium partus peruenerit, matureſcēte foetu, & robore multum augescēte, in perfectione magis quā alijs temporibus, pelliculæ in quibus ab initio nutritus fuit, quemadmodū spicarum membranæ laxātur, ad id coactæ antea quam fructus perfecte matureſcat: & fortissimi ac plenissimi foetus uiolantes ac dirūpentes pelliculas, partū fieri cōgunt, et plurimi ex his perēūt. Quū enim parui sint, transmutationē maiore q̄ alij utūtur, & quadraginta dierū afflictionē perferre cōguntur, ex utero egressi, id quod etiā ex decimestribus multos peremit. Sunt autē ex his septimestribus qui etiā superstites manent, ex multis pauci. Propterea quod ratio & tempus in quod enutriti sunt in utero, constitit, ut omnium participēs sint, quorū etiam perfectissimi participes existunt, maxime qui superstites manent, & processerunt de matre prius pariente, utpote in octauo mense ægrotaturi. Si enim in his laboribus succedant, ut in cōspicuum prodeat puer, impossibile est superstitem esse, ob prædictas affectiones, quas ego octimestres perimere dico. Immo etiam multos decimestres. Cæterū multi foetus septimestris ætatis, quū pelliculæ laxantur, secedunt in id quod cedit, & hic alimētum sumunt, primos quidē quadraginta dies laborantes, alij plus, alij

29. alij minus: propter permutationē autē ex locis & pelliculis quā ipsos aluerūt,
 transmutantur, & pro umbilico, trahunt & transmūt etiam per matrē labo-
 res. Pelliculæ enim dum tenduntur, & umbilicus conuulsus, dolores matri in-
 ducunt. Et fœtus ex antiquo uinculo exsolutus, grauior redditur. Multæ uero
 mulieres etiam febricitant his contingētibus, quædam etiam pereunt unā cum
 30. fœtibus, uerum omnes in breui ex hoc cõtaminantur ac inquinātur. Aiunt au-
 tem & octonos menses difficilime uteros ferre, recte id dicentes. Est autē octa-
 uus mensis nō solum hoc tēpus, sed & dies accedūt à septimo mēse, & à nono,
 & ab ipso anno. Verū dies nō similiter, neq; dicūt, neq; cognoscunt mulieres.
 Decipiuntur enim ex eo quod non eodem modo fiunt, sed aliquādo à septimo
 mēse plures dies accedūt ad quadraginta, aliquādo à nono. Tūc enim fieri ne-
 cesse est, prout cõtigerit mulierem in uētre concipere, tum mēse, tum tempo-
 re. Mensis autē octauus minime dubius est, secundū hunc enim cõtigit, ut ius-
 dicatio difficilis existat. Et mea sentētia pars etiā in undecimo mēse, mensis est,
 ut hic satis memorabilis existat. Porro mulieribus de partibus fidem derogare
 31. non oportet, dicunt enim omnia, & semper dicunt, & semper proferunt. Neq;
 enim aut opere, aut sermone persuasæ sunt, sed ex eo quod cognouerūt in cor-
 poribus suis cõtigisse. Licet autē & uolētibus aliud dicere, Quæ uero iudicio
 præditæ sunt, & uictoriā de hac sententia pronūciant, semper dicūt ac testātur,
 nasci septimestres, & octimestres, & nouimestres, & decimestres, & undecime-
 32. stres: & ex his octimestres nō superstites manere. Dicunt autē & abortus plu-
 rimos in primis quadraginta diebus fieri, sed & reliqua cōscripta his accidere,
 in quadragenarijs, ac in singulis mēsis diebus fieri dicūt. Quum autē septimo mēse
 pelliculæ dirumpātur, & fœtus secesserit, labores qui circa octauū mensem, &
 sextū quadragenariū, in partu fieri tradūtur, corripunt, hoc autē tēpore præte-
 33. rito, quibus bene futurū est, inflāmationes tum fœtus, tum matris exoluūtur,
 ut uenter molliatur, & tumor à præcordijs & laterū mollitudine descendat ad
 locos inferiores, ad facilem partus tēpore progressionem, & septimo sanè qua-
 dragenario plurimo tempore fœtus isthic existūt. Nam loci ipsis molles sunt,
 & transmotiones ipsis faciliores ac frequētiore sunt, & propterea ad partum
 34. magis solubiles consistunt, & mulieres per hos ultimos dies ex toto quadra-
 genario facilius uteros ferūt, donec cõtigerit fœtū uerti. Postea uero dolores par-
 tus ac labores incumbūt, donec à puero & à secūda mulier liberetur. Quæcūq;
 uero mulieres multos pueros pepererūt, & quidam ex ipsis claudus natus est,
 aut cæcus, aut aliud quoddā malum habens, aiūt in hoc puero octauū mensem
 35. ipsas difficilius transegisse, q̃ in his quos pepererunt nihil mali habentes. Fœ-
 tus enim mancus in octauo mense fortiter ægrotauit, ut etiam morbus absces-
 sum ac ablationē siue mutilationem alicuius partis fecerit, quemadmodū etiam
 uiris fortes morbi faciunt. Qui uero fœtus in alio tempore fortiter ægrotant,
 36. pereunt prius q̃ ipsis abscessus eiusmodi fiat. Quicūq; autē octimestres fœtus
 non ualde ægrotant, sed iuxta unā aliquam partē, ex secessu afflictionē pertule-
 runt, quadraginta quidē dies in imbecillitate transigunt, ut plurimū in utero,
 propter prædictas necessitates, sani autē fiunt. Quicūq; autem natus fuerit in
 his quadraginta diebus, eum impossibile est superstitem manere. ægrotanti es-
 nim adhuc ipsi in utero trāsmutationes & afflictiones post partum accedunt.

Quicūq;

Quicumq; uero ægrotans in utero ad nonū mensem peruenierit, & in hoc mēse natus fuerit, superstes erit. Et superuiuit quidē non minus hi quā septimestres. uerū pauci etiam ex his educātur. Neq; enim crassitudinē habēt, quā perfectissimi habent, & labores in utero nō diu ante tolerauerūt, ut tenuēs euaserint. Seruabitur autē uel maxime talis puer, si nouem mēsum fuerit in exitu: fortior autē euadet etiam is, qui plurimū abest à morbis, qui octimestribus accidere solent. Qui enim in septem quadragenarijs nascūtur, decimestres appellati, ob id maxime educantur, quōd fortissimi sunt, & plurimū à uulgarium puerorum tempore absunt, in quo affligūtur quādraginta ægrotantes diebus, circa octauū mensem. Declarant autē de morbis & afflictionibus octimestrium, etiā nouimestres tenuēs nascētes. Iuxta multitudinē enim temporis, etiā magnitudo corporis contingit, ex morborū afflictione progressis, & nō uelut septimestres carnosī gignūtur, & crassitudinē probe coactā habentēs, ut qui tempus quo in utero gestabātur sine morbis trāsegerunt. Verū enim uero conceptus, & abortus, & partus mulieribus in eo tēpore, in quo etiam morbi, & sanitas, & mors omnibus hominibus fiunt, hæc uero omnia partim secundū dies, partim secundum menses, partim secundū dierum quadragenarios, partim secundum annum, significationē sui præbent. In omnibus enim his temporibus insunt ad unumquēq; & utilia multa, & hostilia multa. Ex utilibus igitur, sanitas & augmentū contingit, ex contrarijs, morbi & mors. Dies quidē igitur maxime insignes in plurimis sunt, primi & septimi, multū potentes in morbis, & multum in foetibus. Nam plurimi abortus in his diebus fiunt, nominātur autē tales effluxus, nō abortus. Verū alij dies intra quadagesimū insignes quidē minus sunt, multi uero iudicant. Cæterū in mēsibus, eadem quæ in diebus sūt, iuxta rationem insunt. Menses enim mulieribus sanis singulis mēsibus apparent, tanquā peculiarem in corporibus uim mēsis habeat. Vnde sanē septimi menses his quæ uterū gestant, foetus in principiū perfectionis cōstituunt. Pueris uero ubi septē menses à natiuitate impleuerūt, tum alia utilia in corporibus fiunt, tum dentes in eo tēpore apparere incipiunt. Eadem ratio est etiam in decretorijs diebus, si quidem fortassis unā cum his quos recē sui coniungere quis uelit, historiæ ac cognitionis gratia referentur. Etenim Medicū qui ægrotorū salutem recte cōiectare uolet, animaduertere quidē oportet & cōtemplari omnes dies, ex paribus uero decimū quartum, & uigesimū octauum, & quadagesimum secundū. Hic enim terminus ponitur à quibusdā pro harmoniæ ratione, & integer ac perfectus numerus, uerum ob quam causā, longius fuerit in præsentī exequi. cōtemplari autē sic oportet per ternarios ac quaternarios, ternarijs quidē omnibus copulatis, quaternarios autē, duobus ad duos cōnexis. At uero quadragenarij primū in foetibus iudicant. Quisquis enim primos quadraginta dies trāsmiserit, abortus effugit ex omni causa cōtingentes, plures autem fiunt in primo quadragenario abortus, quā in alijs omnibus. Hoc autem tempore præterito, foetus fortiores sunt, & ipsorū corporis per singula membra discretio fit: & masculorū quidem partes omnes ualde cōspiciuæ fiunt foemellæ uero in hoc tempus, carnes apparent exortus ac processus solum habentes. Similia enim longius tempus in simili sunt, & tardius discernūtur, propter consuetudinē & amicitia: quanquā aliās quā à matre segregatæ fuerint,

filix citius quam filij pubescant, & sapiant, ac senescant, propter corporum imbecillitatem, & uictus ratione. Alter quadragenarius est, in quo circa octauum mensis foetus in utero agrotant, de quibus hic totus sermo institutus est. Tertius est, in quo ubi nascantur pueri etiam male afflicti, si effugerint quadraginta dies, apparent magis robusti ac sapientes. Nam & splendores clarius uident, & strepitum audiunt, quod prius non potuerunt, tanquam incrementum habeat hoc tempus, cum iuxta alia, tum iuxta sapientiam ex corpore elucescentem. Peculiarem quidem sapientiam in corpore inesse manifestum est, in prima sane die. Nam in somnis, statim ubi nati sunt pueri, ridere & plorare uidentur. Vigilantes quoque sua sponte statim ridet ac plorant, prius quam quadraginta dies transierint. Non ridet autem, etiam si titillentur ac irriterentur, priusquam hoc ipsum tempus transeat. habentur enim uires in muccis: quamquam mors etiam per fatum sit sorte designata. ut hoc exemplo omnibus sit, quod omnia existetia quae naturam ex ipsidem habent, transmutationes per tempora uenientia habeant. Declaratur autem in singulis, quum alia nascantur, alia corrumpantur. Porro anno finiente multi quidem morbi fiunt, inultrae etiam sanitates, iuxta temporis rationem, ad menses, & ad singulos dies. Septenarij autem annorum, cum alia multa insignia corporibus sunt, tum dentes pueris excidunt, & alij nascuntur. Quae enim in corporibus sunt, ea scribam.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE OCTIMESTRI PARTU, IANO CORNARIO Medico Physico interprete.



De octimestri partu sic sentio. Impossibile esse ut duas consequenter succedentes afflictiones pueri ferre possint, & propterea octimestres non superstitibus manere. Contingit enim ipsos consequenter affligi, tum ea quae in utero sit afflictione, tum ea quae in partu accedit, & ob id nullus octimestris uitalis est. Insuper & decimestres appellatos, in septem quadragenarijs dierum magis in lucem edi sentio, & maxime contingere ut educetur. Nam perfectissimus est foetus in primis quadraginta diebus, ubi uero plures accesserint, perit. Coguntur enim multa in paucio tempore assumptas ac perferentes, multum agrotare, ex quibus mors consequitur. Incipit autem laborare puer ante partum, & interitus periculum subit, quam in utero uertitur. Producentur enim omnes sursum habentes caput, pariuntur autem multi in caput, & securius discedunt ac liberantur his qui in pedes pariuntur. Flexibiles enim corporis partes non impedimento sunt, puero in caput exeunte. Verum quum in pedes prodierit, obturamenta contingunt. Versiones scilicet in utero, & alia pericula, & umbilici puerorum iam saepe circa colla apparuerunt. Si enim iuxta partem quamcumque umbilicus fuerit in utero porrectus, magis hac parte puer umbilici circumactionem, dum uertitur, faciet, quam circa ceruicem. Si uero iuxta humerum, umbilici circumactionem retrahit. hoc autem ubi fit, etiam matrem magis laborare necesse est, & puerum aut perire, aut difficilius exire. Quare multi iam pueri principium morbi intus nati prodire, & consequenter alij perierunt, alij morbo superuixerunt. Quicumque uero probe ac tuto prodierint

rint, & in conspicuū exierint, de repente ex necessitate in uentre liberati, & crassiores ac maiores q̄ pro ratione statim existūt, his nō ex augmento, sed laxo tumore id cōtingit, & multi sani ex his pereūt. Si enim tumor nō residat citius q̄ tertio die, aut paulo serius, morbi ex ipso fiūt. Quare etiā alimenta ac respiratio nes periculose mutātur. Si quid enim morbidū inducūt, per os & per nāres inducūt; & pro eo q̄ tanta ingerātur edulia quanta sufficiunt, & ea etiā nō superentur, multo plura ingerūtur; ut necesse sit & cogātur prae ingestorum copia, & prae ipsa adeo affectione, qua pueri corpus afflētū est, alia quidem per os & nāres rursus exire, alia uero per intestinū ac uesicam inferne transire, antea nullo horum ita cōtingente. Sed & pro flatibus ac spiritibus, & humoribus ita cognatis, cū quibus necesse est in utero cōsuetudinem ac beniuolentiā habuisse, omnibus peregrinis utitur, crudioribus ac siccioribus, & minus mansuetis, ut necesse sit dolores aboriri multos, plerisq̄ etiā mortes: quandoquidē etiā uiris transmutationes locorū ac uictus, morbos faciūt. Eadē ratio est & de uestibus. Pro eo enim q̄ carne & humoribus induti fuerūt, ijsq̄ tepidis ac liquidis & cognatis, tales uestes pueri induunt quales ipsi uiri. At uero umbilicus per quem alimēti ac spiritus ingressus pueris cōtingunt, solus ex omni corpore utero adhæret, & per hunc introitus ac ingressus ingredientium particeps fit, reliquæ partes cōnniuent, & nō prius apertæ sunt, q̄ ubi in exitu fuerit puer ex uentre. Quum autē in exitū fuerit, reliquæ omnes aperiuntur, uerū umbilicus attenuatur, & cōnniuet ac resiccatur. Quemadmodū autem in his quæ ex terra nascūtur, fructus pleni ac maturi secernūtur ac decidunt, iuxta discriminationē qua parte inhærent; Sic etiā pueris maturis ac perfectis, umbilicus quidem cōnniuet ac clauditur, reliqua uero apēriūtur, ut & ingredientia suscipiant, & exitus habeant secundū naturam, quibus necesse est uiuentes uti. Singula enim separantur, iuxta modum quo agmina cōgregantur repētia: optima autē sunt, quæ maxime soli cōnutritā sunt. Cæterum decimestres & undecimestres partus, ex septem quadragenarijs eodē modo fiunt, uelut ex dimidio anno septimestres. Plurimis enim mulieribus necessariū est in uentre concipere, post mēstrua purgamenta, ubi ab his exolutæ fuerint. Oportet igitur mulieri tempus dare mensis, in quo ipsa purgatio cōtinget; & hoc tēpus quibus breuissimū fit, tres sunt dies. Plerisq̄ autē multo plures. Sūt autē & aliā multa impedimēta etiā in uiris, ex quib. cōceptus retardatur. Oportet autē uel maxime hoc cōsiderare. Quod nouilunium quod dies unus existit, exactissime trigesima mensis pars est. duo autē dies, fermē quindecima mensis pars sunt. Tres uero dies, pars mensis decima sunt, & reliqua iuxta horū rationem. & nō est possibile in pauciorib. partibus fieri, neq̄ menstruorū solutionem, neq̄ fœtuū cōceptionem. Ex his igitur omnibus necessariū est plerasq̄ mulieres circa plenilūniū, & ultra in uentre concipere, ut ducenti & octoaginta dies, sæpe undecimū mēsem apprehendere uideantur, tot enim dies septem quadragenarios cōstituunt. Nam quū ultra plenilunium mulier concipit, necesse est eum conceptum undecimum mēsem attingere ac apprehēdere, quo ad ultimum circuitum perueniat.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE SUPERFOETATIONE IANO CORNAS

rio Medico Physico interprete.



VVM superfoetarit mulier, si primum puerū in medio uteri habuerit, superfoetatio elabitur, à primo ac ueteri expulsa. Si uero in altero cornu superfoetationē habuerit, posterius ipsam insuper parit non uitalem, nimirum uitalitate ubi uterus laxatus & humectus fuerit exsoluta. Si uero non statim secedat superfoetatio, dolores exhibet, & fluxum foetidum, ac febrem; & facies intumescit, tibiaeque ac pedes, & si pereat, cibum auersatur donec exciderit. Superfoetant autē mulieres, quarum stomachus id est uteri os, post primum conceptū non clauditur ita ualde, idque apparentibus signis constat, clauditur autē post superfoetationes quae posterius insuper pariuntur. Si superfoetatio nondū partiū discriminationē habeat, sed caro sit, non quidē intumescit, sed putrescit donec ex utero exeat. Si cui exeat secunda pueri in utero, priusquam puer foras procedere incipit, aegre parit; & magis adhuc periculose, si caput nō praecedat. Si uero alicui unā cum secunda puer foras exierit, & ad stomachum id est os uteri progressus, rupta secūda emerferit, magis facile parit. Itemque si puer quidem foras prodit, secūda uero adhaerescit, & seipsam retrahit, atque isthuc manet. Quum puer non uitalis futuris nascitur, caro ipsius ungues supereminet, ungues uero tum in manibus, tum in pedibus deficiunt. Quum uitali puero nascente manus praeminuerit, primū retro retrudenda est, donec retruferis; & si ambae praeminuerint, ambas retrudes. Et si crus praeminuerit, etiam hoc repelles. Vbi uero ambo crura in propatulo manserint, neque aliō processerint, fomētō uti opus est, à quo humectissimus uterus reddatur, habeat autē odorem ipsum fomentū. Et quū caput in propatulo fuerit, reliquū uero corpus intus erit, etiam sic fomētō uteris, Et quū pars corporis in utero, pars in pudēdis, pars extra pudenda intumescit ac manet, etiam sic fomentum adhibebis. Et si quidē à fomētō processerit, satis est; sin minus, os uteri elaterio crasso aqua diluto oblines, quo partū producat. Sed & à potibus ac cibis partus promouendus est, & pudenda ipsa cerato illinenda, si sicciora quam ex re est, esse tibi uidebuntur. Quū pueri capite ex stomacho apparente, reliquū corpus procedere nō uult, puer autem mortuus est, digitos aqua madefactos inter stomachū ac caput immittito, & in orbem circūducito, deinde subditum sub mentū digitum in os intrudito, ac foras trahito. Quū uero reliquū corpus extra pudenda fuerit, caput autē intus, in pedes uidelicet prodeūte foetu, postquam digitos in orbē circūduxeris, ambas manus inter stomachū ac caput aqua praemadefactas immittito ac extrahito. Si uero extra stomachum fuerit, uerum intra pudenda, immisisis manibus apprehensum capite educito. Si porro foetus intus maneat mortuus, & non possit neque sponte, neque per medicamenta iuxta naturam excidere, manu cerato maxime lubricante uncta, deinde in uterum intrusa, humeros à collo magni digiti conamine deducito. Oportet autem ad huiusmodi etiam unguem instrumentum in magno digito habere, & distractione facta manus educere, deinde rursus immissa manu, uentrem dissindere, &

& ex diffisso intestina senſim eximere; deinde his exemptis latera confringere, quo cōſidens corpusculū leuius ac expeditius fiat, & facilius exeat nō tumidū exiſtens. Cæterū ſi ſecunda nō facile excidat, maxime quidē ad ſortum appēdere ſinenda eſt, & puerpera uelut ſuper ſella uentri exonerādo deſtinata, laſanum græci uocant, locanda. Sit autē in altum extructa ſella, uel ſimile quiddam, quo ſcetus depēdens grauitate ſua ſecundam ſimul extrahat. Senſim autē hoc faciendū eſt, nō uiolenter, ne præter naturā diuulſa, inflammationē inducat. Sub ſternere igitur lanas molis q̃ maxime recens carminatas ſcetus oportet, quo paulatim remittant ac cōſidant, Aut utres duos cōpulatos aqua plenos ſupponere, & ſupra utres lanas inſternere, & ſupra has puerū. deinde utrunq; utrem ſtilo perforare, quo paulatim aqua effluat, effluente autē aqua, utres remittunt ac cōſidunt, cōſidentibus autē utribus, ſcetus umbilicū attrahit, umbilicus uero attrahit ſecundam. Si uero ſupra laſanum, uel ſimile quiddā puerpera ſedere nequeat, ſuper reclinatā ſellam perforatam collocetur. Si uero adeo debilis eſt, ut omnino ſedere nō poſſit, lectū q̃ erectiſſimum à capitis partibus ſtruemus, ut deorſum declinet ac repat, & ſic ſcetus grauitas q̃ maxime ſimul ſecundam trahat. Verum puerperā ſub alis, foris ad lectum faſcia, aut loro lato ac molli, aligare oportet, ut ne quū erectus ſit lectus, corpus ipſius deorſum feratur. Iuxta eundē autem modū etiam ſi umbilicus abruptus ſit, aut etiam ante tempus reſiſus, moderate grauib; ponderibus appēſis, ſecundæ educationē facere oportet. Optima enim hæc curatio in talibus exiſtit, & minime lædit. Si cui puer in utero immoriatur, et nō egrediatur humido utero exiſtēte, & quū iam nō habeat amplius humiditatē, ſed ſiccatus fuerit uterus, primū quidem intumeſcit puer, deinde colliqueſcūt ac putreſcūt carnes, forasq; effluūt, poſtreimū autē oſſa procedunt; & fluxus aliquādo corripit, ſi nō prius moriatur. Quū puer immortalus fuerit, tum alijs ſignis cōiectare id licet, tum iubere, ut aliquādo in dextro latere iaceat, aliquādo in ſiniſtrū tranſmutet. Tranſlabitur enim in utero puer eò quò mulier ſe uertit, uelut lapis aut aliud quiddam, ſi mortuus fuerit, & pectinem frigidū mulier habet. Si uero uiuat, & pecten calidus eſt, & uēter totus tranſlabitur unā cum reliquo corpore extētus, & in ipſo nihil tranſlabitur abſq; reliquo corpore. Si cui ex partu laborātī fluxus multus ſanguinolētus citra dolorem, ante puerū prodeat, periculū eſt puerū mortuū exoluendū eſſe, & non uitalem proceſſurū. Prægnātibus mulieribus pleriq; ſtomachus uteri prope extat ante partū. Mulier prægnās ſi nō coitu utatur, facilius à partu liberabitur. Quæ gemellos geſtat, eadē die parit uelut cōcepit, habet autē utroſq; pueros in una ſecunda. Muliere ægre pariente, ſi puer in genitalibus locis hæreat, & nō facile exeat, ſed cū labore ac medici machinamētis, tales pueri modicæ uitæ ſunt, horū umbilicū ſecare nō oportet, priuſq; mingāt, aut ſternutent, aut uociferētur, ſed ſinēdi ſunt, & mulier proxime apud puerū permaneat, & ſi ſitierit, aquā mulſam bibat, & ſi umbilicus inſletur uelut ſtomachus, & moueatur, aut puer ſternutet, aut uocē rumpat, tūc ſanē ſecetur dum puer reſpirat, ſi uero nō inſletur umbilicus, neq; moueatur, tempore accedente uiuet.

Prægnantē mulierē ſi aliter nō cognoſcas, oculi tracti & cauioreſ fiūt, & candidum oculorū albedinis naturā non habet, ſed liuidius exiſtit. Si qua partui uicina ſit, & oculos cauos habeat, & facies intumeſcat, & ipſa tota itemq; pedes

tument, ut uelut à pituita alba apprehensa appareat, & habeat aures albas, & summum nasum album, & labia liuida, ea ipsa mortuos gestat quos pariet, aut uiuos prauè, & nō uitales, & exangues, utpotè morbosos, aut prius peperit nō uitales. Huic sanguis in aquositate cōuersus est. Oportet igitur tali post partum odorata in uuluum apponere, & comedere ipsam ac bibere odorata. & primum in facie nasus summus insignis euadit, ac colorem recipit. Si qua prægnaans terram edere cōcupiscat, aut carbones, eaq; edit, in capite pueri ubi natus fuerit, signum à talibus apparet. Mulierem id nosse expedit, utra mamma ipsi maior est, illic enim fœtus existit. Similiter autē & oculum cōsiderabit. Maior enim & splendidior omnino erit intra palpebram, etiam eius partis cuius mamma maior existit. Si cui ab apposis in uuluum nō ualde fortibus, dolores in articulos perueniant, & stridor dentiū corripiat, & membris tendatur, ac oscitat, hanc magis cōcepisse spes est, q̃ eam quæ nihil tale patiatur. Mulier quæ præter naturā crassa est, ac pinguis, & pituita repleta, nō concipit hoc tempore. Quæ uero ex natura talis est, horū gratia concipit, si non aliud quiddam ipsam impediatur. Mulieribus plerisq; quū menses apparituri sunt, stomachus uteri in seipsum contrahitur, magis q̃ aliās. Mulier quæ facile concipiebat, si prægnaans esse desiit, bis per annū à manibus ac cruribus uenam secari sinat. Si cui dolores in coxendice, aut in capite, aut manibus, aut aliqua alia corporis parte fuerint: quum uero prægnaans est desinunt, conceptu autē ab utero exoluto rursus insunt, odorata & bibere, & ad uteri os apponere conducit. Quum mulieri alicui conceptus gratia medebris, ubi purgata esse uidebitur, & os uteri recte habuerit, lauatur, & caput cōfricetur, nullo autem unguine illinatur. deinde linteam in odorū lotum circum capillos ipsos circūdatum, reticulo loto aut nihil olenti obliget, ita ut primū linteam ipsum capiti imponatur, postea quiescat galbano ad uteri stomachū appposito, quod coctum ac molitum sit ad ignem, & nō ad solem. Deinde mane deposito reticulo cum linteo, uerticem suum alicui olfaciendum exhibeat, & si quidem oluerit, probe purgata est, sin minus, male. Hæc autē ieiuna faciat, & si nō fecunda fuerit, nūquam olebit, neq; purgata, neq; aliās, & si prægnaati idem medicamētum apponatur, neq; sic probe olebit. Quæ uero prægnaans futura est frequenter, & facile concipit, ac sana existit, etiam si nō apposueris neq; purgaueris, uertex ipsius olebit, aliud uero nihil. Vbi autē omnia probe uidebuntur, & ad uirum accedere oportuerit, mulier ipsa ieiuna sit: Vir autem non ebrius, frigida lotus, & comodo alimento nutritus. Et si cognouerit mulier geniturā se concepisse, eo tempore uirum non accedat, sed quiescat. Cognoscet autē si quidem uir se emisisse dixerit, ipsa uero præ siccitate ignorauerit. Si uero uterus rursus in pudenda genituram reddat, ipsaq; humecta fiant, rursus cum uiro coeat, donec concipiat.

Mulier quæ concipit quidem, perdit autē fœtus bimestres, exacte in eodem tempore, & neq; prius, neq; posterius, atq; hoc iterū atq; iterum perpeffa fuerit, immo si etiam trimestres aut quadrimestres, siue uetustiores perdiderit, iuxta eundem modum, Talibus uteri puero augescēte, & bimestre aut trimestre, aut quantūcūq; tempus transgredientē, si quando etiam aliās augescit, in maiorem amplitudinē non porrigitur, ita ut non ampliū sufficiant capiendū fœtui, sed propterea perditur eodem tēpore. Huic cucumerariū medicamētum

in uterum dare oportet, ipsumq; distendere ac inflare pharmacis appositis hisce. Cucumeris sylvestris medulla cōtundatur ac cribretur, deinde modicū de ipsa melle cocto copiosiori misceatur, addito silphio modico: sit autē uelut dixi, mel coctum. hoc circū specillum oblinatur, crassitudine formata quantā utri stomachus suscipere potest: apponatur autē ad os uteri, & impellatur quo in internā uteri partē penetret. Quū uero colliquuerit medicamētum, specillū extrahatur. Sed & elateriū hoc modo præparatū apponere potes, Similiterq; colocynthidem sylvestrē. Per hoc autē tempus edat allia quā plurima, & silphij caulem, & quicquid statim in uentre inducit. Hoc apposititium pharmacū per tertiam diem apponatur, donec probe habere uisa fuerit, copia quātam uterus admittit. Interiectis diebus, mollientibus utendum est: postquā autem ex mollientibus præparatum fuerit os uteri, post mensium apparitionē ubi sicca fuerit, cum uiro cōmisceatur. Si cui uterus suppuratus fiat, aut post partum, aut ex abortu, aut quomodoq; aliās, & nō in uasē alio ac tunica, uelut in tuberculo solet, pus fuerit: huic conducit specillum unctoriū in uteri os demittere. Minus enim opus fuerit uisura, si ad specillum processerit. deinde erucas à tithymalide colliges: habēt autem uelut aculeos quosdam, quos leniter rescindes, ne pabulum internum ex ipsis elabatur. deinde siccabis ipsas in sole, ac teres. Verumes quoq; stercorearios similiter in sole siccabis ac teres, & erucæ quidem pondus duorum obolorū Aeginæorum, uermium uero duplum miscebis, modico aniso addito, aut aliquo eius generis. Nam mali odoris medicamētum euadit. Hæc autem leuia facta ac cōtrita uīno albo odorato diluito, Et postquā biberit, grauitas accedit, & torpor in uentrē irruit. Si itaq; accedit, aquam mulsam modicā insuper bibat. Si qua liberis carens, imprægnatione ac puerorū generatione indigeat, atq; ea iam prægnans fuit ac peperit, & hoc ipsi cōtingat, aut quum stomachus uteri siccus, aut summa parte affectus, aut cōclusus fuerit, aut non recte habuerit, sed ad coxendicem alterum distortus, aut ad rectum intestinum occultatus, aut in seipsum contractus fuerit, aut labiū stomachi sibi ipsi ut cunq; incubuerit, aut stomachus uteri asper et callosus fuerit: durus autem fit, & à conclusionē, & à callositate: his mēses non apparent, aut pauciores quā oportet, & per longius tempus apparent. Sunt autem in quibus etiam menses iuxta corporis sanitatem, & uterorū exitum reperiuntur, inimo cōsuetō & iusto modo, & stomacho uteri præ caliditate ac humiditate mēsium non ualde læso. Verū genituram non suscipit propter hanc læsionē, quæ impedit susceptionē, stomacho nō recte habētē. Huic per totū corpus fomentū adhibere oportet, & pharmacū bibendum dare, ac corpore primū purgatā ac mundā reddere, siue superne & inferne opus habuerit, siue superne solum. Et si quidē superne purgans medicamentū dederis, fomentū ante purgationē non præmittes. Verum fomentū adhibebis inferne purgaturus. Si uero superne purgante medicamento non egere uidebitur, præmisso fomento, inferne purgans bibendum dato. Quum autem probe purgatum esse corpus uidebitur, postea utero fomētum adhibeto, frequentes infusus ipsis adornans, si ita conferre uidebitur. Immitte autem in fomētum, cupressi ramenta, & lauri folia cōtusa, lauabisq; multa & calida aqua. Vbi uero recēs lota fuerit, & fomētum admiserit, uteri os dilatabis specillo stanneo, corrigesq; ubi opus fuerit: potes & plumbeo uti, initio

tio per paruum factō, deinde crassiore adhibito si suscipere potest, donec recte habere uidebitur. Intinges autē specilla in mollitorio quopiā diluto, aut etiā li-
 quido reddito, si cōferre uidebitur. Specilla ipsa retro caua facienda sunt, deinde
 de circū ligna longiora adaptanda, sicq̃ ipsi utendū. Cāterū hoc tēpore bibat,
 in uino albo odorato dulci & q̃ suauissimo decoctam tādā q̃ pinguisimam,
 in tenuia segmēta cōcisam, & apij semen cōtusum, & cumini Aethiopici semē,
 & thus q̃ optimū. ex hoc bibat ieiuna copia quāta moderata esse uidebitur, tot
 diebus quot satis habere uidebitur. Et edat catulos coctos, & polypum in uino
 dulci coctum, iusculumq̃ ipsum bibat, & brasicā coctam, Vinū autem album
 insuper bibat, & ne sitiat, & calida bis per diem lauet. A cibis autē hoc tempore
 abstineat, ab eo uero tēpore si quidē proeesserit per stomachum, & quid purga-
 tionis foris apparuerit, adhuc de potione bibēdum est unum atq̃ alterū diem,
 & a specillorū usu desistendū, ac conandum ut uteri apposititijs medicamentis
 purgentur. Cuiuscūq̃ autē stomacho recto, ac magno & sano existēte, ac probe
 habente, & in loco ubi conuenit & oportet sito, mēses nō apparuerint ex toto,
 aut pauciores, & per longius tempus, & non sani, morbū ipsum inuestigabis
 quēcūq̃ tandem uteri habēt, & si corpus quoq̃ aliquid conferat, causam per-
 scrutaberis ob quam non concipit; & hēc sic habeant, & curationē facies si me-
 delam suscipere uolet, initio a fortibus factō, prout opportunū uisum fuerit, ita
 ut desinas in molliorū usu, donec uterus uisus tibi fuerit probe esse purgatus,
 & stomachus recto statu esse constitutus, & rite situs. Si uero a potu ac medica-
 mento menses non processerint, etiam si moderato tempore id biberit, nequa-
 quam a potu cessandum est: ubi uero probe habuerit, specillorum usu os sto-
 machi molliendū est, & faciēdum ut hiet, ac uiam præbeat appositio medica-
 mento, idq̃ pharmacis suffitui aptis ac molliētibus perficies. Quum autem sa-
 tis suffitum ac mollitum esse uidebitur, appposito medicamēto subditio uteri
 purgationē facies, donec rite habere uidebitur, a mollibus ad fortiora progres-
 su factō, ita ut rursus in mollibus ac odoratis desinas. Nam pleraq̃ ex fortibus
 medicamentis stomachum exulcerant ac corrodunt. Deinde uero tum stoma-
 chum ad rectum statum ac sanitatē redigito, quo aptus sit ad suscipiendam ge-
 nituram, tum uterum siccum reddito, & flatū immittito. Si mulier præ pin-
 guitudine uterum ad concipiendum læsum habere uideatur, attenuatio q̃ ma-
 xime, & gracilitas inducatur, supra reliquam curam. Tempus porro uernū ap-
 tissimum est ad cōcipiendum. Vir autē non sit ebrius, neq̃ uinum albū bibat,
 sed quod fortissimū est ac meracissimū, itemq̃ edulia fortissima, & calida nō la-
 uet: robustus autem sit, & sanus, & a cibis abstineat ad rem non conferentibus
 Et ubi marem generare uoluerit, mensibus desinētibus aut defectis misceatur,
 & quā penitissime intrudat, donec desæuiat. Vbi uero foemellam genera-
 re uolet, quum plurimi menses prodierint mulieri, & dum adhuc eunt, coeat,
 ac dextrum testem obliget, quantum id tolerare poterit: sed si marem generare
 expetat, sinister testis obligandus erit. Stomachus uteri a suffimentis qui-
 dem, ubi cōclusus fuerit, hians redditur, ab emollientibus uero mollescit. Sus-
 fire autem oportet, loti corticem, lauri semen siue baccas, & folia eiusdem uiri-
 dia contusa, thus, myrrham, artemisīe semen aut folia: item anisum & adipem
 aut ceram simul contusa, sulphur, cupressi semen, peucedani radicem, myrti
 folia

folia uiridia contusa, fibri testem, asini masculi stercus, allia, styracē, adipem suillum, sed & si distortū os uteri fuerit, his suffiendū est. Sic quidem igitur hians redditur ac conuertitur. Mollire aut per hæc uteri os oportet, sandaracham uidelicet, adipem caprinum, fici succum, silphij succū, cyclamini succum, Thapsiam, succum tithymalli, cardamomi semen, herbam quæ peplos appellatur, fibri testem, lini semē, nitrum, ari radicem, staphidem syluestrem, calaminthæ folia uiridia, herbæ lanariæ siue struthij semen, scillę internam partem.

Medicamenta emollientia, & ad ciendū idonea, quo fortis purgatio fiat.

Thapsiæ radicem, medullam bouis, adipē anserinū, rosaceum, hæc trita ac feruefacta per quadriduū apponat, & bibat porri succum, ac uinū dulce album. Item resinā, & oleum tepidum, cuminū, nitrum, mel, sordida lana excipiat, & per quadriduum utatur, bibatq; apij semen, & thuris nucleos quinq; & cuminum Aethiopicū in uino albo meraco dulci, lauetq; bis per diem.

Item myrrham, thus, fel bouis, resinam terebinthinā, aut netopon siue metopium unguentū, horum singulorū æqualem, mēsuram misceat, & in lana pura, aut linteo tenui apponat. Intingat aut linteum in unguento albo Aegyptio odorato, & filo obligatum, à balneo subdet, & polypum plagis mollitū edat, & apij ac asparagi semen ac uinum albū bibat, ter in die ieiuna existens. Aut myrrham, casiam, thus, cinamomū, netopum, singulorum æquas portiones lana exceptas, aut in glandes redactas apponat. Aut cucurbitæ syluestris interiora, cuminū tostum, anethi semē, cupressi radicem, trita ac melle cocto subacta in glandes cogito, easq; subdendas exhibeto, & bibat Pæoniæ radicem, apij semen, ac silphij succum, cum uino. Sed & Bulbium ipsum subditū purgat.

Item myrrhā primariā, & florem æris modicū in uino albo odorato subdat.

Medicamenta subdititia ad uterū purgandum cōuenientissima.

Accipe æris florem ac nitri tertiam partē, mellēq; cocto subacta in glandulas iustæ magnitudinis ac crassitudinis redige, atq; sic ad uteri osculū appone, si uero fortius facere uelis, elateriū ammiscē, ad florem solum, & hoc modo coactas glandulas subdendas præbe. Potes & ramulorū fici corticem detrasum ac tenuiter tritum ammiscere, quum os uteri siccus esse uidebitur, dimidia portione eodem modo. Aliud. Elaterium & æris florem trita, duabus floris partibus, una elaterij acceptis, dilue, & cyclaminū tritum prout oportuū uidebitur ammiscē, & in lana simul coacta subde.

Glandulæ album fluxum purgantes.

Artemisiā herbam, nitrum, cyclaminum semiaridum, cuminum, subde. Alia. Artemisiā herbam uiridē tritam, & myrrhæ tertiam partem, ammixto uino odorato, in lana alba obuolue, eamq; uino tinctam apponēdam præbe. Vbi uero hiauerit uterus, nitrum, cucumeris syluestris medullam, cyclaminum semiaridum, in lana appone.

Subdititia omnis generis purgare potentia.

Staphidē syluestrem uiridē tritā, artemisiæ herbæ folia trita, melle cocto excipe, et in umbra siccata in glādulas coge, ac subdēdas exhibe. Aliud. Flore æris, & alumen Aegyptiū cū cyclamino dilue, & uelut priora melle cocto excipe, aut in caricā inde, cū modica myrrha. Aliud. Cyclaminū tritam uino albo odorato ammixto, in linteo tenuissimo puro obliga, & subdendā præbe.

205 Aliud. Cyclaminum semiaridum, nitrum, cantharidas, adipem, sandarachē, subde.

De uirgine.

270 Si uirgini menses maturi nō prodeant, mulcū & febricitat, & dolet, & sitit, & esurit, & uomit, & furit, et rursus respiscit: uterus mouetur, & quā ad uiscera uertitur, uomitus, ac febris, & deliriu accedit, ubi uerō sedatur uterus, & hæc quiescunt, esurit, ac sitit, & febris lenis, hepialon græci dicunt, tenet, Huic pelles agninas calidas ad uentrē apponere oportet, & suffitu facere in ipsa pendenda q̄ penitissime, ita ut super amphoræ collo desideat, & fumum admittat. Fiat autē suffitus ex myrrha magnitudine fabæ, & thuris dupla portione, amixta etiam zea fresa. hæc simul suffire debet, & in ignem immittere maxime dum ieiuna est, & multa calida lauare.

Medicamentum subdititium.

A Lumen Ægyptium emollitum lana inuolutū subdat. Aliud. Artesmisiā tritam, & uino albo subactam, apponendam præbe.

Puerperæ recens enixæ.

280 R Ofaceum, myrrham, ceram, mixta in lana apponenda præbe. Vbi autem uterus ipsi prociderit, acida & acerba offerenda sunt, tum potāda, tum foris adhibenda. Item ficum nigram, allium, nitrum, cuminum, hæc omnia tenuiter trita in lana apponenda dato. Aliud. Sepiæ testam tusam, & uino imbutam, cum leporinis pilis, lana excipe, & apponendam præbe. Si uero post partum uterus doleat, ptissanam, & porrum, ac adipem caprinū coquat, indeq̄ modicū sorbeat.

Subdititium medicamentum.

285 Nitrum, cuminum, ficum, omnium æquas portiones subde.

Subdititium purgans & molliens.

290 N Etopum, rofaceum unguentū, adipem anserinū, linteis tenuibus excipe. Si menses multi prodeūt, Pæoniæ grana nigra bis septem numero, in uini cyathis duobus bibenda præbe. Si uero uteri frequēter prolabantur, uteros aquā tepida madefacies, ipsam uerō mulierem supinā reclinabis, miscebisq̄ mali coriū, gallam, & rhoem rubrā, hisq̄ in uino albo tritis uteros illines, ac immittes. Postea lauri folia in uino austero bibēda dabis. Quū autem mulier prægnās menses profluos habet, sterqus asini siccū, & rubricā, ac sepiæ testam, trita simulq̄ linteo illigata apponat, si uero secūda nō purgetur, elaterij oboli Attici pōdus in uini albi Cyathi mensura tritum bibendum præbe, & purgabitur.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE EXECTIONE FOETVS, IANO CORNARIO Medico Physico interprete.



E his qui nō iuxta naturalem modū pariuntur, sed excinduntur, hoc modo ferēs habet. Primum quidem Sindone supra mulierē iniecta, eam supra mīmmas circūdato, & caput obuelato, ne uidens quod facturus es timeat ac exhorrescat. Si itaq̄ foetus oblique prolāpsus manū protēsā habuerit, manū apprehēsa foras producere q̄ maxime conare, & brachiū ipsum excoriato, atq̄ ubi os brachij denudaueris, squatinæ pellem

pellē circū duos manus digitos obligato, ne caro lubricitate sua elabatur. Deinde uero carnem circa humerū rescinde, ipsumq; iuxta iuncturam exime, post ea caput iuxta naturam protrusum foras producere tenta. foetū uero ipsum intro protrudito, ferramento per latus & costas, siue clauiculam adacto, quō flatus emittat foetus, & confidat ac cōtrahatur, atq; ipsi faciliōr exitus pateat. Cæterum caput si fieri potest iuxta naturam extrahe, sin minus, confringe: atq; sic foetū unā subextrahe. Postea calida large perfusam, & oleo illitam decubere iubeto, pedum situ alternatim uariato. Bibat autem uinum dulcē, album, meracius uo temperatum. Sed & resina melle trita ac uino ammixta, in potū præbeatur. De cætero uero curanda est, uelut dixi, iuxta ea quæ relata sunt. Quum uero parienti mulieri foetus oblique prolapsus fuerit: id quod contingit dum uertitur puer, & umbilicus circū collum obuoluitur, & exitum foetus impedit, & caput in coxendicem incumbit, & manus ut plurimum foras prominet, quōd ipsum mortui foetus signum est. Quibus autem manus non exerta est, ut plurimū uiuunt foetus, periculum autem etiam hoc modo est. Aliquæ enim purgamenta ante partum mittūt, & necesse est cognoscere ex eo partum siccum, & cum dolore laboriosum esse. Quibus autem purgamenta ante partum non prodeunt, hæ in pariendo facilius liberantur. Concutere porro oportet hoc modo. Sindone substrata mulierem reclinabis, & aliam superinijcies, quo pudendum ipsius sit obuclatum, obuoluesq; sindonem circum utrūq; crus & circum utranq; manum. Mulieres autem duæ utranq; crus apprehendant, & aliæ duæ utranq; manum, deinde concutiant ualide ipsam tenentes nō minus quā decies. Postea in lectum reclinetur mulier in caput, ita ut crura sursum uergāt, & mulieres omnes ipsum pedibus corripiant, manibus dimissis, sæpēq; concutiant, ac reiectionem in humeros faciant in lecto, quo foetus in spaciōsiorem locum retrusus uertatur, & naturaliter prodire possit. Et si dictamnū creticum habueris, ipsum bibendum dabis: sin minus, fibri testem in uinum chium derades. Si uero uteri foras prodierint, siue ex dolore, siue ex partu, si quidem iuuentulæ fuerint, aggressiōem facito: sin minus, finito. Aggressio autē hoc modo fiat. Pelliculam uteri iuxta naturalem modum & oblique incisam, linteo cōfricato donec inflammetur, & illinito phocæ oleo siue adipe, aut pice, aut mali punici flore integito, & molles spongas uinō resperfas apponito, & ex humeris ipsas alligato. Mulier uero decubat cruribus quā maxime sursum uersus porrectis.

Moderatis autem edulij

uescatur.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE DENTITIONE, IANO CORNARI

rio Medico Physico interprete.



VERI natura habitiores, non pro carnositatis ratione etiam lac sugunt. Voraces uero & multum lactis trahentes, non pro ratione carnosifuerunt. Pueri sugentes si multum mingant, minime anniculi fiunt. Quibus aluus multum profluit, & bene concoquunt, hi saniores sunt. Quibus modice profluit, & uoraces sunt, & non pro ratione similiter nutriuntur, morbofi. Quibus multum lactosum reuomitur, his aluus supprimitur. Quibus in dentitione aluus amplius subducit, minus conualluntur, quam quibus parum. Quibus in dentitione febris acuta accedit, parum conualluntur. Quicunque dentientes habitiores manent, & altiore somno utuntur, periculum est ne conuulsione corripiantur. Qui hyeme dentiunt, reliquis similibus existentibus, melius liberantur. Non omnes in dentitione conuulsi moriuntur, sed multi etiam seruantur. Qui cum tussicula dentiunt, tardius dentes producant, in perpunctione autem magis gracilescent. Quicunque in dentiendo hyemem habent, si attente tractentur, dentitionem facilius ferunt. Qui plus mingunt quam egerunt, pro ratione habitiores sunt. Qui non pro ratione mingunt, uerum aluus frequenter cruda a pueris egessit, morbofi sunt. Qui bene dormiunt, & habitiores sunt, multum alimentum adsumunt, idque adiacet, non sufficenter distributum. Qui dum sugunt interim cibum adsumunt, facilius ab lactatione ferunt. Qui saepe cruenta ac cruda per aluum egerunt, plurimi in febre somniculofi sunt. Ulcera in tonsillis citra febrem facta, securiora sunt. Quibus infantibus in sugendo tussis instat, uiam maiorem habere solent. Quibus cito in tonsillis ulcera serpentia confidunt, febribus ac tussi permanetibus, periculum est rursus generanda esse ulcera recurrentia. Ulcera tonsillarum in infantibus periculosa. Pueris memorabilis magnitudinis, si ulcera in tonsillis sint, & deglutire possint, salutis signum est. Quum uero maiores prioribus, deglutire in tonsillarum ulceribus non possunt, his multum bilem reuomi, aut per aluum prodire, periculosum est. In ulceribus tonsillarum si quid araneosum inest, non bonum. In tonsillarum ulceribus post prima tempora, pituitam per os effluere, si prius non fuit, commodum est, & tamen reducenda est. Si uero incipiat, & omnino remittat, gaudendum est. Si autem non sic effluat, uereri oportet. Qui tonsillas destillatione uexatas habent, his aluus amplius subducta, siccas tusses soluit. Verum pueris si quid concocti superne prodierit, amplius soluit. Ulcera multo tempore in tonsillis citra augmentum manentia, ante quintum aut sextum diem periculosa non sunt. Sugentes qui multum lactis adsumunt, ut plurimum somniculofi sunt. Sugentes qui non probe aluntur, macilentifuerunt, & aegre uires colligunt. Ulcera in tonsillis aestate facta, peiora sunt quam alijs temporibus, citius enim proserpunt. Ulcera in tonsillis citra uiam proserpentia, in his qui seruatur uocem alterant. Ulcera proserpentia circa fauces, grauiora & magis acuta, ut plurimum spirandi difficultatem inducunt.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE CORPORVM RESECTIONE, IANO COR

nario Medico Physico interprete.



ARTERIA ex utraque faucium parte exortum faciens, in summam pulmonis desinit, circulis composita consimilibus rotundis, in superficie se mutuo contingentibus. Ipse autem pulmo testitudinem coadimplet, in sinistra conuersus, quinque apices habens, quos lobos & summitates uocant, cinereo colore praeditus, notis cauernosis compunctus, naturaeque antrosus existens. Ad medium uero ipsius cor situm est, rotundius ac oblongius quam in omnibus animalibus. A corde uero ad hepar multa chartilaginosa arteria procedit, & cum ipsa uena magna appellata, per quam totum corpus nutritur. Hepar autem similitudinem quidem cum omnibus alijs habet, uerum sanguinolentius quam alia existit, apices habens duos, quos portas appellant, in dextris locis sitas. Ab hoc uero obliqua uena inferne ad rhenes tendit. Rhenes autem consimiles colore, malorum speciem praeseferunt. Ab his canales obliqui ac ferme triangulares in summum uesicae apicem tendunt. Vesica autem tota neruosa est, magna quoque ac late se extendens capacitas intra eam a natura disposita est. Et has sex partes intus per medium corpus natura disposuit. Gula autem a lingua principium faciens, in uentrem desinit, quam sane graeci etiam oesophagum, & stomachum, id est os uentris, significanter appellant. Caeterum a spina retro hepar, septum transuersum productum est. Ex latere uero notho, sinistro uidelicet, lien initio sumpto extentus est ad humani uestigij similitudinem. Venter autem hepatis adiacens iuxta sinistram partem, totus quidem est neruosus. A uentre uero extat intestinum uentri consimile, longum cubitorum non minus duodecim, pampinoformiter in sinibus inuolutum, quod aliqui columm uocant, per quod alimenti delatio contingit. A colo autem situm est rectum ac princeps intestinum postremum, carnem copiosam habens, & in summum anum desinens. Reliqua porro natura ipsa ordinauit ac disposuit.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE CORDE, IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.



COR figura uelut pyramis est, colore autem abunde puniceum, & tunicam leuem circumdatam habet, et est in ipsa humor modicus uelut urina, ut putare possis in uesica cor diuersari. Facta est autem ea gratia, ut sanum in custodia florescat. Habet autem humiditatem tantam quanta satis est aestuanti in medellam. Caeterum hunc humorem cor emingit, bibendo ipsum assumens ac consumens, pulmonis nimirum potum lambens. Etenim homo multo maximam partem in uentre bibit, Gula enim siue stomachus uelut infundibulum, potus copiam & quaecumque uolumus excipit. Bibit autem &

in guttur ac arteriā, minus uero & quantū latere possit per rimam illapsum, Oculum enim exactum epiglossis, lingula siue minor lingua appellata, ne per miserit quidem aliquid amplioris potus penetrare. Signum autem huius rei hoc est Si quis enim aquam cæruleo colore, aut rubrica temperatā, sitienti ualde bibendam dederit, maxime sui, hoc enim pecus nō est curiosum, neque mūdici deditū. Deinde dū adhuc bibit ipsius guttur resecat, hoc colore ipsum tinctum reperiet: sed nō est cuiusuis hæc chirurgiæ aggressio. Nequaquā igitur fides nostra suspecta esse debet de potu, quod homini in guttur uergat. Sed quomodo aqua acruatim irruēs, turbationē ac tussim multam exhibet: propterea in quā, quod contra respirationē fertur. Quod enim per rimam illabitur, tanquā iuxta parietem delabēs, aeris elationi nō instat, sed leuem ac lubricam quādam uiam humectatio ipsi præbet. Hunc itaque humorē cor de pulmone unā cū aere abducit. Aerē quidē igitur ubi in medelam celsit, necessario oportet retrō per eandem uiam qua adduxit rescere. Verū humorē partim in culeū ac uaginam suam expuit, partim rursus unā cum aere foras propellit. Quapropter etiam palatum eleuat, quum spiritus recurrit. Merito autē recurrit. Non enim humanæ naturæ alimenta hæc sunt, Quomodo enim hominis alimētum sint uentus & aqua cruda: sed sunt magis cognata affectionis castigatio & medela. Porro ut ad institutum sermonē reuertamur. Cor musculus est ualde fortis nō neruio, sed densitate ac cōstrictione carnis, & duos uentriculos habet discretos in uno amiculo, ab utraq; parte unum. Nihil autem inter se similes sunt. Alter enim in dextris ad osculum situs est, contingens alteram uenam. Alter in sinistris. Totum enim cor in his sedem suam firmauit. Sed ille etiam omnino amplioris uentris, & magis inanis quā alter est, neque extremitatē cordis attingit, sed caudam eius ambit, solidus item est, ueluti extrinsecus assutus. Alter autem subter sinistram māmam maxime in directū situs est, ubi etiam saltus ipsius significationem sui præbet. Amiculum autē habet crassum itemque foueam. Foueæ enim speciem præ se fert similem mortario. Sed enim hic etiam pulmonem subit cum mansuetudine, & circūiectu ipsius, caloris intemperantiam castigat. Etenim pulmo natura frigidus est, sed & inspiratiōe perfrigeratur. Ambo autem densi ac asperi sunt interna sui parte, et uelut subcorrosi, magisque sinister quā dexter. Nam insitus à natura ignis nō est in dextro. Quare mirū est sinistrum asperiorē fieri, ubi intemperatū aerem inspirauerit. Quapropter etiā roboris caloris custodiēdi gratia crassius intus cōstrictus est. Oscula autē ipsis nō sunt aperta, nisi si quis cordis aurículas præsecet, aut caput cordis præcidat. Si autem quis præsecet, apparebūt duplicia oscula in duobus uentriculis. Crassa enim uena ex altero excurrentis uisum decipit, si fuerit resecta. Hi fontes sunt humanæ naturæ, & hic flumina sunt quibus totū corpus irrigatur: atque hi etiam uitam homini cōferunt, & ubi reficcati fuerint, homo moritur. At uero prope exortum uenarū, corpuscula circum uentriculos cōsurgunt, mollia, cauernosa, quæ auriculæ appellantur. Non sunt autē foramina aurium, non enim clamorem exaudiunt. Verum sunt organa quibus natura aerem rapit. Et sanē uidetur mihi hi boni ac præstantis artificis opificiū esse. Quum enim considerasset figuram solidam futurā ipsius uisceris, propter sanguinis ex uenis effusi collectionē ac concretionē, deinde attractoriū ipsum esse totum uidisset, folles ipsi apposuit, quem

quemadmodum fabri ferrarij fornacibus solent, quo per ipsos spiritum apprehenderet. Signum autem sermonis hoc est. Etenim cor uideas ex toto uentilari, aures uero priuatim tum inflari, tum cōsidere ac contrahi. Et propter hoc etiam dico, quod uenæ quidem operantur respirationē in sinistrum uentriculū, arteria autem in alterum. Molle enim magis attrahit, & incrementū capit. Opertebat autem nobis magis incumbentia cordis tegmina perfrigerari. Est enim calor nō in dextris: quare propter hanc affectionē, non acceperūt amplum organum, ut ne in totum ab ingrediente aere superarentur. Restant dicēdæ cordis pelliculæ latentes, opus dignissimū cognitione. Sunt enim & aliæ quædam in uentriculis pelliculæ, uelut araneorum telæ extēntæ, quæ undiquaque oscula cingunt, & strias ac segmenta in solidum cor inserūt. Hæ mihi nerui ipsius uisceris, & uasorum principia aortis esse uidentur, est autem ipsarum par unum. Cæterum osculis singulis tres pelliculæ subornatæ sunt, rotundæ in summo, uelut circulus semisectus. Et qui rei intelligentes sunt admirātur, quomodo oscula & aortarum fines claudunt. Et si quis ueteris, eximendi cor mortui, moris gnarus, aliam auferat, aliam reclinet, neq; aqua, neq; flatus immissus in eor penetrarit, atq; hæ magis in sinistri uentriculi osculis exactius, & merito sanè subornatæ sunt. Mens enim hominis in sinistro uentriculo insita est, & reliqua quæ animæ imperat. Nutritur autē neq; cibis neq; potibus à uentre, sed pura & illustri substantia ex sanguinis discretione nata. Adsumit autem alimentū ex proxima sanguinis cisterna, radios suos eò immittens, & depascēs, uelut ex uentre intestinorum alimētum non naturale existat. Quo uero nō in mora sit, qui in arteria est in fluctuatione cōstitutus cibus, uia in ipsam occludit. Magna enim arteria uentrē depascitur ac intestina, plenāq; est alimento nō principali. Quod autē non nutritur sanguine apparente, & quē uidemus, arteria ipsa magna, ex hoc manifestū existit. Mactato enim animali, & sinistro uentriculo dissecto, tota desolata apparet, modico seroso humore excepto, flauaq; bile, ac pelliculis, de quibus iam mihi dictū est. Arteria autē altera sanguine nō est destituta, neq; uentriculus dexter. Hoc quidem igitur uas causa fuit, mea sanè sententia, ut pelliculæ producerētur. Id uero quod ex dextro fertur uentriculo etiam ipsum quidem cōmissura pellicularū clauditur, uerū non ualde salit præ imbecillitate. Sed aperitur quidem in pulmonis uasa, sanguinē exhibens ipsis in alimentū, clauditur autem in cor, nō tamen cōfestim, quo ingrediatur quidē aer, non autem multus. Debilis enim est hic calor, frigiditatis facultate superatus.

Sanguis enim nō est natura calidus, neq; enim alia aliqua aqua, sed calefcit, Multis autem uidetur natura calidus esse.

Et de corde sanè talia dicta sint.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE GLANDVLIS, IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.



DE GLANDVLARVM tota natura sic habet. Natura ipsis est spongiosa, Sunt enim raræ & pingues, & neq; carnes sunt reliquo corpori similes, neque aliud quid simile corpori, Sed friabiles sunt, & uenas multas habent. Si uero disseces, sanguis largus erumpit, specie albus & uelut pituita. Tangenti autem uelut lanæ apparent. Et si multa ui ipsas digitis com-
 5 presseris, glandula humorem oleosum remittit, qui & ipse
 10 conteritur ut plurimum, ac disperit. Aegrotant autem non ualde, sed una
 cum reliquo corpore. Quum uero proprio morbo aegrotant: nam parum eti-

am cum reliquo corpore aegrotant: morbi tubercula fiunt, & strumæ resultant,
 & febris corpus occupat. Perpetiuntur autem hæc, ubi humiditate repletæ fue-
 rint, ex reliquo corpore in ipsas influente. Influit autem ex reliquo corpore per
 uenas, quæ per ipsas extentæ sunt multæ & cauæ, ut humor quemcunq; tan-
 dem traxerint, facile in ipsas sequatur. Et si multa ac morbosa fuerit fluxio,
 glandulæ reliquum corpus in se distendunt, atq; sic febris incenditur, & eleuan-
 15 tur ac inflammantur glandulæ. Cæterum glandulæ in corpore sunt plus
 res siue maiores, in cauis ipsius partibus, quàm in articulis, & quæcunq; in ar-
 tibus humectis ac sanguinolentis locis consistunt: atque illæ quidem, ut quod sus-
 perne in cauas partes influit, suscipientes in se trahant, hæc uero ut rursus na-
 20 scentem præ laboribus humiditatem in articulis, si quam articuli remittant, e-
 ius multitudinem susceperint: & sic nimia humectatio in corpore non inest.

Nam si etiam quid gignatur humiditatis, non statim nimia humectatio inde
 successerit. Reflectitur enim & consumitur tum multa, tum modica, in ipsas
 glandulas, atque sic reliqui corporis redundantiam glandulæ sibi lucrifaciunt,
 & alimentum hoc est ipsis coalescens. Quare ubi cœnosæ partes sunt & hu-
 25 mectæ, ibi etiam glandulæ. Cuius signum est, Quod ubi est glandula, ibi etiam
 pili. Natura enim facit glandulas & pilos, utraque eadem utilitate partici-
 pantes. illas quidem ut quod influit, uelut antea dictum est, suscipiant.

Pili uero ex glandulis opportunitatem habentes nascuntur & augescunt,
 colligentes id quod in extremitates redundat ac efferuescit. Vbi autem cor-
 30 pus siccum est, neque glandula, neque pilus inest. At uero teneræ & exerci-
 tijs deditæ & humectæ partes, glandulosæ sunt ac pilosæ. Glandulæ por-
 ro sunt ab utraque aurium parte iuxta iugulares colli uenas, & pili etiam ibi
 dem. Item sub alis utrinque & glandulæ & pili sunt. Inguina & pubes
 similiter ut alæ, & glandulas & pilos habent. Et hæc quidem cauæ corpo-
 35 ris partes sunt, & ad humoris redundantiam expositæ. Nam & laborant hæc,
 & ex omnibus corporis partibus maxime mouentur. Reliquæ uero glandu-
 las tantum habent, uelut intestina. Habent enim & hæc glandulas in or-
 gumentum maiores: pilos autem non habent. Nam & in cœnosis ac humectis
 40 terræ

terræ locis; semen non nascitur, neque supra terram ascendere conatur, sed per redundantiam putrescit ac suffocatur. Violat enim semen, Violat autem & in intestinis copia ac multitudo humoris, & pilos enasci non sinit. Glandulæ autem in intestinis maiores sunt, quàm alibi in corpore, & pascuntur humectationem nimiam ex intestinis exprimentes. Intestina uero ex uasis in omentum suscipiunt ac remittunt humiditatem. Omentum autem in glandulas distribuit. Habent præterea etiam rhenes glandulas, Nam & hi multa humiditate exfatiantur. Maiores uero etiam hac parte quàm aliæ glandulæ existunt. Influxus enim humor in rhenes non imbibitur, sed perfluit infra in uesicam. Quare quicquid eius lucrifaciunt de canalibus, hoc ad se trahunt. Sed & aliæ in corpore glandulæ sunt paruæ ualde, Verum non uolo hunc sermonem longius euagari permittere, Nam earum quæ alicuius momenti sunt gratia, hoc scriptum institutum est. Nunc itaque sermone progressum faciam, & dicam de tota natura glandularum colli. Collum ab utraque sui parte hinc et hinc glandulas habet, & uocantur hæ glandulæ tonsillæ, in hunc usum atque utilitatem. Caput supra situm est, sursum cauum ac rotundum existens, & humiditatem ex reliquo corpore complectens, & corpus simul uapores omnis generis sursum in caput demittit, quos caput rursus retro dimittit. Non enim immorari ac manere potest id quod influit, non habens ubi sedem firmet. Nisi sanè caput ægrotet. Tunc enim non remittit, sed isthuc retinet. Postquam uero attractionem remisserit in glandulas fluxio uergit, & nihil molestat, donec pauca & moderata fluxio fuerit, & ipsæ glandulæ ualidæ ac potentes extiterint. Si enim multa & acris influxerit, manseritque acris & glutinosa, inflammatur ac intumescit & collum distenditur, atque sic ad aurem progreditur, & si quidem in utraque partem processerit, utraque auris: sin ad alteram, altera tantum ægrotat. Si autem pituitosa, & multa ac lenta fuerit fluxio, etiam sic inflammatur, & inflammatio quum stabilis humor existat, strumas pessimum colli morbum generat. In alas autem etiam tunc quid confluit. Sed ubi copiosi fuerint acres & serosi humores, etiam sic in ipsis tubercula producuntur. Sed & in inguinibus glandula à partibus supra sitis humiditatem trahet, sed ubi multitudo eius occupauerit, inguina intumescunt, & suppurantur ac inflammantur, similiter ut alæ ac collum. Atque hæc sanè tum bona, tum mala glandulæ exhibere uidentur. & de his quidem hæc suffecerint. Porro intestina multam satietatem ex cibis ac potibus habent, & præterea humiditatem sub cuticula habent. Sed & hæc tota reflectitur ac consumitur in glandulas, similiter uelut superior. Morbos autem non facit ferè, quemadmodum in articulis contingit. Frequentes enim glandulæ & expassæ, ac non cauæ sunt, & altera alterius multitudine non multum fruitur, & aliàs si qua etiam plus habere uelit, copiam eius habere non potest, Sed quod in paucas ac singulas confluit in articulis, id in multas hic diuiditur, & æqualitas ipsis existit.

Caput etiam ipsum glandulas habet, cerebrum nimirum simile glandulæ. Est enim cerebrum album ac friabile, quemadmodum etiam glandulæ. Et ob id in commoditatem capitis glandulas facit, & per relatas à me cerebrum auxilium ferens humiditatem aufert, & in extremitates foras ablegat, per fluxiones ex magna parte. Maius autem est cerebrum quàm aliæ glandulæ, & ca-

pilli etiam maiores quam alij pili. Maius enim est cerebrum, & in amplo spacio in capite situm est. Facit autem morbos & minores, & maiores, quam aliae glandulae, facit autem quum in infernas corporis partes redundantiam ac superfluitatem suam ablegarit. Fluxiones porro de capite usque ad secretionem contingunt, per aures secundum naturam, per oculos, per nares, atque haec tres sunt, & aliae per palatum in guttur, & in gulam, & alia per uenas in medullam spinalem, & in sanguinem. Quae omnes septem numero existunt, haec fluxiones cerebri fordes ac purgamenta discedentes existunt, & si non discesserint, morbus ipsi inde oboritur. Sic autem & reliquo corpori aliqui morbi accedunt, si intro abierint ac discesserint haec fluxiones, & non foras. Et rursus turbatio multa oboritur, si hianter ac affatim attrahat, & acrem quidem fluxionem cerebrum demittat, quae in fluxiones corrodit & exulcerat. Et si id quod cerebro influit copiosum fuerit, fluxio descendens non desinet, donec multitudinem influentis exhauserit atque sic id quod influit foras demittens, & aliud suscipiens, ac semper in consimili statu consistens, & humores trahit, & morbos facit. Ambo autem magno taedio ac molestia naturam frangunt, quae si fuerit affecta, dolorosa afflictio existit. Affectio enim naturae sunt praedictae fluxiones, & multitudinem moleste ferunt, & morsum ac roSIONem perceptat, ex eo quod praeter rationem & non consuetum existit. Cerebrum autem cladem perfert, etiam ipsum non sanum existens, sed si quidem rodatur, turbationem multam sustinet, & mens desipit, & cerebrum conuellit ac distrahit totum hominem, qui in seipso uocem non edit, ac suffocatur, & haec affectio sideratio, ac graece apoplexia appellatur. Aliquando uero acris quidem non est fluxio, sed copiosa in cerebrum irruens, ipsum affligit, & mens perturbatur, & homo circum ambulat, aliena cogitans, & aliena uidens, perferens morbi mores, uisis, risu, & peregrinis imaginationibus. Alia fluxio ad oculos ophthalmia graecis, latine lippitudo appellatur, & oculi in ipsa intumescunt. Si uero ad nares defluxio fiat, arroduntur nares, & nihil aliud graue accedit, nam uiae ipsarum amplae sunt, & sibi auxiliari possunt, insuperque non compactum est quod ab ipsis discedit. At uero aures intortus quidem meatus & angustus, cerebrum autem prope ipsum ipsis auribus apprimitur. Aegrotans uero hoc morbo, plurima excernit, & auris a frequenti fluxione per tempus uexatur, & pus graueolens effluit. Sic etiam fluxiones ad oculos foris conspicuae sunt, & non lethales in totum. Si uero fluxio retro processerit per palatum, & in uentre pituita peruenerit, fluunt quidem horum uentre, non autem aegrotant. Si uero inferne maneat pituita, affectiones uoluuolae fiunt diurnae. Alijs autem si per palatum in guttur multa fluxio contingat, ut plurimum morbi tabis oriuntur, replentur enim pulmones pituita, atque ea ipsa pus fit, id quod pulmones exedit, & aegroti non facile superstitites manent, & mens medici si bonus & prudens est, ut plurimum causam intelligit. Alius morbus oritur ex defluxione capitis per uenas in spinalem medullam. Inde autem in sacrum os impetum facit, quo medulla ipsa fluxionem perducit, & in coxendicum acetabula siue iuncturas deponit. & si tabem fecerit, homo marcescit, atque hoc modo contabescit, & uiuere non expetit. Statim enim scapulae dolent, amboque pedes ac crura consequuntur, & semper tandem pereunt multo tempore curati, atque sic deflorescit homo ac moritur.

Haec mihi de fluxionibus capitis dicta sunt. Sunt autem affectiones cerebri, etiam

etiam alij morbi, Deliria, insaniæ, omnia periculosa, & ægrotat cerebrū, & alia glandulæ. Habet enim & dolorem, & alius congressus corporis hic contingit, Quin & glandulæ in pectoribus mammæ appellantur, & attolluntur ac lac faciunt, aliquibus uero lac non faciunt. Et faciunt quidem lac mulieres, uiri uero non faciunt. Mulieribus enim rara est glandularum natura, quemadmodum etiam reliquum corpus rarum habent, & alimentum quod in se trahunt, in lac permutant. Et ab utero accedit ad mammas, quod post partum puero cessurum est in alimentum, quod ipsum sanè exprimit ac sursum mittit omertum, ad supernas partes ab ipso foetu coarctatum. Verum maribus locorum angustia, & corporis insuper densitas conducit ad hoc, ut glandulæ non sint magnæ. Mas enim plenus est, & uelut pallium densus, tum ad uisum, tum ad tactum. foemina uero rara & laxa, & uelut fluida, tum ad uisum, tum ad tactum. Quare humiditatem non remittit id quod est rarum & molle. Mas autem non amplius quid eius susceperit, quam densus existat ac coherens & compactus, sed & labor corpus ipsius corroborat, ut non sit locus ubi redundantia ac superfluitates recipiat. Atque hoc modo cogit ac concludit hæc ratio, & pectora, & mammas, & reliquum corpus mulieribus laxa ac mollia esse, tum ob oculi ac segniciem, tum ob alia prædicta. Viris autem uice uersa. Porro faciunt etiam mammæ tubercula ac inflammationes, lac ipsum putrefaciunt. Comoda autem habent superioribus similia, & reliqui corporis redundantiam auferunt: testimoniū abunde præbent mulieres, quibus morbus, aut alia quædam calamitas mammas adimit. Nam et uox ipsarum aspera redditur, & humores in gulam feruntur, & multo sputo uexantur, & caput dolent, & ab his ægrotant. Lac enim proficiscens ac influens ab utero, quemadmodum etiam antea in superna uasa transibat, quum propria uasa non habeat, nec reperiatur, utpote ipsis per mammarum ademptionem priuatum, in principales corporis partes incurrit, cor uidelicet ac pulmonem, atque sic suffocantur.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE OSSIVM NATVRA MOCHLICVS,

id est uectarius, Iano Cornario Medico

Physico interprete.



ssivm natura hæc est. Digitorum quidem ossa ac articuli simplicia sunt. Manus autem & pedis multa alia, alio modo coartculata. Maxima uero suprema parte. Calcanei uero unum, uelut extra apparet. Ad ipsum autem posteriores tendines tendunt. Tibiæ uero duo sunt, quæ superne ac inferne coherent, iuxta medium uero distant. Paruum est quod extrinsecus est, iuxta paruum digitum paulo tenuius. Plurimum autem hac parte distant, & minore momento iuxta genu: & tendo ex ipso nascitur, qui circa poplitem foris est. Habet autem inferne communem appendicem, ad quam pes mouetur. Aliæ uero superne habent appendicem, in qua femoris articulus mouetur simpliciter, & expedit in longitudinem, specie nodosa, patellam habens. Ipsum autem femur foras, & in anteriore parte incuruum est. Caput autem eius appendix est rotunda, ex qua neruus, qui in coxæ acetabulo est, nascitur. Subobliquus autem etiam hic

annexus

15 annexus est, minus uero quàm brachiū. Coxa uero magno uerticulo, quod iuxta os sacrum est, ex ligamento chartilagineo ac nervoso adhæret. Spina uero à sacro osse, usq; ad magnū uerticulū gibbosa est, & uesica, & genitura, & recti intestini pars inclinata, in hac parte est. Inde uero usq; quo ad septum transuersum peruenit, in directum repanda est. & musculi lumbares hac parte existunt. Hinc uero usq; ad magnum uerticulū, quod supra supernas humeri partes est, 20 ē directo gibbosa est. Immo magis esse uidetur quàm est. Nam posteriores ossium propagines hac parte altissimæ sunt. Cervicis autē articulus repādus est. Verticula uero intrinsecus inter se æqualia sunt; ab externis autem chartilaginibus ac nervis continentur. Coarticulatio uero ipsorū in posteriore medullæ spinalis parte est. A posteriore autem parte exortū acutum habent, qui appendicem habet chartilaginosam, unde neruorū propago prona fertur: quemadmodum etiam musculi à ceruice ad lumbos adnascuntur, costarū ac spinæ mediū explentes. Costæ uero iuxta discriminationes uerticulorū, nervo annexæ sunt, à ceruice usq; ad lumbos intrinsecus. Ab anteriore autem parte, iuxta pectus, laxam ac mollem summam partem habētes, specie præ cunctis animalibus maxime obtorta. Hac enim parte angustissimā molem homo habet. Quæ uero parte costæ non sunt, exortus obliquus, brevis & latus, ad singula uerticula nervo annexus est. At uero pectus cohærēs ipsum sibi ipsi, discriminatio- 30 nes habet obliquas, qua parte costæ annexæ sunt, laxum autē est & chartilagineum; clauiculæ uero rotundæ sunt ad anteriore partem, ad pectus quidem breues motus habentes, ad summū uero humerum frequentiores. Summus autem humerus ex scapulis nascitur, in plerisq; dissimiliter. Scapula ad spinam chartilaginea est, reliqua parte laxa, inæqualem partem foras habens, cervicem uero & acetabulum habet chartilagineum, ex quo costæ motum habent. Facile autem ut inter ossa exoluitur, brachio excepto. Huius autē caput ex nervo ex acetabulo dependet, chartilaginis laxæ rotundam appendicem habens. 40 Ipsum uero brachium incuruū foras, & anteriore parte obliquum, non rectum est ad acetabulū. Pars uero ad cubiti gibbum lata est, & nodosa, & repagulo similis, & solida, posteriore parte caua, in qua cornix inest ex cubito, quū manus fuerit extēta. Ad hanc etiam torpidus nervus, qui ex cubiti ossium discriminatione media nascitur, perficitur ac terminatur. Ossa manus uiginti septē sunt, pedis uiginti quatuor. Colli usq; ad magnū uerticulum septem, lumbi quinq; spinæ uiginti, capitis unā cum oculorū ossibus octo. In uniuersum nonaginta unum, cum unguibus uero centū ac undecim. Cæterū ut nos ipsi ex hominis ossibus didicimus, uerticula supra clauiculam unā cū magno septem sunt. 50 Iuxta costas autem tot quot costæ sunt, duodecim uidelicet, iuxta laterū multitudinem uero forinsecus ubi coxēdices, in lumbo quinq;. Semen porro ueslut fauus ab utraq; uesicæ parte est. Ex ipsis autem rhenibus uenæ ab utraq; meatus urinæ parte, in pudendū tendunt. Potus per fauces ac gulam; larynx enim qui caput arteriæ est, in pulmonem ac arteriam tendit; ab his in summam uesicam. Hepatis extremitates quinq; sunt, super quarta autem extremitate fel incumbit, quod osculum ad septū transuersum, & cor, ac pulmonē profert. Circū cor pellicula est. Intestina crassa homo maiora q̃ canis habet, depēdēt aut ex Mesenterij membrana, quæ Mesocolon hac parte uocatur, Mesocolon autem

autem

autem ex nervis de spina sub uentrem. Rhenes ex nervis de spina. Arteriae fons cognatus cor est. Vena tendit per septum transuersum, hepar, splenem, rhenes, ad coxendicem, circa suram ad summum pedem. Altera autem ex corde sub alas, clauiculas, iugula, caput, nasum, frontem, iuxta aures, humeros, dorsum, pectus, uentrem, per cubitum. Aliae uero per alias ad cubitum, ad summam manum. Neruorum exortus ab occipitio usque ad spinam, ad coxendicem, in pudentia, in femora, pedes, tibias, in manus. Alij in brachia, partim in carnes, partim ad fibulam, in magnum digitum, partim ex carnibus in alios digitos. Alij ad scapulas, pectus, uentre, ossa, ligamenta. A pudendo uero ad princeps intestinum ac podicem, acetabula coxarum, partim supra femur, partim infra ad genua. Inde alius ad genua extensus ad tendinem, pernam, pedes. alius ad fibulam, alius in rhenes. Ipsae porro uenae in utraque parte bifariam maxime finduntur, partim ab una utriusque rhenis parte, partim ab altera: & perforatae sunt in rhenes. Habent autem cordis formam ipsi rhenes. Nam etiam ipsi uentriculos habent. At uero Rhen cauum sui partem ad uenas magnas habens situs est. Vnde enascuntur ex ipso uenae in uesica, qua parte potius trahitur per uenas in rhenes, & per ipsam intestina per quae procedit. Deinde uero uelut per qualum, per rhenes aqua percolatur. Spongiforme enim est ipsorum corpus ad uesicam, & hic percolatur ac secernitur a sanguine urina, quapropter etiam rubra existit. Neque enim in rhenes aliae procedunt uenae quam quae dictae sunt, neque est alius locus ubi potius colliquescat, quantum ego noui. Venae circa costas tendentes, subter unamquamque costam sunt, non a capite, inferius etiam ab arteria. Arteria quidem igitur subtermeans in costas distribuit. A crassa uero uena a corde recurrit una in sinistram partem inclusa. Deinde haec quidem per medias uertebras usque ad summas costas meat, non ex aequo distribuens costas a dextris ac sinistris ramos ac segmenta sua. Alia uero aequos quidem, uerum superne in dextris finditur. Caeterum iuxta utramque clauiculam duae uenae sursum, duae sub pectus, partim ad dexteram, partim ad sinistram, ramos siue segmenta, spargunt, illae quidem magis ad ceruicem, duae uero alterae magis ad cor, partim ad dexteram, partim ad sinistram, ab utraque parte iuxta costas, & sub ipsis uelut inferiores scinduntur, donec recurrenti inferne a corde commiscuntur. At uero sanguiflua uena ab arteria hac, propterea finditur, quod sublimis hic est per cor means. Infra uero costas uena sanguiflua crassa appellata, uerticulis rursus seipsam ingerit, & hic adhæret, & non amplius pendet, uelut superne per hepar means. Est autem iuxta lumbum quidem superne arteria, infra autem sanguiflua, ab hepate per septum transuersum sublimis ueniens, & ad dextram cordis fertur usque ad clauiculas simplex, praeterquam quantum cum corde communicat, iuxta uasa quidem in ipso magis in superficie fissi, uerum iuxta uasa in uentriculo cordis penetrans, postea a corde ad sinistram se demittit, et simplex ad spinam rursus currit, ad superna quidem corporis usque ad supremas costas, & ramos a seipsa habet iuxta unamquamque costam extensos iuxta naturam usque ad pectoris commissuram, & in sinistram, & in dextram, & rectitudo ipsius magis ad uerticulum est, quam arteriae extensio, itemque uenae ab hepate uenientis. Ad inferiorem uero cordis partem, recta extensio ab ipsa magis ad uerticulum est, quam arteriae extensio altera, quae iuxta cor et in infernas partes septi transuersi ad spinam appensas conuersa est. Inde uero rami in unamquamque rectitudinem inferuntur.

inferuntur, per ossa & carnes mutuo transeūtes. At uero uenæ crassæ sic habent. Ex oculo iuxta superciliū per dorsum, iuxta pulmonē sub pectore, altera ex dextra in sinistram, altera ex sinistra in dextrā transit. & quæ quidem ex sinistra uenit, per hepar in rhenem ac testiculum descendit, Quæ uero ex dextra, in splenem & rhenem ac testem, his autem osculū est ipsum pūdendum. A dextra uero māmima in sinistram coxendicem, & in crus descendit, & rursus à sinistra in dextram. Oculus uero dexter, ex sinistro uenam suscipit, itemq; testiculus. Iuxta eundem modū rursus sinister ex dextro. Crassissimæ porro uenæ in hūc modum se habent. Quatuor paria sunt in corpore. & aliquæ quidē ex ipsis, à capite retrò per ceruicē foris iuxta spinam ab utraq; parte ad coxendices perueniūt, et ad crura, deinde per tibiae ad malleolorū partes externas, ac in pedes procedunt. Oportet igitur uenæ sectiones in doloribus in dorso, ac in coxendicibus, à poplitib. facere & à malleolis forinsecus. Alteræ uero uenæ ex capite iuxta aures per ceruicē, sphagitides, id est iugulares appellatæ, intrinsecus iuxta spinam, ab utraq; parte iuxta lūbos procedunt in testes, & in femora, & per poplites ab interna parte, Deinde per tibiae ad malleolos intrinsecus, et ad pedes. Oportet igitur uenæ sectiones facere ad dolores lumborū ac testiu, à poplitibus ac malleolis intrinsecus. Tertiæ uenæ ex tēporibus per ceruicē in scapulas procedūt, deinde in pulmonē deferuntur, & perueniūt altera quidē à dextris in sinistras sub mammam, in splenem & in rhenem. Altera uero à sinistris in dextras ex pulmone sub māmam in hepar & in rhenem. desinūt autem ambæ hæ in intestinū rectum ac podicem. Quartæ autē uenæ ab anteriore capitis parte ac oculis, sub ceruicē & sub clauiculas procedunt. Deinde à brachijs superne sub curuaturas, postea per cubitos, ad manuū iuncturas ac digitos. Postea rursus à digitis, per manuū pectora, hoc est uolas, & per cubitos in curuaturas, & per brachiorū infernam partē ad alas, & ex costis superne, altera quidem in splenem procedit, altera in hepar, deinde supra uentrē ambæ in pūdendum desinunt. Et crassæ quidem uenæ hoc modo se habent. Sunt autem & à uentre uenæ per corpus multæ & omnigenæ, per quas alimētum corpori uenit, procedunt autem & à crasis uenis in uētre ac reliquum corpus, & ab extremis, & ab intimis, & inter se mutuo distribuūt, internæ foras, externæ intro. Venæ igitur sectiones facere oportet iuxta hos modos. Operamq; dare oportet, ut q̄ longissime à locis, ubi dolores fieri solent ac sanguis colligi, secedamus. Sic enim minime mutatio magna de repente fiet, & cōsuetudinē transtuleris, ut ne amplius in eundem locum colligatur. Cæterum Hepatitis uena in lumbis usq; ad magnum uerticulū, inferne etiam uerticulis se ingerit, inde sublimis eleuata per hepar, & per septum transuersum in cor: & hæc quidem recta ad clauiculas procedit. Inde uero aliæ quidem ad collum, aliæ ad scapulas, aliæ deorsum reflexæ iuxta uerticula ac costas declinant, à sinistris quidem una prope clauiculas, ex dextris autem in quendam ipsarum locum. Alia uero utrinq; deflexa. Alia paulo inferius deflexa, ubi quidē illa deficit, costis se ingerit, donec ad uenam in ipsum cor accesserit ad sinistras deflexa. Infra autem decursum ad uertebras descēdit donec perueniat, & inde incipit eleuari, ingerens se costis reliquis omnibus, & hinc atq; hinc ramos iuxta singulas spargens quum una existat, à corde quidem in locum quendam in sinistris magis existens, deinde

inde infra arteriam, donec cōsumatur & perueniat eò, ubi hepatitis eleuata est, priusquā aut eò uenit, iuxta extremas duas costas bifida fit, & altera pars hinc, altera inde ad uertebra progressa cōsumitur. Altera uero recta à corde ad clauiculas tendens, supra arteriā est, & ab hac (quemadmodū & ea quæ iuxta lumbum infra arteriā est) in hepar exilit, partim in portas, & extremitatē, partim in reliquum cōsequenter procedit paulo infra septum trāuersum. Septum autem transuersum hepatis adnatum est, ut nō facile separari possit. Duplices autem uenæ à clauiculis, alteræ hinc, alteræ inde, sub pectus ad pubē ac pectinē tendunt, quò uero inde, nondū noui. Septum uero transuersum iuxta uerticulum infra costas, ea parte qua rhen ex arteria cōsurgit, Arteriæ uero ex rhene oriuntur, hinc & hinc ab arteria neruum habentes. Et hac parte in recurrente à corde hepatitis desinit. Ab hepatitide uero per septum trāuersum maximæ duæ, altera hinc, altera inde sublimes feruntur. Multifidæ aut per septum sunt, & circum ipsum innascuntur. Verum supra septum hæ magis conspicuæ sunt.

Duo autem crassi nerui, à cerebro sub os magni uerticuli superne, & magis ad gulam, ab utraq; arteriæ parte uterq; progrediens, inter se committuntur, ut uni similes existant, Deinde uerticula ac septum transuersum hic sunt ubi desinunt. Et quidam dubij, ad hepar & splenem ab hac societate tēdere ipsos putauerunt. Alius neruus utrinq; ex uerticulis iuxta clauiculam ad spinam tēdit, ex obliquo uerticulorū, & se in costas ingerit: atq; hi quemadmodū uenæ per septum transuersum ad mesenterium mihi tendere uidentur. ubi autē hæ deficiunt, rursus hinc ubi septum exoritur, ab eo cōtinui ac coherentes existentes, iuxta medium infra arteriam, de cætero ad uerticula se ingerunt quemadmodū uenæ, donec totum sacrum os pergressi cōsumuntur. Ossā corpori stabilitatē, & resiliuitudinem, ac speciem exhibēt. Nerui flexionem & cōtractionem ac distentionem. Carnes & cutis omnium colligationē ac constructionem. Venæ per corpus diffusæ spiritum & fluxum ac motū exhibent, ab una multæ germinantes, atq; hæc una unde oriatur, & ubi desinat, non scio, Circulo enim facto principium non inuenitur, Cæterū rami ac germina ipsius unde pendeant, & qua parte corporis desinant, & quod una his cōsentit, & in quibus locis corporis extentæ sunt, ego declarabo. Circa caput iuxta medium ex obliquo circum sita est uena lata & tenuis, non multi sanguinis, In cerebrum enim iuxta cōmissuras multæ tenues uenulæ radices egerunt, & circum totū caput extētæ sunt, usq; ad frontem ac tempora. Ipsa autē in rectum extēditur retro caput forinsecus iuxta spinæ cutem, inde uero circa externā ac internā uenam ex his quæ in iugulis sunt demittitur. Ultra aures aut subfissa à gena forinsecus tēdit crassa. Ab hac in linguam multæ & tenues procedūt, excepta ea quæ sub linguā & sub maxillares dentes fertur. Ipsa autē crassa per clauiculam descēdit sub scapulas: & hac parte ab ipsa germinat per neruū subter summam humeri partem siue cuticulā, Vena humeralis appellata. Ipsa aut sanguiflua est & sanguine plena, & ægrè curatur, si rūpatur aut cōuellatur. Ab altera enim parte neruus latus ipsam ambit, ab altera chartilago, mediū uero locum ipsa tenet, & pellicula spumosa. Quū igitur locus non sit carnosus, facile rūpitur, & carnē circum nasci non contingit. & si sanguis in hæc partem subtercurrat, nactus spaciosum locū non discedit, sed induratur. Induratus autē morbum & dolorem exhibet. Atq; hæc

h quidem

quidem finit ubi prius dixi. Illa uero sub scapulas germina emittit sub mamas densarum & tenuium ac uarie implicatarū inter se uenularū, & per humeralem uenam, prætergrediēs chartilaginē, ipsam subter subattingens ad brachiū tendit, musculum in sinistra habēs. Dextra autem ipsa finditur circa humerum, & cubiti supernam partē. Inde uero cubitum utrunq; penetrās, pōstea manus iuncturam, inde autem defluens per totam manum uarie uagans radices agit.

Cæterum principalis uena iuxta spinam sparsa, per dorsum, & iugulum, ac guttur, in cor inseritur, & de seipsa uenam magnā multorū osculorum in corde producit, inde uero in os procedens fistulam facit, quæ sanè arteria appellatur, per pulmonem transiens, pauci sanguinis ac multi spiritus existēs. Propter spaciositatem enim ac raritatē uisceris, multis locis per pulmonē deriuatur, cætera uero chartilaginosa facta est. Quapropter sanè etiam si quid in has uias pulmonis delatū fuerit ex insuetis, uel in potu, uel in spiritus ac sanguinis trāsitu, utpote uenis talibus existentibus, & uiscere spongiformi, ac multū humorem suscipere potente, & sursum procedente, tum humorū ingressorū lex constituta est, tum sanguis amplius per has uenas non multus cōtinetur, neq; multum constringitur, & non cito procedens, illa bentia nō educit. Ipsi autē non subeductis, sed intus manētib; callosa cōcrefcit duricies. Sic autem destruitur alimēti accessio ac ingestio, quum hac parte arteriæ capitis accessus ad externas partes existat. Interceptis uero trāsitib; per callosam duriciē, uelocitas ac difficultas spiradi oboritur, quum neq; emittere neq; attrahere spiritum facile possint. Ex huiusmodi autē tales morbi fiunt, uelut sunt anhelationes, & tabes sicca. Si uero humor amplior in ipsis consistens præualuerit, ut crassifactus spissari non possit, & pulmonē putrem facit, & uicinas ipsi partes, fiuntq; suppurati ac tabidi. Fiunt autem hi morbi etiam ob alias causas. Inde porro hæc uena pulmonem occupat, & per extremitates duas magnas intrò conuersas, sub septum transuersum extēta est ad spinam, alba ac neruosa, uenulas per reliquum condensatū corpus spargēs. hinc autē per uerticula densis uenulis in spinalem medullā inseritur, ac instar hederæ implicatur. Et alia quidē uena in corpus distributæ ex omnib; partibus ad spinam tēdentes, unaquæq; quod tenuissimū ac sincerissimū est colligens hic eructat. Hæc uero uelut præses imposita per demissas plicationes in idem cogit. Inde uero etiam in rhenes radices agit, tenuibus ac fibrosis uenulis iuxta spuriā costam. hinc autē tendens condensatur, posteaq; etiā neruosa fit ad principē intestinū ac podicē, cōprimēsque musculos adstrictorios ipsi inseritur. In uesicam etiam, & testes, ac adstites radices agit, multiplicibus implicatis tenuibusq; ac solidis & fibrosis uenis. Inde uero crassissima ac rectissima ipsius pars rursus conuersa in caulem transit, hoc est pudendum. In reflexu autē in illa ipsa adaptatur. Et per pectinem supra subter cutem uentris & ipsius uenæ, procedunt uenæ ad easquæ deorsum tendū, quæ in seipsas mutuo deriuātur. Penetrant autē & per pudendū uenæ crassæ, & tenues, & densæ, & curuæ. At uero in foeminis illa ipsa in uteros tendit, & in uesicam ac urinæ meatū. hinc autē rectā procedit, & mulieribus quidem circa uteros pendet, masculis uero circa testes disseminatur. Ob hanc autem naturam ipsa uena etiam plurima foecunda ac genitalia concipit. A plurimis enim ac sincerissimis partibus cōnutrita, pauciq; sanguinis existens ac caua, & densa

densa instar nerui, ac spiritu referta, intentaque à pudendo, demissas ad spinam uenulas cogit: hæc uero uelut cucurbita medicinali in seipsas coactæ, omnia in suæ pernam uenam emittunt. Confluit autem & ex alijs corporis partibus in hæc, uerum multo maxima pars uelut dictum est, de medulla hæc colligitur. Voluptas uero accedit, uena hæc genitura expleta, Quum igitur soleat reliquo tempore modici sanguinis ac multi spiritus esse, repleta & calfacta & semine deorsum confluente, ea quæ in seipsa habet cōstringit. Spiritus autem in ipsa existens, & præsens uolentia, & caliditas, & uenarum undiquaque cōcitatio, titillatione inducit. Illa autem quæ à seipsa germinauit, per dorsum & iugulum iuxta spinam sparsa, multis uenulis costas intertexit, & uerticula per carnes alternatim condensat, ut & probe nutrita & sanguine plena existat. Ipsa autem iuxta coxendicem ac nates meat, per musculum sub femore submersa, à natibus uero iuxta acetabulum femoris iuxta caput in uenam perforata est, quæ femori respiratione exhibet, trans femur autem iuxta flexuram ad genu. Alteram uero iuxta inguina demittit frequētibz radicibus, & ægre transeuntē. Hæc uero per musculum tendens, & circa genu disseminatur, & per ossis tibialis summitatē uenam de se in fistulam cauat, quæ medullam nutrit, & deriuatur per infimam tibiā, iuxta pedis illigationē ac cōnexionē. Ipsa autem per patellam genu ad interna per tibiæ musculum submersa extenditur, & per malleolum implicatur, intus crassa & sanguine plena, atque hic circa malleolum, et tendinē, uenas ægre cognobiles producit ac inuoluit. Ipsa uero infra ad pedē, sub summū pedem decurrit, et hic se implectens, et in magnū digitum innitens, duplicem sanguine refertā uenam super ne sub cutem ex summo pede reflectit, et apparet sanē crassifaccta iuxta externā malleoli partem, ac sursum spargitur iuxta oppositum tibiæ radiū. Iuxta suram autem uelut fundam facit. Inde extenditur iuxta internam genu partem. Immittit etiam patellæ uenas, et iuxta internam patellæ partē quæ catia est, uenam implicat, quā si quis doleat, celerrime biliosum serosum ac saniosum humorē colligit, procedit autem ipsa iuxta internā genu cavitatē. Distribuit etiam de se in poplites multas implicatas uenas, Quæ inde tendentes iuxta neruos sub femore, radices agunt in testes, & in rectum intestinū ac podicem, et circa os sacrum attenuatæ unitæ circūtenduntur. Illa uero procedens iuxta internā genu cavitatem, sursum iuxta internā femoris partē, in inguen transit, et per coxendicē ultra ad spinā et lumbū foras ueniens, crassa et lata ac sanguine plena sursum porrigitur ad hepar, et ubi bifidam produxit sanguine referam uenam, dextrā hepatis extremitatē, ad rhenem occupat. Rursus uero subter hepar dispersa in uenam crassam finditur. Fissa uero in crassitudine hepatis inseritur, et altera quidem ipsius pars in superficie uisceris extat, in qua etiā est fel, habetque multas radices instar cirrorum ac plicationū per hepar dispersas. altera uero pars per internas ipsius partes deriuatur. Duæ autem uenæ inter duas latas extremitates explicantur, et una quidem per uertices ac cutem penetrans ex umbilico effertur. Altera uero premens spinam, in rhenem, ac uescicam, et pudendū, uelut anicoris iactis inseritur. Verū ex coxendicē incipiens ascendere ad pubem, multas uagabundas producit uenas, et costas ac uerticula ad spinam illigat, & propaggines suas multipliciter per uenas trāsmittit, et intestina ac uentrē inuoluit. Et alia quidē à pube ad mamas, et supra mentū, et summos humeros exporrectæ

diuagantur. Alia uero procedens iuxta crassitudinē hepatis, ubi fel in fistulam coegit, sursum sub spinam dispergitur, per septum transuersum itinere facto.

Caterum uena ex sinistris partibus, in reliquis quidem iuxta eandem naturam, uelut ea quæ in dextris, radices agit. Verū ex sinistris emergens in hepar non se ingerit, sed in splenem inseritur, iuxta caput quod in crassitudine ipsius cōsistit. Inde uero internas splenis partes subit, ipsasq; uenulis sanguinolentis instar aranearū telæ intertexit. Hic uero totus ex omento eleuatur, uenulis ex seipso sanguine plenum ipsum reddens. Quæ uero à capite splenis ad spinam accedunt, per septum transuersum penetrant. Inde uero sursum & dextra & sinistra sub pulmonem extēduntur. Quæ aut sanguine plenæ sunt, sub ipsum & in ipsum corriuantur. Quæ uero pauci sanguinis & tenues à pulmone intrinsecus procedentes, qui natura rarus existit, utpote ab ipso emulctæ, in cor frenantur circa aurículas ipsius, & in cāuitates internas diffluūt. Ingerunt aut & priores in ipsum. Etenim in angustia transitus siū est, uelut ex omni corpore habenas habens. Quapropter ex omni corpore maxime circa thoracem sensus existit. Colorum quoq; mutationes corde adstringente uenas ac laxante fiunt. Laxante quidem igitur rubicundi colores fiunt, & bene colorati ac pellucidi, constringente uero, uirides cum pallore & liuidi. Verum tales euariant iuxta præsentēs in unoquoq; colores.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE LOCIS IN HOMINE, IANO CORNARIUS
Medico Physico interprete.



MHI quidem uidetur principiū corporis nullum esse, sed omnia similiter principiū, & omnia finis. Circulo enim scripto principiū non reperitur. Similiter etiam morborū in toto corpore. Quod enim siccus est, morbos magis recipere, ac magis dolere, à natura solet. Humidū uero minus. Morbus enim qui in sicco est, stabilitur & non cessat. Qui uero in humido, diffluit, & aliàs aliam corporis partē occupat, & semper transmigraus requiem facit, & citius quoq; sedatur, utpote non stabilitus. Corporis aut singulæ partes altera alteri, ubi hinc aut illinc processerit, morbū statim facit, uēter capiti, caput carnibus ac uētri, & reliquæ omnes iuxta eādem rationē, quemadmodū uenter capiti, & caput carnibus ac uētri. Etenim quum uēter egestionē moderatā non fecerit, & in ipsum cibus ingeratur, humiditate ciborū ingestorum corpus irrigat. Ipsa autē humiditas à uentre obstructa, ac uatim ad caput uiam facit, & ubi ad caput peruenerit, à uasis in capite nō recepta, fluit quocūq; cōtigerit, & circū circa caput, & in cerebrum per os tenue, & partim quidem os ipsum subit, partim uero circum cerebrū per os tenue. Et si quidem in uentrē rursus peruenerit, uentri morbū inducit. Si uero ad aliam aliquam partē incubuerit, illi ipsi morbū facit. Ita etiā reliquæ partes altera alteri morbum inducit, & optimū fuerit sic curare ægrotas per has quæ morbos faciūt. Sic enim q̄ optime principiū ægrotantis quis sanauerit. Corpus porro ipsum sibi ipsi idem ac simile est, & ex isdem cōpositum est. Similiter aut habet

bet & paruas & magnas partes, itemq; infernas ac supernas. Et si quis minimā corporis partem acceptam male afficere uelit, totum corpus affectionē sentiet, qualiscūq; tandem ea fuerit: propterea quod minima corporis pars omnia habet quācūq; & mīxīma. Insuper quicquid tandem minima pars pertulerit, ad gentilitatem refert ac trāsfert, unaquāq; ad suam, siue bonū siue malum id fuerit. & propterea corpus & dolet, & lætatur, cum minima gētē, quia in minima omnes insunt partes, & hæ ad gentiles sibiipsis singula transferunt, & omnia denunciant.

Cæterum natura corporis, principiū sermonis in arte medica, primum perforata est qua parte audimus. Etenim uacua circū circa aures, non aliud inaudiunt q̃ strepitū & clamorē, Quicquid autē per membranā in cerebrum peruenerit, id liquido & clare auditur. Ob id etiā forām solum per membranā circū cerebrum extēta est. In nārēs autem nō inest foramen, uerū mollis laxitas uelut spongia & propterea per longiorē distantiam audit q̃ olfacit, odor enim ab olfactu lōge dispergitur. Et in oculos uenulæ tenues ad uisum ex cerebro per ambientem membranā feruntur. Hæ autē uenulæ uisum alunt humore de cerebro purissimo, qui etiā in oculis apparet. Eadem uenæ etiam uisum extinguunt, ubi fuerint resiccatae. Membranæ autē tres sunt quæ oculos custodiunt. Superna quidem crassior, media tenuior, tertia tenuis, quæ humorem conseruat. Ex his superna & crassissima si lædatur ac mutiletur morbos facit. Media uero etiam ipsa periculosa est, & ubi rupta fuerit prōminet foras, uelut uesica. Tertia autē tenuissima omnino periculosa est, quæ humorem conseruat.

Membranæ cerebri duæ sunt. altera superna crassior, altera tenuis cerebri attingens, non amplius eadem permanens, postquā fuerit uulnerata. Venæ autē transeunt ad uerticem per carnē uenientes ad ossiculum. feruntur & per carnē duæ ex uertice rectā, qua parte supercilia clauduntur, & desinunt ad angulos oculorū. Vna autē à uertice ad nasum fertur, & in utrāq; nasi chartilaginē finditur. Aliæ uero duæ uenæ iuxta tempora feruntur, in medio temporū & aurium, quæ premunt oculos, & semper pulsant. Solæ enim hæ ex uenis sanguine non rigantur, sed auertitur ex ipsis sanguis. Qui autem auertitur influenti occurrit, & qui quidem auertitur uolens discedere, qui uero superne influit uolens infra procedere, hic impelluntur ac diffunduntur ac mutuo circūagitantur, & pulsus uenis exhibēt. Visus humore de cerebro nutritur, quū autem quid eius de uenis acceperit, fluxione turbatur, & humor ipse non apparet, & ob oculos moueri ipsi uidentur aliquando uelut auicularum imagines, aliquando uelut lentes nigræ, & nihil exacte iuxta rei ueritatē uidere potest.

Aliæ duæ uenæ in medio auriū & aliarū uenarum, quæ feruntur ad aures, & premunt aures. Aliæ duæ uenæ ex ossis cōclusionē in aures feruntur. Quædam uero infra ad corpus conuertuntur: duæ quidem uenæ iuxta tendines colli feruntur & iuxta uerticula, & desinunt in rhenes, hæ autē etiam in testes penetrant, & quum hæ affectæ fuerint homo sanguinem mingit.

Aliæ duæ uenæ à uertice ad humeros feruntur, & sanè humerales uocantur. Aliæ duæ uenæ à uertice, iuxta aures, ab anteriore colli parte utrinq; ad cauam appellatam uenam feruntur. Caua autem ueniā finitur quidē uelut gula, consistit autē inter gulam & guttur siue arteriam, ferturq; per septū transuersum & per cor, & inter septum, & finditur ad inguina, & ad femora intrō,

& disparationes in femorib. facit, & ad tibias intus fertur ad malleolos. Hæ & infœcūdum faciunt hominē, quū fuerint seclæ, & in magnos digitos definūt.

Ex caua autē uēna producitur quædam in sinistrā manum, fertur autē subter
 70 splenem ad sinistri lateris mollitudinē, unde splen propagatur, per omentū, &
 finem fortitur ad thoracē. Producitur autē iuxta septum, & cū humerali cōmit
 titur subter cubiti articulū. atq; hæc splenis gratia secatur. Alia etiam ad dex
 xtram manū eodem modo à caua producitur. Cōmunicant autem omnes ues
 næ, & cōfluunt inter se mutuo, & aliæ quidem sibijpsis per se committūtur ac
 80 coincidunt, aliæ uero per uenulas à uenis extentas. Quæ autē carnes nutriunt,
 ea parte inter se cōfluunt. Et quicūq; morbus à uenis oritur leuior est q̃ qui à
 neruis. diffiuit enim unā cū humore qui in uenis inest, & nō quiescit. Et natura
 uenis in humore est, in carnibus. Nerui autē sicci sunt, & uentriculos siue cavi
 tes nō habent, & ad ossa cōsistunt, & maxima ex parte ab ossibus nutriuntur.
 85 Nutriūtur & à carnibus, & colorē ac robur inter ossa ac carnē medium habēt,
 & humidiores quidē sunt ac carnosiores q̃ ossa, sicciores autē ac magis ossei q̃
 carnes. Quicūq; autē morbus in ipsos peruenerit, roboratur & quiescit in eodē
 loco, & difficile est ipsum educere. Maxime uero impetunt ipsos distentiones,
 & alij morbi à quibus tremor corpus occupat, & qui tremere ipsum faciunt.
 90 Nerui autē premunt articulos, extētiq; sunt per totū corpus. Robusti autem
 maxime & semper crassissimi sunt in illis corporis partibus, in quibus paucis
 simæ carnes sunt. Et corpus quidē omne neruis plenū est. Verū circa faciem &
 caput nō sunt nerui, sed fibræ consimiles neruis, inter ossa & carnes, tenuiores
 & solidiores. Capita futuras habent, alia tres, alia quatuor. & quæ quidē qua
 tuor habent, his sunt utrinq; iuxta aures, & tertia ab anteriore, quarta à postē
 riore capitis parte. Sic quidem in capite quod quatuor habet, in eo uero quod
 tres, iuxta aures utrinq; sunt, & ab anteriore parte tertia. Posteriore uero parte
 futura nulla est, uelut in eo quod quatuor habet. Saniores autē capite sunt, qui
 plures futuras habēt. Inter supercilia os descēdit ac transit, & mandibularū
 95 clausura in medio mento, & superne ad caput est. Verticula alij plura, alij
 pauciora habent. Qui pauciora habēt, his duodeuiginti sunt. horū alia sursum
 ad caput, alia deorsum ad sedē tendūt. Costæ septem à posteriore corporis par
 te, ad uerticula cōnectuntur, anteriore parte in pectore inter se committuntur.

Clauiculæ articulos habēt, alios in medio pectoris iuxta guttur, atq; hic co
 100 articulatę sunt, alios uero ad humeros, reclinatos ad scapulas, qui humeris sem
 per adhærent. Scapulæ uero ad membra brachij siue totius manus coarticulan
 tur, incumbentes in ipsum os quod in membro est. Iuxta os autem appendices
 duæ prodeunt, altera intrinsecus, altera forinsecus, quæ ad scapulas ossi adna
 scentes, infra coarticulatę sunt. Quæ uero in cubiti flexura sunt, infra quidem
 110 radio coarticulatę sunt, iuxta os natura cauū existens, supra autem radiū pau
 lulum, in cubiti gibbū. & tunc tum os, tum radius in idem cōmissa, articulū in
 cubiti gibbo faciunt. Iuxta ulnam uero appendices prodeunt tenues ual de qua
 tuor, duæ sursum, duæ deorsum, & ad cubiti gibbū quidem duæ appēdices cō
 sistētes, supra ex osse hærent, hæ cū osse cohæretes, iuxta ossis articulū in cubi
 ti gibbū coarticulātur. Quæ uero infra sitæ sunt, & intus reclinatę, hæ utræq;
 115 cōmittuntur ad radiū ex supernis à membro procedentē, & intus ad mēbrum
 coartis

coarticulantur, & radium appellatū faciunt hæ sibiipsis intus in cubito cōmissæ. Infra autem ad manū os articulum habet. Appēdices uero hac parte teneræ existētes, duæ quidē non exeunt in articulū. Superna autē & inferna cū ossē coarticulantur ad manū. Cæterum manus articulos multos habent. Quæ 120
cunq; enim ossa inter se cōmittuntur, omnia articulos faciūt. Digni articulos habēt multos, unusquisq; tres. Vnū ad ungucem, in medio unguis & nodo sæ prominētia, alterū in ipsa nodosa prominētia, qua parte etiā digitos conflectunt. Tertiū qua parte digitus à manu exoritur. At uero in coxēdicibus articuli duo sunt, quæ acetabula appellantur, & femora in hos inarticulata sunt. 125
Iuxta femora autē appendices duæ protēduntur, altera intus, altera foris, & in articulum neutra procedit, neq; ab altera parte, sed ad os ad femur inferuntur.

Femur autē superne ubi in acetabulū ingruit, bifidū est huiusmodi bicipitate. In ea quidem parte quæ intro inclinata est, in summitate rotundū est ac leue, quæ etiam in acetabulū ingreditur. Altera autē bicipitatis pars exterior, magis foras prominet, & inferius apparet ad nates, et coxēdix appellatur. Ad genu uero os femoris taliter biceps est. Bicipitio autē huic os tibia appellata, uelut in cardine adaptatū est, supra adaptatū autē Mola siue patella incūbit, quæ humiditatē à carne in articulū expassum descēdere prohibet. Iuxta tibiā autē appēdices duæ procedūt, quæ inferne ad malleolos pedis finiūt, superne ad genu, nō aut perueniūt ad articulū. Ad pedē uero tibia iuxta malleolos articulū habet, & aliū infra malleolos. Et in pedibus articuli multi quēadmodū & in manibus sunt. Quot enim ossa, tot sunt articuli, & in digitis pedū eodem numero sunt, ac pari modo habēt. Articuli insuper multi in corpore parui sunt, nō similiter omnibus, sed alij alijs. Hi autē qui scripti hic sunt, omnibus similiter habent. 130
Aliæ etiā uenæ alijs sunt, sed nō memorabiles. Mucus omnib. à natura est, & quū hic purus fuerit, articuli sani sunt, & bene moueri possunt, utpote lubrici inter seipos. Labor autē & dolor fit, ubi à carne humiditas fluxerit uisiosa. Primū enim articulus stabilitur, Non enim lubrica est humiditas quæ de carne influxit. Deinde ut multa, & ualde sparsa, & ex carnē nō irrigata, semper resiccat. & ut multa existēs, & articulo ipsam nō capiente, effluit, & male stabilita eleuat nervos, quibus articulus colligatur, ipsosq; incōnexos ac dissolutos facit, & propterea claudi fiūt, quū hoc magis fit, magis: quū minus, ininus. 135
In uentrē porro ea quæ comedūtur ac bibūtur procedūt. Ex uentre autē, fibræ in uescam, qua parte humorē percolat, extēntæ sunt. Fluxiones autē, & perfrigerata ualde carne, & percalfacta fiunt, ac superinflāmata. Fluxiones propter frigus fiunt, quū caro in capite, & uenæ tensæ fuerint. Hæ enim horrentē carne, & ad angustias perueniēte, adstrictæq; ac excludēte, humiditatem expriment. Et simul carnes ipsæ cōtra exprimūt, ad angustias peruenientes: & capilli fursum erecti fiūt, utpote simul undiquaq; fortiter cōpressi. Quicquid igitur inde expressum fuerit, id ipsum quocunq; cōtigerit fluit. Fluit autem etiam 140
propter caliditatem, quum carnes rarefactæ transitus præbuerint, & humor calefactus tenuior redditus fuerit. Omnis enim humor calefactus tenuior fit, & omne cedens fluit, Maxime uero ubi ualde fuerit inflammatum propter hanc fluit causam. Carnes ualde plenæ factæ quum capere non possint, fluit humor qui capi non potuit, fluit autem quocunq; contigerit. Vbi uero semel fluit 145

185 dae factae fuerint fluxiones, diffluunt ad locum quò tandem contigerit, donec
 transitus fluxionis compressi fuerint propter gracilitatē. Quum autem corpus
 fuerit resiccatum, & alioqui corpus ipsum sibi ipsi cōmunicans sit, etiam quum
 siccum est, diducit, & concipit ac ducit, ubicunq; humor tandē obtigerit: duce
 re autem ipsum nō difficile est, utpote corpore uacuo & non intumescēte, prae
 190 gracilitate. Aliquando autē infernae partes siccae fiunt, supernae uero humi
 dae. Magis autē superna uasa humida sunt. Venae enim plures supra sunt quam
 infra, & carnes in capite minori humiditate opus habent. Ducit itaq; sicca cor
 poris pars humiditatē ex capite, & simul transitus magis ducenti parent, q̄ ei
 quae ducitur. Nam ipsi transitus, utpote sicci existentes, eam sibi lucrificiūt, &
 simul humores à natura deorsum procedere solent, si uel modica quaedā neces
 sitas cōtingat. Fluxiones de capite septem sunt, in nares, in aures, in oculos,
 195 atq; hae ex capite fluxiones ob oculos conspicuae existunt. Postquā autem
 in thoracem fluxerit prae frigore, bilis fit. Magis autē in thoracem prae frigore
 fluit, propterea q̄ facilis est fluxio ad guttur, utpote non contestū, prae frigore
 uero à bile infestati propterea lassitudine affligitur, quia carnes quū bilem ha
 buerint, nō quiescunt, sed cōcutiūtur, & cōcussae laborant ac delassantur, utpo
 200 te uelut in itinere faciēdo concussae, & suppurati fiunt quū in thoracem fluxe
 rit, itemq; tabidi. Quū uero in medullam fluxio cōtigerit, tabes occulta ac in
 cōspicua oboritur. Quum autē retro ad uertebras, & in carnes defluerit, hy
 drops fit. Id quod ex hoc cognoscere datur. Siccae enim anteriores partes sunt,
 caput uidelicet, et nares, ac oculi: & oculis amplius hebetudo accedit, fiuntq; cū
 uirore pallidi, itemq; reliquū corpus: & nihil expuit homo, etiāsi multū fluat.
 205 Fluxus enim per mediam carnē retro fluēs, & ab anteriore auersus, anteriores
 partes siccas facit, posteriorū uero carnē irrigat, & magis eam quae intus est ad
 uentrē, q̄ quae foris est ad nasum. Et propterea corpus foris magis solidū est, q̄
 intus, & angustiores meatus ac foramina habet. Quare sanē quum tenuia sint
 foramina cōstringuntur, ipsaq; sibi ipsis medētur, & fluxus nullus hac transire
 210 potest. Intus uero foramina ampliora sunt, & intermedia tenuiora habēt. flu
 xus uero utpote ab altioribus procedens, & tenuia impedimenta contra se ha
 bens, influit & carnes humiditate replet. Sed & humiditas à cibis in idem pro
 cedens corrūpitur, corrupta autē ipsa prae ammixtione, & simul cū ipsa ea quae
 à capite defluit, corpus nutriunt. Carnes uero multa humore nutritae, & mor
 215 bofo augescentes, hydropes plenae sunt. Si autē modicus fluxus fuerit, coxē
 dicum & articularū diuturnā affectionē facit, ubi fluere cessauerit. Nam ut mo
 dicus, & undiquaq; ab omnibus fortioribus depulsus, ad articulos refugiu fa
 cit. Fiunt praeterea articularū ac coxendicum affectiones, à talibus morbis sa
 natis, quum morbum quidem efficiens sanatur, in carne uero quid relictū fue
 220 rit, cui nō sit exitus, neq; rursus intrò, neq; foras, sed ad cutem egressum tubercu
 lum utiq; fecerit, fugit autē in id quod cedit, articulos uidelicet, & aut articulo
 rum, aut coxendicū affectiones inducit. Si porro intumuerint nares, & pi
 tuita plenae fuerint, atq; ea cōpacta, oportet pituitam cōpactam ac congelatam
 225 attenuare aut fomentis, aut medicamento, & nō auertere. Si enim fluxus auersus
 alio procedet, omnino maiorem morbum faciet. Quum uero in aures
 fluxerit, primū dolorē exhibet, uiolenter enim procedit: dolorē autē exhibet,
 donec

donec in fistulam redactus fuerit. Vbi autē fluere cōsueuerit, nō amplius dolo-
rem facit. Ei uero quem dolor affligit medicamentū natura calidū, tepidum fa-
ctum & netopo dilutū, infundendū est, & retrō cucurbita medica affigenda, si
sinistra auris doluerit, ad dextrā, sin dextra, ad sinistram. nō autem scarificando
pertundere oportet, sed ut trahat solum sinenda est. Si uero per hęc dolor non
sedetur, frigefacientia à natura frigida infundātur, & medicamentū potandum
præbeatur, quod secessum deorsum faciat, sursum autem non, quādoquidem
uomitū nō auxiliatur: & de cætero frigidis utendū est, et semper nō sanantem
uariare oportet modū, & si quidem peius reddiderit malū, ad cōtrarium te con-
uertere: si uero ad sanitatē tendat, omnino nihil ab his quæ adhibētur auferre o-
portet, neq; quicquā aliud addere aut apponere. Si uero iam in fistulam reda-
ctus fuerit, & multa purulēta sanies fluxerit, quæ graueolens sit, sic facere o-
portet. Spongiam siccante quopiam sicco medicamento imbue, & in aurem q̄
penitissime inde, et in nares purgatoriū medicamentū mitte, quo ea quæ prius
in aures fluebant, in nares ferantur, & non id quod morbosum est in caput rur-
sus recedat. Cæterum ubi in oculos fluxio processerit, oculi inflamma-
ntur & tument. Sic autem affectum hominē medicamento liquido, aut sicco in-
sperili curare oportet. Si uero statim inflāmāti fuerint, nihil omnino illine, sed
aut fortissimo quā in fine urito, aut alio quopiam aluum subducente medica-
mento attenuato, uitando ne uomitum facias. Si uero uelut lapilli subtercurre-
rint, medicamentum illines quod plurimā lachrymam ducere potest, & reliquū
corpus humectabis ac tumidū facies, quo oculi humidiores fiant ac colluātur,
ut lachrymā adstrictam ac cōpactam decurrere facias. Quum aut in oculos pau-
latim fluxerit, & pruritus fecerit, sic affectum molli medicamēto illines, quod
siccare potest, simulq; in modicam lachrymā ducere, & ad nares medicamentum
adhibebis, aut singulis diebus, aut alternis eodem utēs. Sit autem tale medica-
mentum, quod non plus quā acetabulum per nares deducat, idē paulatim:
quod uero oculis adhibetur resiccet, ut quod oculorū pharmacum resiccarit ac
obstruxerit, id ipsum ad nares feratur. Medicamēta caput purgātia, quæ
quidem fortia sunt, à toto capite ducunt, quæ uero debilia, ab oculis & hinc à
uicinis naso partibus. Si autem à carne & ossē, mucō inter os & carnē sub-
sistente, fluxus ad oculos fiat, ex hoc manifestū sit quod inde profluit. Cu-
tis in capite cōpressa cedit, & ulcera in capite enascuntur, & oculi lachryman-
tur, & palpebræ non exulcerantur, nec mordax est fluxus, nec uisum hebe-
tat, sed homo ipse acutius uidet. Fluxus enim nō est saluus, utpote non de ce-
rebro, sed magis mucosus. Hunc sic sanare oportet. Medicamento caput
purgandum est non forti, & corpus attenuādum, & cibis & medicamentis in-
fra corpus subducentibus, donec attenuato corpore fluxus resiccet, aut me-
dicamento in nares indito emoueat. Verū ad ipsos oculos nullum pharma-
cum adhibendum est. Si uero neq; sic sanus fiat, caput secare donec ad os per-
uenieris oportet, non superficialibus neq; trāsuersis aut obliquis fissuris, incu-
sis usq; quo ad os ipsum pertigeris. frequenter autem secare oportet, ut com-
pactus humor citius prodeat per ulcera effluens. & simul ut frequentes sectio-
nes, extensionem carnis ad os faciant. Sic mederi oportet, si huic hoc modo res-
succedat. Si uero hęc non commoda fuerint, & fluxus non eluitur, ut elutus
acutē

acutē cernere faciat, semper ab incumbēte oculi magis splendescētes fiunt, & acutus uisus hominis extinguitur. Si in uisum, in humorem purum cruentus aliquis humor ingreditur, huic uisus intra oculū non rotundus esse apparet, propterea quod in quocūq; inest cruentus humor, id ipsum nō apparet. huic itaq; deficit ut uisus rotundus appareat, & ante oculos aliqua moueri ipsi uidentur, & nihil reuera uidet. Huius uenas uisum premētes exurere oportet, quæ uel delictē semper pullant, & inter aurē ac tempora cōsistunt; & ubi has obturaueris, oculis pharmaca quæ humectant adhibe, & lachrymā q̄ plurimā prolecta, quo id quod in oculis compactū est, & morbū facit, eluatur. Si uero oculus ruptatur, mollibus medicamētis & acerbis utendū est, ut ulcus adstrictū in angustum coeat, & cicatrix tenuis fiat. Si autē adhuc humorib, plenus fuerit, lachrymare oculo conducit. At uero quum in thoracē fluxerit, & bilis fuerit, ex hoc manifestum fit, dolor lateris mollitudinē occupat, & clauiculam eiusdem partis, & febris adest, & lingua superne pallida ac uiridis fit, & excreat compacta. huius morbi periculū septima aut nona die instat. Aliabilis. Quum ambo latera doluerint, reliqua autē similia uelut in priore fuerint. Hæc quidem peripneumonia est. Illa uero pleuritis. Hæ autem propterea fiunt. Quum in pulmonem fluxerit ex capite, per guttur, & aortas appellatas appendentes partes pulmonis, pulmo tāquam natura rarus & siccus, trahit in se humorem quantū eius capere potest, & ubi influxerit maior fit; & ubi quidem in totū fluxerit, extremitas eius maior reddita utrūq; latus cōtingit, & peripneumoniam pulmonis appellatum morbū, facit. quum uero alterum tantum, pleuritis id est costalis morbus fit. Peripneumonia multo periculosior est, & dolores multo fortiores sunt, qui ad laterū mollitudinem & ad clauiculas tendūt, & lingua multo uiridior ac pallidior, & fauces præ fluxione dolēt, & lassitudo fortis occupat, & spiritus sexta aut septima die corripit. hūc si nō septima die febris dimiserit, moritur aut suffocatur, aut utrūq;. Si uero nona die, duabus diebus interpositis, corripit, ut plurimum etiam hic aut moritur, aut suppuratus euadit. Si uero duodecima die, suppuratus fit. Si quarta & decima, sanus fit. Et qui eūq; præ peripneumonia aut pleuritide suppurati fiunt, nō moriuntur, sed sani fiunt. Suppurati ut plurimū fiunt, quum fluxus in idem uelut in bile cōtingit, sed in bile quidem multū defluit, & ubi defluxit sedatur. Suppuratis uero minus defluit, & nō sedatur. Fiunt etiam suppurati, quū minus excreant q̄ influit in pulmonē. Hoc enim quod in pulmone cōsistit, & quod influit, pus fit. Pus autem in pulmone & in thorace cōsistens ac cōgregatum, ulcerat & putrefacit, & postquā exulcerata fuerint, ab ulcerato influit, & quum excreat caput simul cōcussū magis fluit, simulq; ex ulcerato in thorace ac pulmone magis fluit, & ulcera agitata refringūtur. ut etiam si fluxus à capite cesset, is qui ab ipsis ulceribus uenit sufficiens sit morbum facere. Fit præterea etiam ab ulcere suppuratus, & leuior hic morbus existit. Fit etiam extra pulmonem, maxime quidem à ruptura, & ubi caro cōtusa fuerit. Iuxta hanc enim pus congregatur, & cōgregatum fluctuat, si quis corpus concutiat, & strepitum facit, & hæc uruntur. Tabes autē fit quū in idem, uelut in suppurato, fluxio fit per guttur, & appendentes pulmonis partes, appellatas aortas, quæ pulmonē & guttur continent ac cōiungunt. Fluit autē in pulmonem frequenter & paulatim, &

humis

humiditate in pulmone nō multam facit. Resiccatur enim id quod influit, & in gutture cōpactū, utpote quod nō eluitur, sed paulatim influit ac derinetur, tussim excitat, & in aortis id quod influit detentū, utpote quum angusta foramina aortæ habeant, angustum spiritui locum exhibet, & talem spiritū habere facit, qui uelut defectus semper respirare concupiscit. Et in pulmone uelut non uehementer humido existente, pruritus cōtingit. Quum uero multum de capite fluxerit, pruritus in pulmone non fit. Multū enim est quod in ipsum influit, & suppurati ex his tabidis siue phthificis græce appellatis fiunt, ubi corpus humectius factum fuerit. & contrā ubi siccus fuerit factum, ex suppuratis tabidi.

Suppurati hoc modo cognoscuntur. Lateris mollitudine à principio dolor occupat. Quum uero iam pus collectum est, & dolor similiter habet, & tussis fit, & pus excreat, & spiritus corripit, Si uero nondū erupit pus, in lateris mollitudine cōcutitur, & uelut in utriculo strepitū facit. Si uero horū nihil adfit, suppuratus autem sit, ex his coniectare oportet. Spiritum multū habet, subraucosiusq; loquitur, & pedes ac genua intumescūt, magis autē ab ea lateris mollitudinis parte, in qua pus est, & thorax cōcuruatus est, & membrorū dissolutio fit, & sudor per totum corpus diffluit, & aliquādo sibi ipsi uidetur calidus esse, aliquādo frigidus, & unguis circūtensi sunt, & aluus calida fit. Ex his suppurationes cognoscere oportet. Porro quum retrō in spinam fluxio processerit, huic tabes fit eiusmodi. Lumbos dolet, & anteriores capitis partes uacuae uidentur ipsi esse. Bilis autem periculosa est, si icterus siue regius morbus in oculis accedat, & in unguibus liuiditas si fiat. & si corpus ulcera habeat, & partes circa ulcera liuidę sint, & quum sudor non toto corpore erumpit, sed una aliqua corporis parte, & quum febre adhuc existēte excreat æger pallidum uiride, aut si dum adhuc in pulmone inest pallidum uiride, excreatione cesset. Sic autem quum inest, & nō inest, cognoscere oportet. Quum inest, in faucibus respirātis strepit, & spiritus periculosus est, & singultus adest, & febris discedit, excreatione adhuc in pulmone hærente, & aluus debili iam existenti secēssum facit. Hæc pleuritidis & peripneumoniæ periculosa indicia existunt. Cæterum pleuritidem hoc modo curare oportet. Febris sedanda nō est per septem dies. Potū utendum aut aceto mulso, aut aceto & aqua: hæc autem quā plurius offerre oportet, quo humectatio fiat, eaq; facta excreationē faciat: & dolor sedandus est calfactorijs medicamentis, & absorbendum dandum est quicquid excreationē facit, & balneis utendū quarta die, quinta autē & sexta oleum illinendū est. Septima lauandum est, si febris dimittere nō uelit, quo præ balneo sudor cōtingat. Insuperq; & quinta & sexta fortissimis utendū est excreatorijs medicamentis, quo septimam diem q̄ facillime transigat. Si uero neq; septima die febris cesset, nona cessabit, si non aliud quid periculosum accedat. Postquā autem febris dimiserit, forbitiones q̄ debilissimæ offerantur. Si uero euacuatione oborietur, si quidē iuuenile adhuc est corpus, potus auferendi sunt. Si uero febris dimisit, triticeis forbitionib. utaris. Et eodē modo peripneumoniā curato. At uero suppuratis, caput purgare oportet non fortibus medicamentis, sed paulatim auertere in nares, & simul edulij uentrē subducētib. uti. Et quū principium morbi nondū est, sed eō fluxus uertitur ac uergit, excreationem facere, & tussim excitare, & medicamentis insusilibus in nares uti, & cibis simul ingestis

ingestis. Quū autem exscreationē facere oportet, pluribus cibis & falsis ac pinguibus utendum est, & uino austero, & quū sic habet tussis inducenda.

345 Tabidos item eodē modo quod ad reliqua attinet curabis, præterquā quod cibi non multi simul ingerēdi sunt, & obsonia nō plura q̄ cibaria frumētacea, & uino inter edēdum utendū est aquoso, ut ne calfaciat, & corpori debili existenti caliditatem exhibeat, & simul ambo calfaciant in eodem tempore, & caliditate multū fluxum inducant. Quum porro per gulam fluxus in uentrem processerit, morbus infra sit, aliquando etiā superne. Huic si quidē in uentre dolor inerit, subducendus est primū medicamento aut succo, deinde phar-
650 maco fortiore utendū est, cibis uero aluū subducentibus, donec dolor perseueret. Vbi uero dolor sedetur, cibis ualidiorib. utatur. Eodē modo ubi morbus multos diēs hæserit curabis. Si uero debilis fuerit, & præ imbecillitate hæc osferri non possint: primum quidē ptisanæ succo per clysterē infuso, alius eluenda est, post ubi per hunc purgaris, aliquo ex adstringentiū numero. Quum
755 autem retrō in carnem iuxta uertebras fluxus illapsus hydropem fecerit, sic mederi oportet. Caro in collo inter uenas crustis tribus uiatur, & ubi uiseris, constringatur, & cicatrices q̄ tenuissimæ inducātur, & ubi fluxum obturaris, medicamentū in nares adhibe, ut eō uertatur, & aliud rursus, donec auertatur. &
860 anteriores quidē capitis partes calfacito, posteriores uero perfrigerato. Et postquam anterioribus capitis partibus excalfactus fuerit, cibos edat q̄ pituitosissimos, ac minime uentrē subducentes, quo fluxionum meatus in anteriore capitis parte q̄ maxime dilatentur. Postea ubi obturaris & auerteris influxionē, si quid prius q̄ curaris fluxum, in corpus peruenerit, sic mederi oportet. Si quidem magis ad cutem secesserit, externis partibus fomētum adhibebis. Si uero
965 intrō ad uentrē, foris autē non conspicuū sit, medicamentū bibendū dabis. Si uero in utraq; partem, ab utraq; detrahes. Verum hoc studio habere oportet, ut proximū exitum facias, siue inferne siue superne, aut etiā alia aliqua corporis parte, ubi exitus sunt. Quum coxendicū morbus à fluxione fiat, cucurbitā medicam affigere oportet, & foras trahere, & nō scarificando pertūdere. & calfactorijs medicamētis in potu exhibitis intus calfacere, quo exitus fiat tum foras ad cutem per cucurbitæ tractionem, tum intus ad uentrem per caliditatē.
1070 Nam quum obturatus fuerit fluxus, & nō habeat quō iter faciat, uiam ad articulos facit, & in id quod cedit influit, & sic coxendicū morbum inducit.

375 Tabes ex fluxione retrorsum. Qui hac affectus est, ei caput est purgandum debili medicamēto, donec fluxus auertatur, diæta autē utere uelut in tabe superiore. Medicamentū potandū præbe Elateriū deorsum purgans, & inferne aluum lacte infuso elue, de cætero fomētis utere. Quum splen præ febre magnus factus fuerit, sit autem quū corpus attenuatur. Ex iisdem enim et splen
480 florescit, & corpus cōtabescit. Quum autē corpus tenue fuerit, & splen flourerit, & omentum simul cū corpore attenuatū fuerit, pinguitudo in omento colliquefcit. Vbi uero uasa pinguitudine uacua facta fuerint, & à splene florente ac augescēte in omentū defluerit, utpote uicinum ualde existens, & ut uasa habens eaq; uacua, excipit, & ubi morbus semel in corpore factus fuerit, ad id
585 quod est morbosum uertitur, nisi quis probe disponat ac curet. Nā etiā si quis bene tractet, periculo non uacat. Hunc sic sanare oportet. Medicamenta in
600 potu

potu exhibenda sunt quæ aquam purgent, & edulia quæ pituitosissima offerenda. Si uero neque sic leuior fiat, inurendæ sunt crustæ quæ tenuissimæ, & quæ maxime in superficie, quo aqua continere possis, circû circa umbilicû, & unâ in umbilicum, et emittere singulis diebus. Quû enim morbus periculosissimus sit, in his periclitari oportet. Si enim successerit, sanum facies; sin minus, quod etiam alias futurum erat, id ipsum perpetitur. Cæterum in puero hydropem sic curare oportet. Partes tumidæ & aqua plenæ aperiendæ sunt scalpello, & frequenter ac parum educendum est. Educendû autem est à singulis corporis partibus, & fomentis utendum, & semper locum apertû unde eduxeris calfactorio medicamento illines.

Pleuritis sicca citra fluxum fit, quû pulmo ualde exsiccatus fuerit præ siti necessaria. Pulmo enim natura siccus existens, ubi amplius quid quàm pro natura siccatus fuerit, gracilis fit, & impotens redditus, & ad latus præ impotentia reclinatus, latus cõtîngit, & postquâ contigerit ipsum humidû existens, cohæret & adglutinetur, & pleuritidem hoc est lateris morbum facit. Tûc uero & dolor fit in latere, & in clauicula, & febris, & album excreat, hunc multis potibus curare oportet, & lauare, & doloris medicamentum præbere, & alia quæ excreationem faciunt, hic in septem diebus sanus fit, & morbus minime periculosus est, & cibos præbere non oportet.

Febres porro propterea fiunt, quum corpore superinflammato carnes intumuerint, & pituita ac bilis conclusa quieuerint, & neque refrigeretur quicquâ, neque exeat, neque moueatur, neque aliud quid subeat. Quû itaque lassitudo occuparit & febris ac repletio, lauare multa aqua oportet, et oleo illinere, & quæ maxime calfacere, quò caliditas aperto corpore, præ sudore egrediatur, consequenter autem hæc facienda sunt per tres, aut quatuor dies: & si non sedetur ac cesset, pharmacû in potu exhibendû est quod bilem educat, & febris perfrigeranda est, præter quæ si quartana existat.

Medicamentum tamen donec corpus floridum est ne propinato, non enim uacuantur, nisi parum, utpote corpore turgente. Quum autem gracilis ac macilentus fuerit, tunc bibendum exhibe, & euacuabitur.

Febrienti cibum ne offeras, neque sorbitionibus subtus aluum ducas. In potu dabis aqua calidam, & aquam mulsam, & acetum cum aqua, hæc autem quæ plurima bibat. Si enim non frigidus ingressus fuerit potus calidus existens ac manens, ex corpore ægroto detrahet, & uel per urinam ejiciet, uel exsudabit. Undiquaque autem apertû, & respirans, ac motum corpus, id quod cõducibile est faciet. Quum uero gracilem existentem febris urat, manifestum est quod non propter corporis tumorem febris occupet, & si non cesset, nutrire oportet ac tumidû facere, & si neque sic conducat, palam est quod non oportuerit febrem inducere.

Hûc itaque medicamentum potare oportet quod educat, qua parte febris magis hæret, siue superne, siue inferne, & si quidē superne hæreat, superne, sin inferne, inferne. Nihil autem minus oportet etiam debiles fortia medicamenta potare, sed similiter: aut solum sic, ut fortibus quidē forte, debilibus uero debile exhibeas. Ardores uero potionibus & sorbitionibus, quemadmodû febrem frigefactorio medicamento exolueri oportet, cammaro uidelicet, aut alio quopiam huiusmodi: & si nauscam contrahat à frigefactorio, calfactorijs utere cõsequenter. Vbi uero nõ cesset, frigefactorijs rursum utere.

Icterus siue regium morbum sic curare oportet. Quum susceperis nutrito, & balneis, & pinguefacientibus, potibusque ac cibis

humectato, per tres aut quatuor dies. Postquam aut humectatū fuerit corpus, purgato & resiccato ipsum, pinguitudinemq; derepente exaurito, & undiq; si possibile sit medicamentū adhibens, humiditatē educito, ad caput uero purgatorio debili utitor: & urinam cientia bibēda dato, eaq; ante cibos hoc tempore quo turbatam humiditatem purgaueris in potu præbe, ne ab eo tempore corpus nutriatur. Quum uero attenuatum fuerit, etiam balneis purgato, & confusa cucumeris syluestris radice, eaq; in aquam coniecta, inde lauato.

Cæterum medicamēta bilem ducentia ne propinato, ne corpus magis cōturbes. Vbi uero siccum fuerit id quod cōturbatum fuit, nutrito, nullo alium subducēte medicamento, neq; urinā cientē utēs, sed uino uinoso, & his quæ rubicundiorē hominem faciunt. Si uero uiridis ac luteus sit, rursus exaurito, nequaquā uero siccato, ut ne is color stabilis reddatur. Vlcus ferinum in corpore propterea uenit. Postquam caro tumida & inflammata circū circa fuerit, & margines ulceris magni extiterint, & ulcus ipsum humidū, & in ulcere sanies resiccata inerit, aut ulcus cōstrictum fuerit. Sanies computrefaciens ab ulcere defluens, foras prodire à cōstricto ad carnē ulcere prohibetur. Caro autē suscipit, utpote eleuata existens ab inflāmatione, & quum in ipsam peruenerit sanies subterfluens, putrefacit & attollit. Hunc medicamētis humectantibus ipsum ulcus illinere oportet, ut ex humectato ulcere fluxus foras effluat, & nō subter carnē. Influxu etiam in ulcus frigefaciētibus pharmacis illinenda sunt, quo perfrigerata caro existat, & nō dirupta rursus fluxionē immitat. Sed & alia ulcera frigefacientibus oblinēda sunt, & super ipsa humectantia imponenda. Angina quam cynanchen græci uocāt à sanguine sit, quū sanguis in uenis quæ in callo sunt cōpactus fuerit. Sic affectis à uenis quæ in brachijs sunt, sanguinem detrahes, & simul aluum inferne subduces, quo id quod morbum exhibet detrahatur. Lingua quoq; quum magna ulcera habuerit, similiter curanda est. Morbos à principio curare oportet, & si quidē à fluxionibus fiunt, primum fluxiones sedare. si uero ab alia causa, principiū morbi sedare ac curare: deinde id quod influxit, si quidem multū fuerit educere, sin modicum, per diætā moderari ac componere. Capitis fracturæ.

Si quidem os fractum fuerit ac cōtritum, periculo uacat, & curare oportet hunc humectantibus medicamentis. Si uero rumpatur, & fissura fiat, periculosum est. Huic ferram adhibere oportet, ne in ossis scissuram sanies influens membranam cerebri putrefaciat, Nam ut per angustum intrans, nō autem exiēs, affligit, & furere hominē facit. Huic itaq; ferram adhibere oportet, ut sanies exitū habeat, nō solum ingressum, ampla serratura facta. Medicamētis autem utendū quæ humorē in se trahūt, & lauandū. Febricitati caput ne purgato, ut ne furiosus fiat. Calfaciunt enim caput pharmaca purgatiua, & sanē ad caliditatē febrilē accedens ea quæ in medicamēto est, insaniā facit. Ex quacūq; causa male affligēte quis atrā bilē reuomuerit, moritur qui uulnus habet. Et qui ab euacuatiōe detinetur, & debilis est, & tenuis existēs derepente siccus subdit, moritur. Quū à caliditate detēto, ulcuscula eruperint debili existēti circū circa liuida, moritur. Quū à morbo quopiā detēto, debili iam existēti, liuida ulcuscula enata fuerint, mortale. Quū quis à medicamēti potu superægrotarit, et inferne ac superne ab ipso secesserit, uinū sorbeat primū quidē dilutū, deinde meracum

meracum frequenter, & sanabitur. Medicamentū autē neq̃ euacuatīuū, neq̃ uomitoriū sumat. Bilis ubi sua spōtē eruperit, aut inferne, aut superne, difficilis sedatur. Quæ enim spōtē procedit, præ uiolētia cōpori facta impellitur. Si uero à medicamēto fluat, nō à gentilitatis cōgnationē uiolatur. Quū fuscē peris uinosum & uomentē, uomitū nē sedato. Vomitus enim euacuationē sedat, facilius autē uomitus postea sedabitur. Si uero debilis fuerit qui hæc patitur, somnificū medicamentū à uomitu præbebis. Sanguis quū morbū facit, dolorē exhibet, Pituita autē grauitatē ut plurimū. Morbū si quis non cognoscat, medicamentū bibēdū præbeat nō forte. Si itaq̃ leuior inde fiat, demonstrata uia est, quod gracilitatē inducēdo curādus est. Si uero nō leuior reddatur, sed peius habeat, cōtraria faciendā sunt. Si nō profuerit gracilem facere, tumidū facere cōducet, & frequēter permutare, ita ut hoc cōsilio utaris. Si quis in morbis quid permutaturus est, forti quidem ægroto, debili autē morbo, tunc quidem cōfidentē fortiorē q̃ morbus est medicamēto utendū est. Nā etiāsi quid de sano abducatur unā cū debili ac ægroto, nullū detrimentū est. Si uero morbū fortiorē, ægroto aut debili acceperis, debilibus pharmacis curabis, quæ ipsum morbū superent & abducāt, uerum ægrotum nihilo debiliore reddant. Ars exercitandi corpora, & Medicīna cōtrariæ sunt. Ars enim exercendi corpora: gymnastice græcis appellata; nō opus habet permutatione, sed Medicīna. Sano enim nō auxiliatur trāsmutatio ex præsentī statu, uerum ægroto. Morbi quicūq̃ ulcera sunt, & super reliquū corpus eminent, eos simul cū medicamentis etiā fame curare oportet. Fluxione ex capite fluente uomitus conducit.

Antiqui morbi difficilīus curantur q̃ recētes, uerum morbos antiquos primum recētes facere oportet. Vlcus callosum factū, eiecta primū duricia per putrefactoriū medicamentū, cōstringere deinde oportet. Pharmaca quæ tu mefacere maxime solent, ea pura ulcera adstringūt. Quæ uero attenuāt, ea purgant. Si uero quis cōstringat ulcera nōdum matura, corpus ægroto nutrit quod ulcus habuerit. Et si quidem adstringere oporteat ulcus ac implere, tu mefacere prodest, etiāsi in capite carnē uelis. Renutrita enim à cibis caro, propulsat eam quæ à medicamento putrefacta est, & simul cū natura debellat. Verum eleuatā aut leuē carnē, cibis gracile reddere oportet. Tristes anxios & ægrotos, ac se strāgulare uolētes, inādragoræ radicē mane in potu data minore pōdere q̃ quod insanire facit, curabis. Cōuulsioni sic mederi oportet. Ignis ab utraq̃ lecti parte succendatur, & mandragoræ radix in potu præbeatur minore pōdere q̃ quod insanīā facit. Et ad tendines posteriores sacculi calidi imponantur. Ac cōuulsione si febris inuaserit, sedatur eadem die, aut sequenti, aut omnino tertia. A ruptura febris nō corripit amplius q̃ tres aut quatuor dies. Si uero corripiat, & quis putat se à ruptura habere, ab alia sanē quapiam causa corripitur, & nō oportet ipsam uelut à ruptura curare. Quū homo manibus ac pedibus distentus ac tortus fuerit, insanīā sibi ipsi facit. Venam porro sic urere conuenit cōmodam ad morbū, ex quocūq̃ tandem quis ægrotarit. Si uultus fuerit homo, & fluxerit sanguis, ita ut hoc non periculosum sit ipsi, ambo hæc facere licet. Si uero percusseris ipsam in dolore, cuius gratia urebatur, non coalescit, uerum fluxui prodest. Si enim perusta fuerit, non fluit. Nam postquā perusta est, extremitas utraq̃ uenæ recurrit, qua parte perusta est, & exarescit.

Si uero quid relictum fuerit, præ relictò perfluente fluxu humectatur. At si sanguis ex uena fluit, per transuersum perurito. Si uero non cesset, ad hæc supra ac infra utrinque diffecato, quo sanguinis fluxus auertatur. Diductum enim facilius est medicamēto sedare, quàm coaceruatum. Doloris in capite gratia, sanguinem de uenis detrahito. Si uero non sedetur, & diuturnus sit, perure uenas, & sanus euadit. Si uero caput purgaueris, magis affliges. Medicinam cito discere non est possibile, propterea quòd impossibile est statim ac certam doctrinam in ipsa fieri, uelut uerbi gratia, Qui scribere didicit, iuxta uinum modum, quem omnes docet, nouit, & scietes omnes similiter nouerunt, propterea quod idem & similiter factum, & nunc, & non nunc, non potest fieri contrarium, sed semper exacte simile est, & non opus habet occasione.

Medicina uero & nunc, & statim, nō idem facit, & ad eundem contraria facit, & hæc etiam contraria sibiipsis. Primum aluum subducentia non semper hoc faciunt, & aluum subducentia utrumque faciunt. Fortassis autem neque sic se habent aluum subducentia, uelut aluum sistentibus contraria. Restitante enim aluo, propter uehementem stabilitatem corpus intumescit, pituita in uentrem perueniente, sic stabilitas secessum facit. Vbi enim pituita in uentrem ingressa fuerit, euacuatio contingit. Insuper uero aluum subducentia ex natura, stabilitatem faciunt in uentre, si quidem non subducētia feceris, Si autem exoluatur & humectetur id quod morbum facit, postquā exolutum fuerit, sanus euadit. Et sic uentrem sistētia, subducentibus stabilitatem uentris faciunt, & uicissim subducentia uentrem, sistētibz. Eodem modo res se habet circa rubicundos & pallidos. Nam & pituitosa ac tumefaciētia & pallidos faciunt, & boni coloris, Itemque attenuantia. utriusque autem medicamētum sunt contraria contrario. Verbi causa, Quum intumuerit pallidus existens, exoluitur sanè si quod medicamentū attenuās adhibitum fuerit. atque hic tumenti attenuans opitulatur. Rursus autem quod aliquādo utilitatem coepit, nunc hic opitulanti opitulatur, quū sanè præ gracilitate decolor & pallidus factus fuerit. Si quis enim pituitosum ac tumefaciens medicamentū exhibuerit, pallor sedatur.

Insuper uero etiam dolor, & propter frigiditatem fit, & propter caliditatem, & propter ualde exuperans, & propter imminutum. Et in perfrigeratis quidem natura extra corpus ad cutē, propter calfaciens ualde, dolor fit. In calidis uero natura, propter frigidum. Et in siccis natura, si humectetur. & in humilis natura, si resiccentur. In singulis enim quorum natura permutatur ac corrumpitur dolores fiunt. Sananturque dolores contrarijs, idque etiam unicuique morbo propriū est. Nam in calidis natura propter frigiditatem ægrotantibus, dolores calesciunt. & reliqua iuxta hanc rationem fiunt. Alius porro modus hic est, per similia morbus fit, & per similia adhibita ex morbo sanantur. Velut, urinæ stillicidium idem facit, si non fit, & si fit, idem sedat. Et tussis eodem modo, uelut urinæ stillicidium, ab ipsodem fit & sedatur. Alius rursus modus hic est. Febris quæ propter tumefactionē ex pituita fit, aliquando quidem ab ipsodem fit, & sedatur, aliquando autem à contrarijs. Aliquando enim si quis uult aqua calida lauare, & multum potum exhibere, sanus æger fit, & febris quæ propter tumefactionem facta est, pituitosis ac tumefactionem facientibus oblati & adhibiti sanescit. Et si quis uult medicamentū bibendum dare,

aluum

aluū subducens & uomitoriū, eodē modo & à facientibus sedatur, & à sedantibus fit. Nam si quis hominī uimenti, aquam multā bibendā dare uelit, eluentur ea propter quæ uomit, unā cū uomitur. Et sic quidem per uomitū uomitus sedatur. Rursus autē propterea quod sedatur, quia inferne procedere ipsi fecit, ex illo id quod intus est uomitū facit, et ambobus cōtrarijs modis homo sanus fit. Et si quidē sic in omnibus haberet, stata sanē ac certa medicina esset. Ita alia quidē contrarijs curare oportet, qualia tandē sint, & à qua causa fiant: alia uero similibus, qualia tandē sint, & à qua causa fiant. Huius autē rei causa corporis debilitas existit. Corpus enim à cibis æqualibus æqualiter nutritur, à corpore uero cibi superantur. Postq̃ uero plus aut minus in ipsum ingestū est, aut alia quæpiam trāsmutatio facta est superatur, superant autē cibi. Et quū sanē superatur corpus ab his quæ ipsi offerūtur, florere hæc ipsa facit, & superāt hæc simul corpus, & cōtraria ipsi faciunt. Et calida lauari, donec quidē corpus superat eius exhibitionē, florere corpus facit. Quū uero superatū fuerit, gracile corpus facit. Et cōiuari similiter ut lauari facit. Hæc enim donec superātur florere corpus faciūt, Vbi uero superauerint, et alui secessus, et uaria uitia inducūt. Quū autē id quod offertur, trāsmutatur, necesse est & id cui offertur, trāsmutare. Et enim corpus trāsmutatum parū efficax ac potens est, & ab omnib. offensiones percipit. Hoc autē faciunt, & aluū subducētia: & florere ipsum facientia, gracile corpus faciūt, & reliqua omnia cōtraria his faciētia. At uero Medicina breuē occasionem habet: & qui hoc nouit, illa stata ac certa habet, & scit quæ consue-
ta sint, & quæ nō cōsueta, ad quæ cognoscēda nō est occasio in medicina, & q̃ aluū subducētia, nō subducētia fiunt, & reliqua q̃ cōtraria sunt, & cōtrarijsi-
ma nō cōtrarijsima. Occasio autē hæc est, ut cibos offeramus ea copia, quan-
tam corpus cui offerūtur superare ualeat. Nā si quis sic fecerit, omnino necesse
est cibū aluū subducentē oblatum, subducentē esse, & pituitosum, pituitosum.
Si igitur superauerit corpus ipsos cibos, neq̃ morbus, neq̃ contrarietas fit ex
his quæ offerūtur, & hæc est occasio quā medicū nosse oportet. Quū uero oc-
casionē supergressus fuerit, contrariū fit, & anteq̃ ei excessum factū esse putāt,
consequēs est ut cale scat. Donec enim corpus id qđ oblatū est superauerit, cor-
pus nutritur. Vbi uero hanc occasionē transmiserit, contrariū fit, nam attenua-
tur & gracile scit. Sed & alia omnia, & quæ tumefaciūt, donec quidē superaue-
rit corpus, ampliusq̃ pro occasione offerūtur, etiam iuxta naturā suam singula
faciunt, & pituitosa siue tumefaciētia tumefaciunt, ubi uero occasionē transmi-
serint, contraria sunt. Medicamēta sunt omnia quæ præsentē statum trāsmo-
uent. Omnia autē fortiora trāsinouent. Licet autē si uelis, medicamēto trāsmo-
uere, & rursus si uelis, alimēto ac cibo. Omnia uero ex præsentī statu transmo-
uere, ægrotanti opitulatur. Si enim id quod morbū facit non transmoueris, au-
gescit. Medicamenta fortia à natura, in debilibus morbis dare non oportet,
neq̃ paucitate medicamēti, debilitas ipsius facienda est, Sed fortibus natu-
ra, fortibus pharmacis utendū est, debilibus uero, pharmacis non fortib. Neq̃
partiendū est medicamentū, sed singulis secundū naturā, debilibus quidē debi-
lia à natura, fortibus uero morbis, fortis naturæ pharmaca exhibenda sunt.

Cæterum morbi ea parte qua proximi sunt educēdi sunt, & qua parte singu-
lis exitus q̃ proximus est extrahendi. Aluū autē subducentia talia sunt,

quæcūq; lubrica & incisua sunt, & quæcūq; in calidis attenuantur, Vēter enim calidus est; & reliqua quæ salsuginosa sunt, & quæcūq; ex talibus plurimū participant. Contrā aluum nō subducentia, sed sistētia sunt, quæ flatum exhibent, humida enim resiccata flatum faciunt; & quæ adstringunt, & quæ à calore compacta sunt, & friabilia, & sicca. Omnia autē quæ foris extenuant, intra corpus assumpta tumefactionē inducūt, eadem autem & uentrē sistētia, & pituitosa, ac tumefaciētia existunt. Et quæ aluum subducūt ac extenuant, cū calefacientibus eadem sunt. Insuper autē etiam acida pituitosa sunt. Omnia uero quæ frigefaciunt ea quæ in uentre sunt, talia aluū subducūt, Item quæ frigida sunt, & quæ humida. Quum autē nō aluum subducētia fuerint, calfaciunt, frigefaciunt autē & calida in uentrem assumpta, & cito secessum faciunt. Si uero secessum nō faciant, calida in uentre existūt. Ex his quæcūq; repletio nem faciunt, maximē pituitosa sunt. Quæ uero plurima assumpta repletionem non faciunt, aluum subducunt. Medicina itaq; mihi iam tota inuenta esse uidetur, quæ sic habet, & quæ docet singulas & consuetudines, & occasiones. Qui enim sic Medicinā nouit, minime fortunā respicit aut expectat, sed & citra fortunam, & cum fortunā, recte faciet. Cōstans enim ac firma est tota medicina, & doctrinæ optimæ in ipsa composita, minime fortuna egere apparēt. Nam fortuna sui iuris est, & nullius imperio subest, neq; optātis est ad ipsam peruenire. Scientia uero imperata facere cogitur, & facile est ipsam feliciter assequi, si quis sciens uti uelit. Deinde uero quid opus est Medicinæ fortuna? Si enim morborum medicamēta clara sunt & manifesta, uelut equidem arbitror, nō expectant sanē fortunā ad sanandos morbos si quidem sunt medicamenta. Si uero cū fortuna exhibere ipsa prodest, nō magis medicamenta q̃ ea quæ non sunt medicamenta, unā cū fortuna adhibita sanos faciūt. Quicūq; uero fortunā ex Medicina, aut alia quapiā arte expellit, dicitq; eos qui probe rem aliquā sciunt fortunā non uti: is contrariū mihi iudicare uidetur. Mihi enim soli hi fortunatē assequi, itemq; infortunatē nō assequi uidentur, qui recte quid, & male facere sciunt. Fortunatē enim assequi, est recte facere. hoc autē hi qui sciunt faciunt. Non assequi autē hoc est, si quis nō sciat, hoc nō recte faciat. Indoctus autem qui est quomodo fortunatē assequi possit? Si quid enim etiā assequatur, non memorabilem sanē successum habebit. Qui enim nō recte quid facit, nō fortunatē assequi poterit, quā reliqua quæ æquū est facere nō faciat. Morbi muliebres.

Vteri omniū morborū causæ sunt: hi enim ubi ex natura trāsmoti fuerint, morbos exhibent, siue ascenderint, siue descēderint. Et quum quidē uteri osculum suum non demittentes, & pudendi eminētias non contingētes, trāsmoti fuerint foras, leuissimus morbus est. Quum uero in anteriore partem promoti fuerint, & osculū in pudendi eminentias ac labra immiserint, primum quidem ipso cōtactu dolorem uterus percipit ac exhibet: deinde obturatus, & uelut o periculo contactus, ex eo quod pudendi eminētij incumbit, fluxus nō contingit, qui mensium nomine uenit. Hic uero fluxus congregatus, tumore ac dolorem exhibet. Et si quidem infra descendens & auersus, in inguen se immiserit, dolorem exhibebit. Si uero sursum ascēdens auersus & obturatus fuerit, etiam sic propter raritatem ac coarctationem dolorem exhibet. Quum uero propter hoc ægrotarit, coxendicum ac capitis dolorem facit. Vbi uero uteri impleri

intumue

intumuerint, nihil fluit, & pleni sūt: quum autē pleni facti fuerint, coxēdicesq; contingunt, dolores exhibēt, & in coxēdices, & in inguen, & uelut pilæ in uentre discurrunt, & caput dolore affligūt, modo altera ipsius parte, modo totum, prout contingit ipsi morbus. Hæc itaq; sic curāda sunt. Si quidem descendit solum, & illini possit, uterē quocūq; libet ex graueolentiū genere, aut cēdro, aut alliī intrito, myttoto græcis appellato, aut aliquo alio ex grauiter et male olentium numero, eoq; suffitū facito, & fomenta ne adhibeto, neq; cibo neq; potu urinam ciente hoc tēpore utitor, neq; calida lauato. Si autē sursum ascenderit, & non auersa fuerit, medicamētis apposititijs bene olentibus, & quæ simul calfaciūt utere. Velut sunt myrrha, aut unguentū, aut aliud quoddā odoratū simulq; calfactoriū. Et his quidem subdititijs uteris, fomentū autē ex infernis ex uino adhibebis, & calida aqua lauabis, & urinā cientibus uteris. Ex hoc autem manifestum sit auersa sit nec ne. Si enim sursum progressa auersa nō fuerit, fluxus procedit. Si uero auersa sit, fluxus, menstrua appellata, nō contingit.

Hunc morbum foimento primū tali curare oportet. In uinum grossos immitto, ipsumq; uinum calfacito, & cucurbitam circum osculum uasis in quo calefit addito, hoc modo. Cucurbitam per mediū dissectam euacuato, & summitate ipsius modice rescissa, uelut in utriculis fieri solet, hanc ipsam uasi uelut osperculum circūdato, quo odor per angustiam means ad uterū perferatur. Insusper autē & calida aqua fouere, et calfaciētibus medicamētis subdititijs uti oportet. Calfacientia aut sunt ea quæ ducunt ex superius relatis, itemq; hæc. Stercus bubulum, fel bubulum, myrrha, alumē, galbanū, & si quod aliud eiusmodi est. Plurimis etiam ipsarū per purgatiā inferne medicamenta altius subducenda est, & per debilia quæ uomitū faciunt, ne euacuatio ex superuacuatione fiat.

Cæterū subdititias glandulas sic facere oportet, si fortes facere uelis. Mel semicoctum facito, & ex præscriptis subdititijs pharmacis ea quæ ualde efficacia sunt immittito, & ubi immiseris, glandulas formato instar earū quæ in sedē induntur, uerū longas facito has ac tenues. Mulierē uero supinam reclinato, locis à pedibus lecti altius instratis, deinde apponito, et panniculo intecto, aut alia quadam re cōsimili calfacito, donec collique scat. Si uero debiliore glandulam subdere uelis, in linteolum illigato. Sed & si humore pleni uteri osculum tumidū habuerint, & nō fluxerint, fluxionē facere oportet, & subdititijs pharmacis sanare, itemq; fomētis uelut scriptum est, ita faciendo uelut in priore fluxione suppressa. Quin & si in anteriore partem procedēs uterus auersus fuerit, fluxionē facere oportet, uelut in superiore fluxione suppressa. Quū uero fluxus nimius fuerit, neq; calida aqua, neq; alio quopīā calfacere oportet, neq; urinam cientibus uti, neq; cibis aluum subducētibus. Lecti autē partes à pedibus altiores esse oportet, ut ne declinatio fluxui facilitatem præbeat. Vtere autem simul etiam subdititijs adstringētibus. Fluxiones porro quū confestim uenerit purgatio statim subcruentæ fiunt, quū uero tardius pro-

dierit, purulentæ. Et iunioribus subcruentæ magis prodeūt. Seniores uero magis mucosa menstrua habent.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE AERE, AQVIS ET LOCIS, IANO COR-
nario Medico Physico interprete.



VICVNQVE artem medicā integre adsequi uelit, primum quidem temporum anni rationē habere debet, quantum potentia quodlibet eorum ualeat: nō enim simile quicquam in illis existit, uerum differunt inuicē propter uarias quæ in eis sunt mutationes. Deinde uentorum calidorūq; & frigidorū, maxime qui ex his omnibus hominibus sunt cōmunes, & mox qui in unaquaq; regione sunt indigenæ & proprij.

Necq; uero negligentiore se circa aquarum facultates cognoscēdas exhibere conuenit. Quemadmodū enim gustu differūt, & pondere ac statione, sic quocq; uirtute aliæ alijs lōge præstant. Quare si quis ad urbem sibi incognitam perueniat, circūspicere oportet eius situm, quo modo scilicet ad uētos, & solis exortus iaceat: non enim æquales uires sunt, ad Septētrionem sitæ, & uergentis ad Austrū: necq; eius quæ solem exorientē, & quæ eundem occidentē spectat. Hęc itaq; diligētē oportet perscrutari, ac simul quo modo habeāt circa eam aquæ: num ne palustribus utantur & mollibus, aut duris & ex sublimi loco prolabantibus, & scaturientibus ex petris, siue falsis, & crudis. Terra etiam ipsa cōsideranda, nudāne sit & aquis carens, aut densa & aquosa, & an concaua sit & æstuosa, uel alta & frigida, hominū insuper diætā perquirenda, qua maxime capiantur. An bibuli sint & lurcones & ocio dediti, aut exercitijs uarijs utētes, et tolerātes laborū, ciborūq; plus adpetentes q̃ poculorū. Ex his enim singula sunt inuestiganda. Nam qui hæc omnia probe, quantū fieri potest, cognouerit, aut horum plurima, eum non latere possunt quū in urbem etiā ignotā sibi peruenerit; necq; morbi regioni peculiare & patrij, necq; cōmunis regiōis natura, quæcūq; tandem ea fuerit, ut non possit in cognoscēdis morbis dubius hærere, aut errare sicubi ad morborū medicationē adhibeatur. Quæ ambo illis euenire solent, qui non prius prouidi hæc diligenter cognouerūt. Quare qui ea studiosè rimatus fuerit, uniuscuiusq; temporis, ac anni futuri cōstitutionem prædicere poterit, qui uidelicet morbi cōmuni adfectione ciuitatē sint inuasuri tū æstate, tum hyeme, & quæcūq; pericula unicuiq; sint timenda ex diætæ ac uictus immutatione: quum enim temporū mutationes, & astrorū ortus ac occasus obserauerit, quemadmodū singula horū eueniant, prænoscet utiq; & de anno, qualis hic sit futurus: hoc nāq; modo si quis rimatus fuerit ac præcognouerit temporum occasiones, maxime de singulis sciet, ut plurimūq; sanitatē adsequetur, & recta uia procedet, non minima artis suæ gloria. Quod si cui hæc sublimiora uideantur, si is ab hac sententia discedat, discet sanè non minimā partem cōferre ad rem medicam ipsam Astronomiam, sed omnino plurimā, quum unā cū temporibus & uentriculi in hominibus mutantur. Quomodo autem singula quæ diximus scrutari ac explorare oporteat, deinceps dicam manifeste. Quæcūq; quidem ciuitas ad uentos sita est calidos, puto autē eos qui inter brumalem solis exortū itidemq; occasum perflant, huic hi uenti sunt peculiare. A Septentrionalibus autē uentis tuta ac protecta ea ciuitas existit. Aquæ uero eius mul-

tæ & subfalsæ sunt, & necessario non sublimes, æstate quidem calidæ, hyemē
 frigidæ. Et quæ quidē urbes bene sitæ sunt ad solem, & ad uentos, & aquis bo-
 nis utuntur, hæ minus à talibus mutationibus afficiuntur. Quæ uero aquis pa-
 lustribus ac lacustribus utuntur, & nō bene sitæ sunt ad uentos, & ad solem, hæ
 magis. Et si quidem æstas sicca fuerit, citius sedantur morbi. Si uero pluuiosa,
 diuturni fiunt: & phagedænas adedentes ex omni occasione oboriri uerisimile
 est, si ulcus fiat. Si uero hyēs frigida sit, homines capita humida ac pituitosa ha-
 bere par est: & uentres ipsorū frequēter exturbari, pituita à capite influēte: &
 formas ipsorum ut plurimū debiliores esse: ipsosq; ad edendū ac bibendū non
 appositos esse. Nam qui capita debilia habent, nō fuerint boni potores. Crapu-
 la enim magis grauat. Morbi uero hi ipsis uernaculi sunt. Primū quidem mulie-
 res morbosæ, ac fluxionibus obnoxia sunt, deinde multæ steriles sunt ex mor-
 bo, nō à natura, & frequēter abortiūt. Pueris uero incidūt conuulsiones ac an-
 helationes, quæ morbus puerorū, & sacer esse putatur. Viris autē dysenteria,
 & alui profluvia, & febres lenes, diuturnæ, hybernæ, et pustulæ nocturnæ mul-
 tæ, & hæmorrhoides in sede. Pleuritides autem, & peripneumoniæ, & febres
 ardentes, & quicunq; acuti morbi putantur, nō multū proueniunt. Non enim
 fieri potest ut isti morbi uigeant, ubi alui liquidæ existunt. Lippitudines uero
 oboriuntur humidæ, nō graues, nec diuturnæ: si nō ex mutatione temporū mor-
 bus aliquis omnibus cōmunis occupet. Et ubi quinquagesimū annū trāsgres-
 si fuerint, defluxiones ex cerebro accedentes, homines semisyderatos faciunt,
 ubi caput derepēte insolatū, aut frigore correptū fuerit. Atq; hi quidē morbi ip-
 sis uernaculi sunt: præterq; si morbus aliquis omnib. cōmunis ex temporū mu-
 tatione oboriatur, nam & huius participes fiunt. Quæcūq; uero ciuitates his
 ex opposito sitæ sunt, ad uētos frigidos, inter occasum solis estiuū, et orientē æ-
 stiuū: etiā ipsis hi uēti uernaculi ac indigenæ sunt, ab austro uerō et calidis uētis
 protectæ sunt. Et de his urbibus sic se res habet. Primū quidē aquæ & duræ &
 frigidæ ut plurimum dulcescūt. Homines autē uegetos & siccos esse necesse est:
 & plures uētres infernos crudos ac duros habere, supernos uero fluidiores: bi-
 liososq; magis q̄ pituitosos esse. Capita uero sana ac dura habēt. & plerūq; uasa
 ipsis rūpūtur. Morbi autē populares ipsis hi sunt, pleuritides et quos acutos esse
 receptū est. Necesse est aut ita habere, quā alui duræ existāt. & suppūрати multi
 ex omni occasione fiunt. Huius aut causa est, corporis extēsis, ac uētris duricia.
 Siccitas em̄ et aquę frigiditas facit ut uasa rūpātur. Edaces aut tales naturas esse
 necesse est, & nō multū bibaces. Nō enim fieri potest ut simul multū edāt ac bi-
 bāt. Lippitudinesq; his fieri ex tēporis interuallo necesse est, duras aut ac uehe-
 mētes, & statim oculos rūpi. Sanguinis itē ex narib. fluxiones uehemētes æstate
 fieri iuniorib. triginta annis. Morbos etiā sacros appellatos, paucos quidē, ue-
 rū uehemētes. Lōgæ uero uitæ magis q̄ alios, hos homines esse par est: & ulce-
 ra nō pituitosa oboriri, neq; efferari. Mores uero magis feros q̄ māsuetos. Ac
 uiris quidē hi morbi uernaculi sunt: præterq; si quis omnib. cōmunis ex tēporū
 mutatiōe ingruat. Ex mulierib. uero, primū quidē multæ steriles fiūt, ppter a-
 quas quæ duræ sunt ac crudæ, et frigidæ. Purgatiōes em̄ mēsiū nō cōtingūt cō-
 mode, sed paucę ac prauæ. Deinde pariūt difficulter, et nō ualde abortiūt. Vbi
 uero pepererint, pueros nutrire nō possunt. Lac em̄ ab aquarū duricia ac crudi-

tate extinguitur: & tabes frequētes à partu fiunt. Præ uiolentia enim ruptiones ac uulsuras habent. pueris autem hydropes in testibus fiunt, quādiu parui fuerint. deinde ætatis progressu euanescent. Pubescunt autē serò in hac ciuitate. Et de calidis quidem uentis ac frigidis, & urbibus ad hos sitis, hoc modo uelut dictum est, res se habet. Quæcūq; uero ciuitates sitæ sunt inter æstiuos ac hybernos solis ortus: & quæcūq; ex opposito harū, de his ita habet. Quæ quidem ad orientem solem sitæ sunt, eas par est esse salubriores his quæ ad septentrionem conuersæ sunt, & his quæ ad calidos uentos sitæ sunt, etiamsi stadiū solum inter sit. Primum enim moderatior est caliditas ac frigiditas. deinde aquas quæ ad solis ortus sunt, omnes splēdidas esse necesse est, & odoratas, & molles, & amabiles oriri in hac ciuitate. Sol enim emergēs ac illustrans ipsas castigat. Matutinum enim tempus ipse aer ut plurimū semper occupat. Et hominū formæ boni coloris sunt, & magis floridæ, si nō quis alius morbus prohibeat. Et clara uoce præditi sunt homines, & ad iram ac intelligentiā præstantiores septentrionalibus, si quidem & alia quæ in ipsa nascuntur meliora existūt. Et ciuitas quæ hoc modo sita est ueri maxime similis est, iuxta caliditatis ac frigiditatis moderatorem. Et morbi pauciores fiunt ac debiliores, similesq; sunt morbis, qui in ciuitatibus ad uentos calidos conuersis oriuntur. Et foeminæ isthic ualde fecundæ sunt, ac facile pariunt. Et de his quidem ita habet. Quæ uero ad occasus sitæ sunt, & ipsæ à uentis ab oriēte spirantibus protectæ sunt, & tum calidi uentiles uiter afflant, tum frigidi ab Vrsis præterflant: eas urbes necesse est situ morbosissimo positas esse. Primum enim aquæ non sunt splēdidæ. Causa uero est quod aer matutinū tempus ut plurimum occupat, qui aquæ immixtus claritatem eius disperdit. Sol enim priusquā eleuetur, non illustrat. Aestate uero, maxime quidem auræ frigidæ spirant, & ros decedit. de cætero uero sol ad ipsas occidens, quā maxime homines percoquit. Quapropter etiā decolores ac infirmos ipsos esse par est, & ex omnibus prædictis morbis participare. Nulla enim re ab ipsis separantur. Verisimileq; est ipsos graui uoce præditos ac raucosos esse, propter aerē, eo quod impurus plerūq; isthic est, & morbosus. Neq; enim ab aquilonaribus ualde expurgatur. Non enim perseverant uenti. Qui uero perseverant ac ipsis incubunt, aquosissimi existūt. Nam uenti occidentales, similes sunt autūno. Et huiusmodi ciuitatis situs est ad diei mutatiōes, eo quod multum temporis inter matutinū ac uespertinū intercedit. Et de uētis quidem qui cōmodi sunt ac incōmodi ita se res habet. Cæterū de aquis deinceps narrare uolo, quæ morbosæ sint, & quæ saluberrimæ: & quæ mala ab aqua fieri uerisimile est, itemq; quæ bona. Plurimā enim partem cōferunt ad sanitatē. Quæcūq; igitur palustres sunt, & stabiles ac lacustres, eas necesse est æstate esse calidas, ac crassas & olentes. Quū enim nō defluant, sed aqua pluuiā semper noua inferatur, & sol urat, necesse est ipsas decolores esse, & prauas ac biliosas. Hyeme uero glaciatas & frigiditas ac turbatas præ niue ac glaciē, ut pituitosissimæ ac raucosissimæ existant: Bibentibus autē splenes semper sint magni ac pleni: & uentres duri, tēues ac calidi. Humeri uero & clauiculæ & facies attenuata. In splenem enim carnes colliguntur, quapropter graciles existūt. Edaces autē esse tales ac siticulosos par est, uentresq; tum supernos, tum infernos, calidissimos habere, ut etiam fortioribus medicamētis opus habeāt. Atq; hic morbus

ipsis

ipsis & æstate & hyeme familiaris est. Ad hæc etiam hydropes plurimi ac letalissimi fiunt. Aestate enim dysenteriae multae ac alui profluvia incidunt, & febres quartanae diuturnae. Hi autem morbi prolongati, tales naturas ad hydropas deducunt ac occidunt. Et hi quidem morbi ipsis æstate fiunt. Hyeme uero iunioribus, quidem peripneumoniae, & insaniae morbi. Senioribus uero, febres ardentes, propter uentris duriciem. Mulieribus autem, tumores oboriuntur, & pituita alba, & uix in uentre concipiunt, ac difficulter pariunt, & foetus magnos ac tumidos. deinde ex alimentis tabescentes ac deprauati fiunt. Et purgatio comoda post partum mulieribus non contingit. Pueris uero herniae accedunt, & uiris uarices, & ulcera in tibia. Quare fieri non potest ut tales naturae longae sint, sed ante temporis aduentum senescunt. Praeterea foeminae se in utero habere putant, & ubi partus tempus adest, uentris moles illa ac plenitudo euanescit. Hoc autem contingit ex aqua, quum uteri ex aqua concepta laborant. Atque has quidem aquas ad omnem rem improbas esse censeo. Secundo uero loco eas quarum fontes è petris scaturiunt. Duras enim esse necesse est: aut isthic ubi calidae aquae existunt: aut ferrum nascitur, aut aes, aut argentum, aut aurum, aut sulphur, aut alumen, aut bitumen, aut nitrum. Hæc enim omnia præ uiolentia caloris nascuntur. Non itaque ex huiusmodi terra aquae bonae prodeunt, sed duræ & æstuosae, quæ & difficulter minguntur, & ad alui egestionem contrariae sunt. Optimæ uero sunt quæ ex sublimibus locis, ac terreis collibus fluunt. Hæ enim & dulces sunt, & albæ, & uinum modicum ferre possunt. & hyeme calidae fiunt, æstate uero frigidae. Tales enim fuerint ex profundissimis fontibus. Maxime uero laudare eas oportet, quarum fluxiones ad solis exortus erumpunt, & praesertim ad æstiuos. Necesse est enim odoratas esse ac leues. Quaecumque uero salsae, & crudae ac duræ sunt, ad hoc quidem ut eas omnes bibant, non bonae sunt. Sunt tamen aliae quæ naturæ, & morbi, quibus tales aquae in potu commodae sunt, de quibus statim dicam. Habet autem & de his hoc modo. Quæ quidem aquae fontes suos ad orientes habent, hæ præ omnibus optimæ sunt. Secundum ab his locum habent, quæ inter æstiuos solis exortus ac occasus emergunt, & magis hæ quæ ad orientes. Tertio loco sunt, quæ inter occasus æstiuos ac hybernos scaturiunt. Pessimæ uero quæ ad austrum, & quæ inter æstiuum ortum & occasum. Et hæ quidem ad australes partes ualde prauae sunt, ad boreales uero meliores. His autem hoc modo uti conuenit. Quisquis sanus est ac ualet, is nullum discrimen faciat, sed semper eam quæ praesens est bibat. Quicumque uero morbi gratia, eam quæ commodissima est bibere uolet, is si ita fecerit, maxime sanitatem assequi poterit. Quorum quidem uentres duri sunt, & idonei ad hoc ut amburantur, his dulcissimæ & leuissimæ ac splendidissimæ conducunt. Quorum uero molles uentres, & humidi ac pituitosi sunt, his durissimæ & crudissimæ, ac subsalsæ aquae cōferunt. Sic enim maxime resiccati poterint. Quaecumque enim aquae optimæ cocti sunt, ac facillime liquecunt, eas par est & uentrem maxime exoluere ac eliquare. Quæ uero crudæ sunt, & minime cocti bonæ, hæ magis cōstringunt uentres ac resiccant. At enim mentiuntur homines de salsis aquis, propter imperitiā, in eo quod per aluū secedere easque soluere putantur. Maxime enim contrariae sunt ad alui egestionem ac secessum. Sunt enim crudæ, & coqui non possunt. Quare uenter magis ab ipsis adstringitur quam eliquatur. Et de fontanis quidem

quidem aquis hoc modo res se habet. De pluuiialibus autē, & quæ à niue fiunt; ut habeat, deinceps dicam. Aquæ igitur pluuiiales leuissimæ & dulcissimæ, & tenuissimæ ac splendidissimæ sunt. Primū enim sol quod tenuissimū ac leuissimū est in aqua educit ac sursum rapit. Clarū autē hoc, ipsum mare facit. Quod em̄ salsum est isthic relinquitur, præ crassitudine ac gravitate, et fit mare. Quod uero tenuissimū est sol sursum rapit, præ leuitate. Rapit autē tale non solum ab aquis stagnātibz, sed etiam ex ipso mari, & ex omnibus in quibus aliquid humoris inest. Inest autem in omnibus rebus. Et ex ipsis hominibus tenuissimū ac leuissimū humorem ducit. Eius rei maximū signū inde sumere licet, ubi homo uestibz, indutus in sole iter fecerit, aut sederit. Quascūq; enim corporis partes sol aspicit, hæ nō exudant. Sol enim quicquid comparat sudoris sursum rapit. Quæ uero sub ueste contactæ sunt, aut sub aliqua aliā re, hæ exudant. Educitur enim ac domatur à sole sudor. Seruatur autē ex tegmentis, ut ne disperdat̄ tur à sole. Quum uero in umbram deuenerit, totū corpus similiter sudore perfluit. Non enim amplius sol affulget. Quapropter etiā ex omnibus aquis hæ citissime putrescunt; & odorē malum pluuiialis aqua habet, eo quod ex plurimis cōgregata est ac permixta, ut citissime putrescat. Ad hæc uero, ubi rapta est & in sublimē eleuata, dum circūfertur & ad aerem permiscetur, quod turbidū est in ipsa, ac noctem refert, id excernitur ac decedit, & fit aer, & nebula. Quod uero tenuissimū est ac leuissimū in ipsa, hoc relinquitur ac dulcescit, dum à sole uritur ac coquitur. Fiunt autem & alia omnia quæ coquuntur semper dulcia. Quādiu igitur dispersa fuerit, & nondū congregata, fertur sublimis. Vbi uero coaceruata fuerit, ac simul cōgregata derepente à uentis inter se aduersarijs: tūc deorsum prorumpit, qua parte plurima collecta fuerit. Tunc enim hoc magis fieri uersimile est, quā nebulas à uento stabilitatē non habēte concitatas ac procedentes, derepente uentus contrarius, ac aliæ nebulæ reliserint: atq; tunc quidē prima ipsius pars congregatur, quæ uero à posteriore parte sunt, insuper accedunt, & sic crassescunt, & nigrescūt, ac simul cōgregantur, & præ gravitate deorsum prorumpunt, & pluuiæ fiunt. Atq; hæ quidem aquæ optimæ sunt secundum hanc rationē. Verum opus habēt ut decoquantur, ac excolentur. Sin minus, odorem prauū habent, & raucedines & uocis gravitatē bibentibus inde accedere par est. At uero aquæ ex niue ac glacie fiētes, omnes malæ sunt. Quum enim semel concretæ fuerint, nō amplius in pristinam naturā restituntur. Sed quod quidē in ipsa clarū ac leue, & dulce est, excernitur ac disperditur. Quod uero turbidissimū est ac pōderosissimum, relinquitur. Hoc uero cognoueris hoc modo. Si enim uolueris hyemis tempore, uasculū certa aquæ mēsurā infusa, sub dio exponere, quo maxime cōgeletur: deinde pōstridie in locū calidum deportatum sinere, quo maxime glacies lique scat, & ubi exoluta fuerit, ac quam metiri: reperiēs aquam multo pauciorē. Atq; hoc signū est, qd à congelatione id quod leuissimū ac tenuissimū est disperditur, & non quod grauissimum ac crassissimū existit. Non enim hoc disperdi poterit. Hæc igitur de causa has aquas quæ à niue ac glacie eliquantur, pessimas esse puto ad omnes res: Itemq; eas quæ ad has sequuntur. Atq; sic quidem de pluuiialibus, & niualibus, ac glacialibus aquis res se habet. Calculo uero maxime laborant homines, & ex rhenum affectionibus, & urinæ stillicidio, & coxēdicum morbo corripiuntur

tur, & herniæ fiunt, ubi aquas omnigenas bibunt, & de magnis fluminibus, in quæ alia deferuntur: & de stagno, in quod fluxiones multæ ac omnis generis deueniunt. Et quia aquis inuectitijs utuntur, quæ ex longo, & non breui locorum intervallo afferuntur. Non enim fieri potest, ut alia aqua similis sit alij. Sed aliæ dulces sunt, aliæ salæ, & aluminosæ, aliæ de calidis fluunt. Vbi uero hæc simul inter se miscentur, dissident: & quæ fortissima est, semper superat. Præualeat autem non semper eadem, sed alias alia. Sed & ex uentis, alij quidem Boreas robur exhibet, alij uero Austro, & de reliquis eadem ratio existit. Talibus igitur necesse est limum & arenam in uasis subsidere, & ab his si potentur, morbi prædicti fiunt. Quod autem non omnibus, consequenter declarabo. Quorum quidem aluus satis fluida est ac sana, & uesica non ardens, neque stomachus uesicæ ualde coardescit, hi facile urinam eiciunt, & in uesica nihil ipsis congregatur. Quorum uero aluus ardens ac feruida fuerit, in his necesse est etiam uescicam idem perpeti. Quum enim magis quam pro natura fuerit calefacta, stomachus ipsius inflammatur. Vbi uero hæc perpetitur, urinam non dimittit, sed in seipsa concoquit, & adurit: & quod quidem tenuissimum in ipsa est, excernitur: & quod purissimum est, trahit & emingitur. Quod uero crassissimum ac turbidissimum est, coaceruatur, & coalescit primum quidem parum, deinde maius fit. Dum enim uoluitur ab urina, quicquid crassum compactum fuerit, ad seipsum adaptat, atque sic augetur, & in totum con- crescit. Et quum urinam emittit, ad uescicæ stomachum allabitur ab urina impulsam, & urinæ emissionem impedit, & dolorem uehementem exhibet. Quare pueri calculosi fricant ac trahunt pudenda. Videtur enim ipsis causa mictionis eo loco esse. Signum autem eius quod hæc ita se habent, hoc est. Urinam splendidissimam calculosi mingunt ad similitudinem feri, eo quod id quod crassissimum est ac bilio- sissimum isthuc manet, & coaceruatur ac coalescit. Et plerique sanè hoc modo lapidem & calculum contrahunt. fit autem pueris etiam ex lacte, si non salubre id fuerit, sed ualde calidum ac biliosum. Ventrem enim percalefacit, & uescicam. Quare urina dum aduritur hæc patitur. & sanè sentio melius esse pueris uinum quam aquosissimum dare. Minus enim uenas adurit ac resiccat. Muliebribus autem pudendis non similiter contingit. Meatus enim urinæ in uesica breuis est et amplius, ut facile urina impellatur. Neque enim manu pudendum fricat, ueluti masculus, neque urinæ in uesica meatum contingit. Ad pudenda enim perforatus est. Et quia meatus sunt amplius, etiam plus bibunt quam pueri. Et de his quidem sic res se habet, aut his quam proxime. Cæterum de annis hoc modo consideratione facta quis cognoscere possit, qualis nam annus sit futurus, salubris ne an morbosus. Si enim secundum rationem fiant signa in astris occidentibus ac orientibus: & in autumno aquæ fiant: & hyems sit moderata, & neque ualde demens, neque modum excedens frigiditate: & in uere ac in æstate tempestiue pluat: sic sanè saluberrimum esse annum par est. Si uero hyems quidem sicca sit, & borealis, uer autem pluuiosum & australe, necesse est æstatem febriculosam fieri, & lippitudines inducere. Quum enim æstus derépente accedat, terra humida existente à uernis imbribus, & ab austro: necesse est æstum duplicatum esse, & à terra irrigua ac calida, & à sole urente: quum uentres in hominibus nondum contracti sint, neque cerebrum resiccatum. Non enim fieri potest, quum uer tale existat, ut corpus & caro non humore fluida fiant, adeo ut febres acutissimæ in omnes ir-

ruant, maxime autem in pituitosos. At dysenterias par est fieri & mulieribus, & uiris humidioribus. Et si quidem circa canis exortum accedat aqua ac tempestas, & Etesiae spirauerint, spes est cessationis, & ut autumnus salubris fiat. Sin minus, periculum est ne & pueri, & mulieres moriantur: Minime uero senes: & ne qui superstites euadunt, in quartanas desinant, & ex quartanis in hydropas. Si uero hyems australis fiat, & pluuiosa, & clemens, uer autem boreale & siccum & tempestuosum, primum quidem mulieres quae uterum gestant, & partus ipsis ad uer instat, abortum facturam esse uerisimile est. Quae uero etiam pepererint, impotentes ac morbosos pueros parere, ita ut aut statim pereant, aut tenues & debiles, ac morbo si uiuant. Atque haec quidem mulieribus, reliquis uero dysenterias & lippitudines siccas: et aliquibus defluxiones a capite in pulmonem. Pituitosis igitur dysenterias fieri uerisimile est, & mulieribus, pituita de cerebro defluente, propter naturae humiditatem. Biliosis uero lippitudines siccas, propter carnis caliditatem ac siccitatem. Valde autem senibus defluxiones, propter raritatem ac eliquationem uenarum, adeo ut aliqui quidem derepente pereant, aliqui uero semisiderati, aut dextra aut sinistra parte fiant. Quum enim hyems sit australis, & pluuiosa, ac calida, & corpus non adstringatur, neque uenae: uere accedente boreali & sicco ac frigido, cerebrum postquam ipsum dissolui ac purgari cōgigit, a grauedine ac raucedine, tunc simul cum uere stabilitur ac cōstringitur. Quare derepente aestate accedente, & ardore ac mutatione contingente, hi morbi incidunt. Et intestinorum leuitates & aqua intercus fere reliquis morbis desinentibus superueniunt, quum non queant facile uentriculi a concepta humiditate exsiccari. Si autem aestas pluuiosa sit & austro multum perflatur similisque sequatur autumnus, necesse est hyemem morbidam esse, & his qui pituita abundat, & qui quadragesimum annum excesserunt febres ardentes fieri uerisimile est, qui uero bile abundant, costarum inflammationes & pulmonis, pleuritidas ac peripneumonias dicitur. Si uero aestas sicca existat, & borealis, sequens uero autumnus pluuiosus & australis, capitis dolores ad hyemem expectare cōuenit, & cerebri corruptiones, ampliusque raucedines, grauedines, & tusses, aliquibus etiam tabes. Quod si Borealis sit autumnus ac siccus, & neque sub caniculā, neque sub Arcturi occasum pluuiosus, cōfert pituitosis natura, et maxime qui natura sunt humida, et mulieribus. Biliosis autem infestissimum hoc tempus existit. Valde enim exsiccantur acciduntque eis lippitudines aridae, & febres acutae, ac diuturnae, & aliquibus bilis atra, siquidem quod liquidissimum & aquosissimum in bile est cōsumitur, densissimum uero & acerrimum relinquitur, quod idem accidit secundum eandem rationem & circa sanguinem, unde himorbi his accidunt, pituitosis autem haec omnia cōmoda sunt. Exsiccantur enim & in hyemem perducuntur, minime humecti, sed resiccati. Haec igitur si quis mente concipiet & cōsiderabit, is praecognoscet plurima omnino quae ex huiusmodi mutationibus sint futura. Maxime autem obseruare oportet magnas temporum mutationes, ut neque medicinas in illis libentes exhibeamus, neque uramus quae circa uentrem, neque secemus, priusquam praetereant dies decem aut plures, & non pauciores. Periculosissima sunt etiam ambo solstitia, maxime uero aestiuum Periculosum etiam aequinoctium utrumque, magis uero autumnale. Oportet autem & astrorum exortus cōsiderare, praecipue canis, deinde arcturi, & Pleiadum occasum. Morbi enim in his maxime diebus iudicantur, alijque perimunt, alij uero desinunt, aut in

in aliam speciem, aliumq; statum trāsmutantur. Et circa hæc quidem sicut dixi habet. Volo autē & de Asia & Europa demonstrare, quantum differant inter se per omnia, & de gentiū formis quid distent, & nihil inuicē simile habeāt. Verū de omnibus si quis dicere uelit in immēsum excresceret sermo, quare de maximis, & plurimū differētib; diuersitatibus dicam, quantū saltē mihi in ea re est cōpertum. Ac dico quidē plurimū differre Asiam ab Europa secundū naturas omnium ex terra nascentiū, itemq; hominū. Longe enim pulchriōra & maiōra omnia nascūtur in Asia. Estq; regio ipsa, hac nostra multo māfuetiōr, sunt etiā hominum mores benigniores & cultiores. Causa uero horū est temporū anni temperata mistura. Siquidem in medio solis exortu sita est ad aurorā, à frigiditate ac caliditate omni remotior. Incrementū autem & benignitatē inde proficisci omnibus in cōfesso est, quum nihil sit præcellens & cogēs uiolenter, sed per omnia æqualitas uigeat, quanquā non habeant ubiq; per omnē Asiam omnia secundū eūdē modū. Quæcūq; enim in ea regio in medio sita est calidiq; & frigidi, ea omniū fertilissima existit, & arboribus refertissima & maxime serena, aquisq; utitur & coelestibus & ex terra promanātibus. Neq; enim à calore cōbusta est ualde, neq; à squalore & aquarū inopia exsiccatur, neq; à frigore oblæditur. Verū austris perflatur & irrigua est, tum propter imbres multos, tum propter niues. Fructus autē suo tēpore maturos multos in ea nasci par est; siue ex sparsis seminibus hi proueniant, siue terra ipsa per se spōte producat eorum plantas, quarū fructibus utūtur homines, eas ex agrestibus cícures & domesticas facientes, & pro cōmoditate sua trāsplantes. Pecora etiā ipsa pleniora proueniūt, quæ & pariūt sæpius & pulcherrime educantur. Quin & homines habitiores esse ac specie pulcherrimos, & magnitudinis eximiae, minimeq; differentes, quantū ad formā ac corporū proceritatem adtinet, constat. Certūq; est hanc regionē proxime accedere ad naturā ac temperaturā optimæ cōstitutionis, uerum uirilitem, laboris tolerantia, ac audaciam non uerisimile est huic naturæ innasci. Sicut neq; eiusdē neq; diuersi generis constantes ac perpetui sunt amatores. Vincit enim in ipsis uoluptas, quæ ratio est multifor-
mes generari partus, præcipue in feris. Atq; sic quidem de Aegyptijs ac Libycis mihi habere uidetur. Qui uero ad dexterā hybernī ortus solis usq; ad Maotidem paludem habitāt: hic est enim Europæ & Asiæ terminus: sic habet. Multo maior diuersitas est inter illas ipsas gētes, q̃ de quibus iam dixi, quū propter uarias temporū mutationes, tum ob regionis naturā, Habet autē eodē planē modo, quemadmodū & circa aliorū hominū terras accidit. Vbi enim tempora magnas mutationes faciūt & frequentissimas, illic & regio agrestis & maxime inæqualis existit, inueniasq; & mōtes plurimos & densos, iteq; campos & prata. Vbi autē non ualde uariant tēpora, illic æqualissima regio est, quod idem & de hominib; ipsis est intelligendū. Si quis enim recte cōsideret, uidebit quorundam naturā, montanis, syluosis ac asperis locis similem esse, aliorū uero aquosa ac exilia loca referre: sicut quidā pratorū ac paludum naturā præ se ferūt, atq; alij sunt à quorū planitiēb; nudisq; ac siccis terris cōstitutio similis existit. Tēpora enim quæ formarū naturā uariant, sunt diuersa: quū ergo inter sese fuerint maxime diuersa, uarias & multiplices formas producunt. Porro quæ parū inter se differūt gentes relinquā, Quæ autē plurimū non natura solum, sed & le-

gibus ac cōsuetudinibus discrepāt, de illis referā quomodo habeāt. Ac primū
omniū de Macrocephalis, quū nulla omnino alia gens sit, quę similia capita ha
beat. A principio quidē cōsuetudo in cāsa fuit, ut tam lōgis capitibus essent.
365 Nūc autē natura ipsa cū cōsuetudine cōspirauit. Si quidē generosissimū apud
eos putatur, caput habere q̄ maxime longū: cōsuetudinis autē hoc inītiū fuit.
Quum recēs infans natus est, caput eius adhuc tenerū ac molle existēs q̄ celer
rime cōstringunt manibus, coaptātesq; cogunt in longitudinē augeri, quin &
uinculis cōnectunt, ac aptis instrumētis colligāt, quo rotūditas capitis phibe
366 tur, ac lōgitudō augeatur. Ea cōsuetudo tantū effecit ut eiusmodi natura capitū
existeret. Tēporis uero progressu natura quoq; tales produxit, ut non esset ne
cesse cōsuetudine priore cogere. Quū enim semē genitale ab omnib. corporis
membris procedat, à sanis quidē sanū, à morbidis morbosum, fiatq; ut ex caluis
calui gignātur, ex celsis celsi, & ut plurimū distortus distortū generet, eadēq; ra
367 tio sit circa reliquas formas: quid prohiberet ut nō ex Macrocephalis Macroce
phali gignerētur. Nūc autē non nascūtur ita magnis capitib. quemadmodū pri
us, quū cōsuetudo nō amplius daret, per incuriā hominū intercepta. Et de his
quidē hęc sufficiāt. De illis autē qui Phasim accolūt adiciam. Regio eorū palu
stris est, calida, aquosa & densa, imbresq; in eam decidunt omnibus tēporibus
370 & magni & impetuosī, homines uero ipsi uitā agunt in paludibus domosq; li
gneas et ex arūdinib. in ipsis aquis habēt extructas, neq; multū inde p̄deunt, ut
adeant uel cinporia uel urbes. Verū nauiculis ex uno ligno fabrefactis permeāt
fursum ac deorsum, habēt enim fossas ac ductus aquarū plurimos. Bibunt autē
aquas calidas & stagnantes, quæ & à sole sunt putrefactæ, & ab imbrīum casu
371 auctæ. Ipseq; fluuius Phasis omniū fluuiorum stagnātissimus est, & qui lentis
simo cursu profluat: fructus autē qui illic nascūtur omnes insalubres sunt, eui
rati imperfectiq; præ multitudine aquarū, neq; unquā maturescūt. Atq; quum
multus aer ab aquis regionē occupet, ob hāc ipsam causam, q̄ ad formā ac cor
porū speciem adtinet, Phasiani sunt à reliquis hominibus lōge diuersi. Sunt e
372 nim magnitudine ingēti, ac corpulentia ualde excellenti, neq; iuncturæ eorū ul
la, neq; uenæ cōparent, pallidumq; præ se ferūt semper colorē, quemadmodū
qui regio sunt obnoxij morbo: loquuntur autē ut si qui alij omnium hominum
grauissimē, nimirum aere utētes non sereno, sed obscuro, & maxime humecta
to, Sunt insuper ad laborē à natura ipsa segniores, anniq; tēpora non uarias ha
373 bent, neq; ad æstum, neq; ad frigus permutationes. Ventī autē eis sunt plurimi
austrini omnes, præter unum eius regionis propriū & indigenā, qui aliquādo
uiolentior ac molestior calidus existēs spirat, quē Cenchrona patrio uocabulo
appellant. Verum Borēas nō ualde ad eos pertrāsīt, q̄ si aliquādo spiret, debilis
tamen existit ac ualde lenis. De natura ergo ac diuersitate & forma eorū qui A
374 siam & Europam incolunt, ita habet. Quod autē timidiōres, effeminatiōres,
ac imbelles præ Europæis Asiani existāt, morib; q; māsuētiōres, tempora ipsa
anni in causa sunt, quæ non magnas permutationes faciunt, neq; calorīs, neq;
frigorīs, sed semper æqualia permanēt: unde neq; mētes stupore percelluntur,
neq; corpora fortem transmutationē incurrunt. A quibus uerisimile est iram
375 exasperari, cognitionēq; & calorē amplius excitari, q̄ si semper in eodem statu
quis persistat. Mutationes enim sunt quæ hominis mētē semper excitāt, neq;
finunt

sinunt quiescere. Propter quas sanè causas imbelles uniuersum Asianorū genus
 existit, atq; adhuc amplius propter leges. Multo maxima enim Asiæ pars sub
 regibus est. Vbi aut non in sua potestate uiuunt homines, neq; sui iuris sunt, sed
 dominis subiecti, ibi nō multū curiosi sunt quo modo se ad bellū adparent, imò
 magis hoc curāt, ut ne bellicosi uideātur. Pericula enim eis nō æqualia instant.
 Nam hi in militiam proficisci, laboresq; perferre, ac mortē oppetere pro dōmi
 nis suis coguntur, relictis interim domi liberis, uxorib. ac reliquis amicis: atq; si
 quidē uiriliter et feliciter bellū gesserint, dominis inde cōmoda accedūt, eorūq;
 facultates inde augētur. Verum ipsis præter pericula & cædes nihil demetitur.
 Proinde neq; his hominib. regionē frequēter habitātā esse necesse est, Imò eam
 propter inertīā bellicam ac otium à plerisq; relinqui. Vt enim quisq; maxime
 à natura uirilis & magnanimus est, ita plurimū eius animus legēs auersatur: cu
 ius rei magnū indiciū uel inde habere licet. Quod quicunq; in Asia Græci iteq;
 Barbari dominis non subsunt, sed iure suo degūt, sibi ipsiq; omnes labores lu
 crificiunt, illi bellicosissimi omnium existunt. Periclitantur enim ipsi sibi, uirilita
 tisq; præmia ipsi reportāt, sicut timiditatis ac ignauiae poenā luunt pariter. In
 uenias aut & Asianos ipsos inter se plurimū differētes, generosiores alios, alios
 degeneres, quorū omnium causa ad temporū mutationes est referēda, quemad
 modū & in præcedētibus dixi. Atq; sic quidē habet in Asia. In Europa uero ge
 nus hominū est Scythicū, circa paludem habitās Maotim, quod à reliquis ge
 tibus maxime differt, Sauromatae appellātur. Horū foeminae equites sunt, arcu
 bus utuntur, ac sagittas iaculātur ex equis, cū hostibus cōgredientes, dum uirgi
 nes existūt, neq; deuirginātur prius, q̃ hostiū tres cōfecerint, neq; prius mari
 tis cohabitāt, q̃ sacra deo patrio more fecerint. Quod si qua sibi uirū acceperit,
 ab equitatu libera est, nisi necessitas cogat cōmuni expeditione omnes exarma
 ri. Dexterā aut mammā non habēt. Nam puellis adhuc infantibus matres aëreo
 instrumēto in hunc usum paratō, igneq; cādefacto eam auferūt, ac exurunt, ne
 iterum succrescere cōtingat, atq; ut omnis uis ac robur in dextrum humerū &
 brachium deferatur. Cæterū reliqui Scythæ quod ad formā adinet, ipsi sibi
 similes sunt, alijs dissimiles. Sicut quoq; Aegyptij ipsi inter se, præter q̃ quod
 hi à uehēmēti calore, illi ab intēso frigore sunt cōpressi. Verū solitudo quæ Scy
 thica dicitur, in planitie sita est, pratis abūdans, sublimis & mediocriter aquosa.
 Sūt em fluij in ea magni, in quos aqua ex cāpis per riuos deducitur. In hac
 itaq; Scythæ degūt, qui Nomades uocātur, propterea q̃ nullas habeāt dōmos,
 sed in curribus habitāt. Sunt autē currus ex quibus minimi quatuor rotis, reli
 qui sex circumagūtur. Sunt etiā luto obturati ac instar domorum fabrefacti, ali
 qui simplici, aliqui etiā triplici tabulato, Vnde robur illis inest aduersus omnes
 iniurias aquarū, niuis ac uentorū propellendas. Trahunt currus aliquos quidē
 bouum paria duo, aliquos tria, atq; hi cornibus carēt, quū præ frigore regionis
 cornua eis nō enascantur. In his itaq; curribus degūt mulieres. In equis autē ue
 huntur uiri. Sequuntur autem simul oues, boues & equi. Tādiu deinde in uno
 subsistunt loco, dum sufficit ipsis pecoribus pabulum, quo deficiente in aliam
 regionē commigrāt. Vescuntur aut ipsi carnibus cōctis, bibuntq; lac equinū, co
 medunt etiā Hippacen, id autem est caseus equinus. Hactenus ergo de uictu &
 moribus diximus, tēporibusq; anni ac formis, quæ à reliquis hominib. longissi

me sunt Scythiæ genti diuersæ. Ipsa enim sibi inter se gens similis existit quemadmodum & gens Aegyptiorum. Minime autem fecunda ea gens est, regioque ipsa minimas feras enutrit, neque numero, neque specie insignes. Sub ipsis enim Vrsis Rhiphæisque montibus sita est, unde Boreas spirat, Solque ipse supremo æstiuo solstitio deficiens proxime accedit, ac tum quidam exiguo tempore calefacit. Neque uero uenti à calidis locis spirantes ualde ad eam regionem penetrant, nisi parumper & debiles. Verum ab Vrsis uenti procedentes sunt illic perpetui frigidi, à niuibus, glacie, imbribusque condensati. Qui nunquam à montibus decedunt, ut propterea etiam inhabitabiles fiant. Aerque ipse totum ferè diem nubilus capos occupat. Ipsi uero in humidis locis degunt. Et ferè perpetua est ipsis hyems, æstas autem paucissimis diebus atque illis non ualde multa, Sunt enim planities eminentiores, & nudæ, neque ullis montibus circumseptæ, sed ferè sub ipsis Vrsis accliuës. Neque feræ nascuntur illic magnæ, sed quales possibile est sub ipsa terra cõtegi. Prohibet enim hyems & nuditas terræ, quæ & diueticulis & umbraculis caret, propter temporum anni mutationes, neque multas neque fortes, sed similes semper, uel parum admodum diuariantes, unde & formas corporum inter se similes habent, quum eodem utantur uictu & amictu, æstatis et hyemis tempore, attrahuntque aerem aquosum condensatum, aquam insuper bibentes à niuibus & glacie resolutam, nullo etiam corporis exercitio accedente, quum non uerisimile sit corpus aut animum ullis exercitationibus apta fieri, ubi non mutationes temporum sunt fortes. Propter quas causas formæ eorum sunt crassæ & carnosæ. Luctura uero humectæ & inefficaces, uetriculique humidi omnes, maxime omnium tamen inferior aluus, Nequit enim ipsa exsiccari in eiusmodi quum regionis, tum naturæ & temporis constitutione. Sed pinguedine & nuditate carnis formæ inuicem sunt similes, masculorum masculis, & foeminarum foemellis. Tempora enim quum sint inter se similia, nullas corruptiones, neque malignitates inferunt in seminis genitalis mixturam ac compactionem, nisi quiddam aliud fortuito uel casu contingat, aut à morbo. Magnum autem argumentum humiditatis corporum Scytharum hoc exhibebo. Multos enim ipsorum, præcipue qui Nomades sunt, reperias exustos humeros ac brachia habentes manuūque iunctionuras, pectora, coxas, & lumbos, nullam sanè aliam ob causam, nisi ob humoris & mollitiei naturæ detractionem. Nam neque arcus intedere, neque telum torquere possunt præimpotentia humiditatis humerorum: quum autem uruntur, humor ipse à iunctionis exoluitur, fiuntque corpora ipsorum ualidiora, melius nutriuntur, & magis redduntur articularum usu potentia. Fluida uero fiunt ac lata primum propterea quod fasciis non colligantur, quemadmodum fieri solet in Aegypto. Deinde quod non animaduertunt quomodocumque inter equitandum equis infideant. Postremum etiam propter desidia perpetuam. Masculi enim eorum antequam potentes fiant equos conscendere, atque in illis uehi, plurimum temporis desident in curribus, raroque prodeunt ut inambularent, propter exilia ac perpetuas circulationes. Muliebrum autem corporum formæ ad miraculum usque fluxæ existunt. Porro Scytharum gens fului ualde coloris existit propter frigus ingens. Non enim uehemens accedit ad eos sol, à frigore uero albedo exurit & fit fulua. Neque uero possibile est fecundam esse eorum naturam, quum uiri minime cupidi sint cum foeminis commisceri, ob nimiam corporis liquiditatem, uentrisque mollitiem ac frigiditatem, quæ causæ adparent minime uiros ad coitum incitari. Accedit his lassitudo ex continua equitatione contracta, quæ eos ad commistionem

mitionē reddit impotētiore, atq; hæ sunt causæ cur uiri infœcūdiore pūen-
 tur. Mulieres pinguedo carnis et humiditas steriles facit, præ quibus uteri earū
 genitale semē nequeūt cōtinere. Lunares nāq; purgationes eis nō eueniūt quē
 admodū est necesse, sed minus & intēpestiue per lōgius tēpus. Ipsūq; ampli-
 us uteri os præ pinguedine cōcluditur, ut nequeat semē suscipere. Sūt em̄ ocio
 se & pingues, uētresq; earū frigidi & molles, unde necessario sequitur nō mule-
 tum fœcundā Scytharū gentē esse, cuius rei famulæ earū indicium exhibēt. Nam
 hæ uiris misceri plurimū gaudent, in uteroq; conceptū cōtinent, ppter corpo-
 ris exercitiū frequēs carnisq; gracilitatē. Amplius autē plurimi Scythæ Eunus-
 chi sūt, & muliebria officia obeūt, instarq; fœminarū omnia faciūt, & loquun-
 tur, uocāturq; hi effœminati. Et regiōis quidē incolæ causam ad deū referūt, co-
 luntq; hos ipsos homines & adorāt, sibīp̄s timētes ne quid tale accidat. Mihi
 uero hi affectus diuini quidē esse uidētur, sicut & reliqui omēs, neq; ullū aliqūē
 alio esse diuiniorē aut humaniorē, sed diuinos omēs, uerū unusquisq; eorū suā
 propriā habet naturā, neq; aliq; citra naturā accidit. Quare quō hic affectus cō-
 tingat, ut mihi uidere uideor, narrabo. Ab equitatiōe ipsa diuturni eos corripit
 unt articulorū dolores. Nimirū propendentib; semper ex equiseorū cruribus;
 deinde claudi sūt, cōtrahūturq; coxēdices quū inualuerit morbus. Medicātur
 aut sibi p̄s hoc modo. à principio morbi utrāq; uenā retro aures incidūt, quo
 facto sanguine multo promanāte, somnus eos corripit præ imbecillitate, sicq;
 obdormiscūt; quorū quidē aliqui depulso somno sani exurgūt, aliqui uero mi-
 nime. Atq; mihi sanē uidētur ea medicatiōe se ipsos perdere. Venæ enim retro
 aures sunt, quas si quis secet sterilitatē inferat his quibus secantur, quare id etiā
 ip̄s ex earū incisione accidere certū est. Quādo igitur postea uxores adeūt im-
 potētesq; se factos uident cū illis coire, primū quidē nihil molestius cogitantes
 quiescūt, quū aut bis aut ter, aut amplius frustra opus tētarunt, neq; quicq; pro-
 ficiūt, mox putāt se deū offendisse, in quē culpā reijciunt. Induūtq; se ueste mu-
 liebri, palā se euiratos esse cōfidentes, ad mulierūq; cōtubernia trāseunt earū o-
 pera tractātes. Hoc itaq; malo ditissimi Scytharū afficiūtur, minime uero infir-
 mi. Imò qui maxime & genere et potētia præualēt ex nulla alia, q̄ cōtinuē equi-
 tationis causa hoc perpetiūtur. Pauperes uero minus, quum nō multū equitēt;
 Vnde si hæc affectio alijs diuinior cēsenda esset, nō nobilissimis, nō ditissimis
 Scytharū ferē solis accideret. Sed esset omnib; æqualiter peculiaris. Imò magis
 inuaderet pauperes circa cultū deorū negligētiore, si saltē gaudent dii in homi-
 nū admiratione cōstitui, et pro hoc beneficia hominib; retribuūt. Diuites enim
 sapius dijs sacra faciunt, uictimas offerūt, statuas erigūt, colūtq; quū pecunijs
 abūdēt, pauperes aut minus id faciunt, quum non habeāt. Quinetiā aliquādo
 deos detestātur, qui eis opes nō suppeditēt, ut uerisimilius esset, pauperes ac pa-
 rum abūdantes hoc malo propter crimina sua puniri, q̄ diuites & qui opib; abū-
 dāt. Verū sicut & prius dixi, diuinus quidē hic affectus est, secundūq; naturā
 accidit similiter ut alijs omnes, neq; alia eius causa q̄ ea quā dixi, Scythis existit.
 Simili autē modo et reliquis hominib; euenit. Vbi em̄ frequēter et cōtinuē homi-
 nes equitāt; ibi plurimi à diuturnis dolorib; articulorū, coxēdicūq; maxime &
 pedū corripīuntur, ad coitūq; sūt impotētes, quæ omnia mala Scytharū gēti ad-
 sunt. Atq; ppter ea Scythæ omniū hominū minime sunt ad coitū ualētes. Et q̄

Anaxyridas (braccarum siue ſcēminaliū id genus eſt) ſemper habent, & plurimum temporis in equis deſides degunt, ut neq; manu tractare pudenda liceat, atq; præ frigore & laſſitudine uoluptatis ac iucunditatis coeūdi obliuiſcātur, neq; prius aliud ſibi faciendū putent, q̃ ut eūirati ſiant. Haſtenus ergo de Scytharum gente recenſui. Reliquum autē in Europa hominum genus ualde inter ſe diſſimile eſt & diuerſum, tum quod ad magnitudinem adtinet, tum quod ad formam, atq; id propter temporū mutationes cōtingit apud eos magnas & frequentes. Sūt enim eis calores uehementēs, & hyemēs fortes, pluuiæ multæ, ruſumq; ſiccitas diutina, et uēti plurimī, ex quibus multæ et omnimodæ ſiūt trāſmutationes. Neq; à uero diſcrepat circa generationē has ipſas mutationēs ſentiri, inq; ſeminis genitalis coactione aliā, neq; ex eodē etiam eandē, æſtatis pariter ut hyemis, pluuiolo ut ſiccō tēpore, progigni. Eaſq; cauſa eſt, cur putē Europæos magis q̃ Aſianos ſecundum corporum formas inter ſe diſcrepare, & magnitudinēs diuerſiſſimas in ſingulis adeo urbibus prouenire. Plures enim corruptionēs cōtingunt in ſeminis coactione, quum tēpora frequenter uariant, q̃ ſi eadē ſunt & ſimilia. Eadem aut morum ratio in utriſq; exiſtit. Feritas, integritas, & audacia à natura Europæis innāſcitur. Frequētes enim mētis percuſſiones feritatem inducunt, manſuetudinē contrā & benignitatē extirpant. Quare etiam magnānimōs magis eoſqui Europā incolunt Aſianis iudico. Siquidem ſimilitudo & æqualitas ſegnitiem parit. Mutatio aut & animum & corpus ad exercitationē excitat. Augetur itaq; à deſidia & ocio timiditas, ab exercitio uero & laborib; creſcit uirilitas. Vnde bellicoſiores quoq; Europæi extāt, nō ob hanc ſolū cauſam, ſed & propter leges. Nō enim regibus obediūt quemadmodum Aſiani. Vbi enim ſub regib; uiuitur, ibi neceſſe eſt homines timidifſimōs eſſe, quemadmodū & ſupra oſtēdi. Seruitute nāq; animi eorū preſſi non libenter, neq; uolentes temere pro alijs ſe periculis exponūt. Europæi autē ſuo iure uiuētes, quū pro ſeiſiſ pericula belli ſubeāt, magna cupiditate ferūtur, uolentesq; ac alacres difficultates omnes adgrediūtur, ipſiq; ſibi ex re bene geſta præmia reportāt, ut certū ſit leges plurimū ad magnānimitatē conferre. Tota itaq; & uniuerſa res de Europa & Aſia ſic ut retuli habet. Cæterū Europa ipſa adhuc habet gētes inuicē differētes, nō magnitudine & forma ſolū, ſed & magnanimitate ac fortitudine. Quæ uero in eis hanc diuerſitatē faciāt, in præcedētib; dixi dicāq; amplius magis manifeſte. Quicūq; regionem montanā, aſperā, nudā & nō aquoſam incolunt, his mutationes temporū contingunt magnæ & diuerſæ, unde & hominū formas magnas progigni cōuenit, qui & ad laborem & ad uiriliter agendū à natura præſtēt, quibusq; feritas & immanitas non mediocriter à natura ſint cōgenita. Qui uero loca cōcaua, præſia & æſtuoſa habitant, uētoſq; calidos plus ſentiūt q̃ frigidos, & aquis utuntur calidis, hi magni quidē eſſe nō poſſunt, neq; bene cōpoſiti & longi ac erecti, ſed in amplitudinē à natura producti carnoſi ſunt, & capillis nigriſ. Imō & ipſi toti nigri magis q̃ albi, & qui minus de pītuita habeāt q̃ de bile. Virilitas autē & tolerantia laboris non æque ipſis à natura ineſt, niſi conſuetudo accedat, & hæc in eis efficiat. Quod ſi flumina extēt in ea regione, quæ ſtagnātēs & pluuias aquas euehant, homines ipſi incolumēs ac ſplēdidi tūent. Si uero flumina deſint, aquasq; puteorū ſtagnātēs & olentēs bibāt, neceſſe eſt ab ipſis illis aquis & uentrē lædi & ſplenem

splenē. Quicunq; aut̃ altam habitāt regionē, planam, uentis expositam & aquo-
sam, eorū formæ magnæ ac inuicē similes & erēctæ. Animi quoq; eorū existūt
mansuetiores. Qui uero macræ, aquis carētia, & nuda loca tenent, & quæ tēpo-
rum mutationibus nō sunt permixta, horū formas necesse est esse asperas et ue-
getas, flauas magis q̃ nigras, mores etiam eorū rigidi sunt, pertinaces & cōtu-
maces. Vbi enim mutationes temporū cōtingunt frequētes, & plurimū inter
se diuersæ, ibi & formas, & mores, et naturas reperias plurimū differētes. Tem-
porū itaq; uarietates potissimæ sunt, quæ naturā ipsam permutāt. Deinde etiā
regio in qua multæ uariationes fiunt, postremū aut̃ aquæ. Inuenias eū ferē sem-
per & formas hominū & mores regiōis naturæ cōpares. Nā ubi terra pinguis
est & mollis, & aquosa, aquæ aut̃ ualde sublimes, ita ut æstate calidæ sint, & hye-
me frigidæ, & temporū ratio aliàs probe cōueniat, ibi & homines carnosī, arti-
culis nō adparētibus, humidi, laboris intolerātes, & ut plurimū maligni nascū-
tur. Segnitiesq; & somnolentia eis inest multa. Sūtq; ad artes tractādas crassi,
nō acres aut subtiles. Vbi aut̃ regio est nuda, natura munita & aspera, quæq; &
à frigore hyberno prematur, & à sole æstiuo exuratur, ibi duos & robustos, &
articulis probe disūctis, uegetosq; & hirsutos reperias homines, & in quibus
à natura laboris tolerātia, & uigilantia inest. Quicq; mores habeāt pertinaces, ad
iram procliuēs & cōtumaces, magisq; feritate participātes q̃ mansuetudine. In
super ad artes etiā acutiores & plus solertes, et ad res bellicas gerēdas aptiores.
Quin & omnia quæ à terra pueniunt, terræ ipsius naturā respiciūt & sequūtur.
Atq; hactenus quidē maxime cōtrarias corporū naturas & formas diximus, è
quibus cōiectura facta, si quoq; reliqua cōsideraueris, nunq̃ à uero aberrabis.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE FLATIBVS, IANO CORNARIO

Medico Physico interpretē.



VNT quædam artes, quæ illis quibus earum cognitio conti-
git, multū laboris ac molestiarū exhibēt: illis uero qui earum
usu indigent, iucundæ ac utiles existunt. Imò ignaris etiam
ac plebeis hominibus cōmune quoddam sunt bonū. His ue-
ro qui eas exercent planè molestæ. Ex harum artū numero
est & ea quæ medicina appellatur. Medicus enim oculis per-
lustrat singula pericula, cōtrectat etiam nulla uoluptate, et ex
alieno malo proprias sibi demetit molestias. Aegrotātēs autē artis beneficio, à
maximis malis liberātur, à morbis, à doloribus, à tristitia, à morte. Omnibus es-
nim his euident medicina auxiliatrix reperitur. Huius autē artis quæ uilia uul-
go putātur, cognoscere difficile est. Quæ uero alicuius precij existūt, facile atq;
uilia quidē soli medici norūt, uulgus ignorat. Nō enim corporis, sed animi ope-
ra existunt. Quæcūq; quidem manuū operam exigunt, ad ea cōsuetudine per-
ueniendum est. Est enim usus ipse egregius manuū exercitator & magister. Ve-
rum de non adparētibus & difficillimis ægritudinib; planè opinio magis q̃ ars
ipsa iudicat. In his ergo plurimū refert, expertus ne sit quis, an omni experiētia
carens. Vnum autē est horum omnium iudiciū, hoc scilicet, Quæ tādē causa

sit

fit morborum, & quod principium ac quasi fons sit, ex quo corpori mala omnia scaturiat. Si quis enim causas corporis affecti probe cognouit, potes est ualde eam adferre, quae corpori commodent, nimirum contraria corporibus morborum natura perspecta. Est enim maxime secundum naturam ipsa medicina. Quare statim ubi fames molestat, morbus fit. Quicquid enim homini molestiam ac tristitiam infert, hoc morbus uocatur. Quod ergo est famis remedium: hoc scilicet quod famem sedat, id autem facit cibus, eo ergo malum illud medicandum. Amplius autem ubi sitis urgeat, bibere cōpescit: & rursus, repletioni euacuatio, euacuationi repletio, labori quies succurrit, & quietis medelam ex labore reperias: atque ut breuiter dicam, contraria contrariorum sunt medicamina. Medicina enim nihil aliud est nisi adpositio & ablatio. Ablatio quidem eorum quae excedunt, adpositio uero eorum quae deficiunt: qui autem istud optime facere potest, is optimus medicus censebitur, quantumque quis ab hoc praestando deficit, tantum deficit quoque ab ipsa arte. Atque haec quidem praeter institutum futuri sermonis à me dicta sunt. Morborum autem omnium unus & idem modus est. Locus uero ipse eorum differentiam facit. Quare uidentur quidem morbi inter se nihil simile habere, propter diuersitatem scilicet locorum, quum sit tamen una morborum omnium & species & causa quoque eadem. Quae autem haec ipsa sit, in sermonis huius progressu manifestum facere conabor. Corpora enim omnia tum hominum, tum reliquorum quoque animalium à triplici nutrimento sustentantur. Horum autem nutrimentorum nomina haec sunt, cibus, potus, spiritus. Ac spiritus quidem qui in corporibus sunt, flatus uocantur: qui uero extra corpora existunt, aer. Qui sane maximus est in omnibus quae corpori accidunt & autor & dominus. Quare operae precium est eius potentiam diligenter perspicere. Ventus enim ipsius aeris fluctus & unda existit. Quando igitur multus aer fortes fluctus facit, tum & arbores radicitus euelluntur, & mare undis exaestuatur, spirituum potentia ita cogente, & naues onerarias etiam et ingentes in altum disiciēte. Talem itaque uim in ista exercet, etiam oculis minime sit conspicuus, & tantum consideratione cognoscatur, & effectum suum fiat manifestus. Quid autem sine hoc sit tandem: aut cui rei non adest: Omne enim quod inter coelum & terram est, spiritu repletum est. Hic & hyemis & aestatis causa est. In hyeme quidem frigidus & condensatus. In aestate autem mitis & tranquillus. Quin & solis & lunae, & astorum omnium cursus per spiritum procedunt. Et enim igni spiritus nutrimentum praebet, quo si ignis priuatur, uiuere non possit. Et solis perpetuum cursum, aer perpetuus & tenuis conseruat. Verum neque mare ipsum spiritus exors esse omnibus manifestum esse puto. Non enim uiuere natantia animantia possent, si non spiritum participarent: quomodo autem participaret, si non per aquam & ex aqua spiritum adtraheret? Et Lunae hic fundamentum est, & terrae uehiculum, neque quicquam usquam est spiritu uacuum. Atque haec tenus quidem quantum aer alijs commodet diximus. Mortalibus autem uitae, & morborum aegrotis, solus is est autor. Tantaque omnibus corporibus, spiritus necessitas extat, ut siquidem omnibus alijs abstineat homo, neque cibum sumat, neque potum, possit tamen dies duos uel tres & plures ducere, Si cui uero spiritus in corpus uitae intercipiatur, in breui parte unius diei intereat, ut uel hinc quantum usui spiritus corpori sit liceat aestimare. Amplius autem ab omnibus operibus aliquando immunes quiescunt homines: multae enim sunt mutationes in uita, uerum ab hoc opere nulla omnibus mortalibus

talibus animantibus requies cōtingit, ut cessent spiritū adducere, ac rursus exhalare. Vides ergo ex his quæ dixi quāta cōmunio omnibus animātibus, in fruendo aere existat. Subijciā igitur mox & illud, q̄ nō aliunde unquā uerisimile sit morbos euenire q̄ inde, si is aut plus, aut minus, aut cumulator, aut morbidis sordibus inquinatio in corpus se ingerat. Sed hæc de uniuersa hac re dicta sufficiāt. Ad ipsa nunc opera sermonē conuertēs demonstrabo, omnes morbos ex hoc oriūdos corporib. innasci, ac generari. Primū autem à cōmunissimo morbo febrili exordiū sumam, & qui omniū morborū comes est: præcipue tamen ex inflāmatione & tensione abscessuū. Quod satis indicant sequētia offendicula, statim enim cū inflāmatione inguinū abscessus & febris cōsequitur. Sūt autē febrīū genera duo, ut hoc quoq̄ nunc attingā, quorū alterum cōmune omnibus pestis adpellatur, alterū propter malam diætā priuatim his cōtingit qui ea utuntur, utriusq̄ autē generis aer autor & causa existit. Cōmunis ergo febris, ppter ea omnibus accidit, q̄ eūdem spiritū omnes adtrahūt, sitq̄ ut simili corpori similes spiritus similiter permixti, similes gignāt febres. Sed est fortasse qui dicat ut quid ergo nō omnibus animātibus, sed alicui eorū generi incidūt hi morbi? Cui ego sic respōderim, Differt corpus à corpore, natura à natura, & nutrimentum à nutrimento. Nō enim omni animantiū generi eadē aut non cōferunt, aut cōmoda sunt, sed sunt alia alijs magis cōuenientia. Quādo igitur aer eiusmodi inquinamētis plenus est, quibus humana natura offenditur, homines egrotāt. Quādo uero alteri cuipiā animantiū generi aer inconueniens est, tum morbus illud genus corripit. Qui ergo populares sint morbi hæcenus dictū sit, & quare, & quomodo, & quibus, & unde gignātur. Quomodo autē propter malam diætā febris accidat deinceps exponā. Est autē mala diætā hæc. Primū quidē quū quis plures cibos, liquidos aut siccos ingerit in corpus, q̄ ipsum corpus ferre queat, neq̄ laborē aliquem ciborū saltem multitudinī parē adiungit. Deinde quū uarios & dissimiles inter se cibos adsumit, seditiōnē em̄ mouent quæ sunt inæqualia, aliquaq̄ citius, alia difficilīus cōcoquuntur. Cū multorū autē ciborū ingestione necesse est & multū spiritū ingredi. Omnia enim quæ edūtur & bibuntur, spiritus in corpus inferūt, aliquādo plures, aliquādo etiā pauciores. Id autē inde manifestū sit, q̄ plurimis eructationes post cibos & potus euenire solent, discurrēte nimirū aere incluso, ubi perruperit bullas quibus fuerat inclusus. Quando igitur corpus cibis expletū est, ac spiritus quoq̄ multitudo uehementer excellit, cibiq̄ uentri diu immorātur, quū præ multitudine exire nēqueant, & inferior uenter uel aluus ipsa sit obturata, per uniuersum corpus permeant flatūs, sanguineq̄ plenas corporis partes maxime petētes eas infrigidant: infrigidatis autē his locis unde fontes & radices sanguinis prodeunt, per uniuersum corpus horror cōsequitur: uniuerso autē sanguine frigefacto, totū corpus horret. Quæ ratio est cur primum horrores ante febres corpus cōcutiant, quantoq̄ maiore impetu multitudinis & frigiditatis ipsi flatūs præcelluerint, tanto maior sit & horror, à pluribus uidelicet & frigidioribus fortior, à paucioribus ac minus frigidis, minus etiam fortis. Cum horribus autem & tremores corporis accidunt, secūdem eundem planē modum. Sanguis enim præsentis horrores timore perculsus concurrit, ac penetrat per omne corpus ad locos maxime calidos. Hi enim sunt eius saltus. Decedente itaque ab extremis corporis

poris partibus sanguine, uiscera cōtremiscunt & carnes. Sunt autem quædam
 corporis partes sanguine plenæ, quædam uero exangues. Exangues itaq; pro
 110 pter frigus non tremunt, sed parumper cōmouentur quum calor ex eis dese
 cerit. Sanguine autem abūdantes propter sanguinis multitudinē & tremūt, &
 inflammationes suscitant. Nequit enim fieri ut sanguinis multitudo conquies
 scat. Hiatus etiam præcedere solet febres, siquidem multus aer coacervatus, cu
 115 mulatim superne petens cōmouet ac diducit os, quū per hoc facillimus ei exis
 tus pateat. Quemadmodū enim ab aquis in lebetē feruētibus uapor multus ele
 uatur: Sic & corpore calefacto penetrat per os aer cōuolutus, & quadā uī erum
 pens. Amplius autē & articuli exoluūtur ante febres, calefacti enim nerui didu
 cuntur. Quando autem cōgregatus fuerit cumulatim plurimus sanguis, calefit
 rursus ipse aer, qui antea sanguinē in frigidauit. Nimirū à calore multo uictus,
 120 accensusq; ac uelut igneus factus per omne corpus calorem spargit, cooperan
 te ei in hoc etiam ipso sanguine. Liquefit ergo quicquid ignea uis illa adtigerit,
 fitq; inde spiritus. Qui quū ad meatus corporis irruerit, sudores fiunt. Siquidē
 spiritus compactus in aquam trāsmutatur, & per meatus penetrans extra pro
 rumpit, eodem planē modo, quo à feruētibus aquis uapor eleuatus, si obstacu
 125 lum habeat, ad quod impingere oportet, pinguefit ac condensatur, guttæq; de
 stillant ab his corporibus quibus uapor ipse fuit impactus. Insuper autē & dolo
 res capitis simul cum febre accidunt, cuius rei hæc causa est. Sanguinis trāsitus
 in capite magna angustia coarctantur. Repleti enim sunt multo aere. Cuius ab
 bundantia ac conclusio dolorem excitant in capite. Sanguis enim ipse natura ca
 130 lidus existens, uī coactus per angustam uiam transire celerrime nō potest, quū
 multa impedimento sint obstacula, & oppilationes, quapropter etiam pulsus
 fiunt circa tempora. Hoc ergo modo, ut dixi, febres fiunt, & cum febribus dolo
 res, ac aliæ quædā ægritudines. Porro sunt aliquæ aliæ infirmitates utpote uol
 uulī, agitationes intestinorum, tormina atq; oppilationes: q; autem hæ ipsæ o
 135 mnes à flatibus caussentur, nemini puto nō manifestū esse. Omnīū enim horū
 causa est spiritus transitus. Nam is quū contingit locos teneros, incōsuetos, ac
 prius intactos, quemadmodū spiculum infixū penetrans per carnē perrumpit,
 aliquando præcordia petens, aliquando ilia. Immo quandoq; utraq; simul adfla
 gens. Quare solent quidam calida fomenta extra adhibentes dolorem mitigas
 140 re. Rarefacto enim corpore à calore fomentū spiritus inde exhalat, ut quies in
 de aliqua & mitigatio cōtingat dolorum. Sed dixerit fortassis quispiam, Quo
 modo ergo fluxus generatur per ipsos flatus? Et quonam modo sanguinis ru
 pturarum circa pectus flatus autor & causa existit? Opinor autem ego me ista
 per hæc manifeste declaraturū. Quū igitur uenæ circa caput aere repletæ sunt,
 145 primum quidē caput ipsum propter flatus inclusos aggrauatur, deinde cōuolu
 uitur spiritus cū sanguine propter angustiam uiarū, tenuissimū autē ipsius san
 guinis per uenas excluditur, atq; idiplum tenuissimū liquidum quum coacer
 uatur, per alios meatus fluit, & ubi tandē cumulatim progrediens cōfiterit, ibi
 constituitur & morbus. Si itaq; ad oculos peruenerit, sequitur eorū dolor. Si ad
 150 aures, morbus & illas occupat. Si ad nares, grauedinē generat. Si ad pectus, rau
 cedinem. Pituita enim ipsa acribus humoribus permixta, quocūq; proruperit,
 maxime in non cōsuetos locos, eos exulcerat. Quod si fauces teneras aliās flu

xus petiuerit, eas exasperat: spiritus enim qui fauces ingreditur, ad pectus usq;
 procedit, ac rursus effertur per eandē uiam. Quū autē spiritus ingrediēs in flu-
 xum qui intus est inciderit, tussis gignitur, & repellitur sursum pituita. Quæ
 quū sic habeāt, fauces exulcerātur, exasperātur & inflāmantur, adtrahūtq; cale-
 factæ humorem de capite, caput aut rursus ab alijs corporis partibus adtrahēs
 his trāsmittit. Quū igitur hic fluxus cōsueuit sic manare, implentur meatus; &
 trāsmittunt in pectus. Acris aut quum sit pituita carnē penetrans, exulcerat ac
 perfringit uenas. Ex quibus sanguis effusus in alienos sibi locos ubi morā tra-
 xerit putrescit, ac in pus cōuertitur, & neq; sursum potest cōscendere, neq; in-
 fra exire. Sursum nō, nam nō facilis est uia humori ad ardua prodire, sicut neq;
 alijs rebus, quæ aliquā admixtam secum habent grauitatē. Infra autē procedere
 prohibet septū transuersum. Quare sanē contingit fluxū aliquē citra spiritum
 rumpi, & aliquādo quidem sua spōte, quandoq; etiā propter dolores. Ac spōte
 quidē quum aer in uenas ultro receptus sanguinis meatus coarctat. Multitudi-
 nē nāq; sua cōpressus sanguis meatus perfringit, qua eius copia maxime pro-
 rumpit. Effusione autē eius facta, uenæ rursus spiritu cōplentur, & ex eo dolor
 sequitur. Neceffe est enim affectum locum spiritu occupari, aliāq; dictis similia
 fieri. Rupturæ aut omnes fiunt hoc modo. Quū uiolentia quadā inuicem disce-
 dunt & finduntur carnes, fissurā subtercurrit spiritus, ac dolore adfligit: quum
 aut ipsi flatus carnes pergressi, meatus corporis rarefecerint, sequitur post fla-
 tus humiditas; cui uiam iam antea aer præstrauit. Irriguo itaq; corpore ab hu-
 miditate factō, liquefiūt carnes, tumoresq; in furas descēdunt, atq; morbus fit;
 qui aqua intercus adpellatur. Maximū autē signum est, morbū hunc à flatibus
 generatum, esse, q̄ iam sæpe aliqui hoc malo affecti exoluti sunt, & ab aqua eua-
 cuati. Atq; his quidē subito aqua ex uētre prorūpens multa adparet, post mo-
 ram aut paucior fit. Cur uero hoc fiat satis manifestū est. Nā primū subito pro-
 rumpens aqua aerē plena est, is tumore ac aceruū præ se fert ingētem: quū autē
 aeris spiritus euauerit, remanēt planē eadē aqua, & adparet quidē paucior, ue-
 rum penitus eadē existit. Adijciā aut aliud adhuc signū. Si quis uniuersum uen-
 trem penitus euacuet, nō trēs procedūt diēs rursus plenus fit. Quid ergo aliud
 quod impleat putandū est q̄ spiritus? Quid enim aliud tam repente impleffer?
 Nā neq; tantū potuū in corpus ingestū est, neq; carnes in causā esse possunt;
 utpote antea liquefactæ. Superfunt aut ossa, nerui, chordæ, fibre, à quorū nullo
 ullum aliquod aquæ augmentū potest puenire. Ergo quomodo aqua intercus
 fiat iam sit dictū, q̄ uero stupor attonitus uel syderatio à flatibus fiat, deinceps
 demōstrabo. Quū ergo flatus frigidi multi penetrēt ac inflēt carnes, partes cor-
 poris stupidæ fiūt, et siquidē plurimi flatus per uniuersum corpus discurrāt, to-
 tus homo syderatur. Si per partē, pars illa pcutitur, atq; ubi abierint flatus, cesa-
 fat & morbus: quādiū aut permāserint, cōsistit & morbus, idq; sic habere indi-
 cat perpetuus syderatorū hiatus. Videtur autē mihi ampliūs & sacri adpella-
 tum morbū ab ipsis flatibus gigni: quibus autē rationibus ego persuasus sum;
 illis ipsis & auscultaturos persuadere conabor. Opinor aut inter omnia quæ in
 corpore sunt, nihil magis ad prudentiā cōferre q̄ sanguinē. Hic ergo quum in
 cōstanti habitu persistit, cōsistit & prudentia: sanguine uero permutato, cōcidit
 simul & prudentia. Quod autē hæc ita habeāt, multa sunt testimonia. Ac pri-

mum quidem, qui omnibus animantibus cōmunis est, hæc cōfirmat somnus.
 Quum enim corpus inuaserit somnus, sanguis frigeſcit. A natura enim ſomno
 200 frigefaciēdi uis eſt. Infrigidato autē ſanguine, languidiores ſiūt eiꝯ meatus : qđ
 hinc palām ſit, qđ corpora ad grauata reclinātur. Omnia enim grauia natura ad
 fundum deferuntur : & oculi ardent, & prudentia permutatur, opinionesqꝫ pe
 regrinæ mentē occupant & exercēt, quæ ſanè in ſomnia adpellātur. Quin & in
 210 temulentis per ebrietatē aucto repēte ſanguine percellitur animus, & in animo
 prudentia, ſiuntqꝫ preſentiū malorum obliuiōſi, ac futurorū bonorum ſecūda
 ſpe beātur. Poſſem autē plurima eiꝯſmodi cōgerere, in quibus ſanguinis permu
 tationes, animi quoqꝫ prudentiā permutant. Siquidē igitur penitus totus con
 turbatus eſt ſanguis, penitus & prudētia proſternitur. Affectus enim & cogni
 220 tiones à cōſuetudine contingunt : quū autem à conſuetudine ſolita recedimus,
 aufertur nobis prudentia. Dico itaqꝫ & ſacrū morbum tum fieri, quū plurimꝯ
 ſpiritus per omne corpus uniuerso ſanguini fuerit permixtus : tū enim multæ
 oppilationes ſiūt multifariā per omnes uenas, quūqꝫ in craſſiores & pleniores
 ſanguine uenas aer prodierit, progreſſuſqꝫ diutius maneat, phibet ſanguinis
 curſum, atqꝫ alio quidē loco cōſiſtit, alio lētius penetrat, alicubi adhuc tardius.
 230 Qua ſanè inæqualitate trāſitus ſanguinis per corpus facta, omnigenæ inæqua
 litates per omne corpus cōtingunt. Omne enim corpus undiquaqꝫ contrahi
 tur ac turbatur, nimirū corpore partes ſuas ad tumultū ac conturbationem ſan
 guinis ſubminiſtrāte : continguntqꝫ ex ſanguinis peruerſione, totius omnino
 corporis ſubuerſiones. Eo enim quo corripitūtur à morbo, tēpore, neqꝫ ſentiūt
 240 quicquā, neqꝫ audiunt quæ dicuntur, neqꝫ uident quæ ſiunt, neqꝫ ullos aliquos
 dolores percipiunt. Sic nanqꝫ aer cōturbatus ſanguinem turbauit, ac cōſpurca
 uit. Spumaqꝫ etiā per os illis excurrit, neqꝫ id ab re eſt. Nam per iugulares uē
 nas aer trāſiens, penetrat quidē ipſe, adducit autē ſimul ſecū quod tenuiſſimum
 eſt in ſanguine, idipſum quum humidū ſit, multa permixtione albeſcit. Tenuēs
 250 enim mēbranas purus permeans aer pellucet, quapropter & albæ ſpumæ om
 nes adparent. Porro liberātur aliquādo huic morbo obnoxij, maxime acceden
 te hyeme. Quomodo autē id fiat, dicam. Quādo uarijs laboribus exercitatū cor
 pus calefactū eſt, caleſcit et ſanguis, qui calefactus, rursus calefacit & flatuſ, hi ue
 ro calefacti, diſſoluūtur & ipſi, & cōpactum ſanguinē diſſoluunt ſimul, proce
 260 dūtqꝫ è corpore partim cū ſpiritu, partim cū pituita eiecti. Deſeruēte itaqꝫ ſpu
 ma, & cōſiſtente ſanguine, tranquillitateqꝫ per omne corpus facta, quieſcit etiā
 morbus. Quare, ut dixi, flatuſ ipſi uere omniū iſtorum morborū omnimodæ
 270 exiſtunt cauſæ. Cæteraqꝫ omnia quæ cauſæ uideri queāt, uel hos adiuuant, uel
 cōſequenter poſt hos in corporibus morbos generāt. Hactenus ergo morbo
 rum omnium cauſas flatuſ eſſe demōſtraui. Id enim à principio receperam me
 facturum. Recēſui autem ſpiritum ipſum, quum in alijs omnibus rebus potē
 280 tem, tum maxime in animantium corporibus plurimum poſſe. Deduxi autem
 ſermonem uſqꝫ ad morborū cognitionem, atqꝫ adeo ægritudinū ſingularum,
 in quibus uerum argumentum huiꝯ ſermonis eſt à me maniſeſtatum. Quòd
 290 ſi pergerem ſingula ægritudinum genera recēſendo amplius corroborare, lon
 giꝯ quidem ſermo ipſe extēderetur. Verus autem nihilominus futurus eſſet,
 & qui fidem ſuam omnibus probaret.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE MEDICAMENTIS PURGANTIBVS;

Iano Cornario Medico Phifico interpretè.



MEDICAMENTORVM purgantium res non ita se habet, quem admodum uulgo putatur. Eodem enim medicamento purgantur & non purgantur. Quandoque uero alia purgat quam que purgare solet. Aliquando nimium purgat. Aliquando ea quae debet facit. Quare fieri non potest ut quis medicamentis confusus, ea temere exhibeat. Nam & cibos nos alentes, medicamenta esse putant dum est, uerum minus quam illa. Homines enim qui his recte in cibum utuntur, sani sunt; qui non recte, aegrotant; qui uero modum excedunt, purgantur quidem uelut à sinceris medicamentis, uerum minus & tardius quam à sinceris medicamentis. Clarum igitur est, quod & hi medicamenta existunt. At uero hi tardiores, qui & familiares nobis sunt, & quotidie in corpus ingrediuntur, si temere & negligenter exhibeantur, temere homines turbant, & quodammodo morbos inducunt. Quin & sinceros & acidos cibos si quis citra delectum ac inconsiderate exhibeat, nihil commodi perficient. Oportet igitur primum biliosis dare quod bilem purgat. Pituitosis quod pituitam. hydropicis quod aquam. atrabilia nisi quod bilem atram. Si uero extra haec purgaueris, quae quidem purgari debent, non purgabis: quae uero non debent, ea euacuabis. Quare in utraque partem peccabis. Quum itaque pharmacum alicui dare uoles, siue deorsum siue sursum purgas, interrogare ipsum oportet, an prius biberit medicamentum, & an aluus ex deorsum purgantibus cita sit, & celeriter obediat, aut dura. Et si citam ac facilem solutu esse dixerit, mollioribus & paucioribus medicamentis opus habet. Si uero dura fuerit, fortioribus indiget. Idem modus in sursum purgantibus requiritur. At si nunquam neque sursum, neque deorsum, se purgatum esse dixerit, neque medicamentum bibisse: cognoscere oportet an ad ea quae sanus in corpus ingessit, aluus deorsum solutu facilis fuerit, aut sursum uersus apposita ad uomitionem, & an ad repletionem aliquam alui profluuium ipsi successerit. Haec omnia interrogare oportet, quo recte consulere possis. Turpis enim est calamitas, medicamento purgante dato hominem occidere. Quicumque igitur à febris, fortibus corripitur, his medicamenta purgatoria dare non oportet, donec remiserit febris. Sin minus, saltem non intra quatuordecim dies. Carnes enim ipsorum & uentres, quum calidi sint, medicamentum assumunt, & nihil depurgatur, & febris maior fit, & color evertitur, & morbi regni specie praeseferunt. Commota enim bile, & non purgata, non sorbere uult aeger, neque bibere, sed omnia abominatur, & plerumque perit. Si uero detinet medicamentum, ante meridiem nihil purgatur: à meridie uero nimium purgatur, & perit. At si hac die superstes maneat, & una cum purgatione remittat febris, sanus fit. Quapropter in febribus uehementibus medicamenta purgatoria exhibere non oportet. Verum si alicui opus fuerit, infusum per clysterem adhibere potes, quotiescumque uolueris. Hoc enim minoris periculi est, iuxta eandem rationem etiam tempore aestatis, à canis ortu, per dies quinquaginta uitare oportet, & non dare medicamentum, sed infusis per clysterem uiui. Idem enim periculum imminet.

HIPPOCRATIS COIDE DIAE

TA SIVE VICTVS RATIONE, LIBER I.

Iano Cornario Medico Physico interprete.



I quis mihi ex prioribus, qui de diætâ humana ad sanitatem
 conferente scripserunt, recte cognouisse ac omnia per totum,
 quantum humanæ menti possibile est, conscripsisse uideretur:
 satis esset mihi aliorum laboribus, quos nossem recte ha-
 bere, uti, prout singula utilia esse uideretur. Nunc uero mul-
 ti quidem iam scripserunt, nullus autem recte nouit, quid nam
 fuerit ipsis scribendum. Et alij quidem aliud assequuti sunt, Ve-
 rum totum nullus adhuc ex prioribus. Immerito autem ullus aliquis ipso-
 rum reprehendatur, propterea quod inuenire non potuerunt. Immo laudandi potius omnes
 quod inuestigare conati sunt. Itaque redarguere ea quæ non recte dicta sunt, mi-
 nime institui, Verum his quæ sufficienter cognita sunt, testimonium præbere ani-
 mus est. Quæcumque quidem igitur recte à prioribus dicta sunt, ut non sit possibile
 me aliter describere, recte describam. Quæcumque uero non recte dixerunt, si quidem re-
 darguam hæc quod non sic se habent, nihil perfecero, uerum exponendo qua de causa
 singula ipso-
 rum recte mihi habere uidentur, declarare uolo. Propterea uero hunc
 sermonem præpono, Quod multi homines ubi audierint aliquem prius de re ali-
 qua exposuisse, eum qui de his posterius disserit non recipiunt, non cognoscentes
 quod eiusdem intelligentiæ est, ea quæ recte dicta sunt posse iudicare. Ego
 igitur uelut dixi, recte quidem dictis testimonium præbebo, quæ uero non recte
 dicta sunt ac cognita, qualia sint declarabo. Quæ autem nullus ex prioribus expla-
 nare tentauit, ea etiam ipsa qualia sint demonstrabo. Porro eum qui de uictu hu-
 mano scripturus est, censeo primum quidem totius hominis naturam nosse ac di-
 iudicare oportere. Nosse quidem ex quibus ab initio constitutus est, diiudicare uero
 quæ in ipso partes dominium obtineant, Si enim constitutionem ab initio non co-
 gnoscet, & id quod in corpore dominatur, non poterit ea quæ homini conducunt
 offerre. hæc igitur scriptorem cognoscere oportet. Deinde uero ciborum ac potuum
 omnium, ex quibus uictum habemus, facultatem, quam tandem singula habent & se-
 cundum naturam, & secundum necessitatem ac artem humanam. Oportet enim scire
 quomodo fortium natura uim detrahare oporteat, & quomodo debilibus robur
 per artem addere oporteat, prout singulorum occasio se obtulerit. Et si relata iam es-
 tiâ cognouerit, nondum sufficiens est hominis curatio, propterea quod homo es-
 ses sanus esse non potest, nisi etiam laboret. Contrarias enim inter se uires habent ci-
 bi & labores. Verum inter se mixti conferunt ad sanitatem. Labores enim ea quæ in
 sunt consumere solent, cibi autem & potus ea quæ euacuata sunt replent. Oportet autem
 uelut par est laborum uim pernoscere, tum naturalium, tum eorum qui per uim fiunt, &
 qui ex ipsis carnes in augmentum præparant, & qui in defectum. & non solum hæc, sed
 etiam mensuram ac proportionem laborum ad multitudinem ciborum, & hominis natu-
 ram, & corporum staturas ac ætates, & ad tempora anni, & ad mutationes uento-
 rum, & ad situs regionum in quibus degunt, & ad anni constitutionem ac statum. Sed
 & Astrorum ortus & occasus cognoscere oportet, quo mutationes et excessus ci-
 borum ac potuum, & uentorum, & totius mundi, ex quibus sanè morbi hominibus
 oriuntur

oriuntur, obseruare sciat. Quum autē hęc omnia cognouerit, nondum sufficiens inuentum est. Siquidem enim supra hęc inuēta fuerit ciborum mensura, & laborum ad unamquāq; naturā numerus, ita ut excessus neq; supra, neq; infra modum fiat, inuenta sanē exacte fuerit hominibus sanitas. Nūc uero prædicta quidem omnia inuēta sunt, qualia sint, hoc uero inuenire impossibile est. Si quidem igitur præsens quis sit, & inspiciat, cognouerit utiq; hominem ex euntem & in gymnasiis exercitantem, ut custodire sanum possit, alia detrahendo, alia apponendo. Verum nō præsentī impossibile est cibos ac labores exacte præscribere. Nam quantum possibile est inuenire à me iam relatū est. At enim etiam si ualde parum defectuosiora q̃ alia fiant, in multo tempore necesse est corpus ab excessu superari, & ad morbū peruenire. Alij itaq; hucusq; inquire conati sunt, & neq; hęc dixerunt ac prodiderunt. A me uero hęc inuenta sunt priusquā homo ægrotet, ut ab excessu in utram tandem partem factus fuerit, prænotio contingat. Non enim derepente morbi hominibus accedunt, sed paulatim collecti, acruatim apparent. Priusquā igitur in homine sanitas à morbo superatur, quæ perpetiuntur homines à me inuentum est, & quomodo hęc in sanitatem restituere oportet. Hoc autem ubi accesserit ad ea quæ scripta sunt, ratiocinationū huius doctrinæ conatus perficitur. Cōstituuntur quidem igitur tum animātia alia omnia, tum homo ipse ex duobus differentibus quidem facultate, concordibus uero & commodis usu, igne inquam, & aqua. Hęc autem ambo simul sufficientia sunt, tum alijs omnibus, tum mutuo sibiipsis. Vtrumuis uero seorsum, neq; sibiipsi, neq; ulli alteri sufficiens est. Vim igitur ac facultatem utrūq; ipsorum talem habet. Ignis enim omnia per omnia mouere potest, Aqua uero omnia per omnia nutrire, Particulatim uero utrūq; superat & superatur, ad summum ac minimū, quantum eius fieri potest. Neutrum enim superare penitus potest, ob hanc sanē causam. Igni quidē ubi ad extremitatem aque peruenerit, deficit alimentū, auertitur igitur eo unde nutriri potest. Aquæ uero ubi ad extremitatem ignis peruenit, deficit motus. Sistitur itaq; in hac, quum uero steterit, nō amplius potens est, sed ab illabente igne in alimentum cōsumitur. & propterea neutrum penitus superare potest. Si uero etiā alterutrum superetur, nihil sanē ex his quæ nūc sunt fuerit uelut nūc habet. Quum autem sic semper se habeant, erunt & eadem & neutra, & neq; simul deficient. Ignis igitur & aqua uelut à me dictum est, sufficientia sunt omnibus per omnia ad summum ac minimū similiter. Cæterū utriq; horū hęc ad sunt, Igni quidem caliditas & siccitas, aquæ uero frigiditas & humiditas. Habēt autē inter se mutuo, ignis ab aqua humiditatē. Inest enim ab aqua humiditas. Aqua uero ab igne siccitatē, Inest enim in aqua ab igne siccitas. Quum autē hęc sic habeāt, multas & omnigenas formas ac species, tum seminū, tum animalium, à se inuicem secernunt, quæ nihil inter se simile habēt, neq; uisu, neq; facultate. Etenim quum nunquā simul in eodem consistant, sed semper alterētur, necessarium est etiam ea quæ ab ipsis secernūtur ac producuntur dissimilia fieri. Equidem nullum omnino corpus perit, neq; sit quod prius nō erat, Verum permixta et discreta alterātur. Homines autem putant hoc quidem ex orco in lucem auctum generari, illud uero ex luce in orcum imminutum perire ac corrūpi. Oculis autem magis credere oportet quàm opinionibus. Ego uero hęc ex sententiā ex-

ponā. Animalia enim sunt & illa & hæc, & neq̃ animal mori possibile est non-
 cum omnibus, Vnde enim moriatur? neq̃ quod non est generari, quum nō sit
 unde generetur. Sed augentur omnia ac minuuntur, ad summū & ad minimū,
 90 quantū eius fieri potest. Quid uero dicam generari & perire, uulgi gratia inter-
 pretabor. hæc autē cōmisceri & discerni significare declaro. Habet autē res hoc
 modo. Generari & perire siue corrūpi, idem est. Idem est cōmisceri & secerni.
 Generari idem est quod cōmisceri. Perire corrūpiq̃ ac minui idem est quod se-
 95 cerni. unūquodq̃ ad omnia, & omnia ad unūquodq̃ idem sunt. Cōsuetudo es-
 nim in his naturæ cōtraria est. Seorsim aut omnia & diuina & humana sursum
 ac deorsum uicissitudinē habent ac transeunt, dies & nox ad summum ac mini-
 mum, Sic & Luna ad summū ac minimū. Ignis accessus est & aquæ. Sol ad lon-
 gissimū ac breuissimū. Rursus hæc, & non hæc. Lux loui, tenebræ orco. Lux
 orco, tenebræ loui. Accedunt & trāsmutentur illa huc, hæc illuc, Omni tempo-
 100 re trāsgunt illa res horum, hæc autē illorum, & quæ quidem faciūt, non sciunt,
 quæ uero faciunt, scire sibi uidentur. & quæ quidē uident, non cognoscūt, at-
 ta men omnia ipsis fiunt per diuinā necessitatē, & quæ uolunt, & quæ nō uolunt.
 Accedentibus aut illis huc, his uero illuc, & inter se permixtis, unūquodq̃ de-
 stinātū fatum explet, & ad maius, & ad minus. Corruptio autē omnibus mu-
 105 tuo inter se est, maiori à minore, & minori à maiore. Et augetur maius à mino-
 re. Reliqua aut omnia, & hominis anima, & corpus uelut anima, ornātur ac gu-
 bernātur. Irrepunt autē in hominē partes partiū, tota totorū temperaturam ha-
 bētia, ignis uidelicet & aquæ, partim acceptura, partim datura, & quæ quidem
 accipiūt, plus faciūt, quæ uero dant, minus. Secāt homines lignū per ferram,
 110 alter trahit, alter protrudit, Idem aut hoc faciūt, & minus faciētes, plus laborāt
 ac faciūt. Sic & hominis natura, aliud protrudit, aliud trahit, aliud dat, aliud ac-
 cipit, & aliq̃ dat, ab alio accipit, & aliq̃ quidē tanto plus dat, ab alio uero nihil mi-
 nus accipit. Locum autē unumquodq̃ suū seruat, & quæ quidē ad minus eūt,
 ad minorē locum secernūtur, quæ uero ad maius uadūt, permixta in maiorem
 115 ordinem mutantur. Peregrina uero non eosdē mores habentia, ex aliena regio-
 ne protruduntur. Semper autē anima & maiora, & minora habens, suas ipsius
 partes circūambulat, nō appositione, neq̃ detractione partiū indigens, uerum
 augmēto & decremēto earū quæ iam sunt opus habēs. Locū uero unicuiq̃ per-
 ficit, ad quē perueniant, & allabētia suscipiant. Non enim potest id quod nō si-
 120 miles mores habet, in discordib. locis permanere. Oberrāt enim uelut ignota,
 permixta uero inter se cognoscūtur. Cōcors enim cōcordi adhæret ac assidet,
 discordia aut rebellant, & pugnāt, atq̃ inter se dissidēt. Quapropter anima ho-
 minis, in homine augetur, in alio uero nullo, & aliorū magnorum animalū si-
 militer. Quæcūq̃ uero aliter ab alijs per uim secernūtur, de alijs quidē animalia-
 125 bus prætermittā, de homine uero declarabo. Irrepat in hominē anima, ignis &
 aquæ temperamentū habens, partē corporis humani. Fœmellæ aut & mascu-
 li, & multi & omnigeni nutriūtur. Nutriūtur autē & augetur per diatā qua
 homo utitur. Necessē est aut omnia quæ ingrediūtur partes habere, Cuiuscūq̃
 enim pars nō inerit à principio, augeri nō poterit, neq̃ multo, neq̃ modico ali-
 130 mento ingrediēte. Non enim habet quod augetur faciat. Id uero quod omnia
 habet, augetur, unūquodq̃ in suo loco. Alimēto autem ingrediente ab aqua &
 igne

igne, sicco & humido, alia quidē intro coguntur, alia uero foras protruduntur. Quemadmodum fabri lignarij lignū serra diffecāt, & alter quidem trahit, alter protrudit, idē sanē faciētes. & qui deorsum premit, superiorē trahit, neq; enim aliās admitteret deorsum ire. Si uero uiolenter cogant, toto opere aberrabunt. Similiter & circa hominis alimentū se res habet, aliud trahit, aliud protrudit, in tro autē coactū, foras repit. Si uero importune & uiolēter cogatur, omī successu priuabitur. Singula autē tāto tēpore eundē ordinē habēt, donec locus nō amplius suscipiat, neq; alimētū aquarū ac ignis sufficiēs ad summū habeat. Postea ad externā regionē transeunt & foemellæ & masculi, eodē modo præ uiolentia & necessitate impulsī. Quæcūq; autē destinatū fatum expleuerint, ea primū secernūtur, ac simul cōmiscentur. Singula enim secernūtur, omnia autē hæc cōmiscuntur. Postq̃ uero regionē permutauerint, & nacti fuerint harmoniā recte habentē symphonias tres cōprehenlim penetrātes per omnia, uiuunt & augescūt, n̄sdem quibus etiā antea. Si uero harmoniā nō assequuti fuerint, neq; gratia acutis cōsona fiāt, prima symphonia perit. Et si etiā secunda generetur, propterea quod unus per omnia corruptus est, omīs tonus uanus est. Nō enim cōcentū habuerit, sed trāsitiō fit ex maiore ad minus, ante destinatū fatū. qđ qui faciūt, nō sciunt quid faciāt. Cur autē utriq; tū masculus, tū foemina fiant, in sermone, pgressu declarabo. Vter autē ipsorū harmoniā assequetur humidus existēs mouetur ab igne, motus autē uiuificatur, & alimentū attrahet ab ingredientib; in mulierē cibis ac spiritu, primū quidē undiquaq; similiter, donec recēter rarus est. a motu autē & ignis siccatur ac cōsolidatur, cōsolidatus autē & firmatus circū circa dēfatur. Et ignis inclusus nō amplius sufficiēs alimentū attrahere potest, neq; spiritū expellit, ppter ambiētis corporis densitatē. Cōsumit enim humorē intus existentē. Quæ igitur solida natura sunt in cōpacto ac sicco, ea nō cōsumuntur ab igne in alimentū: sed ualida ac robusta fiūt, & cōsistūt humore deficiēte, atq; hæc sanē ossa ac nerui nominantur. Ignis autē ex cōmixto ac moto humore corpus secundū naturā ordinat ac disponit, ppter talē necessitatē. Nā p solidū & siccū nō potest diutinos trāsitus facere, quia alimentū nō habēt, per humida uero & mollia potest, hæc enim ipsius sunt alimentū. Inest autē & in his siccitas, quæ ab igne nō cōsumitur. Hæc autē inter se cōgregātur mutuo. Ignis igitur penitissime ad intima obturatus, et plurimus est, & maximū exitū facit. Plurimus enim humor in ea parte inest, quæ uetēr appellatur, et excidit inde ubi alimentū non habet foras, & exitū facit. Plurimus autē humor in uētre inest, tum ppter alimenti ingestione, tum propter concoctionē. Qui uero in reliquū corpus cōclusus est ignis, triplices circuitus facit. Eteim quod humidissimū est in igne, in his locis quæ uenę cauæ appellātur, existit. In media autē horū id quod reliquū est aquæ cōgregatum stabilitur, atq; ea uocātur carnes. In summa, ignis omnia quæ in corpore sunt, secundū suū ipsius modū exornauit, ad uniuersi imitationem, parua ad magna, & magna ad parua. Ventrē quidem maximū, sicco et humido prōptuariū, ut det omnibus, & accipiat ab omnibus, iuxta maris facultatē quod est animalū in ipso nutritorū ac nutriri solitorū alimētum, discordiū uero pernicies. Circū hunc autē aquæ frigidæ & humidæ cōgregatio, trāsitus spiritus frigidi & calidi, ad terræ imitationē, omnia quæ in ipsum incidūt alterātis, Et alia quidem cōsumens, alia uero augēs, aquæ tenuis ac ignis dispersionē

fecit, in superq; non obscuri & apparētis à compacto secretionē, in quo delata
 omnia in apertum perueniunt, singula iuxta destinatum fatum. In hoc uero tri
 plices circuitus ignis fecit, inter se mutuo intro ac foras terminantes, alios qui
 160 dem ad cavitates humorū lunæ facultate, alios uero ad externam circumferen
 tiam, ad ambientē soliditatem astrorum facultate. Medij uero & intro & foras
 terminantes, calidissimum ac fortissimū ignem habent, qui sanè omnibus do
 minatur, omnia secundum naturā gubernans, sine strepitu, tum ad uisum, tum
 ad tactum. In hoc Anima, Mens, Prudentia, Augmētum, Motus, Imminutio,
 180 Permutatio, Somnus, Vigilia. Hic omnia per omnia gubernat, & hæc, & illa,
 nunquā quiescens. At uero homines ex manifestis obscura considerare non
 nouerunt. Quum enim artibus utantur similibus humanæ naturæ, id ipsum in
 gnorant. Diuina enim Mens edocuit ipsos sua ipsorū imitari, ita ut cognoscāt
 quæ faciunt, & non cognoscant quæ imitentur. Omnia enim similia sunt, dissi
 190 milia existentia, & omnia cōcordia, discordia existentia, quæ comprobamus,
 non comprobamus, æquitatē habentia, iniqua sunt. cōtrarius est modus singu
 lorum ei quē confitentur. Lex enim & natura, quibus omnia transigimus, non
 confitentur quæ confitentur. Legem enim posuerunt ac tulerunt homines ipsi
 sibiipsis, non cognoscētes de quibus tulerunt. Naturam uero omnes dij exor
 210 nauerunt. Quæ igitur homines sancierunt, nunquā eodē modo habent, neq;
 recte, neq; nō recte. Quæ uero dij sancierunt, semper recte habent. Et recta ac
 non recta intantum differunt. Ego uero Artes hominis manifestas, affectioni
 bus & manifestis, & obscuris, similes esse declarabo. Vaticinatio tale quid
 est. Ex manifestis quidē cognoscere obscura, ex obscuris uero manifesta, & ex
 220 præsentibus futura, & ex mortuis uiuētia. Et ea quæ intelligi non possunt, ua
 tes intelligunt, qui quidē doctus est, semper recte, qui uero non doctus est, aliās
 aliter. Naturam hominis etiā hæc quantum possibile est imitantur. Vir mulie
 ri concumbens puerum facit, Hoc manifesto obscurū cognoscere datur, quod
 sic futurum est. Mens hominis obscura, cognoscens manifesta, ex puero in ui
 230 rum transit, hoc præsentī futurū cognoscit. Non simile à morte ullum aliquod
 animal existit, neq; mortuo animal uiuum. Venter quod intelligi nō potest
 nouit. per hunc enim intelligimus quod sitit aut esurit. Hæ artis uaticinandi
 & humanæ naturæ affectiones, cognoscētibus quidem semper recte habent,
 uerum nō cognoscentibus aliās alter. Artis fabrilis ferrariæ instrumēta fer
 240 rum circumliquant, flatu ignem fabri cogunt, & alimētum iam præfens aufe
 runt, ubi uero rarefecerint, feriunt ac tundunt. Aquæ autē alimento ferrum rur
 sus roboratur. Eadem patitur homo à pædoribus, præfens enim alimentum
 igne detrahitur, quum præ spiritu homo cogatur, rarefactus autē tunditur, at
 teritur, subuertitur. Aquæ autē aliunde accessione corroboratur ac fortis euas
 250 dit. Et fullones idem transigūt, calcitrant, feriūt, destruentes, tundūt, trahūt
 destruētes, robustiora faciunt, deradētes supereminētia, & attexētes pulchrio
 ra reddūt. Eadē etiā homo perpetitur. Sutores coriarū tota in partes dissecā
 tes, scindētes et pungētes, marcida ac lacera, sana et integra, faciūt, Et homo idē
 patitur. Ex totis partes secātur, & ex partibus cōpositis tota fiunt. Pungūtur
 260 & secātur à medicis marcida, sanāturq; ac uiuīt homo. Medicina id quod mo
 lestat tollit, & id à quo homo ægrotat auferēs, sanū facit. Natura eadē sua spōte
 nouit

nouit. Desidens conatur resurgere, currens conatur requiescere, & alia eiusce-
 modi natura habet quæ medicinæ sunt. Fabri lignarij serra secantes, alter tra-
 hit, alter protrudit. Idem autē uterq; facit, & in utrāq; partem tendit. Idem tere-
 brant, alter trahit, alter protrudit, & qui premit, superiorem deorsum trahit, &
 minus facientes plus faciunt, naturāq; hominis imitantur. Spiritus alter tra-
 hit, alter protrudit, Idem autem uterq; facit, & in utrāq; partē tendit. Cibi par-
 tim deorsum premuntur, partim sursum uergunt. Ab una anima diuisa, plu-
 res & maiores, & minores & pauciores fiunt. Aedificatores ex diuersa rebus
 unam cōcordem facientes, sicca quidem humectantes, humida uero siccantes,
 & tota diuidētes, diuisa uero cōponentes, Si enim non sic cōtingeret, nihil pri-
 uatim ac proprium cōstitui posset: diætā humanā in hoc imitantur. Nam &
 in hac sicca humectantes, & humida resiccantes, tota quidem diuidunt, diuisa
 uero componūt. Hæc omnia diuersa ac discordia existentia, cum natura cōcor-
 dant. Musices autem organū primum producere oportet, in quo harmonia
 quæ uult declarabit. Constructiones ex iisdem non eadem sunt, ex acuto, ex
 graui, nomine quidem similibus, sono autem nō similibus. Quæ plurimum di-
 uersa sunt, maxime concordant, & quæ minimum diuersa sunt, minime cōcor-
 dant. Si uero quis similia omnia faciat, non inest delectatio. Plurimæ ac multi-
 formes transmutationes, maxime delectant. Coci obsonia hominibus pa-
 rant, omnis generis diuersa cōmiscentes, ex iisdem non eadem, ad hominum
 cibum ac potum. Quod si omnia similia facerēt, non haberent delectationem,
 & si in eodem etiam omnia cōstruerent, non utiq; recte haberent. Pulsantur to-
 ni in musica partim superne, partim inferne. Lingua musicam imitatur, co-
 gnoscens quidem dulcedinē & acorem eorum quæ allabūtur, itemq; dissonan-
 tia. pulsat autem sonos superne ac inferne, & neq; ea quæ superne pulsan-
 tur, si inferne pulsentur recte habent, neq; quæ inferne, si superne. Quum autem lin-
 gua probe fuerit attēperata, symphonie delectatio cōtingit. Si uero discors fue-
 rit ac incōgrua, molestia. Pellium tinctores tendūt, terūt, pectināt, lauant. Ea-
 dem est puerorū curatio. Plicatores ac textores ducētes in orbem filā plicant,
 à principio in principiū desinunt. Idem circuitus in corpore est, unde incipit, in
 hoc desinit. Aurum operātes, tundunt, lauant, molli igne liquāt, forti aut nō
 conflatur, Vbi uero elaborarūt, ad omnia utuntur. Homo frumentū tundit,
 lauat, molit, & ubi igne coxit, utitur, & forti quidem igne in corpore non con-
 flatur, uerum molli ac lento. Statuarij imitationem corporis faciunt, anima
 excepta, mentem autem habentia non faciunt. ex aqua & terra humida siccān-
 tes, & sicca humectantes, ab his quæ superabūdant detrahūt, & ad ea quæ defi-
 ciunt apponūt, ex minimo ad maximū augentes. Eadem patitur homo, auge-
 scit à minimo ad maximū, ex superabūdantibus detrahens, & deficientibus ap-
 ponēs, sicca humectans & humida siccans. Figulī rotā uersant, & neq; retror-
 sum, neq; antrosum procedit, sed simul in utrāq; partē, Vniuersi hæc imita-
 trix circularis existit. In eadem aut quū iam circūfertur, omnis generis opera ef-
 ficiūt, ut alterū altero in nulla re simile existat. Ex iisdē homines eadē patiūtur,
 itemq; reliqua animalia in eadem circūferentia omnia operātur, & ex iisdem ni-
 hil simile, iisdē instrumētis ex humidis sicca faciētes, & ex siccis humida. Græ-
 matica talē quid est, figurarū cōpositio, quæ signa ac notæ sunt humanæ uocis,
 facultas

facultas reuocandi in memoriā praterita, & quæ facienda sunt declarandi. Per septem figuras noticiā cōtingit. Eadem omnia homo transigit, siue sciens literas, siue literarū rudis. Per septem figuras etiam sensus hominibus cōtingit. Auditus sonorum, Visus manifestorū, Nasus odoris, Lingua uoluptatis & in iucunditatis, Os sermonis, Corpus tactus calidi aut frigidi, Spiritus transitus intro ac foras. Per hæc cognitio hominibus cōtingit. Palestra & pædotribæ tale quiddam docēt, præuaricari secundū leges, iniuriam facere iuste, defraudare, furari, rapere, uiolare honestissima ac turpissima. Qui hæc non facit, malus. qui hæc facit, bonus est. Ostentatio multorum ac uulgi est, desipiētia hæc esse uident, & unum ex uniuerfis bonum iudicant, reliquos uero malos. Multi mirantur, pauci cognoscunt. Homines in forum progressi eadem perpetrant, defraudant uendentes & ementes, Qui plurimum defraudauit in admiratione est. Bibentes & insanientes eadem perpetrāt, currūt, luctantur, pugnat, furantur, defraudant. Vnus ex omnib. præfertur. Simulatores & deceptores alia ad scientes dicunt, & alia sentiūt, lidem ereptāt, & irrepunt nō iisdem. Inest autē homini, alia dicere, alia facere, & eundē non esse eundē, & nunc aliam habere mentem, nunc rursus aliam. Sic quidē artes omnes cū humana natura cōmunicant.

Cæterum anima hominis, quemadmodū etiam antea à me dictum est, ignis & aquæ temperamentū habens, partes autē hominis, irrepit in omne animal quod sanè spirat, itemq; in omnem hominē, & iuniore, & seniore. Non autē similiter in omnibus augetur, sed in iuuenibus corporibus, utpote celeri circū uolutione existente, & corpore auctili, expassæ & attenuatæ partes illæ animæ, in corporis augmentū consumuntur. In senioribus autē, utpote tardo existente motu, & corpore frigido, in decrementū hominis consumuntur. Quæcūq; autē corpora in uigore sunt, & in ætate foecūda, eas nutrire & augere possunt.

Potentes autē homines, ut quisq; plurimos homines alere potest, ita fortis iudicatur ac potēs, ubi uero defecerint quos alat, imbecillior cēsetur. Sic etiā circa singula corpora res se habet. Quæcūq; plurimas animas nutrire possunt, ea fortiora sunt, ubi uero hæc discesserint, imbecilliora. Quicquid igitur in aliud corpus ingressum fuerit, non augetur. Quicquid uero in foeminam, augetur, si ea quæ ipsi congrua sunt cōtingant. Discriminatur autem partes & augetur simul omnes, & neq; prius alteræ alteris, neq; posterius. Verum maiores natura priores apparent minoribus, quā non priores existant. Non autē in æquali temporis spatio omnes foetus exornantur, sed alij citius, alij tardius, prout singuli & ignē & alimētum fuerint nacti. aliqui itaq; in quadraginta ac tribus diebus scaturiunt ac formantur, aliqui in quatuor mēsis. Similiter etiam uitales fiunt ac gignuntur, aliqui citius, septimo mēse perfecte, aliqui tardius, perfecte nono mēse in lucē prodeunt, & ostendunt se temperamētum habere, quod semper habebunt. Masculi igitur & foemellæ hoc modo gignuntur, quantum eius fieri potest. Cæterum foemellæ ab aqua magis, & à frigidis ac humidis & mollioribus augetur tum cibus, tum potibus, itemq; studijs ac exercitijs. Masculi uero magis ab igne, à ficcis uidelicet ac calidis cibus & reliqua diætā. Si igitur foemellam parere uelit, diætā ad aquā uergente utēdum est. Si uero masculū, exercitijs ac uictu ad ignē tendente utetur. Et non solum uirum hoc facere oportet, sed etiam mulierē. Nō enim solum quod à uiro secernitur auctile est, sed etiam quod

quod à muliere, ob hæc sanè caussam. Vtracq; quidē pars sufficientem motū nō habet ad humoris multitudinē, ut quod influit. cōsumat, & propter ignis debilitatē coagmētantur. Quū uero ambæ in idē coinciderint, mutuo inter se incur runt & obuoluūtur, ignis ad ignē, & aqua similiter. Siquidē igitur in sicco loco circūuoluitur ignis, coillapsū aquā superat, & ab hoc ignis augetur, ne ab illa bente unda extinguitur, aliūq; accedentē suscipiat ac sibi cōsociet. Si uero in humorē inciderit, statim ab initio extinguitur ab illabēte unda, & in minorē ordinē dissoluitur. In una autē die uniuscuiusq; mēsis, cōsociare ac superare ea quę accedūt potest, & hoc si coinciderint ab utrisq; in unū locum. Cōsistere autem possunt inter se & fœmella & masculus, propterea q; anima quidē idē est in omnib. animatis. Corpus autē uniuscuiusq; differt. Anima quidē igitur semper similis, & in maiore, & in minore. Nō enim alteratur neq; per naturā, neq; per necessitatē. Corpus autē nunq̄ idem in ullo aliquo est, neq; secundū naturā, neq; ex necessitate, propterea q; partim secernatur in om̄ia, partim permisceatur ad om̄ia. Si quidē igitur mascula corpora ab utrisq; secreta fuerint, augetur pro pre præsentī, & fiūt hi uiri animis splēdidi, & corpore fortes, si nō à diætā postea detrimētum sentiāt. Si uero à uiro quidē masculū secernatur, à muliere uero fœmineū, & superauerit si ita cōtingat masculū, (Genitura em̄ ammiscetur ad fortiorē aut debiliore, Nō enim habet ex præsentibus aliquid ad quod familiarius secedere possit. Suscipit enim parua maiorē, & maior minorē. In cōmune autē super hæc quę adsunt dominū exercent) corpus sanè masculū augetur, fœmineū uero minuitur, et in aliam sortē secernitur. Et hi quidē minus priorib. splēdidi fiunt, tamen quia masculum à uiro superauit, uiriles euadūt, & hoc nomen merito habēt. Si uero à muliere quidem masculum secretū fuerit, à uiro autē muliebri, superauerit aut masculum, augetur eodē modo sicut prius, fœmineū uero minuitur. Et fiūt hi Androgyni, id est uiri effœminati, atq; sic recte appellantur. Tres quidē igitur hæ sunt generationes hominū, differētes in eo quod magis aut minus tales sint, propter partiū aque temperamentū, & alimenta, & institutiones, ac consuetudines. declarabo autē in progressu sermonis etiā de his. Cæterū fœmella eodem modo gignitur. Si enim ab utrisq; fœmineū secretū fuerit, fœminosissimę ac ingeniosissimę fiēt. Si uero à muliere quidē fœmineū, à uiro aut masculum, superauerit autē fœmineum, audaciores quidē prioribus fient, ueruntamē ornatae ac moderatae etiā ipsæ. Si uero à uiro quidē fœmineū, à muliere uero masculum secretū fuerit, & fœmineum superauerit, augetur eodem modo, & fiunt hæ audaciores adhuc prioribus, & uiriles ac uiragines nominantur. Si autem quis non credat animā animæ ammisceri, demens est. Si quis enim carbones ardentes ad ardentes adiiciat, fortes ad debiles, & alimentum ipsis præbuerit, simile corpus omnes exhibebunt, & alter præ altero non cognoscitur, sed in qualicunq; corpore ignē susceperint, tale in omnibus erit. Vbi uero præsens alimentum cōsumpserint, secernuntur ac obscurātur. Idem hoc anima hominis patitur. At uero quomodo gemini nascātur, hoc sermone declarabo. Equidem natura uterorū in fœminis ut plurimum in caussa est. Si enim similiter in utrāq; partem iuxta osculum dispositi à natura fuerint, et similiter hiauerint, & à purgatione siccantur, alere possunt, si semen uiri cōceperint ita ut statim discindatur. Sic enim necesse est dispergi in utrūq; utrum si

militer

milititer. Siquidem igitur multum semen ab utrisq; & forte secretum fuerit, in utrisq; locis augeri potest, dominium enim habet in alimentum quod accedit. Si uero aliter contingat, gemini non fiunt. Quum itaq; masculum ab utrisq; secretum fuerit, necessarium est in utrisq; masculos gigni, quum uero foemineum ab utrisq; foemellae fiunt, quum autem alterum foemineum, alterum masculum fuerit, utrum altero praeualeat, id ipsum augeat pro ea ratione. Similes porro inter se sunt gemelli, ob hanc causam. Primum quidem quod aequales sunt loci in quibus augeantur. Deinde quod simul secreti sunt. Postea quod ipsdem alimentis augeantur, uitaesque in lucem prodeunt. Caeterum superfetationes hoc modo fiunt. Quum uteri calidi & siccis natura fuerint, ipsaq; mulier eiusmodi, & semen calidum ac siccum illapsum fuerit, non fit amplius ulla aliqua humiditas in utero, quae semini superillabens contineat. Quapropter consistit ab initio ac uiuit, perseverare autem non potest, sed etiam id quod iam adest in super corrumpit, quia non eadem utrisq; conferunt. Etenim quod tenuissimum est in aqua, & quod rarissimum in igne, si in hominis corpore temperamentum acceperint, sanissimum habitum constituunt. Propterea quod neque in temporum anni maximis mutationibus, neque in regionum permutationibus, neque in ciborum ac potuum alterationibus, aqua densissima euadit in aquae impetuosius incursibus, neque ignis in ignis impetu. Possunt enim ambo & generatione & satietatem plurimam suscipere. Aer mollissimum ac rarissimum, plurimum temperamentum suscipit, ac optimum euadit. Eodem modo etiam quod tenuissimum est in aqua, ac rarissimum in igne, ubi temperamentum acceperint. Qui igitur hanc naturam habent, sani perseverant omni tempore usque ad quadragesimum annum, aliqui uero etiam usque ad extremam senectutem. Qui uero a quadragesimo anno, a morbo aliquo correpti fuerint, nunquam ferme euadunt. Quaecumque autem corpora ignis fortissimi, et aquae densissimae temperamentum acceperint, fortia & robusta fiunt, uerum multa custodia opus habent. Magnas enim transmutationes in utraque partem habent, & in aquae incursibus in morbos incidunt, & in ignis consimiliter. Qui igitur eiusmodi naturam habet, eum uictu uti conducibile est temporibus anni contrario. Et aquae quidem incursu contingente, uti oportebit eum ab his quae ab aqua sunt, paulatim pro temporum ratione discedendo. Porro ubi aquae crassissimae & ignis tenuissimae in corpore mixtura facta est, talia contingunt, ex quibus frigidam & humidam naturam cognoscere oportet. Talia enim corpora in hyemem morbosiora sunt, quam in aestate, & in uere quam in autumno. Caeterum quod ad aetates attinet, sanissimi ex talibus pueri sunt. Deinde adulescentes. Morbosissimi autem senes, & his uicini, & hae naturae cito senescunt. Talibus in uictu conferunt quae calfaciunt ac siccant, tum in cibis, tum in exercitiis, & externas corporis partes magis quam internas exercere conducit. Si uero humidissimum in igne, & densissimum in aqua, in corpore mixtura acceperint, ex his humidam ac calidam naturam cognoscere oportet. Laborant quidem ex morbis huiusmodi maxime in uere, minime in autumno, quia in uere excessus est humiditatis, in autumno uero symmetria & moderatio siccitatis. Ex aetatibus uero morbosissimae sunt iuniores. Corpora autem cito augeantur, & tales distillationibus obnoxii sunt. His conducit exhibere quae cumque siccant ac frigefaciunt, & in cibo, & in potu ac laboribus. Verum labores intra corpus his facere maxime confert. Si uero mixturam acceperint fortissimi

m̄m̄ in igne, et tenuissimū in aqua, sicca & calida est natura, et talibus morbus
 in ignis accessionibus contingit, sanitas uero in aqua. Et in ætatibus iugētibus
 ad carnis bonam habitudinē, morbosissimi sunt, sanissimi autē senes. Ita etiam
 utriq; proximi. Diætæ quæ frigefaciunt ac humectant, & ex laboribus qui mi-
 nime excalfaciunt ac colliquant, plurimam frigiditatē exhibebunt. Huiusmodi
 naturæ uiuacissimæ ac sanissimæ existunt. Si autē mixturam acceperint cor-
 pora ignis rarissimi, & aquæ siccissimæ, sicca & frigida talis natura est, morbo-
 sa quidē in autūno, sana uero in uere, & uicinis tēporib. Similiter ætates ad an-
 nos quadraginta morbosæ, pueri sanissimi, Ita & utriq; proximi. Diætæ his cō-
 ferunt quæ calidæ existentes humectant, & labores sensim adhibiti leniter cal-
 facientes, & nō multum ab his quæ adsunt auferētes. De naturæ igitur cogni-
 tione sic à prima cōstitutione cognoscere oportet. Cæterum ætates ipsæ ad
 seipsas hoc modo habent. Puer itaq; ex calidis & humidis tēperatus est, quia
 ex his cōstitutus est, et in his augmentū accepit. Humidissima igitur & calidissi-
 ma sunt corpora proxima generationi, & augescunt q̄ plurimum, & quæ his
 proxima sunt eodem modo. Adolescens autē calidus quidem est, quia ignis
 impetus aquæ dominatur. Siccus autē, quia humidū ex puero cōsumptum est,
 partim in augmentū corpōris, partim in motū ignis, partim præ laboribus ac
 exercitijs. Vir quū steterit iam corpus, siccus est & frigidus, quia caliditatis im-
 petus nō amplius dominatur, sed stat corpus ab augmēto quiescens, ac perfri-
 geratum. Verum ex adolescenti ætate siccitas inest. Ab insequēti autem ætate
 & aquæ accessu, humiditatē non habet, quāpropter ex siccis & frigidis exupe-
 ratū est. Senes autem frigidi sunt & humidi, Quia ignis quidem recessus
 contigit, aquæ autē accessus, & siccorum quidē sublatio, humidiorū autem sta-
 tus. Ex omnibus autem masculi calidiores sunt & sicciores, fœminæ uero
 humidiores ac frigidiores. Propterea quod ab initio utriq; in talibus geniti
 sunt, & a talibus augescūt. Vbi uero in lucem editi sunt masculi, uictu ac diætā
 laboriosiore utuntur, ut excalescāt ac resiccentur. Fœminæ uero humidioribus
 ac pigrioribus diætis utuntur, & caliditatis purgationem ex corpore singulis
 mensibus faciunt. Porro de animæ sapiētia ac desipientia, hoc modo serēs
 habet. Quod humidissimū est in igne, & siccissimū in aqua, si in corpore tē-
 peramentum acceperint, sapiētissima sunt. Quia ignis quidem habet humidi-
 tatem ab aqua, aqua autē siccitatē ab igne, uterq; autē sic sufficientissimus est.
 Neq; ignis alimenti indigētior multū procedit, neq; aqua motus indiga mul-
 tum leuis redditur. Sic itaq; utraq; & per se sufficientissima sunt, & inter se per-
 mixta. Quod enim minime uicinis indiget, hoc maxime præsētib. obtēpe-
 rat, uelut ignis qui minime mouetur, nō præ necessitate: & aqua quæ maxime,
 non præ uiolentia. Ex his autē anima temperata, sapientissima est, & memoria
 ualentissima prædita. Si uero aliquo ascitamento utens, alterutrum horum au-
 gescat aut contabescat, desipientissima redditur, propterea quod quum sic ha-
 beant sufficientissima existunt. Si autem ignis sincerissimi, itemq; aquæ tem-
 peramētum anima fortiat, sit autē ignis paulo inferior ac defectuosior quā
 aqua, sapientes quidem sunt etiam hi, uerū defectuosiores quā in priore tē-
 peramento: propterea quod ignis ab aqua superatus, & tardiozem motum fa-
 ciens, segnius sensibus allabatur, cōstantes autem cum māsuetudine sunt eius.

modi animæ, ad quancūq; tandē rem animū applicuerint. Si uero recto uictu utantur, & sapiētiores & acutiores præter naturā fieri queant. Talibus confert uictu uti ad ignē magis tendente, et nō repletionibus, neq; ciborū, neq; potuum. Cursibus itaq; utendū est uelocibus, quo & corpus humore euacuetur, & humor amplius citius sistatur. Luctis autē & fricationibus & eiusmodi exercitijs uti nō cōducit, ut ne meatus cauiōres redditī repleantur. A talibus enim animæ motū grauari necesse est. Cōfert & deambulationibus uti, tum à cœna, tum mane, itēq; à cursibus. A cœna quidem, quo alimentū siccior anima suscipiat ab ingrediētibus ac ingestis. Mane uero, quo trāsitus humoris euacuetur, & meatus animæ nō obturentur. Ab exercitijs uero, ut ne in corpore relinquantur quod secretum est à cursu, neq; animæ cōmiscetur, neq; transitus obturet, neq; alimentū conturbet. Cōfert & uomitibus uti, quo corpus depurgetur, si quid defectuosius labores transegerunt. à uomitu aut paulatim adijciēdo cibis offerēdus est, minimū ad quatuor dies. At uero ungi cōducibilis est q̄ lauari. Coitu utendū est, aquæ accessibus cōtingentibus, frequentiore, in ignis autē impressiōibus, pauciore. Porro si in aliqua anima defectuosiorē uim ignis accipiat q̄ aqua, eam tardiorē esse necesse est, & appellantur tales stolidi. Nā ut tardiorē existēte circuitu, sensus paulatim allabūtur, & qui acuti existūt parum cōmifcentur, propter circuitus tarditatē. Sensus enim animæ qui per uisum ac auditū contingunt acuti sunt, qui uero per tactum, tardiores & facilius percipiūtur. hos quidē igitur percipiūt etiam tales nihilominus, uelut sunt frigida & calida ac cōsimilia, Quæ uero per uisum aut auditū percipere oportet, quæ non prius sciunt, percipere nō possunt. Si enim non cōmota fuerit anima ab igne allabēte, nō percipere poterit quale quid tandē sit. Tales igitur animæ nō perpetiūtur hoc ob celeritatē, Si autē recta diætā utatur, etiā talis homo melior fieri possit. Cōferunt itaq; huic eadem quæ priori, Verū siccioribus ac paucioribus cibis utetur, laboribus autē pluribus & acutioribus ac uelocioribus. Confert & fomētis uti, & uomitibus à fomentis, & exhibitionibus ciborum à uomitibus ex longiori tēpore, si defectuosius cōtigerint uomitus. Et sanè hæc faciens, sanior ac sapiētior fuerit. Si uero amplius adhuc superetur ignis à præsentī aqua, hos iam alij desipiētes, alij attonitos siue stupidos appellant. Et hæc insanix quædam species tardior existit, hi plorant nemine molestante aut uerberātē, formidantq; nō formidanda, & tristantur in rebus nihil ad se pertinentibus, & sentiūt ea quæ nō conueniunt sapiētibus. Cōfert itaq; his, fomentis uti, & à fomētis ueratrīs expurgari, ac diætā uti quā prius dixi, indigetq; talis hōmo attenuatione pulmonis ac siccitate. Si autē aqua defectuosiorē uim accipiat q̄ ignis, quum aliās sincerū temperamentū habeant, sani sunt homines corporibus, & sapiētes. Talis autē anima cito percipit allabentia, & non sæpe ab una re ad aliam transit. Natura quidē igitur talis, animæ bonæ est. Melior aut reddet rectæ diætæ usu, & peior prauæ. Confert huic, diætæ usus ad aquam magis uergentis, ita ut excessus uitet & ciborū, et potuum, & laborum. Vitetur & cursibus curuis & rectis reuertētibus, luctisq; ac reliquis exercitijs, ita ut in nullo excessum faciat. Si enim sanū fuerit corpus, & non ab aliquo alio perturbetur, animi temperamentū sapiens existit. Si uero amplius aquæ uis ab igne superetur, tali homini necesse est tanto acutiorē animam esse, quāto citius

tius mouetur, & ad sensus citius allabi, uerum minus constantem priore, propterea quod iudicat ea quæ obueniunt, & in pulmonē procedit ob celeritatem.

Confert tali homini diæta uti magis ad aquā uergente, q̄ priori, & maza magis q̄ pane, & piscibus magis q̄ carnibus, & potu aquosiore, & Venere rarius utetur, et laboribus qui sunt maxime secundū naturā q̄ plurimis, uiolentis autem uti nō est necesse. Utetur & uomitibus paucioribus ex repletionibus, quo corpus quidem euacuetur, q̄ minime uero caleseat, Conducit etiā talibus ad sapientiā, ut minime carnosi sint, Nam ad carnis bonā habitudinē, ardoris inflātionem fieri necesse est. Quum autē tale quid huiusmodi anima perpetitur, ad insaniam adigitur, ex superata aqua adacta. Talibus cōfert actiones obire ac trāsigere à cibo accepto magis q̄ ieiunis. Stabilior em̄ redditur anima alimēto cōmodo ammixto, q̄ alimēti indiga. Si uero adhuc amplius superetur aqua ab ignē, talis anima ualde acuta est, & tales necesse est somnia uidere, uocāt aut ipsos subfuriosos. Nam res ualde propinqua insanix est, Etenim à breui & incōmoda inflātionem insaniūt, & in ebrietatibus, & carnis bona habitudine, & præ carniū esu. Verū talem oportet ab his omnib. abstinere, itemq̄ à reliqua repletionē, ac exercitijs uiolentis. In uictu utendū est Maza uino dulci nō subacta, & oleribus coctis, sed nō purgātibus, & pisciculis ex muria, & aquā bibere præstantissimū est, si fieri possit, sin minus, uinū molle et albū quod aquæ sit proximum. Deambulationibus quoq̄ multis mane utendum, à cena uero satis est exsurgere, quo cibi quidem non resiccentur à deambulationibus post coenam, corpus autem euacuetur à matutinis.

Lauare autem magis conducit aqua tepida circumaffusa, quàm ungi. Confert & in æstate interdū somno uti breui non multo, ut ne corpus ab anni tempore resiccentur. Conueniens est etiā uere ueratris purgare, fomentis antea præparatos, deinde sensim ad diætā inducere, & neq̄ hunc ieiunum actiones obire oportet. Et ex hac sanè cura, huiusmodi anima sapientissima fuerit. Sapientis quidem igitur ac desipientis animæ hoc temperamentū causa est, quemadmodū à me scriptum est, potestq̄ ex diætā & melior, & deterior fieri. Cæterum cursus impetu igne præualefcēte, impossibile fortē fuerit aquæ aliquid apponere, Similiterq̄ aqua præualente in temperamēto, ignem augere. Ex his uero & sapiētiores & desipientiores animæ fiunt. At uero taliū non amplius temperamentū est, qualis est, Iracūdu, Segnis, Dolosus, Simplex, Infestus, Beneuolus. Taliū omnium natura meatuū per quos anima meat causa est, per qualia enim uasa secedit, & ad qualia allabitur, & qualibus ammiscetur, talia sapiūt. Ob id itaq̄ impossibile est talia ex diætā trāsmutare. Naturā enim obscurā trāsfornare non est possibile. Similiter autem & uocis qualiscūq̄ tandē fuerit, meatus spiritus causa sunt, per qualescūq̄ enim aer mouetur, et ad qualescūq̄ allabitur, talem necesse est esse uocem: & hanc quidem tum deteriorē, tum

meliorem facere possibile est, quia leuiores ac breuiore
res meatus spiritus facere possibile est.

Verū illa ex diætā alterare im
possibile existit.

HIPPOCRATIS COIDE DIAE

TA SIVE VICTVS RATIONE, LIBER II.

Iano Cornario Medico Physico interprete.



REGIONVM singularū situm & naturā hoc modo cognoscere oportet. Et in summa res hoc modo se habet. Regio ad meridiem sita calidior est, & siccior, q̄ ea quæ ad septentriones iacet, propterea quòd soli propinquior est. Et in his regionibus necesse est & hominū genera, & nascentia ex terra, sicciora ac calidiora & fortiora esse, q̄ in contrarijs. uelut Libyca gens ad ponticā, & utrisq; uicinā. Ipsa autem loca iuxta seipsa hoc modo habent. Alta & squallida & ad meridiem sita, sicciora sunt quàm campestria & æqualiter sita, propterea quòd pauciores humores habent, illa enim stationem pro aqua pluuiā non habent, hæc habent. At uero lacustria ac palustria humectant & calfaciunt. Et calfaciunt quidē quia caua sunt & circumdata, & non perflantur. humectant autem, quia nascentia ex terra quibus homines aluntur, humidiora sunt, & spiritus quem attrahimus crassior est, propter aquæ stationem ac immobilitatem. Verum caua loca & non aquosa, siccant & calfaciunt. Et calfaciunt quidē quia caua sunt & circūdantur. Siccant autem, tum propter alimenti siccitatē, tum quòd spiritus quem inspiramus siccus existens, humorem ex corporibus trahit in alimentū sibi ipsi, quum non habeat alium humore ad quem allapsus nutriatur. Vbi autem regionibus montes adiacent ad austrum, in his squallidi austri & morbosi afflant. Vbi autem ab Aquilone montes adiacent, in his aquilones perturbant ac morbos faciunt. Vbi uero ab Aquilone caua loca urbibus adiacent, ab æstiuis uentis calida & morbosa hæc regio existit, propterea quòd neq; aquilo perflans puram spiritus inductionem exhibet, neq; ab æstiuis uentis perfrigeratur. Cæterum insulæ propinquæ cōtinenti tempestuosiores sunt & ægre in ipsis hybernæ namus. Marinæ uero hyeme tepidiores sunt, propterea quòd niues & glacies in cōtinenti stationes habēt, & uentos frigidos in uicinas insulas mittunt. Verum insulæ intra pelagus positæ non habent in hyeme niuium stationem.

Porro de uentis quā naturam ac facultatē singuli habēt, hoc modo cognoscere oportet. Naturam quidē habent omnes uenti humectandi ac frigefaciendi, tum animalium corpora, tum nascentia ex terra, ob hanc causam. Necesse est omnes uentos spirare à niue, à glacie, & gelu uehementi, & fluminibus, & stagnis, terraq; humecta ac perfrigerata. Et fortiores quidem uentos, à maioribus & fortioribus, debiliores uero à minoribus & debilibus. Quemadmodum enim animalibus spiritus inest, Sic etiā alijs omnibus, alijs quidem minor, alijs uero iuxta magnitudinē. Naturam quidem igitur habent humectandi ac frigefaciendi omnes uenti, Verū propter situm regionū ac locorum, per quæ uenti ad singulas regiones accedunt, diuersi inter se fiunt, frigidiores, calidiores, humidiores, sicciores, morbosiores, salubriores, Singulorum autem causam sic cognoscere oportet. Boreas siue aquilo frigidus spirat ac humidus, quia progreditur à talibus regionibus, meatq; per tales locos, ad quos non accedit sol ipse, neq; aerem resiccans, humorem ebibit ac exhaurit, Quare ad terram

ram habitabilem accedit suam ipsius uim habens, ubi non per regionis situm corrumpitur. & his quidem qui proxime habitant frigidissimus est, qui uero remotissime, minime. Auster autem à similibus aquiloni natura regionibus spirat. Ab Australi enim polo spirans, & à niuē multa glaciēq; ac gelu fortibus procedens, necessario his qui prope ipsum illic habitant talis spirat, qualis nobis est Aquilo. Verum omnem non item similis accedit regionem. Nam quū per solis iter & in meridiem spiret, humiditas ipsius à sole ebibitur, & resiccatus rarefcit, quapropter necesse est ipsum calidum ac siccū huc accedere. In proximis igitur regionibus necesse est ipsum talem uim calidam ac siccā exerce-
re. & hoc sanē in Libya facit, Nam & terræ nascentia exarescunt, & homines latenter resiccant, Quum enim non habeat nec mare, nec fluuium unde humiditatem accipiat, ex animantibus ac plantis humorem exhaurit. Vbi uero pelagus transit, tanquā calidus & rarus existens, multa humiditate regionē in quam illabitur implet, & necesse est ipsum calidum ac humidum esse, ubi non regionum situs alterius qualitatis causa existat. Eodē modo etiam aliorum uentorum facultates se habent. Cæterū iuxta singulas regiones uenti hoc modo se habent. Venti ex mari in regiones illabentes, sicciores quodammodo sunt. Qui uero à niuē aut glaciē, aut stagnis aut fluminibus procedunt, omnes humectant ac frigefaciunt, tum plantas, tum animantia, & sanitatem corporibus exhibent qui non frigiditate superexcellunt. Hi enim lædunt, propterea quod magnas mutationes calidi ac frigidi in corporibus inducunt. Hæc autem perpetiuntur hi qui in regionibus habitant palustribus ac calidis, prope flumina magnā. Reliqui uero uenti qui à prædictis spirant utiles sunt, tum aerē purū ac sincerum exhibentes, tum animæ calori humiditatem præbentes. Quicunq; uero uenti ex terra accedunt, eos necesse est sicciores esse, tum à sole, tum à terra resiccatos. Quum autem non habeant uenti unde alimentum trahant, à uiuentibus humorem trahentes, & plantas & animalia omnia lædunt. Et quicunq; uenti relictis montibus ad urbes accedunt, non solum siccant, sed etiam turbant spiritum quem inspiramus, & corpora hominum morbosa faciunt. Naturam quidem igitur & uim singulorum sic cognoscere oportet. Quomodo autē ad singulos se præparare oporteat, in sermonis progressu declarabo. At uero ciborum ac potuum singulorū uim, tum eam quæ secundum naturam est, tum eam quæ per artē accelsit, hoc modo cognoscere oportet. Quicunq; igitur in summa dicere aggressi sunt, aut de dulciū, aut pinguium, aut salforum, aut alterius cuiusdam consimilis facultate, non recte iudicant. Non enim eandem uim habent, neq; dulcia inter se, neq; amara, neq; ulla aliqua eiusmodi. Multa enim ex talibus sunt quæ & aluū emolliunt, & sistunt; siccantq; & humectant, Similiter autē etiam in reliquis omnibus. Sunt & quæ adstringunt, itemq; aluū mouent, & urinā cient. Sunt quæ neutrum horum faciunt. Similiter & ex calfaciētib; ac reliquis omnibus, alia aliam facultatem habent. De omnibus quidem igitur impossibile est qualia nam sint declarare, Verum quam uim singulatim habeant, docebo. Ordeum natura quidem frigidum est & siccum. Inest & purgatoriū quiddam à succo pælearum. Eius si-
gnum habebis si uoles ordeum non purgatum coquere, Purgat enim is succus fortiter, Si uero decorticatū coxeris, perfrigerabit magis ac aluū sistet. Quum

autē tostum fuerit, humor quidē purgatorius prae igne perit. Frigiditas autem & siccitas relinquitur. Quęcunq; uero perfrigerare ac siccare oportet, id ipsum polentę transigunt.

Maza omnis generis sic utimur, facultatē autem habet maza hæc talem. farinę ex toto collatę alimentū quidem minus habēt, uerum magis per aluum secedunt. Purę autē magis nutriunt, minus uero per aluum secedunt. Maza prius subacta, respersa, uino dulci non emollita, leuem facit, & per aluum secedit, ac frigefacit. Et frigefacit quidem, quia frigida aqua madefacta est, per aluum autem secedit, quia cito cōcoquitur. leuem uero facit, quia multum alimenti cum flatu foras excernitur. Quū enim transitus alimentī angustiores sint, aliud insuper accedens non suscipiūt, & quod quidem cum flatu attenuatum est, foras excernitur, quod uero intus manet, flatum inducit, & partim superne eructatur, partim inferne secedit. Multum itaque alimenti à corpore diffatur. Si uero uelis mazam statim ut subacta est exhibere, talis rescicatoria est. Quum enim polenta sicca existat, & aqua sit madefacta, atq; sic præparata in uentrem illabatur, humorem ex ipso trahit calidum existentem. Solet enim calidum attrahere frigidum, & rursus frigidum calidum. Cōsumpto autem humore ex uētre necesse est siccari. Aqua uero quę unā cum maza ingressa est, frigefacit. Quęcūq; igitur siccare oportet aut frigefacere, aut uentris profluuiο diffusum, aut alia quapiam eiusmodi caliditate, maza efficax existit.

At uero sicca, uino dulci emollita ac trita maza, siccatur quidem non similiter, propterea quod uehementer est adstricta, alimētum uero plurimum corpori præbet, Nam ut leniter liquefcentis alimentum transitus suscipiunt. Per aluum quidem igitur tarde secedit, flatū autem nō inducit, neq; eructatur. Quę uero & aqua, & uino dulci emollita ac prius subacta est, nutrit quidem minus, per aluum autem secedit, & flatum magis inducit. Cyceon autem solum in aqua quidem frigefacit ac nutrit, in uino uero calfacit ac nutrit, & aluum sistit. In melle autem calfacit quidem minus ac nutrit, per aluū uero magis secedit, si non meracum mel fuerit: sin minus, nō secedit, sed aluum sistit. In lacte uero bene alunt omnes Cyceones, hoc est farinę. Verūtamen ouillum aluum sistit, caprinum uero magis per aluum secedit. Bubulum uero minus.

Equinum autem & asininum magis secedunt. Triticum fortius est ordeo & magis nutrit, minus autē per aluum secedit, tum ipsum, tum succus.

Panis autem ex tota farina collata, siccatur & per aluum secedit. Purus autem magis nutrit, minus uero secedit. Ex ipsis porro panibus, fermentatus quidem leuis est & secedit. Et leuis quidem est, quia à fermenti acore humiditas consumpta est, quę sanē alimētum existit, secedit autem, quia cito concoquitur. Non fermentatus secedit quidem minus, nutrit autem magis.

Qui succo subactus est, leuior est, & multum nutrit, ac per aluum secedit. Nutrit, quia purus est. leuis est, quia leuissimo subactus est, & fermentatus ac tostus ab eodem est. per aluum secedit, quia passus, & aluum mouēte tritici parte, permixtus est. Ex ipsis autem panibus maximi maxime alunt, propterea quod minime exuritur humiditas ab igne. Et furnacei panes magis alunt q̃ focarij & ueruarij, propterea quod minus exuruntur ab igne. Clibano autem cocti & subcinericij siccissimi sunt, hi quidem propter cinerem, illi uero per testam humore priuati. Similaginei omnium horum fortissimi sunt, Et ad

huc

huc magis qui ex alica fiunt, ualdeq; nutriunt, uerum non similiter secedunt.

Farina pura in aqua pota frigefacit, & lotura pollinis tritici. Furfurum succus coctus, leuis, per aluum secedit. Verum farinæ in lacte datæ magis per aluum secedunt, quàm in aqua, propter serum, & maximè inter aluum mo-¹³⁵ uentia numerantur.

Quæcūq; uero farinæ cum melle & oleo coquuntur, aut assantur, omnes æstuosæ sunt, & ructū cient. Et ructum quidem cient, quia probe alentes non secedunt. Aestuosa autē sunt, quia pingua, & dulcia, & inter se concordia, non eadem coctura indigentia, in eodem sunt.

Similago & alica cocta, fortia sunt & alunt, non tamen per aluum secedunt.

Trygis, id est Tragus siue olyra, leuior est tritico, & quæ ex ipsa fiunt similiter ut ea quæ ex tritico parantur, & magis per aluum secedunt.

Auena comesta humectat ac perfrigerat, itēq; in sorbitione accepta.

Polentæ ac farinæ recentes sicciore sunt uetustis, quia igni & præparationi propinquiore existunt. Vbi uero uetustæ fiunt, calor exhalat, & frigiditas inducitur.

Panes calidi siccant, frigidi minus, gracilitatem autem quādam inducunt.

Fabæ alunt, aluum sistunt, & inflant. Inflant, quia meatus aliud insuper accedens alimentum non suscipiunt. Aluum sistunt, quia totam alimenti fecem habent.

Pisæ inflant quidem minus, per aluum autem magis secedunt.

Ochri siue eruiolæ, & dolichi siue phasioli ac siliquæ, his magis per aluum secedunt, minus inflant, & probe alunt.

Cicer album per aluum secedit, & per urinam ejicitur, & alit. Et alit quidem, carnosum in ipso. Per urinam uero ejicitur, dulce, per aluum autē secedit, saluginosum.

Mili grana ac paleæ siccant, & uentrem sistunt, & cum ficibus, fortibus doloribus cōferunt. Ipsum autem Milium coctum alit, nō tamē aluo secedit.

Lentes æstuosæ sunt & turbatiuæ, & neq; per aluū secedunt, neq; ipsam sistunt.

Eruum aluum sistit, & robustum est, & crassfacit, & explet, & boni coloris hominē facit.

Lini semen comestū aluum sistit, habet & quiddā frigefactoriū. Hormini semen consimilia lini semini facit.

Lupini natura robusti sunt & calidi, uerū per præparationē leuiore ac frigidiores fiunt, & aluo secedūt.

Irio humectat & aluo secedit.

Cucumeris semen per lotiū magis abit q̃ secessum. Explet autem & crassfacit. Et secedit quidem per aluū, propter paleam externam, explet autem & crassfacit, propter carnem.

Lotum uero secedit quidem, uerū minus, crassfacit autem & explet magis, humectat autē & urit, propter pingue & oleosum.

Cnicus aluum mouet. Papauer aluū sistit, magis autē nigrum hoc facit, sed & album idem agit, alit autē, & robustum est.

Horum porro omnium succi carnis aluum mouent, oportet itaq; in præparatione id obseruare, ut quæ siccare uelis, ab his succos detrahas, & carne utaris.

quæ uero aluū mouere uelis, ut succo copiosiore, carne uero pauciore & succulentiore utaris.

Cæterū de animalibus quæ in ciborū usum ueniunt, sic cognoscere oportet. Carnes Bubulæ robustæ sunt, & aluum sistunt, & agrè in uentre concoquuntur, propterea quod crassi ac multi sanguinis est hoc animal, & carnes graues, itemq; sanguis, ac lac.

Quorum autem animalium lac tenue est, & sanguis similiter, eorū etiam carnes cōsimiles sunt.

Caprinæ carnes his leuiore sunt, & magis aluo secedūt. Suillæ robur quidem magis q̃ hæ corpori inducūt, multū autē aluo secedunt, propterea quod tenues et modici sanguinis

uenas sues habent, carnem uero multam. Agninae leuiiores sunt ouillis, & hedinae caprinis, quia exanguiores sunt & humidiores. Quum enim sicca & robusta natura sint animalia, dum quidem tenerae sunt, aluo secedunt, ubi uero augmentum sumperint, non similiter. Et uitulinae carnes eodem modo se ad bubulas habent.

Verum porcinae suillis grauiiores sunt. Quum enim animal sit natura carnosum & exagüe, humiditatis excessum in tenella aetate habet. Quum igitur meatus superaccedens alimentum non suscipiant, intus manens calfacit ac perturbat uentrem. Asininae carnes aluo secedunt, & pullorum adhuc magis.

Equinae leuiiores sunt. Caninae calfaciunt ac siccant & robur inducunt, non tamen aluo secedunt. catulinae uero humectant & secedunt. Suis syluestris caro siccatur & robur exhibet, ac secedit. Cerui siccatur, minus autem secedit, magisque urinam prolicat. Leporinae siccatae sunt & aluum sistunt, urinam autem citamentum quoddam faciunt. Vulpinae humidiores sunt & urinam cient.

Et erinaceorum terrestrium carnes humidiores sunt ac urinam cient. Porro de uolucrum generibus sic res se habet. Omnia ferme uolucrum genera sicciora sunt quam quadrupeda. Quaecumque enim uesicam non habent, neque mingunt, neque sputum aut saliuam fundunt, omnino sicca sunt. Propter caliditatem enim uentris, humiditas ex corpore consumitur in alimentum caliditatis, quare neque mingunt, neque sputum aut saliuam fundunt.

Cui autem tales humiditates non insunt, id ipsum necessario siccatur. Siccissima igitur caro est palumbis, deinde columbae, tertio loco perdices, ac galli, & turturis. humidissima uero anseris. Seminales autem uolucres praedictis sicciores sunt. Verum anatis carnes, & reliquarum auicularum quae in paludibus degunt, aut in aquis, omnes humidae sunt.

At uero ex piscibus siccissimi sunt hi, scorpius, draco, callionymus, cuculus, glaucus, perca, thrissa. Leues autem sunt petrosi ferme omnes, uelut turdus, phoca, elephetis, gobio. Tales autem & praedicti item, leuiiores sunt erronebus, Nam hi ut quiescentes raram ac leuem carnem habent, Errones autem & undas uerberantes laboribus fracti, solidiorem carnem habent. Torpedines autem & squatinae ac Rhombi, & huiusmodi, sunt leuiiores. Quicumque uero pisces in lutosissimis & aquosis locis alimenta habent, uelut capitones, mugiles, anguillae, & reliqui eiusmodi, grauiiores sunt, propterea quod ab aqua & luto, & in his nascentibus, alimenta habent, a quibus etiam spiritus in hominem ingrediens ipsum laedit ac grauatur.

Fluitatiles autem & palustres his adhuc grauiiores sunt. Polypi uero & sepiae, & eiusmodi pisces, neque leues uelut uidentur sunt, neque per aluum secedunt. quapropter etiam oculos comesti grauatur, luscule tamen horum aluum mouent.

Caterum conchylia uelut sunt pinnae, purpurae, patellae, buccinae, ostreae, ipsa quidem sicca sunt, succi autem ipsorum aluum mouent. Mituli uero & pectines ac tellinae magis aluo secedunt, Vrticae autem & charitilaginosi generis pisces, maxime humectant ac aluum mouent. Caeterum Erinaceorum oua, & locustarum humor, & musculi, & ursae, ac cancri, magis quidem fluuiatiles, sed & marini, aluum mouent & urinam cient.

Salsamenta siccant & attenuant, plerumque etiam aluum leniter mouent. Ex salsamentis siccissima sunt marina, deinde fluuiatilia, Humidissima autem sunt palustria. Ex ipsis autem salsamentis pisces percae appellati ualde siccissimi sunt. Animalium porro cicurum ea quae in syluis & agris pascuntur, sicciora sunt his quae intra aedes

ædes nutriuntur, quia labore resiccantur, itemq; præ sole ac frigore, & spiritu sicciore nutriuntur. Verum syluestria sicciore sunt mansuetis, & crudiore ac sylvarum materie pasta, itemq; parū edacia, sicciore sunt edacibus. Et frugiuora herbiuoris sicciore sunt, Et frugiuora non frugiuoris, & paucibilibus multibilibus, & sanguine referta exanguibus ac paucum sanguinem habentibus, & quæ in uigore sunt uetustis ualde ac iuuenilibus, & mascula foemineis, & castrata non castratis, & nigra albis, & hirta nudis. Contraria uero his humidiora sunt.

Ex ipsis autem animalibus carnes hæc fortiores sunt, quæ optime exercentur ac sanguinolentissimæ sunt, & in quibus recumbunt. Leuissimæ autem carnes sunt, quæ minime exercentur, & in umbra degunt, & in intimis animalibus partibus sitæ sunt. Exanguium autem partium robustissimæ sunt, cerebrum & medulla. Leuissimæ uero carniū partes sunt capitales, & sub uentre, musculi, pectines, pedes. Ex piscibus sicciissimæ sunt supernæ partes, leuissimæ sub uentre, Et capita ipsorum humidiora sunt, propter pinguedinē ac cerebrum. Oua uolucrum robustū quid habēt, & alunt, & inflant. Robustum quid habent, quia generatio est animalis. Alunt, quia hoc est pulli lac. Inflant, quia ex parua mole in multam diffunduntur. Caseus robustus est & aestuosus & alit. Robustus quidem, quia proximus est generationi. Alit autem, quia carnosæ reliquæ sunt lactis. Aestuosus est, quia pinguis. Aluum autem sistit, quia succo & coagulo compactus est. Aqua frigefacit. Vinum calidū est & siccum, Habet & purgatoriū quiddam à materia. Vina nigra & austera sicciore sunt, & aluum non mouent, neq; urinam cient, neq; saluā faciunt. Siccant autem & calfaciunt, humiditatem ex corpore cōsumētes. Mollia uero nigra humidiora sunt, & inflant atq; aluum magis mouēt, Dulcia nigra humidiora sunt, calfaciūt autem & inflant humiditatē inducentia. At uero alba & austera calfaciunt, magisq; urinam cient, q̃ aluum mouent. Noua uina aluum magis mouēt, quia propiora musto sunt, itemq; alunt, & odorata magis quàm inodorata eiusdem ætatis, quia magis concocta sunt: & crassa magis quàm tenuia. Verum tenuia dulcia magis urinā cient, & aluum mouēt, & humectant corpus, & sanguinem debilem faciunt, & aduersariū corporis sanguinem in corpore augent. Mustum inflat, & subducit, ac cōturbat feruens in uentre, & aluo secedit. Inflant quidem, quia calfacit, subducit autem ex corpore, quia purgat. conturbat aut, quia feruet in uentre, atq; ita aluo secedit. Vina acida frigefaciunt, attenuāt & humectant. Frigefaciunt quidem & attenuāt humiditatis euacuationem à corpore facientes. humectant autem per aquam unā cum uino ingrediētem. Acetum frigefacit, quia colliquans humiditatem in corpore cōsumit. Sistit autem magis quàm mouet aluum, quia non alit & acre est. Sapa calfacit & humectat ac subducit. Calfacit, quia uinosa est, humectat, quia alit. subducit, quia dulcis est. Vinum recens sub tunculari expressum & nondum excolatum, humectat, subducit, & inflat, quia etiam mustum idem facit. Mel calidum est & siccum, si meracum sit, cū aqua autem humectat & aluum mouet biliosis, pituitosis uero sistit. Dulce uero uinum pituitosis magis aluo secedit. De oleribus porro hoc modo res se haet. Allium calidū est, & aluum mouet & urinā ciet corpori, oculis uero non est cō-

& urinam mouet, propter uim purgatoriam, coctū debilius est quam crudū, flatum autem inducit, propter spiritus intētionem. Cēpa uisui commoda est, corpori uero mala, quia calida & æstuosa est, & aluo secedit, & alimentum quidem nullum corpori præbet neq; utilitatem, calfaciēs autem siccatur propter succum. Porrum calfacit quidem minus, urinā uero ciet, & aluum mouet, habet & quid purgatoriū. humectat autem & ructum acidum sedat. Præstat à reliquis cibis postremū ipsum edere. Raphanus siue radícula, humectat pituitam diffundēs sua acrimonia, folia minus profunt, præterq; ad articulare morbum. Radix uitiōsa est, innatās ac agre cōcoctilis. Nasturtiū calidum est, & carnem liquat, sistit autē pituitam albam, quare urinæ stillicidiū inducit. Sinapi calidum est & aluum mouet, sed & hoc urinæ difficultatem facit. Quin & Eruca idem facit. Coriandrū calidum est, & aluum sistit, & ructum acidum sedat, & somnū conciliat, si postremū edatur. Lactuca frigidiſſima est, prius q̄ succum habeat, debilitatē autem quādam corpori inducit. Anethum calidum est, & aluum sistit, & sternutamenta sedat olfactatum. Apium magis urinam ciet q̄ aluū mouet, & radices magis q̄ ipsum, aluum mouent. Ocymum siccum est & calidū, & aluum sistit. Ruta urinam magis q̄ aluū mouet, Habet & uim quandā condensandi, & ad medicamenta noxia cōmoda est præpotata. Asparagus siccus est & aluum sistit. Saluia sicca est & aluum sistit. Solanum frigefacit, & semen in somnis effundere non permittit. Portulaca fluuiatilis frigefacit, sale uero condita ac seruata, calfacit & purgat. Calamintha calfacit & purgat. Mintha calfacit & urinam ciet, & uomitus sistit, Et si quis semen eius sæpe comedat, colliqueſcit ut quis disfluat, & arrigere prohibet, & corpus debile facit. Rumex calfacit ac aluum mouet. Attriplex humida est, nō tamē aluum mouet. Blistum calidum est, non mouens aluum. Bralsica calfacit ac aluum mouet, & biliosa ducit. Betæ succus quidem aluum mouet, ipsum autē olus comestū sistit. Radices uero magis aluum mouent. Cucurbita frigefacit & humectat, & aluum mouet. Rapum æstuosum est, humectat autē & conturbat corpus, non tamen aluo secedit, & urinæ difficultatem inducit. Pulegium calfacit & aluum mouet. Origanū calfacit, & biliosa subducit. Thymbra similia origano efficit. Thymum calidum est, per aluū secedit & mingitur, ducit & pituitosa. Hyssopum calidum est & pituitā ducit. Porro syluestria olera, quæ os calfaciunt, & odorata sunt, ea calfaciūt & minguntur magis q̄ per aluum secedunt. Quæ uero humidam habēt naturā frigidamq; ac fatuam, & odores graues, magis per aluum secedunt, q̄ per urinam. Quæ autem acerbæ & austera sunt, aluum sistunt. Quæ acriæ & odorata sunt, urinam cient. Quæ acriæ & sicca in ore sunt, ea omnia siccant. Quæ acida sunt, frigefaciunt. Cæterum succi urinam cientes sunt, crethmi, apij, allij cremor, cytisi, fœniculi, porri, adiantis, solani, qui & frigefacit. Item scolopendrium, mintha, seseli, caualides, hypericū, urticæ. Aluum autem mouent & purgant, cicer, lenticula, ordeum, beta, bralsica, mercurialis, sambucus, cnicus. Hec omnia aluum magis mouēt quā urinam. At uero de pomis hoc modo se res habet. Quæ quidem seminibus referta sunt, ea magis aluum mouēt, Item uisidia magis q̄ sicca. Verum uis & facultas ipsorum referatur. Mora calfaciunt

ciunt & humectant ac aluo secedūt. Pira matura calfaciūt & humectant ac aluum mouent. Dura uero sistunt. Pira syluestria, hyberna, matura, aluū mouent ac purgant. Cruda uero sistunt. Mala dulcia ægre cōcoquuntur. Acida uero & matura, minus. Cydonia adstringunt, & nō mouent aluum. Succiautem malorum, uomitus sistunt, & urinā cient. et ante uomitū odores ipsorum idem præstant. Mala syluestria aluum sistunt. Cōcta comesta magis aluum mouēt. Verum ad respirationē quæ erecta ceruice fit, & succi ipsorum, & ipsa quoq; hausta profunt. Sorba, Mespila & Corna, & quæcunq; alia huius generis poma, aluum sistunt & acerbata sunt. Mali punici dulcis succus aluū mouet. habet autē quid æstuosum. Mala punica uinosa, minus æstuosa sunt. Acida uero magis frigefactoria. Nuclei autem omnium aluum sistunt. Cucumeres crudi, frigidi sunt & ægre concoctiles. Maturi autem & pepones, minguntur & per aluum secedunt, uerum flatuosi sunt. Botri uuarū calidi sunt & humidi ac aluum mouent, maxime albi. Dulces quidē igitur calfaciūt fortiter, propterea quod multum iam caliditatis habent. Immaturæ uero minus calfaciunt, magis autem purgant potatī. Ficus & uuæ passæ æstuosæ sunt, sed aluum mouent. Ficus uiridis humectat & aluū mouet, ac calfacit. humectat, quia succo plena est. Calfacit, propter succum itidem, aluū mouet, propter succi dulcorem. Primæ ficus pessimæ sunt, quia succulentissimæ, optime aut sunt postremæ. Ficus aridæ æstuosæ sunt, sed aluo secedunt. Amygdalæ æstuosæ sunt, uerum probe nutriunt. Aestuosa quidem sunt propter pinguitudinē, nutriunt autem propter carnositatē. Noces rotundæ similes his sunt. Latæ uero maturæ probe alunt, & aluum mouēt. Depuratæ uero etiam flatum inducunt. Tunicæ uero ipsarum aluum sistunt. Acyli ilicis glandes, & quercinæ ac fagineæ glâdes, aluū sistunt crudæ & assatæ, coctæ uero minus. Pingues carnes æstuosæ sunt, sed aluum mouent. Carnes conditæ ac asseruatæ in uino quidem siccant & alunt, & siccant quidem propter uinum, alunt autem propter carnem. In aceto autem asseruatæ calfaciunt quidē, uerum minus propter acetum, multum autē nutriunt. At uero sale seruata minus quidem alunt, humiditate per salem priuata, attenuant autē & siccant, ac sufficienter aluū mouent. Cæterum uires singulorū detrahare, & addere ac augere, hoc modo oportet. Ex igne & aqua omnia cōstituuntur, & animalia, & terra nascentia, & ex his augescunt, & in hæc secernuntur ac resoluūtur. Fortium quidem igitur eduliorum uim sæpe coquendo ac frigefaciendo detrahare oportet, et uice uersa augere. Humidorū autem torrēdo ac assando humiditatē eximere. Siccorum uero rigādo ac madefaciendo. Salsorū rigando & coquendo. Amarorū & acrium dulciū mixtura. Acerborū pinguiū temperamēto. & de reliquis omnibus ex prædictis iudicium facere oportet. Quæcūq; tosta aut assata sunt, aluū magis sistūt q̃ crudæ, propterea quod humiditas iteq; pinguitudo per ignē ablata sunt. Quū itaq; in uentrē inciderint, humiditatē ex uentre trahunt, & oscula uenarū concludunt siccantq; ac calfaciūt, quare trāsitus humiditatis sistunt. Quæ uero ex inaquosis ac siccis & æstuosis locis ueniūt, ea omnia sicciora ac calidiora sunt, & robur amplius corpore exhibēt, propterea quod pari mole ac copia grauiora sunt & densiora, & maiore redditū tribuūt, q̃ quæ ex humidis et riguis ac frigidis. Hæc em̃ humidiora sunt et leuiora ac frigidiora. Nō igitur

igitur solū ipsius cibi & potus, & animalū ipsorum uim nosse oportet, sed etiā patriā unde sunt. Quū igitur forte alimentū corpori offerre uoles, & ex istisdem cibis, his quæ ex inaquosis locis ueniunt utēdum est, & cibis, & potibus, & animalibus. Vbi uero leuiore & humidior, his quæ ex riguis ueniunt uteris. Dulcia & acria, & salsa, & amara, & austera, & carnosa, calfacere solent. Item quæ sicca sunt, & quæ humida. Quæcunq; igitur de sicca parte plus in se habent, ea siccant & calfaciunt. Quæ uero humidæ partis plus habent, ea omnia calfacientia humectant, & aluum magis mouēt q̄ sicca. Nam ubi alimentum amplius corpori præbuerunt, reuulsionē in uentre faciūt, & humectantia aluo secedunt. Quæ autē ex calfacientia siccant, tum edulia tum pocula, neq; saluam, neq; urinam, neq; secessum facientia, corpus siccant, idq; ob hanc causam. Corpus calfactum humore uacuatur, & pars eius ab ipsis cibis, pars in alimentum caloris ipsius animæ consumitur. Pars etiam calfacta & attenuata per ipsum corpus expellitur. Dulcia & pingua ac oleosa replent, quia ex modica mole multum diffundūtur. Calfacta autem & diffusa, caliditatem in corpore replent ac tranquillam esse faciunt. At uero acida, & acria, & austera, & acerbata, & ex toto collata, & sicca, non replent: propterea quod oscula uenarum aperiant & expurgant, & partim siccantia, partim mordentia ac adstringentia, humiditatem carnis horrere ac confidere & in modicam molem cōtrahi faciunt, atq; ita uacuū multum in corpore fit. Quum igitur uoles à modicis implere, aut à pluribus euacuare, talibus utaris. Recentia omnia maiorem q̄ alia fortitudinem habent, propterea quod propinquiora uiuo sunt. Verū antiqua & marcida, magis q̄ recētia aluum mouēt, quia propiora putredini sunt. At uero cruda alunt & ructus cient, propterea quod quæ ignem coquere oportebat, ea uenter transigit, debiliior q̄ ingesta sunt existens. Cæterum obsonia ex uarijs intritis præparata, æstuosa & humida sunt: propterea quod pingua, & tosta, & calida, & inæquales inter se uires habētia, in eodem coherent. Verum quæ in muria præparantur meliora sunt, & non æstuosa. Porro de balneis hoc modo habet. Aqua potabilis humectat & frigefacit, exhibet enim corpori humiditatē. Salsum autem balneū calfacit ac siccatur. Quum enim natura calidum sit, trahit à corpore humiditatē. Calida autem balnea ieiunū attenuant ac frigefaciunt: per caliditatem enim humiditatē de corpore auferunt, euacuata autē de carne humiditate, corpus perfrigeratur, à cibo accepto eadem calfaciunt, ac humectant, ea quæ supereminet in corpore diffundentia in maiorem molem.

Balnea autē frigida uice uersa, uacuo quidē corpore præbent quandam caliditatem. Vbi autem cibus ingestus est, ab humido existente detrahūt, & frigidum existens siccitate replent. Illuuiēs siccatur quum humiditas cōsumatur. Si militer etiam unctionis neglectus. Vnctio uero calfacit, humectat, ac mollit.

Sol & ignis siccant, propterea quod quū calida sint & sicca, humiditatē ex corpore trahunt. Vmbra & frigus moderate humectant, dant enim magis q̄ accipiunt. Sudores omnes abeuntes siccant & attenuant, humore ex corpore deficiente. Coitus attenuat, humectat & calfacit, Calfacit quidē propter laborem & excretionem frigiditatis. Attenuat autē propter euacuationem. humectat, propter colliquationis reliquias in corpore præ labore. Vomitus attenuat propter cibi euacuationē, non tamen siccant, si quis postridie recte cur

ret, sed humectant, propter repletionem & colliquationē carnis præ labore. Si uero quis sinat hæc postridie consumi in alimētum caliditati, & diætā sensim adhibeat, siccant. Ventrem autē compactum uomitus soluit, & egerentem magis q̃ oportet, sistit, illū quidem humectans, hunc uero siccans. Quum igitur aluū quis sistere uolet, auide deuoratū cibum euomere oportet, priusquā humescat & infra detrahatur: & magis acerbis & austeris edulijis uti. Vbi uero soluere aluum quis uelit, plurimo tēpore cibis immorari confert, & acribus, ac falsis, & pinguibus, ac dulcibus, tum cibis, tum potionibus uti. Somni ieiunum attenuant & frigefaciunt, si non longi fuerint, præsentem humiditatē euacuantes. Qui uero magis calfaciūt, colliquant carnem, & corpus diffundētes exoluunt, ac debiles faciunt. à cibo uero sumpto calfaciētes humectant, alimētum in corpus diffundentes. à matutinis autē deambulationibus somnus maxime siccatur.

Vigilia in exfatiatis cibo noxia est, non permittens cibum liquari ac concoqui. Ieiunos autē attenuat quidem, uerū minus lædit. Seignicies ac ocium humectat, & corpus debile facit. Anima enim quiescēs humiditatem ex corpore nō consumit. Labor siccatur, & corpus robustum facit.

Semel in die cibum capere attenuat, & siccatur, & aluū sistit, propterea quod per animæ caliditatem humiditas ex uētre & carne cōsumitur. Prandium contraria facit. Aquæ potus calidus attenuat, similiter & frigidus. At uero & spiritus, & cibus, & potus, humiditatē in corpore cōgelant, si excellenter frigida fuerint, & per cōgelationem ac frigiditatem aluos sistunt. Nam animæ humiditatem superant. Rursus autē etiā caliditatis excessus eandem cōgelant, in tantum ut diffundi nequeat.

Quæcūq; uero calfacientia corpus, & alimētū non præbentia, carnem humiditate euacuant etiam excessum non facientia, ea frigiditatem homini exhibēt. Nam præsentem humiditatem mota, flatu ab ipsa repletur ac perfrigeratur. Cæterum quam uim labores habeant nunc exponam. Sunt enim alij naturales, alij uolēti. Naturales igitur sunt, Visus labor, auditus, uocis, curarum. Visus quidem igitur talis uis est. Anima in id quod uidetur intenta, mouetur & calefcit. Calfacta uero, euacuata humiditate siccatur.

Per auditum uero allabente sono, anima cōcutitur & laborat, labrans autem calefcit & siccatur. Quæcūq; sunt hominibus in cura, anima etiam ab his calefcit ac siccatur, & humiditatē consumens laborat, & carnes attenuat, & hominem euacuat. Quicūq; labores uocis sunt, uelut sermo, aut lectio, aut cantus, omnes hi animam mouent, Mota autē siccatur & calefcit, & humiditatem in corpore consumit. At uero deambulationes etiam ipsæ maxime præ reliquis naturales sunt. Habent autē quid uolentum. Vis ipsarum talis est. Deambulatio à cœna & aluū, & corpus, & uentrē siccatur, ipsumq; amarum fieri non sinit, ob hanc causam. Quum mouetur homo, calefcit corpus, itemq; cibi. Attrahit igitur humiditatē caro, & aluū amarā fieri non sinit. Corpus quidem igitur repletur, aluus uero attenuatur. Siccatur autem eadem, ob hanc causam. Quum corpus mouetur & calefcit, quod tenuissimum est alimēti consumitur, partim per insitum calorem, partim uero unā cū flatu foras excernitur, partim etiam per lotium eiicitur. Quod uero siccissimū est de cibis relinquatur, Quare unā cum alio etiam caro resiccatur. Matutinæ deambulationes attenuant, & partes circa caput leues, & agiles, ac promptas reddunt,

& aluum soluunt. Attenuant quidem, quia motum corpus calefcit, & humiditas attenuatur ac purgatur, partim per spiritū ac flatum, partim uero emungitur & excreatur: sed & aliqua pars in alimentū caliditatis animæ consumitur. 350 Aluum autem soluunt, quia quū calida sit, frigidus spiritu superne allabente, caliditas frigiditati cedit. Leues autem partes circa caput faciūt, ob hanc causam. Quū euacuata est aluus, ex reliquo corpore & capite humiditatem in seipsam attrahit, nimirū calida existens. Euacuato autem capite, & uisus & auditus depurgantur, & homines agiles fiunt. Deambulationes autem post exercitia, 455 corpora pura reddunt, & attenuant, non permittentes carnis colliquationem fieri præ labore, sed ipsam depurgant. Cæterū cursus longi ac curui sensim facti, calfacientes carnem, concoquere ac diffundere possunt, & uim ciborū in carne concoquunt: uerū corpora tardiora ac crassiora reddūt quàm cursus circulares. Et multa comedentibus cōmodiores sunt, & hyeme magis quàm æstate. 460 Qui uero in ueste fiunt, eandem uim habent, magis autem excalfaciūt, & corpora humidiora faciūt, & decoloratiōra: quia sincerus spiritus allabens ipsa non depurgat, sed in eodem spiritu exercentur. Conferunt itaq; & siccis, & carnosius qui carnem demoliri & abolere uolunt, itemq; senioribus, propter corporis frigiditatem. Cursus autem recti reuertētes, & equestres indefiniti, carnem minus diffundunt, attenuant autem magis, propterea quod externis animæ partibus hi labores sunt, & humiditatem ex carne reuellunt, & corpus attenuant ac siccant. 465 Circulares uero cursus carnem minime diffundunt, attenuant autem & distendunt carnem & uentrem maxime, propterea quod acutissimo spiritu utentes, humiditatem in seipsos celerrime trahunt. At uero concussiones siccant quidem derepente, non sunt autem idoneæ, neq; cōmodæ. nam conuulsiones inducunt: quia excalfactū corpus, cutem quidem fortiter attenuat, carnem uero minus coagmentat q̃ cursus circulares, carnem autem humore euacuant. Cōmotiones & alleuationes carnem quidem minime excalfaciunt, corpus autem & animā irritant, & spiritu euacuant. 475 Lucta & frictio, externis corporis partibus magis laborem exhibent. calfaciūt autē carnem, & corroborant ac augerī faciunt, ob hanc causam. Quæ ex natura solida sunt, conficta confidunt ac coagmentantur, quæ uero caua sunt, augescunt. Quod itaq; densum est in carne, id confictū coagmētatur, caua uero augescūt, itemq; uenæ. Nam carnes calfactæ ac siccatae, alimentū in seipsas per uenas trahūt, deinde augescunt. 480 Volutatio in puluere cōsimilia luctæ efficit. Magis autem siccatur propter puluerem, & minus incarnatur. Micatio per summas manus attenuat, & carnes sursum trahit. Follis, & manuum ad rythmū motus, cōsimilia faciunt. Spiritus detentio, meatus disparare, & cutem attenuare, & humiditatē sub cutem extrudere potest. Exercitia in puluere & oleo in tantum differunt, quod puluis quidem est frigidus, oleum autē calidum. In hyeme igitur oleum corpus magis auget, propterea q̃ frigus prohibet à corpore quid auferre. In æstate uero caliditatis excessum faciēs, carnē liquat: quū et à tempore, & oleo, ac labore, corpus calefiat. At uero puluis qui inter exercendum accedit, in æstate quidē magis auget, Nam frigefaciēs corpus, in excessum calferi nō permittit. In hyeme uero frigus & algore inducit. Morari in puluere post exercitia in æstate, modico tēpore, cōfert frigefaciendo. Verū longior mora su-
per

perresiccat, & corpora dura ac lignosa efficit. Frictio ex oleo & aqua mol-
lit, & nō uehemēter excalfieri finit. Porro de lassitudinibus quæ in corpo-
re fiunt, hoc modo res se habet. Homines inexercitati ab omni labore las-
santur. Nulla enim corporis pars exercitata est ad ullum aliquē laborem. Cor-
pora autē exercitata, ab insuetis laboribus deassantur. Aliqua uero etiam à cō-
suetis exercitijs lassantur, si modū exceſſerint. Species quidem igitur lassi-
tudinum eiusmodi sunt. Vis autē ipsarum sic habet. Etenim inexercitati humi-
dam carnem habentes, quum laborauerint corpore calefacto multā colliquatio-
nem remittunt. Quicquid igitur exsudauerit, aut cum corpore depurgatū fue-
rit, non exhibet magis laborē in corporis parte præter consuetudinē euacuata.
Quicquid uero ab excretionē intus remāserit, non solū huic laborē exhibet,
sed etiam ei parti quæ humiditatē suscepit. Non enim cōmoda est corpori, sed
infesta. Et in carnes quidē corporū non similiter cōgregatur. Verū in carnosas
partes, quare his laborē exhibet, donec exiuerit. Tanquā enim circuitū non ha-
bens, quiescēs calefit tum ipsa, tum quæ allabūtur. Si igitur multū fuerit quod
excretū est, etiā sanum corpus exsuperat, ut totū concalescat, & febrem fortem
inducit. Calefacto enim sanguine & attracto, celerem circuitū faciunt ea quæ
in corpore sunt, & tum reliquū corpus præ spiritu purgatur, tum quod compa-
ctum est calescēs attenuatur, & simul ex carne foras sub cutem extruditur, atq;
hoc sudor calidus uocatur. Hoc autē excreto, & sanguis in naturalē statum resti-
tuitur, & febris remittit, & lassitudo sedatur maxime tertiā die. Cæterum
eiusmodi lassitudinem sic curare oportet, ut fomētis & balneis calidis id quod
cōcompactum est dissoluamus, & deambulationib. uehemētibus depurgemus, &
modico cibo ac attenuationib. carnis euacuationē cogamus ac cōagmētemus,
& oleo sensim multo tēpore fricemus, ut ne uiolenter excalescat. Vnguētis etiā
tum exudatorijs, tum molliētibus, unguere ac mollire cōducit. At uero exer-
citis, ab insuetis laboribus propterea lassitudo cōtingit. Quū corpus nō fue-
rit laboribus exercitatū, necesse est carnē humidā esse ad eum locū, ad quem nō
est adſuetus se laboribus exercere, quemadmodū etiā ad singula exercitationū
genera. Carnē igitur necesse est colliquari, & excerni, cōsiderēq; ac cōtrahi, ue-
lut priori. Cōfert autē hoc modo curari. Exercitationibus utendū est cōsuetis,
quo id quod cōcompactum est calescēs extenuetur ac depurgetur, & reliquum cor-
pus nō humectetur, neq; inexercitatū maneat. Vtile est & hunc balneis calidis
uti, itemq; frictione similiter ut priorē. Verum fomētis nihil habet opus. Labo-
res enim calfaciētes sufficiētes sunt attenuare & depurgare id quod compactū
est. Lassitudo autē à cōsuetis exercitijs hoc modo fit. A moderato quidē la-
bore lassitudo nō mouetur. Quū uero maior q̄ oportet labor fuerit, carnē su-
perresiccat, euacuata autē humore caro, calefit, & dolet, & horret, & ad febrem
perducitur longiorē, si non quis recte curet. Oportet aut primū quidem ipsi
balneo nō ualde multo, neq; nimis calido lauari. deinde exhibito à balneo mol-
li uino, in cœnā offerre plurima & omnigena edulia, et potu aquoso, uino uero
molli ac multo uti. Postea lōgo tēpore his immoretur, donec uenæ repletæ at-
tollantur. Deinde uero uomat, & post modicam stationem, molliter dormiat.
Postea per dies sex sensim ad cibos et labores consuetos adhibeatur, atq; ita ad
cōsuetum cibum ac potū perducatur. Vim autē habet hæc curatio talem. Resic-

catum excellēter corpus, humectare potest citra excessum. Si quidē igitur possibile esset, laboris excessum nosse, quātus is esset, commodū foret ipsi per moderatū cibum mederi. Nunc uero illud impossibile est, hoc uero facile. Corpus enim resiccātū, ab ingestis omnigenis edulijis id quod cōducibile sibi ipsi est sumit, unaquæq; pars de singulis cibis, repletū autē & humectātū, aluo per uentum euacuata, rursus excessum remittit. Aluus autē uacua existēs reuellit. Excedentē itaq; humiditatē caro eructat, moderatam uero nō remittit, nisi per uim, aut labores, aut medicamēta, aut aliam quādam reuulsionē. Qui autem additio ne cibi sensim crescente utitur, is corpori diætā placide constituit.

HIPPOCRATIS COI DE DIAE

TA SIVE VICTVS RATIONE, LIBER III.

Iano Cornario Medico Physico interprete.



De diætā humana exacte quid cōscribere, ut ad ciborum copiam, laborū cōmensuratio ac symmetria fiat, nō est possibile, quemadmodū etiā antea à me relatū est. Multa enim sunt impedimenta. Primū quidem hominū naturæ, diuersæ existentes. Nam & siccae ipsæ ad seipsas, & ad alia collatæ magis ac minus siccae sunt & humidæ. Similiter etiā aliæ omnes. Deinde ætates nō ipsdē indigētes, Insuper & regionū situs, & uentorum mutationes, & temporū alterationes, & anni cōstitutiones. Est & inter ipsos cibos multa differentia, Triticū enim à tritico differt, & uinū à uino, & reliqua omnia ex quibus uictū facimus diuersa existentia, impediūt quo minus possibile sit exacte de diætā cōscribere. At enim prænotiones inuētæ sanè à me sunt eorū quæ in corpore dominātur, siue labores cibos, siue cibi labores supererēt, & quomodo singulis mederi oporteat, prædiscereq; sanas naturas, & ut nō accedāt morbi, nisi quis ualde multū delinquat ac sæpe. hæc autē medicamentis iam opus habēt. Sūt autē quæ neq; per medicamēta sanari possunt. Quantū quidē igitur inueniri possibile est quæ maxime ad rem faciūt, à me inuentū est. Verū exacte à nullo. Primū igitur multis ac uulgo hominibus cōscribam, ex quibus maxime utilitatem capere possint, qui sanè cibis uulgaribus utūtur, ac laboribus necessarijs, profectionibusq; necessarijs, ac operis marinis ad uitā degēdam repertis: quiq; calefcunt plus q̃ expedit, perfrigerāturq; præter cōmoditatem, & reliqua diætā incōstanti utuntur. His itaq; ex præsentibus scire uictū facere conducit. Annū equidē in quatuor partes diuidunt, quas pleriq; omnes nouerūt, hyemē, uer, æstatem, autūnum. Et hyemē quidē à pleiadū occasu, usq; ad æquinoctiū uernum. Ver autē ab æquinoctio usq; ad pleiadū exortum. Æstatem uero à pleiadum ortu usq; ad Arcturi exortum. Autūnum ab arcturi ortu, usq; ad pleiadum occasum. In hyeme quidem igitur tempore frigido & cōpactio se opponēdo, hoc uictu uti cōducit. Primū quidem semel tantū in die cibum capere cōuenit, nisi quis ualde siccum uentrē habeat. Id uero si fieri non possit, modicum prandere. Victu autē utendum est sicco & austero, & calfactorio, & ex toto collato, ac meraco. Pane autē magis uti expedit, & obsonijs assatis potius q̃ coctis. Et potionibus nigris meracioribus ac paucioribus

bus. Oleribus minimū, præterq̃ calefacientibus & siccis. Succis item ac sorbitionibus minime utendū est. Laboribus autē multis omnibus, cursibusq̃ curuis sensim crescēte accessione, & lucta in oleo longa, à leuibus ordiendo ac sensim addendō. Et deambulationibus ab exercitijs, acutis ac celeribus. à cœna uero, tardis in tepore. Matutinis autē multis, leni initio factō, ac sensim crescente accessione, ita ut placide rursus desinas. Utendū est & strato duriore, & nocturnis itinēribus, & funambulationibus, ac cursibus per funem uti cōfert. Omnia enim hæc attēnuant ac calfaciūt. Utendum etiā nauigatione. Vbi autē quis lauāri uelit, si quidem in palestra se exercuerit, frigida lauetur. Si uero alio quopiam exercitio usus fuerit, calida cōmodior existit. Utendū & uomitibus, si humidiores sint ter in mēse, sin sicciore, bis à cibis omnis generis. à uomitibus sensim peruēniendū est ad cōsuetum cibum per dies tres, eoque tempore laboribus leuioribus ac paucioribus utēdum. à bubulis autē & porcinis carnibus, aut alijs, quicquid tandem modum excefferit, repletus uomat; & à caseosis & dulcibus ac pinguibus, eum qui non est adfuetus repleri, uomere cōducit; & ab ebrietate, ac ciborū mutatione, & regionū alteratione uomendū est. Oportet autem frigori seipsum purum exhibere, præterq̃ à cibis ac exercitijs. Sed & in matutinis deambulationibus ubi corpus calefieri coeperit, itemq̃ in cursibus etiam in alio tēpore, excessum uitare oportet. Melius est enim corpori hyemem ferre, q̃ exerceri hoc tēpore. Nam neq̃ arbores quæ hyemem non pertulerunt hoc tēpore, fructū ferre possunt, neq̃ ipsæ sanæ esse. Utēdum est & laboribus hoc tēpore multis usq̃ ad excessum, nisi lassitudines succedāt. Signū autem docebo idiotas, ostendāq̃ quapropter hæc ita se habent. Tempore existente frigido ac compacto, cōsimilia patiuntur etiam animalia ipsa. Necessē igitur est corpora tarde calefieri à labore, & modicam quandam humiditatis præsentis partem excernere. Deinde modicū tempus cōcessum est quo laborēt, multum autem quo quiescāt. Dies enim breuis est, nox uero lōga, propterea igitur neq̃ tempus, neq̃ labor excessum habet. Ob hanc itaq̃ causam hoc tempore sic diætā instituere oportet, à pleiadum occasu usq̃ ad solstitium hybernū diebus quādrāginta quatuor. Circa solstitium autē maxime in custodia ac tutela esse, & à solstitio alios totidem dies eadem diætā uti. Postquā autem tēpus adduxerit fauoniū, & mollius factū fuerit, oportet etiam cum tempore diætā sequi, diebus quindecim, quum arcturus oritur & hirundo uolat. Sequēs uero tēpus magis uarie transigere oportet usq̃ ad æquinoctium diebus triginta duobus. Oportet igitur etiam diætā uti hoc tēpore uariēgiore, mollioreq̃ ac leuiore, & cibo, & potu, & labore, atq̃ ita sensim ad uer perducere. Quum autē æquinoctiū iam factum fuerit mollius, & dies longiores, ac noctes breuiore, & tempus calidū ac siccum cōstituerit, etiā præsens uictus probe nutriendus ac merendus sit. Quemadmodū igitur arbores rationē non habentes, hoc tempore præparant sibi ad æstatis cōmoditatem, tum incremētum, tum umbram: Sic oportet hominē, quū sanē mente ac ratione præditus sit, carnis incremētū salubre sibi præparare. Oportet igitur ut ne derepētē diætā trāsmutetur, tempus in sex partes diuidere, per octo dies. In primā itaq̃ partē, & labores detrahēre oportet, & reliquis quoq̃ uelocioribus uti. Cibis autē mollioribus, & potibus aquosioribus, ac alboribus, & lucta cū oleo in sole utendū est. In singulis autē temporibus sin-

gulas diætās paulatim trāsmutare oportet, & deambulatīōes detrahēre à cœna plures, matutinas pauciores: & mazā pro panē offerre, & olera cocta exhibere, & obsonia cocta assatis adæquare, & balneis uti, & parū prandere, & re uenerea pauca uti, & uomitib. primū quidem quarto quoq; die, deinde per longius tempus, quo & corpus pura carne incarnatū cōstituas, & diætā in hoc tempore mollem, usq; ad pleiadum exortum. Et in hoc iam æstas adest, & ad hanc nunc diætā instituere oportet. Quum itaq; pleias exorta fuerit, cibis mollioribus ac paucioribus uti oportet. Deinde maza magis q̃ panē, atq; ea prius subacta, & uino dulci nō emollita, potibus autē mollibus albis aquosis, prādio modico, & somnis à prādio breuihus, & repletionib. ex cibis ac potibus q̃ minimis. Potu inter edendū utendū est sufficiēte, per diem uero minime bibendum, nisi necessaria aliqua siccitate corpus utatur. Utendum est & oleribus coctis, exceptis estuosis ac siccis. Utendū etiā crudis, exceptis calfaciētibus ac siccis. Vomitib. nisi si qua repletio cōtingat, utendū nō est. Re aut uenerea minime. Balneis aut tepidis uti licet. At uero poma fortiora sunt q̃ pro humana natura. Melius est igitur à pomis abstinere. Si uero quis cū cibis utatur, minime deliquerit. Laboribus quoq; ac cursibus circularibus exerceri oportet, & cursibus rectis reuertētib. modicis multo tēpore, & deambulationib. in umbra, lucē aut in puluere, quo q̃ minime excalescat. Verū uoluntationes in puluere meliores sunt q̃ cursus circulares. Frigefaciūt enim corpus humore euacuātes. à cœna deambulandū non est, sed saltem surgendum. Mane uero deambulationibus utendū. Soles uitādi sunt, itēq; frigora, tum mane, tum uespere, quæ flumina, aut stagna, aut niues exhalant. Hanc aut diætā tolerare oportet usq; ad solstitiū æstiuū, quo in hoc tēpore adimas omnia quæ sicca sunt et calida et nigra ac meraca, itēq; panes, præterq̃ si parū qd uoluptatis gratiā cōcedere uelis. Dequēti uero tēpore utetur mollibus & humidis & perfrigerātib. ac albis, usq; ad arcturi exortū ac æquinoctiū per dies nonaginta tres. Cæterū ab æquinoctio sic diætā instituere oportet, per autumnū ad hyemē adducēdo, ita ut mutationes frigorū ac teporis uites uestitu crasso. Utendū aut hoc tēpore motu in ueste, frictionēq; ac lucta in oleo, ita ut sensim accessio crescat. Deambulatīōes quoq; in tepore faciēdæ sunt, & calidis lauacris utendū, & somni diurni detrahēdi. Cibis aut utendū est calidioribus, ac minus humidis, & puris, & potibus nigrioribus, uerū mollibus & nō aquosis. Oleribus uero minus. Reliquā item diætā omniē sic cōsonā adhibere oportet, ut ab æstiuis detahas, hybernis aut utaris nō ad summū, quo hybernū uictū q̃ proxime constituas, in diebus duodequingaginta, usq; ad pleiadū occasum, ab æquinoctio. Hæc porro multitudinis commonēdæ gratia ac uulgi hominū causā prodo, qui ex necessitate uitā temere transigunt, neq; licet ipsis aliorū negligentes esse, ac suā ipsorū sanitatē curare. Quibus uero iam hoc certū ac percognitū est, quod neq; diuitiarū, neq; corporis, neq; ullius alterius rei ulla utilitas est, citra sanitatē, ad hos inuēta est à me diætā, quantū possibile est, ad ueritatē ac certitudinē possibilium rerum adducta. Hanc itaq; in sermonis progressu declarabo. Inuēntū autē hoc honestum quidē mihi repertori, utile uero discētib. nullus adhuc priorū ne attētauit quidē componere, quod ad omnia alia magni æstimandū duco. Est autē præcognitio antequā ægrotent cognitio, quid corpora perpetiantur, utrū

cibus

cibus superat labores, aut labores cibos, aut moderate inter se habeant. Vtrum enim tandem superetur, morbi fiunt, ab æqualitate autē inter ipsa mutua, sanitas adest. Ad hæc sanè cōmemoranda accingor, & demonstrabo qualia fiunt hominibus qui sani sibi esse uidentur, & iucūde comedunt, laborareq; possunt, & corporis ac caloris satis habēt. Nares citra causam apertam à cœna implētur, & repletæ esse uidentur, emungunt autē nihil. Vbi autē deambulare mane incipiunt ac exerceri, tunc emungunt ac spuunt. & progressu tēporis etiam palpebras graues habent, & pruritus frontē occupat, & à cibis abstinēt, & bibere minus possunt, & color fit decolor, & aut destillationes mouentur aut febres horridæ, iuxta quodcūq; tempus repletio fuerit mota. Quicquid autē eo tempore fecerit, in id ipsum culpā ac causam reijcit, quū id ipsum causa non sit. Huic enim cibi superant labores, & repletio paulatim collecta in morbum ipsum adduxit. Sed nō huc usq; differre oportet, uerū ubi prima signa cognouerit, scire quod cibi labores superāt, & paulatim collecta repletio existit. Mucus enim & saliuæ repletionis indices sunt ac signa, & quiescēte quidem corpore, meatus spiritus obturant, multa repletionē existente. ubi uero calefactū est præ labore, attenuata excernūtur. Talem autē sic curare oportet. Exercitārū in cōsuetis exercitijs citra lassitudinem, calidatq; lotum, cibis omnigenis expleto, ac uomere facito, à uomitu uero os & fauces colluat uino austero, quo oscula uenarū cōstringantur, & nihil attrahant, uelut à uomitu fieri solet. deinde surgens modice deambulet in tepore. Postridie uero deambulationib. quidē utendū est. exercitijs aut pauciorib. & leuioribus q̃ prius. & si æstas fuerit impransus degat, sin minus, parū comedat, & de cœna quam sumere solebat, dimidiū detrahat. Tertia autem die labores quidem obeat omnes consuetos ac deambulationes, uerū cibos sensim ingerat, quo quinta die à uomitu cōsuetum cibū assumat. Et si quidem ab hoc satis bene habuerit, de cætero cibis quidē paucioribus, laboribus aut pluribus curetur. Si uero signa repletionis nō quieuerint, interpositis duobus diebus ab ea qua cōsuetos cibos assumpsit, rursus uomat, & eodē modo sensim ad cōsuetos cibos redeat. Quod si nō successerit, etiam tertiū eadem repetē, donec à repletionē liberetur. Sunt autē homines qui ubi labores superantur à cibis, talia patiūtur. Incipiente quidē repletionē somni longi & dulces, ipsis cōtingunt, & interdiu etiā dormiunt. Somnus autē contingit carni, & sanguis funditur, & spiritus diffusus tranquillus est. Quum uero nō suscipiat amplius corpus repletionē, secretionē iam remittit intro, præ circuitus uiolentia, quæ sanè secretio cōtraria alimēto à cibis, animā perturbat. Quo tempore non amplius iucundi ipsis sunt somni, sed necesse est hominē perturbari, & uidetur sibi cum aliquo pugnā cōmittere. Qualiacūq; enim patitur corpus, talia uidet anima, uisu iam concluso. Quū igitur ad hoc peruenerit homo, prope iā est ut ægrotet. Quod aut ueniet morbus, ualde manifestū est, Qualis em secretionē uenerit, & quancūq; partē superauerit, eam ipsam morbo affligit. Verū nō oportet ita desipiētem esse & hucusq; differre, sed statim ubi prima signa cognouit, curā cōtingere, & hūc uelut priorē curare. longiori autē tempore, ac fame opus habet. Sunt præterea etiā talia repletionis signa. Dolet corpus aliquibus totū, aliquib. pars quædā, quacūq; tandē. Dolor autē est uelut lassitudo, & delassati esse sibi uidentur, segnicieq; ac repletionē curantur donec ad febrē perueniant.

& adhuc nondū hoc cognoscūt, sed balneis ac cibis utētes, ad pulmonis inflā-
 mationē, peripneumoniā græcis dictā, morbū deducunt, & ad extremū peri-
 culū deueniunt. Verū oportet prouidere antequā ad morbos perueniāt, & hoc
 modo curare, ut maxime mollibus fomētis hominē foueamus, aut si id fieri ne-
 queat, multa calida lauemus, ac corpus dissoluamus, & à multis ingestis cibis,
 primū quidem acribus ac plurimis, deinde falsis, probe uomere faciamus. quo
 facto exurgat ac modico tempore deambulet in tepore, deinde dormiat. Mane
 uero deambulationib. sensim crescētib. utendū est, & exercitijs leuibus, & cibo
 rū exhibitōib. sensim crescētibus, uelut prius. Attenuatione aut plurima opus
 habet, itēq. deambulationib. Si uero prouidētia nō adhibita ad febrē peruene-
 rit, nihil aliud offerre oportet præter aquā per dies tres. Si quidē igitur ex hac
 sedetur, bene est: si minus, pitisanæ succo curandus est, & aut quarta aut septi-
 ma die decedet febris, si exsudabit. Bonū autē est & unguētis exsudatorijs uti,
 sub iudicatiōes: exsudare enim cogūt. Quidā uero etiā talia à repletōe perpe-
 tiūtur. Caput ipsis dolet ac grauiatur, & palpebræ ipsis à coena concidunt, &
 in somnis turbantur, et calor inesse ipsis uidetur, & aluus aliquando sistitur. Et
 talis ubi uenere utitur, leuior statim esse sibi uidetur, postea uero magis grauā-
 tur. His caput repletionē reuellens, et aluū sistit, & ipsum grauiatur. Periculū au-
 tem subest, ut quod erūpat ipsa repletio id ipsum corrūpat. Verū prouidere hoc
 modo oportet. Si curā celerē facere uelit, ueratro purgādusest. deinde exhibēdi
 cibi leues ac molles ad dies decē, atq. hi aluū mouētes, quo uēter inferior supe-
 ret, et de capite reuellere ualeat. Utendū et cursib. tardis ac matutinis, et deam-
 bulationib. multis. Item lucta in oleo, & prādio, & somno à prādio nō longo: à
 coena uero exurgere satis est, et partim balneis, partim unctiōe utendū, balneis
 uero tepidis, à uenere aut abstinendū. Hæc quidē uelocior cura est. Si uero me-
 dicamētū bibere nolit, multa calida lotus, à cibis dulcib. ac falsis uomat. à uomitu
 uero satis est ut exurgat: mane autē deambulationib. adhībēdus est, et exerci-
 tijs præscriptis ad dies sex. die septima repletionē corporis facta à similibus ci-
 bis uomitū faciat, et eodē modo cibi rursus sensim adijciēdo exhibeantur. atq.
 his hoc modo ad quatuor hebdomadas utatur. In tāto enim tēpore maxime se-
 datur. Deinde cibi exhibēdi quo corpus reficiatur, et diætā paulatim ad cōsue-
 tum morē redigenda est. Fiunt etiā talia à repletionē. Quibusdam uenter qui-
 dem cōcoquit cibū, carnes aut non suscipiunt. Alimentū autem intus manens
 flatum inducit. Vbi uero pransi fuerint sedatur. Nam à fortiore id quod leuius
 est expellitur, et uidentur sibi liberati esse. Verū malū multo maius posttridie ac-
 cedit. Quū autē quotidie augescens fortius inualuerit, id quod prius inest su-
 peringesta superat, & calfacit ac perturbat corpus, et profluuiū uētris facit. Sic
 enim nominatur q̄ diu ipsum solū alimentū putrefactū secedit. Vbi autē corpo-
 re calefacto purgatio acris fiat, tūc et intestinū raditur ac exulceratur, & sangui-
 nolenta egerūtur. hoc aut dysenteria, à mala intestinorū affectiōe appellatur,
 morbus grauis et periculosus. Sed prouidere oportet, et prandiū detrahēre, &
 coenā tertiā partē. Cursibus aut pluribus, et luctis ac deambulationibus uti, tū ab
 exercitijs, tū mane. Quū uero dies decē præterierint, dimidiū cibi detracti ap-
 ponere, ac uomitu uti, atq. sic ad dies quatuor cibū exhibere: ubi aut alij decē di-
 es præterierint, etiā reliquū cibū apponere, ac uomitū facere: atq. sic ad cōsuetū
 cibum

cibum reducens, & talem laboribus cōfidenter premens ac urgens, in hoc tempore sanum facies. Fit etiā talis repletio. Postridie cibum eructant crudum, citra ructum acidum. Alius autē egerit, pauciora quidem q̄ pro ratione ciborū, attamen multū. Dolor uero nullus intus est. His uenterculus frigidus existens, cibos in nocte cōcoquere nō potest. Quum igitur motus fuerit, cibū crudum eructat. Oportet itaq; huic pręparare uentriculi caliditatē, tum ex uictu, tū ex laboribus. Primū quidem igitur utendū est pane ex tota farina colalata, fermēto, diffractō in uinū nigrū, aut in iusculū suillæ carnis. piscibus uero coctis in muria acri. Utendū etiā carnosus, uelut extremitatibus percoctis, & suillis carnis coctis pluribus, & porcinis nō multis, & catulorū, ac hædorum. Ex oleribus uero porro & allio cocto ac crudo, blitōq; cocto & cucurbita. Potionibus uero meracioribus, somnisq; longis citra prandīū prima die, itemq; somnis ab exercitijs, cursibus aut curuis sensim accessione augefcēte, luctaq; molli in oleo, balneisq; modicis. Est & ficus cum cibus bona, & meracum uinum ab ipsa. Ex hac autē curatione alijs citius, alijs tardius repletio sedatur.

Alij porrō quidam talia patiūtur. Faciem decolorē habent, & ubi comedērint, paulo post eructant acida, & acor in nares proserpit. His corpora pura non sunt, & plus est quod de carne colliquatur prę labore, q̄ quod depurgatur prę circuitu. Et hoc sanē intus manēs alimēto contrariū est, ipsumq; uiolat ac acidum facit. Alimētū quidem igitur eructatur, illud ipsum uero sub cutem expellitur, & hominē decolorē facit, et morbos similes aquæ inter cutem parit. Verum providere oportet hoc modo. Velocior quidem curatio est potō uerastro, exhibere cibos quemadmodū à me scriptū est. Verum tutior à diætā, hoc modo. Primum quidē calida lotus uomitū faciat, deinde septē à uomitu diebus cibum cōsuetum capiat, decima autē à uomitu die rursus uomat, & similiter cibū assumat, & tertiu similiter faciat. Et cursibus quidē circularibus paucis ac uelocibus utatur, & motibus, ac frictione, & mora lōga in gymnasio ac exercitio. Utatur & uolutatione in puluere, & deambulationibus multis ab exercitijs, sed & à cœna. Plurimis autē matutinis in puluere utatur. Quū autem lauari uult, calida lauetur, & eo tempore impransus degat. Et si quidem uno mense restituitur, de cætero cōuenientibus curetur. Si uero quid reliquū fuerit, medela utatur. Sunt autem quidam quibus postridie ructus acidi fiunt. His in nocte secretio prę repletionē fit. Quū igitur motū fuerit corpus ex somno denfiore spiritu usum, calidum ac acidum unā cum spiritu foras expellit, & ex hoc morbi fiunt, nisi quis providentia utatur. Conducit autem etiā his facere uelut priori. Verum laboribus pluribus hos uti oportet. Quibusdam etiā talia fiunt. In corporibus densa carne pręditis, quum cibi concalescunt ac diffunduntur, & à primo somno, & prę cibus carne calefcente, secretio per somnū fit à carne multæ humiditatis. Deinde caro densa existens alimētū non suscipit, Id uero quod à carne secretum est alimento cōtrarium ac foras protrusum, hominem suffocat ac calfacit, donec euomuerit. Postquā autem leuior factus est, dolor nullus in corpore manifestus inest, sed decoloratur. Progressu uero temporis, & dolores, & morbi fiunt. His cōsimilia patiuntur etiā qui in exercitati derepente laborauerūt, & colliquationē carnis uiolentā ac multā fecerūt. Hos autē sic curare oportet. De cibo detrahēda est tertia pars. Utendū autē cibus acribus

acribus, & siccis, & austeris, ac odoratis, & urinā cientibus. Cursibus uero plurimis curuis in uestitu, rectis aut reuertentibus & circularibus, exutis uestibus: frictione & lucta modica. Micatio per summas manus cōmodior est q̃p̃ follis.

260 Vtendū & deambulationibus ab exercitijs multis, itemq̃ matutinis. A cœna uero etiam uocis exercitatio ualde cōmoda est. humiditatis enim euacuationē faciēs rarefacit carnē. Cōducit & impransum degere. His autē cibus utendū est per dies decē, deinde dimidiū ablati apponēdum est ad dies sex, & uomitus faciendus. ab unoquoq̃ uero uomitu, ad dies quatuor sensim adijciēdo exhibendus est cibus. Quū autē dies decem à uomitu trāsierint, omnem detractū cibum assumat, laboribusq̃ ac deambulationibus deditus sit, & sanus euadet. Talis autem natura copiosiore labore quā cibo opus habet. Quidam etiā talia perpetiuntur. Secedit ipsis cibus per aluū liquidus inconcoctus, uelut ex intestinorum leuitate, & dolorem nullum exhibet. patiūtur autem hoc uentres maxime qui humidi ac frigidi sunt: & propter frigiditatē quidem non cōcoquunt. propter humiditatem uero secessus fit. Corpus igitur contabescit, alimentū conueniens ac debitū non accipiēs, Ventresq̃ corrumpuntur, & in morbos incidunt. uerum providere oportet. Confert huic de cibus tertiā partem auferre. Sint autem cibi, panes non fermentati ex tota farina collata, clibano cocti, aut subcinericij calidi, in uinū austerū tincti, & pisciū partes ex dorso ac cauda. Verū capiales & sub uentre sinendæ sunt uelut humidiores, & coctos quidem pisces in muria edere oportet, assatos autē in aceto. Vtendū etiā carnibus sale & aceto in ueteratis, & caninis assatis, et de palūbe ac reliquis eiusmodi uolucris, assatis ac coctis. Oleribus uero minime. Vīno utendū est nigro, & deambulationibus à cœna ac matutinis, à deambulatione autē dormiat. Cursibus uero curuis sensim accessione auge scētē utatur. Sit & frictio multa, & lucta tarda, & in oleo, & in puluere, quo caro cōcalescens resiccetur, & humiditatē ex uētre reuellat. Vn

270 gui autē magis cōducit q̃p̃ lauari, impransus uero degat. Quū autē dies septem trāsierint, dimidiū cibi apponatur, & ad quatuor dies exhibeatur, & uomat. Post alios uero septem dies, omnē cibū assumat, & uomitu rursus facto, cibus eodem modo exhibeatur. Quibusdā uero alijs talia fiunt. Seccessus nō putrefactus per aluū abit, et corpus cōtabescit cibus nō fruens, hi uero progressu temporis in morbos incidunt. His uētres frigidi ac sicci sunt. Quū itaq̃ neq̃ conuenientibus cibus, neq̃ exercitijs utūtur, talia perpetiūtur. Cōducit autē sic affecto,

280 panibus puris furnaceis uti, et piscibus coctis cū intritis, & carnibus coctis suillis, & extremitatibus percoctis, & plurimis assatis, et ex acrib. ac salis his quæ humectāt, et saluginosis. Vinis autē nigris mollibus, et inter cibos uuis ac ficus impleri cōfert. Oportet et modicū prādere, & exercitatiōib. plurib. uti, cursibusq̃ curuis sensim crescētibus, postremū aut cursib. circularibus, et post cursum lucta cū oleo; deambulationib. uero nō multis ab exercitijs, à cœna uero satis est exurgere. Matutinis aut pluribus deambulationib. utatur. Lauetur calida, & utatur laborib. ac unctiōib. somnoq̃ lōgiori indulgeat, et molliter cubet. Oportet et uenere aliquo modo uti. Verū de cibus quarta pars detrahenda est, et post dies decē rursus ad cōsuetos cibos reducēdus est. Sūt etiā quibus seccessus liquidus ac putrefactus per aluū abit, et qui aliās sani sunt ac exercētur, nullū dolorem exhibet. Quibusdā uero excluduntur ea quæ cōueniebāt, p̃gressuq̃ tēporis

uenter

uenter per caliditatem carnes attrahit, & dolorem exhibet, & cibi excluduntur, & uenter exulceratur, & ipsum sistere iam operosum ac difficile est. Verū prius providere oportet, ac nosse uentrem calidum ac humidum magis quam debet esse, laborumque incommodorum excessum factum esse. Per dietam igitur frigefacere ac siccare oportet, & primum quidem exercitia ex dimidia parte detrahare, & de cibus tertiam partem. Vtatur autē Maza antea subacta, ac uino dulci emollita, & piscibus siccissimis coctis, & neque pinguib. neque salis. Vtatur & carnibus assatis uolucrum, coctis quidem, palumbis ac columbae, assatis autē perdicum & gallorum, citra condimenta. Leporinis uero coctis in aqua, itemque ferinis omnibus. Ex oleribus autē quae frigefactoria sunt, uelut beta cocta acida. Vino uero nigro austero. Gymnasia autē, cursibus circularibus uelocibus, uerū frictio non multa adhibeatur, sed modica, neque lucta. Micatio per summas manus, & manuum ad rhythmum motus, & follis, & Volutatio in puluere, comoda sunt, sed non multa. Deambulationibus ab exercitijs utatur sufficiens iuxta laborem, & à cena pluribus, iuxta cibum, & mane moderate, iuxta habitum. Lauet autē tepida, ac quiescat. Sic ubi in hac dieta transegit dies decem, apponatur cibi dimidium, & laborum tertia pars, & uomitum faciat à cibus siccis & acerbis, & in cibo ne moretur, sed quam celerrime uomat à uomitu ad dies quatuor & cibus, & labor partitus exhibeatur. Vbi autē dies decem praeterierint, reliquum cibi apponatur, & uinum potabile, uerum labores pauciores, & ubi uomitum fecit, cibus uelut scriptum est exhibeatur. Hoc uero tempore semel tantum in die cibum capere conducit, donec malum sedetur. Alijs porro quibusdam siccus & perustus secessus fit, & os siccum, & progressu temporis etiam amarum fit, & aluus sistitur, iteque urina. Quum enim non habeat intestinum humiditatem circa excrementum, intumescentes transitus obturat, & dolorem exhibet, & calor occupat, & quicquid biberit aut ederit homo, id ipsum reuomit. Postremum uero etiam sterces uomit. atque hic non superuiuet, quum ad hoc peruenerit. Verum providere oportet ac nosse, quod caliditas & siccitas in homine praedominatur. Victum igitur ipsi constituere oportet ex maza prius subacta respersa, & pane ex tritico trimestri, succo fursurum fermentato. Oleribusque utendum, exceptis acerbis & siccis, atque illis coctis, & piscibus leuissimis coctis, & partibus capitalibus tum piscium, tum locustarum, & mitilis, & herinaceis, & cancris, & conchyliorum succis, ipsisque leuissimis. Carnibus autē suillis, & extremitatibus anterioribus coctis, & haedorum et agnorum ac catulorum coctis. Piscium uero fluuiatilium ac in stagnis degentium coctis. Vino molli aquoso. Laboribus autē utendum est non multis, neque uelocibus, sed omnibus quietis. Deambulationibus uero mane utatur, iuxta habitum sufficiens, et ab exercitijs laboribus, moderatis, à cena uero ne deambulet. Balneis utatur et somnis mollibus, et praedio, et somno à prandio non longo. Pomis etiam humectantibus. una cum cibus utatur, et cicere uiridi, ac sicco in aqua macerato. De laboribus uero prioribus dimidium detrahat etiam hic à principio, & uomitum faciat à dulcibus & pinguib. ac salis, hisque plurimis. moretur aut plurimum tempus in cibus usque ad uomitum. Deinde cibum exhibeat ad triduum, & non maneat impraesus. Quum uero dies decem praeterierint, labores sensim adiaciendo augeat, & si quidem repletio inierit à cibo, aut uentris uitio, uomat: si minus, sic reliquo tempore curetur. Fiunt insuper etiam talia. Horrores à deambu-

deambulationibus matutinis accedunt, & caput grauat. Huic plures sunt deambulationes quæ modus requirit. Corpus enim & caput humore euacuatum horret ac grauiatur. Progressu uero temporis ad febrem perueniunt horrores. Sed non hucusque differre oportet, uerum prius curare hoc modo. Quæprimum aliqua signa apparuerint, unctus ac frictus modice prandium amplius solito faciat, & uinum multum bibat molle, deinde somno utatur à prandio sufficienter. ad uesperam uero ubi exercitijs leuibus usus est, calidamque lotus, consueto more coenet. deambulationibus autem à cena ne utatur, uerum ad tempus differat. Post tridie in aqua lauetur, & somnis mollibus tempus transigat. Et per dies quinque paulatim ad consuetos cibos ac labores procedat. Sunt autem quidam qui horrent ex gymnasijs, & quam se exuunt donec decertent, ubi uero perfrigerati sunt, rursus horrent, & stridor dentium tremulus corpus occupat, somnoque talis grauiatur. Vbi autem expergiscitur, sæpe oscitat, et à cena palpebræ ipsi graues sunt. progressu uero temporis etiam febres malignæ accedunt. Verum cauere oportet, & non hucusque differre, sed prius curare hoc modo. Primum quidem ab omnibus exercitijs dimidium auferatur. Cibis uero omnibus humidioribus ac frigidioribus. utatur, et potibus mollioribus ac dilutioribus. Vbi uero præterierint dies quinque, tertia pars laborum ablatorum apponatur, Cibis uero isdem utatur. Post alios autem quinque dies, dimidium reliquorum laborum apponatur. Et rursus post alios quinque, omnes labores & leuiiores & pauciores reddito, ut ne rursus excessus fiat. Nam his qui hæc signa perpetiuntur, labores maiores sunt quam cibi. Adæquare igitur hæc oportet. Quidam uero non hæc patiuntur, sed aliqua ex his, aliqua uero non. In omnibus autem his signis, labores superant cibos, & curatio eadem est. Et confert his calida lauare, ac molliter cubare, & semel atque iterum inebriari, uerum non usque ad excessum, & uenere uti, ubi excessus contigerit, & segnem esse ad labores. Deambulationes autem in totum non sunt faciendæ.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE INSOMNIIS, IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.



VIS QVIS de his quæ in somnis obueniunt recte coniectat, is magnam habere uim ad omnia, ipsa reperiet. Anima enim uigilat, & quum quidam corpori inseruit, in multas partes distributa, non sui iuris est, sed partem aliquam singulis corporis partibus. siue sensibus distribuit, auditui, uisui, tactui, gressui, actioni, ac omni corporis facultati. Ipsa autem animæ cogitatio sui iuris non est. Quum autem corpus quiescit, anima in motu est, & corporis partes perreptas, domum suam gubernat, & omnes corporis actiones ipsa perficit. Nam corpus dormiens non sentit, ipsa uero uigilans cognoscit, ac uisibilia uidet, & audibilia audit, uadit, tagit, tristatur, animaduertit. In summa, quæcumque corporis aut animæ munia, ea omnia anima ipsa in somno obit. Quicumque igitur hæc recte iudicare nouit, magnam sapientiæ partem nouit. Quæcumque quidem igitur somnia diuina sunt, & quædam euentura significant, aut urbibus, aut populo priuato, siue bona, siue mala, non ob ipsorum delictum, de

de huiusmodi sunt qui iudicāt certā artem habētes. Quæcūq; aut corporis affectiones sunt, & anima per ipsas repletionis aut euacuationis rerū à natura insitarum excessum, aut consuetorū mutationē præmonstrat, de his quidē itidem iudicāt, & partim assequūtur, partim aberrāt, & de neutris recte sentiūt, cur nam fiant; neq; sciūt quando assequūtur, neq; quādo aberrant, cauere admonentēs ne quid mali accidat. Atq; hi nō docent quomodo cauere oporteat, uerum dījs supplicare iubent. Et supplicare quidē decorum ac ualde bonū est. Oportet autē etiam ipsū opitulari, & deos inuocare. De his igitur res hoc modo se habet. Quæcūq; Insomnia mēs hominis in noctē per somnū offert de diurnis actionibus, & reddit quo modo facta sunt, ea quæ seria ac iusta in re per diē facta sunt, aut de quibus consiliū inītū est: hæc homini bona sunt, sanitatē enim significāt propterea quod anima in diurnis cōsilijs perseuerat, neq; repletionē, neq; euacuationē, neq; aliqua alia forinsecus allap̄sa re, uicta. Quū aut Insomnia diurnis actionib; aduersantur, & de ipsis pugna oboritur, quū sanē hoc contigerit, turbationē in corpore significat. Et si quidē fortis fuerit, forte est malū: si uero leuis, debilius. De actione quidē igitur, an auertēda sit, siue nō, nihil decerno. Verū corpus hominis curari cōsulo. Repletionē enim aliqua intus facta, secretio quædā cōtigit quæ animā perturbauit. Si igitur fortis fuerit contrarietas, uomitū facere cōducit, & cibos leues exhibere sensim adiiciēdo aliquid ad dies quinq; et deambulationib; multis ac uelocibus sensim augescētib; uti, & exercitijs exerceri moderatis, pro ciborū assumptorū ratione. Si uero debilior fuerit cōtrarietas, detractō uomitū, tertiā cibi partē adime, atq; hanc sensim, rursus ad dies quinq; adijce, & deambulationib; preme. Sed & uocis exercitijs utatur, & dījs supplicet, & turbatio ipsi sedabitur. At uero solē & lunā, & coelū ac stellas, pura atq; agilia solito more uidere, singula bona sunt. Sanitatē enim corpori significāt ab omnib; præsentib; Verū talem habitū præsentī diætā conseruare oportet. Si uero quid contrariū his fiat, morbū quendā corpori significat: à forti bus quidē, fortiorē: à debilibus uero, leuiorē. Et astrorū quidē exterior est in corpore circuitus, solis uero mediū, lunæ autē ad cauitates, Quodcūq; igitur horū astrorū extingui, aut lædi, aut disparere, aut sisti à circuitu suo uidetur, iuxta illam ipsam partē morbū redundare significat: & si quidē ab aere, aut nebula, aliquid ex ipsis astris pati quid horū uidet, debiliorē: si uero ab aqua, aut grā dine, fortiorē. Significat autē secretionē in corpore humidam ac pituitosam factam esse, & in externā circūferentiam illapsam esse. Cōducit itaq; huic & cursibus in omni uestitu uti multis, sensim augescētibus, ut q̄ maxime exudet. Item deambulationib; ab exercitio multis citra prandiū uti, & detracta ciborū tertiā parte, ad dies quinq; sensim adiiciēdo rursus exhibere. Si uero fortius uideatur malum esse, etiā fomētis uti. nam per corporis cuticulā purgationē facere expedit, propterea quod in externa circūferentia offensa ac læsio existit. Cibis uero utendū est siccis, acribus, austeris, meracis, & laborib; maxime siccātibus. Si uero quid horū luna patiat, reuulsionē intro facere cōducit, utiq; uomitū ab acribus, & salfuginosis, ac mollibus cibis, cursibus autē circularibus celeribus, & deambulationibus uelocibus. Utendū & uocis exercitijs, & prandiū auferē dum, cibiq; detractōne, ac rursus appositōe, eodē modo utendū est. Ob id aut intro reuellendū est, quia ad cauitates corporis offensa apparet. Si autē sol tale

quid pati uideatur, fortius iam malū est, & difficilius exigi potest. Oportet autē in utrāq; partē reuulsiones facere, & rectis cursibus, & curuis, & circularib. uti, & deambulationibus, & alijs laboribus omnibus. Ciborū autē detractiōe, ac rursus appositionē, eodē modo, deinde uomere, & rursus sensim cibos augere, ad dies quinq;. Si uero serenitate existētē premātur hęc, & debilia esse uideantur, & prę siccitate à circuitu suo impediri, periculum significant delabendi in morbū. Verū oportet labores detrahere, et diēta humectiore ac molli uti, & balneis ac ocio ampliori, & somno lōgo ac multo, donec malū sedetur. Si autem ignē ac calidum esse uideatur quod se illis opponat, bilis secretionē significat. Si uero superata hęc dispareant ac euanescaūt, periculū est ad mortē perueniendi ex morbo. Si uero uersa ac mutata hęc esse uideantur, pręsentē statum in fugam uerti significant. Fugere autē ipsa celeriter, esseq; qui ea persequantur, periculum denūciant futurę insanię hominis, si nō curatus fuerit. Omnibus autē his cōducit, ut ueratro purgati, optimā uictus rationē instituant. sin minus, ut uictu ad aquā tendente utātur. uinum uero nō bibant, aut omnino albū, tenue, molle & aquosum. Abstineant autē ab acribus, resiccatibus, calfaciētib. ac saluiginosis. Laboribus secundū naturā plurimis utātur, & cursibus in uestitu plurimis. Frictio uero ne fiat, neq; lucta, neq; uolutatio in puluere. Somnis utatur mollibus, & in ocio degat, exceptis laboribus naturalibus, à cœna deambulet. Bonū est et fomētis uti, à fomētis uero uomere, per triginta uero dies nō repleatur. Quū autē repletus fuerit, bis in mēse uomat à dulcibus & aquosis ac leuib. Quęcūq; autē ex his aliās aliō prę nulla necessitate errant, animę turbationem quandā prę cura significāt. Confert autē huic ociū, & animū conuerti ad spectacula, maxime risum inouentia: quod si fieri nō possit, ad id ex quo ad bīduū aut trīduū maxime uoluptatē capiat, & sedabitur. sin minus, periculū est delabēdi in morbū. Quęcūq; astra ex circūferētia excidere uidētur, suntq; pura & splēdida, & ultra ac prorsum ferri uidētur, sanitatē significant. Quicquid em̄ in corpore parū ex circuitu excernitur secundū naturā, à uespera in aurorā: id ipsum recte habet. Nā & quę in uētre secernūtur, & quę in carnē eructantur, omnia ex circuitu ac circūferētia excidūt. Quęcunq; uero nigra & obscura sunt, & ad uesperā ac occasum ferri uidētur, aut in mare, aut in terrā, aut sursum, ea magis morbos significant. Et quę quidē sursum ferūtur, fluxū capitis significant. Quę uero in mare, uētris morbos. Quę in terrā, tubercula maxime significant ex carne enascētia. His cōducit tertiā cibi partē detrahere, & à uomitu, ad dies quinq; eandē rursus sensim adiiciēdo exhibere, in alijs autē quinq; diebus cibos omnes assumere, & uomitu facto, rursus eodē modo cibus sensim auctus exhibetur. Quęcūq; uero ex his pura & candida in cœlo hærere uidebuntur, sanū esse significāt, quia quod in hominē descēdit ex æthere est. Tale autē uidet anima, quale sanē descēderit. Quę autē nigra fuerint, & non pura, neq; conspiciua, morbū significāt, nō propter repletionē, neq; euacuationē, sed forinsecus inductū. Huic cōfert cursib. circularib. uelocibus uti, quo q̄ minima corporis colliquatio fiat, & spiritu q̄ densissimo utēs, id quod inductū est excernat. à cursibus autē deambulatōib. celeribus utendū est. Victus autē mollis & leuis ad dies quatuor offeratur. Quicquid porro à deo accipere quis sibi uidetur purum, bonū est ad sanitatem. Significāt enim ea quę in corpus ingesta sunt pura esse.

Quicquid

Quicquid uero huic contrariū uidere quis putat, nō est bonū. Morbū enim in corpus uenisse significat. Oportet igitur uelut priorē etiā hūc curari. Si quis se cōplui putet clemēti cœlo, aqua molli, et nō ualde madesieri, neq; uehementē tempestatē ingruere, bonū est. significat enim moderatū ac purū spiritum ex aëre ingressum esse. Si uero uice uersa, ualde cōplui quis sibi uideatur, & tēpestatem ac turbinē esse, idq; aqua non pura, morbū designat à spiritu qui in ipso est. Verū oportet etiā hunc simili diætā uti, & omēs hos pauco cibo ali. De significatiōib. quidē igitur astrorū sic iudicare oportet, prouidereq; ac diætā statuere, & dijs supplicare, in secūdis quidē rebus Soli, Ioui cœlesti, Ioui possessori, Mineruæ opulētæ, Mercurio, Apollini. In cōtrarijs uero, dijs malorū auersoribus, & terræ, & heroibus, quo mala ac grauia omnia auertāt. Cæterū & hæc sanitatē præsignāt. Nimirū ea quæ in terra fiūt, acute uidere, & audire, et securē iter facere, & secure ac citra timorē currere, & uidere terrā leuē ac probe cultā, & arbores florētes, fructuosasq; ac satiuas, & flumina solito more fluētia, & aqua pura, neq; copiosiore, neq; pauciore q̃ cōueniens est. Itē fontes et puteos eodē modo. Hæc omnia sic uisa, sanitatē homini designāt, & corpus recte habere, omnesq; circuitus, & exhibitiones ciborū, ac secretiones, integras esse. Si uero quid his contrariū uideatur, detrimentū aliquod in corpore significat. Et uisus quidē ac auditus Iesus, morbū circa caput significat. Itaq; matutinis deambulationibus, itēq; à cœna pluribus utendū est, ad superiorē diætā. Cruribus uero læsis, uomitibus reuellendū est, & lucta ampliore utendū, ultra superiorē diætā. Terra autē asperā, carnē non purā significat. quare deambulationib. ab exercitijs pluribus utendū est. Arborū uero sterilitas, seminis humani corruptionē indicat. Si igitur folia arborib. decidant, ab humidis ac frigidis corpus læditur. Si uero floridæ sint arbores, uerū infructuosæ, à calidis & siccis. hæc igitur per diætā frigefacere ac humectare oportet, illa uero siccare ac calfacere. Flumina autē nō solito more fluentia, sanguinis circuitū significant, & auctiora quidē fluentia, excessum: imminuta uero, defectū. Oportet itaq; per diætā hunc quidē augere, illū uero imminuere. Nō pura autē fluentia, turbationē significāt, quæ à cursibus circularib. & deambulationibus, corpore per densum spiritū moto, purgatur. Fontes uero & putei cōmoti cōspecti, flatūs circa uesicam significāt, quos medicamentis urinā cientibus expurgare oportet. Mare perturbatū, uentris morbū significat, sed oportet aluū mouētibus, leuibusq; ac mollibus expurgare. Terrā autē domū moueri uidere, sano quidē uiro debilitatē significat, ægrotātī uero sanitatē, & ex præsentī statu transmotionē. Sano itaq; trāsmutare diætā conducit, Itaq; primū uomat, & rursus, ubi paulatim cibum assumpsit, à præsentī enim diætā totū corpus mouetur. debili uero eadem diætā uti cōducit. Nam corpus ex præsentī statu trāsit. Terrā ab aqua aliqua aut mari inūdatam uidere, morbū significat, humiditatē multa in corpore exstante. Verū oportet uomitibus, & prædij detractione, et laborib. & sicco uictu uti, deinde sensim adhiēcdo, ac modico cibo renutrire. Sed neq; nigrā, neq; combustā terrā uidere bonū est, sed periculum est de labēdi in fortē ac lethalem morbū. Siccitatis enim excessum in carne esse significat. Verū oportet & labores detrahēre, & cibos qui sicci & calidi, & acres ac urinā cientes sunt: nutrireq; p̃tisanæ succo decocto, & omnib. mollibus ac leuib. modicis: & potū uti aquo-

150 fo, albo, copiofiore: et balneis multis calidis, sed ieiunus ne lauget, molliter cubet
 ac dormiat, & in ocio degat. frigus & solē uitet. Supplicet autē terrā, & Mercurio,
 & Heroibus. Si uero in stagno, aut in mari, aut in fluminibus natare quis
 sibi uideatur, nō est bonū, humiditatis em̄ excessum significat. Cōfert autē huic
 & diætā sicca, & laboribus uti. febricitātī uero id bonū est, extinguitur enim ca
 155 liditas ab humorib. Quicquid porrō quis circa seipsum uidet solito more fie
 ri, ad naturā suū ipsius, neq; maius, neq; minus, bonū est ad sanitatē. Et uestitum
 albū indutū esse, & calciamentū pulcherrimū, bonū est. Quicquid uero mēbris
 160 maius fuerit, bonū non est. sed neq; quodcūq; tandem fuerit minus: & oportet
 hoc quidē per diætā augere, illud uero minuere. Nigra autē morbosiora sunt, &
 periculosa. Mollire itaq; oportet & humectare. Noua quoq; transmutationem
 significāt. Mortuos uidere puros in uestibus albis, bonū est, et accipere aliquid
 ab ipsis purū, bonū est. Sanitatē enim significat corporū, & salubritatē ingesto
 165 rum. à mortuis enim nutrimēta, & incremēta, ac semina fiunt. Hæc autē pura in
 corpus irrepere, sanitatē significat. Si uero contrā quis uideat ipsos nudos, aut
 170 nigris uestibus indutos, aut nō puros, aut aliquid accipiētes, aut ex domo por
 tates, nō est cōmodum. Morbū enim significat. quā enim in corpus ingerūtur
 nocua sunt. Verū oportet cursib. circularibus & deambulatiōib. depurgari, &
 alimētō molli ac leui à uomitū sensum nutriri. Quēcūq; uero formæ peregrinæ
 175 corpora in somnis apparēt, & hominē perterrēt, ciborū inconſuetorū repletio
 nē, & secretionē, & bilis superne ac inferne eruptionē, & morbū periculosum
 significāt. Verū oportet uomitū facere, et ad dies quinq; cibos q̄leuissimos nō
 multos, neq; acres, neq; siccos, neq; calidos sensim adijciēdo accipere, & labori
 180 bus naturalibus maxime uti, exceptis deambulatiōib. à cœna. Vtendū etiā bal
 neis ac calidis lauacris, & ocio, Solē uero & frigus uitet. Si uero quis per som
 num edere aut bibere cōsuetos cibos ac potus sibi uideatur, inopiā alimenti si
 185 gnificat, & animæ tristitiā. Et si carnes robustissimas quis edere se putet, maxi
 mum alimēti excessum designat. Si uero debilissimas, minorē. Quemadmodū
 enim id quod editur bonū est, Sic etiā id quod uidetur. Cibos igitur detrahere
 cōducit. Nam alimēti excessum hoc significat. Sed & panes ex caseo ac melle fa
 190 cti per somnū comesti, similiter significāt. Aquā autē purā bibere bonū est, reli
 qua omnia nociua sunt. Quæcūq; homo ex cōsuetis ac familiarib. se uidere
 putat, ea animæ concupiscentiā significāt. Quæcūq; uero fugit perterrefactus,
 sanguinē sisti ac præ siccitate coerceri significant. Cōfert itaq; frigefacere ac hu
 195 mectare. Quū uero quis pugnat, aut pūgitur, aut ab alio ligatur, secretionem
 circuitui cōtrariam corpori cōtigisse significat. Cōducit igitur uomere, & atten
 nuare ac deambulare, & cibis leuib. uti, & à uomitū ad dies quinq; sensim renu
 200 trire. Quin & oberrationes & ascēsus in somnis uisi, grauiā significant. Flus
 minum trāsitiones, & hostes armati, mōstra formæ peregrinæ, morbū aut insa
 niam significāt. Cōfert itaq; his qui talibus insomnijs uexantur, cibis modicis
 205 uti leuib. & ac mollibus, itēq; uomitibus, atq; sic sensim rursus ad dies quinq;
 cibū exhibere. Vtendū & laboribus naturalibus multis, præterq; à cœna, Cali
 da lauacra, & ociū, frigusq; ac solē uitent. Qui igitur his quemadmodū conscri
 pta sunt utetur, uitam sanus deget, & inuēta est sanē à me hæc ipsa diætā, quan
 tum possibile est humano ingenio excogitare, dijs auxiliantibus.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE ALIMENTO, IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.

*Hunc librum Galenus Hippocratis esse negat. Sed tamen non
alicuius plebei ac uulgaris hominis esse dicit, & fortassis ipsius
Thessali. Quidam Herophilum autorem putant.*



ALIMENTVM & alimenti species, unum & multæ, unū quia
dem, quatenus unum genus est. Species uero humiditate ac
siccitate finitur. & in his formæ, ac quātitas est, & ad quædā,
& ad tot. . Augēt autem, & corroborat, & incarnat, & assimi-
lat, & dissimilia facit quæ in singulis sunt, iuxta uniuscuius-
iusq; naturam ac facultatē quæ ab initio adest. Assimilat
autē pro uiribus, quū id quod superingeritur superatur, id

uero quod prius inest superat. Exile autē fit aliquādo quidem prius, in tempore
dissolutū aut in super appositum, aliquādo uero posterius, in tempore disso-
lutum aut appositum. Destruit autē utrunq; in tēpore & post tempus, id quod
extrinsecus assiduo superingestum est, & per multum tempus omnibus mem-
bris solide implicatum est, & propriam quidē formam producit, priorē uero,
aliquando autē & priores, destruit. Facultas porro alimenti peruenit & ad
ossā, & ad omnes partes, & in neruum, & in uenā, & in arteriam, et in musculū,
& in pelliculam, & carnem, & pinguedinē, & sanguinē, & pituitam, & medul-
lam, & cerebrū, & medullam spinalem, & interanea, omnesq; ipsorū partes, &
sanē etiam in caliditatē, & spiritū, & humiditatē. Alimenti uero & id quod
hoc nutrit, alimentū est, & quod uelut nutrimentū est, & quod nutrimentū fu-
turum est; Principium autē omnium unū est, & finis omniū unus, & idem finis
est atq; principium: & quæ particulatim in alimento probe & male distribuun-
tur. Probe quidem, quæ prædicta sunt. Male uero, quæ contrariū his ordinem
habent. Succī uarij, & coloribus, & uiribus, & in detrimentū, & in utilitatē
tem, & neq; lædentes, neq; cōmodantes, & multitudine, & excessu, et defectu,
& implicatione, aliquorū quidem, aliquorū uero non. Et omnium caliditatem
lædunt ac iuuant, et frigiditatē lædunt ac iuuant, & facultatē lædunt ac iuuant.

Facultatis autē uariæ naturę sunt. Succī corrūpentes & totum, & partem,
& forinsecus ac intrinsecus, spōtanei et nō spontanei, Nobis quidē spontanei,
causæ uero nō spontanei. Rursus autē causæ, aliæ manifestæ, aliæ obscuræ,
& alię possibiles, aliæ impossibiles. Natura omnibus subuenit. Ad hanc ue-
ro forinsecus quidem cataplasma, Illitio, Vnguentū, Nuditas & totius & par-
tis. Caliditas & frigiditas, iuxta eandē rationem & Adstrictio, & ulceratio, &
morsus, & corrosio. Intrinsecus uero & quædā ex prædictis, & supra hæc causæ
obscuræ, & parti & toti, & alicui et nō alicui, excretiones uentris secundū na-
turam, item urinarū, sudoris, saliuæ, mucī, uterī, iuxta hæmorrhoidas, uerrucā,
lepram, tuberculū, carcinoma, ex naribus, ex pulmone, ex uentre, ex sede, ex co-
le, secundū naturam, et præter naturā, discrimina horū alijs iuxta aliā rationē,
aliquando etiam aliter. Vna natura sunt hæc omnia, & nō una. Multæ naturæ

funt hæc omnia, & nō una. Medicina sursum & deorsum, & neq; sursum, neq; deorsum. In alimento medicina, optimū. In alimento medicina in alium. Malum & optimū ad aliquid. Vlcus, crusta, sanguis, pus, sanies, lepra, furfur, ulcera capitis manantia, impetigo, uiriligo, lentigo, aliquādo lædit, aliquādo prodest. aliquando neq; lædit, neq; prodest. Alimentū, non alimentū. Si nutrire nō potest, nomen est alimentū, non opus. Opus & res est alimentū, non nomen. In pilos alimentum, & in ungues, & in extremam superficiem intrinsecus peruenit. Forinsecus alimentū ex extrema superficie, ad intima peruenit. Cōfluxio una, conspiratio una, Consentientia omnia. Iuxta totius quidē corporis naturā omnia, iuxta partem uero, partes in unaquaq; parte ad opus. Principiū magnū ad extremā partē peruenit. Ex extrema parte ad magnū principiū peruenit. Vna natura, esse, & nō esse. Morborum differentia, in alimento, in spiritu, in calore; in sanguine, in pituita, in bile, in humoribus, in carne, in pinguedine, in uena, in arteria, in neruo, musculo, pellicula, osse cerebro, medulla spinali, ore, lingua, stomacho, siue gula, uentre, intestinis, septo transuerso, peritonæo membrana aluum ac intestina amplectente, hepate, splene, renibus, uesica, utero, cuncte. Hæc omnia & singulatim & particulatim.

Magnitudo ipsorū magna, & non magna. Signa, uicillatio, dolor, ruptura, mens, sudor, urinarū subsidetia, quies, iactatio, uisus, imaginationes, morbus arquatus, singultus, morbus comitialis, sanguis integer, somnus, & ex his, & ex alijs naturalibus, & quæcūq; alia huiusmodi ad detrimentū & utilitatem procedūt. Labores totius & parvis. Et magnitudinis signa, alterius ad maius, alterius ad minus, & ab utrisq; ad maius, & ab utrisq; ad minus. Dulce nō dulce. dulce ad potentiam, uelut aqua. Dulce ad gustū, uelut mel. Signa utrorūq; ulcera, oculi, & gustus. & in his magis & minus. Dulce ad uisum, & in coloribus, & in alijs mixturis. Dulce magis & minus. Raritas corporis ad perspirationem, quibus amplius aufertur, saniores sunt. Densitas corporis ad perspirationem, quibus minus aufertur, morbidiores. Qui probe perspirant, debiliores & saniores sunt, & à morbis facile reconualescunt. Qui male perspirant, priusquam ægroterent, fortiores sunt. Vbi autem ægrotarunt, difficilior à morbis reconualescūt. Hæc autem & toti & parti.

Pulmo contrariū corpori alimentū trahit, reliqua uero omnia idem. Principium alimenti spiritus, nares, os, guttur, pulmo, & reliqua respiratio. Principium alimenti & humidum & siccum, os, gula, uenter. Verum antiquius & primordiale alimentum, per abdomen umbilicus. Radicatio uenarum hepar. Radicatio articularū cor. ex his aberrant in omnia sanguis & spiritus, et calor per hæc meat. Vis una & nō una, qua omnia hæc & alia gubernantur. alia quidē ad uitam totius & partis, alia ad sensum totius & partis. Lac nutrimentum, quibus uidelicet secundum naturam alimentū est, alijs uero non. Alijs autem uinum alimentum est, & quibusdam non alimentū. Et carnes, & alia multæ alimentū species, & iuxta regionem et iuxta cōsuetudinem alunt, partim ad augmentum, et ad esse. partim ad esse solum, uelut in senibus. Quædam uero supra hæc, etiam ad robur.

Dispositio Athletica non est à natura. Habitus sanus melior in omnibus. Magna res est quantitas ad uires solerti ratione adoptata.

Lac & sanguis alimenti sunt redūdantia. Circuitus ad multa consoni sunt, ad foetum eiusq; alimentum. Rursus autem sursum repit in lac, & in alimentū,

&

& ad infantem. Viuificantur non animalia, uiuificantur animalia. Viuificantur partes animalium. Naturæ omnium nullo doctore usæ sunt. Sanguis alienus utilis. Sanguis proprius utilis. Sanguis alienus nociuus. Sanguis proprius nociuus. Humores proprii nociui. Humores alieni nociui. Humores alieni comestibiles. Humores proprii conducibiles. Consonans dissonans est. Dissonans consonans est. Lac alienum bonum. Lac proprium nociuum. Lac alienum nociuum. Lac proprium commodum. Cibus iuuenibus facile ac leuiter putrefactus. Senibus uero ad summum transmutatus. His qui in uigore ætatis consistunt impermutabilis. Ad figurationem, soles triginta quinque. Ad Motum, septuaginta. Ad perfectionem, ducenti & decem. Alij tradunt. Ad formam, quadraginta quinque. ad motum, septuaginta sex. ad exitum, ducenti & decem. Alij sic. Ad formam, quinquaginta. ad primum saltum, centum. ad perfectionem, trecenti. Alij sic. Ad discriminationem, quadraginta. ad transitum, octoginta. ad elapsum, ducenti quadraginta. Non est, & est. Gignuntur autem in his & plures & pauciores, secundum totum, & secundum partes. Non multo autem plures aut pauciores. pauciores uero tot, & quæcunque alia his similia.

Ossium alimentum ex contractione. Naso bis quinque. Maxilla & clauicula, & costis duplicia. cubito triplicia. Tibiæ et brachio quadruplicia. femori quintuplicia. Et si quod in his plus aut minus potest. Sanguis humidus & sanguis solidus. Sanguis humidus bonus. Sanguis solidus malus. Ad aliquid omnia mala & bona sunt. Via sursum deorsum una. Potentia alimenti melior quam moles. Moles alimenti melior quam potentia. Et in humidis & in siccis detrahit & apponit idem. & alteri quidem aufert, alteri uero apponit idem. Venarum pulsationes, & respiratio spiritus, iuxta ætatem, & consonantia & dissonantia sunt, & morbi & sanitatis signa. et sanitatis magis quam morbi, & morbi magis quam sanitatis. Alimentum enim etiam spiritus est. Humidum alimentum magis facile transmutatur quam siccum. Siccum alimentum facilius transmutatur quam humidum. Alimentum quod ægre alteratur, egre consumitur. Quod facile apponitur, facile consumitur. Et quicunque ueloci appositione opus habet, his humidum ad reficiendas uires medicamen optimum. Quicunque uero adhuc uelociori indigent, per olfactum. Qui autem tardiore appositione opus habet, solido alimento utantur. Musculi solidiores ægre magis quam alia colliquescent, excepto osse & neruo. Quæ denudata sunt ægre transmutantur, & secundum genus ipsa seipsis fortiora sunt quam pro re ipsa: propterea ipsa seipsis ægrius colliquescent. Pus ex carne, purulentum ex sanguine, & ex alia humiditate. Pus ulceris alimentum. Pus alimentum uenæ, arteriæ. Medulla alimentum ossis, propterea callo obducuntur. Facultas & potentia omnia auget & nutrit, & germinare facit. Humiditas alimenti uehiculum est.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE HUMIDORVM SIVE LIQVIDORVM VSV,

Iano Cornario Medico Physico interprete.



QUA potabilis, salufuginoſa, mare, potabilis quidem in officina medica optima. Nam & ferramētis & aramētis optima, & medicamentis plurimis inueteratis cōmuniffima. Verum ad corpus noſſe oportet, quōd hęc aut madefacit, aut frigefacit, aut calfacit. Aliter uero nulli cōmodat, aut detrimento eſt potata. Vbi modica potabili in ſpōgia uteris, optimū oculis eſt. Cutis ipſa ſuperne exulceratur calidæ aſperſione. Fomentū corporis totius aut partis.

Cutis durę mollitio, diſtentæ laxatio, neruorum, carniū, humorum ſub cutem effuſio, ſudoris ſecretio. Humectare proluſione, uelut nares, ueſicam, ſtut. Incarnare, attenuare, liquefacere, minuire, colorem reuocare, colorē diſpergere. Somniferum & in caput, & in alia. cōuulſionum, tenſionū, mitigatiuū dolores ſtupefacit auris, oculorū, & quæcunq; talia. frigida calfacere, uelut pix ulceribus, præterquā à quibus ſanguis erūpit, aut erupturus eſt, fractis, luxatis, reliquis quibus linteola ſunt medicus, Capitis grauitati. Moderatio in uno quocq; ne ultra torqueamus. uelut calida corpori, ex exceſſu in utrāq; partem, ut ab utrāq; non aberret, cōiectione ex detrimento, aut inuili facta, uelut in tepida. Oportet enim detrimētis aut utilitatibus etiā ſi ſint uti, uſq; quo iuuēt, aut donec lædant. Madefactio itaq; & humectatio, debile quid eſt. Frigefactio uero & calfactio, forte; uelut ex ſole. Verum frigida calida exiſtens, uelut potabilis aqua, debile quid eſt. Calida aut ne ulterius pergat, ut urat. Indicatum de his ipſe ægrotus, exceptis mutis, aut leuiter ſyderatis, aut ſtupefactis, aut uelut in uulnerib. perfrigeratis, aut nimio dolore uexatis. his enim hæc ſenſu non percipiuntur. Nam nō ſentiunt hi peruſti. Itemq; profundæ ac magnæ luxationes. Iam uero etiam pedes deciderūt perfrigerati, ex calidæ perſuſione. Sed his corpus perſuſi iudex eſt, ſimiliter etiam frigidæ. Harum aut utrarunq; paucitas, debile quid eſt. Multitudo uero, forte. ueruntamen ſinere oportet, donec fiat id cuius gratia ſunt. antea uero q̃ poſtremū fiat, ceſſandum eſt.

Harum porro utraq; lædit, & calida quidē amplius ea utentibus has læſiones inducit, carniū effœminationē, neruorum debilitatē, mentis ſtuporem, ſanguinis eruptiones, animi deliquia hæc ad mortē. Frigida uero cōuulſiones, tenſiones, nigrores, rigores febriles. Mediocritas quidē extra noxam eſt. Reliqua uero lædunt ac proſunt, uelut relatum eſt. Voluptatibus, & iucunditatibus, & doloribus ac moleſtijs, prout ſingula ex ipſis cōueniunt, ita ſani apparent. Corpus tegi ac uelari adſuetum, quicquid inſuetū eſt, quicquid lōgiſſime à familiari calore abeſt, & peregrino frigori propinquiſſimū, id ipſum auerſatur: & propterea ſanè calida gaudet, & ferre poteſt. Cerebrū et quæ ab hoc oriūtur, frigida quidē triſtantur, calida uero gaudēt, ſi ſanè frigidius et ſolidius à natura fuerit. Propterea oſſibus, dentibus, neruis frigida inimica, calida uero amica, quia ab illa conuulſiones, tenſiones, rigores febriles, quæ ſanè frigida facit, calida uero ſedar. Ob id etiam à calida uoluptates, et illecebræ, à frigida uero dolores et auerſationes. Ideoq; ſpina, pectus, dorſum, præcordia, magis frigida

gida aggrauant. calida uero gaudēt, & ferre ipsam possunt, ppter ea sanē spina, pectus, dorsum, præcordia, cōtraria ppeffa sunt, q̄a sunt cōtraria. Propterea sanē in hoc loco anxietatē ex calida obortā, frigida sedat, ppter ea sanē frigida potu gaudet, ppter ea sanē cibis calidis delectatur, propterea sanē & in animi deliquis frigida extremis partib. affundere pdest. Quod aut̄ posteriores partes calidā magis sufferūt q̄ anteriores, quā relata sunt in causa sunt. Quod uero etiā frigida, recte habet. Nā & extremæ partes anteriores sunt, & tegi nō adsueta: uelut etiā interna pars se habet ad externā. Cogitādū aut̄ q̄ utraq̄ in unoquoq̄ corpore potior est externa cute, quā & sibi ipsi, & neruo sanguineo cōtinua ac coharens, eo q̄ extra propriū calorē, in externo frigore est, ab utrisq̄ frequēter supatur, et utrisq̄ frequēter opus habet, frequētius aut̄ calida ad uoluptatē. Perpetiuntur aut̄ & extremæ partes tale quid, quare cito multa percipiūt, tarde aut̄ primū attollūtur. Et uenæ quoq̄ aliæ prius, aliæ posterius. Atq̄ sic om̄ia apparēt, & ubi frigesūt extremæ partes, & ubi calefiūt, in uasorū euacuationibus, in animi deliquis. Et iuxta rationē merito etiā uenas sequūtur, ea quā ab his eueniūt. Et calefacit primū calida, uelut in manibus, internas partes. At ulcera calida gaudēt ex cōfesso, quia tegi adsueta sunt. Merito itaq̄ altera grauatur. Merito igitur & ipsa uenæ, quia sunt in calido. Merito etiā ipse thorax, & uētricus ipse à frigida superatus, moleste fert, & mortē minatur, quia maxime desuetus est. Verū plurimū abest ab eo ut patiat̄ur; propinquissima aut̄ inter se sunt, egerē, et pati. Merito igitur frigida potu delectatur. Et sic cōsentiunt inter se om̄ia hæc. Quod uero om̄ia desquamata & ambusta in superficie, nō ualde tegi adsueta, maxime frigida moleste ferūt, par est. Citissime enim superātur. Et profundissima si superētur, maxime utiq̄ grauētur. deinde etiā natura neruosa participat. Quoniā imus uēter calida delectari uidetur, cōsiderandus locus est, et postea extremæ partes, & uelica, & genitales partes, et uirilīs mēbri glans natura frigidior est, q̄ quis putat. Sursum enim nō deorsum exilit caliditas: & propterea calida delectatur. Cōsiderandum etiā, quod post calidā frigescit corpus magis perfrigeratū: post frigida uero recalescit magis cōtrariū: uelut etiā aqua frigefaciēda & calefaciēda sunt, propter tenuitatē. Et q̄ post calidam durefcit corpus magis resiccatū, uelut oculi post frigida. Altera enim similis est aeri ambiēti, altera nō. Mare pruriginosis, & qui ab acris humoribus uellicātur prodest, ut & lauēt, & foueāt ex calido. Qui uero nō adsueti sunt, aliquantū læduntur. Verū ad ulcera, & ambusta, ac desquamata, & quæcūq̄ talia, contrariū est. Aptū est aut̄ puris. Bonū est & ad attenuādū, & ad piscatorū ulcera. Hæc enim neq̄ suppurātur, si nō uellicēs: & ad ulcera cuniculosa, & depascētia proserpendo sedat ac sistit, uelut sal, falfugo, nitrū. Om̄ia autem hæc si quis parum utatur, irritant; si excellenter, bona sunt. Melius autē est calidū ad plurima. Acetum ad corpus & articulos, simile est mari, & potentius, ad perfundendum & ad fomentum: & ad ulcera recens uulneratis, & ad sanguinis grumos, ubi nigredines sunt in pudendis. collutio est ad aures, & ad dentes. Calido autē hæc fiunt, & alia, sed & ex tempore coniecturam facere oportet. Eliquat uelut sal, & ut alia quæ impetigini, lepris ac uutiliginibus cōducunt, affusum ad calidū solē: maxime uero conducit unguibus leprosis. Superat enim post tempus. uerrucas formicarias attenuat, & sordes in auribus sanat. Mollit autem & corpus, &

multos alios locos, si non odor offenderet, & maxime mulieres. Valuerit & ad podagrā, si non corpus uulneretur. Eadem etiam sex acetī facit. Vinum dulce ad diuturna uulnera cōmodum est assidue utenti. Sed & ad medicamentorum potione. Austerū autem & album, & nigrū uinum, frigidum ad ulcera cōmodum est, frigidum propter caliditatē. Lanæ quæ frigiditatis gratia, aut perfunduntur, aut induntur, aut intinguntur, aquā frigidissimā postulant. Quæ uero adstrictionis gratia, uinū nigrū etiam lanas aspergere potest, uelut etiā betarum foliā, aut linteola intinguntur, in plurima quibus adstrictio inest, uelut sunt hedera albæ folia, & quæ acerbiora sunt, aut friabiliora, uelut hedera & rubus, rhus coriarius, saluā: & in ea quæ mollire oportet, uelut farina cocta.

Aqua frigida prodest papulis rubicūdis, quales alia atq; alia parte sublatae erumpunt, quales per splenia attractoria emergūt. In carnis uero & tenera carne præditis subrubicūda sunt; in nigris aut rotundæ, dothienes hoc est furunculi appellatæ, & quales in ipsis calidis lauacris oboriuntur, & mulierib. ex mensium sub cutem recursum fiunt, & ab irritamētis cutis, aut insolita uestimentorum asperorum gestatione, & ex sudoris exitu, aut ubi quis ex frigore, derepente ad ignē, aut calida lauacra accessit. Nam si hæc posterius fecerit, nequaquā amplius erumpūt. Alioqui quæ ex frigore fiunt, aut quæ exasperantur instar milij, dein de exulcerantur, eas frigida lædit. Calida uero prodest. Tumores in articulis, & dolores sine ulcere, ac podagricos, & conuulsas, plurima ex his frigida multa affusa leuat ac extenuat, & dolorē torpescit. Torpor autē moderatus, dolorem soluit. Sed & calida aqua attenuat ac mollit. Podagricis, resolutis, ante ac retro distentis, cōuulsis, talia accedūt, distentiones, tremores, leues siderationes: Talibus laxatis, claudicationes, torpores, uocis interceptiones, ad talia, excretiones per infernas partes suppressæ. Cauendum autē est in frigida usu, ne modum excedamus. Articulos induratos, aut ab inflammatione aliquādo obortas, aut à distortionē, operæ precium est sanare, aqua calida in utriculū infusa. Manū deligare, et oculos, lachrymas lenit, ita ut ad acres, stillamentū lene infundat q̄s, ut ne saluginosa cōtactu lædat. Et fossulis ulcerib. oculorum elotio prodest, & repletio ad naturā reducēs. Calida oculis cōuenit, doloribus, suppuratiōibus, lachrymis mordacibus, siccis omnib. Frigida doloris exortibus, ualde rubicūdis, & qui collectiōes tuberculorū iuxta uenas habere solēt, qualia sunt ulcuscula capitis manātia, circa thoracē, & alia dura. Verū podici & utero, nō ualde cōmoda est, neq; sanguinē in frigore mingētib. Vlcerebus quidē frigida mordax, cutē obdurat, dolorosa nō suppurari facit, liuefacit, nigrefacit, rigores febriles facit, conuulsiones, ante ac retro distentiones. Quādoq; uero in hac distentione, sine ulcere, iuueni carnosum, media æstate, multæ frigida aquæ effusio, caloris reuocationem facit. Calor autē hæc soluit. Calida suppuratoria est, non in omni ulcere, maximum signum ad securitatem, cutem mollit, attenuat, dolorem eximit, rigores, conuulsiones, ante ac retro distentiones lenit, capitis grauitatē soluit, plurimum autem conducit ossium fracturis, magis autem denudatis, & ex his maxime his qui in capite ulcera habent, & quæcūq; præ frigore, aut moriuntur, aut ulcerantur: itemq; in ulcerationibus uoluntarijs ac inuoluntarijs, qualia sunt desquamata: herpetibus serpendo adedentibus, denigratis aut in gingiuis, aut in aure, aut in sede, aut utero. His omnibus calida amica est

est iudicatoria. Frigida uero inimica & occidens, præterquam in quibus sanguinem fluxurum esse timor est. Atq; hoc modo utendum est liquidorū perfusionibus, inunctilium illitionibus, foliorū impositionibus, aut linteolorū cataplasmatis, quæcunq; aut frigiditate, aut caliditate profunt, aut nocent.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE HUMORIBVS, IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.

*Genuinum Hippocratis librum hunc esse Galenus dicit,
Verum quædam insunt ad extremam dictionis breuitatem
contracta: quædam rursus ultra modum extenta.*



HUMIDVS & ferocitas humorū, ubi nō reciprocatio humorum est, uelut florum, ducendus est quā repit per cōuenientes ac cōmodas regiones, exceptis his quorū inaturitas tempore contingit. Maturationes extra aut intro repunt, aut aliō quō oportet. Cautio, infinita magnitudo, experiendi difficultas, pilorū nuditas, uiscerum uacuitas, infernis repletio, supernis alimentū, mutatio sursum, mutatio deorsum. Spontanea sursum & deorsum. quæ profunt & lædūt. Cognata species, regio, mos, ætas, tempus, constitutio morbi, excessus, defectus. Quibus quantum deficit, aut non, medela, declinatio, deriuatio, in caput, in obliqua, quā maxime repit. aut reuulsio, in supernis deorsum, in infernis sursum, aut siccare, aut aliquibus inferna, aut aliquibus superna, aut eluitur, aut quibusdam mitigabitur. humores effusi ne intro reuellātur, sed secretiones siccantur. Turbatio, infusio per sedem, pelluiū, quibus abscedit ad sedem, unde exoluitur aut medicamentum, aut ulcus, aut humor aliquis cōpactus, aut eruptio pustulosa, aut flatus, aut ciabus, aut animalculū, aut æstus, aut alia quædam affectio. Consideranda hæc, spontanea desinentia, aut uelut ab exultione excitatæ bullæ, in quibus qualia lædunt aut profunt. Figuræ, motus, eleuatio, & rursus subsidencia, sompnus, uigilia. Quæ facienda, aut impedienda, cito assequi. Castigatio per uomitū, inferne per exitum, aut sputum, mucū, tussim, ructum, singultū, flatum, urinam, sterutinationem, lachrymas, pruritus, euulsionem, contactus, sitim, famem, repletionem, somnos, labores, ocium, corpus, mentē, disciplinam, memoriā, uocem, silentium, uterī purgationem. Quæ superne erumpunt ac torquent, pinguis, in temperata ac meraca, spumosa, calida, mordacia, æruginosa, uaria, rametosa, feculenta, cruenta, flatus expertia, cruda, cocta, sicca. Quæcūq; circumfluunt, ferendi facilitatem cōtemplari oportet, itemq; difficultatē, priusquā periculū ueniat. Item quæ sedare nō oportet. maturatio, descēsus eorū quæ infra sunt, redundantia & fluctuatio eorū quæ supra. & quæ ex uteris, & in auribus sordes, concitatio ac permixtio, apertio, euacuatio, calfactio, perfrigeratio, intrinsecus, forinsecus. horum quidem, horum uero non. Quū infra umbilicum fuerit id quod torquet, tardum & molle est tormen. Vice uersa, contrā. Quæ per aluum egeruntur quā repunt, non spumosa, matura, cruda, frigida, foetida, sicca

secca, humida. Quæ olfactum male afficiunt. Sitis quæ prius nō adfuit, neq̃ æstus, neq̃ alia causa. Urina, nasi humectatio, lactationē. Siccitatē. & non esse contractum ac arefactum, & spiritū turbulentū. præcordia, extremitates, oculos male affectos, coloris trāsmutatio. Pulsus, frigiditas, palpitationes, cutis durities, neruorum, articulorum, uocis, mentis, figura uoluntaria, pilī, ungues, facile ferre, aut nō, qualia oportet. Signa hæc. Odores corporis, oris, secessus, auris, flatus, urinæ, ulceris, sudoris, sputi, nasi. Corpus falsuginosum, aut sputū, aut nasus, aut lachryma, aut alij humores. Penitus similia, iuuantia, lædentia.

Insomnia qualia uideat, & in somnis qualia faciat, an acute audiat, & obedire paratus sit animo, an magis fortia sint ac plura quæ cōmoda sunt ac seruant, q̃ alia, an sentiant omnia omnibus sensibus, & ferant, ueluti odores, sermones, uel situs, figuras, & huiusmodi patienter, quæ sanē & sua sponte cōparentia profunt, & quando etiā talia iudicationē inducunt. Item tot, & talia, ueluti sunt flatus, urina, qualis, & quanta, & quādo. Quæ uero cōtraria sunt, auertere, ipsiq̃ aduersari. Quæ propinqua & cōmunia sunt affectionibus, prima & maxime affligūtur. Constitutionē autem ex primis incipiētibus, quicquid tandē excernatur ex urinis, quales nā fuerint. & qualis sit corporis collapsio, coloris immutatio, spiritus imminutio, & reliquæ cum his uictus rationes. Scire etiam oportet an similia sint quæ decedūt, transitus, urinæ, per uteros, sputa, per nares, oculi, sudor, ex tuberculis, ex uulneribus, ex pustulis, quæ sua sponte, quæ arte. Quod similia sunt inter se omnia quæ iudicāt, & quæ profunt, & quæ nocent, & quæ perimunt, quo hæc quidem fugiens auertat, illa uero accersat, & ducat, ac suscipiat. Sed & alia eodem modo, cutis, extremarū partium, præcordiorū, articulorū, oculorum, oris, figurarum, somniorū, qualia iudicant, & quando, talia machinari. Insuperq̃ qui tales abscessus fiūt. Qualia profunt cibis, potibus, odoribus, uisu, auditu, cogitatu, secretionibus, humoribus, calefactiōe, frigefactione, siccitatibus, humectando, siccādo, unguētis, illitionibus, cataplasmatibus, emplastris, insperсионibus, deniq̃ & epithematis quæ imponūtur. Figuræ, de frictio, curatio, labor, ocium, somnus, uigilia: spiritibus superne, inferne, cōmunibus, proprijs, arte paratis. In exacerbationibus neq̃ præsentibus, neq̃ futuris, neq̃ pedum frigiditate, sed in declinante deorsum morbo. In exacerbationibus per circuitus fientibus, ciborū oblationes dandæ non sunt, neq̃ cogere oportet, sed auferre de appositionibus ante iudicationes. Quæ iudicantur, & iudicata sunt integre, neq̃ mouere oportet, neq̃ nouare, neq̃ medicamētis, neq̃ alijs irritamentis, sed finire. Concocta medicamētis aggredi oportet, & mouere non cruda, neq̃ in principijs, si non turgent. Multa uero nō turgent. Quæ ducere oportet, quō maxime repunt per cōuenientes locos, eō ducere oportet. Quæ prodeunt non multitudine æstimare oportet, sed quādiu prodeant qualia oportet, et facile æger ferat. Vbi uero opus est, debilitare etiā, aut animi deliquium inducere oportet, donec hoc feceris, cuius gratia hoc fit, interim aliò uertere, aut siccare, aut humectare, aut reuellere, si sufficiat æger, id quod ex his coniectabis. Sicca quidem calida erunt, humida uero frigida. Quæ uero aluum mouent, plerunq̃ contraria. Hæc imparibus diebus, sursum, si et circuitus, et constitutio talis sit ex exacerbationibus. Fiunt autē plurima paribus diebus, deorsum: sic enim & sua sponte profunt: si non circuitus faciant exacerbationes in paribus

paribus. In talibus autem, in paribus sursum: in imparibus deorsum. Tales autem pauci sunt. Et tales constitutiones etiam difficilius iudicantur. Quin & ulterius tempore progressa sic fieri necesse est, uelut ad decimātertiam, ac decimāquartam diem. Decimatertia quidē deorsum, decimaquarta uero sursum. Ita enim ad iudicationē conducit. Et quæ ad uigesimalam. Cæterū quæ infra prodeunt, multum purgare oportet, & hæc nō prope iudicationē, sed longius ab ea. Raro autem in acutis, multa ducere oportet, in delassatis, totum. In febribus ad articulos, & circa maxillas maxime abscessus fiunt, prope sanē dolores uniuscuiusq; ad supernā partem magis & in totum. Si uero lentus fuerit morbus & deorsum tendens, inferne etiam abscessus fiunt. Maxime autē pedes calidi, inferne significāt; frigidi superne. Quibus uero ex morbis se erigētibz statim in manibus aut pedibus dolores fiunt, in his abscessus contingunt. Sed & si quid doluerit quis antea q̄ egrotet, ad eas partes firmatur. Quēadmodū etiam tussientibus & anginosis in Perintho. Faciunt enim tusses abscessus, uelut etiam febres. Iuxta eandē rationē contingit ab humorū aut corporis colliquatione & frigiditate. Proinde nōsse expedit, in quibus temporibus humores florent, & quales in singulis morbos faciunt, & quales in unoquoq; morbo affectiones: & reliquum corpus ad quē morbū maxime natura repit: & quale quid splen intumescens facit. Horū sanē & natura, & fermē colores deteriores sunt, et corpora tumēt. Et si quid aliud est, in his exercere se prodest, uelut est Animi intēperantia circa cibos ac potus, somnū, uigilias, aut ob amores quosdā, uelut tesserarū, aut propter artes, aut propter necessitates: tolerantia laborū, & quorum ordinata est, aut inordinata: Mutatiōes ex qualibus ad qualia: ex moribus animæ industria, aut quærens, aut meditans, aut uidēns, aut dicens, aut aliud quid, uelut tristitiæ, iracundiæ, cupiditates, quæ ex casu cōtingunt. Molestiæ animi aut per oculos, aut per auditum, uelut etiam corporum, Molis quidem ad seipsas attritis, dentes stupefcunt: Ambulanti uero circa cauum locum, crura tremunt: quum autem quis manibus ea quibus opus habet leuat, hæc tremunt: Serpens derepente cōspectus pallorem cū uirore inducit. Timores, pudor, mœror, uoluptas, ira, aliq; huiusmodi quomodo obediunt. Vnicuiq; autem pars corporis ad actionē pertinens, in his obedit. Sudores, cordis palpitatione, & eiusmodi potentiæ. Quæ extrinsecus profunt aut nocent, unctio, persusio, illitio, cataplasmatū usus, deligatio lanarum & talium rerū: & internæ partes talibus obediunt, non solum externæ his quæ intro assumuntur: Sed & quæ in lanis ab ouili succidis adhibētur, & quod à rege nomen habet cuminum, uidentibus & olfacientibus. Quæ de capite ducunt, turbāt, sermones, uox, & huiusmodi, mammæ, geniturā, uterus, & quæ signa in ætatibus, & in suffocationibus, & tussi, & quæ ad testiculos. Quēadmodū arboribus terra, ita animalibus uētriculus: & nutrit, & calefacit, & frigefacit. Frigefacit, dū euacuatur. calefacit, dū impletur. Quēadmodū terra stercoreta hyeme calida est, ita etiā uētriculus. Arbores corticē tenuem siccū habēt, intrinsecus aut carne sicca, sanæ, nō putridæ, diuturnæ. Ita & ex animalibz testudines, & quicquid eiusmodi est. Aetatibus, temporibus, annis, similia animalia, nō deteruntur si mōderate melioribus utantur. Quēadmodū hydria quod recens est trāsmittit, quod inueteratum retinet. Sic & uētriculus trāsmittit alimentū, & fecem retinet, uelut uas

sculum. Modī morborum hi sunt, partim quidē cognati sunt, de quibus in-
 125 terrogādo discere oportet; partim à regione, familiares enim sunt per multas,
 & multi ipsos noscunt; partim ex corpore, & uictus ratione, ac temperiei cōsti-
 tutione, aut à temporibus. At regiones ad tēpora male dispositæ, tales morbos
 pariunt, quali tempori similes fuerint, Verbi gratia, Inæqualis calor aut frigus
 eadem die, quū talia fuerint, morbos autumnales faciūt. Et in alijs temporibus
 secundum rationē, alijs ab odoribus cœnosis aut palustribus; alijs ab aquis, calcu-
 130 losi, splenici: alijs à uentis bonis & malis incipiunt. Qualia uero sunt tempora,
 tales erunt etiā morbi, & constitutiones ex ipsis. Si tempora tēpestiue, & ordi-
 nate se habuerint, morbos iudicatu faciles faciunt. Vernaculi autē temporum
 morbi iudicant mutationes, & prout euariauerit tempus, similes aut dissimiles
 erunt morbi, qui in hoc tempore oriūtur. Si uero similiter procedat, eiusmodi
 135 quoq; fuerint morbi, & ad talem modū tracti, ueluti est morbus regius autūna-
 lis. Frigora enim ex caloribus, & calor ex frigore. Et si æstas biliosa fiat, & bilis
 aucta intus relinquatur, etiam aliquantū splenici fient. Quum igitur & Ver se
 processerit, etiam uere fit morbus regius. Proximus est enim hic motus tēpori,
 iuxta hanc speciem. Quū uero æstas fiat ueri similis, sudores in febribus, & fe-
 140 bres faciles, & nō peracutæ, neq; linguis obaridæ fient. Si uero hybernum fiat
 uer, & postremū hyemis tempus, hyberni etiam morbi, & tusses, & peripneu-
 moniæ, & anginæ. Et autūnus si non in tempore ac de repente hybernari, non
 assidue, tales morbos facit, eo quod nō in tempore incepit, sed inæqualiter fit.
 Quapropter etiā tēpora à iudicatione aliena ac incōstantia fiunt: quemadmo-
 145 dum etiā morbi, si præerūpant, aut præexcernātur, aut intus relinquatur. Reci-
 diuas enim etiam tempora faciunt, quemadmodū & morbos ita inducūt. Itaq;
 insuper considerandū est, quomodo habētia se corpora tēpora suscipiant. Aus-
 stri auditū grauant, caliginē inducunt, caput grauant, torpidi sunt, dissoluant.
 Quum hic præualuerit, talia in morbis patiuntur, ulcera glabra, maxime os, pu-
 150 dendum, & aliæ partes. Si uero aquilo, tusses, faucium affectiones, uentres du-
 riores, urinæ difficultates, horrores, dolores laterū ac pectoris. Quū hic domi-
 natur, tales morbos magis expectare oportet. Si magis redundauerit, ad squa-
 lores sequuntur febres, itemq; ad pluuias, ex qualibus tandē redundantē trās-
 mutatæ fuerint, & quomodocunq; habentia se corpora ex alio tēpore suscepe-
 155 rint, & quocūq; tandem humore in corpore domināte. Cæterum siccitates
 & austrinæ sunt, & Aquilonares. Differunt enim & alia hoc modo. Magnum
 enim & hoc est. Nam alius in alio tempore ac regione magnus est. Veluti Æs-
 tas bilem parit, Ver sanguinē, reliqua prout singula. Mutationes maxime pa-
 riūt morbos, & præsertim maximæ: & in tēporibus magnæ mutationes, & in
 160 alijs. Quædam sensim fiente progressu fiunt. Tempora huiusmodi sunt se-
 curissima, uelut etiam diætæ, & frigus, et calor maxime sensim facto progressu.
 Et ætates sic trāsmutantur. Naturæ quantum ad tempora attinet, aliæ ad æsta-
 tem, aliæ ad hyemem, bene aut male dispositæ sunt. Quantū uero ad regiones,
 & ætates, & uictus rationē, & alias morborum constitutiones, aliæ ad alias be-
 165 ne aut male se habent. Et ætates ad tempora, & regiones, & uictus rationem, &
 morborum cōstitutiones. Et in tēporibus, uictus, & cibi, & potus, qualitatem
 suam requirūt. Nam hyems ab operibus ocūū habet, & quæ in corpus ingerun-
 170 tur

tur matura ac simplicia postulat. Magnum enim & hoc est. Autūnus autem laboribus deditus. Sub insolationibus potus frequentes sunt, cibi incōstantes; uina, arborum fructus. Quemadmodū autem ex tēporibus morbos coniectare datur, ita quandoq; etiam ex morbis aquas, & uentos, & siccitates prænoscere licet, & aquilonares, & austrinas. Licet autē ei qui probe ac recte didicit, unde sint hæc cōsideranda, uelut & lepræ quædam, & circa articulos dolores. Aquæ ubi futurę sunt, pruriginosi sunt, & alia huiusmodi. Et quæ pluuiæ alternis, aut singulis diebus, aut per alios circuitus, aut assiduæ fient. Et uētī aliqui per multos diēs flant, & contrario inter se modo flant, alij per pauciores. Et ijdē per circuitum. Hæc habent cum temporum cōstitutionibus similitudines. Verum breuius talia. Si uero annus diutius talis fuerit, qualem cōstitutionē fecerit, tales etiam morbi diutius erunt. Et si magis fortes fuerint, maximi quoq; morbi sic fient, & cōmunissimī, & ad plurimū tempus. Ex primis aquis, ubi post multam siccitatē, aqua futura est, de aqua inter cutē prædicere licet: & ubi talia parua signa apparuerint in uentorum quiete, in trāsmutatione. Colligenda igitur sunt, quæ in qualibus aquis aut uentis morbi significant, & audiēdus est si quis nouit, quod tali hyemē prægressa, tale uer aut æstas erit. Colores non sunt similes in tēporibus, neq; in aquilonaribus, neq; in austrinis, neq; in ætatibus, neq; in unōquoq; ad seipsum, neq; in alio ad alium. Considerandum autem est ex his quæ præsentia ac quiescentia nouimus de coloribus, & q̄ ætates temporibus similes sunt, & colore, & mutationē. Qui hæmorrhoidas habent, neq; pleuritide, neq; peripneumonia, neq; phagedæna, neq; furunculis, neq; tuberculis terebinthi figuram habentibus corripuntur. Fortassis autem neq; lepris, fortassis neq; uiriliginibus. Multi tamen intēpestiue curati, non tarde correpti sunt, & sic perniciosæ fuerunt. Et quicunq; alij abscessus, uelut fistulæ, aliorum medela sunt. Quæ ubi insuper cōparent sedare solent, ea prius fientia impediementa ab his liberāt. Alterius loci morbos loca excipientia, aut dolore, aut grauitate, aut ob aliud quiddam liberant, aut quod alijs sunt cōmunicationes. Propter inclinationē nō amplius sanguis prodit, sed iuxta hūmoris cognationem talia spūunt. conuenit quibusdam sanguinem detrahare tempestiue in talibus; in alijs autem, uelut in his, non hoc cōuenit. Impedimentum in spuentibus cruenta, tempus anni, pleuritis, bilis. Tubercula circa aurē quibus circa iudicationem exorta, non suppurata fuerint, his disparētibus recidiua fit, & pro ratione recidiuarum, recidiua fiēte, rursus intumescūt, & permanēt, quemadmodum febrium recidiuæ, in simili circuitu: in his spēs est ad articulos abscedere. Urina crassa, alba, qualis Archigenis familiari erat, in lassitudinis febrib. quarta diē aliquādo prodit, & liberat ab abscessu. Si uero ultra hoc, etiā sanguis ē naribus large eruperit, etiam ualde. Cui intestinū in dextra parte dolebat, & articulari morbo correptus est, quietior erat. Postquam autem hic curatus fuit, magis dolebat.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE MORBO SACRO, IANO CORNAB

rio Medico Physico interprete.

*Non genuinū Hippocratis, sed memorabilis tamen uiri, hunc librū Gale-
nus esse dicit, tum quod ad dictionē, tum quod ad sententiā attinet. Hippo-
cratis autem neq; dicendi modum, neq; sententiarum acumen, in ipso esse.*



De morbo sacro appellato sic se res habet. Nulla re uidetur mihi alij diuinior esse morbis, neq; sacratior. Verū naturā habet quam etiam reliqui morbi, unde fit. Homines uero naturam & causam eius diuinā esse putauerunt, præ inexperiētia & admiratione, propterea quod reliquis morbis nulla res similis est. & per inopiam quidē quod nō cognoscunt, diuinitas ipsi cōseruatur. Per abundantia uero & parabilem modū sanationis medentur. Exoluūtur enim aut expiationibus aut incantamētis. Si uero propter admirationē diuinus cēsetur, multi morbi sacri erūt, & nō unus: quemadmodū ego demonstrabo etiam alios nihil min⁹ admirabiles, neq; minus mōstrosos, quos nemo sacros esse cēset. Primū etenim febres quotidianæ, & tertianæ, & quartanæ, nihil minus mihi sacri esse uidentur, nec minus à deo fieri q̃ hic morbus, etiā si nihil admirabile habeāt. Deinde uideo insanos homines & delirātes à nulla manifesta causā, & multa & simul importuna facere, uisq; multos in somno plorare ac uociferari, alios uero suffocari, alios exilire & foras fugere, atq; ita delirare donēc expergiscūtur. postea autē etiam sanos esse ac sapientes uelut prius, essēq; ipsos pallidos ac debiles. atq; hæc non semel, sed saepe, alijq; multi sunt ac omnigeni morbi, in quibus singulis recēsendis in longum sermo extenderetur. Cæterum qui primi hunc morbū sacrum esse pronunciauerunt, tales homines mihi fuisse uidentur, quales etiam nūc sunt magi & expiatores & circulatores, & quidā arrogantes, qui se uehementer pios esse simulant, & amplius quid scire. Hi itaq; cōsiliū ac mentis inopiæ obuelantes ac prætexentes diuinitatē, quum nihil haberent quod exhibitum prodesset, ut ne manifesta fieret ipsoꝝ ignorantia, sacram hanc affectionē esse pronunciarunt. & rationibus idoneis collectis, curationē constituerunt sibi ipsis securā, expiasmenta offerentes & incantamēta, & à balneis abstinere iubētes, & à cibis multis ac ineptis ad hominū ægrotorū esum, uelut ex marinis quidē à mullo, & melanuro, mugilicq; ac anguilla, hi enim pisces opportune haberi possunt. Ex carnibus uero à caprina, ceruina, suilla, ac canina. Hæ enim carnes maxime aluum turbant. Ex uolucris autē, à gallo & turture ac otide. insuperq; ab his quæ robustissimæ esse cēsentur Ex oleribus à mentha, allio, ac cepa. Nihil enim acre infirmo conducit. Palliū præterea nigrum habendū non esse præcepere. Niger enim color mortalis est. Neq; in caprina pelle decumbēdum esse, neq; eandem gestare oportere. neq; pedem supra pedem habendū esse, neq; manū supra manum. Hæc enim omnia curationis impedimenta esse. Omnia autē hæc diuinitatis gratia apponūt, uelut amplius quid scientes, & alios prætextus proferētes, quo si sanus æger euadat, ipsis gloria & dexteritas adscribatur. sin moriatur, in

tuto

tuto positæ sint ipsorum excusationes, habeantq; prætextū quod non ipsi sint in causâ, sed dei. Neq; enim medicamētum aliquod edendū aut bibēdum exhibuerunt, neq; balineis incoxerunt, ut ipsi in causâ esse uideri possint. Mihi autem uidetur nullum ex his qui mediterranea Africæ inhabitant sanū esse posse, propterea quod caprinis pellibus ac carnibus utuntur, quū neq; stratū, neq; palliū, neq; calceamentū habeant, quod non sit caprinū. Non enim alia ulla ipsis sunt pecora, præter capras & boues. Si autē hæc admota & comesta morbum augent, & non comesta sanant, non est sanè deus alicuius autor aut causa, neq; profunt expiamēta, sed edulia sunt quæ & sanant & lædunt. Numinis uero uis dissipatur. Sic igitur mihi uidentur hi qui hoc modo hos morbos curare aggrediuntur, neq; sacros ipsos putare, neq; diuinos. Vbi enim præ talibus expiamētis ac tali curatione transmutantur, quid uetat etiam præ alijs artibus similibus illis, & discedere ab hominibus & accedere? Quare nō deus autor est, sed aliquid humanum. Quisquis enim lustrationibus & magicis incantamentis talem affectionem abducere potens est, is etiam alijs artibus abduxerit, & ex hac ratione diuinitatis opinio penitus pessum it. Talia itaq; dicentes ac excogitantes, amplius quid se scire simulant, & homines decipiunt, proponentes his lustrationes ac purificationes, quū uerba ipsorum magna ex parte se ad deum ac dæmoniū extendant. Atqui mihi sanè non de pietate uerba facere uidentur, uelut ipsi putant, sed potius de impietate, & quod dei non sunt, pietasq; ac diuinitas ipsorum impia est ac scelestā, uelut ego docebo. Si enim & lunam abolere, & solem obscurare, tempestatēq; ac serenitatē facere, pluuias item ac siccitates, & mare sterile itemq; terram, & alia huiuscemodi omnia, se sci re profitentur, siue ex sacrorum mysterijs, siue ex alia quadam professione aut meditatione, hanc potentiam iactent, qui talia studio habent, impij sanè mihi esse uidentur, & deos non esse putare, neq; si sint, aliquid posse, neq; ullum aliquid etiam extremum malum prohibere. Quod quum faciant, quomodo non ipsis infesti sint? Si enim homo incantamentis ac sacrificijs utēs, & lunam abolebit, & solem obscurabit, & tempestatem ac serenitatem faciet, non utiq; ego horum aliquid diuinum esse putauerim, sed humanū, si sanè diuinitatis potentia ab humana uolūtate superatur, & in seruitutem redacta est: fortassis autem hæc nō hoc se modo habēt, sed homines uictus indigi multa & omnigena moriuntur & euariant, tum in alia omnia, tum in hunc morbum, in singulis affectionis speciebus causam deo adscribētes. Non enim semel, sed sæpius eorundem mentionem faciunt. Siquidem enim capras imitētur, & si balatum edant, & frendant, & si dextris partibus conuellantur, Matrem deorum causam esse aiunt. Si uero acutiorem & concitatiorem sonum emittant, equo æssimilant, & Neptunum autorem esse dicūt. Si uero etiam aliquid stercoreis emittant, quod sæpe quibusdam contingit præ morbo coactis, Hecates enodiæ appellatio additur. Si autem tenuiorem & densiorem uocem edant, uelut auiculæ, Apollo Nomius, id est pastor, si uero spumam ex ore remittant, æ pedibus calcitrent, Mars causam habet. Quicunq; porro pauores noctu ingruūt, timoresq; ac deliria, & exsultationes electo, terroresq; ac fugæ foras, Hecates insidias esse dicunt, & heroum insultus, expiamētisq; utuntur ac incantamentis, & scelestissimum ac impijssimū, meo sanè iudicio, faciunt numen. Expiant enim mor-

ho correptos sanguine, itemq; alijs sceleribus inquinatos, aut iniustos, aut ab hominibus intoxicatos, aut qui scelestum aliquod facinus perpetrarunt, quos cōtraria his facere oportebat, sacrificare nimirum ac precari, & ad templa progressos dijs supplicare. Nunc uero horū quidem nihil faciunt, uerum expiant, & alia expiamenta terra occultant, alia in mare proijciunt, alia ad montes deferunt, ubi nemo attingat, neq; conculcet. Oportebat autem ea ad templa deferre ac deo contribuere, si quidem deus est autor, Non tamen ego puto hominis corpus à deo inquinari, sordidissimū scilicet à purissimo. Verum etiam si contingat ab alio inquinari, aut quid perpeti, cupierit utiq; à deo purgari ac purificari magis quàm inquinari. Deus itaq; est qui maxima ac sceleratissima peccata purgat ac purificat, et liberatio nostra existit, ipsiq; terminos templorū ac delubrorum dijs designamus, ut nullus qui non purus sit eos transcendat, & ingressi respergimur, nō uelut qui inquinemur, sed si quod etiam prius scelus habemus purificemur. Et de expiationibus quidem sic se res habere mihi uidetur.

Hic uero morbus nulla re diuinior reliquis mihi esse uidetur. Sed naturā habet, quam etiam alij morbi, & causam unde singuli gignūtur. Naturam autem & causam, ab eodem deū fieri, à quo etiam alia omnia. Et sanabilis esse mihi uidetur nihilo minus q̃ alij, nisi iam prae temporis longitudine inualuerit, ut fortior sit medicamentis quæ adhibentur. Incipit autem uelut etiam alij morbi secundum genus. Si enim ex pituitoso pituitosus, ex bilioso biliosus gignitur, & ex tabido tabidus, & ex splenico siue lienoso lienosus? quid prohibet ut cuius pater & mater hoc morbo correpti fuerint, etiam posterorū ac nepotū aliquis eo corripiatur? Semen enim genitale ab omnibus corporis partibus procedit, à sanis sanū, à morbidis morbosum. Aliud porro signū magnū est, q̃ nihilo diuinior reliquis sit morbis: pituitosis enim natura oboritur, biliosis uero nō accidit. Atqui si diuinior est reliquis, similiter omnibus morbū hunc fieri oportebat, & non discrimen facere inter biliosos ac pituitosos. Sed enim ipsis cerebrū

Quo uero modo, & ex qua causā fiat, ego manifeste docebo. Cerebrū hominis duplex est, quemadmodū etiam alijs omnibus animalibus. Mediū autē ipsius diuidit mēbrana tenuis. Quapropter non semper eandē capitis partē dolet, sed particulatim utramuis, aliquādo uero totum. Sed & uenæ in ipsum tendunt ex uniuerso corpore, multæ & tenues, duæ uero crassæ, altera ab hepate, altera de liene. Et quæ quidē ab hepate uenit, hoc modo se habet. Altera quidem uenæ pars deorsum tendit, per partes ad dextrā, iuxta ipsum rhenē ac lumbum, ad internam femoris partem, & descēdit in pedem, & uocatur uena caua. Altera uero sursum tendit per uenas dextras ac pulmonem. Finditur autem & in cor, & in brachiū dextrum. Reliquū uero sursum fertur per clauiculam in dextram ceruicis partē, ad ipsam cutem, ut cōspicua fiat, iuxta aurem uero occultatur. Atq; hic finditur, & crassissima quidem ac maxima & cauisima ipsius pars, in cerebrum desinit. alia uero pars in aurem dextram, quæ sanè uenula tenuis est, alia autem in oculum dextrū, alia in ipsum nasum. Atq; sic quidem uenæ ab hepate habent.

Tendit autem & à liene uena in sinistra sursum ac deorsum, uelut ab hepate, uerum tenuior & imbecillior. Cæterū in has uenas etiam spiritus copiam inducimus. Hæ enim corporis nostri respirationes sunt,

aerem

aerem in seipſas trahētes, & in reliquum corpus ac uenulas deriuantes, refrigerantq; ac rursus dimittunt. Non enim poſſibile eſt ſpiritum ſtare, ſed procedit ſurſum ac deorſum. Si enim alicubi conſtiterit ac interceptus fuerit, impotens redditur illa pars ubi conſtiterit. Cuius rei ſignum hoc eſt. Quum enim deſcendenti aut decumbēti uenulae compreſſae fuerint, ut ſpiritus à uena non diſcurrat, ſtatim torpor occupat. Et de uenis quidem reliquis ſic habet. At uero morbus ipſe ſit in pituitosis, in bilioſis uero non. Incipit autem fieri in foetu adhuc in utero exiſtente. Purgatur enim & floreſcit cerebrum, uelut etiam aliae partes prius quàm gignantur. In hac autem purgatione, ſi quidem probe ac moderate purgatum fuerit, & neq; plus neq; minus quàm oportet deſluxerit, hic foetus ſaniſſimum caput habebit. Si autem amplior colliquatio à toto cerebro facta fuerit, morboſum caput augeſcēs foetus habebit, & ſonitu plenum, & neq; ſoem, neq; frigus tolerabit. Si uero ab una aliqua parte colliquatio contigerit, aut ab oculo, aut ab aure, aut uena aliqua ſimul gracilis facta fuerit, ille ſic afficitur qualiter ſanè colliquatio contigerit. Si uero purgatio non contingat, ſed in cerebro ſpiſſetur ac cogatur, ſic neceſſe eſt foetus pituitoſos eſſe. Et quibuscunq; quidem pueris exiſtentibus erumpunt ulcera in caput, & in aures, ac in reliquum corpus, & qui ſaliuoli fiunt ac mucoli, hi ipſi progreſſu ætatis facile me degunt: hic enim abit ac purgatur pituita, quam in utero purgari oportebat, & qui ſic purgati fuerint, comitali ſiue ſacro morbo ſerè non apprehenduntur. Qui uero mundi ſunt, & neq; ulcus ullum, neq; mucus, neq; ſaliua ulla prodit, neq; in uteris purgationem fecerūt, talibus periculum imminet, ut ab hoc morbo corripiantur. Si porro ad cor progreſſum fecerit deſluxus, tremor apprehendit & anhelationes, & pectora corrumpuntur, aliqui uero etiam incurui fiunt. Quum enim deſcēderit pituita frigida ad pulmonem aut ad cor, perfrigeratur ſanguis. Venae autem uiolenter perfrigeratae, ad pulmonē & cor aſiliunt, & cor tremore cōcutitur, ut præ hac neceſſitate anhelationes incidāt, & ſpiratio ceruice erecta. Non enim ſpiritum ſuſcipere poteſt, donec id quod influxit à ſanguine fuerit ſuperatum, & calefactū in uenas fuerit diſfuſum. De inde & tremor & anhelatio ſedatur, ſedatur aut prout copia eius fuerit, Si enim amplius influxerit, tardius. ſi minus, citius. Et ſiquidem denſiores ac crebriores fuerint deſluxus, crebrius comitali morbo corripitur, ſi minus, rarius.

Hac itaq; perpetitur homo ſi ad pulmonem ac cor fluxus proceſſerit. Si uero in uentrem, profluuiā alui apprehēdunt. Si uero ab his uijs exclusus fuerit, & in uenas quas dixi deſluxum fecerit, mutus fit & ſuffocatur, & ſpuma ex ore effluit, & dentes conſtringuntur, & manus cōuelluntur, & oculi diſtorquētur, & nihil ſapiūt, aliquibus etiam ſtercus inferne ſecedit. Atq; hæc fiunt aliquando in ſiniſtra, aliquando in dextra, aliquādo utrinq;. Quomodo uero ſingula hæc perpetiatur ego narrabo. Mutus quidem eſt, quū pituita derepente in uenas delapſa, aerem excluſerit, & non admiferit neq; in cerebrū, neq; in uenas cauas neq; in uentriculos, ſed occuparit reſpirationē. Quum enim accipit homo per os & nares ſpiritum, primū quidem ad cerebrū uenit, deinde uero in uentriculum magna ex parte, pars etiam ad pulmonem, & pars ad uenas. Ex his uero ad reliquas partes in uenas diſpergitur, & quantum quidem eius ad uentriculum uenit, perfrigerat, & nihil aliud confert. Idem præſtat & quod ad pul-

monem uenit. Qui uero ad uenas peruenit aer, cōfert ad uentriculos ingressus & ad cerebrum. Atq; sic sapientiam & motū membris exhibet. Quare ubi fuerit exclusus à uenis aer præ pituita, eumq; non susceperint, mutum ac desipientem hominem reddunt. At uero manus impotentes fiunt ac cōuelluntur, sanguine quiescente & dum non diffunditur uelut solebat. Oculi quoq; distorquentur aere à uenis excluso, & cōmouentur. Spuma uero ex ore prodit ex pulmone. Quum enim spiritus non ingrediatur in ipsum, spumescit & ebullit uelut moriens. Stercus uero subit dum uiolēter suffocatur. Suffocatur autem, hepate & uentre sursum ad septum trāuersum irruētib; & stomacho uentris concluso. Irruunt autem, quum tantū spiritus in os non ingreditur quantū solebat. Calcitrant autem pedibus, quum aer in membris conclusus fuerit, & foras penetrare nō poterit præ pituita, uerum exiliens per sanguinē sursum ac deorsum, cōuulsionem ac dolorem inducit, & propterea sanē calcitrant. Porro omnia hæc perpetitur, quū pituita frigida defluerit in sanguinē calidum existentem. Perfrigerat enim & sistit sanguinem. Et si quidem fluxus multus fuerit ac crassus, statim occidit. Dominatur enim sanguini per frigus, ipsumq; cōgelat. Si uero paucior fuerit, in præsens quidem dominatur obturans respirationem. Deinde temporis progressu quū dispersus fuerit per uenas, & ammixtus sanguini, multo existenti ac calido, si sic superatus fuerit, uenæ aerem suscipiunt, atq; ita ægri resipiscunt. Et quicumq; quidem pueri parui hoc morbo corripiuntur, ut plurimum moriuntur, si multus fluxus contingat, isq; humidus existat. Venæ enim tenues existentes pituitā præ crassitudine ac multitudine suscipere non possunt, sed perfrigeratur ac congelatur sanguis, & sic moriuntur. Si uero modica existens pituita in utraq; uenas defluxum fecerit, aut in alterius partis, superuiuūt, nota ex morbo impressa relicta. aut enim os conuellitur, aut oculus, aut ceruix, aut manus, ubicūq; sanē uena pituita repleta superata fuerit & gracilis reddita. Hanc itaq; uenā necesse est debiliore esse, & hanc corporis partem læsam defectuosiorem. Verū ad longius tempus plerūq; prodest. Non enim amplius morbo apprehenditur, si semel notam impressam susceperit. Quapropter necessario etiam reliquæ uenæ affliguntur, ac partim simul gracilescunt, ut aerem quidem suscipiant, pituitæ autem defluxus non amplius similiter illabatur. Debiliora tamen similiter membra esse uerisimile est uenis afflictiis. Quibuscūq; autem imperfectis & ualde modica pituita defluerit, & ea in dexteris partes, hi citra notā impressionē superuiuunt, uerū periculum est ne morbus cōnutriatur ac simul augeat, si non his quæ commoda sunt curentur. Pueris quidē igitur sic fit hic morbus, aut quā proxime huic modo. Seniores uero non occidit si accedat, neq; distorquet. Nam & uenæ sunt cauæ, & sanguine calido refertæ, quapropter neq; superare potest pituita, neque perfrigerare sanguinem ut congelet ipsum, sed ipsa superatur, ac sanguini cito ammiscetur. atq; sic uenæ aerem suscipiunt, & sapientia contingit, signaq; prædicta minus inuadunt propter fortitudinem. At uero antiquissimis si hic morbus accedat, propterea ipsos occidit, aut leuiter sideratos facit, quia uenæ ipsis sunt euacuatae, & sanguis modicus est ac tenuis & aquosus. Si igitur multum defluerit, & hyemis tempus fuerit, occidit. Suffocat enim respirationes, & sanguinem congelat, si in utranque partem defluxus fiat. Si uero in alteram tantum

tantum, leuiter sideratū facit, Non enim potest sanguis pituitā superare, quū
 tenuis sit frigidusq; ac modicus, sed ipse superatus cōgelatur, ut impotētes fi-
 ant illæ partes iuxta quas sanguis fuerit corruptus. Ad dexteras autē magis de-
 fluit q̄ ad sinistras, quia uenæ sunt cauiiores & plures q̄ in sinistris. Ab hepate
 enim tendunt & liene. Defluit autē & eliquatur pueris maxime, quibus sanè
 caput fuerit percalefactū, siue à sole, siue ab igne, siue etiam derepente in horruē-
 rit cerebrum, etiam tūc pituita secernetur. Eliquatur etenim per calorē ac ceres-
 bri diffusionem, segregatur autē à frigore ac cōcretionē, & sic defluit. Et quibus-
 dam quidē defluxionis causa hæc est. Alijs uero etiam ubi derepente post aqua-
 lonares uentos auster flare cœperit, compactū ac debile cerebrum derepente sol-
 uit ac laxat, ut pituita redundet, & sic defluxū facit. Defluit insuper & ex igno-
 to timore, si quidē timuerint aut aliquo uociferante, aut inter plorandum spiri-
 tum cito reuocare non potuerint, id quod pueris frequenter contingere solet.
 Quicquid sanè horū ipsorum acciderit, statim horret corpus, et æger mutus fa-
 ctus spiritū non trahit, sed spiritus quiescit, & cerebrū compingitur, & sanguis
 cōstitit, & sic secernitur ac defluit pituita. Et pueris quidē hæ ipsæ causæ sunt,
 ut ab initio à sacro morbo corripiantur. At uero senibus hyems infestissima est.
 Quum enim ad multū ignem senex caput & cerebrū percalefecerit, deinde in fri-
 gore uersatus fuerit ac inhorruerit, & ex frigore ad teporē accesserit, & ad ignē
 defederit, idem hoc patitur, ac sic à morbo sacro apprehenditur iuxta prædictū
 modū. Periculum uero multum est ut & uere patiatur idem hoc, si caput fuerit
 insolatum. Minime autē æstate, non enim fiunt repētina mutationes. Postq̄
 uero uiginti anni præterierint, nō amplius hic morbus corripit, præterq̄ pau-
 cos aut nullum, nisi ex puero cōnutritus fuerit. Venæ enim plenæ sunt, & cere-
 brum cōcompactum est, & acerbū ac rigidum, quare nō defluit in uenas: si uero de-
 fluxerit, sanguinem nō superat multū ac calidū existentē. In quo uero à puero
 augmentū cepit ac cōnutritus est, in eo per consuetudinē facit ut in mutationi-
 bus uentorū patiatur, & ut plurimū morbo sacro corripiatur, præcipue austras-
 ti ac humida aeris cōstitutione. Et liberatio difficulter contingit. Cerebrū enim
 humidius q̄ ex natura fit, & præ pituita inūdat, ut defluxiones quidē frequēti-
 res fiant, non autē amplius possibile sit pituitā excerni, neq; cerebrū resicari, sed
 perrigatur & humidū existit. Cognouerit autē hoc ipsum quis maxime ex o-
 uibus hoc morbo correptis, & præsertim capris, Hæ enim frequētissime corri-
 piuntur. Si enim caput ipsarū diffecueris, reperiēs cerebrū humidū esse, & sudō-
 re refertū, ac male olēs. Et in hoc nimirū cognosces quod nō deus corpus affli-
 git, sed morbus. Sic uero se res habet etiā in homine. Quū enim ætatē adeptus
 fuerit morbus, nō amplius curabilis est, cerebrū enim eroditur à pituita ac colli-
 quatur. Id uero qd' colliquatur, aqua fit, & foris cerebrū ambit ac circūalluit, &
 ppter ea frequētius ac facilius à morbo hoc corripiuntur. Propterea uero diutur-
 nus est morbus, quia id quod influit uenis tenue est præ multitudinē, & statim
 superatur à sanguine ac calefcit. Quicūq; uero iam assueti sunt morbo, præco-
 gnoscūt se corripiēdos, & ex hominū frequētia fugiūt, si domus ipsorū in pro-
 pinquo fuerit, ad domū: sin minus, in locū desolatissimū, ubi q̄ paucissimi ipsos
 lapsos sint uisuri, statimq; se obuelāt, idq; faciūt præ pudore affectiōis, nō præ
 timore, uelut multi putāt, dæmonij. At uero pueri primū quidē cadūt ubicūq;
 tandem

tandem cōtigerit prae inassuetudine, Quum autē saepius à morbo corripiātur,
 postq̃ praeferant cōfugiunt ad matres, aut ad aliū maxime notū, prae timore
 ac formidine affectionis. uerecūdari enim pueri nōdum sciūt. Cæterū in mu-
 tatiōib. uentorū propterea morbo sacro corripī cēseo, maxime quidē austrinis,
 postea uero etiā aquilonaribus, deinde etiā reliquis uētis, hi autē sunt qui fortissi-
 mi ex ipsis existūt, & inter se tū statione, tū uiribus cōtrarijssimi. Etenim aquilo
 cōpingit aerē, & turbatū ac nubilosum excernit, et illustriorē ac pellucidū facit.
 Eodē modo etiā alijs omnes uēti ex mari ac alijs aquis proficiscētes. Ex omnib.
 enim rebus, atq; adeo ex ipsis hominib. humiditatē ac tenebrositatē excernūt.
 Quapropter saluberrimus omnīū uentorū aquilo existit. Auuster autē cōtraria
 huic operatur. primū enim incipit aerem compactū liquare ac diffundere, quā
 propter etiam nō statim magnus spirat, sed primū lentus ac lenis est, quoniā ae-
 rem statim superare nō potest, qui prius densus est & cōpactus, sed tēporis pro-
 gressu ipsum dissoluit. Idē porro hoc etiā in terrā operatur et in mare, fluuiosq;
 ac fontes & puteos, & quae ex terra nascūtur, & in quibus humor inest. Est autē
 in omni, in alio plus, in alio minus. Omnia autē hāc uentum hunc sentiūt, & ex
 splendidis tenebrosa fiunt, & ex frigidis calida, & ex siccis humida. Et quēcūq;
 in domibus uasa iuxta terrā sunt cū uinō aut alio quopiā liquore, ea omnia autē
 strū sentiūt, & formā in aliam speciem trāsmutant. Solem uero & lunā ac sydera
 multo hebetiora q̃ ex natura sunt reddit. Quū igitur etiā his quae adeo magna
 sunt ac fortia intantū dominetur, & corpus sentire faciat, ut ex horū uentorum
 alterationibus trāsmutetur, necesse est ab austris quidē solui ac humectari cere-
 brum, & uenas laxiores reddi, ab aquilonis uero flatibus, quod sanissimū est in
 cerebro cōpingi, quod uero morbosissimū ac humidissimū est excerni, & foris
 secus circūalluere, atq; sic defluxus in horū uentorū mutationibus succedere.
 Hoc modo hic morbus fit & floret, tum ab accedētib. tum à decedētib., &
 nullatenus difficilior aut cognitu aut curatu est q̃ alijs, neq; etiā diuiniōr alijs.
 Porro expedit homines nosse, q̃ ex nullā alia nobis parte uoluptates cōtingūt,
 & læticiæ, & iusus & iusus, q̃ ex cerebro. Itemq; moerores & anxietates tristi-
 tiæq; ac eiulatus & querelæ. Et hoc sapimus maxime ac intelligimus, & uide-
 mus & audimus, & cognoscimus turpia & honesta, mala & bona, iucunda &
 iniucunda, partim cōsuetudine discernētes, partim utilitate percipientes. Eodē
 uoluptates & iniucunditates pro opportunitate dinoscimus, & nō eadem nobis
 placent. Eodē & insanimus & deliramus, & terrores & timores nobis acce-
 dunt, partim noctu, partim interdiū, & insomnia, & errores intēpestiui, & curæ
 inanes, & ut nō noscamus adstantes, & defuetudo, & inesperienza. Atq;
 hāc omnia perpetimur à cerebro, quum sanū non fuerit, sed aut calidius q̃ ex
 natura fiat, aut frigidius, aut humidius, aut siccus, aut aliud quid perpetiatur
 prae naturam, & consuetudinē. Et insanimus quidem prae humiditate. Quū
 enim humidius fuerit q̃ pro natura, necesse est moueri, ubi uero mouetur affe-
 ctio, necesse est neq; uisum quiescere, neq; auditū, sed aliās aliud uidere & audire,
 & linguā talia dicere qualia semper ac singulis uicib. uiderit ac audierit. Quā-
 to uero tēpore cerebrū quieuerit, tāto etiā homo sapit. Fit autē corruptio cerebri
 à pituita & bile. Vtriusq; cognitio sic contingit. Qui enim à pituita insaniunt,
 quieti sunt, & nō uociferantur neq; tumultuātur. Qui uero à bile, uociferatores
 sunt

sunt & malefici, & nō quieti, semper aliquid intempestiuū facientes. Si quidem
 igitur assidue insaniunt, hæc ipsis sunt causæ. Si uero terrores ac timōres acce-
 dant, à cerebri transmutatione id cōtingit, transmutatur autē dum calefcit, cale-
 fcit autē præbile, ubi ad cerebrū impetum fecerit ex corpore per uenas hæmati-
 tidas hoc est sanguinarias appellatas. & timor adest donec rursus redierit in ue-
 nas ac corpus, deinde quiescit. Angitur autē homo & inquietudine multa iacta-
 tur intēpestiue, dum cerebrū perfrigeratur, & præter cōsuetudinē cōpingitur.
 Hoc uero à pituita perpetitur, ab hac autē affectione etiā obliuio sus euadit. No-
 du uero clamat & uociferatur, quū derepēte cerebrū percalefiat. hoc autē perpe-
 titur biliosi; pituitosi enim nō percalefiūt; quū sanguis multus ad cerebrū per-
 uenerit et efferbuerit, uenit autē per uenas prædictas: Quū cōtigerit ut homo ui-
 deat insomniū horrendū, et in timore fuerit, uelut etiā si uigilet, tūc magis facies
 ignescit, et oculi rubescūt, quū timuerit, et mēs meditatur aliquid mali operari,
 sic etiā in somnio patitur. Vbi uero expergefactus fuerit, & reliquērit, atq; san-
 guis rursus in uenas prædictas dispersus fuerit, quiescit. Et ppter ea iudico cere-
 brum uim plurimā in homine habere. Hoc enim est nobis eorū quæ ab aere fiūt:
 interpret, si sanū fuerit. Sapientia autē ipsi exhibet aer. Oculi uero & aures &
 lingua, & manus & pedes, qualia cerebrum statuit ac cognoscit, talia submini-
 strāt. Sapientia enim toti corpori cōtingit, prout aere participat. Ad intelligen-
 tia uero internūcius est cerebrū. Quū enim homo spiritū in seipsum attraxerit,
 primū quidē ad cerebrū peruenit, & sic ad reliquū corpus aer dispergitur, relin-
 quēs in cerebro suū ipsius uigorē, & quicquid prudēs ac sapientia præditum fue-
 rit. Si enim in corpus primū perueniret, & posterius in cerebrū, relicta in carni-
 bus ac uenis dinotione ac iudicio, ad cerebrū calidus iam existēs perueniret, &
 nō sincerus ac purus, sed ammixto humore à carnib; et sanguine, ut nō amplius
 exacte sincerus esset. Quapropter dico cerebrū intelligētia ac prudentia inter-
 nūciū ac interpretē esse. Cæterū præcordia aliās fortuitū nomen apud græ-
 cos per consuetudinē habēt, quū phrenes à sapientia dicta uideātur, reuera autē
 nō, neq; ex natura. Neq; ego sanē noui quā uim habeant præcordia, ut sapiant
 & intelligāt, præterq; si homo ex improviso nimio gaudio perfundatur, aut tri-
 stitia afficiatur, tūc sanē exiliūt & anxietatē exhibent præ tenuitate & qd disten-
 ta sunt maxime in corpore, & uentriculū non habent ad quē suscipiant aut bo-
 num, aut malū allabēs, sed ab utrisq; his turbātur, ppter naturæ debilitatē. Nā
 nullo sanē prius sentiūt ex his quæ in corpore insunt, sed frustra hoc nomen &
 causam habēt. Quemadmodū quæ ad cor sitæ sunt aures appellātur, quū nihil
 cōferant ad auditū. Porro dicunt quidā qd corde sapimus, & qd hoc est quod
 angitur, & quod curā gerit. Verū hoc nō ita se habet, sed cōuellitur quidem ue-
 lut præcordia, & magis etiā propter easdē causas. Ex omni enim corpore ue-
 næ ad ipsum tendūt, & cōclusiones habet ut sentiat, si quis dolor, aut collectio
 homini cōtingat. Necesse est enim & dum angitur, in horrere corpus ac disten-
 di, & si quis nimio gaudio perfundatur, idem pati. Quapropter cor quidem &
 præcordia maxime sentiunt, sapientia tamen minime participant, sed omnium
 horum cerebrum causa est. quemadmodū igitur etiam prudentiam ac aerem
 omnium primum ex his quæ in corpore insunt percipit cerebrum, Sic etiam si
 qua mutatio fortior in aere cōtingat, præ tēporibus anni, etiam ipsum à seipso
 diuersum

diuersum redditur in aere. Etenim cerebrum propterea primum sentit, quia etiam morbi in ipsum irruunt acutissimi, & maximi, ac præcipue lethales, & qui difficilem iudicationem habent apud inexpertos. Hic uero morbus sacer appellatus, ex iisdem causis oritur, à quibus etiam reliqui, ab accedentibus nimirum ac decedentibus, uelut frigore, sole, uentis, quæ & transmutantur, & nunquam quiescunt. Hæc autem sunt diuina. Quare nequaquam hunc morbum ab alijs discriminare oportet, neque reliquis morbis diuiniorē putare, sed omnes diuinos omnesque humanos. Naturam autem unusquisque habet & uim in seipso, & nullus nec auxilij nec remedij expers est, & plerique his ipsis curantur, à quibus etiam nascuntur. Alterum enim alterius nutrimentum est, alterius uero perniciēs ac afflictio. Hoc itaque Medicum nosse oportet, & temporis occasionem in singulis pernoscere, quod alterum quidem per alimentum absoluet & augebit, alterum uero detrahet & minuet. Oportet autem tum in hoc morbo, tum in reliquis omnibus, non augere morbos, sed festinare ut ipsos exteramus, id quod aduersissimum est morbo exhibendo, non quod amicum & familiare. A familiari enim & consueto floret ac augefcit, ab aduerso uero & hostili perit & dissipatur. Quisquis autem talem mutationem in hominibus nouit, & humidum ac siccum facere potest hominem, calidum item ac frigidum per dietam, hic utique & hunc morbum sanauerit, si occasionem eorum quæ conferunt pernoscet, citra expiamēta ac incantationes, citraque omnem aliam huiusmodi machinamentorum absurditatem.

HIPPOCRATIS COI DE MOR-

BIS, LIBER. I. IANO CORNARIO

Medico Phifico interprete.



VI de sanatione recte inquirere uelit, percunctantique respondere, & contradicere recte, eum hæc animaduertere oportet.

Primum quidem à quibus omnes morbi hominibus fiunt. Deinde uero qui morbi necessario ubi facti fuerint, aut longi sunt aut breues, aut lethales aut non lethales, aut aliquam corporis partem mutilent, aut non mutilent, & qui postquam orti sunt dubij sint, an mala ab ipsis euentura sunt, aut bona. Et à quibus morbis ad quales transitus fiat. Et quæ per fortuitum successum medici ægrotos curantes faciunt. Et quæ bona aut mala ægrotantes in morbis perpetiuntur. Et quæ importune aut dicuntur, aut fiunt à medico ad ægrotum, aut ab ægrotato ad medicum. Et quæ exacte fiunt ac dicuntur in arte. Et quæ recta in ipsa, & quæ non recta. Et quod ipsius principium, aut finis, aut medium, aut aliud quid eiusmodi demonstratum, quod recte habet ut in ipsa sit, aut non sit. Et quæ parua & magna, & multa & pauca. Et quod omne in ipsa unum est, & omnia quod unum. Et quæ fieri possunt intelligereque ac dicere. et si opus sit, neque intelligere, neque dicere, neque facere. Et quod facilitas in ipsa sit, & quod difficultas, & quod opportunitas, & quod intpestiuitas, & quibus alijs artibus similis sit, & quibus nihil similis sit. Et de corpore, quod calidum sit aut frigidum, aut siccum aut humidum. Et quod forte aut debile, aut densum aut rarum. Et quæ multa, pauca fiunt, aut in peius, aut in melius, Et quod honeste aut turpiter, aut tarde aut cito

cito, aut recte aut non recte. Et quod malū supra malum fieri necesse est. Hæc animo uersantem obseruare oportet in sermonibus, quantū quis ab his delinquat, aut in dicendo aut percunctando, aut respōdendo. Et an quæ multa sunt, pauca dicat, et an quæ impossibilia sunt, possibilia esse asserat. Et quicquid sanè etiā aliud dixerit ac aberrarit, hac ratione obseruare oportet, & in cōtradictio ne aggredi & impetere. Morbi quidem igitur uniuersi sunt ex his quidē quæ in corpore insunt, tum à bile, tum à pituita. Ab externis uero, à laboribus et uulneribus. Sed & à calido & supercalefaciente, & à frigido ac superfrigefaciēte, & sicco ac superresiccante, & ab humido ac superhumectante. Et bilis quidē ac pituita unā cum nascentibus gignuntur, & sunt in corpore aut plus, aut minus. Morbos autem exhibent, partim à cibis & potibus, partim à calido supercalefaciēte, & à frigido superfrigefaciēte. Necessitatē autē talia habēt, ut fiant hæc quum ipsa fiunt, uelut uerbi causa. In uulneribus eos qui crassos neruos sauciatos habent, necesse est claudos fieri. Itemq; si musculorū cāpita saucia sint, præsertim eorum qui sunt in femoribus. Moritur autem si quis cerebro sauciatus fuerit, aut spinali medulla, aut hepate, aut præcordijs siue septo transuerso, aut uesica, aut uena sanguiflua, aut corde. Non moritur autē uulneratus in his partibus, in quibus hæc membra non insunt, sed ab his longissimè absunt. Ex morbis uero tales necessitatem habent, ut ab ipsis perimantur quum fiant, Ta-
bes, Aqua inter cutē ac subter carnem nascēs, & si mulierem fœtum in uterō habentem peripneumonia id est pulmonis inflammatio corripiat, aut febris ardens, aut pleuritis siue lateris inflammatio, aut phrenitis id est membranarum cerebri inflammatio, aut Erysipelas ignis sacer appellatus, in utero fiat. Dubij autem morbi, ut & perdant, & non, tales sunt, peripneumonia, febris ardens, phrenitis, pleuritis, angina, uua, hepatitis, splenitis, nephritis, dysenteria, in muliere fluxus sanguinolentus. Tales uero nō lethales sunt, nisi quid ipsis accedat, affectiones fluidæ circa articulos, atra bilis, podagra, coxendicum morbus, tinea, nesimus qui est uoluntas egerendi ineuitabilis, quartana, tertiana, strangulatus urinæ, lippitudo, lepra, impetigo, morbus articularis, Multi autem frequenter ab his mutili fiunt, sideranturq; manibus ac pedibus, & linguæ impotētes redduntur. Et ab atra bile quidam leuiter siderantur. Claudii uero à coxendicū morbo fiunt. Oculi autem & auditus mutilantur à pituita obfirmata. Longos autem necesse est esse, tabem, dysenteriam, podagram, affectiones fluidas circa articulos, pituitam albam, coxendicum morbum, urinæ strangulatum, in senioribus uero Nephritim. Mulieribus uero fluxum sanguinolentū, hæmorrhoidas ani, fistulas. At uero febris ardens, phrenitis, peripneumonia, angina, uua, pleuritis, cito decernunt. Transitus autem fit in his, ex pleuritide in febrem ardentem, ex phrenitide in peripneumoniam. Verū ex peripneumonia febris ardens non fit, ad dysenteriam tinea nesimus accedit, & à dysenteria, lienteria siue leuitas intestinorū, sequitur: ex lienteria in aquam inter cutē transitus fit, & ex pituita alba in aquam inter cutē, & ex peripneumonia ac pleuritide, in pectoris suppurationem. Mala porro supra mala fieri necesse est, uelut si rigor corripuerit, ardor igneus superuenit. Et si neruus dissectus fuerit, conuulsionē facit, & ut dissectus neq; coalescat, & fortiter inflammetur. Et si cerebrum cōcussus fuerit ac doluerit eius qui percussus sit, necesse est euestigio mutū fieri, &

neq; uidere, neq; audire. Si uero sauciatum fuerit, febrem necesse est superuenire, & bilis uomitum, & aliquam corporis partem sideratam fieri ac perire. Si uero omentū exciderit, necesse est putrefieri. Et si sanguis ex uulnere aut uena effluerit, in supernum uentriculū, necesse est ipsum in pus conuerti. Tem-

porum autem occasiones, ut in summa dicam, multæ sunt & uarię in arte, quę admodum etiam morbi & affectiones, & horum curationes. Maxime uero res pentinæ sunt, in his quibus animo defectis opitulari oportet, & qui neq; urinā neq; sterces egerere possunt, & qui suffocātur, & si mulierem parientē aut sauciatam liberare oportet. & quęcūq; eiuscemodi. Et hæc quidem occasiones res pentinæ sunt, & paulo posterius nō sufficiūt. Pleriq; enim paulo posterius perirent. Occasio uero est, si horum aliquid perpetiatur homo, & quis antequam animam efflet opituletur, hoc totū ex occasione opitulatur. Est quidem igitur fermē hæc occasio etiam in omnibus alijs morbis. Semper enim in quocūq; sanē quis opituletur tempore, ex occasione opitulatur. Quicūq; uero morbi, aut uulnera non ad mortem tendunt, sed temporarij sunt ac periculosi, doloresq; in ipsis fiunt, uerū possibile est ut cessent, si quis recte medeatur: His sanē non profunt auxilia à medico adhibita, quā adhibeantur. Nam & non præsentē medico utiq; cessassent. Alij uero morbi sunt, quibus occasio est ut curentur matutina diei hora, nihil autem refert an ualde mane, aut paulo posterius.

Alij morbi sunt quibus occasio est, ut semel in die curentur, nec refert quo tempore id fiat. Alij per tertium, aut quartum diem curantur, & alij semel per mensem, & alij per tertium mensem, nec refert an id ipsum tertij augmēto uel fine fiat.

Tales itaq; occasiones sunt, in quibus non aliam q̃ hanc certitudinem habent. Intempestiuitas autem hæc est, si quæ mane curari oportebat in meridi die curentur. Propter eā uero intempestiue curātur, quia inclinationē ad peius habent, propter curationem nō in tempore factam. Quęcūq; etiam citius siue in meridiē, siue uesperī, siue noctu curentur, intempestiue curantur. & si uere curari oporteat, curentur autem hyeme, aut si hyeme oporteat, curentur aut æstate: aut si quod iam curari oportet, id ipsum differatur, aut quod differre oportet, id ipsum iam curetur. Talia omnia intempestiue curantur. Recte porro & non recte in ipsa hæc fiunt. Non recte quidem fit, si morbum alium existentem, alium esse pronūcies, & magnum existentē, paruum dicas, & uicissim paruum, magnum. & si superuicturū, non superuicturum pronūcies, & periturū non periturū. Et si suppūratum existentē non cognoscas, nec morbum magnum in corpore nutriri cognoscas. & si medicamēto aut potionē quis opus habeat, quo ipsi opus sit non cognoscas. & si quæ sanari possunt nō sanes, & quæ sanatu impossibilia sunt, te sanaturū recipias. Atq; hæc quidem circa sententiā non recte fiunt. Circa chirurgiā uero hæc. Pus in ulcere aut tuberculo existens nō cognoscere: & fracturas ac luxationes nō cognoscere, & specillo admoto ad caput non cognoscere an os fractum sit: & fistulam in uesicā immisā demittere non posse, & lapidem in uesica existentē non cognoscere: & suppūratum existentem ex cōcussione non dinoscere, & secando aut urendo, aut a profunditate, aut a longitudine aberrare, aut urere & secare quæ non oportet. Et hæc quidem non recte. Recte autē fiunt hæc. Morbos cognoscere qui sint, & a quibus, & qui ipsorum longi, & breues, & lethales & non lethales, & qui transiuntur

tantur, & qui augescunt, & qui minuuntur, & qui magni, quicq; parui. & dum curas possibiles quidem curare, impossibiles uero scire cur curatu sunt impossibiles. & dum curas eos qui tales habent, per curationē quantum possibile est opitulari. Quæ uero offeruntur ægrotis, ea sic obseruare oportet, recte ne an secus fiant, ueluti si quis quæ siccare oportet, humectet, aut si crassificare oportet, non exhibeat à quibus crassitudo inducitur, aut si quæ attenuare oportet, non attenuet, quæ frigefacere, non frigefaciat, quæ calfacere, non calfaciat, quæ putrefacere, non putrefaciat, & reliqua iuxta eandem rationem. Talia autem sua sponte ac casu hominibus in morbis fiunt, tum bona, tum mala. Febrienti ac bilioso, in tēpore foras dispersa bilis, bonū: diffusa uero ac dispersa sub cutem, toleratu leuior est habēti, & curatu facilior sananti, diffusa autem ac dispersa & ad unam aliquam corporis partem allapsa, malum. Alius turbata in pleuritico aut peripneumonico, aut suppurato, malum. Febrienti aut uulnerato alius resiccata, malum. Subaquofo ac liēnoso ab alba pituita detēto, alius fortiter turbata, bonum. Erysipelas si extra diffusum intro uertatur, malum. Si uero intra diffusum foras uertatur, bonum. A profluuiio alui forti correpto, uomitus superueniens, bonum. Mulieri sanguinem uomenti menses erumpere, bonum. A fluxione uero infestata, ad nares aut os fluxionem transire, bonum. Mulieri à cōuulsione pressæ ex partu, febrem superuenire, bonum. Et tetano ac cōuulsione occupantē, igneum ardorem superuenire, bonum. Talia enim per nullam medicorū ignorantiam, aut scientiam, fiunt, & non fiunt, sed sua sponte ac fortuito casu fientia, & profunt, & nocēt, iuxta eandem rationem. Cæterum Medici talia per fortuitū successum bona, in curatione faciunt. Nimirum si medicamento sursum purgante dato, & sursum & deorsum probe purgant. Et si mulieri medicamēto dato, quod bilem aut pituitam deorsum purgat, menses alias nō fluentes erumpant. Et si liēnem suppuratum habenti medicamentū dederint, quod bilem ac pituitam deorsum purget, & sic pus deorsum à liēne expurgent, & à morbo liberent. Et si medicamēto exhibito calculoso, calculum in urinarium meatū præ pharmaci uolentia protrudant, ut per urinam eijciatur. Et si medicamentū dederint quod pituitā sursum purgat, ei qui pus in superiore uentriculo in tuberculo habet, nō scientes quod habet, isq; pus uomat ac sanus fiat. Et si eum qui ex medicamēto sursum purgante superpurgatur, sua sponte aluo subter erumpente, à uomitu sanum faciant.

At uero Mala operantur Medici præ infortunio hæc. Si pharmaco bilis aut pituitæ sursum ductiuo dato, uenam in pectore præ uomitu rūpant, ei qui prius nullum manifestum dolorē in pectore habuit, atq; sic fiat morbus. Et si mulieri in utero habenti medicamentū superne purgans exhibeant, alius autē inferne erumpens foetum expellat. Et qui suppuratum curat, si alius proflua fiat, ipsum perdit. & qui oculos curat ac sublinat, si dolores incendant acutiores, & si ita contingat, rumpantur oculi & destruātur, accusant medicum quod oculos subleuit. Et si puerperæ in uentris dolore medicus aliquid det, & male habeat aut pereat, medicus in culpa est. Ferre autem quæcunq; necessitatē habent ut fiant in morbis ac uulneribus mala supra mala, ea ubi fiūt, in medicum culpam reijciunt, & necessitatem talia fieri cogentem nō agnoscunt. Et si ad febricitantem aut uulnus habentem ingressus, ad motis q̄ primum remedijs non opitus

letur, sed postera die æger peius habeat, medicum accusant. Si uero opituletur, non æqualiter laudant. Oportere enim ipsum perpeti putant, ulceraq; inflammati, & in morbis quibusdam dolores fieri oportere, neq; tales esse ut ne fiant. Nervus præcisus ac dissectus non coalescit, neq; uelica, neq; aliquid ex tenuibus intestinis, neq; uena sanguiflua, neq; tenuis genæ pars, neq; pudendi pellicula. Porro principium sanationis demonstratum quidem non est, quod sane recte principium sit uniuersæ artis, neq; secundum aliquid, neq; mediū, neq; finis. Sed incipimus ab ea aliquando dicentes, aliquando operantes, & desinimus eodem modo. Et neq; dicētes ex iisdem sermonibus incipimus, neq; si de iisdem dicamus, neq; in iisdē desinimus. & operantes iuxta eandem rationem, neq; ex iisdem operibus incipimus, neq; in iisdem desinimus. At uero facilitas ac promptitudo in his est. Quum quis secās aut urens, neq; neruum secet, neq; uenam. Et si suppuratum urat, pus consequatur. Et si secet, eodem modo. Et fracturas recte componere. Et si qua pars corporis ex natura excidat, ut ipsam recte ad naturam retrudat. Item apprehendere fortiter ea quæ oportet, & apprehendendo premere. Et apprehendere leniter ea quæ oportet, & apprehendendo non premere. Et in obligando tortuosa non facere ex rectis, neq; premere quæ non oportet. Et in contactu ubicūq; tandem contigerit, dolorem ex superfluo non exhibere. Hæc quidem igitur facilitatis ac promptitudinis existunt. At uero digitis decenter attingere, aut probe, aut nō probe, aut longis, aut breuibus, aut probe deligare omnes deligaturas, non ad artem pertinere iudicatur de facilitate ac promptitudine, sed seorsim. Quicunq; suppurati sunt pulmone, aut superiore uel inferiore uentre, aut tubercula habent, siue in superiore uentre siue inferiore, aut in pulmone, aut ulcera intrinsecus, aut sanguinem uomunt aut spuunt, aut dolorem aliquem habēt, uel in pectore uel in dorso: Hæc omnia habent ex his quidem quæ in corpore insunt, à bile & pituita: ab externis uero ab aere insito calori ammixto. Sed & à laboribus ac uulneribus. Et quicunq; quidem pulmone suppurati sūt, ab his fiunt. Si peripneumonia correptus in iudicatorijs diebus nō purgetur, sed relinquatur in pulmone sputum ac pituita, suppuratus fit. Et si quidem statim curatus fuerit, ut plurimum effugit, si uero neglecta fuerint illa in pulmone, corrūpitur, illis & inhærentibus & putrescentibus, ulceraturq; pulmo & suppuratus fit, & non amplius intro ad seipsum nutrimentū memorabile trahit, neq; quicquam depurgatur ab eo sursum, sed suffocatur, & semper amplius difficulter spirat, & respirādo stertit, & respirat illinc sursum ex pectore, tandem uero obturatur à sputo, & moritur.

Fit autem & suppuratus, si pituita ex capite ad pulmonem destillet, & primum quidem ut plurimū latenter defluit, tussimq; tenuem exhibet, & sputum paulo amarius solito, & aliquando tenuis adest calor. Temporis autē progressu, exasperatur pulmo, & intus exulceratur à pituita inhærente ac putrescente, & grauitatem exhibet pectori, & dolorem acutum ante & retro, caloresq; acutiores in corpus incidunt, & pulmo à calore trahit ad se pituitam ex toto corpore: & maxime ex capite. Caput uero calefactum ex corpore, & hanc putrescentem subcrassam spuit. Quanto uero magis tempus progreditur, tanto magis pus sincerum spuit, & febres acutiores fiunt, & tussis frequens ac fortis, & interdum uexat, & tandem alius inferne turbatur. Turbatur autem à pituita. pituita

uero

uero de capite descēdit. Hic quum ad hoc peruenerit, perit quemadmodum dictum est in superioribus, purulento ac putrido pulmone factō, aut uentre infra erumpente. Fit præterea & ab his pulmo suppuratus. Quum uenula uidelicet aliqua in ipso fuerit rupta, rumpitur autem à laboribus: & ubi rupta fuerit, sanguinem fundit, si quidem crassior fuerit, amplius, sin tenuior, minus, & sanguinem quidem ipsum partim cōfestim spuit, partim uero nisi uena adstringatur, in pulmonem funditur, & in ipso putrescit, & ubi putrefactus fuerit pus facit. progressu uero temporis aliquando pus sincerū, aliquādo pus subcruentum, aliquando sanguinem, & si magis repleta fuerit uena, ipsam sanguinis copiam aceruatiū à seipsa reuomit, spuiturq; pus crassum ab accessoria & intus putrescente pituita. Hic si anticipetur incipiente morbo, priusquam uena sanguinem fundat ac fortiter laxetur, & priusquam attenuetur, & in lecto decumbat, & caput corrumpi incipiat, & reliquū corpus colliquari, superstes ab hoc morbo euadit. Si uero neglectus fuerit, & hæc occuparint, ut ea perpetiatur aut omnia, aut plurima, perit, perit autem hic aut ex iisdem quæ superius dixi, aut à uomitu, sanguine multo multoties per uomitum reiecto. Si uero uena omnino quidem rupta non fuerit, uerum acutus tractus in ipsa fiat, fit autem maxime uelut uarix, qui etiam statim ubi factus fuerit, dolorem quandam tenuem inducit, ac tussim aridam. Si uero diu durauerit & neglectus fuerit, primum quidem sanguinem modicum ac subnigrum dimittit ac reijcit, deinde uero adhuc copiosiores & sincerissimum, deinde pus, patiturq; quæcunq; in superioribus dicta sunt. Conducit autem talibus, si ab initio curandos suscipias, ut & uenæ de manibus sanguinem emittant, & diæta à qua quàm siccissimus & exanguissimus fiat. Eodem porro modo etiam uenæ in latere afficiuntur, quæ intus in superficie sitæ sunt. Quum igitur affectæ fuerint, uariæcosæq; factæ, & intus eleuatae, & neglectæ fuerint hæc perpetiuntur. Erumpunt & spuiunt à se sanguinem, & aliquando etiam uomunt, & suppurati fiunt, & ut plurimum pereunt. Si uero curētur incipiente morbo, rursus in loco uenæ confidunt ad latus, humilesq; fiunt. Et pulmo ab his suppuratus redditur, & ab ipso etiam talia perpetiuntur, & sic moriuntur. Cæterū superiore uentre suppurati multipliciter fiunt. Nam quum pituita de capite copiosa & aceruatiū in superiorem uentrem fluxerit, putrescit & in pus uertitur. Putrescit autē maxime in diebus uiginti una. Hoc igitur pus concutitur & intus fluctuat ad latera allabens. Hic si uratur aut secetur priusquam diuturnum fiat pus, sanus plerumq; euadit. Fiunt autem & superiore uētre suppurati ex pleuritide, quū fortis fuerit, & in iudicatorijs diebus neq; putruit, neq; spuito reiecta est, sed latus exulceratum fuerit à pituita affixa, & bile, & quum ulcus factum fuerit, reddit de se pus, & ex uicinis locis præ caliditate in seipsum pituitam adducit, & hæc ubi computruit, pus spuitur. Aliquando uero etiam ex uenis sanguis se in ulcus ingerit, & putrefactus pus fit. Hic si euestigio assumatur, sanus plerumq; fit, si uero negligatur, perit. Fiunt præterea suppurati etiam, si pituita de capite delapsa, ad latus adglutinata fuerit & putruerit. Tunc enim latus ut plurimum inflammatur, & patitur eadem quæ ex pleuritide suppuratis. Fiunt & quū præ labore, aut exercitijs, aut alio quopiam modo, uena ante aut retro fuerit

rit rupta, & sic rupta ut non statim spuat sanguis, sed in carne acutus tractus siue uarix fiat: & caro tracta ac conuulsa humiditatem modicam traxerit, & sub liuida facta fuerit: & statim quidem sic affectus nō percipit prae robore ac bona habitudine, aut si etiam sentit, nihil molesti esse putat. Hic ubi deprehenderit, quum iam prae febris, aut potu, aut uenere, aut aliqua alia re correptus, fuerit attenuatus, caro sauciata subresiccatur & subcalescit, & humiditatem in seipsam à uicinis tum uenis, tum carnibus trahit. Vbi autē attraxerit, intumescit & inflammatur, & dolorē exhibet tenuem, & tussim raram & siccam primum. Deinde adhuc magis trahit in seipsam, & dolorem inducit uehementiorem, & tussim frequentiore. Et primum quidem subpurulentum spuit. Aliquando uero liuidum & subcruentum. Et quanto magis tempus progreditur, amplius in seipsam trahit ac putrefacit. et de ipsa carne quantū ab initio liuidum erat, hoc pus fit: & dolorem acutū exhibet, & febrem, & tussim multam ac frequentem, & per sputum sincerum pus expuit. Si uero pus in uētre moram traxerit, totū corpus ab ipso calescit. Maxime uero uicinissimæ partes. Calescens autē corpore, humiditas maxime eliquatur. Et quæ quidem à supernis partibus eliquatur, in supernū uentriculū maxime confluit, & pus fit, ad hoc quod iam in ipso est. Pars uero eius etiā in infernum uentriculum fluit: & quandoque alius ab ipsa turbatur, & hominem perimit. Nam cibi ingesti secedūt in concocti, & alimentum ab ipsis corpori non accedit. Et sputi sursum purgatio non æqualis contingit, aluo nimirum calefacta, & omnia deorsum trahente in seipsam. Et à sputo quidem suffocatur & stertit, dum nō purgatur: à uentre uero fluente debilitatur, & plerūque perimitur. In huiusmodi autem morbis hunc fluxum maxime exhibet caput, utpote quod cauius est, & superne situm. Quum enim ab aluo fuerit calefactum, tenuissimā pituitam de corpore in seipsum trahit. Vbi uero hæc in ipso fuerit collecta, reddit rursum acervatam & crassam, uelut dictum est: & pars quidem ipsius in supernum uentriculum defluit, pars uero in infernum. Quum igitur caput fluere inceperit, & reliquum corpus colliquari, non amplius æqualiter, ne uisti quidem, superstitēs etiā diunt. Superant enim supra pus influentia mala, ea quæ defluunt: & carnes liquefcunt magis à malis, quàm nutriuntur ab ingestis. Qui uero huiusmodi morbos habent, partim ab his breui pereunt, partim diutius tempus extrahunt. Differt enim corpus à corpore, & ætas ab ætate, & affectio ab affectione, & tempus à tempore, in quo ægrotarint: & aliqui maiorem tolerātiā in morbis habent, alij omnino ad tolerandum impotentes sunt. Proinde certitudo exacta temporis in quo pereunt nō est, an longum, aut breue futurum sit. Neque enim hoc tempus certum est quod quidam definiunt: & plerūque neque hoc ipsum suppurat. Differt enim & annus ab anno, & tempus à tempore. At si quis de ipsis recte cognoscere ac dicere uelit, is cognoscet omni tempore, & perire, & superstitēs euadere, & pati quæcumque tandem patiantur. Cæterum inferno uentriculo suppurati fiunt, maxime quidem quum pituita aut bilis acervata inter carnem & cutem collecta fuerit. Fiunt autem & à conuulsionibus, quum uenula conuulsa rupta fuerit, sanguis effusus putrescit & suppuratur. Si uero caro conuulsa fuerit, aut cōtusa, sanguinem ex uenis sibi ipsi propinquis trahit, atque hic putrescit

rescit ac suppuratur. His si quidem foras de se significationem præbuerit & eruperit pus, sani fiunt. Si uero sua sponte intro proruperint, pereunt. At uero diffusum pus in uentriculo inferno, ueluti in superno dictum est, generari haudquaquam poterit, sed uelut à me dictum est, in tunicis & in tuberculis innascitur. Et si quidem intro notas habuerit, cognitu difficile est. Neque enim ex concussione cognoscere licet. Cognoscitur autem maxime ex dolore ubi fuerit, & si terram figulinam, aut aliud quid huiuscemodi imposueris, breui id resiccat.

Erysipelas autem in pulmone fit, ubi pulmo fuerit nimium resiccatus, id quod contingit ab ardore, & à febribus, & à labore, ac intemperie. Et quum superresiccatus fuerit, plurimum sanguinis in seipsum trahit, maxime quidem & plurimum ex magnis uenis. Hæ enim ipsi uicinissimæ sunt, ac ipsi incumbunt. Trahit etiam ex alijs uicinis. Et tenuissimū ac debilissimum trahit. Postquam autem traxit, febris ex ipso fit acuta, & tussis sicca, & repletio in pectoribus, & dolor acutus in anterioribus ac posterioribus partibus, maxime circa spinam, nimirum magnis uenis percalefactis: Et uomunt aliquando subcruentum, aliquid quando liuidum. Vomunt item pituitā & bilem, & frequenter animo linquuntur, propter sanguinis transmutationē derepente cōtingentem: atque hoc maximum signū est Erysipelatis in pulmone generati, & si assidua febris inuasio cōtigerit. Huic si quidem duobus aut tribus aut quatuor ad summum diebus, id quod intus est diffusum fuerit ac transierit foras, plerumque sanus euadit. Si uero non diffundatur ac foras transeat, intus putrescit, & suppuratus fit ac perit. Perit autem breui, utpote pulmone toto suppurato ac putrido. Si uero foras diffusum, intro uertatur & pulmonem corripit, huic nulla uitæ spes reliqua est. Quum enim antea resiccatus pulmo, traxerit in seipsum, non amplius dimittit, sed statim ab ardore, & siccitate, nihil amplius suscipit, neque quicquam sursum distribuit, sed corrūpit. Tuberculum in pulmone fit hoc modo, quum pituita aut bilis coacta putrescit. Et quandiu quidem adhuc crudius fuerit, dolorem exilem, ac tussim siccam inducit. Postquam autem maturum factum fuerit, dolor & ante & retro acutus fit, & calores corripunt, ac tussis uehemens.

Et si quidem quàm citissime maturuerit, & eruperit, & pus sursum uertatur, ac totum expuatur, & uenter in quo fuerat pus, contrahatur ac resiccetur, penitus sanus euadet. Si uero ruptum quidem fuerit quàm celerrime, & maturatum, ac repurgatum, uerum penitus resiccare non poterit, sed ipsum tuberculum à seipso pus produxerit, & à capite sanè tunic, itemque reliquo corpore pituita ad tuberculum defluens putrescit, & pus fit, ac expuitur, per quod homo perimitur. Perimitur autem à uentre fluente, ab his quæ antea relata sunt, & loquente ipso ac intelligente omnes res, æque ut in priori tempore, resiccatur ac perfrigeratur, cōnniuentque uenæ in corpore omnes, utpote sanguine ex ipsis à febre exusto: quandoque uero etiam præ temporis longitudine, ac morbi magnitudine, tum malorum iam præsentium, tum eorum quæ insuper accedunt. Quod si multo tempore rumpi non possit, neque sua sponte, neque à medicamentis, consumitur debilitatus à doloribus uehementibus, & inedia, & tussi, & febribus, & ut plurimum perimitur. Si uero iam attenuato, & in lectū reclinato, pus eruperit, neque sic ualde reualescunt, sed tali modo perimuntur. At si

eruperit quidem quàm celerrime, & maturuerit, maturatum autem multa fuit parte ad septum transuersum effundatur, statim quidem melius habere sibi uideatur. Verum progressu temporis si quidem totum per sputum reiecerit, & uentriculus in quo pus inerat, cōsidat ac resiccetur, sanus euadit. Si uero & tempus longius protrahatur, & ipse debiliior fiat, & per sputum reicere nequeat, sed uisus fuerit aut sectus, & pus exeat, statim quidem & sic melius habere sibi uidetur, uerum tempore procedente perimitur ab iisdem quæ prius relata sunt. Porro in latere fiunt tubercula, & à pituita & bile, eadem ratione qua in pulmone.

Fiunt etiam à laboribus, quum uena aliqua tracta rupta fuerit, non tamen penitus rupta, sed ita ut acutus tractus in ipsa factus sit. Siquidem igitur rupta fuerit, statim sanguis è uena effusus putrescit & suppuratur. Si uero acutus tractus in uena fiat, principio quidem dolorem exhibet ac pulsat, progressu uero temporis distribuit uena sanguinem in carnem, atque hic in carne putrescens, pus fit. Eodem modo & caro, si quidem magis doluerit, & sanguinis plus in seipsam trahit ex uicinis uenis, & statim suppuratur. Si uero minus doluerit, tardius & trahit, & suppuratur. Quibusdam autem quum debiles facti fuerint tractus in carnibus, aut uenis non suppuratur, sed fiunt dolores diuturni, & uocantur Ruptiones. Et quæ quidem in carne fiunt, hoc modo fiunt. Quum caro afflictæ fuerit, aut conuulsa, aut percussa, aut aliud quid perpeffa, liuida uelut antea dixi sit, non sincero sanguine, sed tenui & aquoso, eoque modo dico. Quum autem plus solito fuerit resiccata, percalescit & dolorem exhibet, & à uenis ac carnibus uicinis humiditatē in seipsam trahit: & ubi nimium fuerit humectata, atque ea ipsa humiditas ubi à carne fuerit supercalescens, per totum corpus dispergitur, qualis est attracta, magis tamen in uenas dispergitur quàm in carnes. Venæ enim magis trahunt quàm carnes. Trahunt tamen etiam carnes. Quando uero ad multam in corpore humiditatē, modicā de carne attracta fuerit, obscura iam fit, & doloris exors, & pro morbida cum tempore sana euadit. Si uero caro magis fuerit percalescens, & ampliorem humiditatem traxerit, dolorem exhibet: & ad quamcunque corporis partem ab ipsa processerit ac firmata fuerit, dolorem inducit acutum, & aliqui putant ipsis ruptionem transmutatam esse, uerum hoc fieri non potest. Propinquissima uero ulceri sunt quæcunque talia & alia. At humiditas de carne exilit per uenas, quum autem percalescens, & crassa, & copiosa facta fuerit, dolorem exhibet, donec similis fiat reliquæ humiditati, in tenuitate ac frigidityte. Quæcunque uero in uenis fiunt, sic habent. Ipsa quidem uena in quantum tracta est, in loco manet. Quum autem tracta fuerit (trahitur autem ac conuellitur à labore & uiolentia) fit ueluti uariæ. Percalescit autem & trahit in seipsam, liquidam quādam humiditatē, quæ est à bile ac pituita. Et ubi mixta fuerint sanguis & humiditas de carne, crassescit sanguis, & multipliciter ipse seipso, ea parte qua uena conuulsa est, & morbosior fit, & amplius stabilior. Et quum copiosior factus fuerit, plenitudo ipsa trans migrat, quocunque tandem contigerit, & dolorem inducit acutum, ut aliquibus uideatur ruptio locum permutasse. Et si contigerit ut ad humerum transferatur, & grauitatem in manu inducit, & torporē ac segniciem. Et si quidē ad uenam pro ruperit, aut ad humerum & dorsum tendat, dolor plerumque statim quiescit. Fiunt porro

porro conuulsiones & à laboribus, & lapsibus, & à plaga, & si quis onus maius leuet, & à cursibus & lucta, & eiusmodi omnibus. Quicunque uero à uulneribus suppurati fiunt, aut ex hasta, aut pugione, aut iaculo, intro sauciati fuerint, quandiu quidem habuerit ulcus respirationem foras, per antiquum uulnus, & hac parte frigidum in seipsum adducit, & calidum à seipso hac parte emittit, & sanè facile tū pus, tum si quid est aliud expurgatur. Et si quidem & interna & externa pars simul fuerint sanatae, sanus penitus homo euadit. Si uero externa quidem sanata fuerit, interna uero non, suppuratus fit. Et si etiam sanatae simul sint interna ac externa pars, cicatrix autem intus debilis fiat, & aspera ac liuida, reulceratur quandoque, atque sic suppuratus fit. Rursus exulceratur etiam si quid amplius laborarit, & si attenuatus fuerit, & si pituita aut bilis ad cicatricem affixa fuerit, & si alio morbo correptus attenuatus fuerit. Vbi uero ulcus factum fuerit, siue hoc modo, siue ubi externa pars priusquam interna coaluit, dolorem acutum inducit, & tussim, & febrem: & frigiditate ipsum sibi ipsi ulcus inducit, eo quod amplius calidum existat: & ipsum à seipso caliditatem effiat, & pus expurgatur, & per longius tempus curatur, & tardius sanescit: quandoque uero neque sanescit. Nam caro, & ulcus, ab ardore qui est in corpore coquitur, & nimium humectatur, ut non possit neque siccari, neque carnem producere, neque sanari. Sed cum temporis progressu moritur, patiens talia quae etiam prius dicta sunt. At si contingat ut crassarum uenarum aliqua saucietur, & sanguis intro fluat ac putrescat, suppuratus fit. Et si quidem hoc pus totum per spiritum reiectum fuerit, & uena sauciata coaluerit, & ulcus intus ac foris sanatum fuerit, penitus sanus euadit. Si uero neque ulcus intus coalescere poterit, neque uena constringatur, sed alias atque alias sanguinem remittat. Et si statim uomatur & spuatur, aut etiam putrescat, & pus expuatur, plerumque perimitur, aut statim sanguinem uomens, aut posteriori tempore, dum perit ab ipsidem quae antea dicta sunt. Saepè uero hi quibus uenarum aliqua intus saucietur à uulneribus, aut quibusdam laboribus, aut exercitijs, aut alia quadam causa, quum coaleuerit & sana esse uidetur uena, alio tempore iterum rumpitur, idque ab ipsidem contingit causis, à quibus etiam prius patiebatur. Vbi uero iterum rupta est, sanguinem fundit, & statim pereunt sanguinem multum ac saepè uomentes (aut alias atque alias sanguinem recentem uomunt) pus autem spuantes per omnem diem multum ac crassum, tali aut consimili modo pereunt, uelut etiam in alijs morbis dictum est. At uero in his ac similibus morbis multum refert, quantum ad facilem ac difficilem curationem, uir sit an mulier qui morbum habet, iuuenis an senex, & mulier iuuenula an anicula. Et praeterea tempus à tempore differt in quo aegrotant. Interest item an ex alio morbo aegrotent, aut non ex alio. Differt etiam affectus ab affectu, maior à minore, & corpus à corpore, & curatio à curatione. His autem sic inter se differentibus, necesse est etiam tempus diuturnitatis differre: & alijs longius fieri, alijs breuius: & alios perire, alios non: & morbos alijs durabiles esse & maiores, alijs minores & breuijs temporis: alijs permanere usque ad senectutem & commori, alias perire ab ipsis breui. Et qui quidem iuniores patiuntur eas affectiones, quae à laboribus fieri dictae sunt, hi & ampliores & uehementiores ipsas patiuntur, & magis quam alij dolent, & statim in ipsis manifestae fiunt, ut sanguinem aut spuant,

aut

aut uomant. Sed & quædam fientia fallunt ipsos, præ bona corporis habitudine. Seniores autem raro quidem patiuntur, & si patiantur, debiles ipsas perpetiuntur, utpote ipsi debiliores existentes, & remittunt magis ipsis, & affectionum maiorem curam gerunt. Fiunt igitur ab initio omnino minus seniori quam iuniori, & ubi factæ fuerint, seniori debiliores fiunt, iuniori uehementiores. Et iuniori quidem, utpote qui habet corporis uigorem & siccitatē, & carnem densam ac robustam & ad ipsa ossa assidentē, cute circum ipsam circūtentā: quum aliquid amplius laborarit, solito magis & derepente, cōuulsiones uehementes fiunt, & ruptiones multæ ac omnigenæ uenarum ac carniū. Et horum aliqua statim manifesta fiunt, aliqua posteriori tempore cōparent. At senioribus uigor fortis non inest, & carnes circum ossa diffiunt, & cutis circum carnes: & ipsa caro rara est ac debilis, & neq; tale quid pati possit similiter senior ueluti iunior. Et si quid patiatur, leuiter patitur, & statim manifestū redditur. Atq; ins tantum quidem in affectionum principio, iuniores senioribus difficilius liberantur. Quum uero morbus conspicuus factus fuerit, & aut pus, aut sanguinem, aut utrunq; expuerint, qui quidem iuniores sunt, quum corpus ipsorum sit robustum ac densum, non æqualiter depurgari possunt ab ulceribus, quorū pus in superno uentriculo existit. Nam & pulmo non ualde trahit ad arterias, ut qui densior sit: & arteriæ quum tenues & arcuæ sint, pus non suscipiunt, nisi modicum & raro. Quare necesse est pus in thorace, & in ulceribus coaceruari & crassum fieri. At seniori & pulmo rarior ac cauior est, et arteriæ ampliores, ut pus non diutius in uentriculo & ulceribus moretur, & quicquid eius in super generatum fuerit, hoc totum necessario sursum attrahitur à pulmone ad arterias, & statim expuitur. In iuniore igitur, utpote quū sint affectiones uehementiores, & purgatio pro sputi ratione nō fiat, & febres acutiores & frequentiores fiunt, & dolores acuti incidunt, tum in ipso affectionis loco, tum in reliquo corpore: nimirum quum uenæ sint robustæ ac sanguine plenæ. Vbi uero hæ percalescunt, dolores ab ipsis transiliūt aliās ad aliam corporis partem. Ac hi quidem plerunq; breui perimuntur. Senioribus uero quū affectiones sint debiliores, & sputum ab ipsis purgetur, & febres mitiores, ac paucae fiunt, & dolores adsunt quidem, uerū exiles. Et ab huiusmodi affectionibus ne senes quidem penitus liberantur. sed longō tempore afflicti pereunt. Et aliquando pus spuunt, quandoq; sanguinē, quandoq; neutrū, tandemq; cū his moriuntur. Moriuntur autē hoc modo, quū ipsos morbus aliquis huic quē antea habent consimilis apprehēdit, ita ut & hunc habeant, & is quē prius habent uehementior fiat, & ut plurimum pereūt. At uero morbi qui hos morbos efficiunt, maxime sunt pleuritis & peripneumonia. Febris porro ab his fit. Quum bilis aut pituita calefacta fuerit, totum reliquum corpus ab his calescit, & uocatur hoc febris. Calescit autem bilis & pituita, intrinsecus quidem à cibis & potibus, à quibus etiam nutritur ac augetur. Extrinsecus autem à laboribus ac uulneribus, & à calido nimium calefaciente, & à frigido nimium frigefaciente. Calescit item à uisu & auditu, Verum minimum ab his. Rigor autem in morbis fit quidem & ab externis, uentis, aqua, serenitate, & alijs huiusmodi. Fit autem & ab ingestis cibis ac potibus, Maxime uero & uehementior fit, quum bilis & pituita sanguini fuerint permixta, aut altera ex his, aut utraq; Magis ta-

men si pituita sola permixta fuerit. Est enim pituita frigidissima ex natura. Calidissimus autē sanguis. Frigidior est etiam aliquāto bilis sanguine. Quū igitur hi humores ambo, aut alter solum, permixti fuerint ad sanguinem, ipsum congelant, non tamen omnino. Neq̃ enim uiuere posset homo, si sanguis densior & frigidior seipso multis modis fieret. Frigescente igitur sanguine, necesse est & reliquum totum corpus perfrigerari, & ubi huiusmodi quid factum fuerit, rigor appellatur. Et si quidem uehemens fiat rigor, uehemētiore est etiam tremor. Nam dum contrahuntur uenæ, sanguine & coacto & cōgelato, corpus & contrahunt, & tremere faciunt. Si uero minus aliquanto sanguinis coactio fiat, hoc rigor appellatur. Horror autē dicitur debilissimus rigor. Quod autem post rigorem necessario corripiat febris, aut maior, aut minor, sic habet. Quum sanguis percaluerit, & uim depulerit, ac rursus ad suam naturam redierit, concalescit simul & pituita, & bilis sanguini permixta. Et sanguis ipse seipso multipliciter calidior euadit. His igitur percalefactis, necesse est febrem succedere post rigore, præ sanguinis caliditate. Sudor uero fit hac de causa. Quicūq; morbi in iudicatorijs diebus iudicātur, & febrilis ignis dimittit, in his de pituita & bile quod tenuissimum est eliquatur & secernitur, & secedit partim extra corpus, partim intus & isthic in corpore relinquitur, partim præ caliditate attenuatur, & uapor fit, & cum spiritu permixtum foras procedit. Atq; hæc quidem huiusmodi sunt, & ab his sudor generatur. Quare uero quādoq; calidus, quādoq; frigidus est, ita contingit. Calidus quidem de percalefacto malo, & exusto, & attenuato, & debili, & non ualde multo secernitur, & necesse est ipsum calidiorem ex corpore excerni. Frigidus autem de ampliore malo secernitur, & de eo quod reliquum est & adhuc ualidum, & nondum putrefactum, neq; attenuatum, neq; exustum, & frigidior ac crassior & graueolentior prodit. Manifestum autem hoc ex hac re fit. Qui frigidum sudorem exudant, è longis morbis, plerunque ægrotant, inualecente malo eo quod in corpore relinquitur. Qui uero calidum sudorem excludunt, citius à morbis liberantur. Pleuritidis & Peripneumonia fiunt hoc modo. Pleuritis quidem, quum portiones acerrimate & fortes ualde corripiunt. Percalescit enim totum corpus ac humectatur à uino. Maxime autem & bilis & pituita percalescit ac humectatur. Et sanè his cōmotis ac humectatis, continget ut rigor inuadat ebrīū siue sobriū. Et quum latus natura carne nudū sit, præ omnibus corporis partibus: & nō sit quicquā in ipso quod renitatur, præter uētriculi cavitatem: maxime rigore percipit. Et quū riguerit ac perfrigeratū fuerit, tum caro quæ est in latere, tum uenæ, contrahuntur ac conuelluntur. Et quantū in ipsa carne inest bilis ac pituitæ, aut in uenis quæ in ipsa carne sunt, id magna ex parte, aut totū secernitur, introq; cōpellitur ad caliditatē, carne extrinsecus cōdensata: atq; id ad latus affigitur, & dolorem uehementē exhibet, & percalescit: & per caliditatē trahit ad seipsum, à uicinis uenis ac carnibus, pituitā ac bilē. Atq; hoc sanè modo fit. Vbi uero ad latus affixa putruerint, & per sputum reiecta fuerint, sani fiunt. Si uero & antiquum multum affixum fuerit ad latus, & aliud insuper accesserit, statim pereunt, præ saluæ copia expuere nequeūtes: aut suppurati fiunt, & partim pereunt, partim euadunt. Indiciū autem hæc de se præbent in septem diebus, aut nouem, aut undecim, aut quatuordecim: dolorem quoq; inducunt ad humerum, & ad clauiculam

uiculam, & ad alas, hac de caussa. Vena quæ splenitis appellatur, tēdit à splene ad latus, à latere uero ad humerum & sinistram manū. Hepatitis autem ad dexterās partes eodem modo: & quum huius in latere pars à rigore contracta fuerit, & sanguis in ipsa horruerit, ad alas & clauiculam ac humerum concedit, & conuellit ac dolorem inducit. Eodem modo & loci circa dorsum, ab affixo ad latus humore pituitæ ac bilis percalescunt: & quandoq; dolorem locis infra latus exhibent. Sæpe uero si ad infernas partes conuertatur, dolorem per uenas ad uesicam distribuit, multūq; ac biliosum æger mingit. Arbitratur autem huius morbi caussam ac principium rigorem esse. Peripneumonia fit quum cōmota ac calefacta pituita ac bile, pulmo præ caliditate traxerit in seipsum de uicinis locis, ad ea quæ iam sunt in ipso. Et percalfacit quidem totum corpus ac dolorem exhibet, maxime autē dorso, & costis, & humeris, ac spinæ: nimirum ab his in seipsum attrahens plurimā humiditatem, & superresiccantur hæ partes, & nimium calescunt. Postquā autem attraxit in seipsum, & tum bilis, tum pituita, sedem in pulmone occupauit, putrescit ac suppuratur. Et si quidē in diebus iudicatorijs putrefacta per sputum reiecta fuerint, æger superstes euadit. Si uero & ea quæ ab initio aduenerunt susceperit, & alia in super accefferint, & neq; spuens, neq; putrefaciens superarit, præ copia eorum quæ in super accedunt, ut plurimum moriūtur. Si uero ad dies perueniant duos & uiginti, & febris remittat, & in his per sputum purgati non fuerint, suppurati fiunt. Fiunt autem maxime ex his, quibus & pleuritis & peripneumonia uehementissima existit. Fit autem & peripneumonia & pleuritis sine sputo, ambæ ex eadem caussa, præ siccitate. Siccāt autem & calida, ubi nimium calfaciunt: & frigida, ubi nimium frigefaciunt. Cōgelatur autem latus, & quæ sunt in ipso uenæ, & conuellitur. & quātum in ipso inest pituitæ aut bilis, id à caliditate resiccatur, & dolorem inducit, & à dolore febrem. Huic uenam secare conducit in manu splenitidem appellatam, aut hepatitidē, iuxta utram sanē fuerit morbus. Atq; sic dolor mollior fit, & lateris, & aliarum partium. Nam uena & quātum in ipsa inest bilis ac pituitæ, & ipsius sanguinis ægrotantis unā cū his magnam partem foras dimittit. Pars uero ex carne per medicamenta & potiones diffunditur, & à calefactorijs forinsecus adhibitis, ita ut morbus per totū corpus dispergatur. Vocatur autem hæc pleuritis sine sputo. Peripneumonia uero quum pulmo etiā ipse superresiccatus fuerit, & quantum in ipso inest bilis aut pituitæ, neq; putrefacit æqualiter, neq; per sputum reddit: & quantum in ipso est humiditatis, aut à potu, aut à sorbitione, aut à uicinis locis, hoc totum exurit, præ nimia siccitate ac caliditate. Huic potiones bibere conducit, à quibus pulmo humectatur, ac sputum reijcit. Si enim sputum non reiecerit, & durior fit, & coarctat, & hominē perimit. Febris ardens corripit magis biliosos, corripit item pituitosos. Corripit autem hoc modo. Quum bilis cōmota fuerit per corpus, & contigerit ut uenæ & sanguis attrahant bilem, eamq; plurimā ex carnibus ac uentriculo, ad eum qui prius inest, utpote quum etiā natura calidissimus sanguis in corpore existat. Quū itaq; percaluerit ex carnibus & uentriculo, supra eum qui iam inest, adhuc magis à bile, percalfacit etiā reliquū corpus. Et quædam sanē partes præ multa humiditate, penitus resiccati non possunt. Si uero resiccatae fuerint, homo moritur. Extremæ uero corporis partes, utpote natura

sicce

siccæ, resiccantur, & plurima humiditas ex ipsis exurit: & si ipsas contingere velis, frigidas comperies ac siccas. Quapropter hi qui à febre ardente corripuntur, internis quidem partibus à febre exuruntur, externis autem frigidi sunt. Et lingua ac fauces ab interno spiritu ac caliditate exasperantur & arescunt.

Quantum autem in uentriculo & in uesica inest bilis, quod quidem in uentriculo est, aliquando deorsum exturbatur, plerumque uero in primis diebus uomitur, aut in quatuor aut quinque. Vomitur autem hac de causa. Quum supernus uentriculus supercalefactus fuerit, attrahit in seipsum, & fit uomitus. Et ob hoc ipsum etiam ex febre ardente, & ex pleuritide, ad peripneumoniam maxime morbi transmutantur. Vbi enim supernus uentriculus supercalefactus fuerit, trahit in seipsum, & suscipit pulmo, & fit peripneumonia: & plerumque pereunt, nimium debiles iam existentes, & morbo alio nouo insuper generato, dies transigere nequeunt, donec sputum in pulmone concoquatur. Verum ut plurimum pereunt præ debilitate. Aliqui tamen euadunt. At quibus in uesicam confluit quid bilis, his crassa urina mingitur, crassa autem à pituita, Biliosa uero alui egestio prodit, eo quod combusta sint ea quæ sunt in uentre.

Phrenitis hoc modo se habet. Sanguis qui est in homine, maximam partem ad prudentiam confert, quidam dicunt totum. Quum igitur bilis commota ad uenas & ad sanguinem ingressa fuerit, sanguinem ex consueta compage ac motione dimouet, & serosum facit, ac calfacit. Calefactus autem, etiam reliquum corpus totum percalefacit, & desipit homo, & non sibi constat, præ febris copia, & sanguinis ad serositatem transmutatione, & motione non solita contingente. Assimiles autem sunt maxime hi qui phrenitide tenentur, his qui ab atra bile delirant. Nam & hi ubi sanguis ex bile & pituita corruptus fuerit, morbum habent, & demones fiunt. Aliqui uero etiam insaniunt. Et qui phrenitide correpti sunt eodem modo. Tanto autem minor insania ipsumque delirium fit, quanto paucior ac debilior est bilis quam pituita.

Porro subcruentum & liuidum est sputum in pleuritide ac peripneumonia, idque ob hanc causam. Principio quidem plerumque neutrum sputum, neque liuidum, neque subcruentum, unde nosse conuenit morbum uehementem esse. Quum autem sputum subcrassum spuere coeperint, tunc maxime purgantur. Sputum autem id à distentione uenarum, in pleuritide quidem earum quæ sunt in latere: in peripneumonia uero earum quæ sunt in pulmone: & caliditate ad seipsam affectio trahit. Si uero agro abscessus fuerit ruptus, ac purulentus fuerit, prima mox die sanguinem, & pus subcruentum ac liuidum cum saliuâ spuit. Liuidum autem fit à sanguine, si modicus ad multam saliuam ammixtus fuerit, & non statim spuatur, sed semiputrefactum & effoeminatum in corpore manet. Moriuntur autem ex pleuritide, ubi & multum pituitæ ac bilis ab initio lateri fuerit affixum, & multum insuper ex reliquo corpore affluerit, & neque spuens, neque putrefaciens superarit, præ materiæ affluētis copia. Implentur autem arteriæ ab his quæ insunt, pituita ac pure. Deinde stertit, & frequenter, & illinc statim respirat, tandem uero omnia obturantur, & moritur. Eodem modo ex peripneumonia pereunt. Quicumque uero ex febre ardente moriuntur, omnes præ siccitate moriuntur. Et resiccantur primum quidem extremæ ipsorum partes, manus ac pedes. Deinde partes sicciores. Vbi autem humiditas ex corpore penitus fuerit exusta ac resiccata, sanguis quidem congelatur penitus ac perfrigeratur. Reli-

r quum

quum uero corpus exsiccatur, ac sic homo moritur. At ex phrenitide ita perit. Desipiunt in hoc morbo semper, nimirum sanguine corrupto, & ex consuetudine motione emoto, & quum desipiant, nihil eorum quæ ipsis exhibentur accipiunt, quod saltem memoratu dignū sit. Quum uero progressum fuerit tempus, marcescunt ac imminuti consumuntur, tum ex febre, tum quod nihil alantur. Et primū quidem extremæ partes cōsumuntur ac perfrigerantur. Deinde ipsis proximæ. Sed & frigiditatis, & febris, & dolorū principium hoc habet. Quū sanāguis qui est in uenis perfrigeratus fuerit à pituita, transmutatur & cōuellitur ac ceruatim aliàs aliā parte, & tremīt. Tandē uero omīa perfrigerantur, & moritur.

HIPPOCRATIS COI DE MOR-

BIS, LIBER II. IANO CORNARIO

Medico Physico interprete,



MVLTVM urinæ emittitur ubi caput nimium incaluerit. Liquefcit em̃ in ipso pituita, liquefcēs autē secedit partim ad nares, partim ad os, partim per uenas quæ ducunt ad pudendum. Quum autem ad pudendum peruenerit, mingit homo & patitur quemadmodum ab urinæ stillicidio. Cæcutiunt autem quum ad uenas in oculis peruenerit pituita. Aquosior enim fit uisus & turbulētiōr, & splendor in oculis non similiter splendidus est, neq; in ipso comparet si uidere uoluerit, similiter sicut ante quū splendidus & purus esset. Hic in quadraginta diebus maxime sanatur. Si uero longo tempore postea morbus reuertatur, cutis capitis crassescit, et reliquū corpus attollitur, & crassescit, ac bonū colorem habet. Hæc pituita ad carnes conuertitur, & ab hac crassus esse uidetur. Nā carnes quū sint perrigatæ & eleuatæ ac rariores, sanguinē ex uenis trahūt, & propterea bene colorati esse uidentur.

Alius morbus. Caput ulceribus impletur, & corpus intumescit, & color morbi regij est, & aliàs aliā corporis parte ulcera erūpunt: et febris aliàs atq; aliàs corripit, & ex dorso aqua fluit. Huic quum in capite pituita subbiliosa cōnutrita fuerit, ulcera fiunt ubi sinciput pituita & bile perrigatū fuerit, & ubi pituita rara & aceruata fuerit, itemq; bilis. Hæc enim consistit, putrescit, & exulceratur. Attenuata uero pituita ad aures penetrat. At in reliquo corpore ulcera eadem ratione qua in capite fiunt, sanguine & bile putrefactis quacuncq; in parte fuerint collecta. Hæc enim parte caro putrescit & exulceratur, & accedentem pituitam ac bilem in super putrefacit, & fit pus. **Alius morbus.** Dolor circum circa caput uexat, & uomit bilem, & difficulter mingit, & desipit. Hic caput quidem dolet, præ nimia eius calefactione. Desipit autem quum sanguis in capite à bile aut pituita fuerit calefactus, & plus solito cōmotus. Vomit autem bilem, utpote cōmotā ipsa in corpore. Et caput præ caliditate trahit in seipsum, & crassissimum quidem uomit, tenuissimū uero in seipsum trahit. Mingit autem & in hoc morbo ab iisdem, uelut etiam in superiore dictum est.

Alius morbus. Si circa cerebrum uenulæ supereuomant, nomē quidem rectū morbo non est. Neq; enim fieri potest ut aliqua uena, siue parua, siue magna supereuomat. Nominant tamē & dicunt superuomitum. Si uero etiam

quām.

¶ maxime supereuomāt, morbum ab hoc ipso fieri nō est uerisimile. Nam à bono malum fieri non potest, neq; a malo utiq; bonum fiat. Neq; rursus bonum plus iusto fieri potest. Verū supereuomere uidētur, quū ad uenas bilis aut pituita ingressa fuerit. Eleuātur enim uenæ & pulsant, & dolor per totum caput dispergitur, et aures sonitū percipiunt ac nihil audiunt. Et sonitum quidē percipiunt, utpote uenis pulsantibus & palpitantibus. Tunc enim sonitus est in capite. Grauius autē audiunt, partim præ interno strepitu ac sonitu, partim quū cerebrum & uenæ circa ipsum eleuātur. Præ nimia enim caliditate, uacuā circa aurem partem cerebrū de seipso implet: & quū æqualis aeris copia nō insit, uelut priore tempore, neq; æqualem sonum exhibeat, ea quæ dicuntur non æqualiter se imprimunt, atq; ex hoc grauem auditū habent. Hic si quidem erumpat ipsi ad nares, aut ad os aqua & pituita, sanus fit. Si uero non erumpat, septima die maxime moritur. At si in capite uenæ supereuomāt, id quod ab ipsdē fit quæ & prius relata sunt. Signū uero qd tali modo supereuomant hoc est. Quū quis aut manum, aut caput, aut aliam quandā corporis partem, hoc patientē incidat, sanguis niger profluit, & turbatus ac morbosus: quanquā neq; sanguis nominari iuste mereatur, nisi tunc quum rubicundus ac sincerus fluit. Quū itaq; supereuomant ab ipsdē causis, dolor & uertigo, & grauitas caput occupāt. Dolor quidem, præ nimia sanguinis caliditate. Vertigo uero, quū acruatus ad faciē procefferit sanguis. Grauitas autem, quod copiosior sanguis fit in capite, & turbulentior ac morbosior, q̄ intrinsecus. Cerebri corruptio.

¶ Si cerebrum corruptum fuerit, dolor ex capite spinam occupat, & ad cor animi deliquiū procedit, & sudor adest, & somni expers est, & ex naribus sanguis fluit. Sæpe etiam sanguinē uomit. Corruptum autē cerebrum tali modo, quum aut nimium calefactus aut perfrigeratus, biliosus aut pituitosus plus solito factus fuerit. Vbi uero horū aliquid perpessus fuerit, etiam spinalem medullam supercalefacit. Et quū etiam hic percalefcit, dolorē spinæ inducit. Animo uero linquitur homo, quū pituita aut bilis ad cor cōsistit. Consistere autē necesse est cōmotis ac humectatis. Sudor autē fit præ dolore. Sanguinē uero uomit, quum uenæ quæ sunt in capite, à cerebro fuerint calefactæ: quæ uero circa spinam sunt, à spina. Spina autē à spinali medulla. Medulla uero à cerebro, unde sanè originem trahit. Quū igitur calefactæ fuerint uenæ, & sanguis in ipsis efferebuerit, quæ quidem in capite sunt uenæ, distribuunt ipsum ad nares, & ad os: quæ uero circa spinam sanguifluæ, in corpus. Hic tertia aut quinta die plerūq; perit. Alius morbus.

¶ Derépente dolor occupat caput, & statim uox interceptitur ac sui impotens fit. Hic in septem diebus moritur, si non febris inuasit. Si enim hæc inuasit, sanus euadit. Patitur autem hæc, quū atra bilis ipsi in capite cōmotā fluxerit, maxime in partem in qua plurimæ sunt uenæ, in colū ing. ac pectus. Deinde postridie sideratus fit ac impotēs, sanguine nimirum perfrigerato. Et si superior euaserit, ita ut sanguis caleseat, siue ab his quæ exhibentur, siue à seipso, attollitur & diffunditur ac mouetur, & spirationem inducit, & spumescit, & à bile separatur, & sanus euadit. Si uero superior non euaserit, adhuc magis perfrigeratur: & ubi penitus perfrigeratus fuerit, & calor ex ipso defecerit, congelatur, & moueri nō potest, sed moritur. At si ex ebrietatibus hæc patiatur (nam & hoc contingit) itidem moritur.

Caries ossis capitis.

QUum caries facta fuerit in osse, dolor ex osse corripit. Temporis autē progressu cutis de capite alia atq; alia parte discedit. Talia uero patitur is cui in secunda ossis lamina, pituita superueniēs resiccata fuerit. Hac enim parte rarum fit, & omnis humiditas ex ipso deficit, & quia aridum est, cutis ab ipso discedit. Hic morbus lethālis non est. Alius morbus. Si sideratus fiat, anteriorem capitis partem dolet, & oculis nō æqualiter uidet, & soporatur, & uenæ pullant, & febris debilis tenet, & corporis impotentia. Hic patitur hæc, quum uenæ in capite fuerint calefactæ, & calefactæ pituitā in seipsas traxerint. Et principium quidem morbi ex hoc fit. Anteriorem uero capitis partem ideo dolet, quod uenæ in hac sint crassissimæ, & cerebrū ad anteriore capitis partem magis situm est q̄ ad posteriorem. Et oculis ideo non uidet, procūbente eō cerebro ac inflammato. Impotentiæ uero ideo corpus occupant. Postquam uenæ pituitam in seipsas traxerint, necesse est præ pituitæ frigidityte, sanguinem magis nunc sisti ac perfrigeratum esse q̄ priori tempore. dum autem sanguis non mouetur, fieri non potest ut nō etiam corpus quiescat ac torpeat. Et si quidem sanguis ac reliquum corpus superarint, ita ut calefant, homo euadit. Si uero pituita præualuerit, sanguis magis perfrigeratur ac congelatur. Et si frigiditytas ac congelatio augeant, penitus congelascit ac perfrigeratur homo, & moritur.

Angina.

ANGINA siue Cynanche fit, quum pituita in capite cōmota acruatim deorsum fluxerit, & in maxillis ac circa collum cōstitit. Hic neq; saluam de glūtire potest, respirat autem uiolenter ac sterit, & aliquando etiā febris ipsum corripit. Et morbus sanē ex hac caussa fit. & aliquando sub ipsam linguam, aliquando paululum supra pectus.

Vua morbus.

VUA fit quum pituita de capite ad gurgulionem descenderit, & gurgulio præceps dependet, ac fit rubicundus. Temporis autem progressu, nigrescit. Nigrescit autem hoc modo. Venosus est gurgulio ac crassus, & postquam inflammatus est, calefit: & præ caliditate sanguinem ex uena adtrahit, ac ab ipso nigrescit. Quapropter si non turgentem feces, statim inflammantur. Nam uena calefacit, & præ caliditate partes circa gurgulionem sanguine replet, & breui suffocantur.

Tonsillæ ac uicinæ partes.

TONSILLÆ, & partes sub lingua, & gingiuæ, & lingua, & quæcūq; huiusmodi hoc loco consistunt: hæc omnes partes ex pituita ægrotant. Pituita autē de capite descendit. Caput autem ex corpore trahit. Trahit autem ubi fuerit calefactū, percalefit autem à cibus, & sole, & frigore, et laboribus ac febrili calore. Quum uero calefactum fuerit, tenuissimum ex corpore ad seipsum trahit, Vbi uero traxerit, rursus id ad corpus descendit.

Morbi à capite fientes.

QUum repletum fuerit caput, & ab aliquo ex relatis percalefactum, torpor caput tenet, & frequēter mingit, & alia patitur quæ ex urinæ stillicidio cōtingere solent. Idem per nouem dies hæc patitur. Et si quidem per nares aut aures, aqua & mucus erumpat, à morbo liberatur, & urinæ stillicidium fedatur, mingitq;

mingitq; citra dolorem, urinam multam & albam, ad uiginti dies. Et dolor capitis cessat, & intuenti splendor ex oculis subtrahitur, & dimidiatas rerum facies se uidere putat. Hic quadragesima die penitus sanus euadit. Multis uero quodq; morbus redit, septimo aut decimoquarto anno. Et capitis cutis ipsi crasse scit, & ad tactum cedit. & de paucis cibis tener ac bene coloratus apparet, & non acutum auditu habet. Quum ita habentem offenderis in principio morbi, priusquam erumpat aqua per nares & aures, & tenuerit ipsum dolor, derafo capite utrem coriaceum circum frontem deligare oportet, aqua plenum calidissima, quantum sustinere potest, atq; hinc ipsum calefieri permittere, & ubi perfrigeratus fuerit, alium adhibere. Si uero hinc debilitetur, desistere ac tempore interposito eadem repetere, donec remiserit dolor. Et si aluus non egerat, infusum per clysterem immittere, & urinam cientibus in potu datis, aquam mulsam aquosam insuper bibendam exhibere. & calore q̄ maxime foueatur. Sorbeat autem succum prisanæ tenuem. Si uero uenter non subeat, mercurialem in aqua coctam terito, ac succu excolato, & de ipso, ac de prisanæ succo, parem mensuram permisceto, & modicum mellis adijcito. Hunc succum ter in die sorbeat, & uinum mellei coloris, aquosum, album modicum, a sorbitione insuper bibat. Postquam autem eruperint ipsi per nares mucosa, & urinā crassam eiecerit, & a dolore capitis liberatus fuerit, utre amplius ne utatur, sed multa calida lotus, urinam cientia, & aquam mulsam aquosam bibat. Et primis quidē diebus melleum delingat, & cucurbitam edat, aut betas per triduum. Deinde cibis utatur mollissimis ac q̄ maxime per aluum subeuntibus, ita ut semper modicu ad cibos priores addat. At ubi quadraginta dies præterierint, (sedatur enim morbus maxime in tanto tempore,) capite ipsius purgato, prius medicamento exhibito, ipsum deorsum purgato, si tempus anni hoc permittat. Deinde serum ad dies septem bibendum dato, aut pauciores, si debilis existat. Si uero morbus reuertatur, fomento per totum corpus adhibito, postridie ueratrū bibendum dato. Deinde quanto tempore tibi uisum fuerit intermittito, & tunc capite purgato, medicamento deorsum purgante exhibito, crustas octo capiti inurito. duas circa aures, duas in occipitio, hinc atq; hinc ad ceruicis neruum, duas in naso circa angulos oculorum. Venæ autem circa aures urendæ sunt, donec pulsare definant. Ferramentis uero cuneoli forma paratis obliquas uenas perurito. Atq; hæc ubi feceris, sanitas continget. Alius morbus. Vlceribus impletur caput, & crura intumescunt, uelut ab aquæ potu, & in tibias tumor infartitur, & si premas, color morbi regij apparet, & ulcera aliās alia corporis parte erumpunt, maxime tamen circa tibias, & malum aspectum præ se ferunt. Vbi uero inflammatione liberata sunt, cito sana fiunt. & febris aliās atq; aliās corripit. Caput autem semper calidum est, & ex auribus aqua fluit. Quum ita habet, medicamentum ei dandū est, a quo pituita & bilis sursum purgatur, si quidem frigus fuerit, præfoto ac calida loto. Deinde tribus diebus interpositis caput purgato. Postea etiam deorsum purgans medicamentum bibendum dato. Si uero tempus anni ferat, etiam serum postea bibat. Sin minus, lac asininum. Post purgationes cibis quam paucissimis, & quam maxime per aluum subeuntibus utatur, & non lauet. Si uero caput exulceratur, fecem uini ad smegma faciendum comburito, & glandis corticem tritum leuigatum ammisceto, & pari

nitro ammixto, his defricus multa calida lauetur. Inungat autem caput baccis lauri tritis, & gallis, & myrrha, & thure, & argenti flore, adipēq; suillo ac oleo laurino. His permixtis inungatur. Post hoc autem tempus uomitibus utatur bis in mense, & exerceat se ac calida lauet. At si his adhibitis, ex reliquo quidem corpore morbus fuerit exclusus, uerum in capite ipsi ulcera adhuc fiant, rursus capite purgato, medicamentum deorsum purgans postea bibendū dato. Dein de raso capite, fissuras raras incutito, & ubi sanguis effluerit confricato. Postea lanas succidas uiño imbutas superligato, & postquā exolueris, spongia detergito, et ne humectato. Deinde oleo sublito cupressum inspergito. Laneis autem deligamentis donec sanus fiat utatur. Alius morbus. Dolor caput corripit, & si paululum moueatur, bilem uomit. Quandoq; etiam urinam difficulter emittit, ac desipit, & septima die quandoq; moritur: & nona quoq; ac undecima, septimam transgressus, si non eruperit per nares aut aures. Si uero eruperit, euadit. Fluit autem aqua subbiliosa. Deinde temporis progressu putrefacta pus fit. Quum igitur ita habuerit, quandiu quidem dolor tenuerit in principio, priusquam ex naribus ac auribus erumpat, spongas aqua calida imbutas cito capiti admoueto. Si uero his non laxetur, utre utaris eodem modo uelut in superiore morbo. Bibat autem aquam mulsam aquosam. Sin minus, aquam de farina crassa in ipsa macerata. Sorbeat ptisanā quoq; succum, & uinum album aquosum insuper bibat. Postquā uero per aures eruperit, & febris ac dolor remiserit, cibus utatur per aluum subeuntibus, à modicis initio facto, semper aliquid addendo. Et caput calida lauetur: & aures colluat aqua pura, & spongiā melle tinctā indat. Si uero neque sic resiccetur, sed diuturna fluxio fiat, collutione facta, argenti florem, sandaracham, cerusam, singula æquis portionibus trita leuigataq; in aurem indito, eamq; expleto, & si quid præterlabatur, de medicamento amplius superaddito. Vbi uero resiccata fuerit auris, expurgato ac medicamentum eluito. Postea (obfurescit enim primum resiccata) lenibus fomentis aures foueto. Nam & sic uix ac longo tēpore sedabitur. Moriuntur autem etiam, si dolor in aure fuerit, & nihil in septem diebus eruperit. Hunc multa calida lauato, & spongas aqua calida imbutas exprime, & tepidas ad aurem appone. Si uero neq; sic erumpat, auri fomētum adhibeto. Sorbitionibus autem ac potionibus iisdem utatur quibus in superioribus.

Alius morbus. Si aqua in cerebro fuerit, dolor acutus per sinciput ac tempora emergit, aliās alio loco: & rigor ac febris aliās atq; aliās, & regiones oculorum dolet, & cæcutit, & pupilla finditur, & ex uno duo se uidere putat, & si surrexerit, uertigo ipsum corripit, & uentū non sustinet, neq; solem: & aures tinniunt, ac inter audiēdum strepitu offenditur. & uomit saliuam ac pituitam, quandoq; etiam cibos: & capitis cutis attenuatur, & contactu gaudet. Quum sic habuerit, primum dandum est ipsi medicamentum quod sursum pituitam educit, & postea caput purgato. Deinde interposito tempore medicamentū deorsum purgans bibendum dato. Postea cibus quā maxime aluum subeuntibus ipsum rescito, semper modica addendo. Postq; uero comederit iam cibos sufficientes, uomitibus ieiunus utatur, lenticulæ decocto mel & acetū miscens, & olera antea comedens: & in die illa qua uomuerit, primum cyceonem bibat tenuem. postea ad uesperam cibus modicis utatur, & non lauet, & à cibus deambulet

bulet, itemq; mane, uitans uentum ac solem, & ad ignem ne accedat. Et si quidem talia faciens, sanus fiat, bene est. Sin minus, uere ubi ipsum prius purgari primum ueratro, postea etiam in nares medicamentum infundito, & pauco tempore interposito deorsum purgato. Deinde cibus reficito. Postea inciso capite iuxta sinciput, ad cerebrum usq; perforato, & ueluti sectionem ac perforationem curato.

Alius morbus. Rigor, dolor, & febris per caput, maxime ad aurem, & ad tempora, & ad sinciput, & oculorum regiones dolet, & supercilia ipsi incumbere uidentur, & grauitas caput detinet, & si quis ipsum mouerit minget, & multum ac facile mingit. & dentes torpent, & stupor ipsos tenet, & uenae attolluntur ac pulsant in capite, & non potest quietus esse, sed anxius est ac desipit pra dolore. Huic si quidem per nares aut aures eruperit, aqua profluit subpurulenta, & sanus euadit. Sin minus, plerumque in septē diebus moritur.

Hic morbus maxime fit ex febre lypyria, quum liberatus à febre, nondum purgatus, aut cibus se impleuerit, aut inebriatus fuerit, aut in sole laborarit. Quum sic habuerit, primum sanguinem de capite mitto, undecūq; tibi uisum fuerit. Et post sanguinis missionem, raso capite perfrigatoria ipsi adhibeto. Et si alius non subeat, infusum per clysterem immittito. In potu uero ptisanæ succum frigidum dato, & aquam insuper bibendam. Si uero ad perfrigatoria non remittat, trāsmutatione facta, utre utitor ac calefacito. postquam autem quieuerit dolor, cibus utatur aluum subeuntibus, & ne impleatur. Vbi uero uigesimalium diem attigerit sedato dolore, fomento capiti ipsius adhibito, ad nares medicamentum apponito, et interposito triduo medicamentum deorsum purgans exhibeto.

Alius morbus. Si uenae circa cerebrum sanguinem supereuomuerint, ac cerebrum calefecerint, febris emergit fortis, & dolor ad tempora, & sinciput, ac posteriorem capitis partem, & aures tinniunt ac flatu implentur, & nihil audit, & anxius est, & seipsum pra dolore iactat. Hic quinta aut sexta die moritur. Quum sic habuerit, caput ipsius calefacito. Si enim per aures aut nares aqua eruperit, mortem effugit. Si uero sex dies euaserit, uictum ipsi uelut in superiore morbo constituito.

Alius morbus. Si uenae superuomuerint in caput, dolor grauis totum caput tenet, & ad collum, & alias ad alias capitis partes transit. Et ubi surrexerit, uertigo ipsum corripit, febris autem non inuadit. Quum igitur sic habuerit, derafo capite si non calefactorijs cesserit, frontem ea parte qua capillus desinit à capite findito: ubi uero secueris disparata ac diducta cute, quum sanguis defluerit, salem tenuissimum inspergito: & postquam effluerit sanguis fissuram cōponito, & duplici filo totam ipsam includito. Deinde splenium cera ac pice illitum, ulcri imponito, & lana fordida superimposita deligato, & ad dies septem ne soluito, si non dolor uexet: si uero dolor adsit, exoluito. Donec autem sanus fiat, aquam de macerata in ipsa crassa farina bibendam dato, & ptisanæ succum sorbendum, & aquam insuper bibendam.

Alius morbus. Si cerebrum bile infestatur, febris emergit debilis, & rigor, & dolor per totum caput, maxime ad tempora, ad sinciput, & ad regiones oculorum: & supercilia ipsis impendere uidentur, & ad aures dolor praecedit, & quandoq; per nares bilis defluit: & oculos hebetes habent, & plerisque dolor ad dimidiam capitis partem extenditur, quandoq; etiam per totum caput. Quum sic habuerit, perfrigatoria

ad caput apponito, & postquā dolor ac fluor cessarit, apij succum in nares instillato, & ne lauet quandiu dolor obtinuerit. Et sorbeat milium tenue modico melle affuso, & bibat aquam. Si uero alius nō subeat, brasicas edat & succum sorbeat. Sin minus, folia sambuci eodē modo. Et postquā tēpestinū tibi esse uisum fuerit, cibos q̄ maxime aluum subeūtes ipsi exhibeto. Et si depulso fluore ac dolore, grauitas ipsi supra supercilia incūbat, & in naso mucus crassus ac putridus fuerit, fomento ex aceto, & aqua, ac origano ipsi adhibito, deinde calida aqua loto, florē aeris & myrrhā ad nares apponito. Atq; his factis plerūq; sanum efficies. Morbus autem non est lethalis. Alius morbus. Si cerebrum corruptū fuerit, dolor ex ceruicis neruo ad spinam tendit, & ad cor frigus descendit, & derepente nouus sudor adest, & per nares sanguis fluit, Vomunt quoq; multi. Hic triduo moritur. Si uero septē dies trāsgrediatur: plerūq; autem nō trāsgrediūtur: & si sanguinē uomat, aut ē naribus fundat, neq; calida ipsum lauato, neq; calefactoria adhibeto. Verum acetū album aquosum bibendum dato, et si debilis sit, ptisanam sorbendā. Si uero plus iusto sanguinem uomere tibi uideatur, aut ex naribus ipsi fluat, à uomitu quidē bibat farinā trī mēstris tritici in aquā inspersam. Si uero ex naribus fluat, uenas & in brachijs, & in temporibus, splenis suppositis deligato. At si neutrū horum ipsi affuerit, dolet aut ceruicis neruū, & collum, & spinam, & frigus ad cor processerit, cum eruo pectora, & dorsum, & ceruicis neruū, & collum calefacito. Nam his factis maximam utilitatem capere poterit. Verum pauci huiusmodi morbum effugiunt. Alius morbus. Sanum derepente inuadit dolor circa caput, & statim uox intercipitur, & stertit, & os hiat, & si quis ipsum uocet aut moueat, solum suspirat, nihil aut intelligit, & multū mingit, & mingere se nō sentit. Hic si non febris ipsum corripit, in septē diebus moritur. Si uero corripit, plerūq; sanus fit. Huiusmodi uero morbus senioribus maxime fit, & magis q̄ iunioribus. Hūc ubi sic habuerit, lauare oportet multa calida, & q̄ maxime calefacere, & aquam mulsam tepidam in os instillare. At si resipiscat, & morbum effugiat, ubi ipsum cibus refeceris, ita ut uiribus ualere tibi uisus fuerit, indito in nares ipsius medicamento, & paucis diebus interpositis, pharmacū deorsum purgans bibendū dato. Si enim ipsum nō purgaueris, timor est ne rursus morbus reuertatur. Effugiunt autem non ita ualde ex primo. Alius morbus. Si quis ex ebrietate uoce priuetur, & statim sanē ipsum etiam febris corripit, sanus fit. Si uero nō corripuerit, die tertiā moritur. Si itaq; in ita affectū incidieris, multa calida lauato, & spōgias in aqua calida tinctas ad caput apponito, & cepas decorticatas in nares indito. Hic si quidem apertis oculis, & loquutus, ad se redierit, & nō nugetur, hac die sopore pressus iacet, postridie uero sanus fit. Si uero exurgens bilem uomuerit, insanit, & moritur maxime in quinque diebus, si non dormierit. Huic igitur hac facere oportet. Multa calida lauato, donec ipse ad se ipsum redeat. Deinde multo oleo illitum, ad stragula molliter reclinato, & uestimenti contegito: & neq; lucernam apud ipsum ardere, neq; loqui permittito. Vt plurimum enim ex balneo obdormit, & si dormierit, sanus euadit. Postquā uero ad se redierit, primis tribus aut quatuor diebus, milium tenue sorbeat, aut ptisanæ succum, & uinum mellis speciem referens bibat. Deinde cibus utatur mollissimis, ac paucis primum.

Cerebri corruptio.

Si corruptio cerebrum inuaserit, dolor tenet maxime anteriorem capitis partem, & paulatim etiam intumescit, & liuida fit: & febris, & rigor apprehendit. Quum ita habuerit, secare oportet qua parte intumuit, & perpurgato osse, ipsum radere donec ad secundam laminam perueniat, deinde uelut fracturam curare.

Caries siue terebo.

Quam caries facta fuerit in osse, dolor ex hoc corripit ipsum os, et progressu temporis attenuatur ac inflatur, & fit in ipso fractura. Et si hanc resecueris, comperies ipsum os eleuatum, & asperum, ac fuluum. Quibusdam uero etiam ad cerebrum usque corrosum. Vbi in hoc modo affectum incideris, si quidem ultra corrosum fuerit, sinere optimum est, & ulcus quod celerrime curare. Si uero corrosum non fuerit, sed asperum, ad secundam usque laminam rasum, uelut precedens curare. Alius morbus.

Si sideratus quis fiat, & anteriorem capitis partem dolet, & oculis uidere non potest, sed sopor ipsum tenet, & uenae in temporibus pulsant, & febris debilis tenet, & totius corporis impotentia, & emacescit. Quum sic habuerit, multa calida ipsum lauato, & calefactoria ad caput adhibeto. A fomentis uero myrrham & aeris florē in nares infundito. Sorbeat autem ptisanam succum, & aquam bibat. Et si quidem ubi haec feceris melius habuerit, bene est. Sin minus, quae una spes reliqua est, sinciput ipsius findito, & ubi sanguis defluerit, labijs compositis curato ac deligato. Si uero non secueris, decimo octauo aut uigesimo die plerumque moritur. Angina.

Febbris corripit & rigor, & dolor capitis: & maxillae intumescunt, & sputum difficulter deglutit. Expuit autem & saliuas duras ac paucas: & infra in faucibus sterit: & si apprehensa lingua inspexeris, gurgulio non magnus est, sed mollis, fauces autem intrinsecus saliuam uiscosa plenae sunt, & non potest excreare, & decumbere non sustinet, uerum si decumbat suffocatur. Hunc si ita affectum deprehenderis haec facito. Primum quidem cucurbitas ad uerticulum in collo primum affigito. Deinde in capite praeraso, & iuxta aurem ab utraque parte apponito. Et ubi cucurbitam affixeris, ad multum tempus adherere finito. Postea fomentum ipsi ex aceto, nitro, origano, & nasturtij semine adhibeto. Haec terito, & cum aceto pari aqua permixta diluito, ac parum olei instillato. Deinde in ollulam infusis, operculo addito, arundinem cauem immittito, & prunis imposita feruefacito: & ubi per arundinis fistulam uapor ascenderit, hianti ore uaporem intro trahat, cauens ne fauces adurat. Forinsecus autem spongiis aqua calida imbutas, ad genas ac maxillas apponat. Gargarismus porro ipsi parandus est, ex origano, fatureia, apio, metha, & modico nitro, cum aqua mulsa aquosiore, & modico aceto instillato. praedictarum herbarum folia trita, & nitrum, in aqua mulsam diluito, tepes facito, ac sic gargariset. At si saliuam supprimatur, myrti ramulum complanatum sumito, & tenera ipsius summa parte incuruata, ac molli lana obuoluta, in fauces immissa, saliuam expurgato. Et si uenter non egerat, glandem subdito, aut clysterem adhibeto. Sorbeat autem ptisanam succum, & aquam bibat. Si uero tumor ipsi oboriatur, & ad pectus intumescat, ac rubicundus sit, & ardeat, amplior spes salutis est. Facienda uero haec sunt, postquam inflammatio foras conuersa fuerit. Beras in frigidam aquam tinctas apponat. Tepidas collutiones ore gargariset, & ne lauet. Haec faciens maxime euaserit. Est autem morbus

lethalis

letalis, & paucissimi euadunt. Alia angina. Febris & dolor capitis corripit, & fauces inflammantur, itemq; maxillæ, & saliuam deglutire non potest, sputit autem crassam ac multam, & difficulter loquitur. Quum ita habuerit, primum cucurbitam affigito, eodem modo ueluti supra diximus. Deinde spongiam aqua calida imbutam, ad collum ac maxillas adhibeto. Aquam autem mulsam aquosam colluendam dato. Et succum pitisanæ sorbere cogito. Si uero ipsi talia facienti saliuam non exierit, eodem modo ueluti in priore fomentum adhibeto. At si ad pectus conuertatur inflammatio, aut ad collum, betas aut cucurbitas concisas, in frigidam aquam tinctas superimponat, & frigidam aquam bibat, quo saliuam facilius excreetur. Quum autem ad pectus extumuerit, plerique euadunt. Si uero faucibus ac tumoribus sedatis, morbus ad pulmonem conuersus fuerit, febris statim corripit, & lateris dolor, & ut plurimum moritur, ubi hoc factum fuerit. Si uero quinque dies effugerit, suppuratus sit, si non ipsum statim tussis inuaserit. Si uero inuaserit, facta excreatio depurgatus, sanus fit. Huic quam diu dolor latus tenuerit, latus calefaciendum est, & adhibenda quæ in peripneumonia adhiberi solent. At si quinque dies effugerit, & febris remiserit, tussis autem remanserit, primis quidem diebus sorbitionibus utatur. Postquam autem cibos sumere inceperit, quæ pinguisimos ac maxime salios edat. Quod si tussis non affuerit, nimirum suppuratum fieri scito, & ubi coenauit quum dormire uolet, allium edat crudum quæ plurimum. & uinum insuper bibat uinosum meracius. Et si quidem ita pus eruperit, bene habet. Sin minus, postridie calida loto suffutim adhibeto, & si eruperit, uelut suppuratum curato. Alia angina.

Linguae posterior pars inflammatur, itemq; locus sub tonsillis ad guttur, & neque saliuam, neque quicquam aliud deglutire potest. Si uero coactus fuerit, per nares ipsi effluit. Quum ita habuerit, mentam uiridem tritam, apium, organum, & nitrum, & rhoem rubrum melle diluito, et ad crassam formam redacta, intus lingue qua parte tumet illinito. Postea ficus aqua coquito, et de rhoe parum tritum, hoc ficum decocto diluito, ac gargarisandum dato si id potest, sin minus, colluendum. Bibendam uero aquam de farina crassa in ipsa macerata exhibeto. Foris autem ceruicem & maxillas, farina calida in uino & oleo cocta integito, & panes calidos apponito. Suppuratur enim plerumque in loco sub tonsillis, & si quidem sua sponte eruperit, sanus fit. Si uero non rupatur, ubi digito contigeris an mole sit, ferramento acuto ad digitum alligato perforato. His adhibitis multi sani fiunt. Est autem hic morbus minime lethalis.

Vua, morbus.

Si uua morbus in faucibus fiat, summa gurgulionis pars aqua impletur, & srotunda fit ac pellucida, & spirationem intercipit. Et si maxillæ ab utraque parte inflammatae fuerint, suffocatur. Si uero ipse morbus per se consistat, maxillis non inflammatis, minus moritur. Quum sic habuerit, gurgulionem digito apprehensum sursum ad palatum apprimito, & summam ipsius partem praefecato. Postea foliorum hortensium condimentariorum decoctum gargarisandum dato, & farinam frigidam delingendam, aquamque insuper bibendam: & ne lauet.

Tonsillæ, morbus.

Si tonsillæ fiant, intumescunt sub maxillis ab utraque parte, & ad contactum foris durum est tuberculum, & gurgulio totus inflammatus est. Quum sic habuerit

buerit, immisso digito tonsillas protrudito, ad gurgulionem autē florem aeris siccum illinito: & foliorum condimentariorum hortensium decoctum, uelut à sole calidum gargarisandum dato. Foris qua parte tumor est, ordeaceam farinam in uino & oleo coctam calidā pro cataplasmate apponito. Postq̃ uero tubercula mollia esse tibi uisa fuerint intrinsecus ad contactum, scalpello ipsa per tundito. Quædam etiam sua sponte sedantur: 310

Tuberculum sub lingua.

SI tuberculum sub lingua, hypoglossis appellatū, fiat, lingua intumescit, & spars sub ipsa ac externa ad tactum dura est, & saluam deglutire nō potest. Quum sic habuerit, spōgiam aqua calida imbutam apponito, & ordeaceam farinam uino ac oleo coctam, foris ubi tumor est imponito. Gargariset sicuū decoctum, et ne lauet. Postquā autem purulentū factum fuerit, secato. Aliquando uero sua sponte erumpit, & sedatur non sectū. Si uero foras suppurauerit, perurito. 315

Inflammatiō consistens ad palatum.

SI inflammatiō constiterit ad palatum, intumescit & suppuratur. Quum sic habuerit, tuberculum inurito. Vbi uero exierit pus, reliquū eluito, primum nitro & aqua calida. deinde uino. Postquam autē elueris, uuam passam albam exemptis uinaceis tritam, in usturæ locum indito, & ubi exciderit uino mero tepido colluat, & ubi edere quid aut sorbere ualet, spongiā indat, atq̃ hæc faciat donec sanus fiat. 320

Polypus.

SI polypus fiat in naso, ex medio cartilaginū dependet, ueluti gurgulio. & ubi expirationem facit, progreditur foras, & est mollis, ubi uero inspirationem facit, retrocedit: & loquitur obscure, & quum dormit sterit. Quum sic habuerit, spongiā in rotundum concisam, & uelut spiram factam, lino Aegyptio obuoluito, ac duram efficit. Sit autē eius magnitudinis, ut ad nasum quaderet. Spongiā uero quadruplici lineo filo deligato, ita ut unumquodq̃ longitudinem habeat cubitalem. Deinde facto unio ipsorum principio, uirgam stanneam tenuem sumito, quæ ad alteram sui partem foramen habeat, & transmissa per foramen filorum principio, uirgam in acutam in os transmittito, & attrahito donec filorum principium apprehendas. Postea specillo instar ungulæ bifurcato sub gurgulionem subposito, renitens trahito, donec polypum extraxeris. Postquā uero ipsum extraxeris, & sanguis fluere desierit, siccum linamentū specillo obuolutū indito, & de cætero aeris flore in melle cocto, linamentum illine, atq̃ sic in nasum inde. Et ubi iam ulcus curatū fuerit, plumbū efformatū ita ut ad ulcus perueniat, melle illine, & donec sanus fiat appone. Alius polypus. 325

Impletur nasus carnibus, & ad contactū caro dura apparet, & per nasum spirare non potest. Quum sic habuerit, fistula immissa, ferramentis tribus aut quatuor urito, & post uersionem ueratrum nigrū tritum inijcito, & postquam computruerit ac exciderit caro, linamenta melle illita cum aeris flore indito. & ubi curatum fuerit ulcus, plumbeas massas siue fistulas melle illitas immittito, donec sanus fiat. Alius polypus. 330

Intrinsecus ex cartilagine caro rotunda prominet, quæ ad contactum mollis est. Quum ita habuerit, chordam nerueam accipito, & facta in ipsa parua ansula, eam tenui filo obligato. deinde alterum principium per ansulam transmittito, alia maiore ansa facta. Postea principium illud per uirgam stanneam transmittito, Deinde ansam illam maiorem 335

in nasum indito, & specillo insecto ipsam circum polypū obducito ac adaptato, & ubi circumscrita fuerit, uirgam in os transmittito, & arreptā ipsam trahito, eodem modo specillo instar ungulæ bifurcato supposito sub gurgulionē ac renitente. Postquam autem extraxeris, curato uelut superiorē. Alius polypus.

Intrinfecus circa cartilaginem alicunde durū quid nascitur, & uidetur quidem caro esse, si uero ipsum attigeris, strepitū edit uelut lapis. Quum sic habuerit, fisso per scalpellum naso expurgato, deinde inurito. Atq; hoc facto nasum rursus consuito, & ulcus curato, linamentū melle illitum indens, & ubi cōputruerit, aris florem cum melle illinito. Fiat autem curatio plūbeis mafsīs itidem immisīs. Alius polypus. Nascuntur ex obliquo cartilaginis in summo, uelut cancelli. Omnes autē hos urere oportet, & post unctionem ueratrum inspergere. Postquā autem computruerint, aris flore cū melle expurgare. Curatio autem etiam plumbo iminisso fiat.

Morbus regius niger.

Color sit niger circa faciem, & maxime circa partes uelut in umbra occultas: & oculi cum uirore pallidi, itemq; lingua inferne, & uenæ sub lingua crassæ ac nigræ: & est homo sine febre, ac mingit urinam crassam, biliosam.

Quum ita habuerit, primum uenas sub lingua secato, deinde calida multa loto, aphrodeli radices bibēdas ieiuno dato, ita ut æquales quinq; radices depurgatas in uino coquas, & apij foliorū quantū manus plena capit addas. Affundito autem uini dulcis tres heminas dimidiatas Aeginenses, ut à coctura semihemina supersit. Hoc permixtum bibendū dato. Postquam autē minxerit, cibis aluum subeūtibus utatur, & à cibo cicer album edat, & uinum album, multum, aquosum bibat: & apium ac porrum in cibo edat, faciat autē hæc per dies septem, & si quidem in his color probe depurgatus esse tibi uisus fuerit, bene est. Sin minus, etiam alios tres hæc faciat. Postea interposita una atq; altera die, medicamentū ad nares apponito. Deinde pharmacū deorsum purgans bibēdum dato, à quo bilis purgatur. Et si splenicus fuerit, asininum lac aut serum postea exhibeto. Hæc faciens, sanū efficies. Alius morbus regius. Febris corripit debilis, & grauitas caput tenet, et quibusdam sanè febres cessant, Ipse uero fit cum uirore pallidus, & maxime oculi, & debilis est, & corporis impotentia adest, & urinam crassam cū uirore pallidam emittit. Hunc calida lauato, & urinam cientia bibenda dato. Postquam autē purior esse tibi uisus fuerit, & color melior apparuerit, medicamentū ad nares appone, & postea deorsum purgans bibendum præbe. Cibis autem utatur q̄ mollissimis. Vinum bibat albū, dulce, aquosum. Hæc faciens sanus euadet.

Febres à bile.

Si bile infestatur homo, febris ipsum corripit quotidie, ac dimittit. Detinet autem in meridie. & os amarum est, & quū sine cibo manet, offendit hoc ipsum. Vbi uero ederit, strangulatur, & à modicis quibusdam cibis impletur, & abominatur, & uomitiones ipsum inuadunt, & ad lūbos ac crura grauitas incumbit, & multū dormit. Hic si post febrem exudarit frigidū ac multum sudorem, & febre non liberetur, morbū diuturnū sentiet. Si uero non sudarit, citius iudicatur. Quū sic habuerit, & ad nonū diem deuenit, pharmacū dato. Nam si statim à febris initio dederis, postquam purgatus est febris repetit, & rursus medica-

medicamento opus habet. At si os non afficiatur, uerum ad imum uentrē tor-
men irruat, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, & postea lac asini-
num, aut seruni, aut aliquem succū. Si uero debilis fuerit, per clysterem subtus
eluito. Ante medicamenti uero potionem, si quis febrat, danda est ipsi aqua
mulla aquosa. Altera autem die qua febris detinet: aquam frigidam quantū bi-
bere uolet dabis. Vbi uero remiserit febris, ptisanæ succū, aut milium tenue sor-
beat, & uinum album, odoratū, aquosum insuper bibat. Si uero febris neq; no-
ctu, neq; interdiu remittat, & ad cōtactum supernas partes habeat calidas, uen-
ter autem & pedes frigidi sunt, & lingua aspera: huic medicamentū nē dederis,
sed molli infuso per clysterem subluito, & ptisanæ succum bis in die frigidū sor-
bendum dato, & uinum aquosum insuper bibendum. Reliquo uero tempore
aquam frigidissimam bibat. Hic si quidem septima die exudarit, et febris ipsum
dimiserit, bene est. Sin minus, decimaquarta die plerūq; moritur.

Alia febris. Foris ad cōtactum febris debilis est, intrinsecus autem ar-
det, & lingua ipsius aspera est, & per nares et per os spirat calidum. Quinta die
præcordia dura sunt, & dolor inest, & calor qualis in morbo regio apparet, &
crassam ac biliosam urinam eijcit. Hunc si septima die rigor, & febris uehemēs
apprehēderit, & exudarit, bene est. Sin minus, moritur septima aut nona. Cor-
ripit autem maxime hic morbus, si non annus squalidus fuerit. Quum sic ha-
buerit, quotidie calida lauato, aquamq; mullam aquosam multam bibendā da-
to, & ptisanæ succum frigidum bis in die sorbēdum. A sorbitione uero uinum
bibat aquosum, album, modicum. Si uero aluus non egerat, clysterem adhibe-
ro, aut glandulam subdito. Cibum aut ne exhibeas, donec febris remittat. Vbi
uero sedata fuerit, pharmacum deorsum purgans bibat. Reuertitur enim quan-
doq; morbus, si impurgatus permanserit. Et amplius morbus hic rursus corri-
pit, si sanguis nimīū biliosus factus fuerit. Alia febris. Si tertiana febris
tenuerit, si quidem non omīssis tribus inuasionibus, quarta corripiat, pharma-
cum deorsum purgans bibendū dato. Si uero pharmaco non opus habere tibi
uideatur, radicū quinquēfolij tritarum acetabuli mensuram, ex aqua biben-
dam dato. Si uero neq; sic cesset, multa calida loto, trifolium, & silphij succum,
in uino pari aqua ammixta, bibenda præbeto, & reclinato uestimenta multa in-
tegito, donec exsudet. Postquā uero exsudarit, si sitiat, polentā cum aqua bibat.
Vesperī aut milium coctum tenue sorbeat, & uinū insuper bibat, donec febris
cesset: & cibis quā mollissimis utatur.

Febris quartana.

Quum febris quartana ex alio morbo non purgatum apprehenderit, phar-
macum deorsum purgans bibendum dato. Deinde caput purgato. Postea
rursus infra purgato. Si uero his factis non cesset, interpositis duabus inuasio-
nibus post purgationem infernam, multa calida ipsum lauato, & seminis hyo-
scyami milij magnitudinem, & mandragoræ tantundem, & succi silphij trium
fabarum magnitudinem, & trifolij tantundem, in uino meraco bibat. At si fir-
mus & sanum se esse putans, ex lassitudine, aut profectione febre correptus,
ad quartanam deueniat: fomentis ipsi adhibitis allium dato, in melle tinctum.
Deinde lenticulæ decoctum bibat, melle & aceto ammixtis. Postquam autem
repletus fuerit, uomat. Postea calida lotus, ubi frigidus factus fuerit, cyceonem

ex aqua bibat. Vesperis cibis mollibus & non multis utatur. Altera uero exacerbatione, ubi multa calida laueris, & stragula ipsi intexeris, donec exudet, statim ueratri albi radices trium digitorum longitudine, & trifolij drachmam, & succi silphij duarum fabarum magnitudinem, in uino meraco hibat. Et si uomitiones ipsum urferint, uomat. Sin minus, post caput purgat. Cibis aut utatur quod molliissimis & acerrimis. Quum uero exacerbatio ipsum inuaserit, ieiunus medicamentum ne bibat.

Pleuritis.

Pleuritis ubi corripuerit, & febris & rigor tenet, & dolor per spinam ad pectus, & erectae cervicis spiratio, & tussis, & saliu alba ac subbiliosa, & non facile per tussim reijcit, & per inguina dolor est, & cruentam urinam mingit. Quum ita habuerit, si quidem febris septima die remiserit, sanus euadit. Si uero non remittat, deuenit morbus ad undecimum aut decimum quartum diem. Et sane multi in his diebus moriuntur. At si decimum quartum transgrediatur, euadit. Quum ita habuerit dolor, calefactoria adhibeto. Bibat autem mel, aequali aceto affuso coctum, ita ut quanta fuerit mensura cocti mellis & aceti, unde uigessimam partem aquae affundas. Hoc paulatim et frequenter bibendum dato: & postea quoque aquam modico aceto affuso ammisceto. Sorbeat et milij succum, melle modico ad stillato frigidum, quartae heminae partis mensura, quoties utrumque cibum sumit, & bibat uinum album uinosum, aquosum modicum. Sit autem uinum quod molliissimum, odorem non habens. Vbi uero febris dimiserit, per biduum milium bis in die sorbeat, et betas iucundissime paratas edat. Deinde catulum aut auiculam coquat, & ius sorbeat, & de carnibus parum edat. Reliquo uero tempore, maxime quando diu a morbo tenetur, in prandio milium sumat, uesperis cibis paucissimis ac molliissimis utatur.

Alia pleuritis.

Febris tenet, et tussis, ac rigor, et dolor ad latus, et quandoque ad clauiculam, et saliu spuit subbiliosam ac subcruentam. Quod si agro abscessus ruptus fuerit, qua parte dolor maxime urget, calefactoria adhibeto, et calida lauato, si non magna febris ipsum teneat. Sin minus, non. Bibendum autem dato fauui in aqua maceratum, ita ut aquam iam subdulcem facias, & postea quoque aquam ammiscens. Sorbeat ptisanæ succum bis in die, & uinum inde bibat album, aquosum. Et si quatuordecim dies effugerit, sanus euadit.

Alia pleuritis. Febris detinet, et dentium stridor, et tussis sicca, et cum uirore pallida reijcit, quandoque etiam liuida: et dolor latus corripit, et dorsum subrubidum fit. Caput et pectus calescunt, aliquando etiam uenter, et pedes, et crura. Et quum erectus sedet, magis tussit: et aluius turbatur, et alui egestio cum uirore ualde pallida est, ac graueolens. Hic in uiginti diebus moritur. Si uero has effugerit, sanus fit. Huic donec quatuordecim dies praterierint, aquam de farina crassa in ipsa macerata bibendam dato, et uinum album uinosum, aquosum postea bibendum. Sorbeat succum ptisanæ frigidum, bis in die. Verum prae melle mali punici succum, ad ptisanæ succum admisceto, postquam iam hic ptisanæ succus coctus fuerit, et lauet non multa. Vbi uero quatuordecim dies praterierint, in prandio milium sumat. Ad uesperam carnibus auicularum, cum iusculo, et paucis cibis utatur. At talem morbum pauci effugiunt.

Peripneumonia.

Febbris detinet dies quatuordecim ut minimum, ad summum duas de uiginti. Et per hos dies fortiter tussit, & primum quidem excreat saliu crassam ac puram

purā, septima et octaua die. Si uero febris corripuerit, nona ac decima, subdulcē & purulentam, donec quatuordecim dies præterierint. Et si quidē decimaquinta die pulmo reficcatus fuerit, & tussiendo reiecerit, sanus fit. Sin minus, duas de uiginti obseruato, & si quidē in his diebus tussis sedata fuerit, euadit. Si non sedata, interrogato ipsum, an salua ipsi dulciior appareat, & si hoc cōfessus fuerit, morbus annū durabit. Nam pulmo suppuratus fit. Huic primis diebus uinum dare conuenit dulce, album, aquosum, paulatim frequenter bibendū. Sorbeat etiam ptisanę succum melle ammixto bis in diē, donec diēs decem & octo præterierint, & febris desuerit. Periclitatur autem maxime in septem, aut quatuordecim. Postquam autem decem & octo dies transgressus fuerit, nō amplius moritur, sed pus spūit, & pectus dolet, & tussit. Quum sic habuerit, ieiunus cum saluā uini illam potionem bibat, & leguminis fressi decoctum sorbeat, adipe multo ammixto, si non calor fuerit. Si uero fuerit, ne sorbeat, sed cibis utatur salis ac pinguibus, & marinis potius q̄ carnibus. Et si pro ratione purgari tibi uisus fuerit, in os infundito, ac fomēta adhibeto: si quidem crassum fuerit pus, fomenta adhibeto: si uero tenue, infundito. & ex cibis hæreat q̄ maxime, & ab acribus abstineat, & a carnibus bubulis, ouillis, ac porcinis.

Suppuratus ex peripneumonia.

Quum ex peripneumonia suppuratus factus fuerit, febris detinet, & tussis sicca, & difficultas spirandi, & pedes intumescunt, & manuum ac pedum ungues contrahuntur. Hūc ita affectum ad decimā diē a suppurationis initio progressum, multa calida lauato, & ari radicē tali magnitudine tritā, & salis granum, & modicum mellis, & aquā, & olei parū, extracta lingua tepida infundito, & postea humerum concutito. Et si quidem ab his pus erumpat, bene habet. Sin minus, aliud facito. Cibos acres et cyclaminū exsuccato, sitq; succi utro runq; acetabulum paruū, deinde silphij succum fabæ magnitudine terito ac diluito, & lactis caprini aut asinini acetabulum ammisceto. Hoc tepidum infundito. Quod si ab hoc nō erumpat, raphani corticem, & æris florem, trium fabarum magnitudine terito: Sit autem raphani duplum: & oleo diluito quarta heminae parte. Hoc tepidū infundito. Et si eruperit pus, cibis q̄ salissimis ac pinguisimis utatur. At si nō p̄dierit pus, paulatim fomentū adhibeto in os, ex sij succo, uino Tornio, lacte bubulo, aut caprino, singulis pari mēsurā permixtis, ita ut sint heminae tres, in quas postea furni testas igni candefactas inijcito, atq; inde uaporē per fistulam trahat, cauendo ut ne aduratur. Postquam autem purius iam sputum prodierit, urticæ semen, thus, origanum, in uino albo, melleq; ac oleo modico, ipsi infundito, idq; per tertium diē. postea uero butyrū, refinam in melle eliquatam. Et cibis non amplius utatur salis, neq; pinguibus. At diebus interpositis, infusionū oris usu cessante, saluā, rutā, satireā, origanū, pari portione ieiunus ex uino bibat acetabuli mēsurā, omnibus illis inspersis. Quod si ab infusionibus his oris nō eruperit, nihil miri est. Sæpe enim prorūpit ad aluum, et statim melius habere sibi uidetur, ubi ex angusto ad ampliore regionem deuenierit. Alius morbus. Quum tempus longius protrahitur, & febris uehemens ac tussis corripit, & latus dolet, & ad sanā partem decumbere nō potest, sed ad dolentem, & pedes, & oculorū cavitates intumescūt. Hunc ubi decimusquintus ab eruptione dies adest, multa calida lorū in

fella firma collocato, & alius quidem manus ipsius teneat, tu uero humerū con-
 cutito, ut audias in utrum latus affectio strepitum edat; optandum autem esset
 in sinistrum. Hunc ipsum igitur locū feces, minus enim lethalis est. Si uero præ-
 crassitudine ac copia strepitum non edat, quo ipsum cognoscere possis, (nam
 hoc aliquando cōtingit) utrum latus tumuerit ac magis doluerit, hoc infime se-
 cato retro tumorem magis quā ante ipsum, quo puris exitus facilem fluxionē has-
 beat. Secato autē inter costas per nouaculam primū cutem, deinde scalpello acur-
 to, quod pāniculo sit obligatū, ita ut summa ipsius pars, ad unguis magni digi-
 ti mensurā expedita restet, quā intromittas. Postea emisso pure quantū uisum
 fuerit, uulnus linamento ex lino crudo, alligato foras propendente filo, conclu-
 dito; & quotidie semel pus educito. postquā autem decimus affuerit dies, om-
 ni pure emisso linamentū ex linteo indito. Deinde uinū & oleum tepefacta per
 fistulā infundito, ne pulmo à pure humectari solitus derepente resiccet. Emit-
 tendum autem est id quod mane infusum est, ad uesperā: quod uespera, mane.
 Vbi uero pus tenue uelut aqua fuerit, & ad digiti contactū uiscosum ac modicū,
 penicillum stanneū cauum indito. Postquā autē omnino uēter resiccatus
 fuerit, paulatim linamentum præfectū minuito, donec ulcus coalescat, & ipsum
 penitus eximas. Signū autē an euasurus sit habes, si pus albū ac purū fuerit, &
 fibræ sanguinis insint, plerūq; sanus sit. Si uero prima die profluat lutei oui spe-
 ciē habēs, aut secunda die defluat crassum, cū uirore subpallidū, foetens, moriū-
 tur ubi pus effluxit. Alius morbus. Quū quis ex pulmonis affectu tabe
 scit, is saluam crassam, cum uirore subpallidā, dulcem, tussiendo reijcit, & strid-
 or ac dolor ad pectus & ad dorsum sit, & in faucibus tenuis sibilus auditur, &
 fauces siccae sunt, & oculorū cavitates rubicundę, et uox grauis, & pedes intume-
 scunt, & ungues cōtrahuntur, & supernæ partes attenuantur ac imminuuntur,
 & saluam abominatur ubi exscreaturus ipsam in ore habet, & tussit mane ma-
 xime & circa mediā noctem, immo etiam alijs temporibus. Et corripit magis
 hic morbus mulierculam iuuenulam quā uetulam. Huic si iam pili de capite de-
 fluant, & nudum sit caput, uelut ex morbo: et si prunis inspuenti salua graueo-
 lens sit, intra breue tempus ipsum moriturum esse pronuncia, id uero quod oc-
 cidet, alui profluium fore. Vbi enim iam pus circa corpus truerit, nidorosum
 odorem prunis iniectū de se præbet: & cerebrū concalescens salfuginosum hu-
 morem effundit, qui aluum mouet. Huius autem signum est, quod capilli ex ca-
 pite defluunt, Hunc ubi ita habuerit ne curato. Si uero à principio morbus ob-
 tigerit, lenticulæ decoctum bibendum dato. Deinde interposita una die, uera-
 trum dato temperatū, ut ne aluum infernam moueat. Et quum noctu ad os sal-
 fuginosus humor ipsi influit, medicamenta ipsi frequentiora ad nares appone.
 Si uero non fluit, appone quidem, sed rarius, & mense semel, ita ut insuper uera-
 trum bibendum des, quantū duobus digitis cōprehendi potest, in uino dulci
 temperato. Statim uero lenticulæ decoctum inde bibendum dato. At medica-
 menta quā paucissima bibat, si non febres acutiores ipsum corripiant. Radicem
 dracontij albam, & ueratri delingat, sed non ex melle. Sic enim minime aluum
 mouebit. Si uero tormen in aluo inferna oboriatur, primū per clysterem illud
 infusum immittito, in quod coctus cnidius ammiscetur. Quod si neq; sic sedes-
 tur, lacte alinino cocto purgato, pharmacum aut nullū deorsum purgans dato.

Si uero ante medicamentū, præpotato ueratro bilem uomat, ab ipso lenticulæ decocto accepto uomat. Cibis aut utatur, si febres acutę tenuerint, carnibus ouillis coctis, et uolucriū, et cucurbita, et beta. Iusculū autem ne sorbeat, neq; ad intinctus utatur. Piscibus utatur scorpijs, et cartilaginei generis coctis. Calidū uero nihil edat, neq; lauēt, si febris multa teneat. Neq; oleribus acribus utatur, præterq; satureia, aut origano. Vinū bibat album. Si uero sine febre sit, calores aut aliās atq; aliās corripiāt, pisces edat optimos ac pinguisimos, et pinguia, et dulcia, et q; maxime salsa. Et deambulationibus utatur, neq; in uēto, neq; in sole. Et a cibis uomat, ubi tempestiuū uisum fuerit. Et calida lauēt, capite excepto. Ex cibis frumentaceis præstat panis, his qui non mazam edere soliti sunt, Mazam uero edere solitis, utraq; dato. Alius morbus appellatus Tabes.

T Vsis uexat, et sputū multum ac liquidū, et quandoq; facile tussiendo reijcitur etiam pus, ueluti grando, quod dum digitis cōteritur, durum et male olens est. At uox pura est et doloris exors, et febres nō corripiunt, uerum calor quandoq; aliās atq; aliās, atq; hic debilis. huic ueratrū bibendū est, et lenticulæ decoctū, et large cibus sumendus, ita ut abstineat ab acribus, et carnibus bubulis ac porcinis et ouillis. Exerceatur modicē et deambulet, et a cibis uomitu utatur. A Venere abstineat. hic morbus per annos septem aut nouē durat, quod si ab initio æger curatus fuerit, sanus euadit. Alius morbus. Si ex ferui do ulcere, aphtha appellato, pulmōis fistula laborarit, febris debilis tenet, et dolor medium pectus, pruritus corporis adest, et uox raucosa, et saliuā liquidam ac tenuem spuit: quandoq; etiam crassam, uelut ptisanę succum. Et in ore odor oboritur ipsi grauis, uelut a piscibus crudis, et aliās atq; aliās in saliuā apparent dura, uelut fungus ab ulcere, et supernæ partes attenuantur, atq; adeo homo totus: et circuli faciei rubescunt, et progressū tēporis ungues contrahuntur, et aridi ac cū uirore pallidi fiunt. Moritur aut statim, si nō curatus fuerit, sanguinem ac pus spuens, postea etiā febres uehemētes accedētes ipsum perimunt. Si uero curetur, effugit ex hac tabe. Curare porro oportet, ut lenticulæ decocto potu uomat. Quod si tempestiuū esse uisum fuerit, ueratrū bibat, si quidem potens fuerit homo, per se. Sin minus, dimidiū potionis ad lenticulę decoctū ammisceto, ita ut in quinta aut sexta potione desinat. At uentrē infernum medicamēto ne moueas, si nō febres fortes corripuerint. Si non autē corripuerint, lacte asinino subtus purgato. Quod si debilis sit, ut bibere non possit, per clysterē infundito. Minus aut caput moueas, & si quidē saliuā ad os prodierit multa ac saluginosa, ad nares apponito quid, quod bilem non ducat. Si uero fluxio ad os nō fiat, nihil capiti adhibeto. ubi aut saliuā graueolens fuerit, interpositis inter lenticulę decocti usum diebus, medicamentū in pulmonē infundito, et interposita una die suffito. Cibis utatur carnibus ouillis et uolucriū, et piscibus cartilaginei generis, et scorpijs coctis. Quarto uero quocq; die salsamentum edat optimum ac pinguisimū, & in prædio mazā sumat, in coena uero etiā panem ad hāc addat, & nihil sorbeat, neq; cyceonē bibat, si edere poterit. Porro obsonia cōdiat ac edat sesamo pro tritico, & coriandro ac anetho. Silphio autē ne utatur, neq; alio quopiā olere acri, præterq; origano, aut thymo, aut ruta. Deambulationibus autem utatur ante & post cibū, uitans uentū & solem. Ab ebrietatibus et re uereā abstineat. Lauet tepida, excepto capite, quod q; rarissime lauari debet.

Tabes dorsalis.

Dorsalis tabes à medulla fit. Corripit autem maxime recētes sponſos, & ueneri deditos. Sunt autem ſine febre, & bene cibum capiunt, ac cōſumuntur. Et ſi interrogēs ita affectum, dicet ſibi ſuperne de capite in ſpinam uelut formicas deſcendere uideri, & ubi mingit, aut uentrem exonerat, prodit ipſi genitale ſemen multum ac liquidum, & genitura in utero non manet, & in ſomnis ſemen profundit, ſiue dormiat cum uxore ſiue non. Et quum iter fecerit aut cūcurrerit, tum aliàs, tum ad accliuem locum, anhelatio ac debilitas ipſum corripit, & capitis grauitas, & aures ſonant. Hūc temporis progreſſu ubi febres fortes ipſum corripuerint, perdūt febres lipyriæ. Quū ita habuerit, ſi ab initio curandum ſuſceperis, ſomēto per totum corpus adhibito, medicamentū ſurſum purgans bibendū ipſi dato, & poſtea caput purgato. Deinde deorſum purgās exhibeto. Optandū autem fuerit ut uere hanc curationē aggrediamur. Poſtea uero ſerum aut lac aſinum bibendum dato. Cæterum bubulum lac per quadraginta dies bibendum præbeto. Ad ueſperā uero q̄ diu lac potat, alicam ſorbendam dato. A cibis autē abſtineat. Poſtquā uero lac bibere ceſſarit, cibis molilibus ipſum reſcito, ex modico initium ſumens, & q̄ maxime craſſum ac pinguem facere ſtudet. Per annum ab ebrietatibus, & uenere, & laboribus abſtineat, exceptis deambulationibus, in quibus uiuet frigus & ſolem. Tepida autē lauet.

Pulmonis morbus.

Saliua craſſa ac fuliginosa tuſſi reiſcitur, et color niger, ac ſubturgidus eſt. & dolores tenues ſub pectus & ſub ſcapulas fiūt: et ulcera ipſis ægre ſaneſcūt. Minus tamen periculofus eſt hic morbus ſuperiore, & plures euadunt. Hunc ueratrum bibere oportet, & per ſe, & lenticulæ decocto ammixtum. Infundere etiam in pulmonem oportet ac ſuffitum facere. Cibis quoq̄ large utatur, abſtinendo à carnibus bubulis, ouillis, & porcinis, & ab acribus oleribus, præterq̄ origano, aut ſatureia. Vratur deambulationibus. Mane uero ieiuuus ad accliuē locum iter faciat. Deinde folia condimentaria hortenſia bibat in uinū temperatum inſperſa. Deinde uero cibis relatis utatur.

Arteria uulnerata.

Si uulnerata fuerit arteria, tuſſis habet, & ſanguinem tuſſiēdo reiſcit, & fauces ſanguine latenter implentur, & grumos eiſcit, & dolor fit acutus ex pectore ad dorſum, & ſaliua uiſcoſa ac multa, & fauces ſiccæ, & febris ar rigō corripit, et ſtrident fauces uelut à pinguedine, atq̄ hæc ad quindecim dies patitur. Poſtea uero pus ſpuit, & uelut ulceris ricinos, brōchia in pulmōe cartilaginea, & ruſſus tuſſit, & ſanē ſanguis erūpit, & poſtea pus craſſius ſpuit, & febris fortior fit, & in pulmōē deſinit, & uocatur ruptio pulmonis. At ſi poſt primū ſanguinem pus non ſpuat, à laboribus ac exercitijs quieſcere oportet, & uehiculū inſcendere, abſtinereq̄ à cibis ſalſis, ac pinguibus, & ab oleribus acribus, & poſtq̄ ipſe ſeipſum optime corpore affectū eſſe putat, pectus ac dorſum inūrito, ex parte utruſq̄, & poſtquā ulcera ſana fuerint, per annum abſtineat ab ebrietate, & ne nimiū impleatur, neq̄ manibus laboret, neq̄ uehiculum inſcendat, ſed ſtudeat ut corpus q̄ maxime craſſum efficiat.

Articuli pulmonis conuulſi.

Quam articuli pulmonis fuerint conuulſi, ſputū ſpuit album, quādoq̄ uer-

ro cruēta, & desipit, & febris tenet, & dolor pectus, dorsum, ac latus: & si se uertat, tussit & sternutat. Huic qua parte dolor fuerit calefactoria apponito, & centaūrium, & daucium, & saluā folia trita, melle & aceto affuso, præforbenda dato, & aquam insuper forbendā. Et ptisanā succum præforbeat, & uinum aquosum insuper bibat. Postquā uero dolor sedatus fuerit, saluiam tusam ac cribratam, & hypericum, & irionem trita, & polentā, singula paribus portionibus, in uinum temperatū coniecta, ieiuno bibenda præbeto. At si ieiunus non sit, leguminis fressi decoctū sine sale sorbendū dato. Si uero calor fuerit, cibus utatur mollissimis, nō salis, & minime nidorosis, ubi iam probe se habuerit corpus, & in pectore, & in dorso. At si ambo conuulsa fuerint, tussis emergit, & salua crassa ac alba apparet, & dolor acutus adest ad pectus, & sub scapulas, ac latus: & ardor detinet, & rubicundis in tibijs circulis impletur, & pruritū habet, & nō sustinet neq; sedere, neq; iacere, neq; stare, sed egre afficitur, ac uiribus deficit. Hic quarta die maxime moritur. Si uero hāc effugerit, spes neq; sic multa superest, Verum periclitatur et in septima. Quod si & hanc effugiat, sanus euadit. Hunc ubi sic habuerit, multa calida bis in die lauato. Et quū dolor habuerit, calefactoria adhibeto, & mel, & acetū bibendum dato, & ptisanā succū sorbendū, & uinum albū uinosum insuper bibendum. Si uero ad balneū et calefactoria affligatur, ipsaq; nō sustineat, crassi lintei pāniculos ipsi adhibeto, quos aqua tinctos in pectus ac dorsum imponas. Et fauum mellis aqua frigidissima macerato, aquamq; bibendam dato. & frigidū ptisanā succum, & aquā insuper bibat, et ad frigus decumbat. Hæc faciēda sunt. Verum morbus lethalis est.

Erysipelas in pulmone.

SI erysipelas in pulmone fiat, tussis habet, et saluā expuit multam ac liquidā, sicut de gutture, non est autem cruēta: et dolor tenet dorsum, et uacuas partes uentris, ac laterum mollitudinē. et uiscera sugūt, et uomit pituitam ac uelut acetum, & dentes stupefcunt, & febris, ac rigor, & sitis corripit, & ubi quid ede rit, in uisceribus fugit, & acidum eructat, & uenter stridet, & corpus torpescit, & ubi uomuerit, melius se habere putat. Quum autem non uomuerit, digressa die tormen et dolor in uentre oboritur, et excrementū alui liquidum procedit, hic morbus maxime fit ex ebrietatibus, et carniū esu, et ex aquæ mutatione. Sed & ex alijs causis emergit. Huic pharmacum deorsum purgans bibendū dato, et lac asininum insuper bibendum, si nō natura fuerit splenicus. Si uero splenicus fuerit, ne purges, neq; succis, neq; lacte, neq; sero, sed eo quod modicum ingestum multum educet. Per clysteres quoq; infusio in aluum fiat, et glandulæ subdantur in omnibus morbis, si aluus nō egerat. Adhibendum est et frigidæ lauacrum in hoc morbo, et exercitium, ubi febres remiserint, et corpus leuiter se habere uisum fuerit. Et uere et autumnō uomitus inducatur. At uero alij capita, et origani pugillum, quantum tribus digitis apprehēdi potest, duabus heminis uini dulcis affusis, et acetū acerrimi hemina una, et mellis quartā heminae parte, coquito donec tertia pars reliqua fiat. Deinde ubi hominem exerceueris, et aqua tepida laueris, calidum hoc bibendum præbeto. Dato etiā lenticalæ decoctū, melle et aceto ammixtis, donec impleatur. Deinde uomat, et ea die pota polenta et aqua, ita ieiunus permaneat. Ad uesperā uero betam edat, et parum de maza, et uinū aquosum bibat. Reliquo uero tempore, à lenticulæ

decocto, & à cibis uomat. Et si discesserit dolor sub scapulas, cucurbitā affigito, & uenas in manibus pertundito. Cibis porro utatur nō falsis, neq; pinguibus. Acria autem & acida edat, & frigida omnia. Utatur & deambulationib. Hæc si fecerit, optima uictus ratione usus fuerit, & per plurimū tempus morbus prorogari poterit. Est autē non lethalis, sed consenescentes relinquit. Si uero iuniorum aliquem citius à morbo liberare uoles, ubi ipsum purgaris, pectus & dorsum inurito.

Morbus dorsalis.

Rigor & febris, & tussis, & spirandi difficultas corripit, & saluam spūit cum uirore pallidam, quandoq; etiam subcruentā: & dolet maxime dorsum & inguina: & tertia aut quarta die cruentā urinam mingit, et moritur septima die. Si uero quatuordecim dies effugerit, sanus euadit: effugit autem nō ita ualde. Huic aquā mulsam bibendā dato, in olla noua feruefactā ac perfrigeratā, et apij aut feniculi radicis cortice in ipsa macerato. Dato & ptisanæ succū bis in die, & uinum album aquosum insuper bibendū. Qua uero parte dolor cōstiterit, calefactoria adhibeto, & calida lauato, si nō febris multa uexet. Postquā autē quatuordecim dies præterierint, in prædio quidem sumat miliū, ad uesperam uero carnes catulinas, aut uolucriū, coctas edat: & de iusculo sorbeat. Cibis autē q̄ paucissimis primis diebus utatur.

Tuberculum in pulmone.

Quoniam tuberculum in pulmone natū fuerit, tussis tenet, & erectæ cervicis spiratio, & dolor ad pectus acutus, & ad latera, & usq; ad quatuordecim dies ita afficitur. Nam pleriq; per tot dies tuberculi affectio inflāmur. Sed & caput dolet & palpebras, & uidere non potest: & corpus subfuluū fit, ac uenis impletur. Hunc multa calida lauato, & aquā mulsam aquosam bibendam dato, & ptisanæ succū sorbendum, & uinū aquosum insuper bibendū. Si uero dolor irgeat, calefactoria adhibeto. Vbi autē sedatus fuerit, cibis mollissimis utatur. Quod si liberatū à morbo, spirandi difficultas corripiat, dum ad accliuē locum rectā pergit, aut aliās festinat, pharmacū dato, à quo inferna aluus non moueatur. Et si unā cum uomitu pus sequatur, si quidem pus fuerit album, & fibræ in ipso subcruentæ fuerint, effugit. Si uero liuidū, & cum uirore pallidum, ac graueolens, moritur. Purgantur autē in quadraginta diebus ab ea qua erupit. Multis etiam annuus fit morbus. Hunc uelut suppuratum curare oportet. Quod si non erumpat (multis enim progressu tēporis abscedit ad latus, & extumescit) hunc si hoc fiat secato aut urito.

Pulmo repletus.

Si pulmo repletus fuerit, tussis tenet, & erectæ cervicis spiratio ac anhelatio, & linguam exerit, rubicūdis circulis in tibijs repletur, & pruritus uexat, & dolor acutus emergit ad pectus et scapulas, et nō potest sedere, neq; iacere, neq; stare, sed ægris uiribus est. Hic quarta die maxime moritur. Si uero hanc euaserit, spes plerunq; est, periclitatur tamē etiam in septima. Si uero hanc effugerit, sanus euadit: hunc ubi ita habuerit, multa calida bis in die lauato, & ubi dolor habuerit, calefactoria adhibeto. Et mel et acetum cocta bibēda dato, et ptisanæ succum sorbendum, ac uinum insuper bibendum. Si uero ad balneum et calefactoria affligatur, et ipsa non sustineat, perfrigoratorium ipsi adhibeto: et fauum mellis aquā frigidissima macerato, aquamq; bibendam dato. Et decubat ad frigus. Hæc faciat. Morbus autem grauis est et lethalis.

Pulmo ad latus prolapsus.

SI pulmo ad latus prolapsus fuerit, tussis tenet, & erectæ cervicis spiratio, & salivam tussiendo rejicit albā, & dolor ad pectus & dorsum emergit, & incumbens pulmo impellit, & graue quiddam in pectore incubere uidetur, & dolores acuti pungunt, & sanguis stridet uelut pellis, & spirationē cohibet, & ad affectum quidem latus decubitū sustinet, non autem ad sanum: uerum ueluti graue quiddam ipsi de latere pendere uidetur, & per pectus trāspirare se putat. Hunc calida multa bis in die lauato, & aquā mulsam ipsi bibendam dato. Post balneum, uinum album, cum modico melle misceto, & dauici ac centaurij semina trita his diluito, & tepida hæc sorbēda præbeto. Et infusam aquā calidam in utriculū, aut uesicam bubulam, ad latus apponito, & fascia pectori alligato. Decumbat in latus sanum. Pūsanæ succum tepidū præbeto, & uinum aquo sum insuper bibendum. At si ex uulnere hoc fiat, aut suppurato secto (fieri enim in his solet) huic uesicam ad fistulam alligatā flatu impleto, ac intro mittito, & penicillum solidum stanneum indito, ac ulterius propellito. Sic curationē instituens, maxime profeceris.

Lateris tuberculum.

QUUM in latere tuberculū sit, tussis emergit dura, et dolor, & febris, et grauitas in latere incumbit, & dolor acutus in eodem semper loco urget, et sitis uehemens, & calidū potum auersatur, & in dolens latus decubere non potest, sed in sanum. At ubi decumbit, uelut lapidis impendere ipsi uidetur, & intumescit, & rubescit, et pedes intumescunt: hūc secato aut urito. Postea pus emitto, usq; ad decimū diem, linamēto ex lino crudo indito. Decima autē die pure omni emissio, uinū & oleum tepidā immittito, ut ne derepente resiccetur, & linamento ex linteolo utitor, ubi uero id quod infusum est emisericis, aliud infundito. atq; hæc per dies quinq; facito. postquam autem pus tenue effluxerit, uelut pūsanæ succus ac modicum, ad manus contactum, stanneum penicillum indito, & ubi penitus resiccatum fuerit, linamento semper modice præfecto, ulcus ad linamentum coalescere sinito.

Hydrops pulmonis.

SI hydrops in pulmone fiat, febris et tussis tenet, & acruatim respirat, & pedes tument, & ungues contrahuntur omnes, & patitur talia, qualia is qui suppuratus sit, sed debilius ac diuturnius. Et si quid infundas, aut fomentum aut suffitum adhibeas, pus non sequitur, atq; ex hoc sanè cognoueris, non pus, sed aquam intus esse. Et si multo tempore aure ad latera adhibita audire tentaueris, ebullit intrinsecus uelut acetum: & hæc quidem aliquandiu patitur, postea erumpit ad aluum, & statim quidem sanus esse sibi uidetur, ac à morbo liberatus. Verum progressu temporis aluus incenditur, eadem que illa patitur, & adhuc amplius. Aliqui etiam intumescunt uentre, scroto, ac facie. Et quidam ab inferna aluo id esse putant, quum uideant uentrem magnum, & pedes tumentes. Intumescunt enim hæc, si sectionis tempus transgrediaris. Hunc si quidem extra intumuerit, inter cōstas sectum curare oportet. Si uero non intumuerit, multa calida lotum uelut suppuratos collocato, & quia parte strepitum perceperis, ea secato, quā potes infimo loco, quo effluxio facilis contingat. Postquam secueris, linamentum ex lino crudo indito, ita ut crassum & acutum

lina

linamentum facias, & sanguinem paucissimū parce emittas. Et si quidem in linamento pus adhæserit quinta die, plerunq; euadit. Sin minus, ubi aquam exhauseris, sitis corripit & tussis, & moritur.

Pectus aut dorsum ruptum.

Si pectus aut dorsum fuerit ruptum, dolores tenent pectus ac dorsum perpetuo, & calor aliās atq; aliās corripit, & saluam subcruentā tussiendo reijcit, & uelut pilus cruentus per saluam transcurrit. Atq; hæc maxime patitur, si manibus quid laborarit, aut in currū, aut equum inscenderit. Hūc ante & retro urito ex partibus utroq; loco, & sic sanus euadit. Cæterum per annum à labore se contineat, & ab uisura pinguefaciendo corpori studeat.

Febris ardens.

Febris tenet, & sitis uehemens, & lingua aspera, & nigra, & cum uirore pallida, & sicca, & uehementer rubicunda: & oculi cū uirore pallidi sunt, & excrementum egerit rubicundum & cum uirore pallidū, talem quoq; urinā mingit, & multū spuit. Sæpe etiā transmutatur uelut ad peripneumoniā, & delirat. Ex qua re cognoueris q̃ peripneumonia sit. Hic si quidem peripneumonicus fiat, & quatuordecim dies transgrediatur, sanus fit. Si uero in decē & octo diebus peripneumonicus fiat, si non impurgatus permanēs suppuratus fiat, aquā de crassa farina in ipsa macerata bibat, et acetum album q̃ odoratissimū postea bibat, & ptisanæ succum sorbeat bis in die, si uero debilis fuerit, ter. & uinū uinosum, album, aquosum insuper bibat, & q̃ minimum lauet. At si suppuratus fiat, uelut suppuratum curato.

Febris singultiens.

Febris detinet uehemens, & rigor, & tussis, & singultus, & unā cum saluā grumos sanguinis tussiendo reijcit, & septima die moritur. Si uero decem dies effugerit, melius habet. Verū uigesima suppuratur, & primis diebus pus modicū tussiendo reijcit, deinde amplius, Purgatur autem in quadraginta diebus. Huic primis diebus acetum & mel cocta bibēda dato, et postea acetum & aquam ammisceto, quo aquosior potio fiat. Et ptisanæ succū modico melle amixto sorbeat, et uinum album uinosum insuper bibat. Postquā autem decem dies præterierint, si febris sedetur, et sputum purum sit, ptisanam integrā sorbeat, aut milium. At si uigesima die pus spuat, saluā, et rutam, et satureiam, & origanum, ac hypericum, singula æquis portionibus confusa ac cribrata permisceat, ita ut omnium cyathi parui siue conchæ marinæ, sit mensura, et polentæ tantundem. Hæc ieiunus in uino dulci temperato bibat. Et si hyems sit, aut autumnus, aut uer, sorbitionibus utatur. Si uero æstas, minime. Verum amygdalas, et cucumeris semen torrefactū, & sesamum, singula æquis partibus, ut in totum sit conchæ marinæ mensura terat, et aquæ heminam Aeginæam affundat, & farinam ac fauum inspergat. Hæc post potum sorbeat. Cibis utatur pinguib; & salis, & marinis magis q̃ carnibus. Calida lauet, minime uero caput. Hæc faciēs à morbo liberatur.

Morbus lethargus dictus.

TVsis oboritur, et saluā spuit multā ac liquidā, et nugas garrit, & ubi nugari desierit, dormit: et recrementum male olens egerit: huic aquā de macerata in ipsa farina crassa bibendam dato, et uinum album uinosum postea biben

bibendum, & ptisanæ succum sorbendum. Verū huic mali punici succum ammisceto: & uinum uinosum album insuper bibat, et ne lauet. Hic in septem diebus moritur, Si uero has effugerit, sanus euadit.

Morbus siccatorius appellatus.

Neq; sine cibo esse, neq; cibū acceptū tolerare potest. Verum ubi quidem sine cibo manet, uiscera sugunt, & os uentriculi dolet, & aliās alia uomit, & bilem, & saliuam, & pituitam, & acria: & postquā uomuit, aliquantisper melius habere sibi uidetur. At ubi cibum accepit, ructus adsunt, & cum rubore exardescit, & semper multum se cacaturū esse putat. Vbi uero ea gratia defecerit, flatus prodit, & dolor caput habet, & totum corpus uelut aciculis pungi uidetur, aliās alia parte. & crura grauiā sunt ac debilia, & consumitur, ac debilis fit. Huic medicamentū bibendum dato, primū deorsum purgans, postea supernet: & caput purgato, & à cibis abstineat dulcibus, & oleosis ac pinguibus, & ab ebrietatibus. Vomat autē à succis, & à cibis, & pro anni tempore, lac aut serū asininum bibendum præbens, pharmacum insuper bibendum dato, utro tandem magis opus esse tibi uisum fuerit. Aestate & uere frigida lauet. Autūno autem & hyeme unguēto utatur, & deambulet, & modice se exerceat. Si uero debilior sit q̃ ut exerceri possit, iter faciat. Et cibis frigidis ac aluum subeūtib; utatur. Et si uenter non egerat, molle infusum per clysterē inijcito. Morbus hic diuturnus est, & consenescentes, si ita futurū est, relinquit. Sin minus, commoritur.

Febris interficiens appellata.

Febbris tenet, & rigor, & supereilia impēdere uidentur, & caput dolet, & uomit saliuam calidam, & bilem multam. quādoq; etiā infra egerit, & loci oculos non capiunt, & dolor ad ceruicem & ad inguinā emergit, et affectis uiribus est, & nugas garrit. Hic septima die aut etiam prius moritur. Si uero hanc effugerit, plerūq; sanus fit. Morbus est lethalis. Huic perfrigatoria adhibere oportet ad uiscera, & ad caput. & ordeum torrefactum unā cū paleis fractum aqua macerare, & de excolata aqua, mulsam facere, atq; hanc aquosam bibendam dare. Cibus autem non offerre, neq; sorbitionem, usq; ad septimū diē, si non debilis esse uisus fuerit. Si uero sit, ptisanæ succum frigidū ac tenuem modicū, bis in die exhibere, & aquam insuper bibendam. Postquā uero septem dies præterierint, et febris dimiserit, milium lingat. Ad uesperam cucurbitam, aut betas paucas sumat, & uinū album aquosum inde bibat, donec ad nonum perueniat diē. Postea cibo q̃ paucissimo utatur, miliū in prandio sumēs. Balneo donec dolor et febris affuerint, ne utatur. Vbi uero cessauerint, multa lauet. Quod si uenter nō egerat, molle infusum per clysterē immittito, aut glandulas subdito. Quū uero ualidus factus fuerit, molli pharmaco ad nares appposito, aluum infra purgato. postea lac asininū bibendum dato.

Morbus liuidus.

Febbris detinet sicca, & horror aliās atq; aliās, et caput dolet, & dolor uiscera tenet, & bilem uomit, & quū dolor tenet, suspicere nō potest, sed grauatur; & uenter durus fit, et color liuidus, et labia, ac albæ oculorū partes liuescunt, & aspectū præ se fert uelut qui strangulatur. Quādoq; etiā colorē trāsmutat, et ex liuido, cū uirore subpallidus fit. Huic medicamentū et deorsum, et sursum purgās bibendū dato, et clysterē adhibeto, et à capite purgato. Et calida q̃ minimē lauet, sed et ubi lauerit, ad solē apricetur. Serū etiā et lac asininū pro anni tēpore bibat

bibat, & cibus q̄ mollissimis utatur & frigidis, abstinēs ab acribus & salis: ue-
rum dulcoribus ac pinguioribus utatur. Ceterū hic morbus ut plurimū cum
aegro commoritur. Morbus ructuosus.

Dolor corripit acutus, & doliat uehementer, & ipse seipsum iactat, & uoci
feratur, & frequēter eructat, & ubi eructauit, melius habere sibi uidetur.
Sæpe etiā bilem reuomit modicam, poculi parui mensura; & dolor corripit a
uisceribus ad inum uentrem, & laterum mollitudinem, & ubi hoc factum fue-
rit, melius habere sibi uidetur; & uēter inflatur, ac durus fit, & strepit, & flatus
non egreditur, neq; stercus. Hunc si dolor habuerit, multa calida lauato, et ea
lesfactoria ipsi adhibeto. Vbi uero in uentre dolor ac flatus fuerit, clysterem ad-
hibeto; & mercurialis coctæ succum, ad pisanæ succū ammisce: ac sorbendū
dato, & uinum dulce, aquosum, insuper sorbendum. Cibū autem ne exhibeas,
donec dolor remiserit, & uuarum expressarum retrimenta dulcia, per noctem
in aqua maceret, & hanc aquam per sex dies bibat. Si uero uuarū expressarum
retrimenta non habeat, mel & acetum cocta bibat. Postquā autem dolorē mo-
uerit, medicamento deorsum aluum purgato. Cibus utatur inde mollibus & ali-
uum subeūtibus, & marinis magis q̄ carnibus, carnibus autem uolucrum &
ouillis coctis: edat etiā betas & cucurbitam: ab alijs uero abstineat. Morbus
hic si iuuenem corripiat, tempore decedit: si seniore, commoritur.

Morbus pituitosus.

Corripit quidem morbus pituitosus etiā uirum, sed magis mulierem, &
est hæc quidem crassa & bene colorata, uerū iter faciens debilitatur, & ma-
xime si ad accliuem locum iter faciat. Corripit ipsam etiā febris tenuis, quan-
doq; etiā suffocatio: & euomit ubi ieiuna est, bilem & saliuas multas, sæpe et
etiā ubi cibum accepit, de cibo tamen nihil; & quum laborarit, dolet pectus &
dorsum, aliās alia parte, & rubicundis cutis eminentijs impletur, uelut ab urti-
ca inustis. Huic medicamentū bibendum dato, & serum ac lac asininū bibat.
Si uero serum poterit, medicamentū deorsum purgans ad plurimos dies præbi-
bendum dato. Et si serum bibere desierit, lac asinum postea bibat, & dum hoc
potarit, a cibus quidem abstineat, uinum uero quā iucundissimū bibat, donec
purgari desinat. At ubi à potione cessauerit, milium in prandio sumat. Vesper
cibo mollissimo utatur ac paucissimo. Abstineat à pinguibus et dulcibus ac o-
leosis. Et aliās atq; aliās, maxime tamen hyeme, à lenticulæ decocto uomat, ole-
ribus præsumptis. Et calida q̄ minimum lauet, sed & ad solem apricetur. Mor-
bus autem commoritur.

Pituita alba.

Intumescit totum corpus albo tumore, & uenter ad cōtactum crassus est, &
pedes ac femora tument, Tibiæ item ac scrotum, & acruatim respirāt, & fa-
cies rubicunda est, & os siccum, & sitis tenet, & ubi cibum accepit, spiritus fre-
quens incumbit. Hic eadem die quandoq; melius habet, quandoq; peius. Huic
si quidem uenter sua sponte turbatus fuerit in principio morbi, proximus sani-
tati est. Si uero non turbetur, medicamentū deorsum purgans dato, à quo aqua
purgetur. Et calida non lauet, & sub dio exponatur, & scrotum ubi impletum
fuerit secato. Cibus utatur pane puro frigido, et betas, & piscibus scorpijs coctis,
iufculo autē q̄ paucissimo. Et frigida omnia edat, & non dulcia, neq; pinguiat
sed

sed trita & acida, & acria, excepto allio, cepa, et porro. Origanū uero & satureiā multam edat, & uinū inde uinosum bibat. & ante cibum iter faciat. At si à medicamento tumeat, clysterem adhibeto, & cibō, deambulationibus, & illuue premito. Medicamenta uero q̄ paucissima exhibetō. Verum sursum purgans nō prius dederis, q̄ tumores ad infernas partes descenderint. Quod si extenuato iam ipso suffocatio in pectore oboriatur, ueratrū bibendum dato, & caput purgato, & postea deorsum purgans bibat. Morbus hic maxime à nullo discedit.

Cura morbus difficilis.

In uisceribus ueluti spina esse uidetur, & pūgere, & anxietas ipsum corripit, & lucem ac homines fugit, & tenebras amat, & timor inuadit, & septū transuersum foris tumet, & ad contactū dolet, & expauescit, & terriculamenta ac somnia horrenda uidet, & quādoq; etiā mortuos. Et morbus hic fere plurimos uere corripit. Huic ueratrū bibendum dato, & caput purgato, & post capitis purgationem pharmacum deorsum purgans bibat, postea uero lac asininū bibat. Cibus utatur q̄ paucissimis, si nō debilis fuerit, & frigidis, & aluum subeuntibus, & non acribus, neq; salis, neq; pinguibus, neq; dulcibus. Et calida nō lauet, neq; uinum bibat, sed aquam maxime, aut saltem uinū aquosum. Neq; exercitijs utatur, neq; deambulet. Hæc si fecerit, à morbo liberabitur tēporis progressu. Si uero neglexerit, commoriētur.

Morbus niger.

Nigrum uomit ueluti fecem, quandoq; cruentum, quandoq; uelut uinū secundarium, quandoq; uelut polypi atramentū, quandoq; acre uelut acetum, quādoq; saliuam & pituitam, quādoq; bilem cum uirore pallidam. Et ubi quidem nigrum cruentū uomuerit, cadauēris foetorem refert: & fauces & os à uomitu aduruntur, & dentes stupefcunt, & id quod uomitu reiectum est terram eleuat. Et postquā uomuit, paululum melius se habere putat. Et neq; sine cibo esse, neq; ampliozem cibum ferre potest. Verum ubi sine cibo manet, uiscera fungunt, & saliuæ acidæ sunt. Quum uero cibū accepit, grauitas in uisceribus est, & pectus ac dorsum uelut stilis pungi uidentur, & dolor tenet latera, & febris debilis est, & caput dolet, & oculis non uidet, & crura grauantur, et color niger est, & consumitur. Huic pharmacum bibendum dato frequenter, & pro anni tempore & serum, & lac. Et à cibis abstineat dulcibus, & oleosis, ac pinguibus, & frigidissimis ac maxime per aluum subeuntibus utatur. Et caput purgato, & post medicamentorum potiones sursum purgantes, de manibus sanguinē detrahitō, si non fuerit debilis. At si aluus nō egerat, molle infusum per clysterem immittito. Et abstineat ab ebrietatibus & uenere. Si uero coierit, ieiunus fomētis utatur. Et à sole abstineat, neq; multum se exerceat, neq; deambulet, neq; calida lauet, neq; acria edat, neq; salsa. Hæc facienda sunt. Et unā cum ætate aufergit etiam morbus, & cum corpore senescit. Si uero denigratus fuerit, cōmoriētur. Alius morbus niger. Subfuluus & gracilis, & oculis cū uirore pallidis fit, & tenuem cutem habet, ac debilis est. Quanto autem tempus amplius progreditur, tanto morbus amplius affligit. Et uomit omni tempore uelut stillementum modicum, ad duorum poculorum paruorū mensuram, & frequenter etiam cibum, ac unā cum cibo bilem & pituitam: & post uomitum dolet totum corpus, aliquādo etiā antea q̄ uomat. Et horrores tenues ac febris tenet.

& ad dulcīa ac olēosa maxime uomit. Hunc medicamentis sursum ac deorsum purgare oportet, & iacasinum postea bibendum præbere. Cibis autē utatur mollissimis ac frigidis, piscibus littoralibus, & cartilaginei generis, & betis, & cucurbitis, & carnibus tritis. Vinū bibat album, uinosum, aquosius. Labore & deambulationibus utatur, & calida ne lauet, et à sole abstineat. Atq; hæc sanesciēda sunt. Verum morbus lethalis quidem est, non autem consenescit.

Morbus corruptorius.

Alia quidem omnia eodem modo patitur. Verum grumos bilis cōcretos uomit, & deorsum similiter egerit, postquā cibos excreuit. Cæterum eadem facere oportet, quæ in priore morbo relata sunt, & clysterem adhibere.

HIPPOCRATIS COI DE MOR-

BIS, LIBER III. IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.



E febris uersis à me dictum est, de reliquis iam dicam.
Cerebri humor.

Quoniam cerebrū ab inflāmatione tumuerit, dolor totū caput occupat, maxime qua parte cōstitit inflāmatio. Cōsistit autē in temporibus: & aures sonitu implentur, & auditus hebescit, & uenæ extēæ sunt, ac pulsant. & febris ac rigor aliquando corripunt, & dolor nūquam deficit, sed quandoq; remittit, quādoq; magis prēmīt, & uociferatur ac exilit præ dolore. Et ubi surrexit, rursus ad lectum decūbere festinat, & iactat seipsum. Hic lethaliter quidem affectus est, in quot uero diebus morietur, nō habet iudicationē. Nā alij aliter pereunt. Plerunq; tamen in septem diebus moriūtur. Si uero uigesimalū primum effugerint, sani fiunt. Quoniam itaq; dolor uexarit, frigefacere caput oportet, maxime quidem per rasurā, aut frigefactorio aliquo, uelut est solani succus, & terra figularis, in uesicam aut folliculū immisso, ita ut uicissim modo apponas, modo auferas, priusquā tepescant. Sed & sanguinem detrahare oportet, et caput purgare, ad apij succos odoratis ammixtis. A uino autem in totum abstinere. Ptifanæ succum sorbere, & infernam alium soluere.

Cerebri repletio dolorosa.

Quoniam doluerit caput præ cerebri repletionē, uitiosorum humorū purgationem non factam esse significat, & dolores totū caput tenent, & delirat, & moritur septima die, & euadere non poterit, si non eruperit humor septima die per aures. Sic enim & dolor sedatur, & respicit. effluit autē multus & inodorus. Huius aures priusquā pus erupisse uideris, potius ne curato. Si uero supernam ac infernam alium purgare uoles, seorsum utrāq; solueto. Postea capiti maxime quidē uniuerso, sed & per aures, & per nares, fomentū adhibeto. Sorbeat autem ptisanæ succum, & à uino abstineat in totū. Postquā uero eruperit pus, contineto te donec multa fluxio sedetur, postea aures collueto uino dulci, aut lacte muliebri, aut oleo ueteri, atq; hæc tepida infunduntur. Caput uero frequenter mollibus ac odoratis fomētis foueto, quo citius cerebrū purgetur. hic primum quidem non audit, progressu uero temporis et fluxio minor fit, &

auditus

auditus unâ cum fluxione penitus quiescentē contingit, & maxime sibi ipsi similis redit. Cauere autem oportet solem, uentos, ignem, fumum, aerium odores, & alia huiusmodi: & quiescere, ac molli uictus ratione uti. Sit autem aluus inferna præ uasorum uacuatione solutu facilis.

Syderati.

Qui icti ac syderati esse dicuntur, quum cerebrum multa immundicia uitioforum humorum repletum fuerit, anterior capitis pars primum dolorem ipsis exhibet, & suspicere non possunt, aliqui ambobus oculis, aliqui altero, & sopor ipsos tenet, & desipiunt, & tempora saliunt, & febris tenuis habet, & corporis impotentia. Hic tertia aut quinta die moritur, & ad septem non deuenit. Si uero deuenierit, à morbo liber euadit. Hunc si curare uoles, capiti fomēta adhibeto, & sectione facta transpirationem effcito. Si uero dolor tenuerit, etiam sternutationes inducere oportet, & caput purgare leuibus ac odoratis, infernâ item aluum purgare. A uino autem penitus abstineat, & ptisanæ succo utatur.

Cerebri corruptio.

Si cerebrum corruptum fuerit, dolor caput tenet, & per collum procedit ad spinam, & æger non audit, & frigus ad caput deuenit, & totus intumescit, & derepente priuatur uoce, & ex naribus sanguis fluit, & liuidus fit. Quod si morbus leuiter corripit, ubi sanguis discessit, melius habet. Si uero uehementer correptus fuerit, cito perit. Huic sternutationes per odorata inducito, & aluum utranq; aut alteram saltem purgato. & odorata quæ leues odores habent, naribus admoüeto. & sorbitionem tenuem ac tepidam exhibeto. Abstineat autem penitus à uino.

Lethargus.

Morbi lethargi appellati status idem est, qui & peripneumoniæ. Verû difficilior, & non omnino liber ac remotus est ab humida peripneumonia. Sed multo tardior est morbus. Patitur autem æger hæc. Tussis et sopor ipsum tenet, & saluam liquidam ac multam educit, & uehementer impotens est: & quum moriturus est, multum atq; id liquidum infra egerit. Huic ualde exigua uitæ spes est. Attamen hoc curandum est ut plurimū spuât, & calefiat, & à uino abstineat. Si uero effugerit, suppuratus fit.

Morbûs siue febris ardens.

In morbo febris ardente appellato, sitis tenet multa, et lingua horret. At color leuius primò quidem tempore est ueluti solet, uerum sicca est. Progressu uero temporis induratur, exasperatur, crassescit ac nigrescit. Si uero in principio hæc patiantur, citiores iudicationes fiunt, Si posterius, tardiores. Cæterū remissionis eadem omnia signa lingua exhibet, quæ in peripneumonia: & urinæ biliosæ aut cruentæ, dolorem ampliorem: flauæ uero, minorem significant. & sputum præ caliditate ac siccitate, combustum ac crassum est. Sæpe uero etiam in peripneumoniâ transit, quod si contigerit, breui moritur. Hunc autem hoc modo curare oportet, calida bis aut ter singulis diebus lauato, capite excepto. At in iudicationibus lauare non oportet. Et primis quidē diebus deorsum purgato, & aquam bibendam dato. Nam plerumq; uomitū aqua ciere solet. Posterioribus uero post purgationē humectato, & sorbitionibus utatur, ac uinis dulcibus. Quod si non ab initio ægrum curandum suscepitis, sed signis iam in lin

70 gua existentibus, finire oportet donec iudicationes præterierint, & lingua signa mitiora facta fuerint: & neq; medicamentū dederis, neq; ad purgationem faciendam clysterem adhibueris priusquam iudicationes prætereant.

Pulmo tumens præ calore.

Q Vum pulmo tumuerit præ nimio calore repletus, tussis tenet fortis & dura, & erectæ ceruicis spiratio, & acruatim respirat, & frequenter anhelat, & intumescit, & nares expandit, uelut equus ex cursu, & linguā frequenter exerit, & pectus ipsi canere uideatur, & grauitas in ipso inesse. Quapropter hanc capere pectus non potest, sed dirumpitur & impotens fit, & dolor acutus emergit, & dorsum, & pectus, & latera uelut acubus punguntur: & ardent hæ partes uelut eius qui sedeat ad ignem & rubores exoriuntur ad pectus & dorsum, uelut à flamma, & morsus fortis incidit, & angustia, ut neq; stare, neq; sedere, neq; decumbere possit. Verū ita uelut desperatis rebus anxius iactat seipsum, & iam mori uidetur. Moritur autem maxime quarta aut septima die, quas si effugerit, non ualde perit. Hunc si cures, infernam aluum q̄ citissime clysteri adhibito, probe purgare oportet, & de cubitis, & naso, & lingua, ac de omni corporis parte sanguinem mittere. Potiones item frigefacientes exhibere, & prohibitiones idem præstantes. Danda sunt & urinam cientia saepe, sed quæ non calefaciant. Et ad ipsos quidem dolores quum irruunt, calefactoria leuia ac humida adhibendo, locum calefacere ac humectare oportet, ubicūq; dolor fuerit: ad reliquas uero partes, frigefactoria adhibere, uicissim ea apponendo ac tollendo, & ubicūq; arserit frigus facere. A uino autem penitus abstinere.

Capitis dolor.

Q Vum à capite initio sumpto, dolor acutus statim uocem interceperit, tum alia, tum si ex ebrietate hoc cōtingat, ita affectus septima die moritur. Minus tamen moriuntur qui ex ebrietate tale quid perpessi sunt, & uoce priuati permanserunt. Nam si eadem die, aut postera, aut tertia uocem edant, sani euadunt, faciunt autem hoc aliqui ex ebrietate, & neutri moriuntur. His sternutationes fortes inducere oportet, & infusum per clysterē inijcere, quod bilem uehementer ducat. Quod si sensum æger receperit, Thapsiæ succum in multa calida aqua dato, quo q̄ citissime reuomat. Postea attenuato, et à uino prohibeto per septem dies. Detrahendus est & à lingua sanguis, si uenam comprehendere reposis.

Phrenitides.

Phrenitides fiunt etiam ex alijs morbis. Patiuntur autem ægri hæc septum transuersum dolent, ut ne cōtingere quidem permittant, & febris accedit, & mente mouentur, & intentis oculis uident, & alia similia faciunt his qui peripneumonia affecti sunt, ubi sanè in peripneumonia mente mouentur. Hoc modo affectum calefacere oportet calefactorijs humidis & potionibus, excepto uino. Et si quidem fieri poterit, sursum purgare, & per tussim ac spuitum educere oportet, quemadmodum in peripneumonia. Sin minus, inferna aluus præparanda est, ut egerat. Humectato autem potionibus, hoc enim conducit. Morbus autem lethalis est. Moriuntur enim tertia, aut quinta, aut septima die. Si uero leniter corripiat, iudicat uelut peripneumonia.

Angina.

110 AB Angina appellata suffocatur homo, & in faucibus magis ipsi inhaerere uidetur

uidetur, & neq; saliuam, neq; quicquam aliud detrahit, & oculi affecti sunt ac prominent, uelut strangulatis, & intente per ipsos uidet, & ipsos conuèrtere non potest, & anxius est, & exilit frequenter, & facies & fauces ardent, immò etiam collum. At uidentibus nihil mali habere uidetur, & uidet ac audit obtusius, & præ suffocatione non intelligit, neq; quid dicat, neq; quid audiat, aut faciat. Verum hians decumbit saliuam fundens, ac talia faciens. Hic quinta, aut septima, aut nona die moritur.

Leuis angina paracynanche appellata.

A Tubi horum signorum quid abfuerit, laxiorem morbum significat, quem paracynanchen uocant. Huic uenam secare oportet, maxime sub mamma. Cõcomitatur enim hac parte ex pulmone spiritus calidus. Oportet quoq; deorsum purgare medicamẽto, aut per clysterem. Fistulas item detrudere conuenit in fauces iuxta maxillas, quo spiritus ad pulmonem trahatur. Et faciem dum uti quàm citissime spuat, & pulmo gracilis fiat. Et suffitus fiat per hyssopum Cilicium, sulphur, & bitumen: & attrahat & per fistulas, & per nares, ut exeat pituita. Fauces & lingua confricentur his quæ pituitam ducunt. Et uenæ sub lingua secantur. Sed & à cubitis sanguis dimittatur, si uires ualidæ fuerint. Auino abstineat, & ptisanæ succum tenuem sorbeat. Postquam uero remiserit morbus, & iam cibos gustarit, elaterio recẽti purgato, ut ne in aliud malum incidat.

Morbus regius.

Morbus regius huiusmodi acutus est, & cito occidit. Color totus mali coloris ualde refert, & cum uirore pallidus est, quales sunt lacerti cum uirore pallicantes. Consimile est etiam corpus: & in urina subsidet uelut eruum fuluum, & febris ac horror debilis habet. Quandoq; etiam uestimenta ferre non potest, sed mordetur ac raditur. Et mane quum cibum non accepit, uiscera plerumq; lancinantur. Et quum quis ipsum excitat, aut alloquitur, nõ patitur. Hic plerumq; in quatuordecim diebus moritur. Has si effugerit, sanus euadit. Oportet autem ipsum calida lauare, & aquam mulsam bibendam dare, ita ut de nucibus Thasiis decorticatis, & absinthij coma, æquis portionibus acceptis, & de aniso cribrato dimidia parte ammixta, obolos tres ieiunus ex illa bibat, & rursus dum cubitum it hanc aquam mulsam sumat. Bibat etiam uinum uetus tenuis, & sorbitionibus utatur. Nec à cibis abstineat.

Tetanus.

Quam distentiones Tetani appellati, corripuerint, maxillæ rigent uelut ligna, & os aperire non possunt, et oculi lachrymantur ac distorquentur, & dorsum riget, & crura contrahere non possunt, similiter neq; manus, & facies rubicunda est, & ualde dolet, & ubi moriturus est, & potum, & sorbitionem, & pituitam per nares reuomit. Hic tertia die, aut quinta, aut septima, aut decima quarta perit. Vbi uero has effugerit, sanus euadit. Huic catapotia ex pipere & ueratro nigro deuoranda dato: & iusculum uolucrum pingue calidum. Inducendæ sunt etiam fortes ac multæ sternutationes, & fomenta adhibenda. Quum autem fomentis non utitur, calefactoria humida ac pinguis undequaq; in uescis ac utriculis apponantur, maxime tamen ad partes dolentes, & calido oleo multo ac saepe illinatur.

Opisthotonos.

QUum autem distētio in posteriores partes, opisthotonos appellata tenues rit, reliqua quidem plerunq; eadem sunt. Verum in posteriores partes cōuellitur, & uociferatur aliquando, & dolores emergunt uehementes, & crura interdum contrahere non permittit, neq; manus extendere. Sunt enim cubiti incuruati, & digiti in pugnum contracti, & pollicem plerunq; alijs digitis continet, & clamat, & nugas garrit quādoq; & non potest seipsum continere, sed aliquando exilit, ubi dolor premit, quum uero dolor remittit, quietem habet. Aliquando etiam uox intercipitur simul ut morbo corripiuntur, aut infani & atra bile perciti fiunt. Hi tertia die moriuntur uoce soluta, & reuomunt per nares. Si uero effugerint decimumquartum diem, sani fiunt. Curandus hic est uelut superior. Quod si uoles, etiam sic facies. Aquā frigidam plurimam superfundito, & postea uestimenta tenuia, pura, ac calida superintegito. Ignem aut tunc non adhibeto. Hoc auxilium & ad tetanos, & ad opisthotonos adhibere oportet.

Voluuli.

VOluli fiunt quum supernus uentriculus calefcit, infernus uero frigescit. Resiccatur enim simul intestinum, & præ inflammationis caliditate obturatur, ut neq; flatus, neq; cibi pertranscant, sed uenter durus sit, & quādoq; uomat, primum pituitosa, deinde biliosa, postremum stercus. Et æger sitim habet ac dolorem, maxime circa præcordia. Verum & totum uentrem dolet, & inflatus est, & anxius est, & febres corripiunt, & fiunt maxime septima die. Hos sic curare oportet. Supernū uentriculum quā citissime purgato, & sanguinem de capite ac cubitis detrahito, ut superna aluus calefcere desinat, & partes supra septum transuersum frigefacito, excepto corde. Infernas autem calefacito, hamine in folio aquæ calidæ collocato, ac semper oleo illito. Calefactoria quoque humida apponito. Et glandulam de melle solum decem digitorū longitudinis facito, & ex summa anteriori parte fel taurinum oblinito, atq; sic bis ac ter subdito, quo omnia combusta stercora circa rectum ac princeps intestinum cōtenta educas. Et si quidem sic obedierit, postea clysterem adhibeto. Sin minus, follem fabrilē indito, & in uentrem flatum immittito, à quo & uentrem, & intestini contractionem distendas. Deinde extracto folle, clysterem adhibeto. Sit autem infusum per clysterem iniiciendum paratum non ex ualde calefactorijs, sed ex his quæ stercora dissoluunt ac colliquant. Postea obturata per spongiam sede, in aqua calida desideat continens clysteris infusum. Et si hoc infusum susceperit, & rursus dimiserit, sanus euadit. Cæterum priore tempore mel optimum delingat, & uinum splendidum uernaculum bibat. Quod si uoluerit amoto, febris ipsum corripiat, desperatus est. Fortassis enim & inferna aluus soluta ipsum occiderit.

Peripneumonia.

PEripneumonia talia facit. Febris acuta tenet, & spiritum frequentem ac calidum respirat, & anxietas adest, & impotentia, & iactatio, & dolor sub scapulas, & ad clauiculam, & ad māmam, & grauitas in pectore, quandoq; etiam delirium. Quidam dolorem non sentiunt, donec tussire inceperint. Verū hic morbus diuturnior ac difficilior illo est. Saliuā tenuem, ac spumofam primum spuit. Lingua flaua est. Verum progressu tēporis nigrescit. Si igitur in princi-

pio nigrescat, citius morbus finitur. Sin posterius, tardius. Tandē uero etiam rumpitur lingua, & si digitum apponas, inhæret. At liberationem à morbo significat lingua, similiter uelut in pleuritide. Hæc autem patitur homo, minimum diebus quatuordecim, ad summum una & uiginti, & per hoc tempus tussit uehementer, & unā cum tussi purgatur, primum salua multa & spumosa. Septima uero & octaua die ubi febris in uigore fuerit, si humida sit peripneumonia, crassior prodierit: sin minus, non. Nona uero & decima, cum uirore pallida ac subcruenta. Duodecima autem usq; decimam quartam, multa & purulenta. Atq; hoc in his contingit, quorum naturæ & corporis affectiones humidae sunt, & morbus fortis est. Quorum uero & natura, & morbi constitutio sicca est, in his minus. Si quidē igitur decima quarta die resiccatus fuerit, et non amplius purulentum tussiendo reiecerit, sanus est. Sin minus, ad duo de uigesimam, & uigesimam primam animum aduerte, & si quidem tunc sputum illud quieuerit, euadit. Sin minus, interroga ipsum, an dulcior sit salua, & si affirmauerit hoc, scito pulmonem ipsi suppuratum esse, & morbus annum durabit, si non in quadraginta diebus pus eduxerit. Si uero insuauem saluam esse dixerit, status morbi lethalis est. Verum in primis diebus hi maxime manifesti fiunt. Si enim putrefactum ac purulentum expuerit in diebus duobus ac uiginti, & non exulceratus fuerit, euadit. Sin minus, non. Hæc peripneumonia nihil abest ab affectionibus quæ in pulmone sunt. Si igitur aliquid harum affectionum abfuerit, cognoscere oportet & quæ ægrotus mala habeat, & quæ medicus aggredi debeat. Si uero pauca horum signorum habuerit, ne decipiatur. Nam perniciofa non est peripneumonia, sed mollis. Cæterum peripneumoniam hoc modo curare oportet. Non tamen peccabit, si quis etiam pleuritidem & phrenitidem ita curare aggrediatur. Primum caput leuius facere incipe, quo nihil insuat ad pectus. Primis autem diebus sorbitiones sint dulciores. Si enim id quod consedit ac compactum est, potissimum elueris ac commoueris. Quarta die & quinta ac sexta, non amplius dulces, sed pingues. Nam ad sputum sursum excreandum conducunt. Si uero pro ratione spueri non possit, ex pharmacis sursum educentibus dato. Aluum autem in primis quatuor aut quinque diebus subducere oportet, & hoc paulo amplius, quo & febres obtusiores sint, & dolores leuiore. Quum autem euacuatus fuerit, & corpore debilis, infernam aluum tertio quoq; die deorsum commoueto, quo & corpus potens sit, & supernæ regiones humoris exortes. Nam si multus humor infra secedat, à quinta die, mortem inducit. Infra enim humore secedente, supernæ partes resiccantur. & sputi purgatio sursum non prodit. Oportet igitur & infernam aluum, neq; ualde suppressam esse, ut ne febres sint acutæ: neq; ualde egerere, quo salua sursum educi possit, & æger uiribus ualeat. At medicamenta sursum educentia, sexta & septima ac nona die, & morbo adhuc ulterius progresso, magis exhibeto. Sit autem medicamentum, ueratrū album, thapsia, elaterium recens, singula æquis portionibus. Quod si salua non probe purgetur, & spiritus fuerit frequens, & purgatio non præualeat, prædicendum est nullam spem uitæ reliquam esse, si purgatione nihil efficere possit. Sed & alia facienda sunt quæ in peripneumonia fieri solent, si inferna aluus ministerium suum probe obierit. Quin & aliter facere curationem oportet.

2110 A prima die initio sumpto, ari magni conchulam maiorem dato, dauci & urticae utriusque itidem unam, sinapis & rutae quantum tribus digitis comprehendere potes, & succum silphij magnitudine fabae. Haec in aceto dulci & aqua permixta & diluta ac excolata, ieiuno tepida bibenda dato. Postquam uero purum exspuere coeperit, ari conchulam maiorem, & sesamum, & amygdalas purgatas, in aceto dulci aqua diluto bibenda praebeto. Si uero magis ducere uoles, radicis Capparis corticem his ammisceto.

Pleuritis.

2115 **Q**Uum pleuritis apprehenderit, haec patitur. Dolor latus, & febris & horror tenet, & frequentem spiritum habet, & erectae ceruicis spiratio urget, & tussiendo reijcit subbiliosa, uelut a mali punici corio, si non ruptiones habuerit. Si uero habuerit, etiam sanguinem a ruptionibus. Est autem & sanguinea pleuritis, in qua subcruenta reijcit, Et est quidem biliosa, mitior, si non ruptiones aeger habeat: sin minus, dolorosior quidem est, sed non lethaliior. At sanguinea fortis, & dolorosa, & lethalis est. Quum igitur affuerit simul singultus, simulque cum salua sanguinis grumos nigros tussiendo reiecerit, septima die moritur. Si uero dies decem transgressus fuerit, a pleuritide quidem sanus fit, uerum uigesima suppuratur, & pus tussiendo reijcit, demum uero reuomit, et non adeo facilis curatu est.

Pleuritides siccae.

2120 **S**unt & siccae pleuritides sine sputo, Verum haec difficiles sunt. Iudicationes autem similes alijs sunt, sed ampliore in potu humectatione opus habent quam aliae. Biliosae uero & sanguineae, nona & undecima die iudicant, atque hi magis sani fiunt. At si a principio quidem molles quidam tenuerint dolores, a quinta uero ac sexta die acuti, hi usque ad duodecimum perueniunt, & non ualde effugiunt. Periculum autem maxime est, usque ad septimum. Immo etiam usque ad duodecimum. Post has uero sanantur. Quae uero ab initio molles sunt, a septima autem & octaua acutae, ad decimum quartum iudicant, & sani fiunt.

Pleuritis ex dorso.

2125 **P**leuritis ad dorsum intantum ab alijs differt, dorsum dolet uelut ex plaga, & suspirat, & aceruatum respirat. statim autem spuit pauca, & corpus delassatur. Tertia aut quarta die sanie mingit subcruentam. Moritur aut maxime quinta die: sin minus, septima. Has si effugerit, uixerit, Et morbus lenis est ac minus lethalis. Custodire tamen oportet usque ad decimum quartum. Postea uero sanus euadit. Caeterum quibusdam pleuriticis salua quidem pura est, mictio autem cruenta, uelut serosa a carnibus assatis sanies. dolores uero acuti per spinam ad petus, & ad inguen tendunt. Hic si septimum diem effugerit, sanus fit. At si alicui in his pleuritidibus contingat dorsum rubescere, & humeros calefcere, & inter desidendum grauari, & uenter exturbetur egestionem cum uirore pallida, ac ualde graeolenti, hic propter uentris egestionem, uigesima prima die moritur. Has si effugerit, sanus fit.

2130 Quibus autem statim sputa uaria sunt, & dolores ualde acuti, hi tertia die moriuntur. Hanc autem transgressi, sanescunt. Qui uero sanus non fit septima, aut nona, aut decima, hic suppurari incipit. Melius est autem suppuratum fieri, etiamsi dolorosum sit. Minus enim lethale est. Porro supra omnia relata signa, in unaquaque pleuritide considerare oportet linguam. Si enim bulla subliuida fiat in lingua, uelut ferro in oleum tincto, si quidem

si quidem in principio fiat aspera, difficilior est morbi emotio, & necesse est sanguinem tussiendo rejicere, in diebus quibus id fieri oportet. Si uero facto morbi progressu fiat, iudicationes quidem contingent ad decimum quartum diem, Verum necesse est sanguinem spuere. Habet autem se res de liberatione ab hoc morbo, hoc modo. Si quidem tertia die inceperit maturari ac expui, citius liberabitur. Si uero posterius maturescat, posterius iudicationes fiunt, quemadmodum in capitis signis. Dolores porro in omni pleuritide, plerumque magis interdiu quam noctu leuiiores fiunt. Curare uero pleuritidas hoc modo oportet, ut plurimum uelut phrenitidem & peripneumoniam, præterquam quod hic balneis calidis & uino dulci utendum est. Si igitur prima aut secunda die postquam inuasit, ægrum accefferis, si stercus prodijt purum, aut leuiter biliosum & modicum, infusum ex Thapsia per clysterem injicito. Si uero alius commota, noctu quidem egerat, postridie uero dolor & tormen uexet, rursus clysterem adhibeto. At si æger biliosus sit natura, & non purgatus correptus fuerit à morbo, priusquam saliuam biliosam expuat, etiam medicamento bilem probe purgato. Si uero iam expuat biliosa, medicamentum ne dederis. Si enim dederis, sputum sursum prodire non poterit, sed septima aut nona die suffocabitur, maxime si præcordia doleant. Quod si ad dolores in lateribus etiam præcordia dolent, clysterem adhibere oportet, & in potu ieiuno bibendam dare, Aristolochiam, hyssopum, cuminum, silphium, peplum, mecona appellatum album, florem aris, mel, acetum, & aquam. Et per medicamenta quidem ita primas curationes facere oportet. Reliqua uero sic se habent. Multa calida pro uiribus ægri lauato, capite excepto, & quum iudicationes sunt, dolentes locos humidis fomentis tepefacito, & oleo illinito. Quum uero impetu fertur morbus, & ægrum & medicum à curationibus quiescere conuenit, ne quid mali inducatur. Dandus autem est ptisanæ succus coctus, aliquanto crassior spissitudine mellis. Post balnea etiam uinum dulce & aquosum bibendum est, non frigidum, modicum, ex angustis oris pocillo, & ubi tussis inuaserint, amplius bibendum & quam maxime exscreandum, & potu humectandum, quo pulmo humidior factus, facilius ac citius sputum reddat, & tussis minus affligat. Sed & mali punici dulcis uinosis succum, lacte caprino modico, & melle ammixto, paulatim sæpe dato, & noctu & interdiu, & somnum quam maxime prohibeto, quo purgatio & citius & copiosior fiat. At uero sanguineam pleuritidem sic curare oportet. Post iudicationes cibis leuibus reficito, & quietem agat, & nimium caueat solem, uentos, repletiones, acida, salsa, pingua, fumum, flatus in aluo, laborem, uenerem. Si enim morbus recidiuarit, mors sequetur. In expuitionibus autem si dolor habeat, & expuere non possit, ieiuno aris florem dato, magnitudine oliuæ, & succi silphij dimidium eius, & trifolij seminis modicum, Hæc ex melle delingat. Aut piperis grana quinque, & succi silphij magnitudinem fabæ, mel, acetum, & aquam, ieiuno tepida bibenda præbeto. Hoc etiam dolores fedat. Quod si pro ratione spuere non possit, sed moretur sputum hærens in ipso, & stertat in pectore, ari magni radicis cochulam maiorem, & oleum ac acetum mixta dato, & acetum aqua dilutum insuper bibat. Aliud forte.

Florem aris magnitudine fabæ, & nitrum assatum dupla portione, & hyssopi quantum tribus digitis comprehendi potest, melli misceto, & aquam ac
oleum

oleum modicum adstillato, & tepesfacta in conchula maiore infundito, ut ne suffocetur. Hoc etiam in peripneumonia facere oportet, si non purgetur. Si uero neque stertat, neque uelut oportet spuatur, capparidis fructus quantum tribus digitis comprehendere potest, & piper, & nitrum modicum, & mel, & acetum, & aquam misceto, atque hæc tepida sorbenda præbeto. Altera die eadem in aceto, melle, & aqua feruesfacta sorbeat. Hoc etiam stertentibus dato, & his qui purgari non possunt. At si fortius facere uoles, hyssopi & sinapis, et nasturtij cōcham maiorem, melle & aqua terito, & feruesfacta ac excolata, tepida sorbenda dato. Atque hoc modo hi morbi curati sanantur, si non quid sputi in pulmone relictum fiat, à quo arida tussis sequitur, & febris ac horror emergunt, & erecta ceruice spiratio tenet, & frequentem & acruatam respirationem æger habet, et uox paulo grauior sit, & color cum calore faciem occupat. Progressu uero temporis, morbus magis manifestus redditur. Hunc si intra decem dies susceperis, ubi uictu & balneo calido calefeceris, medicamentum quod pus ducat in pulmonem infundito, alijsque pus ducentibus utitor, atque sic uelut suppurato uictus rationem præscribas. Caput quoque resiccato, ut ne quid influat. Si uero ex eo quod in pulmonem infusum est, pus non educatur, rumpitur hoc ipsum ex pulmone in thoracem, & post ruptionem sanus esse uidetur, quoniam ex angustia ad amplam capacitatem pus peruenit, & spiritus quem respirando attrahimus in pulmone locum ac sedem habet. Verum progrediēte tempore pectus pure impletur, & tussis, & febres, & alij dolores omnes magis ipsum premunt, & morbus inflare incipit. Hunc post eruptionem per quindecim dies sinere oportet, quo pus rursus maturescat. Nam ex eo quod pus ad ampliorem locum deuenit, per frigeratum est, & id quod in thorace humidi erat ad seipsum attraxit, ita ut ipsum sit semiputrefactum. Si quidem igitur sua sponte expui incipiat in hoc tempore, bene est. Sin minus, medicamentis aut potionibus opem ferre oportet, in ultimis ex quindecim illis diebus, festinando ad corporis excitationem antea quam magis affligatur, ita ut caput purum custodias, influxionum gratia. Si uero non spuatur, sed sui significationem ad latera præbeat, secato aut urito. At si neque spuatur, neque ad latera de se significationem præbeat, ubi multa calida ieiunum lauasti, & neque potui usum in firma sella locasti, alter ex humeris ipsum apprehēdat, tu uero concute ipsum, aure ad latera admota, quo percipias ex utraque significationem sui præbeat. Optandum autem esset ex sinistra. Nam dextras urere aut secare lethalius est. Quanto enim robustiores sunt dextræ partes, tanto etiam fortiores morbi in ipsis fiunt. Quod si præ crassitudine, humor non fluctuet, neque strepitus sit in pectore, uerum spiritum frequentem trahat, & pedes intumescant, & tussicula aliqua adsit, ne te decipiant hæc, sed thoracem pure plenum esse probe noris. Proinde in terra eretriade liquida, & ualde trita ac tepida, linteam tenue tingito, eoque thoracem circumcirca integito, & qua parte primum resiccatum fuerit, ea secato aut urito, quam proximè ad septum transversum, cauendo tamē ne hoc ipsum lædas. Si uero uoles, ipsam terram eretriadem illinito, & similiter uelut in linteis considerato. Multi simul illinunt, ne quæ primū illinuntur resiccetur. Post sectionem aut uersionem, linamēto ex lino crudo utere, & paulatim pus emitte. Ceterum ubi secare uel urere uoles, corpori in eadem figura, in qua inter secandum aut urendum futurum est, notā imprimito, ut ne cutis te decipiat.

si in

si in figurâ transmutatione sursum aut deorsum magis cedat. Sed & tusses uitare oportet ex uictu, ut ne rursus pus reuellant ad pulmonē. Malum enim hoc est: quare permittendum est ut ad sectionē q̄ citissime rescicetur. Postquā uero duodecima affuerit dies, reliquū pus totū emittito, & ex linteo linamentū indiato, & bis in die pus emittito, & uentrē supernum ex uictu q̄ maxime rescicato. Atq; hoc modo oportet etiā suppurationes ex uulneribus, & ex peripneumonia: & ex magnis destillationibus, & pulmone ad lateres prolapsō, considerare ac curare.

Frigefactoriæ potiones in febre ardenti.

Frigefactorias potiones in febribus ardentibus quādo uoles bibendas dato. Sunt autē multarum operationum. aliæ enim mictionem inducunt, aliæ alui egestionem, aliæ utrūq; præstant, aliæ neutrum, aliæ solum frigefaciunt, uelut si quis in uas aquæ feruentis frigidā aquam infundat, aut ipsum uas ad frigidum uentū exponat. Dabit itaq; alias alijs. Neq; enim dulces omnibus conducunt, neq; acerbæ, neq; eadē omnes bibere possunt.

I. Fauorum siccorū heminarum duarum mensuram aqua macerato, & conterens gustato donec subdulcis aqua fiat, deinde excolato; & iniectis apijs bibendam dato. **II.** Seminis lini acetabulū, aquæ heminis decem affusis, in noua olla prunis imposita coquito ac feruere finito ut transpirent, donec succus ad tactum pinguis fiat.

III. Aquam mulsam aquosam ad dimidias coquito, deinde apio iniecto frigidam paulatim exhibeto.

IIII. Ordeum Achilleum magnū ac plenū heminae mensura siccato, & acutis spicis ablatis, ubi probe laueris, aquæ congio affuso coquito ad dimidias, frigefacito ac bibendum dato.

V. Cumini Aethiopici heminae decimæ parti, tres aquæ semicōgios affunde, & olla luto piloso oblita, donec tertia pars restet feruere sine, & frigidā hanc ad omnem ardentē aliamq; febrem exhibe.

VI. Aquam coelestem ipsam per seipsam præbe.

VII. Ptisanæ heminae congio aquæ affuso, ad dimidias coquito, deinde excolato, & apijs iniectis frigidam dato.

VIII. Profunt & uina alba aquosa ex uuis pãsis.

IX. Profunt & uuarū passarum expressarum retrimēta aquosa.

X. Vuarum passarum albarum exemptis uinaceis heminam, radicū quinquefolij mānipulum, tundito, & affusis aquæ heminis uiginti, ad dimidias coquito, & frigidam hanc paulatim bibendam dato.

XI. Ad farinæ ordeï pleni crassæ chœnicem dimidiā, aquæ congiū affundas, & quum iam intumescunt crassæ farinæ partes, manibus teras, donec aqua alba fiat, et adiāti pugillo iniecto, sub dio per noctem exponito, ac exhibeto.

XII. Ouorum trium aut quatuor candidum, in aquæ congio concussum bibat. Hoc ualde frigefacit, & ægrum ad aluū exonerandam conturbat.

XIII. Ordeï torrefacti probe loti chœnicem dimidiā, in aquæ congio bis aut ter feruere finito, & frigidam hanc exhibeto.

XIIII. Ptisanæ succum coctum tenuem, & uinum dulce dato. Hoc urinam ducit.

XV. Cucumeris peponis corio nudati pollinē ex aqua præbeto. Hæc potio urinam ciet, frigefacit, & sitim sedat.

XVI. Eruum in aqua præcoquito, deinde ollam nouā, in maiore ollam aqua plenam ponito, & alia aqua eruo affusa, ad modicū tempus coquito, postea ubi coctū fuerit eruum, tertiā aquæ partem reliquā excolatam bibendam dato, ita ut ad singulos cyathos, & cucumeris, & erui pollinem inspergas. Hoc cōstanter sitim sedat.

XVII. Vinum Thasiū uetus partē una, cū uiginti quinq; aquæ partib; dato.

XVIII. Trifoliū, cucu

cūcumeris pollinem, & crassam ordeī farinam in aqua macerato, & hanc bibendam dato. xix. Apīj manipulos tres, pulegij pugillos duos, in aceti heminis decem ad tertias coquito. Hoc melle & aqua dilutū, aquosum bibat, adianti pugillo iniecto. Hoc urīnam ducit, & aluum soluit. xx. Mala odorata dulcia contundito, & aqua macerato, & aquam bibendam dato. xxi. Mala cydonea eodē modo, si aluus soluta fuerit in febre ardente. xxii. Quod si morbus regius insuper corripiat, uuæ passæ albæ exemptis uinaceis, & cicerum alborum, utrorumq; dimidiā heminā, & ordeī Achillei magni ac plenī tantundem, & cnicī tantundem, aquæ heminas decem, & apium, & mētam, & coriandrum, de singulis parum, terito donec placide aqua dulcescat, & adiātī pugillo postea iniecto, ubi sub dio per noctem exposuisti exhibeto. Potes etiā alia his similia imitari. Omnia uero per noctē sub dio exposita dabis febriētī, exceptis his quibus alui plus q̄ cōuenit fluunt. xxiii. Pulegij pugillos tres, apīj duplū, in uinō diluto coquito ac exhibeto: hoc urīnā ciet, & bilem per aluū trahit.

HIPPOCRATIS COI DE MOR

BIS, LIBER IIII. IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.



De hominis generationē de omnibus & uiri & mulieris partibus semen progressum, & in uterum muliebrē illapsum condensatur, temporeq; ueniente natura hominis formam referens ex ipso producitur. Habet autem & mulier, & uir, quatuor species humoris in corpore, à quibus morbi fiunt, qui non à uiolentia aliqua fiunt. Sunt autem species hæ, Pituīta, Sanguis, Bilis, & Hydrops siue aqua: & de his nō minīma, neq; debilissīma, in semen procedit portio. Et quia animal secundum parentes nascitur, tot humorum species, & sanorum & morbosorū in seipso habet. Ostendam autem quæ in unaquaq; harum specierū & plura & pauciora in corpore fiunt, & à quo ægrotant. Et q̄ morbi in imparibus diebus iudicantur. Et quæ sint morborum principia. Et qualia singula ex ipsis in corpore efficiant, ut morbum inducāt, & à quo rigor febrilis fiat, & cur post ipsum febris irruīt. Primum autē demonstrare uolo, quomodo bilis, & sanguis, & hydrops, & pituīta, copiosiora & pauciora fiant à cibis & potibus, hōc modo. Vētriculus dum plenus est, omnium horum corpori fons est. Verū ubi uacuuus est, corpore fruitur colliquefcente. Sunt autē & aliī fontes quatuor, à quibus unusquisq; horum humorum in corpus procedit, postquā sanē ipsi à uentriculo acceperunt: & hi quoq; fontes ubi euacuantur, de corpore fruuntur. Sed & ipsum corpus attrahit, ubi uentriculus in seipso quid habuerit. Et sanē sanguini fons est cor, pituitæ caput, Aquæ splen, Bili locus folliculi in hepate. hi sunt quatuor humoribus hi fontes, uentriculo excepto. Ex his autē maxime caui sunt, Caput & Splen, Nam in hoc ipso maxima amplitudo est. Verū de hoc paulo postea clarius dicam. Quin & hæc sic se habent. In omnibus cibis ac potibus et biliosi quidē, & aquosi, & sanguinei, & pituitosi: in alio plus, in alio minus. Quapropter & quæ eduntur ac bibuntur, alia alijs præstant ad sanitatē. Atq; hæc mihi de hoc dicta

dicta sunt. Postquam uero comedit aut bibit homo, corpus in seipsum humorem relatum ex uentriculo, & fontes trahunt per uenas de uentriculo, similis humor similem, & corpori distribuunt. Quemadmodum etiam in plantis similis humor similem trahit de terra. Habet enim eodem modo terra omnigenas in se ipsa ac innumeras facultates. Quaecunque enim in ipsa nascuntur, his omnibus exhibet humorem similem unicuique, qualem & hoc ipsum quod nascitur sibi similem, iuxta cognationem habet. & trahit unumquodque de terra alimentum, quale etiam ipsum existit. Nam & rosa de terra trahit talem humorem, qualis ipsa in potentia est: & allium de terra humorem eiusmodi trahit, quale ipsum in potentia est. Et alia omnia terrae nascentia, ex terra trahunt, singula iuxta seipsa. Si enim haec res non ita se haberet, non nascerentur plantae similes seminibus. Cui porro plantae in terra cognatus humor multo uberior est quam conuenit, ea planta aegrotat. Cui uero paucior quam opportunum est, ea resiccatur. At si ab initio non in sit terrae humor, quem planta iuxta cognationem trahat, ne germinare quidem poterit. Intelligentiam autem huius rei, quod si non habeat planta humorem secundum naturam, ne ab initio quidem germinet, inde nobis suppeditatur. Ionia enim regio & Peloponnesus pro temporibus anni a sole non minime calet ac illustratur, ut sol nascentibus ex terra sufficere possit, attamen fieri non potest, multis frustra iam id tentantibus, ut in Ionia aut Peloponneso Silphium nascatur. At in Libya sua sponte nascitur. Non enim est neque in Ionia, neque in Peloponneso, eiusmodi humor qui ipsum alere possit. Quum autem sint & aliae multae medicinae, quas sole sufficiente, regiones alere non possunt, aliae uero sua sponte producant, hoc ipsum eius quod nunc dicturus sum considerandi occasionem exhibet, quantum uidelicet locus alteri loco etiam ualde uicinus praestet ad iucundi uini productionem, sole aequaliter sufficiens. Hic etenim in terra humor est, qui uinum suaue exhibere potest, illic non est. Sunt etiam syluestria non pauca in loco nascentia, quae ad orgyae seu cubitorum quatuor spatium translata: nasci minime comperias. Non enim habet terra talem humorem translato, qualem illa syluestribus plantis exhibebat. Sunt enim ex ipsis quaedam uenenosiores, aliae humidiores, aliae dulciores, aliae sicciores, aliae asperiores, & innumerae aliae aliter se habent. Innumerae enim sunt in ipsa terra facultates. Et propter haec genera primum nihil alteri simile ex terra productum est, quod non esset cognatum. Et mihi sane uidetur haec omnes plantae syluestres fuisse. Verum homines ipsas mansuefecerunt, fructum ferre efficientes unamquamque iuxta suum semen. Trahit enim similis humor simile ex terra, & ex hoc augetur ac nutritur. & nullum ex terrae nascentibus alteri simile est, quod non aequalem, neque similem humorem ex terra trahat. Et omnia quae nascuntur in cibi ac potus usum uenientia, multas facultates de terra ad se trahunt, & in omnibus est aliquid pituitosi ac sanguinei. Et ex hoc adeo ad hanc demonstrationis necessitatem deueni, quod a cibis ac potibus in uentriculum procedentibus trahitur corpus, secundum fontes quos nominaui, similis humor similem per uenas. Referam quoque aliud argumentum, quod singula prout relatum est trahant, & simul dicam, unde pituita in corpore gignatur. Vbi quis caseum comedit, aut aliquid acre, aut aliud quid edit aut bibit, quod pituitosum est, statim ipsi ad os ac nares accurrit, atque hoc ita fieri partim omnes uidemus, partim ita esse credere oportet, ex his quae

ego referam. Altero itaq; quod quantū in cibo aut potu pituita inest, illud ubi ad uentriculū peruenit, partim corpus ad seipsum trahit, partim caput, ut quod cauum sit, & uelut cucurbita corpori incumbat, ad se trahit, utpote uiscosa existente pituita, ita ut hanc alia per aliam sequatur ad caput: & quæ quidem recēs ex cibo generatur pituita, in capite manet. Vetus autem, prout copiosior est recens, ab ipsa uiolente extruditur. Quapropter ubi quis edit aut bibit aliquid pituitosi, excreat pituitam. Habet autē et hæc res se hoc modo. Si ubi edit aut bibit quid pituitosi homo, non rursus exeat quod redundat, neq; per os, neq; per nares, necesse est ipsum manere in capite, aut ad corpus descendere de capite, & ad uentriculum peruenire. Ac optimum quidem fuerit, si ad uētriculum perueniat. Exire enim poterit unā cum stercore, et si quidem multū fuerit ac humidū, sterqus humectare poterit. Si uero modicū, non hoc effecerit. At si in capite maneat, multum dolorem capiti exhibuerit, quū in uenis est. Si uero modicū, nō hoc fecerit. Significationem autem de se præbet copiosum ne sit an modicum. Quod si ad corpus deueniat, atq; illic alio humori ammixtū fuerit, si quidē multa fuerit pituita, statim corpus læserit: si uero pauca, nō adeo lædere poterit, quū magnū sit corpus, si non & aliud quoddam principium ipsi reliquū sit. Verum temporis progressu, si alia pituita superaccedat, lædi utiq; possit. At si corpus uesicæ ac uētriculo deleget, atq; hæc foras perferat, nihil mali ex ipsa habuerit. In hoc igitur sermone demonstratum est, quomodo caput pituitā ex uentriculo trahat, & simile ad simile perueniat, & simul à me dictum est, quomodo & quare copiosior pituita hominē à cibis ac potibus fiat. Nunc uero dicam de bile, quomodo & cur copiosior in corpore fiat, & quomodo locus folliculi in hepate ipsam trahat. Habet se res hoc modo. Postquam comedit & bibit homo aliquid amari, quodq; aliās biliosum ac leue est, copiosior etiam bilis fit in hepate, & statim dolet hepar, quod pueri cor uocant, atq; hoc ita fieri uidemus, et clarū nobis est qd à cibo aut potu factū est. Trahit etenim corpus in seipsum de cibis omnem prædictum humorē. Trahit etiam folliculus in hepate, quicquid isthic biliosi inest. Et si derepēte multa bilis fiat, homo hepar dolet, et de uentre copiosior fit. Hoc enim cōtingente, procedit de ueteri bile propter multitudinem ad uentriculum, & ex hoc tormen uentriculo oboritur, et pars ipsius per uesicam, pars per aluū egreditur, atq; sic minima pars in homine manet, & dolores cessant. Si uero neutrum horum cōtingat, procedit primum de ueteri bile ad corpus, distribuitur enim ad ipsum: & si multa fuerit, statim significationē sui præbet aliq. humori ammixta. Si uero modica, non adeo læserit, quum magnum sit corpus, si nō & aliud quoddam principiu suboriat, Verū temporis progressu, si alia bilis superaccedat copiosior, hominem utiq; læserit. Si uero non superaccedat, excolare illam poterit corpus, ut & bilis, & quæcūq; biliosa sunt prodeant. Nam quæ in cibo ac potu sumuntur, alia aliorum medicamenta sunt. Sic sanē etiam alia quæcūq; lædentia sunt medicamenta, ubi aliud ab alio in uentriculum incidit, sua ipsius potestate causam habens, id quod superatū est expellit, ac ipsum lædit. At si superaccedat alia bilis in corpore, ab his quæ in uentriculum incidunt, morbus huic oboritur. Atq; in hoc sermone iam ego declarauī, quomodo bilis, & cur copiosior fiat in corpore, à cibis & potibus: & qd trahit in seipsum folliculus in hepar, iuxta similitudinem id quod biliosum est

à cibis

à cibis ac potibus. Nunc uero dicam de aqua, quomodo, & cur copiosior fiat in corpore, & quomodo splen trahat in seipsum. Assero autem ubi homo bibit amplius, & corpus, & splenem, aquam in seipsa trahere ex uentriculo. Et si plus traxerint quàm oportet, statim hominem affligi. atq; hoc ita fieri intelligunt quicunq; homines splenici existunt. Postquam autem traxit splen, optimum est, si uetus aqua quæ in splene inerat, ad uesicam aut uentriculum excoletur, & per hæc expellatur. Nam per supernas regiones non purgatur aqua de splene, nisi quantum eius in uasis inest, quæ de liene procedunt; uerum ad uentriculum & uesicam depurgatio fieri potest. Si uero hæc ad fluxionem apta non fuerint, neq; aqua per ea foras excoletur, de splene ad infernas partes aqua procedit, atq; isthicalij humori miscetur. Et si quidem pauca fuerit, non sanè læserit. sed de corpore ad uesicam, & ad uentriculum, per uenas exolari poterit. Sunt enim multæ ex hoc tendentes deorsum, quæ ex infernis partibus ad seipsas trahunt, ubi sicciore fuerint q̃ prius erant. At si alia aqua generetur, & uentriculus ac uesica foras non expellant, splen eleuatur, & infernæ corporis partes dolore afficiuntur. Atq; hæc à me dicta sunt, quomodo & cur aqua copiosior generetur in corpore à potu: & quomodo splen trahit. Nunc autem de sanguine dicam, quomodo & cur amplior in corpore generetur. Postquā bibit aut comedit homo aliquid quod sanguineū est, trahit quidem et totum corpus in seipsum, trahit autē & cor sanguineum ad seipsum. Et ubi plus attraxit, non oboritur cordi dolor. Est enim cor res solida ac densa, & propterea dolore non affigitur. Et ex ipso procedunt uenæ crassæ iugulares appellatæ, ad quas statim si copiosius accedat, sanguineū illud distribuitur, & illæ impletæ breui ad caput & corpus delegant. Et quum ederet aut biberit homo quid sanguinei, statim uenæ iugulares attolluntur, & facies rubet. Accedente uero ad cor & corpus sanguine quàm satis est uberiore, à cibis ac potibus, & ad alium humorem ammixto, si non ab ipso egressus fuerit, per aluum aut uesicam, reliquo humori ammixtus, dolorem corpori inducit. Si uero modicus accedat, non sanè læserit corpus. Verum temporis progressu distribuitur ab ipso ad uentriculū, aut ad nares, quæ ipsum foras excolant, & nulla læsio contingit. Si uero paulatim copiosior fiat, morbosus efficitur. Atq; ita quomodo copiosior sanguis generetur, à me declaratum est. Quum autem sint quatuor, Sanguis, Bilis, Pituita, & Aqua, omnia hæc à me demonstrata sunt, & quomodo, & cur copiosiora fiant, à cibis ac potibus. Quod autem ex his fiant ac generentur, hoc argumento constat. Si homo parum edit, & parum bibit, nullum morbum hoc ipsi inducit. Et hæc quidem de hoc mihi dicta sunt. Attigi etiam obiter ostendere intelligenti, quomodo hæc pauciora fiant. Verū de hoc paulo post melius tractabo. Cæterum fontes hi quatuor quos nominaui, quū pleni fuerint, semper corpori distribuunt; quum uero uacui, uice uersa trahunt ab ipso. Sic etiam uentriculus facit. Et habet res hoc modo, ueluti si quis tria aut plura ænea uasa in planissimo loco componat, & coaptata quàm optime disponat, fistulis ad foramina insertis, atque ita placide in unum uas aquam infundat, donec omnia ab aqua fuerint expleta. Ab uno enim diffluet in reliqua uasa, donec etiam alia fuerint expleta. Postquam autem plena facta fuerint uasa, si quis de uno aquam effundat, retribuet se retro fluens aqua ad unum uas, & uacua fient reliqua uasa

rursus, quemadmodum etiam susceperunt. Sic sanè & in corpore res se habet. Postquam enim cibi ac potus in uentriculum inciderint, fruitur corpus de uentre, & unà cum fontibus impletur. Vbi uero aluus uacuatur, rursus retro humor ab ipse redditur, quemadmodum susceperat, ueluti ex alijs ad unum uasculum. Venæ enim sunt per totum corpus tendentes, aliæ tenuiores, aliæ crassiores, multæ ac frequentes. Hæ autem donec uiuit homo apertæ sunt, & suscipiunt & dimittunt nouum humorē. Vbi uero mortuus fuerit, clauduntur & extenuantur. Quandiu igitur uiuit homo, fruitur corpus de uentriculo, ubi quid in seipso habuerit: fruuntur etiam fontes, & impleti corpori distribuunt. Si enim corpus non traheret de uentriculi humore, sed soli fontes, & hi ad corpus distribuerent, non sanè haberet corpus sufficiens alimētum, sed paucius. Non enim amplius haberent alimentum fontes, quod corpori subministrarent. At uero si fontes isti nō essent, dum edimus ac bibimus, uere nō cognosceremus, neq; quid iucundum, neq; quid iniucūdum esset, propter hanc quam referam necessitatem. Hi loci quum minores sint, & intra reliquum corpus, semper etiam antea quàm attrahat unusquisq; iuxta suam facultatē, reliquo corpori denūciat de cibis ac potibus, qui biliosus sit, & qui pituitosus, & qui sanguineus, & qui aquosus. Quicquid enim horum humorum plus q̄ opportunum est, in cibis ac potibus nobis obuenerit, neq; cibos illos iucūdos facit. Quæ uero maxime appetimus, pro eorum ratione etiam illi iucundi sunt. Si uero cibis ac potibus opus habuerit fons quidam, pro hac ratione etiam corpus trahet ab ipsis fontibus, donec humor paucior q̄ oportet fiat, & tunc sanè appetit homo aut edere, aut bibere tale quid, quod portionem illam expleat, ac reliquis adæquet. Et propterea ubi multum cibi sumpsimus aut bibimus, quādoq; adhuc cibum aut potum appetimus, & nihil aliud libenter edimus, quàm quod appetimus; Postquam autem comedimus, & adæquatus fuerit humor, his perfectis & in fontibus, & in corpore, tunc cessat appetētia. Atq; hæc de hoc à me dicta sunt. Quin & hoc se ita habet, quòd ad folliculum in hepate, sola bilis à cibis ac potibus secernitur. Venulæ enim quū debiles & tenues sunt, alium humorem trahere non possunt, qui grauior & crassior existit: & simul non est ea loci capacitas, ut alius humor in hoc folliculo consistat: & est hic locus maxime familiaris bili secundum naturam, & ob id in ipso nullus alius fit morbus, quàm is quem homines Cardiognum, hoc est cordis morsum uocant. At Caput, & Cor, & Splen, de omnibus humoribus participant. Vnumquodq; tamen si non ægrotet, plurimum de relatis participat, iuxta suam ipsius naturam, caput pituita, cor sanguine, splen aqua. Trahunt autem & de alio humore uenæ in seipfas, amplæ & crassæ, & instar pampini retortæ existentes, ita ut ubi trahant, alius humor alium sequatur. Et cordi quidem propinquant uenæ iugulares crassæ, ad quas cito distribuitur, ubi illi amplior quàm commodus est humor accedat. Hæ uero ad reliquum corpus delegant: & simul ipsum cor solidum est ac densum, ut ab humore nō ægrotet, & propterea nullus morbus in corde oboritur. Caput autem & splen maxime sunt morbis obnoxia. Aegrotāt enim & ab his quæ à natura insunt, quum plura quàm opportunum est acceperint. Aegrotāt item ab alijs humorib. Venæ enim in ipsis crassæ ac multæ sunt, & ipsa quoq; uenosa sunt ac caua, ut & alijs humoribus recipiendis capacitas in ipsis sit, paulatim

latim nimirum accedētibz, & ad eum humorē qui à natura inest, se ammisceribz. Quemadmodū in uase magno amplior capacitas est quā in paruo. Sic sanē et in capite, aut in splene, res se habet. Magna enim capacitas maxime in ipsis est. Si uero repletæ fuerint isthic humore uenæ, ab ipso sanē in illis morbus oboritur. Atq; hæc mihi de hoc nunc dicta sunt. Volo autē melius declarare, quomodo unusquisq; horum humorū in corpore paucior fiat. Quatuor equidē humores esse demōstrauī hominem lædentes. Quatuor item ipsoꝝ fontes. Quatuor quoq; esse dico locos, per quos homo de singulis his expurgatur. Sunt autē hi, os, nares, podex, urinæ meatus. Et ubi humor aliquis affligens corpior factus fuerit, si his locis homo depurgetur, nullus ipsum morbus ab illo premit. Et si uentriculus plenus fuerit, liqueſcēte corpore ab humore, defluit ad ipsum, & extra prodit per aliquem horum locorū, & propterea humor paucior fit in corpore. Corpus enim uelut & antea dixi, uentriculo retribuit, ubi uacuu fuerit: & fruitur de ipso, ubi plenus existit. Atq; hæc à me dicta sunt, quomodo & cur pauciores fiant humores hominem affligētes. Quomodo uero & cur homo sanus degat, referam. Postquam comedit ac bibit, & humor ad corpus peruenit, eo quo dictum est modo, ammixtus alijs, tum ei qui in corpore, tum ei qui in fonte est, ea quidem die qua accesserit, in corpore manet. post tridie uero alius humor ad ipsum accedit. Atque hi quidem duo sunt dies, duo uero in corpore humores. Et alteri quidem humori duo dies sunt, alteri unus. Et qui quidem post tridie accessit, manet in corpore, ut qui sit crassus. Alter autem coctus à caliditate diffunditur, & tenuis fiens, postera die ad uentriculum accedit, & per omne tempus à recenti expellitur. Vbi uero ad uentriculū peruenit, cibos in hoc loco coquit, & de se sanguinē in corpore facit. Si uero permanſerit, tempore graueolens fit. Tertia uero die unā cum stercore, & urina exit, copia ipse sibi ipsi æqualis, & consimilis, & æquilibris, etiam si suipsius pars quædam sit, quo humor maneat in corpore iuxta relata rationem. Influit autē & tertia die humor de corpore ad uētriculum amplior & graueolentior, qui uide licet reliquus fuit à secundo, & defert cibos cōcoctos, & quicquid est in corpore morbosum, & rursus simul exit. Indicium est autem urina quæ salſuginosa est, quod cibi deferunt de corpore etiam id quod morbosum est. Et cibi quidē semper post tridie per aluum secedunt, humor autē ad tertiam diem. Hoc modo sanitas cōtingere solet. Atq; hæc dicta sunt, quomodo, & cur homines sani degūt. At uero humor hic si particulatim foras prodiret post tridie, cibi nō similiter ex uentriculo graueolentes facti foras prodirent, sed ueluti cocti: & urina potui similis, & corpus semper euacuaretur, & per omne tempus homo, ubi uentrem exonerasset ac minxisset, opus haberet statim potu ac cibo, pro egestionis factæ copia, si modo ualidus esse deberet, quū humor sufficiens in corpore nō relinquatur, sed unā cum stercore foras prodeat post tridie, aut eadem die. Et si quidem comedisset, bene esset. Sin minus, & euacuatus debilis esset, neq; humor crassus fieri posset, ut post tridie foras prodiret. Non enim sufficiens in corpore relinquatur. Nunc uero aluum exonerantes probe ualemus, & si per biduum nihil cibi acceperimus, & uiuere, & facere quid possumus, & non penitus debilitamur ex euacuatione in hoc tempore. Humor enim in corpore manens, robur exhibet. Atq; hæc à me dicta sunt, quomodo & cur fieri non possit, ut

humor qui corpori accessit, foras egrediatur eadem die, immo neq; postridie. Id porro assero, si humor pluribus quàm tribus diebus in corpore permaneat, aut alius multus implens accedat, uenis calescentibus ac stantibus, maius malum, aut minus, homini significationem de se præbere: hyeme quidem minus, & posterius: æstate uero maius, ac prius. Atq; hæc à me dicta sunt, de eo quod fieri solet, si humor in corpore maneat. At uero si corpus cibos eadem die egeret, non sufficienter humore uti posset, sed essent homines tenues ac debiles. Nunc uero quum maneat cibi ac potus, quamdiu permanent, corpus fruitur sensim de uentriculo trahens, & impletur. Hæc dixi & quomodo, & cur cibi non possint eadem die exire. Si uero cibi maneant in uentriculo, ampliore tempore quàm opportunum est, & alij ad ipsos incidant, corpus utiq; repleatur: & dum premuntur à plenitudine uenæ, calor ac dolor corpori accesserint, æstate quidem citius, hyeme uero posterius. Aestate enim calidus est aer ambiens, & calidior corpus in seipsum trahit. Et si calido adhuc existente uentriculo, calidior quàm opportunus est spiritus homini accedat, nihil miri est hominem ex tali febrile, hyeme uero quum frigidum spiritum trahat in seipsum, multo magis poterit corpus repletionem ferre, homine modice uentrem exonerante. Et hæc à me dicta sunt de eo quod fieri solet, si cibi ampliore tempore in uentriculo maneant. Et attigi quoq; obiter ut declararim omnem humoris accibi, & longioris & breuioris temporis differetiam, cur homines ægrotent. Verum de hoc melius tractabo temporis progressu. Reuertor rursus retro de sanitate dicturus, quod sanè corpus hominis humore de cibis ac potibus fruitur, & prodeunt foras in sano, tum cibi, tum humor, iuxta relatum rationem. Et si quidē foras prodeat plus humoris, quàm de cibis ac potibus accessit, homo attenuatur. Prodit autem foris plus quàm accessit ob hanc causam. Si in quiete degat homo, & non laboret, mali aliquid ipsi in corpore inest. Verum præ alia sanitate quæ multa est, non lædit ualde. Malum uero illud huiusmodi est. Postquam aliquid ex his quatuor corpori accedentibus, aduenerit copiosius, non ita multo, corpus calescit sensim, ut non ualde lædatur: & liquescit in uentriculo, & cibum homini iniucundum facit. Si uero humor alius alio copiosior fuerit, febris ex hoc homini oboritur. Verum de hoc exactius paulo post tradam. Quandoq; etiam ubi cibus iucundus est, homo attenuatur. Causa uero eadem est. His autem fientibus, plus humoris extra prodit, quàm succenturiatur. Et propterea in quiete degenti contingit ut attenuetur. At uero laborantibus hominibus itidem corpus coalescit. Et hoc à labore calescente, tum humor in ipso diffunditur, tum attenuationis morbus oboritur. Quum autem inutilis fiat humor, & ad uentriculum, & ad uesciā defluit, hæc autem foras expellunt. Pars uero ipsius extra exhalat, per internam corporis raritatem. Pars autem quæ adhuc intus manet, sudor fit, & per corpus foras procedit. Eodem modo & exercitationes iuuenum idem efficiunt quod labor. Si uero etiam non paucior fuerit humor eo qui prius exiuit, accedatq; insuper alius à cibis ac potibus, attenuatur propterea homo. Paucior autem accedit, si non aliud quid edere poterit, & si neq; laboret pro prioris laboris aut exercitationis ratione, alij alijs pauciores fiunt. Cæterum bonus corporis habitus accedit ex esu, hæc de causa. Postquam resiccatus est tempore humor, & in priore labore prius egressus

egressus est alius alio copiosior, & unus alius alios ualde superauit, homo repletus fit. Et si quidem à multis ualde superetur, febris ex hoc modo oboritur. Si uero à paucis, parum superatur. Sed & corpus hoc modo sufferre ac reualefcere potest, humiditate enim uberiore in ipso existere, calorē exoluit. Calefcit enim corpus à febre, & si quidem modicū fuerit id quod affligit, tertia die eodem modo dimittit, per duas autem continue tenet: Si uero copiosius, quinta die per quatuor uero tenet pro ratione. Atque hoc modo morbi per dies iudicantur. At si dimiserit febris in imparib. diebus, et sanus homo fit, et moritur. Quae de causa, paulo post dicam. Nunc autem referam cur febris dimittat. Sic autem sentio. Quaecumq; febris de corpore hominem corripuerit, necesse est tertia die humorem affligentem exire de corpore, aut in alio quopiam impari die, iuxta rationem antea relatam. Non enim exit prius q̃ alius bonus de uentriculo ipsi accedat. Nam intermedia & postera die corpus trahit de uentriculo, quicquid ipsi in seipso dimiserit priore die, nisi uentriculus id expulerit, & alium humorem habuerit, quod sanè malum homini esset. Si uero dimiserit febris tertia die, eodem modo dimittit quo etiam eadem die, uelut dictum est. Atq; ita quidem contingit, ut febris de corpore fiens, tertia die remittat. Dico autem, etiam si quinta die, aut septima, aut nona dimittat, eodem modo dimittere, quemadmodum & tertia exiuit. Etenim alimētum febre contingit, secundū locos quos paulo antea dixi. Vbi enim humor copiosior praeualuerit, homo liberatur à febre. Dimittit autem febris in diebus imparibus ea de causa. Quod uidelicet in paribus diebus trahit corpus de uentriculo: in imparibus uero dimittit. Venter autem extra propellit in homine sano, iuxta huiusmodi necessitatem morbi in imparibus diebus iudicatur. Atq; hac quidē ratione homo febricitans sanus euadit. Assero autem & quod doleant maxime homines aegroti in imparibus diebus, propter hoc & secundū rationem fieri. Conturbatur equidem homo quum febricitat. Cuius rei signum est, quod horror aliās atq; aliās per corpus transcurrit. Hoc uero nō sanè ita contingeret, si non cōturbaretur humor, & de ipso aut plus, aut minus secerneretur, & alius aliū superaret. Cōturbatur autem maxime in imparibus diebus quū aegrotat. Sed & horror maximè tunc fit. Habet enim se res hoc modo. De humore affligēte expellitur aliquid ex corpore, à recentissimo humore superatum, & procedit ad aluum infernā, & alius ipsa unā cum affligente calefcit, suscipiens in seipsam magis quam priore tempore. Hoc autem maxime fit in morbi iudicatione. Et si paulatim corpus ad aluum dimiserit, & nō multum fuerit id quod hominem affligit, & alius, & corpus, calorē sufferre in iudicatione potest, & homo sanus euadit, ubi humor affligens egressus fuerit, & is qui febre alimentū praebebat consumptus, & sanus praeualuerit. Atq; hac ratione propter relatas à me causas, homo aegrotus sanus euasit. Nunc uero referam cur moriantur homines in imparibus diebus. Sic autem sentio. Si multum fuerit id quod affligit in corpore, magis q̃ opportunum est, & acruatim robustū, turbatur ad uentriculum, & quum nō possit calorem sufferre corpus, eo fruatur, et graueolentiā circa spiritum fieri necesse est, et quū nequeat corpus prae debilitate, nimirum omni humore morbofo existente, spiritum trahere, quo ea quae in uentriculo sunt refrigerentur, quicquid est humoris uitalis id foras exhalat, atq; ita homo moritur. Non enim superat alius humor,

sed totus à morboſo qui multus eſt eleuatus, ac cōſumptus à febrī exhalauit ac perſpirauit. Atq; hoc modo in imparibus diebus maxime dolor affligit. Neq; eſt quiſquā cui hoc nō ſit notum. At uero q̄ humor turbetur in iſdem diebus, hoc ſignū eſt. Qui cūq; iam à febre continua correpti, pharmaco uſi ſunt in diebus paribus, hi nimium purgati nūquam ſunt. Qui uero in diebus imparibus medicamento forti uſi ſunt, nimium purgati ſunt. Multi uero etiā perierunt nimium purgati. Proinde priores Medici in hoc maxime peccarūt. Medicamēta enim exhibuerūt in diebus imparibus, & homines peremerunt, nō ſcientes q̄ hęc res ſe ita habet. Humor enim in corpore ægroti magis turbatur in imparibus diebus, nimirū corpore humorem ad uētriculū tranſmittēte. Et ſi quis iam turbatum, adhuc magis perturbet medicamento immiſſo, nihil miri eſt ex talibus hominē perire. Quin et ulcera ſi curentur, maxime in hiſ diebus inflammantur. Venit enim humor ad omnes uenas quū turbatur, eaſq; replet. Et ubi ad ulcuſ peruenit, ſi quidem non curetur, & puſ exitū habeat, expellitur ab humore qui in turbatione acceſſit, & ulcuſ foras expurgatur. Si uero curetur, puſ exitum non habens, & iſthic unā cum eo qui acceſſit permanēs, dolorem inducit, & carnem circa ulcuſ attollit: & ex illo ſi quidē in cruribus habuerit ulcuſ, attolluntur uenę quę in iuncturis crurum exiſtūt. Si uero in manibus, quę in manuum iuncturis ſunt. & ex hoc glandularum tumores ſunt. Quibuſcunq; uero hominibus febris incidit, ſi nihil aliud male habeat homo, à pinguiore q̄ oportet exiſtente humore incidit. & uenę impletę dolorem ac calorem ulceri inducunt. Hoc autem calefactū, etiā reliquū corpus calefacit. Atq; hoc modo caliditas ad ulcera peruenit. Caleſcit enim corpus, & ulcera, ab humoris cōmotione. Et labor talia efficit. Liberantur autem ulcera ab inflammatione quinta die, & iuxta horum dierum rationem, prout etiā ulcera fuerint magna, & tertia, & quinta, & ſeptima, & nona, & undecima. Deinde abſoluto primo circuitu, ruſus ſecundi principium tertia ſequens hinc eſt, quę à prima, decimaquarta eſt. Maxima uero ulcera decimaquarta die ab inflammatione liberantur. Atq; hęc ratio docet morboſos in imparibus diebus iudicari, & humorem in ſano homine tertia die exire, ſtercuſ autem ſecunda. Et hęc tertia die contingentiā mutuū inter ſe teſtimonium præbent, quod res ſe ita habeat. Atq; ita mihi hic ſermo uniuerſus ad ſummum perductuſ eſt. Nunc uero exactius reſerre uolo, cur homines ægrotent, ſimul que cum hoc ſermone dicam quę ſint principia morborum, & qualia unumquodq; ipſorum efficiat. Sicut autem aſſero. Si cibi plures quàm oportunū eſt, qui iam concocti ſunt, intuſ maneat, & homo non purgetur, & alij cibi ſuperingerantur, corpus ab humore priore ac recenti repletum caleſcit, & febris ex hoc homini oboritur. Verum febris hoc modo ſiens, non periculōſa, neq; fortis eſt, in qua humor equalis eſt, copia paululum uberiore noſ affligens. Si enim hoc ita ſe habuerit, & quiſ admodum ualiduſ ſit, & quę commoda ſunt adhibuerit, ſanuſ euadit. Vnuſ autem morbuſ ſoluſ eſt ex omni humore, & ſeptem ſigna habet. Nam & tuſſiſ ipſum habet, quę & debiliſ, & ſicca eſt: et uēter duruſ ſit, utpote & ſtercore intuſ contento: caput grauatur: & uomit: & febrit: & urina nō probe prodit. Hęc ſep̄ ſigna huiuſ morbi ſunt ex omni humore ſientis. Si uero alui egeſtione non prodeunte, unus ex alijs humorib; ſuperet, meliùſ deget homo. Et ſi quiſ febre ſiente

fiente ab omni humore, nō adhibeat idonea, inualeſcet morbus quantum ipſe humores ſuperauerit, hoc modo. Caleſcētē ſanguine exhalat maxime per hunc humor aquoſus, qui febrī eſt infeſtiſſimus. Relinquitur autem pinguis ac leuis, qui eſt bilioſus, & febrī maxime nutrimentum eſt. Exhalat autem hoc modo, Velut ſi quis aquā & oleum in uas æneum infundat, & ligna multa ſubiecta ad multum tempus exurat. Aqua enim multo paucior erit, ex uafe enim exhalabit: oleum autē paululum imminuetur. Nam aqua præ raritate ab igne attenuari poteſt, & leuis reddita exhalare. Oleum uero utpote quod eſt coniunctum ac denſum, attenuari non poteſt, neq; ſimiliter ut aqua exhalare. Sic fanē & in hominē ſeres habet. Aqua enim caleſcētē corpore foras exhalat, Bilioſus autem humor, ut qui coniunctus eſt ac denſus, non ſimiliter attenuatus exhalare poteſt. Verum attenuatus hic bilioſus humor, corpus magis calere facit. Copioſius enim & melius alimentum febrī bilis ſuppeditat, & prorūpens aut firmata in corpore, morbum ſupra priora corroborat. Atq; hæc quidē dicta ſunt de eo quod afficitur homo, ſi non purgetur & curetur. Si uero non ipſa copia præualuerit, ſiue ſemel multa ſiens, ſiue paulatim colligatur, reliquū corpus dū hoc fit, præ robore ſufferre poteſt, donec principiū aliquod ſuperaccedat. Atq; hoc fanē modo morbus fit, ſi homo à copioſiore fiente humore nō expurgetur.

Principia ex quibus fiunt morbi tria ſunt. Et unum quidem iam à me relatū eſt, qualia & quot efficiat in corpore. demōſtraui enim quomodo & cur ægrotet homo, ſi non purgetur. Alterum eſt, ſi contingat ut ea quæ ex cœlo obueniunt, inepta et præter uictus rationē ſint. Tertiū eſt, ſi uiolentū quid accidat, Violentum autē eſſe dico, & caſum, & uulnus, & plagam, & laborē, & ſi quid aliud eſt huiuſmodi. Horū uero principiorū maximū eſt Violentia, ſi magna fuerit: ſi uero parua, nō ita maximum. Secundum eſt, ſi nō purgetur homo. Tertium, ſi quæ ex cœlo obueniunt inepta fuerint ad ſanitatē. Proinde diligenter ab his ſe cuſtodire oportet. Singula uero talia in corpore faciunt, qualia ego dicturus ſum. Equidem ſi uulnus fiat, manifeſtum eſt quod caſu diſſecta eſt, & ulcus factum eſt. hoc autem morbum eſſe dico. Si uero contuſio fiat, hominē percuſſo, aut lapſo, aut aliud quid tale perpeſſo, & tumor oboritur, ſanguis ſtatim præ uiolentia calefactus, & uenis hiantibus illapſus, nō habens exitum præ copia, quod abire poſſit, conglobatur: & propterea tumor fit, & tamdiu adeſt, donec depurgatus fuerit, eo modo quo de locis depurgari dictum eſt, aut etiam per ipſum tumorem, et ſiue per chirurgiam, ſiue ſine ea, ſanguini tranſitus fiat, aut per tempus ſuppurato, aut non. Sed & labor tale quid efficit. Quum enim homines laborarint, quibus fanē maxime ſanguinis afflictio contigerit, illic firmatur ac caleſcit, & ex hoc dolor oboritur. Si uero hæc quidē ſuperarit homo, uerum multa copia labor accedat, & alius ac ueſica nō breuī copiam expulerint, febris fanē ex hoc irruerit. Et ſi quidem prior humor æqualis fuerit, nequaquam. Si uero in labore ipſorum plurimus in corpore permaneat, ſuperat ille. Atque hæc à me dicta ſunt de uiolentia, qualia in corpore efficit. Et hæc quidem duo ſunt principia, Violentia, & plenitudo, quæ ſi non purgentur homines, corpora calefaciunt.

At uero quod ex cœlo obuenit principium, ſi ineptum fiat in hominē, ſuperat aliquid humoris, & uelut ad morbum caſu facit, & frigefacit prius, ſi fieri contingat. Dicam autem prius de eo, quod calefa

calefacit. Sic igitur sentio. Si in eodem homine fuerit aliquid morboſi, quale in priori dixi, & ea quæ ex cœlo obueniunt incommoda fuerint, & caleſcat homo, turbatur humor omnis in corpore caleſcens. Hoc autem uiolentia facit. Et ſi quidem depurgetur homo, humore illo turbato, ſecernitur quantũ eius plus quàm commodum eſt redundarit. Et habet hæc res ſimilitudinem ad id quod Scythæ faciunt ex equino lacte. Lac enim in caua uafa lignea infuſum concutiunt. Illud autem dum turbatur, ſpumefcit ac ſecernitur, & pingue quidẽ, quod Butyrum uocant, quum leue ſit, in ſuperficie conſiſtit: graue uero & craſſum, deorſum ſidit, quod etiam ſecretum ſiccant. Vbi uero concretum ac ſiccatur fuerit, Hippacen ipſum uocant. At ſerum lactis medium locum tenet. Sic etiam in homine, dum turbatur humor, quicquid eius eſt in corpore, à principijs quæ dixi diſparatur. Et in ſuperficie quidem bilis conſiſtit. Leuiſſima enim exiſtit. Secundo loco ſanguis. Tertio pituita. Grauiſſimus autem horum humorũ eſt aqua. His uero ita ſe habentibus, quiſquis ex his in morbo plurimus fuerit, in principio fiente turbatione, deuenit ad locũ, ubi plurimus eſſe poſſit. Verum in turbatione, ſpacioſa capacitate fiente, ſecretus diſtrahitur, & calefacit corpus. Aut aliqua corporis parte firmatus, unà cum alio humore, cum quo eſt in alio loco, dolorem ac calorem exhibet. Qui uero calefactus eſt locus, inſuper etiam reliquum corpus cõcalefacit, & ex hoc febris oboritur. Et oboritur magis à bile, & pituita, & ſanguine, calidiſſimi enim hi humores exiſtũt. Et ſi quis horum in aliqua corporis parte firmatus fuerit, ut plurimũ morbus illinc nominatur, & cognomen habet. Cæterũ ab aqua non ualde fortis febris oboritur, neq; diuturna. Nam igni non bonum alimẽtum aqua præbet. Atq; hæc quidem de hoc dicta ſunt. At uero ante turbationem, non habet multus humor quo præcedat, ſed ſurſum ac deorſum uoluitur & diſtrahitur alijs humori permixtus. Omnia enim plena exiſtunt. In turbatione uero euacuantur. Verum aliud alio magis euacuatur. Et multus humor ſuum locum occupat, & alienus alijs nõ ammiſcetur, ſi firmatus fuerit priuſquam ille uiribus adæquetur. Poſteſt autem ipſi adæquari iſ qui ab ipſo poſtea ad morbum ſuperacceſſit, donec purgatus fuerit locus qualicunq; purgatione. Si uero multus fuerit affligens humor, fruſtur: & cõſumitur ad morbum etiam alius qui prius ſalubris erat. Et tali modo homo moritur. fruſtur autem, ſi morbus nõ amplius ſufficiens alimentum habuerit, & cõſumitur ab humore qui in loco dolente exiſtit. primum enim propinquũ aſſumit, deinde longius depaſcitur, donec conſumptũ fuerit, & nõ amplius ineſt in corpore alimentũ. Alimentũ autẽ eſt homini humor leuiſ. Quem admodũ igitur ut certũ eſt, putrefactio primũ paulatim ſit, ſi maxime caleſcat: Poſtea ubi iſthic alimentum putrefactioni non amplius ſufficit, depaſcitur de ſano, initio ſumpto à proximo, ad totum corpus, donec totum quicquid carnoſum eſt putrefecerit, poſtquam uero in totum depaſta eſt, alimẽtum putredini conſumitur: Sic ſanẽ etiam in morbo. Sumpto enim à loco illo initio, ubi iſthic alimentum ſufficiens non amplius ineſt, depaſcitur ulterius, à proximo initio facto. Poſtquam enim per totum graſſatus fuerit, alimentũ morbo cõſumitur, & alius ſalubris humor nõ ſuperat. Et ſi hoc fiat, homo moritur. Quin & in turbatione, ubi hic ſalubris humor ampliorem locum occuparit, & non firmatus fuerit, ſed uoluatur ac diſtrahatur, nõ amplius alijs miſcetur, ſed ad morbum cõſumitur.

consumitur, si non depurgetur. Deinde uenæ superimplentur. Valde autem impletæ, nihil ex seipsis remittunt, priusquã spaciõsa capacitas ipsis contingat. Quemadmodũ ubi quis uehementer percussus est, sanguis sub plagam subter currit, nimirum uenis à plaga euacuatis. Postquam autem carnes ueluti spõgia fuerint repletæ, non amplius remittunt, sed cõtinent in seipsis, donec in loco aliquid ab ipsis euacuatum fuerit. Quum enim collectus fuerit sanguis, præ copia uiam intercipit. Quemadmodum si quis uas oleariũ coriaceum angustis oris oleo impletum, in osculum uertat è directo, & si hoc fecerit oleũ ex ipso prodire non poterit: uiam enim ipsum oleum interceptit, utpote multum & acuatim incumbens. Si uero quis ipsum uas inclinẽt, libera erit uia osculi intercepta, qua effluet oleum ex ipso. Idem fecerit etiam aqua in mēsa. Ita sanè etiã ubi multus humor in corpore, præ turbatione locum occuparit, & uenas impleuerit, nõ amplius ab ipsis discedit, priusquã ubi locus uacuuus est, alimento à morbo consumpto. Atq; hæc à me dicta sunt de hoc, si in corpore quid fuerit unde morbi gignantur, redundantibus etiam alijs: & quomodo principia efficiãt colorem & turbationem humorũ deducẽtia ad morbum. Nunc uero dicam quæ efficiant ea quæ ex cœlo nobis obueniunt, si ad ea quæ in corpore generata sunt inepta fiant, & quum humorem in corpore superarint. Assero autẽ partem humoris in homine, ubi liquatus fuerit, conglobari ac spissari, donec morbum pepererit: partem uero dilatarĩ, ac secerni. Habet autem & hæc affectio similitudinem ad lac. Si quis enim succũ in lac immittat, frigiditas in ipso oborta, lac inspissat & conglobat. At circum inspissatum, serum est. Sic etiam in homine humor, frigiditate in morbo oborta, conglobatur & inspissatur. Circum ipsum uero aquosum humorẽ, adhuc etiam alius humor, quanto copiosior fuerit in alio corpore, ammixtus est. At si quidem ad aluũ deuenierit, stercus cõturbat, & tormen in aluo inducit, & foras pertrãsit, nullo magno damno illato. Si uero non ad aluũ deuenierit, firmabit se aliqua corporis parte, ubi ipsi plurima capacitas erit. Volutatur itaq; exquirens sibi ipsi loci capacitatem. Et quod quidem aquosus humoris de cõglobatione secretũ est, utpote frigidissimum ac grauissimũ in corpore existens, ad infernas partes descendit, & circum ossa ac neruos uolutatum, adhuc magis corpus ad inflammationẽ perducit, & clarum est quod circa neruos, & præsertim circa ossa, aquosus humor, qui humorẽ facit, existit. Circa osseas enim corporis partes, homo maxime riget, & capilli erecti stant, contorta cuticula, ac sicciore fiẽte quã priori tempore: Nimirum aquoso humore isthic deficiente, & circa ossa obuoluto. Atq; hinc sanè solus illẽ locus ubi primo tempore erat, humorem facere non potest, unde etiam rigor oboritur. At uero reliquus humor qui æqualissime crassus est, partim quidem in toto corpore est, partim uero quantum abundauerit, si quidem alius plena non fuerit, & quod affligit modicum sit: quandoq; ad aluum deuenit, & nulum magnum damnum inducit. & aliquando quidem febrem non inducit, alioquando uero debilem & innoxiam. & quod affligit unã cum stercore exit. Si uero alius plena multum quod affligit habeat, periculum est ex ipso morbum aliquem fieri, si alicubi se firmet id quod affligit, aut ad latus, aut ad uiscus, aut alicubi aliam partem concalefaciat, quo primum illum humorem simul surbet. Qui uero non ualde ex calore ab aquoso humore uicti sunt, utpote qui

circa

circa ossa, & prope medullam consistit: hos progressu tēporis magis lædet, pri-
 mum quidem in illum ipsum locum, deinde ipsi propinquū, & semper ulterius
 depascitur, & alius ipsum assumit, ut quæ calida sit, & postea tum alius, tū læ-
 dens humor, adhuc magis calefacit. At humor crassus calescens primū diffun-
 ditur, is qui propinquus affligenti existit, diffusus autē aquoso humori affligē-
 ti miscetur. deinde in concussione corporis inanior redditur. & tam diū rigor
 tenet, quādiu aquosus humor alij humori ammixtus est. Quin & febris hoc
 modo generata oboritur. Affligentia ad locum firmata, calescens corpus fe-
 brē in se suscipere cogūt: & ab affligente, & ab alio calefactum, reliquū aquo-
 sum humorē superat. Atq; sic febris fit post frigus, si qua corporis parte copio-
 sior humor formatus fuerit. Si uero uoluatur ac distrahatur, tali modo febris ob-
 oritur. Post frigus febris uoluitur, maxime affligēs circa aluum & supernam,
 & infernam. Isthic enim plurima loci capacitas existit. Dum autem uoluitur,
 primum propinqua calescunt, & uiscera, & quæ in aluo sunt. Postea etiā alius
 humor diffusus calore fruitur, & aquoso humori miscetur. Atq; febris post ri-
 gorem hic fit, ubi affligens uoluitur, imò etiam ubi firmatū fuerit reliqua cor-
 poris parte. Et hæc à me dicta sunt, quomodo, & quando, rigor morbosus fiat,
 & quomodo, & ex quali necessitate febris post ipsum irruit. Et quæ sint princi-
 pia morborum, & qualem unūquodq; ipsorum morbum in corpore inducat,
 & quomodo & cur in diebus imparibus morbi iudicantur. Et unde homines
 sani sint, & unde ægrotent. & quomodo bilis, & pituita, copiosior & paucior
 fiat. Itemq; alia multa quæ in ipsa natura humana sunt demonstraui, quæ sanè
 hic sermo exigebat. Atq; hæc ita relata finem habent. Nunc autē de lumbrici-
 cis latis dicam. Assero enim ipsos in puero dum adhuc in utero est nasci. Post-
 quam enim semel ex utero egressus est, non tanto tempore stercus in aluo man-
 net, ut ex eius diuturnitate ac putrefactione, tantæ magnitudinis animal gene-
 rari possit. Excernit enim semper hesternū stercus per omnes dies, si sanus ho-
 mo esse debet. Tale uero animal nasci non possit, etiam si multis diebus homo
 stercus non egereret. Multa enim nascuntur dum puer in utero est hoc modo,
 Vbi ex lacte & sanguine computrescente ac redūdante, utpote quod dulce est,
 pus factum fuerit feruidum, animal isthic generatur. Nascuntur autem & rotun-
 di lumbrici isthic eodem modo. Signū uero qd hæc res ita se habet, hoc est. Post-
 quam in lucē editi sunt pueri, mulieres ipsis in cibo offerūt medicamenta, quo
 stercus ex intestino exeat, & nō comburatur, & simul ut intestinum dilatetur.
 Vbi uero cibum obtulerunt, multi sanè pueri & rotundos & latos lumbricos
 unā cum primo stercore excernunt. Si uero non excreuerint, fiunt etiam insus-
 perq; nascuntur in uentribus. Et rotundi quidem pariunt, lati uero non ampli-
 us, etiam si quidam ipsos parere dicant. Nam homo qui latum lumbricum ha-
 bet, uelut cucumeris semen excernit aliàs atq; aliàs, unā cū stercore ipso, & sunt
 homines qui hoc lumbrici partus esse dicunt. Mihi uero nō recte dicere uiden-
 tūr qui talia dicunt. Neq; enim ab uno animali tot pulli generari possunt: neq;
 ea est loci in intestino capacitas, ut partus educare queant. Augescente autem
 puero, augescit etiam lumbricus in intestino, ab his quæ in uentriculū ingesta
 sunt, & æqualis fit intestino, quibusdam in pubertate, quibusdā posterius, qui-
 busdam paulo prius. Et postquam intestino adæquatus est, similiter augescit,

& quanto maior factus fuerit, una cum stercore excernitur de intestino recto, & excidit uelut cucumeris semē, sæpe uero etiam maior. Quibusdam uero iter facientibus, aut laborantibus, & uentriculo calefcēte, deorsum descendit, ipsiſq; prominet ex podice inflatus, hocq; facit, & de podice refecatur, aut retrocedit. Signa uero quod non pariat, sed ita habeat uelut ego dico, hæc sunt. Si quis cures hominem latum lumbricum habentem, & medicamentum dederit aut positionem, siquidem fuerit homo bene præparatus, totus rotundus factus ad pilæ figuram exit, & homo sanus euadit. Si uero ad medicinam hereat, recta pars delumbrico abrumpitur, lōgitudine duorum aut trium cubitorum, aut etiam longe amplior, & ubi abruptus fuerit per multum tempus signa cum stercore non prodeunt. Postea uero augescunt. Atq; hæc argumenta sunt, quod lumbricus latus non parit, sed abrumpitur. Est autem species ipsius, qualis alba intestini rasura. Signa habet hæc. Cacat aliàs atq; aliàs uelut cucumeris semē, & ubi ieiunus est homo, exilit ad hepar aliàs atq; aliàs, & dolorē inducit: & quandoq; sputa ori influunt ubi ad hepar afsilit, quandoq; non. Quibusdam etiam uocem intercipit, si fortiter ad hepar irruat, & ualde multa sputa ex ore fluunt, paulo autem post sedatur, & tormen multum in uentriculo aliàs atq; aliàs oboritur. Quandoq; etiam ad dorsum dolor incidit. Nam & hic aliquando firmatus innititur. Hæc lumbrici lati signa sunt. Contingit & hoc. Qui hoc animalculum habet, in toto quidem tempore ualde debilis fieri non poterit. Vbi uero debilis factus fuerit, uix reualeſcit. Latus enim lumbricus partis alicuius partis ceptus fit, ex his quæ in uentriculum ingesta sunt. Si quidem igitur curatus fuerit iusto modo, sanus fieri poterit. Si uero non curetur, sua sponte nō exit. Mortem tamen non inducit, sed consenescit. Atq; hæc a me dicta sunt de lumbrico lato, unde nascitur, & quæ morbi ipsius signa sunt. Cæterum calculi morbo principium oboritur à lacte, ubi puer lac impurum fugit. Lac autem in nutrice impurum fit, si pituitosis cibis ac potibus, & alimentis impuris nutrix utatur. Conferunt enim omnia in uentriculum illabentia in ipsa ad lac. Habet autem & hæc res se hoc modo. Si nutrix nō sana fuerit, sed biliosa, aut aquosa, aut sanguinea, aut pituitosa: Lac etiam malum puero generatur. Consentient enim corpus & uentriculus. Plurimum uero ipsi ad lac cedit, de eo quod ipsa plurimum in seipsa habuerit. Et puer si de nutrice lac non purum suxerit, sed biliosum uelut dixi, morbosus fit ac debilis: & in præsens maxime affligitur, quandiu lac prauum ac morbosum suxerit. At ubi suxerit lac non purum, sed terreum & pituitosum, & habuerit puer uenas de uentriculo ad uesicam tendentes amplas ac attrahentes: procedit autē & quod bibit nutrix, & lac in uentriculum pueri, tale quale trahit à uentriculo de lacte, in totū similiter prout uenæ ad uentriculum detrudere possunt: si quid sanè in lacte nō purum fuerit, id quo uesica fruitur lapis fit tali modo, uelut in aqua non pura, in calice aut uase æneo turbata, & rursus sedata, fex aceruata fit in medio. Sic sanè & in uesica de urina non pura existente. Et non per urinam efficitur, ut quæ in cauo fit loco, & maxime aceruata fiens, præ dolore per mictionē non pertransit, & à pituita cruda concreſcit. Glutinum enim fit pituita ad fecem ammixta. Et primum parua lanugo superstat, deinde quod accedit arenosum fit, glutino fiente pituita, quæ est in uesica de lacte, & augetur, et quicquid humoris in glutinatione accesserit,

emigitur. Rurſus autem ſex ſolida ſit, & lapidis ſpeciem accipit. Quemadmodum ferrum ex lapidibus ac terra dum comburuntur ſit. Et in prima quidem in ignem immiſſione, conglutinati ſunt lapides cum terra ad ferri recrementum. At ubi iterum atque iterum in ignem immiſſa fuerint, recrementum quidem foras decedit liqueſcens ex ferro, id quod ita fieri oculis uidemus. Ferrum autem in igne relinquitur, & recremento decedente ſubſidet, ſitque ſolidum ac denſum. Sic proſecto etiam ſex in ueſica, dum pituita glutinum ſit, emigitur id quod ab urina liqueſcit. Fex autem ſubſidet, & denſatur, ac ſolida ſit uelut ferrum. Vbi uero ſubſedit ac ſolida facta eſt, ſurſum ac deorſum in ueſica uolutatur, & feriēs ueſicam dolorem inducit, & ſi uehemēter feriat ac ulceret, aliquid de ipſa auferit. Verum id quod inſuper affertur, adhuc magis quam id quod arenolum decelſit, concretionem efficit. Atque tali modo ſit lapis de lacte in ueſica: & ſi puero anxietas aliqua ab hoc oboriatur, aliās atque aliās, ubi meiēre uult, urinæ meatum apprehendit. At ſi puero iam adulto lapis gignatur ex terræ eſu, dolor non adeſt ipſi prius quam ipſe ſibi ipſi cibum deligat. Et hæc à me de hoc relata ſunt. Cæterum morbus ſigna quinque habet. Nam ubi meiēre uult, dolore affligitur, & urina paulatim fluit uelut in urinæ ſtillicidio, & eſt ſubcruenta, nimirum ueſica à lapide exulcerata, & ueſica inflammata eſt. Verum hoc ſignum inconſpicuum eſt, indicat tamen ſumma pars præputij. Quandoque mingit arenola, uerum à talibus, qualia ego dicam. Eiſcit autem aliquando lapides duos, aut etiam plures paruos, generatos eodem modo, uelut de uno dixi. Fiunt etiam tali modo. Quum lapis fuerit concretus, & profunde ſubſederit in ueſicam in arena ſeparata, ita ut ipſam aduenientem lapis non aſſumat in ſeipſum, ſed grauior ac coſpicioſior fiat, ut tamen ipſa ad ſeipſam non cōcreſcat, etiam ſic duo lapides fiunt. Fiunt etiam plures eodem modo. Sed & collis ſis inter ſe in agitatione aliquid diſparatur, & arenolum per urinā eiſcitur. Quod etiam aliquando contingit, ubi arena ad ueſicam deſcendit, & non coaluit. Quidam dicunt quod potus in pulmōnem deuenit, ex hoc uero in reliquū corpus. Hi autem qui hæc dicunt, redarguuntur ex hoc quod dicturus ſum, quod uidelicet pulmo cauus eſt, & in ipſo fiſtula eſt. Quod ſi pulmo cauus non eſſet, & fiſtula non ipſi adhæret, animalia uocem nō ederent. Vocem enim edimus de pulmōne, quia cauus eſt, & fiſtula ipſi adeſt. Vocem autem articulant labia & lingua, Verum de hoc exactius in peripneumoniæ tractatione egi. Cæterum hominibus quibus potus in pulmōnem ferri uidetur, aduerſabor, habetque res ſe hoc modo. Proce dit potus in uentrem, à uentre autem in reliquū corpus expenditur. Oportet autem his quæ dicturus ſum mentem adhibere. Sermonis argumēta, quod potus non procedit in pulmōnem, ſed in uentrem, hæc ſunt. Si enim potus procederet in pulmōnem, quum pulmo expletus eſſet, homo non facile reſpiraret, neque loqui poſſet. Non enim eſſet, pulmōne pleno exiſtente, quod reſonaret. Et hoc quidem unum argumentum eſt. Deinde ſi potus in pulmōnem procederet, cibi in nobis ſicci exiſtentes non ſimiliter cōcoquerentur. Atque hæc duo argumenta exiſtunt. Sed & medicamenta aluum ſubducētia, ſi in potu ſumantur, extra uentrem procederent. Habet autem hæc res hoc modo. Quæcunque medicamenta purgatoria ſunt aut ſuperne, aut inferne, aut etiam utrūque præſtant, ea hæc faciunt. Omnia ualde urunt, & fortia quidem ex ipſis, ſi partem aliquam

aliquam teneram corporis contigerint, eam exulcerant. Mitiora uero turbulenta corporis motum faciunt, quaecumque tandem partem occuparint. Si uero aliquod ex his medicamentis in pulmonem perueniret, uideretur mihi magnum aliquod malum inducturum esse. Pituita enim de capite descendens, et in ualde breui tempore exulcerat. Tenera enim & rara res est pulmo, & si exulceratus fuerit, non bene habebit homo ille, ob multas sane causas. At uero uenter à medicamento non exulceratur. Nam res est ualida ac robusta, nimis uelut pellis & corium. Et plerique sane ex Libyae incolis pecorum pellibus pro uestibus utuntur, uentribus autem pro utriculis. Robusta enim res uenter existit. Deinde ubi à uino nigro homines repleti fuerint, nigra recrementa excernunt. Atque hæc omnia argumenta existunt. Et ubi alia comederimus, aut aliud quoddam edulium olidum, urinam reddimus comesta odore referentem. Et hæc quidem omnia argumenta sunt. Sed & hoc considerandum uenit quod dicturus sum. Si quis cyceonem biberit, aut farinam coctam sorbuerit, aut aliud quid eiusmodi, & hoc ipsum in pulmonem peruenierit, certe arbitramur ipsum ne minimum quidem tempus uiuere posse. Vbi enim modicum quiddam pituitæ in pulmonem peruenierit, aut in fistulam ipsius, multa ac fortis tussis oboritur, ac conuulsio. Si uero utique & uixerit homo qui cyceonem biberit, aut farinam coctam sorbuerit, ubi sane concocta fuerit sorbitio, uideretur mihi multa & fortis caliditas corpori oboritura esse, multusque dolor, ut omnino moriatur homo hoc modo, si illa in pulmonem perueniant. Atque hæc iam argumenta septem sunt. Præterea quomodo lac infantes pueros nutrire posset, si ad pulmonem descenderet. Atque hoc mihi aliud adhuc argumentum est. Et hæc ne produxissem quidem ad sermonis mei confirmationem, nisi multi adeo homines essent, quibus potus in pulmonem procedere uideretur, & necesse est ad opiniones fortiter inhærentes multa argumenta adducere, si quis uelit auditorem à priore sententia abducere ac conuertere ut suis uerbis fidem habeat. Et propter hoc etiam potus in pulmonem non procedit, sed in uentrem: quia contigua & annexa est ipsi gula hominis semper hians, & in hanc procedit. Et simul pulmonis fistulæ uelut hederæ folium incumbit, quare neque descendere permetteret in transglutendo, si in ipsum procederet. Atque hæc mihi de hoc relata sunt. Procedit nanque potus in uentriculum, & ubi expletus est, splen de ipso suscipit, & distribuit ad uenas, & ad omentum, & in decliue deorsum, & in scrotum, & ad crura, & ad pedes. Et postquam morbus ex aqua multa obortus fuerit, procedit de uentriculo, & semper ad splenem uenit de potu, ubi biberit homo. Contingit autem in hoc morbo, ut neque febricitent aliàs ex uentre, quam ubi homo sitiat, uesica autem & uentriculus non iusto modo excolunt, neque conueniente diæta homo utatur. At splen subægotans à uentre de potu trahit. Morbus autem oboritur, & scrotum pellucidum fit, & clauiculæ, & collum, & pectora attenuantur. Colliquantur enim ab hoc morbo, & humor ad uentriculum defluit, & infernæ partes aqua plenæ sunt, & uenter cibum auersatur, & quandoque ualde adstringitur, quandoque defluit. Nec uesica iusto modo excolat, & plerumque horror aliàs atque aliàs per corpus discurrit, & quandoque febris corripit. Et quibusdam facies tumida

fit, quibusdam non. Aliquibus etiam tibiæ rumpuntur, ubi morbus diuturnus factus fuerit, & aqua illinc effluit. Incidunt & uigiliæ, & impotentia corporis, ac maxime lumborum. Et postquam edit aut bibit, etiam paulo amplius splen affligitur, & spiritum frequentem semper emittit. Atque hæc signa hydropis sunt. Est autem & circa uentriculum solum, siue febris corripuerit, siue non. Et uenter magnus fit, & crura implentur aqua. Verum supernæ corporis partes attenuantur his qui ita affecti putantur. At signa omnia debiliores sunt, & simul in cruribus aqua non discedit, & dolor tanto minor existit.

Cæterum circa uentriculum solum hydrops & aqua hac de causa fit. Etenim ubi acruatim aqua accessit, & uia in principijs non pateat ad infernas partes, sed acruatim in uenis concludatur, nimirum ut quæ respirationem non habeat, neque sursum neque deorsum inniti potest, haud aliter quam si quis magnum uas angusti osculi occludat, ac subito inuertat, deinde sensim operculum de osculo detrahat. Et si enim hoc fecerit, aqua non effluet foras, neque enim respirationem habet, sed à spiritu qui intus est, conclusa est. Nam spiritus qui intus est replet uas, & externo spiritui renititur, & excursus aquæ non datur præ spiritu uas implente, & simul aere incumbente. Si uero quis sensim uas inclinarit, aut fundum perforarit, spiritus de uase exibat. Egresso autem spiritu, procedit etiam aqua foras. Sic sanè in hydrope, si quidem perspiratio sursum aut deorsum contingat, in principio morbi, transit ad crura hydrops, & ad pedes. Sin minus, isthic solum uoluitur circa uentriculum, Atque ita quidem de his à me dictum est. Fit autem & mulieribus hydrops in utero ipso, & signa sanè in uentriculo, & in cruribus, & reliqua signa eadè habet. Et de hoc ipso à me dictum est in morbis muliebribus. Atque hæ tres sunt species morborum ab hydrope. Fiunt autem hi morbi omnes citò difficiles, & omnes cito augentur. Adhuc autem difficiliores fiunt, si ex alio morbo corpus liquefactum, ad hunc deuenierit. Si quidem igitur subito occupauerit morbus hominem, moritur, nempe alio morbo diutissime iam affligente. At ubi etiam alius ualde fluida fuerit, citissime moritur, & sentiens, & loquens. Atque hæc à me relata sunt de hydrope, & unde oriatur, & quòd hæc sint ipsius signa.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE AFFECTIONIBVS, IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.

Hunc Galenus Polybius effecit.

IRVM prudentem ratione apud se inita, quod maximi pretij res est hominibus sanitas, nosse cōuenit quomodo ex sua ipsius intelligētia, in morbis utilitatem capiat. Nosse autem conuenit ea quæ à medicis & dicuntur, & adhibētur corpori suo, eaquē diiudicare posse. Atquē hæc singula hæcenus nosse satis est, quatenus idiotæ contingere potest. Hæc uero nouerit quis maxime, si harum rerum cognitione ac studio te-
neatur. Morbi omnes hominibus à bile ac pituita fiunt. Bilis autem & pituita morbos exhibent, quum in corpore nimium aut resiccantur, aut humectantur, aut incalescunt, aut frigescunt. patiuntur autem hæc pituita & bilis, & à cibis, & à potibus, & à laboribus, & à uulneribus, & olfactu, & auditu, & uisu, & coitu, & à calido, & à frigido. patiūtur autē quum singula ex relatis, aut non in debito tempore corpori exhibentur, aut non cōsueta, aut plura & fortiora, aut pauciora & debiliora. Vniuersi igitur morbi hominibus ex his fiunt. Oportet autem ad hæc idiotam nosse, quæ par est nosse idiotā. Quæ uero artifices nosse par est, ea etiam adhibere ac tractare. De his autem quæ dicuntur & fiunt, fieri potest ut idiota ex intelligentia quadam cōiecturam faciat. Iam uero unde singula hæc nosse oportet, ego referam. Si in caput dolores inciderint, huius caput calefacere cōducit; ita ut multa calida lauemus, & sternutatione facta pituitam ac mucos subducamus. Et si quidem ex his à dolore liberetur, sufficiunt hæc. Si uero non liberetur, purgandum est caput à pituita. Victus autē sit sobrius, & potus aqua. Vinum aut non exhibeatur, donec dolor sedetur. Quum enim calidum existens caput, uinum attraxerit, dolor fortior euadit. Dolores incidunt à pituita, quum in capite mota cumulata fuerit. Si uero aliàs atquē aliàs dolor & uertigo in caput inciderit, profunt quidem & hæc adhibita, prodest autē etiam, si sanguis à naribus fuerit detractus, aut à uena in fronte. Si uero diuturnus & fortis in capite fiat morbus, & purgato capite non decedat, huius caput aut scarificare oportet, aut uenas in circuitu inurere. Ex his enim solū sanum fore spes est. Aegrotos considerare oportet statim in constitutionis morborum principio, quare opus habeāt: & quales sint ut pharmaco purgentur, aut ut aliud quid, quodcunquē tandē uolueris, exhibeas. Si uero omisso principio, ad finem iam uergente morbo exhibueris, in desperato iam corpore, forte quiddam præbere ueritus, periculū est ne magis delinquas, quàm successum consequaris. Si in aures inciderit dolor, cōducit multa calida lauare, & auribus fomentū adhibere. Et si quidem ad hæc cesserit pituita de capite attenuata, & dolor cessauerit, sufficiunt hæc. Sin minus, optimum omniū pharmacum fuerit, quod in potu exhibitum, sursum pituitam purgat. Aut purgandum est caput medicamēto, quo capitis pituita purgatur. Fit autem & hic dolor, quum intrinsecus ad aures pituita ex capite allapsa fuerit. Si uero fauces inflammatae fuerint

fuerint, gargarismis uti oportet. Fit autem & hoc à pituita. Si uero gingiuae, aut aliquid sub lingua inflammatum fuerit, his quæ cōmanduntur utendū est. A pituita autem & hæc fiunt. Si uero uua dependit & suffocari, (Quidam hoc gurgulionem uocant) statim gargarismis utendum est, præparatis uelut scriptum est in medicamentis. Si uero ex his gracilis non fiat, retro raso capiti cucurbitæ duæ adhibeantur, & sanguinis plurimū detrahatur, & pituitæ fluxus retro reuellatur. Si uero neq; ex his detumescat, scalpello incidito, & aqua educito. Sectio autem facienda est, ubi summum subrubicūdum factum fuerit. Nam si tale factum sectū non fuerit, inflammatur, & aliquando derepente stragulat. Fit autem & hoc à pituita, ubi ex calefacto capite acruatim defluerit.

Cæterum quod ad dentium dolores attinet, si corrosus fuerit dens, & mouetur, eximatur. Si uero non corrosus est, neq; mouetur, dolorem autem exhibet, per unctionem resiccatur. Profunt etiam quæ cōmanducantur. Dolores autem fiunt, quum pituita sub radices dentium subierit. Exeduntur autem & corroduntur, partim à pituita, partim à cibis, si natura debiles fuerint, & cavitatem habuerint, & male in gingiuis fixi fuerint. Si in nare Polypus nascatur: quæ res ex naso in obliquum per respirationem diffatur, ac intumescit: eximitur laqueo ex naso ad os distractus. Aliqui etiam pharmacis erodūt. Nascitur autem à pituita. Atq; hi quidem sunt morbi qui à capite oriuntur, exceptis oculorum morbis, de quibus priuatim agemus. At uero de morbis circa uentrem, hæc considerare oportet. Pleuritis, peripneumonia, febris ardens, phrenitis, hi morbi acuti uocantur, & fiunt maxime quidem ac fortissimi hyeme. fiunt etiam æstate, uerum minus, & molliores. Quod si forte in tales incideris, hæc facere faciens ac consulens, maxime successum senseris. Pleuritis. In pleuritide febris detinet, & lateris dolor, & erecta ceruice spiratio, & tussis, & sputum ab initio quidem subbiliosum spuit. Postquam autem quinta aut sexta dies aduenit, etiam subpurulentum. Huic ad lateris quidem dolorem dandum est, quod pituitam & bilem à latere deducat. Sic enim dolor lenissimus fuerit. Alius autem curanda est per clysterem subducentem ac frigefaciētem. Hoc enim uniuerso morbo commodissimum erit. Exhibendus est etiam potus, & sorbitio. Et potiones dandæ sunt acidiores, quo sputū de latere repurgetur. Quum autē pus purgari inceperit, latus calefacere conducit, & forinsecus maturare ea quæ circa latus sunt, prius autē hoc facere nō expedit. Resiccatur enim. Fit autē hic morbus maxime ex potu, quū quis humecto corpore, aut ebrius, aut sobrius, friguerit. Fit etiā aliter. Iudicatur autē morbus breuissimus septima die, longissimus decimaquarta. Et si quidem in hac, per sputū reiectū ac purgatū fuerit pus à latere, sanus fit. Si uero per sputū nō fuerit pus reiectū, pectore suppuratus efficitur, & morbus longus erit. Porro iudicari in morbis est, quū morbi aucescunt, aut marcescunt, aut in alium morbum transeunt, aut desinunt.

Peripneumonia. In peripneumonia febris detinet, & tussis, & excreat primum quidem pituitā crassam ac puram, Sexta uero & septima, subbiliosam & subliuidam. Octaua autem & nona suppurulentam. Huic si quidē dolor adest, aut dorsi, aut laterum, dandū est medicamentū, quod in pleuritide ad lateris dolorem, in medicamentario libro scriptū est. Per potus autē, & sorbitiones, & uentris subductionē ac frigefactionē, eadem curatio adhibeatur quæ in pleuritide;

Quo uero spū et pus ex pulmone repurgetur, danda sunt pharmaca in potu, quibus pulmo humectatur, & pus sursum purgatur. Fit autē hic morbus, quū pituita acruatim ex capite ad pulmonē fluxerit. Aliquādo etiā ex pleuritide in peripneumoniā & febrem ardentē transitus fit. Iudicatur autē breuissimus quidē in diebus quatuordecim, lōgissimus uero in duobus de uiginti. Pauci uero hūc morbum effugiūt. Fiunt etiam pectore suppurati ex hoc morbo, si nō in iudicatorijs diebus pulmo fuerit purgatus. Phrenitis ubi apprehenderit, febris primum debilis detinet, & dolor circa præcordia, magis autē dextra, ad hep̄ar. Quum autē quarta aut quinta aduenerit, & febris fortior fit, et dolores augescunt, & color subbiliosus efficitur, & mēs percellitur. Huic ad dolorē quidē danda sunt quæ in pleuritide, et tepor faciēdus ubi dolor heret. Sed & aluus curanda, ac reliqua similiter facienda sunt, excepto potu. Potu uero utendum est quocūq; alio uolueris, præter uinū. Aut acetum & mēl ac aquam dato. Vinum autē non conuenit mente motis, neq; in hoc morbo, neq; in quibuscūq; alijs. Cōducit autē in hoc morbo etiā caput multa calida lauare. Mollito enim corpore, sudor quoq; magis sequitur, & aluus & urina secedit. Et æger ipse seipso tēperantior euadit. Fit hic morbus à bile, quū mota uisceribus ac septo trāsuerſo infederit. Iudicatur autē morbus, breuissimus septima die; lōgissimus undecima. Effugiūt & hunc pauci, transitq; etiā ipse in peripneumoniā, & si transierit, pauci effugiunt. Febris ardens siue caufos, quū habuerit, febris detinet, et sitis fortis, et lingua aspera ac nigra fit, à spiritus sanē caliditate. Et color subbiliosus fit, & sputa biliosa. Et æger extrinsecus quidē frigidus fit, intrinsecus uero ualde calidus. Huic conducit frigefaciētia adhibere, & ad aluum, & forinsecus ad corpus, cauendo ne inhorrescat. potiones quoq; ac sorbitiones dandę sunt frequentes, & paulatim q̄ frigidissimæ. Venter autē curetur, & si quidem non subeant quæ insunt, infusa frigidissima per clysterem immittantur, aut quotidie, aut alternis. Hic autem morbus fit à bile, quū mota intra corpus firmata fuerit. Solet etiā in peripneumoniā transire. Iudicatur autē breuissimus quidē nona aut decima die. Longissimus autē decimaquarta. Et si quidē transierit in peripneumoniā, pauci effugiunt. Si uero nō transierit, multi effugiunt. Atq; hi quidē morbi acuti uocantur, & oportet hos sic curare. Quæcūq; uero aliæ febres hyeme fiunt, siue ex uino, siue ex lassitudine, siue ex aliqua alia re, eas obseruare oportet. Transeunt enim aliquādo in morbos acutos. Transitus uero ipsarum talis est. Quum commotis duobus humoribus, pituita & bile, non conducentia corpori exhibentur, ipsi inter seipſos coacti, pituita uidelicet ac bilis, corpori ubicūq; tandem cōtigerit allabuntur. Et fit pleuritis, aut phrenitis, aut peripneumonia. Obseruare igitur ac uitare oportet febres in hyeme. Sit autē obseruatio, & tutela ab ipsis; quies, & gracilitas, & uentris euacuatio. In sorbitionibus autem & potionibus degendū est, donec febris imminuta fuerit. Ex morbis fermē maxime acuti & occidunt, & laboriosissimi sunt, & opus est ad ipsos plurima tutela, & exactissima curatione. Et à curante nullū malū accedere oportet, sufficiunt enim quæ ab ipsis morbis adsunt. Verum ut boni quid præstet, pro uiribus conetur. Et si quidem recte curante medico, à magnitudine morbi superetur æger, nō hæc culpa medici est. Si uero non recte curante, neq; cognoscēte, à morbo superetur, medici culpa est. Aestate porrò hæc fiūt, febris detinet fortis,

13 & sitis. & uomunt aliqui bilem, aliquibus uero etiam inferne secedit. His in
 potu dandum est, & ad sorbendū, quodcunq; tandem tibi idoneum esse uisum
 fuerit. Si uero bilis aut pituita ad cor cōsederit, aqua frigida, aut aqua mulsā po-
 ta, uomant. Si uero uenter non secesserit, clysteri utendū est, aut subdititiā glan-
 de. Morbus autem fit à bile. Liberatur autem maxime septima die, aut nona. Si
 13 uero febre detinente non purgentur, neq; deorsum, neq; sursum, dolor autem
 affuerit per totum corpus, tertia aut quarta die, pharmaco leui aut potionē, de-
 orsum purgato, facito autem sorbitionē ex milio, aut farina; & iisdem potioni-
 bus curato. Patiuntur autem & hæc à bile. Si uero externæ partes, nō ualde
 feruidæ fuerint, uerum internæ, & lingua aspera ac nigra sit, huic pharmacū ne
 160 dederis, curato autem frigefacientia adhibendo, & ad aluum, & ad reliquū cor-
 pus. Vocatur aut hæc febris æstuosa. Iudicatur maxime undecima die, & deci-
 ma quarta. Si uero febrilis calor apprehenderit ac dimiserit, grauitas aut cor-
 poris ipsum detinuerit; hunc donec quidem calor tenuerit, sorbitionibus ac po-
 tionibus curato. Quum autem non tenuerit, etiam cibos dato, purgato autem
 165 q̄ celerrime pharmaco, siue sursum siue deorsum opus habere tibi uisum fuerit.
 Si uero febris quidem non tenuerit, os uero amarum habuerit, & corpus gra-
 uetur, & cibum auersetur, pharmacum dandum est. Patitur autem hæc à bile,
 quum in uenas ac articulos incubuerit & firmata fuerit. Quicūq; uero alij dolo-
 res in æstate circa uentrem fiunt, si quidem ad præcordia & cor tenderint, aquā
 170 mulsam aquosam facito, & aceti tribus heminis affusis, tepidam bibendam da-
 to. & ubi modico tēpore ipsam retinuerit, & igne ac uestibus cōcalefactus fue-
 rit, uomat. Si uero à uomitu rursus accesserint ac suffocauerint, rursus uomitū
 faciat. Aut ipsum multa calida lotum, per clysterem subluē, & tepefactoria adhi-
 be, si affuerit dolor. Patiuntur autem hæc maxime à pituita, quum commota ad
 175 cor allapsa fuerit. Danda sunt etiam his qui talibus doloribus uexantur, phar-
 maca quæ descripta sunt ad eiusmodi morbum, in medicamentario libro. Si ue-
 ro transierit dolor aliās ad alium uentris locum, & febre caruerit, multa calida
 lauetur, & doloris gratia bibenda dentur, quæ in pleuritide sunt descripta, aut
 alia prout tibi uisum fuerit. Si uero à dolore non liberetur, per pharmacū deorsum
 180 subpurgetur. A cibis autem abstineat, quousq; dolor affuerit. Tales autem
 dolores, qui sic errant, à bile fiunt. Quicunq; uero dolores infra umbilicū fiunt,
 in his molli infuso per clysterem immisso subluito. Si uero non sedentur, phar-
 macum deorsum purgans dato. Quicunq; uero dolores derepente in corpore
 re fiunt citra febrem, in his lauare multa calida conducit, & tepefacere. Nam pi-
 185 tuita & bilis compacta quidem, fortia sunt, & præualent in quacunq; corporis
 parte cōstiterint, & laborem ac dolorē fortem exhibent. Diffusa uero debiliora
 sunt, quacunq; corporis parte manifesta fuerint. At uero morbi qui in æsta-
 te fiunt, sic fieri solent. Quum corpus à sole fuerit calefactū, humectatur, hume-
 ctatum aut ægrotat, aut totum, aut ea parte in quā pituita & bilis incubuerint.
 190 Si quidem igitur quis ipsos incipientes curret, neq; longi fiunt, neq; periculosi.
 Si uero non curret, aut male curret, & longiores fiunt, & sæpe quoq; occidunt.
 Sed & tertianæ et quartanæ febres, ex talibus fieri solent. Hæc morborum cō-
 stitutio maxime quidem æstate fit, aliquibus uero etiam hyeme. Tertianæ
 febris quum apprehenderit, si quidem uidebitur tibi nō purgatus esse, quarta
 die

die pharmacum dato. Si uero pharmaco non uidebitur opus habere, medicamenta in potu exhibeto, quibus febris aut transmutetur, aut deficiat. Exhibeto autem uelut scriptum est in medicamentis. Et in apprehensione quidem, sorbitione & potu nutrito. Interposito uero tempore, cibis per aluum secedentibus. Apprehendit autem plerumque non ita sæpe. Si uero non curetur, in quartanam transire solet, & diuturna fieri. Si uero quartana apprehenderit, si quidem impurgatus fuerit, primum caput purgato, & interpositis tribus aut quatuor diebus, pharmacum sursum uersus purgans dato in ipsa apprehensione. Et interpositis diebus rursus aliud deorsum purgans dato in ipsa apprehensione. Si uero ex his non sedetur, rursus interpositis diebus, multa calida lauato, & pharmaca quæ scripta sunt dato. potibus autem & sorbitionibus, & reliqua diuturnum utendum est uelut in tertiana. Apprehendit autem hæc febris plurimos multo tempore, alios uero pauco. Et fit tum tertiana, tum quartana, à bile & pituita. Cur autem tertiana & quartana, alibi à me scriptum est. Vim porro habet medicamenta in his febribus, ut potis his corpus in loco sit, in consueta caliditate ac frigiditate, & neque præter naturam calefiat, neque frigefiat. Danda sunt autem uelut scriptum est in medicamentario libro. Pituita alba quum tenuerit, corpus totum intumescit albo tumore. & in eadem die alia parte melius sibi uidetur habere, alia deterius. Et tumor alias in alia corporis parte maior et minor fit. Huic pharmaca danda sunt deorsum purgantia, à quibus aqua, aut pituita purgatur. Victus autem ratio constituenda est, in cibis & potibus, ac laboribus, à quibus siccissimus ac gracilissimus euadat. Morbus autem hic fit à pituita, quum quis ex febribus diuturnis pituitosus existens, impurgatus manserit, et pituita ad carnes ipsius conuersa fuerit. Et nihil quidem albidior est hæc pituita quam alia. Verum corporis color albidior apparet. Sanguis enim à pituitæ copia aquosior fit, & non inest similiter in ipso bonus color. Quapropter albidiores apparent. & uocatur hic morbus pituita alba. Si quidem igitur curatus fuerit inchoante morbo, sanus fiet. Sin minus, in hydropem transit morbus, & hominem corrumpit. Quicumque splenem habent magnam, qui quidem fuerint biliosi, hi mali coloris fiunt, & malis ulceribus scatent, & ex ore graue olent, & tenues euadunt. Et splen durus est, & semper cõsimili magnitudine, & cibi non secedunt. Qui uero pituitosi sunt, hæc & minus patiuntur, & splen alias maior, alias minor efficitur. His conducit si quidem impurgati fuerint, et caput & reliquum corpus purgare. Si uero purgatione non egeant, uictus ratio constituenda est, ita ut pituitosis corpus resiccemus ac attenuemus, cibis & potibus, & uomitibus, & exercitijs plurimis, & deambulationibus. Et in uere sursum per uerum purgetur. Biliosis autem conducit, ut per uictum humectantem, aluum & uesicam subducamus, & ut de uena splenitide frequenter sanguinem mittant: & medicamentis urinam cientibus utantur, quæ splenem mollire scripta sunt, & ut pro anni tempore bilem purget. Quidam uero splenici à pharmacorum potu nihil utilitatis sentiunt, neque à reliqua curatione, quicquam gracilior splen ipsorum euadit, sed quæ adhibentur à magnitudine morbi superantur. progressu uero temporis, aliquibus in hydropem morbus degenerat, & corrumpuntur. Aliquibus autem splen suppuratur, & uisti sani fiunt. Cum quibusdam uero cõsenescit durus & magnus existens. Morbus autem fit, quum ex febribus & mala curatione, bilis aut pituita,

aut

aut ambo in splenem incubuerint. Et diuturna quidem est affectio, non autem lethalis. Ex pharmacis quæ splenis gratia exhibentur, alia per uesicam purgant, & ipsum molliorem faciunt. Alia uero purgant quidem, uerum neq; per uesicam quicquam, quod manifestius fiat, neq; usq; alia parte. Splenem tamen molliunt.

Voluulus quum apprehenderit, uenter durus fit, & nihil secernit, & dolor inferne omnem alium tenet, & febris, & sitis. Aliquando uero præ dolore æger etiam bilem uomit. Hunc humectare oportet, & intrinsecus, & extrinsecus. Et multa calida lauare. Et bibenda dare quæ aluum mouent, & urinā subducunt. Et clysterem adhibere, si admittat. Si uero non admiserit clysterem, fistulam ad utriculi extremitatem alligato, & insufflando multum flatum immitto. Et ubi intestinum & uenter eleuata fuerint à flatu, exempta fistula, statim infusum per clysterem immittito, Et si susceperit, secessum emittet, & sanus euadet. Si uero non sic susceperit infusum, moritur maxime septima die.

Talis aut morbus fit, quum stercore aceruatim cōbusto in intestino, pituita circa hoc colligitur. Et intestinū intumescit, utpote his aceruatim induratis, & neq; phar maca quæ superne bibuntur suscipit, sed reuomit. Neq; infusa inferne adhibita admittit. Est autem morbus acutus & periculofus.

Aqua inter cutem fit plerunq; quum quis ex longo morbo impurgatus multo tempore manet. Cor rumpuntur enim carnes, & liquantur, & fit aqua. Fit etiam hydrops à splene, quum ægrotauerit: & ab hepate, & à pituita alba, & à dysenteria ac lienteria. Et si quidem ex purgatione non facta fiat hydrops, uenter aqua impletur. pedes autem & suræ attolluntur. humeri uero & clauiculæ, & pectora & femora liquesunt. Hunc si à principio acceperis, priusquam aqua superexcreseat, phar maca bibenda dato, à quibus aqua aut pituita purgatur. Bilem uero ne moueas. Cibos autem & potus & labores ac deambulationes constituito, à quibus gracilis ac siccus euadat, & carnes quam robustissimæ fiant. Morbus autem est lethalis, cum aliàs, tum si uenter aqua repletus fuerit.

Quum uero à splene, aut hepate, aut pituita alba, aut dysenteria in hydropem transitus fit, conducit quidem per eadem curare, effugiunt autem non ualde. Nam in morbis quum alter alteri succedit, plerunq; occidit. Quum enim corpori à præsentī morbo debilitato, alius morbus accesserit, præ imbecillitate perit, priusquā alter morbus qui posterior accessit, desinat. Aqua porro sic fit. Quum carnes à pituita, & tempore, & morbo, & non purgata immundicia, & mala curatione, ac febribus corruptæ fuerint, liquefcunt & fiunt aqua. Et uenter quidem non distribuit aquam in seipsum, uerum in circuitu circa ipsum consistit. Siquidē igitur à phar macis, & alia uictus ratione, æger utilitatem percipiat, & uenter ipsius euacuat, bene est: Sin minus, sectione facta, aquam emittito. Secatur autem uel iuxta umbilicum, uel retro iuxta lumbos. Effugiunt autem & hinc pauci.

Dysenteria quum habuerit, dolor adest per totum uentrem, & tormen, & egerit bilem ac pituitam, & sanguinem combustum. Huius ubi purgaueris caput, phar maco in potu exhibito, quod sursum pituitā purgat, et aluum lacte cocto elueris, reliquū corpus curato, & si quidē febre caruerit, pinguiibus & dulcibus, ac liquidis semper quæ insunt, ex aluo subducito. Et multa calida partes sub umbilico lauato, si dolor affuerit. Potus autē & sorbitiones ac cibos exhibeto, uelut seri-

ptum est in medicamētario libro. Morbus hic fit, ubi bilis & pituita in uenas ac aluum incubuerint, ægrotat quidem sanguis, & corruptus secedit: ægrotat autem & intestinum, & raditur ac exulceratur. Fit autem hic morbus, & lōgus, & laboriosus ac lethalis. Et si quidem robusto adhuc corpore curetur, spes est fugæ. Si uero colliquato iam, & uentre omnino exulcerato, nulla uitæ spes superest.

Lienteria. In lienteria, hoc est, intestinorum leuitate, cibi secedunt non putrefacti, liquidi, dolor autem non adest, & corpus attenuatur. Hunc per eadem curato, uelut à dysenteria detentos, Morbus autem fit, quum ex capite & superiore uentre, pituitæ defluxus fit in uentrem inferiorem. Quod ubi contingit, cibi ab ipso frigescunt ac humectantur. Et secessus ipsorum non putrefactorum uelox contingit. Et corpus liquefcit, dum simul cibi per multū tempus in uentre non concoquuntur, & simul à uentre calido, præter naturam calefcit.

Profluuium uentris longum quum detinuerit, secedunt primum quidem liquida, quæ sunt ingesta: postea pituita. Et probe quidem edit, uerum à multo secessu debilis ac tenuis fit. Hunc sursum uersus rescicato, ueratro in potu dato, & capite à pituita purgato. Ventrem quoq; lacte cocto eluito. Deinde reliqua cibis ac potibus curato, à quibus uēter & totum corpus rescicetur. Morbus autem ab hōdem fit, à quibus etiam intestinorum leuitas. Hi morbi, dysenteria inquam, & lienteria, ac diarrhœa siue profluuium uentris, consimiles sunt. Et oportet ipsos sic sanare, ita ut defluxū à capite & superiore uentre intercipias, aut auertas. Morbi enim natura hinc est. Et nemo sententiam tuam reprehendet. Firmè autem & reliquos morbos sic considerare oportet, unde unicuique natura sit, Et si sic consideraueris ac deprehenderis principium morborum, minime aberraueris.

Tenesmos ubi apprehenderit, secedit sanguis ac mu-
cus, & dolor fit in uentre inferiore, maxime ubi ad secessum deuenit. Huic conducit uentrem humectare, & pinguefacere, ac tepefacere. Et quæ insunt subducere. & calida lauare, excepto capite. Solet autem hic morbus plures cibos expetere, Tormina enim euacuato uentre à sanguine ac mucos pertransentibus, & ad intestinum allabentibus, fiunt. Quum autem insunt cibi, minorem mordacitatem intestino inferunt. Et fit quidem ex hōdem à quibus & dysenteria, uerum debilior, & breuis, & non lethalis.

Quum ex uino aut à conuiui-
o, bilis superne ac inferne fluxus, aut diarrhœa corripuerit, diarrhœæ quidē conducit ieiunare. Et si sitim habeat, uinum dulce dare, aut uuarum passarū dulcium retrimenta. Ad uesperam uero danda sunt, quæ etiam his qui à pharmaco purgati sunt dantur. Si uero non cesset, uelis autem sedare, uomitum à cibo, aut lenticulæ decocto facito, & cōfestum sursum reuellitur infernus secessus. & si succo lentium aut cicerū infuso elueris, etiam sic sanè sedabitur. At uero bilis fluxui cōducit, si dolor adsit, dare quæ in pharmacis scripta sunt sedantia dolorem. Venter autem curetur, tum superior, tum inferior, per portiones humectantes, & per balnea calida corpus mollientia, capite excepto. et sic tū uomitus prodiiuor fit: & si liquor aliquis ingressus fuerit, ea quæ aduersantur sursum reuomuntur: tum infernus secessus magis prodit. Si uero euacuaueris, uiolenter uomuntur, & uiolentius secedunt. Ad uesperā uero dato & huic ea quæ dari solent ei qui pharmacū bibit, fiunt aut & hi dolores qui ex potationibus aut ex conuiui-
o oriuntur, quū cibi & potus plus solito in uentrē ingressi fuerint, & quæ ex
trinsecus

310 trinfecus corpus supercalefacere solent, bilem ac pituitam mouerint. Vrinae stillicidij modi quidem multi & omnigeni sunt. Conducit autem forinfecus quidem corpus balneis calidis mollire, Intrinfecus uero humectare, aluum quidem per cibos, à quibus fluida fiat. Vescicam uero per potus, à quibus urina quam plurimum diffunditur. Danda sunt & urinam cientia medicamēta, quæ scripta sunt in medicamentario libro sedantia dolorem. Morbus autem fit à pituita. Et quum quidem uescica siccata fuerit, aut perfrigerata, aut euacuata, dolorem exhibet. Quum uero humida est, & plena, aut etiam diffusa, minus. fit autem senioribus diuturnior hic morbus. Iunioribus autem breuior. Neutris uero lethalis. Coxendicum morbus quum fit, dolor corripit coxæ iūcturam, & summas nates, ac coxendicem. Tandem uero etiam per totum crus dolor uagatur. Huic confert quum dolor tenuerit, mollire in quacuncq; tandē cruris parte dolor hæserit, per balnea, & tepefactoria ac fomenta. Et aluū subducere. Vbi uero quieuerit dolor, pharmacū dandum est infra purgans. Et postea bibat lac asininum coctum. Doloris autē gratia dentur quæ scripta sunt in medicamentis. Morbus hic fit, quum bilis & pituita in sanguifluam uenā incubuerint, aut ex alio morbo, aut aliter quantūcūq; sanguinis à pituita & bile cōfactum ægrotarit. Hic enim per crus uagatur per sanguifluam uenam; & ubicūq; cōstitit, ibi etiam dolor manifestus fit maxime, molestus quidem, sed non lethalis. Si uero in unum aliquem locum incubuerit dolor, & constitit, & medicamentis non fuerit exactus, urito quocūq; loco fuerit dolor. Vrito autē lino crudo.

Articularis morbus quum tenuerit, corripit calor & dolor corporis articulos. Corripit autem acutus, & in aliū atq; alium articulum dolores incumbunt, tum acutiōres, tum molliores. Huic conducit adhibere quā parte dolor hæret, frigefactoria. Et quæ insunt ex alio subducere, per clysteres, aut glandem subditam. Ad sorbendum uero & bibendū dato quodcūq; tibi conducibile uisum fuerit. Quū uero dolor intus fuerit, pharmacum infra purgans bibendum dato, & post hoc serum coctum, & asininū lac. Hic morbus à bile fit & pituita, quum cōmota in articulos incubuerint. Et breuis quidem fit & acutus, non autem lethalis. Solet autē iunioribus magis quā senioribus contingere.

Podagra uiolentiōr est omnibus eiusmodi circa articulos morbis, & diuturnissimus ac ægre cedēs morbus. Et est quidem hic morbus sanguinis in uenulis à bile ac pituita corrupti. Quanto autem in tenuioribus fuerit uenulis, & in plurima corporis necessitate cōstitutis, & in neruis, et ossibus multis ac densis: tanto sanē durabilior est morbus, & qui egerrime depelli possit. Conducit autem & huic eadē quæ morbo articulari. Et longus quidem est & hic morbus ac molestus, sed nō lethalis. Si uero in digitis dolor relinquatur, uenas paululum supra articuli in digito nodum inurito. Vrito autē cum lino crudo.

Morbū autē regiū sic curare oportet. Extrinfecus quidē corpus molliendum est balneis calidis. Aluus uero & uescica humectanda, & urinā cientia danda, quæ sunt præscripta. Si uero fortis fuerit, purgato capite, pharmacū quoddam potandū dato quod bilem deorsum purgat. Postea uero urinā cientibus utendum est. Morbus autē fit, quum bilis commota sub cutem uertitur.

Quod si hæc nouerit uir idiota, nō similiter in incurabiles morbos inciderit. Solent enim morbi ex paruis occasionibus magni ac diuturni fieri. Et quicūq;

cibi

cibi, aut potus, aut sorbitiones congrue ac consequenter se habent, & quæcūq; pharmaca doloris gratia, ea omnia sine periculo semper exhibētur, si iuxta præscriptum exhibueris. Quæcūq; uero pharmaca purgant bilem aut pituitam, in his pericula fiunt, & culpæ medentibus imputantur. Quàm maxime igitur ea uitare oportet. Atq; hi quidem sunt morbi qui circa uentrem fiunt. Excep-
tis pectore suppuratis, & tabidis, & muliebribus morbis. Hi enim seorsim de-
scribentur.

Tubercula quæ enascuntur omnia, à pituita aut sanguine nas-
cuntur, quum sanè à uulnere, aut casu fuerint collecta. Cōducit autem horum
aliqua cataplasmatibus integere, & per pharmaca in potu data diffundere. Ali-
qua uero impositis cataplasmatibus maturare. & diffundūt quidem cataplasma-
ta, quæ quum calida sint humectant, & non in seipsa trahunt. Maturant au-
tem, quæ calefacientia contrahunt. Quum uero aliquod sectum fuerit, aut sua
sponte ruptum, pharmaco humorem repurgare conuenit, ubi autem pus e-
fluere desiuerit, uelut ulcus sanare.

Lepa, & pruritus, & scabies, & impē-
tignes, & uiriligo, & alopecia, à pituita fiunt. Sunt autem talia turpitudine ma-
gis q̃ morbi.

Fauus, & strumæ, & pani, & furunculi, & carbunculus, à pi-
uita fiunt. Quo uero hæc depurges, pharmacis sic utendum est. Quicūq; bi-
liosi sunt, his dato ea à quibus bilis purgatur. Pituitosis uero, ea à quibus pitui-
ta. Atrabiliarijs autē, ea à quibus atra bilis. Hydropicis ea per quæ aqua. Quæ-
cūq; uero pharmaca in potu dantur, & non purgant neq; bilem, neq; pituitā,
ea quum in corpore ingressa fuerint, uim exhibere oportet, aut frigefaciētia, aut
calefacientia, aut siccantia, aut humectantia, aut contrahentia, aut diffundentia.

Quæ uero somnum faciunt, ea quietem sanguini exhibere oportet. Quum ad
ægotum deuenieris, interrogare oportet quæ patitur, & ex qua causa, & quot
iam diebus: & an ueter secedat, & quo uictu utitur, Et primum considerare, an
morbus à bile aut pituita factus sit, aut utrisq;. Et hoc probe nosse conuenit, q̃
necesse est, ut ab altero horum, aut utrisq; fiat. Deinde utrum siccitate aut hu-
miditate opus habeat. Aut aliquæ quidem partes corporis siccitate, aliquæ ue-
ro humiditate. Postea an morbum sursum purgare oportet, aut deorsum, siue
per uesciā. Et an augetur morbus aut marcescit, & an soluitur, aut in alium tran-
sit.

Vulneratos fame affligito, & ex aluo quæ insunt subducito, aut per dy-
sterem, aut pharmaco infra purgante exhibito. & in potu dato aquam, aut ace-
tum. Aut sorbitiones præbeto. Inflammata cataplasmatibus frigefacito. Talia
uero cataplasmata sint, aut betæ coctæ in aqua, aut apium, aut oleæ folia, aut fici
folia, aut rubi, aut quercus, aut mali puniceæ. Atq; his coctis utendū est. Crudis
uero rhamni folijs, aut uiticis, aut saluig, aut Tithymali. Aut pulegiū uiride, aut
porrū, aut apium, aut coriandrū, aut isatidis folia impone. Si uero nihil horum
habueris, neq; ullum aliud cataplasma, polentam aqua aut uino subactā im-
ponito. Tanto autem tempore hæc cataplasmata prosunt, quanto frigidiora fue-
rint q̃ ulcus. Quū uero fuerint calidiora, aut similiter calida, nocēt. Pinguiā
ad inflammata nō conducunt, neq; ad ea quæ non sunt purgata, neq; ad putre-
scencia. Sed ad inflammata conferunt frigida. Et ad impurgata ac putrescentia,
acria faciunt, & quæ mordacitatem aliquam inducentia purgant. Vbi uero car-
nem producere uoles, pinguiā & calidā magis conducūt. Ab his enim caro pu-
lulat.

Quibuscūq; cibis aut potibus homines sani in uictu utuntur, ex his
y opor

oportet praesentibus uti ad aegrotos, ita ut praepares calidos et frigidos, et humidos, & siccos. Ex frigidis quidem calidos, & calidos ex non calidis, & siccos ex non siccis, & reliquos iuxta eundem modum. Neque uero de praesentibus desperare oportet, tanquam nihil possint, & absentes quaerere, qui nullam utilitatem aegro afferant. Comperies autem, si recte considera ueris, extra hos, paucos quibus ad aegrum utaris. Sorbitiones autem in morbis omnibus dato, aut ptisanam, aut milium, aut farinam, aut alicam. Et quaecumque ex his dederis ad secessum, te nuia dato, & magis percocta, & dulciora potius quam saliora aut calidiora. Quae uero ad robur aut refocillationem, crassiora, pinguiora, & moderate cocta. Potibus autem utendum est, si quidem aluum & uesicam subducere uelis, uino dulci aut aqua mulsae. Si uero adstringere, austero, albo, tenui. Si corroborare, austero, nigro. Qui uinum bibunt citra affectionem erga ipsum, his dandi sunt porus qui praeparantur, & in medicamentario libro scripti habentur. His qui medicamentum biberunt, post purgationem detur, febrientibus quidem, aut lenticula, aut milium tenue, aut ptisanae succus. Danda est autem ptisana & milium, uelut quae leuia sint. Alica uero uelut omnium robustissima. Et farina uelut his robustior. Lenticula autem odorata praeparetur, & modica secundo loco detur, ut quae leuis sit sorbitio, & stomacho grata sursum uersus. Ammisceatur autem aut sal, aut mel, & cuminum, & oleum. Ad lenticulam uero ammisceatur pulegij herba, & parum aceti. Non febrientibus autem, panis puri medullam in iusculum intro, aut mazam & frustum piscis dato, aut ouiculae tenerimae carnem, aut uolucris aut catuli coctam. Febrientibus autem etiam betam dato, aut cucurbitam, aut blitum. Et post cibum bibant uinum uinosum, uetus, album quam aquosissimum.

Quibus lauari non conducit, ungantur uino & oleo calido, & alternis extergantur. Quum aluum debilis, a cibis humectare uolueris, mazam dato & obsonia. Et marinorum quidem piscium frusta cocta cum intro. carnes autem ouiculae tenerimae, aut hedi, aut catuli, aut uolucris coctas. Et betam aut blitum, aut rumicem, aut cucurbitam, si tempus tulerit. Ex oleribus uero apium, & anethum ac ocimum. & uinum mellei coloris, uetus, album item ac aquosum.

Quum uero siccare uolueris corpus, panem dato, & obsonia assa, & sicca, & haec omnia calidiora. & carniū partes carnosas: pisces, petrosos: olera, rutam, aut thymum, aut organum. Vinum uero nigrum austerrum. Praeparantur autem obsonia cum sale & cumino. Alijs uero condimentis parcissime utendum est. Quum autem ex morbo refocillare uolueris, alia quidem eadem dato, quae exhibes quum uentrem humectas, Verum pro lactentibus carnes fortiores, & pro catulinis, uolucrum ac leporinas. & ex his aliquas assatas, tum de carniibus, tum de piscibus, & quam optime praeparatas. Quibuscumque morbis siccitas conducit, his semel in die cibum exhibere expedit, & cibos ac potus pauciores dare, quam ut repleantur, & hos laboribus ac deambulatione perficere, & quam minimū dormire. Quibuscumque uero humiditas conducit, his expedit inediam non ferre, & cibi ac potus non indigos esse, neque laborare, & dormire quantum uoluerint. Quoscumque cibos, aut obsonia, aut potus aegroti concupiscunt, exhibere, si non corpori damnum inde accessurum est. Quum aut cibum aut potum augere inceperis aut detrudere, paulatim & additiones, & deductiones facere oportet. Quicumque cibos sufficientes perficere possint, his sorbitiones ne dederis. Ex-

cludunt

cludunt enim cibū. Qui uero nō possunt, his dato. Si uero quid dare uolueris refectionis gratia, alicā dato, et ptisanā triticeam. Hæ enim sorbitiones sunt fortiores. Dentur aut post cœnam. Pharmaca quæ potantur, & quæ ad uulneta adhibentur, discere oportet: omnibus enim hoc expositū ac procliue est. Non enim ex intelligentia homines hæc reperiūt, sed potius ex fortuna. Neq; artifices magis q̃ idiotę. Quæcūq; uero in arte medica, intelligētia discūtur & reperiuntur, aut de cibis aut de medicamentis: ea ab his qui dinoscere possunt quæ in arte sunt, discere oportet, si quid discere uelis. Post sorbitiones cibum debilibus dato, & uinū uinosum insuper bibendū. Ante cibos uero & potus aut sorbitiones, & postea, & cibū & potum quicūq; tandem tibi uidebitur debilibus exhibeto, ita ut & corpus & animā inspicias. Sic enim maxime profueris. Quam facultatē singuli cibi habeant, coniectare oportet, ex his qui uim manifestam faciūt. Quicūq; flatum, aut morsum, aut repletionē, aut ructū faciunt, aut tormen, aut secedūt, aut nō secedunt: hi manifesti sunt q̃ hæc operantur. & ex his etiam alios cōsiderare oportet. Habēt enim singula edulia, & quo profunt, & quo lædunt. Verū alia manifestissime operantur quæ operantur, alia uero obscurius. Cibi & obsonia præparētur ac exhibeantur debilibus, à quibus neq; flatus fit, neq; ructus acidus, neq; tormē, et quæ neq; ualde per aluum secedūt, neq; ualde resiccantur. Hæc autē sic fiunt. Quæcūq; quidē uenter superat, et corpus ipsa suscipit, ea neq; flatū exhibent, neq; tormē. Si uero uenter non superarit, ab his & flatus, & tormē, & alia huiusmodi fiūt. Leuissima sunt cibaria, & potus ac obsonia, quæ moderata in corpus ingesta, aut paulo amplius supra modum, neq; repletionē exhibent, neq; tormen, neq; flatū, neq; aliud quiddam eiusmodi, & celerrime cōcoquantur, & cōcocta secedunt, & per omnem diem in uentrem ingesta, minime molesta sunt, etiam si diu antea fuerint ingesta. Grauiora autem sunt, quæ moderata exhibita, aut infra modum, repletionem & dolorem exhibent. & quæ neq; dari, neq; edi, neq; bibi possunt, ut non dolorem exhibeant. Et si quis ipsa per tempus rursus bibat aut edat, etiam sic dolorem exhibent, & non pro ratione secedunt. Ad sanitatē optima sunt, quæ modice ingesta, sufficiunt, ut & famis & sitis sint medela. Et plurimo tempore corpus ipsa suscipit, & pro ratione secedunt. Ad robur autem optima sunt, quæ carnem plurimā ac densissimam producunt, & sanguinē crassesciunt, & pro ingestorū ratione secedunt. & corpus plurimo tempore ipsa suscipit. Pinguis, & caseosa, & mellita, & ex sesamo parata, ructū acidum maxime faciūt, & bilis fluxum superne ac inferne, & tormen, & flatum, & repletionē. Hoc ipsum etiam cōtingit, quum quis plura ederit aut biberit, q̃ uenter cōcoquere potest.

Debilibus si quidem pro morbi ac corporis ratione dederis, quæcūq; tandem dederis, consumit hæc corpus, et neq; indigum est, neq; repletum. Si uero aberraris à temporis occasione, detrimentū in utraq; sequitur. Quæcūq; cibaria aut potus, aut obsonia corpus suscipit, ab his maxime neq; tormen fit, neq; flatus, neq; ructus acidus. Quū enim in uentrem ingesta fuerint, corpus ab ipsis trahit quod ipsi commodum est. Et necesse est iam quod restat debilius esse, q̃ ut tormen, aut flatum, aut aliud quiddam huiusmodi in uentre faciat. Vina dulcia, & austera, & mellei coloris uetusta, uentrem subducunt, maximeq; urinam cient ac nutriunt, & neq; flatum exhibent, neq; tormen, neq; repletio-

nem. Carnes percoctæ & exassatæ, utræq; debiles sunt ad robur augendū. Ad secessum uero percoctæ cōmodæ sunt, Assatæ uero magis sistūt. Quæ uero moderatā habent & cocturā & assaturā, hæc & ad robur, & ad secessum moderate se habent. At uero crudiores ad robur quidem cōmodæ sunt, sed nō ad secessum. Ex cibis ac potibus qui cōmodissimi sunt corpori ac maxime sufficientes, & ad alimētum, & ad sanitatē, ex his ipsis etiam, ubi quis ipsis non in tempore utatur, aut pluribus q̄ tempestiuū est, & morbi, & ex morbis mortes fiunt. Reliqui uero cibi ac potus, qui talem uim non habent, parum utilitatis afferūt, etiam si quis semper ipsis in tēpore utatur. parum autem etiam lædunt. In utræq; enim partem debiles sunt, ut & boni aliquid faciāt, & mali. Sunt autē cibi & potus qui hāc uim habēt hi, panis, maza, carnes, pisces, uinum. & ex his alij magis, alij minus. Qui cūq; ex sicco uictu uiuunt, his nō cum cibo potus detur, sed post cibū, multo tempore interposito. Et sic quidē siccus humor à siccis cibis ortus, corpus siccatur. Si uero quis simul cum cibo bibat, cibus humidior factus, corpus humidius facit. Panis calidus, & carnes calidæ, ipse per se comeſt, siccāt. Si uero cū liquore dederis, aut statim à cibo potū prębueris, nō siccāt.

Panis purus ex farinis, ad robur ac refectiōē commodior est, q̄ qui nō est ex tenuibus farinis paratus, & recēs utilior est q̄ uetus, & ex farinis recentibus melior q̄ ueterib. Polenta ex ordeo non madefacto, sed circūcirca consperso ac decorticato, fortior est q̄ ex madefacto: & recens quā uetusta. Et maza prius subacta fortior est, quā nō subacta. Vinū diffusum, ac perfrigeratū, & excolatum, tenuius sit ac debilius. Carnes coctæ, si quidē percoctas feceris, debiliores sunt ac leuiiores. Assatæ uero si exassatæ fuerint, et inueteratę ex aceto aut sale, debiliores sunt & leuiiores recētibus. Debiles ac leues cibi, uentrē quidem nō lædunt, neq; corpus, eo quod calefacti non intumescūt, neq; replent, sed cito mollescunt, & cōcocti secedunt. Humiditas autē ab ipsis debilis corpori accedit, et neq; augēt, neq; robur memorabile exhibēt. At fortes cibi, et intumescūt ubi in uentrē ingesti fuerint, & replent. & difficilius quidē ac tardius concoquantur, & nō secedunt. Verū humor ab ipsis fortior ac incorruptus accedēs, multum robur ac augmentum corpori addit. Ex carnibus leuissimæ sunt in corpus, caninæ, & uolucrū, & leporinæ coctæ. Graues autem sunt bubulæ. Et porcinæ moderatiore, flatum autē faciunt, & coctæ & assatæ. Et sanis autē & debilibus conueniunt ouillæ. Suillæ uero his qui laborant & exercitātur, & ad bonum habitum, & ad robur cōmodæ sunt. Debilibus autē & priuatam uitam degentibus, fortiores. Sed & ferinæ mansuetis leuiiores sunt, eo quod fructū non similem edunt. Differunt autem & pecorū carnes, & eorum quæ fructū edunt, & quæ non edunt. Et fructus nō idem in omnibus facit, sed partim densam ac fortem uictimæ carnem efficit, partim raram & humidam, ac debilem.

Vt in summa dicam, pisces leue sunt edulium, & cocti, & assati, & ipsi per se, & cū alijs cibis. Ipsi uero inter seipsos sic differunt. Stagnorū pisces, & pingues, & fluuiatiles, grauiiores sunt. Littorales autē marini, leuiiores. Et percocti assatis sunt leuiiores. Ex his itaq; fortes dato, ubi rescire aliquē uoles. Leues uero, ubi gracilem & tenuem facere oportuerit. Balneum calidū moderatum quidem, mollit et auget corpus. Quod uero opportunū modum excedit, siccas quidē corporis partes humectat, humidās uero resiccat. Et siccæ quidem humectatæ

etate debilitatē & animi deliquium exhibēt. Humidæ uero siccatae, siccitatē ac sitim. Ex oleribus allia, & cocta & assata, urinā cient, & per aluū secedunt, & ad menses muliebres cōducunt. Cepæ ad urinas cōmodæ sunt. Succus enim acrimoniam quandā exhibet, ut secedat. Atq; his quidem sic utēdum est, sed debilibus non exhibēda. Apium & coctū & crudum urinā ciet, & palustre magis q̄ satiuū, quod etiam maiorem uim habet. Coriandrū stomacho gratum est, & per aluum secedit, tum coctū, tum crudum. Ocimū & humidū est & frigidū, ac stomacho gratum. Porrū coctum quidem urinā ciet, & secedit. Crudum uero æstuosum est & pituitosum. Malum punicū reficit & pituitosum est, et cū nucleo quidem, aluū sistit. Citra nucleū uero, secedit. Calidi cibi, siccī quidem sistunt, humorē enim in uentre resiccant. Si uero humidi sunt, humectātes per caliditatē, aluum subducunt. Acerba siccant, & cōtrahunt corpus. Habent & uim sistendi. Acida attenuant, morsum inducētia. Salsa secedunt, & urinam cient. Pinguia & dulcia, humiditatē & pituitam exhibent.

Reficiunt cucurbita, & beta, & blitū, & rumex, & per humiditatē secedunt.

Brasica uero acrimoniam quandam habet ad secessum, & simul boni succi est.

Caseus, & sesamū, & uua passa, reficiūt & pituitosa sunt. Vinū dulcē, et mellis speciem referens, ambo & reficiunt, & urinā cient, & pituitosa sunt. Austera uero, ad robur & siccitatem commoda sunt. Urinam autē cient etiam austera uetusta, quæ alba & tenuia existunt. Oleum & quæcūq; oleosa, reficiūt et pituitosa sunt. Ex oleribus coctis secedūt, quæ ex natura humidissima aut acerrima sunt, aut caliditatē habent. Dāda autē sunt hæc tepidiora ac flaccidiora. Sic enim ad secessum cōmodant. Cucumis pepo, & urinā cit, et aluo secedit, ac leuis est.

Alter autē pepo, frigiditatē quandam exhibet, et sitim sedat. Alimētum uero à neutro horū contingit, nisi tenue quoddā. Sed neq; malum, neq; memorabile. Mel cum alijs quidem comestū, et nutrit, et bonū colorem exhibet. Ipsum autem per seipsum attenuat magis q̄ reficit. Nam & per urinā, & per secessum plus iusto expurgatur. Urinam cientia in uentre & cito calefiūt, & calefacta marcescūt ac liquefcūt, & ob id citum secessum faciūt. Stabiles autē ac aluum sistentes cibi, & calefcūt, & calefacti cito resiccātur ac compingūtur, & propter ea obduri facti, nō secedunt. Quæ per aluū secedunt, succosa sunt, & natura calida. Quæ uero urinam cient, sicca & frigida. Frumentū & uinū, differūt quidem & ipsa inter seipsa ex natura, tum robore & debilitate, tum leuitate ac gravitate. Differt etiā locus à loco, ex quo illa fuerint. Est enim alius aquosus, alius aquarū inops, & apricus, & umbrosus, & bonus, & malus. Quare omnia hæc ad hoc cōferunt, ut singuli cibi aut fortiores sint, aut debiliores. Quicūq; sanè panē comedere soliti fuerūt, his dandus est et in morbis. Quū quis cibos aut potus plures solito acceperit, si nō solito more perfecerit, optimū est ut statim reuomat. Poma & fructus arborei, tum mollis, tū duri corticis, propter ea post cibum molestiora sunt, & sano, & debili, quia corpus eius qui cibū sumpsit, solū ab ipsis humores trahit. Si uero ieiunus quis edat, plures. Quicūq; cibi aut flatum, aut æstum, aut morsum, aut repletionē, aut tormen faciūt, à talibus liberat uinum meracū insuper potatum. Corpus enim à uino calefactum, per calorē amouet ea quæ insunt à cibis & potibus ac similibus. Venter aliquando perturbatur, aliquādo sistitur, aliquādo etiam pro ratione secedit. Cur

autē hęc sic se habēt: primum quidem uenter quū humidior fuerit, & quū si-
 cior, susceptū cibum corrumpit. Deinde quū mutatio facta fuerit, siue ex frigore
 580 read caliditatē, siue ex caliditate ad frigiditatē, itidem corrūpit. Quare necesse
 est uentrē, ab iisdem cibis ac potibus propter hęc ipsa, & molliorem fieri, & du-
 riorem. Cibaria & potus & obsonia, excepto pane, & maza, & carnibus, &
 piscibus, & uino, & aqua, reliqua omnia tenues ac debiles utilitates exhibēt, ad
 augmentū, & ad robur, & ad sanitatē. Tenuia item ac debilia mala ab ipsis fiūt.

585 Quoscunq; ægrotos, febres nō continenter detinent, sed intermittētes corri-
 piunt, his cibi dandi sunt post apprehensionē, ita ut coniecturā facias, ne febris
 a recens accepto cibo irruat, sed cibis iam cōcoctis. Vinū & mel optima iudi-
 cata sunt in hominibus, si iuxta naturā & sanis, et debilibus cū temporis oppor-
 tunitate ac mediocritate exhibeantur. Et bona quidē sunt ipsa per seipsa, Bona
 590 uero etiā pernixa, & tū alia, tū quæcūq; memorabilē utilitatē habēt. Quæcūq;
 sanis cōmoda sunt, ea etiam ægrotis exhibita fortiora sunt. Et oportet detractio-
 ipsoꝝ uigore ea dare, alioqui nō feret ipsa corpus, sed magis lædūt, q̄ profunt.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE INTERNIS AFFECTIIONIBVS, IANO

Cornariō Medico Physico interprete.



1 Sicut pulmonis arteria fuerit exulcerata, aut aliqua tenuis uenula
 ex his quæ in pulmonē dependent, rupta fuerit, aut aliqua fi-
 stula ex his quæ per pulmonē distentæ sunt: & alia in aliam
 distracta fuerit, & sanguine fuerint impletæ; distrahuntur sa-
 ne ac rumpuntur ob has maxime causas, propter laborē, pro-
 pter cursum, ob casus, ob plagas, ob uomitus uiolenter fiē-
 tes, ob febres. Hęc igitur patitur. Primū quidem tussis sicca
 obtinet. Deinde paulo post expuit saluam subcruentā, aliquando autē puram.
 Et si quidē hic breui a morbo liberetur, satis est: Si uero nō, temporis progressu
 10 sanguis amplior prodit, aliquādo purus, & aliquādo etiam subputridus. Sæpe
 uero etiam fauces nō animaduertētibus sanguine implentur. Postea sanguinis
 grumos paulatim & frequēter emergētes reijciunt. Aliquādo uero etiā graueo-
 lentia ab ipsis cōtingit, et fauces aliquādo spuma quadā replentur. Et rigor ac fe-
 bris apprehēdit, circa initia quidē morbi, uehēmēter: In progressu autē debilius,
 15 & aliās atq; aliās corripit. & dolor quādoq; in pectoribus insitus est, & in dor-
 so, et in lateribus. Et ubi sanguinē spuerit, saluā multam liquidā expuit,
 quandoq; uero etiā uiscosam. Atq; hęc quidē sic patitur donec quatuordecim
 dies præterierint. Post hos uero si nō desuerit morbus, squamas ab arteria tuf-
 siēdo auellit, quales a pustulis decedūt, et dolor incidit in pectus, & in dorsum,
 20 & in latus. et præcordia cōtingens uelut ulcus dolet. Huic cōducit ut q̄ maxime
 quietē intus habeat, si morbus sic se habuerit. Si enim quid laborarit, et dolor a-
 cutior, et tussis magis q̄ prius premit, et rigor ac febris magis occupat. Et si ster-
 nutauerit, dolor acutus irruit. Dolet autē & in lecto, quū se circumuertit. Huic ci-
 25 bos quidē eosdem, quos & pectore suppurato exhibere oportet, uerū hos non
 multos. Ex obsonijs autē his utatur. De piscibus quidē, squatina, aut pagro, aut
 galao

galæo magno albo, aut alijs similibus, omnibus cū rhoe et origano cōditis. Car-
nem autē edat galli affatam, sine sale, aut capræ coctā. & uīno austero uetustissi-
mo ac iucūdisimo nigro utatur. Deambulationib. autē moderatis. Verūtamen
hæc fiant febre non tenente. Si uero febris tenuerit, sorbitione farinæ aut milij
utatur. Si uero cibos assumat, paucos assumat, & obsonia per aluū secedentia.
Et si pharmaco tibi utendū esse uidebitur, cnidio cocco, aut tithymalide ipsum
subpurgato. Et post purgationē, farinæ coctæ pinguis heminā absorbendā da-
to. Deinde q̄ maxime reficito, ut q̄ minimum tenuis sit. Ad huiusmodi enim
morbū non conducit tenuē esse. Deambulationes etiā primū paucas faciat, ut
ne lassitudo succedat. Fomentum uero aliās atq; aliās adhibeatur. Et qua die fo-
mentū adhibetur, sine cibo sit excepta farina cocta, cuius heminā absorbeat. A-
quam autē bibat. Postera die minus q̄ solitus fuit edat, & bibat uinū nigrum, iu-
cundū, austērū modicum. De cætero uero bis aut ter in die cibi dentur. Sic autē
huic paulatim dato, donec uentrē confirmaueris. Nam ex febribus & inedia, si
os quidē appetiuerit, uenter autē suscipere noluerit, ubi acruatim suscepit, in-
flammat. Quare paulatim dare oportet. Si uero acruatim dederis, & parū la-
borarit, deambulationibus uenter nō perfrigeratur, nimirū cibis quiete compa-
ctis. Quare etiā febris succedere solet, & hyeme quidē minus, æstate uero peri-
culū est ne delinquat. Hūc q̄ maxime reficere oportet, quo q̄ crassissimus fiat. et
deambulationibus moderatis utatur, & minus solito luctetur, & parū labore-
t primū, deinde amplius, nunquam aut multū. hæc si fecerit, celerrimē sanus erit.
Si uero tenuis fiat propter laborē, remittat ac quietē agat. Hic ubi sanus fuerit,
neq; ad uentū celeriter currat, neq; equū, neq; currum cōscendat. Vitet etiā uo-
ciferationē, & iracundiā. Periculū est enim ne morbus reuertatur. Quare hæc
omnia uitare oportet. Si uero cibū auersetur, eruum torreto, et corticē depurga-
to, deinde per triduū in aqua mācerato, singulis aut diebus aquā diffundito, &
aliā affundito. Postea quarta die excolato ac reficcato, deinde tenuissime moli-
tum cribrato. Et lini semen tostū tundito ac terito. Et sesamū tostū tūdito ac
terito. Et polentam nō falsam, purā, tenuem accipito. Et erui quidē ac polentæ,
amborū æqualis sit mēsurā, sesami uero tertia pars, lini uero dimidia unius par-
tis. Hæc in lacte caprino cocta q̄ liquidissime absorbeat. Postea uero in pran-
diū ipsi dentur cibi puri, et obsonia fortiora. Vinum autē idem bibat. Dato autē
ipsi et cētauræ radices, ad has rupturās facientes, in uinū ipsas deradens. dato
item dracontij radices in uinū derafas. Sed & tussis gratia, dracontij derafum
in melle delingendū dato. Et si decoctū in lacte asseuerarit se sorbere non posse,
lac bubulū q̄ plurimū bibat, tertia parte aque mulsæ ammixta. Atq; sic celerrī-
me sanus erit. Morbus aut curatione multa opus habet. Est enim difficilis. Si e-
nim curatus et sanus factus nō seipsum custodierit, plerisq; reuertēs morbus in-
teritus caussa fit. hic si quidē ab hac curatiōe sanatus fuerit, satis est: Sin minus,
ipsum lacte crassifacitū, & in pectore, et in dorso urito. Si enim successerit ultiō,
fugæ morbi spes est. Si uero arteria cōuulsa fuerit, aut aliqua uena ex his quæ ad
pulmonem tendūt, hæc patitur. Ab initio quidē morbi, tussis acuta obtinet, &
rigor, & febris. et saluā expuit multā, albā et spumofam, aliquādo uero subcrue-
tā. & dolor caput ac collū detinet. hic morbus fortior est priore. & usq; ad decē
primos dies talia patitur. Postea pleriq; undecima die pus crassum uiolēter ex-

puunt. Decimaquarta uero die puriora expuit, si euasurus est, & dolore minus
 uexatur, & breui sanus fit. Si uero morbus diuturnus futurus est, tunc & pus
 multo amplius expuit, et reliquus dolor multo amplior in corpore inest. Calo-
 res aut debiliores habent q̄ prius. Hūc si à principio acceperis, infra subpurga-
 to scammonia succo, si nō febricitarit. Post purgationē autem accipiat ea quæ
 prius, et alia eadē assumat, quieto q̄ maxime corpore, et molliter cubet. et hæc
 quidē ab initio faciat usq̄ ad decē dies. Si uero pectore suppuratus fiat, eadē
 quæ etiā prius faciat. Si uero sanus fiat, ab his cibis ac potibus abstinere opor-
 tet, ab acidis, & acribus, & falsis, & pinguibus. A labore itē ac iisdem à quibus
 prior, abstineat. Hæc si fecerit, celerrime à morbo liberabitur. Si uero quid ho-
 rum nō fecerit, rursus reuerso morbo periclitabitur, et morbus peior erit. Nam
 multi rupto pulmone uitā degunt, donec moriātur. Hunc si nō statim quis cu-
 ret, recidiuātē morbo postea nō habueris quo prodesse possis, nisi hæc feceris.
 Lacte bubulo crassefactum, in pectore et dorso urito. Si enim ustio successerit,
 proderis. Morbus aut hic ex iisdē delictis fit, ex quibus etiā prior. Pneumo-
 nis siue pulmonia, ab his maxime fit. Quū pulmo sanguinē in seipsum traxerit,
 aut pituitā falsam, et non rursus dimiserit, sed in ipso coacta ac cōpacta fuerint:
 ab his tubercula fieri solent in pulmone et suppurari. Hic autem hæc patitur.
 Ab initio et per totum morbum tussis acuta sicca obtinet. Et rigor, et febris, et
 dolor in pectoribus et in dorso incūbit. Aliquādo etiam in latere. et erecta cer-
 uice spiratio uehemēs incidit, hic usq̄ ad quatuordecim dies talia patitur. Sepe
 uero etiā plures. Deinde erumpit pus, et multū expuit. Sæpe uero etiam uelut
 araneorū tunicas expuit. Sæpe etiā subcruentum. Et si quidē depurgatus fuerit
 et breui gracilis factus pulmo, interitū effugit. Si uero nō adhæret, et per annū
 morbus tenet, et transmutatur, ut aliās alia æger patiatur, huic in principio an-
 tequā pus erumpat, hæc adhibere oportet. Quū febris remiserit, multa calida la-
 uetur, et sorbitionibus multis utatur. Pisanæ succū coctum, melle ad coctū af-
 fuso, sorbeat. Et uinum bibat dulce album, aut aquā mulsam coctam. Quū uero
 pus expuere inceperit, eadē bibat, quæ prior suppuratus, & cibis ac potibus, &
 obsonijs iisdē utatur, abstinens ab acidis, & acribus, et falsis, ac pinguib. Et à ue-
 nere ac ebrietatibus, nisi morbo cōmodum fuerit. Ex coloris aut inspectiōe esti-
 mandū est, qualibus opus habere uideatur. Reliqua uero eadē faciat. Bibat etiā
 lac bubulū, ac caprinū pro tēpore. prius aut subpurgetur lacte asinino cocto. Bi-
 bat etiam equinū lac excolatum quotidie mane, poculi tres heminas cōtinentis
 mēsurā, si facere poterit. Si quidē igitur sic curatus melius habebit, satis est. et si
 nō eruperit pus in pectus, ipse seipsum curet, quietē q̄ maxime corpori exhi-
 bēs, et quæ cōmoda sunt sibi ipsi exhibēs. Si uero erūpat pus in pectus, qua par-
 te tibi significationē de se præbere uidebitur, illic maxime sectione aut ustione
 facta, pus emittito modicū primum. Reliqua uero eadē facito, quæ & in priore
 suppurato facto descripta sunt. Si in pulmone uarix fiat, tussis sicca corripit, et
 rigor, et febris in principio quidē morbi ualde uehemēter, habet etiā erecta cer-
 uice spiratio. et dolor in capite cōsistit. Et supercilia impēdere uidētur. et tumor
 in faciē descendit, & in pectus, et in pedes. Sæpe uero etiam in capite innititur.
 & præ dolore ubi is uexat, respicere nō potest. & corpus subpallidū est, & ue-
 næ per ipsum tendunt flammeæ, aut nigræ. Huic quū sic habuerit, & dolor ma-
 xime

xime premit, primū sanguis detrahatur. Deinde multa calida lauato. Et ubi sitis habuerit, Cyceonem in uino nigro austero q̄ iucundissimo, æquali mēsurā aquæ mixtū, bibendum dato. Frigidum aut maxime bibere oportet. Sorbitionibus autem utatur ptisanæ succo cocto, melle bono affuso. Hæc exhibere oportet in primis quatuordecim diebus. Si uero diutius morbus teneat, & dolor amplior fuerit in corpore, & impotentia aderit, huic sic habenti eadem exhibeto, quæ ei qui pulmonē suppuratū habet, ubi quatuordecim diēs præterierint. Hic morbus fit à labore, et atra bile. Quū uenæ cauæ per pulmonem tendentes, sanguine aut atra bile impletæ fuerint, uenulæ aliæ in alias rumpuntur, ut quæ in angustijs sunt cōclusæ, & exitum non habeant: & dolorem exhibent ac flatū in pulmone. Hic morbus difficilis est, & multa curatione opus habet. Alioqui ægrum non relinquit, & plerūq̄ in multis simul cōmoritur. Si inflammatio in pulmone fiat, fit autem maxime à uinolentia, & gulositate, pisciū capitonum, & anguillarū. Hi enim pinguedinē habent naturæ hominis infestissimam. Iam uero etiam factus est morbus à pituita, ubi sanguini mixta in pulmonem influxerit. Accidit etiam ex carnis esu, & ex aquæ mutatione. Hæc igitur æger patitur. Tussit fortiter, & saliuā expuit liquidam ac multā. Sæpe etiā crassam & albam, uelut à raucedine. Et dolor premit acutus in pectora, & dorsum, & laterū mollitudinem ac latera. Et acidū eructat. Et ex pectoribus ac pulmonibus, uelut uēter murmurat. Et uomit pituitam acidam. & si id quod uomuit in terram effundas, radit terram uelut aceto infuso. & dentes stupescunt. & rigor ac febris, & sitis fortis detinet, et si quid pingue uoluerit edere, exugitur ad uiscera, et uomitum inducit. Et totum corpus torpor occupat. Quum uero reuouerit, paulo leuior sibi esse uidetur. postea ubi uespera diei accessit, uenter sonitum edit, & tormine uersatur, ac murmurat. Huic quū sic habuerit, & tempestiuū esse uisum fuerit, curationē sic adhibeto. Mel & lac, & acetum, & aquā, mixta in ollam infusa tepefacito, & origani capitati ramulis agitato, ubi uero tepida facta fuerint, bibēda dato, aut apprehēsa lingua, sensim per fistulam infundito. Deinde conuolutum quietem habere iubeto. Postea si uomitus succedat, prompte uomat. Si uero nō succedat, irritatione per pennam facta uomat. & si quid pituitæ uomuerit, per dies quinque idem faciat. hinc enim leuior euadet. Bibat autem hæc exercitatus, si fieri poterit, & multa calida lotus: Sin minus, saltem lotus. postquam uero quinque diēs præterierint, mane ieiunus bibat in aqua mulsa, aut uino mulso silphij succū, erui magnitudine: & allium comedat ac raphanidas ieiunus: et meracū uinum insuper absorbeat nigrum, aut album austerum. Bibat etiam inter cibū, & post cibū. Cibus uero siccis, & carnibus caninis utatur coctis, si rigor & febris nō apprehenderit. hic si à tali infusione per fistulam in os, purgetur, satis est. Sin minus, sursum per ueratrum ipsum purgato. Post purgationem uero farinæ coctæ duas heminas absorbendas dato, melle affuso. Vinum uero idem bibat aquosum. At si non in principio affueris morbo, lacte ipsum crassifacitum in pectore ac dorso urito, ita enim maxime à morbo liberari poterit. Si uero non fuerit ustus permanet, et non ualde deficit, sed ad senectam usq̄ adhæret. Sæpe etiam cōmoritur, si non in primis quadraginta diebus mortuus fuerit. Quare multa quàm maxime opus est cura. Et seruū ac lac pro tempore bibat, bubulum & caprinū, & asininū ac equinum. Sic enim facillime

facillime deget. Est autē morbus difficilis. Si pulmo ab erysipelate intumue-
 rit, Hic autem tumor maxime à sanguine fit, quum pulmo in seipsum sangui-
 nem attraxerit, & susceptum tenuerit. Morbus autē hic æstatis tempore maxi-
 me fit: Hæc igitur ab ipso æger patitur. Tussis incidit sicca, & rigor, & febris,
 & erecta ceruice spiratio, & dolor fortis in pectoribus. & nares aperit, uelut
 quus à cursu. Et linguam exerit, uelut canis æstate ab ardoris flatu uistus. Et tu-
 mor detinet pectora. & parum loquitur. & rubor est in facie. & pruritū fert in
 corpore. & præ dolore decumbere non potest. Sed ipse seipsum anxius iactat.
 Hic in septem diebus moritur. Verū tamen in principio quum sic habuerit, per
 hæc curetur. Corpus quidē perfrigeretur, betis in aqua frigida tinctis, ac corpo-
 ri impositis, in recenti maxime dolore. Aut lintea frigida aqua tincta ac expres-
 sa apponito. Et si quidem sic melius habuerit, satis est: Sin minus, terram figula-
 rein frigidam pro cataplasmate imposito. et sub dio decumbat. Sic enim tracta-
 tus sæpe septē dies effugerit. Quū autem septem dies præterierint, & dolor ad-
 hæserit, dolentē partem intus, cū oleo illinito, & tepesfactoria eadē quæ in pleu-
 ritide adhibeto: & potionem ad subpurgationē ipsi dato, ex peplio, & meconi-
 de, siue peplo, & grano cnidio. Et post purgationē, lenticulæ heminā absorbē-
 dam dato. Bibat autē aquam. Postera die multa calida aqua ipsum lauato, capite
 excepto. Postea origanū in aqua mulsā macerato, & bibēdam dato. Potibusq;
 q̄ calidissimis utatur. Cibos autē accipiat eosdem quos & qui à pleuritide corre-
 ptus est, si nō febris adhæserit. Hic morbus grauis est, & pauci effugiunt. Si
 pectus & dorsum dirupta fuerint: Dirumpuntur autem maxime à labore: æger
 hæc patitur. Tussis obtinet acuta, & saliuam expuit aliquādo subcruentā, & ri-
 gor & febris plerūq; corripit. & in pectore, & in dorso, dolor inest acutus. & in
 latere uelut lapis incumbere uidetur, & à dolore perpetuo pungi, uelut si quis
 acu stimulet. Huic quū sic habuerit, statim lacte in potu dato, pectus & dorsum
 inurito. Et sic celerrime sanus erit. De cætero uero quietā in maxime corpori ui-
 tam degat. Si quid enim laborarit, & aut currum, aut equum ascenderit, aut hu-
 meros oneri subdiderit, periclitabitur ne rursus morbus recidiuam faciat. Et si
 hoc cōtingat, periculū est ut corrūpatur. Morbus enim reuersus magis premit
 q̄ ab initio. Si uero nō fuerit uistus, iisdem ipsum curato quibus & suppuratū,
 sorbitionibus, & potibus, & cibis. In summa uero, quietem agat, & cōmodis ci-
 bis alatur. Si enim sic tractatus fuerit, celerrime sanus erit. Morbus autē grauis
 est. Si in latere tuberculū nascatur, & suppuratus fiat, hæc patitur. Rigor te-
 net & febris, & tussis sicca per multos dies. Et dolet latus. & ad māmam, & ad
 clauiculam, & ad scapulas, dolor impetū facit. Hic quum sic habuerit, in primis
 decē diebus sorbitionibus utatur, ptisanæ succo cōcto melle affuso, quū sorbie-
 tio cōcta fuerit. Vino autē utatur albo, dulci, aut austero, & aquoso. Et ut uinum
 sæpe sorbeat, ac expuat iubeto. Et à somno impedito, donec undecim dies præ-
 terierint. Post hos dies cibis paucissimis utatur, carnibus catulinis aut galli cali-
 dis. Oportet autē ipsas probe cū iusculo præparare, & iusculū absorbēat. Et sor-
 bitionibus prius q̄ cibo utatur. & ne sitiat, donec latus suppuratū fiat. Suppu-
 ratur autē maxime in quadraginta diebus, aut paulo prius. Hoc autē cognosces,
 ubi suppuratū fiat latus. Pus enim nō expuit, neq; reuomit. Hūc quū sic habue-
 rit, ubicūq; tumor significationē de se præbuerit, secato aut urito. Et postea pus
 paulatim

paulatim emittito. Et postquam exhauferis, linamētum crudi lini immittito & hoc post die rursus exempto, paulatim pus exhaurito. Deinde rursus linamētum indito, & rursus tertia die, & alijs deinceps, bis per diem exhaurito, donec reficcatum fuerit. Dato autē & cibos & obsonia, si admiserit. Et bibat modicum non multū, siue uinum, siue aquam. Edat etiam origanū tenellam plurimā melē tinctam. Si uero tenellam nō habeat, siccam tritam & melli ammixtam plurimā exhibeto. Et neq; frigeat, & balneis lauet, & molliter cubet. Et sic hunc morbum curans, celerrime sanum feceris. Quum autē sanus euaserit, uitet frigus, calorem, solem. Et deambulationibus modicis utatur post cibum; ut ne lassitudo corpus corripiat. Hæc faciēs sanus erit. Ex his morbis quoscunq; uisseris, statim post uersionem, porrū multum tritum super uistas imponito, & per diem unam finito. Tres sunt tabis species. Prima quidem fit à pituita. Quum enim caput pituita impletū ægrotarit, & calor accesserit, pituita in capite cōputrescit; ut quæ moueri non potest ut decedat. Postea quū crassifactæ fuerint & putrefactæ ac superexpletæ uenulæ, fluxio in pulmonē fit. Et pulmo ubi susceperit, statim ægrotat, ut qui à pituita mordetur quæ salsa est ac putrida. Hæc igitur æger patitur. febris debilis inuadere incipit, & rigor, & dolet pectora ac dorsum. Aliquando etiam tussis premit acuta. & expuit saliuam, multam & liuidam ac salfam. Et hæc quidē in principio morbi patitur. In progressu uero corpus attenuatur, cruribus exceptis, hæc enim intumescunt. & pedes et ungues contrahuntur. ex humeris autē tenuis & debilis est, et fauces uelut lanugine implentur, & uelut per arundinē sibilat; & fortiter sitit per totū morbum; & multa impotētia corpus habet. Hic quū sic habuerit, in anno corruptus malē perit. Verum studium q̄ maxime adhibere oportet, ac reficere. Et primū quidē uerum bibendū dare, infra autē subpurgare epithymo, aut peplio, aut grano cniādio, aut tithimalide. Hæc quater in anno dare oportet, sursum bis, deorsum bis. Dandū est & lac asininum coctum ad subpurgationē, aut bubulū, aut caprinū. Bibat etiā crudum lac bubulū, tertia aquæ mulsæ parte ammixta, per quinq; & quadraginta dies, ammixto etiā origano. Caput autem ipsius prius purgetur, pharmaco ad nares appposito. Cibaria autē & obsonia dentur, neq; pingua, neq; nidorosa, neq; ualde acra. Hæc autē morbū obseruando facere oportet, & deambulationibus ad cibos uti, obseruādo ne frigeat. Hyeme uero iuxta ignem habitationem faciat. Vinum autē bibat austerum, nigrum, q̄ uetustissimū ac iucundissimū, uerum modicum. Et si tibi uisum fuerit, antē pharmacū fomentum adhibeto, & sic pharmacū dato. Si uero dare nolueris, facto fomēto, uomitum ex cibis facere cogito, uelut prius scriptum est. Huic si cōmodæ fuerint, deambulationibus utatur. Si uero non cōducant, corpore quā maxime quiescat. Hic hoc modo tractatus, facillime in morbo deget. Est autem morbus lethalis, & pauci hunc effugiunt. Secunda tabes fit à labore. Eadem autem æger patitur quæ & prior. Morbus autem hic magis priore quiescit, & æstate remittit, Saliuam uero exspuit crassiore priorē, & tussis premit maxime senes, & dolor fortior est in pectoribus, & uelut lapis incumbere ipsis uidetur. Dolet etiam dorsum. Et color ipsius limpidus existit. & si quid laborarit, flatu & anhelatio oboritur. Hic ex hoc morbo in tribus annis maxime moritur. Cura re autem oportet n̄sdem, quibus etiam priorem. Hic morbus multis adhæret

usq; ad tres annos, sed moriuntur. Estq; morbus grauis. Tertia tabes. Ab hac hæc patitur. Medulla ipsius spinalis sanguine plena fit. Tabescit autem similiter & a cauis uenis. Hæc uero pituita hydropiformi, & bile replentur. Patitur autem eadem, ab utris tandem tabescat. Et homo statim niger fit ac subtus midus. Et partes sub oculis pallidæ fiunt. Et uenæ in corpore pallidæ distentæ sunt, quædam uero ualde rubicundæ. Maxime autem manifestæ sunt, quæ sunt sub alis. Et sputa pallida, quæ ubi ipsum inuaserint, suffocant; & tussire uolens aliquando non potest. Quandoq; autem præ suffocatione & tussiendo cupiditate, bilem aceruatum uomit, aliquando uero pituitam. Sæpe uero etiam cibos, quum comederit. Et ubi reuomit, leuior sibi esse uidetur. Deinde modico tempore interpolito, in ipsdē doloribus iacet. Hic etiam acutius loquitur q̃ quā sanus esset. Et rigor ac febris interquiescens, rursus sudorosa corripit. Hūc ubi sic habuerit, cibus & sorbitionibus, & potibus ac pharmacis, & reliquis omnibus curato, uelut priores. Morbus autem durat maxime annos nouem. Postea durat dum corrumpitur. pauci uero ex ipso effugiūt. Grauis enim est morbus. Si uero uoles, sic ipsum curato. Primum fomentum adhibeto, & ubi fomentum adhibueris, postridie aquæ mulsæ dimidium congiū ipsi bibendum dato, modico aceto affuso. & hæc citra respirationem bibere iubeto. Deinde stragulis ipsum ad multum ac q̃ longissimū tempus contegito. Si uero non sustineat, & euomere uelit, uomat. Si uero uomitus non sequatur, tempore iam aliquo interpolito, aquæ tepidæ poculo magno superingesto uomat, irritatione per pennam facta. Quū uero euomuerit, ut bene habeat, quietem agat per hūc diem. Vbi autem coenæ tempus fuerit, coenet mazam modicam, & obsonium habeat, salsamentum & porrum. Hæc autem q̃ plurima edat. Vinū uero bibat dulce. Reliquo tempore per totam diem, exordio mane factō, multa calida lauetur. & post balneum cauere oportet, ut ne frigescat, sed decubens plurimo tempore dormiat. Quum autem a somno surrexerit, uiginti stadia minimum circumbeat illa die. In alijs autem diebus alia quinq; stadia prioribus addens uadat, singulis diebus additione facta, donec ad centum stadia perueniat. Ventrem uero quotidie subpurgare oportet, succis betæ, & a brasiica, ita ut utranq; seorsim coquas, & de utraq; congiū excoles. Deinde adipis a rhenibus detracti minæ quadrantem ammisceas ac simul coquas, in utrisq; succis diuisim facta coactura. Quum autem bibere uoluerit, ad brasiicæ quidem succum, salem adijceto. Ad betæ uero succum, mel affundito. Licet autem seorsim utranq; bibere; Aut melle in alterum poculum affuso bibat, in alterum uero immisso sale. Ebibere autem oportet totum succum, & hæc facere per triginta dies. Secundo uero mense edat panem, & carnes pingues suillas coctas, aliud uero nihil. Vinum autem bibat album, austerum, & iter faciat, non minus stadiorum triginta ante coenam. Post coenam uero decem. & ne frigeat, sed contegatur. Hæc si fecerit, leuius morbum feret. Tercio autem mense cyceonem floridum bibat, aprij radices, & anethum, & rutam, & mentam, & coriandrum, & papauer tenerum, & ocimum, & lentem, & mali punici dulcis & uinosi succum. Oportet autem dulcis duplam mensuram esse, ita ut utriusq; succi simul sit hemina dimidium, & uini nigri iucundi austeri hemina dimidium, & aquæ hemina dimidiū. Postea flores triti in hoc diluantur permixto, & in poculum infundantur. Et postea

farinæ erui acetabulum adijciatur, & polentæ tantundem, & casei ueteris capri niasi tantundem, & hæc permixta ebibat. Deinde modico tempore interposito prædeat panem, & obsoniū habeat, frustum torpedinis, aut squatinæ, aut galei, aut raiaæ. Et carnes suillas edat coctas, & crassefaciat seipsum, quietem quæ maxime agens. Et decimo quoque die fomentū sibi ipsi leuiter adhibeat. Quarto autem mense, quinto quoque die leuiter fomento utatur. Et edat obsoniū plurimū. Sint autem obsonia, caseus, & carnes ouillæ coctæ paucae. Et iter faciat per stadia, uelut antea dictū est. Et prima quarti mensis die, initio à decem stadiis facto eat, & quotidie addat, donec octoaginta stadia fiant. Et deambulet in die stadia octoaginta. Antè coenam, triginta. Post coenam, uiginti. Mane, triginta. 300

Reliquo uero tempore uictu utatur, mazam & panem utraq; edens. Et obsonium habeat, chartilaginea. Sed & carnes omnes edat, exceptis bubulis ac porcinis. A piscibus autem his abstineat, à mugile, anguilla, & melanuro. Edat autem torpedinem, squatinam, raia, galeum, pastinacam, & ranas: Ex alijs nihil. Si uero uideatur innoxius esse, etiam cyceonem bibat. Postquam autem dormire uoluerit, bibat de uino nigro, iucundo, ueteri, poculum duarum heminarum. Et per diem eodem uino utatur inter cibum. Et in die iter faciat per stadia centum quinquaginta: Antè coenam, nonaginta. Post coenam, uiginti. Mane, quadraginta. Hic hoc modo curatus, in anno sanus euadit. Resiccatur medulla spinalis maxime, quum uenulae ad medullam tendentes fuerint obturatae, itemque ex cerebro accessus. Propter corporis autem afflictionē hæc patitur, & agrotat. Resiccatur etiam à uenere. Hæc igitur patitur. Dolor acutus incidit ipsi in caput, & in collum, & in lumbos, & in lumborum musculos, & in articulos crurum, ut aliquando flectere non possit. Et sterces non secedit, sed sistitur. Et urinæ difficultate uexatur. Hic in principio quidem morbi quietius degit. Quanto autem magis tempus morbo prolongatur, tanto magis omnia dolet. Et crura uelut ab aqua inter cutem tumient. Et ulcera à lumbis emergunt, & alia quidem sanescunt, alia uero nascuntur. Huic quum sic habuerit, caput purgato, hippophais succo, aut cnidio grano, corpore prius ualde bene foto. Vesperi uero post purgationem, ptisanæ duas heminas sorbeat, melle affuso. Visum autem bibat album molle. Postera die asinini lactis cocti, melle affuso, octo heminas ebibendas ipsi dato. Si uero asininum non habeas, bubuli aut caprini cocti tres semicōgios, melle affuso. Et dum temporis opportunitas adest, lac bibat, sero & lacte utens, per quinque ac quadraginta dies. Cibus autem & obsonijs: utatur quæ maxime per aluum secedētibus. Vinum bibat album, molle, Mendesium. Quum autem crassissimus fuerit, in lumbos ipsius ab utraque uerticuli parte crustas quatuor inurito, & in dorsum utrinque quindecim. & in ceruicem duas, inter tendines. Si enim ustio successerit, sanum facies. Est autem morbus hic grauis. Quatuor morbi à rhenibus fiunt, A primo hæc patitur. Dolor acutus incidit in rhenem, & in lumbos, & in testem secundum rhenem situm. Et frequenter mingit, & adstringit paulatim ac supprimitur urina, & cum urina pro cedit arena. Et ubi per urinæ meatum exit arena, dolorem fortem in meatu exhibet. Quum autem ipsam per urinā eiecerit, dolor remittit. Postea uero rursus in iisdem doloribus iacet. Quum autem mingit, etiam colēm præ dolore fricat. Vagus autem medicorum quod non intelligit morbum, ubi uidet arenam, putat ues-

ficam è calculo laborare. At non uestica, sed rhen lapide laborat. Hic morbus fit à pituita, quum rhen susceptam in seipsum pituitā, non rursus dimiserit, sed in ipso in totum concalluerit, & fiunt ex ea tenues lapilli, uelut arena. Huic quū sic habuerit, cum scamoniæ succo aut ipsa radice, fomēto prius adhibito, totū corpus purgato. postera uero die duobus cōgijs succi ciceris albi subpurgato, quē sale iniectione bibēdum dabis. Post hæc potibus, & cibis, & balneis curato. & eadem quæ in urinæ stillicidio exhibentur pharmaca dato. Quum autem dolor presserit, multa calida lauato, et tepefactoria qua parte maxime dolet adhibeto. Quum autem intumuerit & eleuatus fuerit, sub id tempus iuxta rhenem secato, & extracto pure, arenam per urinam cientiā sanato. Si enim sectus fuerit, fugæ spes est. Sin minus, morbus homini cōmoritur. Secundus rhenum morbus. Dolores fortiter premūt, uelut in priore. fit autem morbus à labore, quū ruptæ fuerint uenulæ ad rhenem tendentes, & postea rhen sanguine repletus fuerit. Hic ubi hæc patitur, cum urina sanguinem mingit in principio morbi, deinde progressu temporis pus. hic si quietem corpore habuerit, celerrime sanus erit. Si enim quid laborarit dolores, multo magis obtinebunt. Quū itaq; suppuratus fuerit rhen, circa spinam intumescit. Hunc ubi sic habuerit, circa tumētem partem secato, profunda maxime sectione iuxta rhenem. Et si quidem successerit sectio, euestigio sanū facies. Si uerò aberraueris, periculum est ne ulcus linamentis curandū fiat. Si autē concreuerit ulcus, uenter intrinsecus à rhe ne suppuratur. & si quidem pus intus rumpatur, & ad intestinū rectum procedat, fugæ spes est. Si uero cōtigerit alterum rhenem, periculū est ne pereat. Curatur autem pharmacis, & iisdem omnibus, quibus & prior. & diætā eādem habeat. Hic morbus grauis est, & multi ex ipso ad tabem rhenalem deuenerūt.

Tertius rhenum morbus. Urina prodit, uelut à carnibus bubulis assatis succus. fit autem morbus ab atra bile, quū bilis in uenas cōfluxerit quæ ad rhenem tendunt, & quum constiterit, exulcerat uenulas & rhenem. Ab ulceratione igitur tale quiddam cum urina procedit. Dolores autem hærent in lumbis, & in uestica, & inter anum ac pudēdum, & in ipso rhene, ad modicum tempus. Deinde remittit dolor, & rursus acutus breuī corripit. & in tenuem uētris partem aliquando dolor incidit. huic quū sic habuerit, uentrē subpurgato, epithymo, aut scāmoniæ radice. Bibenda uero eadem dato, quæ & ex urinæ stillicidio laborāti. & quum dolor habuerit, multa calida lauato. & tepefactoria ad dolentem maxime locum adhibeto. & sorbitione utatur farina cocta, melle affuso. & reliquo uictu utatur q̄ maxime per aluū secedente. & uinū bibat albū Mendacium mellei coloris. Aut aliud album iucundissimū probe temperatū. Hic morbus nō ualde deficit. & pro temporis opportunitate serum & lac bibat. Serum quidem ad purgationē. Lactis aut potum faciat in tempore per quinq; ac quadraginta dies. Hæc si ita feceris, morbum in melius dispones. Quartus rhenum morbus. Morbus hic fit à bile & pituita, maxime tempore æstatis. fit etiam à uenere morbus. Hic æger hæc patitur. Dolores premunt ipsum in lateris mollitudinem, & in lumbos, & in lumborum musculos: & patitur qualia folet mulier ex partu laborans, & nō sustinet in sanam partem decubere, sed ualde dolet. & ex lateris mollitudine quædam pendere uidentur, uelut abrupta. Si uero pronus decubat, nō dolet. pedes & tibiæ ipsius semper frigent. Urina uer

ro uix prodiit, præ pituitositate & crassitudine sua, & si fueris ipsam ad modicum
 cum tempus deposita donec defecerit, uidebis subsidentiâ crassam, uelut farinâ.
 & siquid bilis præualuerit, subfuluâ ipsam uidebis. Si uero à pituita fuerit mor- 390
 bus, alba & crassa erit, et primū quidem in annū, aut paulo amplius aut breuius
 tempus, æger talia patiēs perseuerat. Si uero prolōgetur morbus, & magis do-
 let, & suppuratur. & quū suppuratus factus intumuerit, quā maxime parte in-
 tumuerit, in rhenē secato, & pus emittito, & si quidē successerit sectio, statim sa-
 nūm facies. Hunc quū sic habuerit, iisdē omnibus curato, quibus etiā priores.
 Et à principio morbi oportet & purgare, & ante subpurgationē fomentū adhi-
 bere, & balneis frequēter lauare. Vnguatur item & magis calefiat, neq; frigeat. 395
 & à sole abstineat. & neq; uenere utatur. Hæc si fecerit, & non celerrime sanus
 euaserit, nihil noui est. Morbus enim est grauissimus. Si uero citra pharmaca
 curari uelit, crassum ex diætâ facere oportet, siue ex hoc morbo ægrotet, siue ex
 aliquo de prioribus, diuisis cibis quos edere solet in decē portiones, ita ut una
 parte detracta, reliquas comedat. Obsoniū autē habeat, carnē suis tritam. & ea 400
 die decē stadia deambulet. postera uero die & tertia usq; ad decē dies, portionē
 minū edat, & deambulet decē stadia aut plura singulis diebus addens. Quum
 autē ad ultimam cibi portionē deuenierit, etiam ad centum stadia iter faciat. &
 edat quidem unam tantū portionem, & ea die centū stadia deambulet. Post coe-
 nam aut uiginti, mane uero quadraginta. Vinū autē bibat Mendæū album, 405
 austerum, atq; hæc per tres mēses faciat. postea reliquo tempore deambulationes
 imminuat, & cibos plures comedat, eodem modo additione facta uelut detra-
 hebat. Deambulationē uero detrahat usq; ad decimū diem. & postea q̄ maxi-
 me quietē habeat. & cibis puris alatur, & obsonia q̄ pinguisima habeat, et dul-
 cia omnia ipsi cōmoda sunt. Ab oleribus aut, & acidis omnibus abstineat, itēq; 410
 ab acribus, & quæ flatū faciunt. Multa etiā calida lauet, & ne frigeat. Hæc si fece-
 rit, celerrime sanus erit. A rhenum morbo corripit morbus magnus uenarū
 cauarū, quæ à capite iuxta iugulū per spinam tendunt, ad malleolū pedis exter-
 num, & ad intermediū magni digiti locum. Morbus hic fit à pituita & bile, quū
 in uenas cōfluxerint. Venæ aut hæ sanguine plene sunt. Si igitur quid alieni in 415
 ipsis præterlapsus fuerit, ægrotât. Si dextram partē morbus corripit, dolorē
 ex coxæ acetabulo in principio exhibere incipit. Quanto aut amplius tempus
 progressum & prolongatū fuerit, tanto acutior dolor infra descēdit, & quū ad
 malleolū pedis externum, & ad magni digiti inter mediū locum deuenierit, rur-
 sus ad caput uenire incipit. & ubi in ipso ulcus cōstiterit, fortiter premit, & ho- 420
 mo caput sibi diffringi putat. & oculi pituita replentur, itēq; totū corpus. huic
 quum sic habuerit, elateriū bibendū dato, aut thapsiæ radicem, aut ueratri, aut
 succū scammonia. post purgationē uero eadem exhibeto quæ superioribus. Si
 uero ab hac curatione nō desinat, lacte ipsum crassefacito, et in scapulam dextrā
 quatuor crustas inurito. & in acetabulū coxæ dextræ, tres. & sub nates, duas. 425
 & in medio femore, duas: & supra genu, unā; & supra malleolū, unam. Hic ubi
 sic ustus fuerit, neq; sursum, neq; deorsum morbū procedere permittit. Si uero
 alicubi dolor ruptus uisus fuerit, si quidē in crus incubuerit priusquam uratur,
 claudus erit. Si uero in caput, surdus aut cæcus. Si uero in uesicam, prodiit simul
 cum urina sanguis maxime, per quadraginta dies. Verum si in uesicam erupēs 430

rit, eadem pharmaca quæ & in urinæ stillicidio dato, & si alicubi dolor cōgregatus fuerit, urito. Vt re autē oportet carnosā quidē, ferro: ossēā uero & neruosa, fungis. Cæterū ante hæc, si in principio morbi accesseris, ista facere oportet. In potu exhibendū est uinum album Mendacum, aquosius, plurimū per diem, & inebrietur donec sanguis à naribus erumpat. Quū autem fluere inceperit, mirum tres & decem dies fluit. Vbi uero hī dies præterierint, nō amplius inebrietur, neq; ubi semel fluere inceperit, Bibat tamen paulo amplius uinum inter cibum, quo sanguis fluere possit. Iam uero quibusdā sedato sanguine, erupit in uescam, & prodijt sanguis ac pus. Si igitur eruperit, eadē pharmaca quæ & ex urinæ stillicidio laboranti dato. Et de eodē uino plus bibendū exhibeto. Hic si ita curetur, & cibos per aluū secedentes assumat, & obsonia eiisdē facultatis, citissime sanus erit. Morbus autē grauis est. Alius morbus à sinistra uena.

Hic ager alia quidem eadem patitur, quæ etiā prior. Verum in splenem dolor acutus incūbit statim, & in principio morbi. Et si nō intellexerit priusquam incubuerit, proflit in pulmonem. Huic per fungos crustas octo inurito, capita lienis q; celerrime intercipiens. Et ubicunq; alius dolor incubuerit urito. Sic enim statim sanus erit. Si uero nō fuerit uisus, sanus autē sponte fiat, plerisq; post duodecim annos, morbus rursus reuertitur, & si splenē occuparit, multis aquā inter cutem inducit. Verū oportet statim curare uelut priorē, & si uisum fuerit urere uelut priorē, si dolor in iisdem articulis constiterit. Si uero nō sic curatus fuerit, de cætero colliquefcens moritur. Morbus enim grauis est. De pituita easdem sentētiās habeo, quas & de bile. & species ipsius multas esse puto. & ælia quidē popularis est, quæ sanē recentissima est. Cuius etiam curatio facilissima est. Vomitus enim post cibū facere oportet per duos aut tres dies, ita ut & prædeat in super ac quiescat, si prioribus diebus semel in die cibū capere, & laborare solitus fuit. Sin minus, huiusmodi diæta utatur. Primū multa calida lauetur, quum uomitū facere uoluerit. & edat mazam oleo & melle subactā, & panem exassatū ueterem. Hæc enim magis pituitā trahunt. Obsonijs autē utatur & oleis acribus. Sed & pinguiā, & dulciā, & acidiā omnia idonea sunt, ut permixta assumātur. Et oleribus omnibus uiridibus utatur. Et bibat inter cibum frequenter modicū uinū dulce, & in fine placentiā in super edat, & mel, & ficus. Et quū cœnabit, pocula large exhauriat. & ubi iam repletus fuerit, parū dormiat. Deinde expectectus uomat, magno uini poculo epoto, cū tepida aqua temperato. Trahit enim magis pituitā & humorē ex carnibus, & corpus magis refectat. Euomat autē donec ficus euomuerit. Hæc enim postremum euomūtur. Atq; hæc quidē hac die faciat, postera uero cōtineat seipsum usq; ad cœnā, & in cœna sumat panē, cui nihil fursurū decēssit. Obsoniū autē sit ex fortioribus. Vinū uero bibat nigrū, austerum. Atq; hæc quidē popularis pituitæ medela est. Si uero edere & bibere potest, & cibus delectatur, deinde uero crura grauentur, & color immutatus fuerit, huic ostendendū est, pituitā molestantē in uentre esse. Verum oportet quū sic habuerit, mel & uinum dulce, & oleū, & nitrum tali ouilli magnitudine, permixta per clysterē infundere. hæc enim mitissima sunt in clysterem ad hominis naturā. Mensuram autē singulorū esse oportet, uini quidem heminam, olei uero heminæ dimidiū, & mellis tantundē. Si uero clysterem nō uoluerit, humectū hominem facere oportet, fomētō humido adinoto. Fortassis enim

enim etiā sic sterco subeuacuari poterit. Nam à ciborum nimia reficcatione hæc patitur. Siquidē igitur quis edat cibos ualde succosos, fortassis hæc nō ita uehementer patiatur. Si uero etiā aliquando patiatur, modica curatione opus habuerit. Hunc ita curans, celerrime sanum feceris. At si antiquior fuerit pituita, appellatur autem hæc pituita alba, hæc patitur. Grauat hominē magis, & speciem à populari alienā habere uidetur pallidiorem. & totum corpus laxo tumore intumescit, & facies rubet, & os siccum est, & sitis tenet; & quum comederit, spiritus densus ipsi incidit. Hic eadem diē aliquādo melius habet, aliquando derepente dolet, & sibi mori uidetur. Huic si quidem uenter sua sponte turbatus fuerit, sanitati proximus erit. Si uero non sua sponte uēter turbetur, purgare oportet cneoro dato, aut hippophae, aut cnidio grano, aut lapide Magne siæ. Et post purgationē, lenticulæ hemina una aut duæ dentur ad absorbendū. Coquatur autē allium in lenticula. Detur etiā betæ pinguis hemina nō condita, polenta circūinpersa. Bibat uinum nigrū, austerū, & forte. Postera uero diē mane stadia uiginti deambulet. A qua deambulatione reuersus, panē edat paruū exassatum, & obsonium habeat allium coctū. & de eodē uino paulo meracius bibat. deinde stadia uadat triginta. & ubi tempus aderit cœnet, quātum etiā prandere consueuit; obsonium autem habeat, maxime quidem pedes, & capita suilla. Sin minus, galli carnibus & suis tritis utatur. Ex piscibus autē scorpio, aut dracone, aut cuculo, aut callionymo, aut gobio, aut alijs piscibus quales qualem facultatem habent. Ex oleribus autē solo allio, & nullo alio utatur. Hoc uero quā plurimū edat, & crudum, & assatum, & coctum, semper plus singulis diebus. & laboret ex modico amplius, respectu ad cibos facto. hic morbus maxime fit tempore æstatis ex aquæ potu. Insuper & à somno multo. Iudicatur autem in triginta diebus, an lethalis sit, aut non. Atq; hæc quidem faciat ubi triginta dies præterierint. In primis autē diebus, sorbitionibus utatur, lenticula cocta acidiorē ab aceto, & ptisana acida. Bibat aquā mulsam tepidam, polenta modica inpersa, quo corpus præparatum sit ad pharmacorū potum. Et his diebus sub diō dormiat. & si tibi uisum fuerit sanguinem à lumbis detrahere, cucurbitā affigito, & uenas in scroto crassissimas secato. hic ita curatus, citissime sanus fiet. A pituita maxime in aquam inter cutem transitus fit, hoc modo, pinguedo colliquescit, & à calore qui in pituita est fit aqua. Cognosces autem hoc an quis sanari possit, aut non. Donec enim quis in pectine pinguedinem habet, fieri nō potest ut ipsum sanes. Cognosces autem ex his maxime, an pinguedo insit in pectine, aut non. Si quidem febres succedant, & nō potest exurgere, & umbilicus inflatus extra prominet, indicium est non amplius inesse pinguedinem, & sanabilem esse. Huic conducit uentrem siccare, & panem dare cui nihil fursurum decessit, antiquū, calidum. Obsoniū autem carnē lepōrinā, & canis perfecti, & ouiculæ, & suis assatā, & galli assatam ac calidā. & polypos edat coctos in uino nigro austero. Vinū autem bibat nigrum, austerum q̃ crassissimū ac acerbissimum. Piscibus autē utatur, gobio, dracone, callionymo, cuculo, scorpio, & alijs huiusmodi, omnibus coctis, non recentibus, & frigidis. hi enim siccissimi sunt, & in iusculum ne intingat, & insulsi sint pisces. ex oleribus autē utatur raphanis, & apio. Torreat autem lenticulam ab aceto acidiorē, & edat. Et deambulet quotidie, & post cœnā, & mane. & serotino tem

pore dormiat, & mane exurgat. Et si quidem ab his restituitur, satis est: Sin minus, cneorum, aut hippophais succum, aut granum cnidium, bibendum dato. Et post purgationem, lenticulæ heminas duas sorbeat, & panem parvū comedat. Vinum uero bibat nigrum, acerbum modicū. Bibat autē pharmacum bis in die, donec uacuus fiat. Si uero tumor cōstiterit in scroto, & femoribus ac tibijs, acuto scalpello multa & frequentia uulnuscula incutito. Et si hæc feceris, cito sanum efficies. Aqua inter cutem ex his fit. Quū æstatis tempore siti uexatus aquam multam biberis: nam ex hoc maxime fieri solet: & pulmo expletus fuerit, rursus ad pectora dimittit. Et quum in pectoribus fuerit, calorem uehementē exhibet, ut pinguedo quæ in arterijs inest colliquescat. & si semel liquari pinguedo inceperit, multo amplius in breui tempore aquam inter cutem facit. Fit etiam si tubercula in pulmone fuerint enata, & aqua repleta, & in pectora rupta. Quod aut fiat etiam à tuberculis aqua inter cutem, testimoniū habeo, & in boue, & in cane, & in sue. In his enim quadrupedibus maxime fiunt tubercula in pulmone, quæ aquam habēt. Si enim diffecueris, citissime cognoueris. Fluet enim aqua. Videntur autē talia multo magis in homine fieri, quàm in pectoribus, quanto etiam morbosiore diæta utimur. Facti sunt autem & multi pectore suppurati tuberculis obortis. Hæc igitur in principio ad morbum confluuntur. Tussis sicca, & fauces exasperari uidentur. & rigor ac febris succedit, & erecta, ceruice spiratio. & corpus intumescit, & pedes tument, & ungues contrahuntur. & donec quidem in superno uentre fuerit aqua intercus, adest dolor acutus, postq̃ aut ad infernū uentrē uenerit, melius habere sibi uidetur. Postea progressu tēporis patitur qualia prius impleto uentre. Quādoq; etiam ad latus intumescit, & indicat ubi secare oportet. Si uero non indicat, multa calida lauato, & humeris apprehensum concutito, & deinde in utro latere magis fluctuet audito. Quo intellecto costam tertiā ab ultima usq; ad os secato. Deinde cum terebra caua ultra perforato. Et ubi perforata fuerit, aqua parū emittito, & ubi emiseris, linamentum ex crudo lino indito, & spongiam mollem superimponito. Deinde ut ne excidat linamentum deligato. Emittere autem per duodecim dies aquam oportet, semel in die. Post duodecimum autem diem sequenti decima tertia totam aquam emittere. & reliquo tempore si subnascatur aqua emittere. & uentrem cibus resiccare. Post sectionem autem hæc exhibere oportet. Succī silphij drachmæ pondus parato, & aristolochiam tali ceruini magnitudine deradito, & lentium ac erui torrefactorū polentam, dimidiæ choenicis mensura utranq; purgato, atq; hæc melle & aceto subigito. Deinde pastillos sexaginta efformato, & quotidie unum tritum in uini nigri austeri ac iucundissimi hemina dimidiā diluito, & mane in potu dato. Reliquum uero uictum ac laborem eūdem, uelut priori tempore, habere iubeto. Et si intumuerint pudenda ac femora, confidenter uulnusculis impactis pertūdito. Hunc si ita curaueris, celerime sanum facies. Ab hepate fit aqua intercus, quum in hepar pituita accesserit, & hepar ipsam susceperit, & humectū fuerit. Statim igitur calorē huic exhibet, & flatum inducit. Deinde temporis progressu aqua impletur. Postea morsus in corpus incidit. Et tumor in tibijs ac pedibus inest. & hepar durū est ac intumescit, & clauiculæ attenuantur. Huic quum sic habuerit, in principio si hepar doluerit, organū tritum, & silphij succum erui magnitudine, in uini albi

dimi-

dimidia hemina diluta, bibenda dato. & lactis caprini poculum quatuor heminarum, tertia aquæ mulsæ parte ammixta. A cibis autem per primos decem dies abstineat. Hi enim iudicant morbum, an lethalis sit, aut non. Sorbeat autem prisanæ succū coctum, melle affuso. Vinum autē bibat album Mendæū, aut aliud iucundissimum aquosum. Quū autem decem dies præterierint, cibos accipiat puros, & obsonium habeat, galli carnem assatā calidam. Habeat & catulīnam coctam. Pisce uero utatur galeo, & torpedine assatis. Vinū uero idem bibat. & si quidem ab his quiescat, satis est: Sin minus, postq̃ sane crassissimus factus fuerit, & hepar maximum, fungis urito. Sic enim celerrime sanum feceris. Inurare aut oportet crustas octo. Si uero aqua intercus innascatur, & rumatur in uentrem, iisdem medicamentis & potibus, & cibis, ac laboribus, quibus priores curato. Vinū uero bibat austerum nigrum. Si uero tibi uideatur discessisse ab hepate, per ferrum ubicūq; apparuerit urito, & aquā paulatim emitto, & uelut reliquos priores curato. Si uero ab his non sanus fiat, tēporis progressu corrumpitur ac moritur. Morbus enim est grauis, & pauci hunc effugiunt. Aqua uero intercus à splene, hoc modo fit, & ab huiusmodi maxime causa, quum quis ficū uiridium, & malorū fructus multos ederit. Multi uero iam etiam à cibo botrorum multorū, & à multo musto, morbum inciderunt. Si quidem igitur in morbum collabetur, statim in doloribus est. Dolores enim acuti in splene consistunt, transeunt autem & in humerū, & in clauiculā, & in mammam, & ad lumbos, & febres fortes tenent. Et si parum quid ederit, uenter impletur, & splen attollitur, & dolorem exhibet. Hic morbus si durauerit, reliquo quidem tempore minus dolet. Quum uero fructuū malorum tempus fuerit, & hos ederit, magis q̃ prius dolet. Hūc ubi sic habuerit, à principio curato, & sursum quidem ueratū exhibeto. Deorsum uero cneorū, aut hippophais succum aut cnidiū granum, Lactis item asinini heminas octo, melle affuso. et si quidem ab his restituitur, satis est: Sin minus, quū maximus fuerit lien, & maxime intumuerit, fungis urito, capita eius intercipiēs: aut ferramētis, cum multa cautione ac obseruatione ne ultra peruras. hæc à morbi principio facito, & hac diæta nutriatur. Si quidē febris nō affuerit, pane utatur triticeo assato, aut ex duro triticeo bis cocto: obsoniū autē habeat salsamentū Gaditanū, aut saperdā. Et carnem ouillam tritā. Et acida ac salsa omnia edat. Et bibat uinū austerum Cou q̃ nigrimū, A dulcibus abstineat. Quum aut exsurgit, et potens est, luctetur summis humeris, et labore per circuitus multos in diē. et comedat ea quę dicta sunt. Si uero aqua intercus fiat, iisdē curato quibus et priores. Alia aqua intercus ab his fit. Aestatis hora si iter faciens per uiam longā, in aquam pluuiālem ac stabilem inciderit, et biberit de ipsa multū assatim. Si igitur carnes absorbuerint & cōtinuerint in seipsis aquā, secessus aut nusquā fiat, hæc patitur. Si quidē fuerit in carne, calorē facit & in uētre, & in corpore, ut pinguedo uentrē ambiens colliquecat. hic quandiu quidē iter facit, nihil mali habere uidetur. Postq̃ aut iter facere cessarit, et sol occiderit, statim dolorē multum habet. progressu uero morbi ualde attenuatur. Si uero etiā cibi fastidium accedat, multo plus attenuatur. Si uero cibos edere poterit, et ad laborē impotēs fuerit, etiā amplius læditur, & pleriq; horū tumor in totū corpus deducitur. Et tenui quidē color corporis liuidus sit, et uēter magnus, et sitis fortis tenet, et uiscera ipsius à calore resiccantur.

617 progrediētē uero tempore, ad edendum quidem prōptus sit, & edit quodcūq;
 quis dederit, & bibit, & dolet nihil. Si uero tumor obtinuerit, color huic fit pal-
 lidus. Et uenæ nigræ frequētes per corpus distenduntur. Indignatur autem &
 tristatur ex quauis re, etiāsi nihil noui accidat. Venter uero aqua perhumescit,
 618 & magnus fit, & laternæ speciem præ se fert. Et temporis progressu cibos no-
 n-admittit, sed uidentur ipsi cucumeris syluestris odorē habere, præ abominatio-
 ne. huic ubi sic habuerit, cneori aut hippophais succum dato, aut cnidium gra-
 num. hæc uero pharmaca ita dare oportet. Cneorum quidem per sextā diem,
 Hippophais autem succum per octauam. Cnidium uero granū per decimam.
 619 & dare ipsa oportet donec expurgetur, & uacuus fiat. Interpositis autē diebus
 alatur ex iisdem quibus et prior. Maxime autem de eadem aqua bibendū dato,
 ex qua morbus corripuit, plurimū, quo uentrē ipsius turbet, & ualde secessum
 faciat. Sic enim potissimum sanū facies. Si uero tibi uidebitur, etiam frequēter
 620 clysterem adhibeto, ex cneori triti dimidia hemina, mellis tertia heminae parte
 ammixta, his cū quatuor succi betæ heminis dilutis, atq; sic infusis. postera die
 etiam asinini lactis cocti octo heminae dentur affuso melle, aut adiecto sale po-
 tandæ. Et post purgationē, iisdem utatur quibus prior. & interiectis diebus, ci-
 bis ac potibus iisdem utatur, & deambulationibus similiter, & sic curatus bre-
 uia morbo liberabitur tertio mense, aut sexto. Si uero negligentia aliqua conti-
 621 gerit, & non statim curatus fuerit, breui moritur. Sed & in attenuato iisdem us-
 tendum est ad sanationē. Præhumeſtare uero antea corpus ipsius oportet per
 fomenta, quo magis pharmacis obediat. At uero statim curam adhibere opor-
 tet. Sin minus, cum multis consenescit morbus. Sed & uter tādē morbus sit,
 622 clysterem ex his adhibere conuenit. Vini albi heminas duas accipito, & mellis
 heminam dimidiam, & olei heminam dimidiam, niri Aegyptij rubri torrefa-
 cti quadrantem, foliorum cucumeris syluestris tusorum ac expressorū succi he-
 minam, hæc omnia mixta & in ollulam infusa feruefacito, & per clysterē infun-
 dito. Morbus hepaticus. Fit ab atra bile, quum influxerit ad hepar. Accidit
 623 autem maxime in autumno, in mutationibus anni. Hæc igitur æger patitur.
 Dolor acutus ipsi in hepar incidit, & sub ultimas costas, & in humerum, & in
 clauiculam, & sub mammam. Et suffocatio fortis tenet. Et aliquando liuidam
 bilem reuomit. & rigor, & febris primis diebus debiliior habet. & dum attingi-
 624 tur, hepar dolet, & color ipsius subliuidus est, & cibi quos prius comedebat,
 suffocant ipsum, & ingesti urunt ac torquent uentrē. Atq; hæc quidem in prin-
 cipio patitur. Morbo uero progrediente, & febres remittunt, & à paucis cibis
 repletur. In solo autem hepate dolor restat, & ipse aliquando fortis, aliquando
 625 quietus. Quandoq; uero acutus corripit, & sæpe derepente æger animam effla-
 uit. Huic conducunt ubi dolor habuerit, tum alia, tum tepefactoria eadem ap-
 posita, quæ etiam pleuritidi. Quum uero remiserit dolor, multa calida ipsum la-
 626 uato, & aquam mulsam bibendam dato, & uinum album dulce, aut austerū, u-
 trum tandē profuerit. Et sorbitiones easdem quas etiam à pleuritide correpto.
 627 Cæterum ad dolorē hæc bibēda dato. Oui gallinacei cocti liquorē terito, &
 succi solani dimidiā heminam affundito, et aquæ mulsæ dimidiā semiheminæ
 partē ammisceto, diluito, ac bibēda dato, et sedabunt dolorē. dato aut quodid-
 donec dolor quiescat. Bibat etiam silphij succū erui magnitudine, & cum eo
 origanum

origanum tritum in uino albo diluat, & sic ieiunus bibat. Bibat insuper & phar-
maca quæ in pleuritide dantur doloris gratia. Bibat & caprinum lac, tertia par-
te mellis ammixta. Sint autem lactis heminae quatuor. Hoc mane bibat, quum
alia non biberit. A cibis autem abstineat, donec iudicetur morbus. Iudicatur au-
tem maxime in septem diebus, in his enim manifestum fit, an lethalis sit, an non. 660

Si uero etiam suffocatio accesserit, hæc dare oportet quo uomat. Mel, aqua,
acetum, salem, permixta in ollam nouā infundito. Deinde tepefacito, & origa-
ni capitati ramulis unā cum semine agitato. Vbi uero tepefacta fuerint, tepida
ebibenda dato. Deinde stragulis iniectis contextum finito, donec quā maxi-
me exudarit. Et ubi uomitus ipsum apprehenderit, prompte uomat irritatio-
ne per pennam facta. Si uero uomere non possit, aquæ mulsæ tepidæ poculum
duarum heminarū insuper bibat, & sic uomat. Et si quid pituitæ aut bilis euo-
muerit, rursus idem facere oportet ad horas quatuor. proderit enim. Post mor-
bi uero iudicationem curato modicis cibis, ijsq; puris datis. & si quidē panem
edere cupiuerit, panē calidum maxime purū edat. Si uero mazā, eam quæ uino
dulci subacta non est edat, ubi tamen prius aqua subegit. Obsonium aut habeat
carnes catuli coctas, aut colubæ, aut pulli gallinacei carnibus, omnibus coctis
utatur. Ex piscibus autē galeo, torpedine, pastinaca, & rais paruis, omnibus co-
ctis. Lauetur aut quotidie, & frigus uitet & parū deambulet antea in securitate.
Hæc si seruauerit non est timor ut morbus reuertatur. Nam huiusmodi morbus 661
grauis est ac diuturnus. Alius hepaticus morbus: Dolores quidē eodem mo-
do premunt in hepar, & color differt à priore. Malicorij enim formā habet. In
tēpore uero æstatis maxime incidit. Fit aut à bubulæ carnis esu, & uini potu ni-
mio. Hæc enim omnia isto anni tēpore hepatis sunt infestissima, & bilē maxime
ad hepār adducūt. hæc igitur æger patitur. Dolores acuti incidunt, & non deficiūt 662
ulla hora, sed semper magis premunt. Aliquando etiā uomit bilem pallidam. &
ubi uomuit, paulo melius sibi habere uidetur. Si uero non uomuerit, bilis ad o-
culos peruenit, & fiunt ualde pallidi. Et pedes intumescūt. Atq; hæc patitur quā-
doq; ualde, quādoq; minus. Quum aut dies præterierint in quibus morbus iu-
dicatur, dolor minus urget, si nihil deliquerit, & eiusmodi diætā huic constitue-
re oportet, qualē & priori. Si enim inebriatus fuerit in tēpestiue, aut uenere u-
sus fuerit, aut aliud quid fecerit quod cōmodum non est, hepar statim ipsi durū
fit, & intumescit, ac à dolore pulsatur. Et si quid facere festinarit, de repente hepar
& totum corpus dolet. huic ubi sic habuerit, & primi dies præterierint, fomen-
tum adhibeto. deinde scammonio subpurgato. Si uero uenter cōbustus fuerit, 663
clysterem ex ijsdem quibus in prioribus usus es adhibeto, quæ probe ducant.
et post clysterē, lacte asininō cocto subpurgato, octo heminis eius, melle affuso,
in potu datis. Dato etiā caprinū lac mane poculi quatuor heminas cōplecten-
tis mensura, tertia parte aquæ mulsæ ammixta. Dato itē cocti lactis caprini he-
minas duas, tertia aquæ mulsæ parte ammixta, aut ipso solo melle affuso. dandū
est etiā equinū lac, eodē modo uelut asininū, & si quidē ab his morbis curatus
cedat, satis est: Sin minus, dextri cubiti internā uenam secato, & sanguinem de-
trahito. Si uero non uisus fuerit tibi per asininum lac subpurgāndus esse, bubuli
lactis crudi duas heminas dato, tertia aquæ mulsæ parte ammixta, quotidie ad
dies decem. Deinde ad alios duodecim dies, sexta parte aquæ mulsæ affusa, ad 664
bibendum

bibendum dato. De cætero uero ipsum lac duarum heminarum mēſura, donec
 pingueſcat exhibeto. Si uero neq; ſic deſinat, urere oportet, quum maximū he-
 par factum fuerit, & maxime eminu-erit. Vrito autē per buxeos fuſos, in oleum
 feruens tinctos. Apponito autem donec tibi bene habere, & uſtionē factā eſſe
 uiſum fuerit. Aut per fungos octo cruſtas inurito. Si enim uſtio ſucceſſerit, ſa-
 num facies, & reliquo tēpore melius deget. Si uero nō ſucceſſerit, de cætero ab
 alijs ſanus non fiens, corrūpitur ac moritur. Alius morbus hepaticus. Re-
 qua quidem eadem patitur hic æger uelut priores. Color autem niger eſt. At he-
 patis ſel, pituita & ſanguine repletū, uelut ratiocinamur, dirūpitur. & ubi dirū-
 ptum fuerit, celerrime inſanit, & indignatur, & loquitur ſtulta, et latrat uelut ca-
 nis. Et ungues punicei fiunt, & oculis uidere non poteſt, & pili in capite erecti
 ſtant. & febris acuta corripit. Huic eadē adhibere oportet quæ etiam prioribus
 Pleriq; uero moriuntur in undecim diebus. pauci q; effugiūt. Splenis mor-
 bus primus. Fit huiusmodi morbus, propter caliditatē ſolis bile cōmota, quū
 in ſeipſum bilem traxerit. Hæc igitur æger patitur. febris acuta in principio ac-
 cedit. progrediente uero morbo remittit, excepto ipſo ſplene, in quo ſemper ca-
 lor hæret. & dolor aliàs atq; aliàs incidit acutus, & in lateris mollitudinē, & in
 uentrē. Et cibos in principio quidem admittit, nō aut ualde ſecedunt. progres-
 ſu autē temporis, & color pallidus fit, & dolor fortis irruit. & clauiculæ attenu-
 antur. & cibos non ſimiliter admittit, uelut in principio, & à modico impletur.
 Lien uero aliàs magnus fit eadem die, & aliàs minor. huic quū ſic habuerit uera-
 trum purgans deorſum, bibendū dato, & cnidio cocco ſubpurgato. Ad ueſpe-
 rum aut poſt purgationē, lenticulæ acidioris heminā ſorbendā dato : & betarū
 pinguiū heminam polenta inſperſa. poſtera uero & tertia die panē paruum da-
 to, pro obſonio aut lenticula utatur, & carne ſuilla in lenticula cocta trita. Vinū
 bibat auſterū, nigrū, paulo meracius. Et quietē his diebus habeat, niſi quod in-
 tus in umbra paululū deambulet. Reliquo uero tēpore hæc exhibēda ſunt. Ci-
 bus ſit panis cui nihil furfurū deceſſit. Obſoniū habeat carnē canis maioris, uel
 capræ, uel ouiculæ tritā. & ſalfamentū Gaditanū, aut ſaperdam. & acida ac ſalfa
 omnia aſſumat, & acerba. Bibat uinum coum ſubſtringens q̄ nigerrimum. à
 dulcibus autem & pinguibus ac nidoroſis abſtineat. & ſilphium non accipiat,
 neq; allium, neq; carnem porcinam. Neq; mugilem, nec recentem, nec ſalfum,
 neq; anguillam. Neq; olus ullum coctum ſine aceto. Ex troximis autē, hoc eſt
 his quæ cruda eduntur, raphanide utatur & apio, in aceto tinctis, & polentam
 uino ſubactam edat. & uinum meracum ſorbeat. Si uero uelit, etiam panem in
 uinum interat, ac calidum edat. Dentur etiam piſces, ſcorpium, draco, cucu-
 lus, gobio, callionymus. Hoſ coctos & frigidos dato. Dato etiam quæ ſplenem
 attenuare poſſunt ſingulis diebus, aſphodeli ſemen, aut uiſci folia, aut ſcenum
 græcum, aut uiticis ſemen, aut rutam, aut mentæ radicem. ex his quodcunque
 uolueris tritum in uino auſtero dato ieiuno. Si uero adeo ualidus fuerit, per tri-
 ginta dies ad ligna ſecanda cogito. & ſummis humeris luſtetur. & interdiu de-
 ambulet. & ueſpere dormiat. Mane uero ſurgat, & quæ relata ſunt edat. Si uero
 ab his non melius habeat, ſplenem fungis urito, decem magnis cruſtis inuſtis,
 quum maximus fuerit ſplen, & maxime eleuatus. Si enim ſucceſſerit uſtio fa-
 cta uelut oportet, ſanum facies, uerum non breui. Opus enim habet morbus
 curatione

curatione. Grauis est enim & diuturnus, si non fuerit statim curatus. Alius splenis morbus fit quidem ab iisdem à quibus & prior. patitur igitur æger ab hoc morbo hæc. Venter inflatur. postea uero etiam splen intumescit, & durus est, & dolores acuti in splenem incidunt, Color autem mutatur, & conspicitur niger, pallidus, malicorij speciē referens, & ex aure male olet, & gingiuæ male olent, & à dentibus discedunt. & ex tibijs ulcera erumpunt, uelut pustulæ nocturnæ. Membra uero attenuantur, & stercus non secedit. Hunc quū sic habuerit, iisdem pharmacis & edulij, & potibus, & laboribus, atq; alijs omnibus curato. & ubi stercus secedere noluerit, clysterem adhibeto, ex mellis hemina dimidia, & nitri Aegyptij magnitudine tali ouilli. Hæc trita in quatuor hominis aquæ de betis coctis diluito, & per clysterem infundito. Si uero morbus ab his non sedetur, splenem ipsius urito uelut prioris, & si uisio successerit, sanum efficies. Alius splenis morbus fit, in anno, ueris maxime tempore, uerum à sanguine. Quum enim repletus fuerit splen sanguine, erumpit in uentrem, & dolores acuti in splenem incidunt, & in mammam, et in clauiculam, & in humerum, & sub scapulam. Color autem corporis est plūbiformis. & parua ulcuscula uelut lancinata in tibijs exurgunt, ex quibus ulcera magna fiunt, & quæ primum infra secedunt, sanguinolenta sunt & æruginosa. et uenter durus subit, & splen uelut lapis est hic morbus magis lethalis est q̃ priores, et ex ipso pauci effugiunt. hunc quum sic habuerit, iisdem purgato quibus et priorem, ueruntamen pharmacum sursum purgans ne dederis. Deorsum uero granum cnidium exhibeto. Et postera die etiam lactis equini cocti octo heminas dato, melle affuso. Si uero hoc non adsit, bubuli aut caprini cocti duos congios præbeto, ita ut alternatim mel in poculum ammisceatur, et uicissim bibantur. Ad uesperam aut post purgationem eadem quæ priori dato. Et si uisum fuerit, ab interna cubiti sinistri uena sanguinem detrahit. Reliquis autē diebus quotidie ieiuno lactis bubuli quatuor heminas dato, tertia muriæ parte ammixta. Cibis uero et potibus et alijs omnibus iisdem curato, quibus & priorem. Abstineat autem à uenere, et ebrietate, hic uelut prior. Et si uideatur etiam urito, quum crassissimus & maximus splen factus fuerit. & si opportune uiseris ac successerit, sanum facies. Si uero ab hac curatione sanus non fiat, tempore corruptus moritur. Est enim morbus ualde grauis. Alius splenis morbus. Accidit & hic morbus uere maxime, quum splen pituitam assumpserit in seipsum, & statim magnus factus fuerit ac durus, & deinde rursus sedatur. Et quum quidem eleuatus fuerit, dolores incidunt acuti. Quum uero mollis fuerit, doloris exors est. Et ubi diuturnus factus fuerit morbus, obscurior esse uidetur. & insurgit, & cito sedatur. Hic quum sic habuerit, in principio morbi cibos admittere non potest, & cito attenuatur: & corpus impotentiam multam habet. Morbus autē si non statim curatus fuerit, aut sua sponte quieuerit, interpositis quinque aut sex mensibus, rursus insurgit. Intermittit autem maxime per hyemem. hunc si in principio acceperis, decem crustas in splenem urito, et statim sanū facies. Si uero non uiseris, iisdem pharmacis curato, quibus & priores. Et alijs item iisdem, & potibus, ac laboribus, Sic enim celerrime sanum feceris, huius autem color fit ex albidus, subpallidus, & squalidus. Alius splenis morbus. Fit autumno maxime ab atra bile. Fit autem ab olerum multorum quæ cruda eduntur esu,

& ab aquæ potu. Patitur itaq; æger hæc. Quum morbus corripuerit, splenem uehementer dolet, & rigor & febris apprehēdit, et inedia ipsum habet, ac cibos auersatur, & corpus citò cōcidit. Splen autē, magnus quidem non ualde fit, uerum durus. & ad uiscera allabitur, & adhærens fugit. Hunc quum sic habuerit, iisdem pharmacis & edulijs ac laboribus quibus priores curato. Et si se tibi exhibuerit, urito ipsum eo modo quo etiam alios. Hic morbus in plerisq; si statim curatus fuerit, breui decedit. Quatuor morbi regij. primus quidē æstate maxime corripit, bile commota. Consistit igitur bilis sub cute, & in capite, quare statim corpus in alium colorē mutat, & fit pallidum, uelut malicorium. Et oculi pallidi fiunt, & in capite sub pilis uelut cortex subest. & rigor ac febris corripit. & pallidum urinam mingit, & crassum subpallidum in ipsa subsidet, & mane q̄ diu ieiunus fuerit, ad cor & uiscera exugitur. & si quis ipsum alloquatur aut interroget, ægre fert, & anxius fit, & non sustinet audire. Stercus autē excrementum cum pallore albicat, & male olet. Hic quum ita habuerit, maxime moritur in quatuordecim diebus. Si uero has effugiat, sanatur. Curare autem oportet ipsum sic. Quum febris remiserit, multa calida lauato, & aquam mulsam bibendam dato. Et sorbitionibus utatur, ptisanæ succo, melle affuso. Mel autem non simul coquito, donec præterierint quatuordecim dies. Hi enim iudicant an lethalis sit morbus, aut non. postea uero bis in die lauato, & nutrito primū modicis quæcūq; maxime admiserit. postea tamen plura dato. Vinū bibat albū plurimum per diem. & si progressu temporis uideatur tibi pallidus esse & debilis, uomitum à cibis facere iubeto, uelut in superioribus morbis habetur. Et si quidem ab his morbis quiescat, satis est. Sin minus, ueratrū bibendum dato. Post talem autem purgationem, ad uesperam edat mazam mollem, aut panis medullam. Obsonium uero edat, pullum gallinaceum percoctū, probe cōditum cum cepa, coriandro, caseo, sale, sesamo, & uua passa alba. Vinum autē bibat album, austerum, uetustissimū. Aluum uero infra subpurgato, postera die succo cicerum alborum, melle affuso, uratur, & duas heminas eiusmodi succi ebeat. Tertia uero die initio facto, singulis diebus hanc aquam bibat, ex his rebus coctam fœniculi radices tenues ea copia quanta tribus digitis comprehendi potest, in duos aquæ congios mittito, ac coquito usq; ad dimidias. Et cicerum alborum choenicen, in duobus aquæ congijjs ad dimidias item coquito, & quod superest excolatum sub dio per integrā noctem exponito, & ambo hæc decocta misce-to. Cum hac aqua & uinum temperatū bibat, & ipsam aquam solam si uelit, q̄ plurimam bibat; & aliam aquam non bibat. Si uero hanc potionem nō admiserit, aliam sic præparatam dato. Caricarum albarum choenicen in duobus aquæ congijjs coquito, excolato, & sub dio per integrā noctem exponito. postea hanc aquam bibat, siue nudam ipsam uoluerit, siue cum uino mixtam. Bibat autē non acruatim multam, sed pro una uice dimidiam heminam, ut ne alui profluiū ipsi succedat. & modico tempore interposito rursus bibat. Commoda autē sunt & hæc in potu data ieiūno singulis diebus, trita & in uini ueteris albi hemina diluta, apij semen, cucumeris semen, fœniculi semen, cuminum Aethiopicum, adiantum, coriandrum herba, uua passæ albæ. His & illis in potu acceptis ut tatem percipiet, & celerrime sanus fiet. Alius morbus regius siue arcuatus. Hic corripit tempore hyemis, et ex ebrietate & rigore. Incipit autem primum ri-

gorinuadere, postea etiam febris detinet. Et humor qui est in corpore, congelatur in cute. Quod autem sic habeat, ex his ostenditur. Liuidum est ipsius corpus & subdum. Et uenae per corpus distentae sunt pallidae. maiores autem & crassiores sunt quam prius. Et aliae uenae subnigriores distentae sunt. Et si quis aliquam ipsarum secet, sanguis effluet pallidus, si pallidae sunt uenae. Si uero nigrae fuerint, niger sanguis effluet. Et uestem interiore corpori adiacentem, praeruritu non sustinet. Hic promptius est ad iter faciendum & ambulandum, sed praer debilitate crura labascunt, ac ipsum non sufferunt, & sitit uehementer. Hic morbus non minus priore lethalis est. Procedit autem ad amplius tempus, si non in primis diebus sanus fiat. Si uero morbus prologetur, & ad octauum aut nonum diem duret, in morbum incidit, & morbus, et dolor magis premit, & exsurgere non potest. Et plerique in hoc tempore statim pereunt. Huic ubi sic habuerit, si quidem principio morbi accesseris, quum iam septem dies praeterierint, ueratrū bibendum dato. Ventrem uero infra subpurgato per succum, uelut priori. Et alia eadem pharmaca dato. Exhibeto & catharidas, sine alis, & capite, quatuor tritas, & in uini albi hemina dimidia dilutas, modico etiam melle affuso. Atque has bis aut ter in die bibat. Progrediēte uero morbo, balneis & fomentis curato. Edat autem quaecumque admittit. Vinum bibat album, austerum, & alia eadem assumat quae prior. Hic morbus diuturnus est & grauis, si non ab initio probe fuerit curatus. Alius morbus regius. Popularis appellatur hic, eo quod omni tempore corripit. Fit autem a repletionē maxime ac ebrietate. & postquam riguerit, statim sanē corpus immutatur, & pallidum fit, & oculi pallidi ualde sunt. Et sub pilos ac sub ungues morbus procedit. Et rigor ac febris debilis tenet. Et debile est corpus, & in capite dolor adest. Et pallidum ac crassum mingit. hic morbus minus lethalis est prioribus. & curatus breui sanatur. Huic quum sic habuerit, cubiti uenam secato, & sanguinem detrahit. Deinde fomento adhibito, elaterium bibendum dato. Tertia uero die rursus infra subpurgato, cum lacte asinino. Reliquas uero sorbitiones, & potus, ac edulia, eadem dato quae priori. Et caput ipsius frequenter purgato, & de succo bibendum dato. Et multa calida ipsum lauato, ac carnem defricato, & defricatas sordes in uino albo bibendas dato, & ad alia omnia ipsdem utatur, & breui sanus euadet. Alius morbus regius, fit quidem a pituita, hyeme autem maxime corripit. & color ipsius agri est albus, & pectora ipsius pituita plena sunt, & sputum saliuā, & quum excreat, sin gultus ipsi oboritur. Et album lotium ac crassum mingit, & in urina subsidet, uelut farina. Hic morbus non est lethalis, & breui sanatur. Huic quum sic habuerit, cnidium granum bibendum dato. Et post purgationem, succi pitisanæ quatuor heminas, melle affuso, exsorbendas dato. Superiorem uero uentrem uomitu inducto, uelut in prioribus purgato. Sic enim facillime pituitam a pulmone & arterijs abduxeris. Sed & gargarismū ipsi frequenter praeparato. Hic aliquando etiam febricit debili febre, & horror tenuis succedit. De cetero uero ipsdem qui bus priores curato, & pharmacis, & fomentis, & balneis, & edulij, & potibus, & sorbitionibus. Sic enim maxime sanum facies. Morbus Typhos uocatus. Typhos quidem appellatur hic morbus, hoc est stupor attonitus, corripit autem tempore aestatis, quum canis sydus oritur, bile per corpus commota. Statim igitur ipsum febres fortes tenent, & calor acutus, & a grauitate debilitas. &

crurum ac manū impotentia : maxime enim inutilia ipsi sūt hæc membra. & uenter turbatur, & quæ secedunt graue olent. Et tormen forte succedit. Sed & hæc patitur, si quis ipsum erigere uelit, erigi non potest. neq; oculis uidere potest præ calore. Et si quis ipsum interrogat, præ dolore respondere non potest. Quum aut moriturus est, acutius uidet, & loquitur cōfidenter. & bibere ac edere cupit. & si quis det quod edat, breui etiam animam emittit, si nō euomuerit. Huic morbus hic iudicatur in septē, aut quatuordecim diebus. Multi uero perueniunt etiam ad uiginti quatuor. Si igitur hos trāserit, sanus erit. Nam in his diebus iudicatur, an lethalis sit morbus, aut non. Hunc quū ita habuerit, sic curato. In primis quidem diebus à balneo abstineat. Vnguatur autē uiuo & oleo tepido, in lecto, & à cibis abstineat. Sorbitiones autem tenues frigidas dato. Vinum autem bibat nigrum, austerum, si ipsi conducatur. Sin minus, album, aquosum, austerū. Si uero sitis fortis premat propter calorem, potu aceruatum dato, euomere iubeto, bis aut ter hoc repetito. Et quū calor habuerit, lintea aqua frigida tincta apponito, qua parte se maxime ardere dixerit. Si uero horrore habuerit corpus, frigefactoria remittito. Hic quū doluerit, ab huiusmodi maxime dolore periclitatur, ne repente animā relinquat. Verum exhibere oportet ipsi doloris causa festināter, eadem pharmaca quæ ei qui à pleuritide tenetur. Quū autem exsurrexerit, cibo & potu, & balneis quàm celerrime refocillato. Morbus enim est difficilis, & pauci effugiunt. Alius typhos. Corripit quidem hic morbus omni tempore. fit autē propter corporis humiditatē, quum cibos humidos, & potum multum, carnes combibūt, & fluidæ fiunt, ab his maxime fit morbus. Incipit igitur febris, tertiana aut quartana, in principio fiens. Et dolor fortis in capite consistit, Aliquando etiam in corpore intermittens. Et uomit saliuam, & frequenter eructat, & oculorum regiones dolet, & facies albescit, & tumor in pedes descendit. Quādoq; uero etiam totū corpus intumescit. Et ad pectora, & ad dorsum aliquando dolor currit. & uenter turbatus est. & oculis fortiter tuetur, & saliuam multā & spumofam expuit, & in faucibus detineri uidetur. & exasperat ipsas. Sæpe uero etiā inflammantur fauces. Hic ubi sic habuerit, & dolor ita prefferit, & erectæ ceruicis spiratio fortis inciderit, quandoq; de repente præ dolore animam emittit, in septem diebus, aut quatuordecim. Multi uero usq; ad uiginti quatuor dies durant. Sæpe uero etiā derepente morbus remittit, & æger sanus esse sibi uidetur. Verum obseruare oportet donec quatuor & uiginti dies præterierint. Si enim has effugerit, non ita ualde moritur. Huic quū ita habuerit, in primis diebus sorbitiones dare oportet, farinam coctam, tenui melle affuso. Vinū uero dandum est nigrū, paulatim, prout uoluerit temperatū. Cibi autē ne exhibeantur priusquā hi dies præterierint. Polypi uero in uiuo cocti edendi dentur, & iusculū sorbendum. Et raphanidas multas edat, & nasturtij semen torrefactū, molitum ac cribratū, uiuo nigro acerbo affuso bibat. Et polenta tenuis modica mane bibenda detur. A balneo autem abstineat, donec hi dies præterierint. Vino uero & oleo tepefactis in lecto illinatur, & extergeatur. Et fructus pæoniæ grana decem in uiuo nigro cocta bibēda dato. & rapi probe percocti succum sorbeat, caseo insulso cōditum, & papauere, & sale, & oleo, & silphio, & aceto. Si uero etiam pharmacū bibendū dare uolueris, cnidium granū dato. Et post purgationē, farinæ coctæ & pinguis duas he-

minas exforbendas dato. Vinum autē bibat idem. Et ex pharmacis & sorbitio-
 nibus ac potibus quicquid dederis profuerit, siue singulatim, siue plura simul
 exhibueris. Atq; sic celerrime sanum feceris. Morbus autē est grauis, et pauci es-
 fugiunt. Alius typhos, hic quidem propter hoc fit. Quū bilis putrefacta am-
 mixta fuerit sanguini, per uenas & articulos, quū sanguis steterit, cōstitit quidē
 maxime in articulis. Incūbit autē quandoq; etiam in reliquū totum corpus, et do-
 lores acutos exhibet, & multi ex huiusmodi morbo claudi fiunt, quū bilis in ar-
 ticulis conclusa in tofum callescit. Dolor autē intermittens, corripit per tres &
 quatuor dies. Hunc ubi sic habuerit, hoc modo curato. Dolore in corpore præ-
 ualente, tepesfactoria facere & adhibere oportet, oleo prius illito. Quum autem
 remiserit, ueratrum ipsi dato, toti corpori antea fomento adhibito. Postera die
 serum caprinum coctū bibendum dato, duorū congiourum mensurā, ita ut in al-
 terum congiū mel affundas, & in alterū sal adijcias, deinde poculis uicissim
 permutatis bibat, donec totum ebiberit. Ad uesperā uero post purgationē, len-
 ticulæ heminam sorbeat. & betarum pinguium heminam, polenta inspersa ebi-
 bat. Et pulli gallinacei carnē, aut colūbæ, aut turturis, aut ouiculæ, aut suis pin-
 guem edat. Veratrum autem per sextū diem dato. & si alicubi in articulis tumor
 fiat, & discessus fieri nolit, cucurbita affixa sanguinē detrahito, punctura per a-
 cum triangularē facta in genua, si in genibus tumor fuerit. Verum nullum ex a-
 lijs articulis perpunxeris. Interpositis autē diebus cibum accipiat, panē maxi-
 me assatū. Mazam uero maxime oleo & melle subactā. Obsonia uero habeat,
 maxime quidē assatās carnes uolucruū, non salas; Si nū minus, etiā coctas, condi-
 tas, uerū sine caseo, & sesamo, & sale. Piscibus autem utatur carnosissimis, assa-
 tis eodem modo uelut carnes: & coctis origano conspersis, ac oleo ipsis affuso.
 Vinū autē bibat album, si conducatur: aut si hoc nō cōmodet, nigrū. & in deambu-
 lationibus se exerceat per diem, & post cōnā, et mane. Serū autē & lac pro tēpo-
 re semper bibat. Si uero tibi uisum fuerit, etiā asininū lac decoctū dato. Et si sa-
 nus fiat, in custodia ipsum esse oportet, ut ne à frigore & aestu lædatur. & cibis
 non ualde expleatur. Periculum est enim ne morbus reuertatur. hic itaq; mor-
 bus si sic curetur, in sex mēsibus sanatur. In tot enim mensiū spatio iudicatur an
 mortalis sit, aut non, etiam si statim curetur. Nam morbus est grauis, & plerisq;
 commoritur. Alius typhos. Fit quidem hic morbus in tēpore pōmorum,
 quū quis se fructibus mollis corticis, & foris nō lignosi, omnis generis repleue-
 rit. Plerisq; uero etiā ab his factus est talis morbus, ubi uidelicet placentarū, &
 liborum sesaminorū, & aliorū dulciariorū ex mellē paratorum, esu se insatiabili-
 ter expleuerunt. Mel enim coctū æstuosum est, et uentri adhæret; postea quum
 concoctū fuerit in uētre, efferuescit: & uenter derepēte attollitur, & ardet ac di-
 rumpi uidetur. Deinde repente uentris profluiū succedit. & quum semel fece-
 dere inceperit, per multos dies purgatur. & multi post hanc purgationē sani
 fiunt. Quum igitur sua sponte purgari cessauerit, lentiū succi tres semicongios
 ipsum ebibere cogito, sale adiecto. post purgationē uero succi, ad uesperam, len-
 ticulæ frigidæ non falsæ heminā sorbeat: Multum autē silphij in ipsam deradat;
 & betæ pinguis nō conditæ heminam, polenta inspersa. Vinū autem bibat ni-
 grum, austerū, paulatim. Reliquo uero tempore eadem faciat. Et cibos accipiat
 panē exassatum, & Mazam oleo & melle q̄ maxime subactā. Primis autē die-

bus farinam edat coctam frigefactā, melle affuso. Vinum autē bibit nigrū, acer-
 bum, & donec quieuerit morbus hæc assumat. At qui ex fructibus morbo arre-
 ptus est, flatum sentit, & tormen, & dolorē: & cibi secedere non uolunt, & uen-
 ter ipsius magnus ac durus est, & rigor ac febris habet. huic si quidē sponte tur-
 batus fuerit uenter, in uiginti diebus ut minimū purgatur. Et quū purgari cessā-
 uerit, sanus statim erit. Si uero nō fuerit purgatus, purgato ipsum hippophais
 succo, aut cnidio grano. Ad uesperā autem eadem exhibeto, quæ ei qui sponte
 purgatur. Postera die si febris habuerit, quietē habeat. Et de eodem uino in a-
 qua frigidissima ipsi bibendū dato. Si uero febris nō habuerit, uictu utatur nō
 humido, sed fortiore. Et deambulet cōiectura iuxta cibos facta. Ab hoc morbo
 multis iam aqua intercus facta est. Et si tibi clysterē adhibere uisum fuerit, eadē
 quæ etiam hydropico per clysterem infundito. Si uero uolueris, hæc infunde-
 re potes. In aquæ mulsæ hemina, herbam thapsiæ coquito, & sic infundito. hic
 hoc modo curatus celerrime sanus erit. Alius typhos. Fit hic morbus quum
 humor qui est in corpore, putrefactus fuerit, & magis q̄ opportunū est resicca-
 tus. Fit igitur æger hoc morbo correptus, specie limpidus ac humectus, subpal-
 lidus, pellucidus, & uesicæ urinæ similis, uerū non intumescit, sed tenuis & ari-
 dus est, ac debilis. Attenuantur autē in corpore maxime clauiculæ, & facie forti-
 ter gracilescit, & oculi ualde sunt excauati. & hæc quidē à morbo patitur. Color
 autē corporis niger est, causa uero hæc est. Quū bilis atra in uenas, & ad cutē sub-
 ierit, & postea calor successerit, necesse est à calore uenas comburi ac resicari,
 Quare sanguis è uenis excedit, hæc igitur patitur. Hic tenuis fit, & fortiter gra-
 cilis, & oculis raro nictat, & muscas à stragulis uenatur. Et grauitas ciborū ma-
 ior est q̄ quum sanus esset. & lucernæ extinctæ odore delectatur. et frequēter se
 men per somnū effundit. Sæpe uero etiā inter eundum genitura ipsi exit, huic
 quū sic habuerit, uentrē nigro ueratio purgato, supernū uidelicet: infernū uero
 scammonia succo. Post purgationē uero eadem quæ & alijs dato. & serū ac lac
 bubulum, aut caprinū pro tempore exhibeto. dato & lac asininum decoctū, ad
 purgationē. Hic ita curatus in duobus maxime annis sanus fit. Cibos autē quos
 uult assumat, & q̄ maxime nutriatur, et deambulet cōiectura ad cibos facta. hic
 morbus corripit maiorem uiginti annis. Vbi uero corripuit, si non à principio
 morbi quis curatus fuerit, nō desinit, nisi uiginti anni præterierint, sed adhæret.
 postea ab aliquibus dum curatur decedit. Morbus autē grauis est. Voluuli por-
 rō uocātur hi morbi. fiunt autē maxime ab his. Si hyemis tēpore quis calido &
 humido uictu utitur, et nō deambulationib. se exerceat, respectu ad cibos facto.
 Verum repletus semper dormit, & deinde longū iter perficere cogatur, frigore
 fæuiente. Deinde riguerit sub ossa, hæc igitur patitur. Flatus in toto corpore ob-
 oritur, & color ipsius fit plūbiformis. & riget semper, ut etiam calida ipsi affusa,
 calida esse nō uideatur. Corpus autē ipsius dum lauatur, à calida desquamatur,
 maxime scrotum. & si digito corpus compresseris, impressionē facies, & notæ
 tibi apparebunt, uelut in farina aqua subacta. Maxime autē in potibus impres-
 sionem perfert. Crura uero ipsius grauiā sunt. & si obambulet, tremat. & si ad ac-
 cliuem locū iter faciat, uehementer anhelat, & ulnæ depēdere uidentur, & sitis
 urget noctu, cibi uero crudi secedunt quoscūq̄ ingessit. Huic quū sic habuerit,
 fomento prius adhibito, cneorū bibendum dato, aut hippophais succum, aut
 cnidium

cnidium granū, post purgationē uero, eadē dato quā prioribus. Postera diē lāctis asinini cocti congiū dato bis ebibendū, sale adiecto. Ad uesperā coenet panem. Obsoniū autē habeat, ouiculā carnēs coctas, & polypos coctos in uino nigro, & iusculū sorbeat. & lenticulā habeat sic pręparatā: heminā lentis coctam probe terito, deinde farinā ammisceto, & silphiū derafum addito, & salē adijcito, & acetū affundito, & alliū ad hęc simul coquito, & affusa aqua bis aut ter feruefacito, et cū tudicula undiquaq; expassa brachia habētē, simul ipsa agitato: deinde ablata frigefacito. Sit autē non ualde crassa, & odoris gratia etiā pulegiū ut simul coquatur, adijciatur. Intermedijs uero diebus, uomitus faciat per sextum diem. Verū aliās atq; aliās ante uomitū, & pharmaci potū, fomentū adhibere oportet. Et per tertiā diem lauetur, si conducat: Sin minus, ungatur. Et deambulet si ita potēs fuerit, cōiectura ad cibos facta. & sambuci, ac cōnyzæ semper teneræ, folia cocta edēda dato. Sic enim curatus, facillime deget, & morbus annū desinet. Multis uero iam sanis factis, post duos annos morbus reuersus est. Sed si hoc cōtingat, eodem modo curetur. Si uero tertiū reuertatur, tumor quidem nō succedit. Tenuis autē fit & gracilis, incipitq; à facie attenuari, & colore exalbescit magis q̃ prius. huic quādoq; aqua intercus fit in uētre. Si igitur facta fuerit, secare ipsum non oportet, moritur enim, sed ijsdē curare quibus eū qui à splene aqua inter cutē laboret. hūc maxime in principio curare uelis, & sic cito sanū facies, Opus autē habet morbus multa curatione. Est enim grauis.

Alius uoluulus arcuatus. Hic maxime ætatis tēpore in palustribus regionibus corripit. Magis autē ab aquæ potu. Multi uero iam à tali morbo correpti sunt, ex uoluatione ad solem capitis dolore affecti. Verū similia prioribus patiuntur, excepto colore. Nam pallidus fit æger, uelut malicoriū. Et oculi aliquādo morbo arcuato implētur. hunc ubi sic habuerit, ijsdē curare oportet quibus priorē. Danda etiā in potu aqua à ci cere albo cocta, & cū uino eadem permixta danda est. Et caput eius tetragono medicamēto purgetur. hic minus q̃ prior lethalis est, & uocatur uoluulus arcuatus. Voluulus hæmatites. Reliqua quidē eadem patitur cū prioribus. Incipit autē morbus autūno fieri. Hęc uero in morbo accedūt. Ex ore male olet à dentibus, & gingiuarū discedūt, & à naribus sanguis fluit. Aliquādo etiā ex cruribus ulcera pullulant, & alia sanescūt, alia emergūt. Et color niger fit, & cutis tenuis. Est autē ad deambulandū ac laborandum prōptus. Hunc ubi sic habuerit, ijsdē curato quibus priorēs, & hęc per clysterem infundito. Cucumeris syluestris folia quinq; terito, & mellis dimidiū heminæ ammisceto, itēq; olei heminā dimidiam, & salis quantū una manu cōprehendere potes, & succi betarū heminas quatuor. Ad subpurgationē uero lāctis asinini cocti heminas octo exhibeto, melle affuso. Bibat etiā bubulū lac pōtēpore, per quadraginta diēs. Bibat item mane bubuli lactis duas heminas, tertia aquæ mulsæ parte ammixta, per intermedios diēs. His morbus multa medela opus habet: Sin minus, nō exit, sed cū homine moritur. Vocatur autē uoluulus hæmatites. Morbi crassi appellati. Ex crassis appellatis morbis, hi maxime fiūt. Quū pituita & bilis mixta fuerint in corpore, fluūt in uentrē. & quū congregata fuerint in uentre, attollūtur, & sursum ac deorsum discurrūt, uelut unda. Et rigor ac febris corripit. Et dolor in capite cōsistit, & quū dolor circa uiscera constiterit, suffocationē inducit. Aliquādo uero uomit pituitam acidam, quandoq; etiam fassam & postq; euomuit, os amarū ipsi esse uidetur. In lateri-

bus aut rubores detinentur. Nam quum pituita in uentre sit, sanguis à caliditate cōgregatus in latera allapsus est, & rubores in lateribus excitat. Et calor maxime latera occupat, ac costas. Et dorsum ipsius incuruum fit. Et quum maxime doleat, corporis contactū non sustinet. Nā uelut ex ulcere dolet. Et carnes præ dolore uibrantur, & testes contrahuntur. & in sedem, & in uescā, calor quidam ac dolor irruit. Et mingit crassum uelut in aqua inter cutē. Et ex capite defluunt capilli. & pedes semper frigidi sunt. & dolor premit maxime latera, & dorsum, & collum. & ad cutem aliquid ipsi proserpere uidetur. Morbus uero quādoq; urget, quandoq; remittit. In progressu autē magis assidue premit. & cutis capitis crassa ac rubicunda est. Hic usq; ad sex annos talia pati perseverat. postea & sudor multus diffunditur, & male olet. Sæpe uero etiam per somnū semen effundit. Quod uero per coitū emittit, subcruentū ac subliuidū prodit. Hic morbus fit propter calorē solis, & aquæ potum. proinde hunc quum sic habuerit, cneoro aut hippophae, aut cnidīo grano dato, subpurgato. dato etiam lactis asinini cocti heminas octo bibendas, melle affuso. postera die post purgationē, eadem quæ alijs exhibeto. Primis autē diebus ex iisdē nutriatur, ex quibus etiam is qui ab aqua inter cutem correptus est. & deambulationibus se exerceat, si ita potens fuerit. Si uero præ febris impotens fuerit, & cibos edere nō poterit, lenticulæ sorbitione utatur. potu uero uīno nigro q̄ maxime austero. Hic morbus maxime corripit autumnō, & tēpore fructuum pomorū. hic si quidem curatus fuerit in sex annis, satis est; Sin minus, adhæret usq; ad decē annos. Cum multis uero simul moritur, si nō statim curatus fuerit. Alius crassus morbus.

Tales crassi morbi à bile fiunt, quū bilis in hepar influxerit, & in capite consistierit. hæc igitur æger patitur. hepar intumescit, et præ tumore ad septū transversum expāditur. & dolor statim in caput irruit, maxime uero in tēpora. & auribus nō acute audit. Sæpe uero etiam oculis nō uidet. & horror ac febris corripit. Atq; hæc quidem in principio morbi ipsi fiunt, intermittētia quandoq; ualde, quandoq; minus. Quāto autem magis morbus progressus fuerit, tanto amplior dolor in corpore existit. & pupillæ oculorū dispersuntur ac hebetantur. & si digitū oculis admoueris, non sentit, eo quod non uidet. Quod autem non uidet ex hoc cognoueris, quod admoto digito non nictat. & floccos de stragulis tollit, si quos uiderit, pediculos ipsos esse putās; & quum hepar magis ad septum transuersum expāsum fuerit, delirat. & ob oculos ipsi obuersari uidētur reptilia, & omnis generis peregrinæ feræ, & milites armati pugnantes. & ipse sibi inter ipsos pugnare uidetur. & talia loquitur uelut qui uideat pugnas & bella geri, & inuadit, & minatur, si quis ipsum exire uetet. & si surrexerit, crura eleuare non potest, sed concidit. & pedes ipsius frigidi sunt. Et quū dormit, exilit à somno, & timet quū insomnia uidet horrenda. Cognoscimus aut hoc, q̄ ab insomnia exilit ac timet, postquā resipiscit. Nam insomnia denarrat, & ea quæ corpore fecit, & quæ lingua loquutus est. Atq; hæc quidē sic patitur. Quādoq; uero etiā per totam diem ac noctem uoce priuatus iacet, respirans spiritū multum aceruatū. Quum autē delirare cessauit, statim euestigio resipiscit, & si quis ipsum interroget, recte respōdet. & cognoscit ac intelligit omnia quæ dicuntur. deinde rursus post modicū tempus, in iisdē afflictionibus iacet. hic morbus accidit maxime in peregrinatione. Etsi quis alicubi per desertā uiam iter faciat, & timor ipsum ex spectro corripit. Fit etiā aliter, huic quū sic habuerit, ueratri nigri

griobolorū quinq; pōdus, in uino dulci bibendū dato. Aut hęc per clysterē in fundito. Nitri Aegyptij magnitudinē tali ouilli terito, & mellis optimi cocti di midiam heminam, & olei dimidiam heminā, in mortario ammisceto, & aquæ à betis coctis heminas quatuor per noctē sub dio expositas addito: aut si uolueris, pro beta lac asininū coctū ammisceto. & hæc mixta per clysterē immittito, siue febris habeat, siue nō. Sorbitionibus aut utatur, ptisana cocta, melle affuso. Bibat etiā mel & aquā & acetū, simul permixta, donec iudicatus fuerit morbus. Iudicatur autē in quatuordecim diebus ad summū, siue lethalis est, siue nō. Multis autem iam huiusmodi morbus sedatus, rursus redijt. Si igitur redierit, periculum est ne æger pereat. Iudicatur aut morbus in septem diebus, an lethalis sit, aut nō. Si uero has effugerit, nō ualde moritur, sed morbus in plerisq; curatus decedit. Quum aut desuerit morbus, diætā bona utatur, quiete ingerens quæ uenter suscipiat, & non cōburantur, neq; uentris profluuiū succedat. Ambonem enim hæc periculosa esse uidetur. Lauetur autē quotidie, & deambulet post cibos modice. Veste uero induatur leui ac molli. & pro tēpore anni lac & serū bibat, per quinq; ac quadraginta dies. Hæc si fecerit, celerrime sanus erit. Morbus aut grauis est, & multa cura opus habet. Alius morbus crassus. Fit à pituita putrefacta. Quod autem putrida est unde fit, ex hoc manifestū est. Bruciat ab hac quod odorē habet, uelut si quis raphanides edisset. Incipit autē fieri talis morbus à cruribus, deinde ab his ascendit ad uentrem. Et quū in uentre constitit, rursus decurrit ad uiscera. Et quum in his constitit, fugit & uomitū facit, pituitam acidam subputridam educēs. & ubi euomuit, nō habet seipsum neq; sibi cōstat æger. Deinde angustia fit circa uiscera. Quādoq; etiam in caput derepente dolor incūbit acutus. Et auribus acute audire non potest, neq; oculis uidere, præ grauitate. & sudor multis diffunditur male olens, & maxime quū dolor habuerit, & morbum leuat. Color autē ipsius arcuatus apparet, hic morbus priore paulo minus lethalis est. Huic quum ita habuerit, uentrē purgato, deorsum quidem, per hippophaes. sursum autē, per ueratrū. & caput tetragono purgato. & quum à ueratrō purgatus fuerit, postera die lacte asinino cocto subpurgato. Tertia deinde caprino cocto. & similiter quarta ac quinta. Reliquis uero uiginti diebus, lac bubulum crudum, aut etiā caprinum dato, tertia aquæ multis parte ammixta. Bibat autem lactis congiū. Post purgationē uero deorsum uersus, eadem pharmaca exhibeantur quæ hydropicis. Reliquo tēpore quū lac bibit, coenet panē exassatū. Obsoniū autem habeat, ex piscibus scorpiū, aut calionymū, aut cuculū, aut squatinge frustū cum cōdimentis coctū, ex carnibus, ouillas, aut gallinacei pulli coctas. Vinū bibat albū, si cōducatur. Sin minus, nigrū austerū. deinde post cibum deambulet, ut ne frigeat. Si quidē igitur cōducant, cibos huic dato qui dicti sunt. Si uero nō conducunt, sorbitiones datō ptisanæ aut milij. In hoc morbo si æger triginta dies transgressus fuerit, sanus fit. hi enim iudicant an lethalis sit, aut non. Est autem morbus grauis. Alius morbus crassus. Fit hic morbus à pituita alba. Congregatur autē in uentre, quum febres diuturnæ corpus occuparint. Initium hic morbus à facie sumit, & intumesce facies. deinde descendit in uentrem, & ubi in ipso constitit, uentrem magnum attollit, & corpus uelut à labore lassatur, & in uentrē grauitas inest, & dolor fortis, & pedes tument, & si pluuia in terram effundatur, pulueris odorem non sustinet. Si uero in pluuia steterit, & terram odoret, derepente cadit.

Hic morbus interquiescēs, longiore tēpore q̄ prior occupat, & tardius decedit. Curare uero ipsum oportet iisdē quibus hydropicū, fomentis uidelicet & phar-
 macis, & edulijs ac laboribus. Hic morbus per sex annos maxime obtinet. De-
 inde decedit tēporis progressu, si probe curetur, etiā si nō in principio fuerit cu-
 ratus. Est aut̄ morbus difficilis, & multa cura opus habet. Coxendicū mor-
 bus ex his maxime causis fit pleriq̄. Si quis diutius in sole uersetur, & coxen-
 dices fuerint calefacti, & humor qui est in articulis à calore fuerit resiccatus.
 Quod aut̄ id quod resiccatur, cōdensatur, ac cōstringitur, hoc mihi signum est.
 Aeger enim articulos uertere aut mouere nō potest, prae dolore qui est in ipsis,
 & eo quod uerticula sunt compacta. Dolet aut̄ maxime lumbos, & uerticula ex
 obliquo iuxta coxēdices, & genua, consistit aut̄ dolor multo tēpore in inguini-
 bus simulq̄ coxēdicibus, acutus et aestuosus, & si quis ipsum erigat, aut trāsmo-
 ueat, prae dolore eiular̄ q̄ maxime potest. Aliquando etiā conuulsio succedit, &
 rigor ac febris, fit aut̄ & à bile, & pituita, fit itē à sanguine, dolor cōsimilis uelut
 ab omnibus morbis, & rigor ac febris aliquando corripit debilis. Cæterū eum
 quia à sole hoc morbo correptus est, sic curare oportet. Corpus ipsius fomento
 humectetur, & cibi ac potus, & alia quæ exhibētur, tepida ac humida præbean-
 tur. Atq̄ hæc omnia cocta, cibo utatur maza molli, uino dulci nō subacta. Vi-
 num bibat albū, aquosum, & corpore quietē habeat, & quāuis impotens fuerit
 ut exsurgat, tamē modice singulis diebus deambulet, & ne frigeat, & nō multa
 aqua lauetur, & quū tibi bene habere uisus fuerit, & corpore humidus esse, leni
 fomēto uehementer foueto. Magis enim remittit, et condensationē ex articulis
 humectat ac relaxat. Deinde postera die cnidiū granum bibendū dato. Si uero
 non profuerit, hæc per clysterē infundito, cumini heminā dimidiā terito, &
 colocynthidem integrā paruam ac rotundā in mortario tundito ac cribrato, &
 nitri rubri Aegyptij minæ quadrantē torreto, ac terito. Atq̄ hæc in ollam cōij-
 cito, & olei heminā, mellis heminam dimidiā, uini albi heminam, & succi betæ
 quantū uidebitur affundito, & donec bonam crassitudinē habere uisa fuerint
 coquito. Deinde per linteū excolato, & si mel nō simul coquere uelis, mellis At-
 tici heminā ipsis ammiscero. Si uero Atticum nō habeas, optimi aliās cocti he-
 minam in mortario ammiscero. Si uero crassius fuerit hoc infusum, de eodē ui-
 no affundito, iustæ crassitudinis respectu habito, & per clysterē infundito. de-
 inde usq̄ ad dies tres purgari sinere oportet. Si uero pluribus diebus purgetur,
 bubuli aut caprini lactis heminas tres ebibēdas dato, deinde betas pingues nō
 falsas, condimentis cōspersas, edendas exhibeto. Ex hoc morbo multi claudi fa-
 cti sunt. Si uero à bile morbus fiat, ueratrū deorsum purgans ipsi bibendum
 dato, aut scammoniae succum, post huiusmodi uero purgationē, succi ptisanæ
 melle affuso, heminas duas exorbendas dato, postera uero aut tertia die adhi-
 bito fomento, lacte asinino cocto subpurgato. Ad uesperam autē pinguis betæ
 heminas duas edat, polēta inspersa. Vinū bibat album, aquosum, dulce, & nūc,
 & post pharmaci purgationem. Si uero à pituita ægrotet, cnidiū granū, aut
 hippophaes, adhibito prius fomēto, bibendū ipsi dato, post purgationē uero,
 eadē sorbitiones ac potus exhibeto. Itēq̄ lactis potionē. Intermedijs aut̄ die-
 bus, diætā q̄ leuissima utatur. Et si quidē ab his utilitatē sentit, bene est: Sin r-
 nus, ipsum urito multis ac profundis crustis inustis, in ossis quidē partibus,
 per fungos. In carnis aut̄, per ferramenta. Si uero à sanguine ægrotarit, fomē-

tum adhibeto, & cucurbitā affigito, et uenas in poplitibus secato. Si autem tibi uisum fuerit, etiam cnidium granū ipsi bibendum dato. Diæta uero q̄ siccissima utatur. Vinū autem ne bibat. Si uero bibere uelit, q̄ minimum & aquosissimum dato, & modice deambulare iubeto, aut si potens fuerit, plurimū. Conducit autē & à pituita ægrotanti talia facere. Si uero stare nō possit, in lecto ipsum q̄ frequentissime circūferre oportet, à quacūq; causa ægrotarit, per omnia similit̄, ut ne intus chartilago cōcrescat. Si uero cōcreuerit, & articuli conglutinati fuerint, omnino necesse est hominē claudum fieri. Et si clysterem adhibere uolueris ei qui à sanguine ægrotat, quo sanguinem ac pituitam à coxendicibus abducas, hæc infundere oportet. Salis pugillo trito, olei heminam, & de orde decocto duas heminas ammisceto, atq; sic infundito. Si enim sic curationē feceris, celerrime sanum facies. Morbus autē grauis ualde est ac diuturnus. Tetani tres. Si ob uulnus tetanus siue distentio fiat, eger hæc patitur. Maxillæ cōglutinantur, & rigent, & os aperire nō potest. & oculi lachrymātur ac detrahuntur, & dorsum conglutinatum riget, & crura flectere nequit, neq; manus, neq; spinam. Quum autē lethalis fuerit, potum & cibos quos prius accepit, aliquādo per nares reddit. Hūc quum sic habuerit, fouere oportet, & pinguius unctum, ad ignem nō ita prope calefacere, & tepefactoria illito corpori adhibere. Et ab sinthium, aut lauri folia, aut hyoscyami semē, et thus terito, deinde uino albo diluta in ollam nouā infundito, & oleum pari cū uino mensura affundito, & cum his calefactis large calidis corpus ac caput illinito. Postea super pelliceum indumentū reclinatū, ita ut pars ad quā fuit animalis caro sursum uergat, mollibus ac puris stragulis ac uestimentis contegito, quo uehemēter exsudare possit. Aquā uero mulsam tepidam, si quidē hanc bibere poterit, per os exhibeto. Si uero nō poterit, per nares infundito. Vinū autē album q̄ iucundissimū ac plurimum bibendū dato. Hoc quotidie facere oportet, donec sanus fiat. Est autē morbus grauis, & statim curatione opus habet. Opisthotonos. In distentione retrorsum fiene (opisthotonū uocant) alia quidem eadem æger patitur. Fit autem, quum tendines qui sunt retro in ceruice ægrotarit. Aegrotat autē, aut ab angina, aut ab uua, aut locis circa tonsillas suppuratis. Aliquādo etiam à capite febribus succedētibz, cōuulsio succedit, iam uero etiā à uulneribus. Hic trahitur in posteriōrē partē, & præ dolore circa dorsum ac pectora, eiulat. Hic conuellitur uehemēter, ut uix detinere possint ipsum præsentēs, ne è lecto excidat. Hic sæpe in die dolore affligitur, sæpe etiā leuius degit. Huic sic habēti eadem exhibere oportet, quæ priori. Morbus autē adheret ad summū diebus quadraginta. Si uero hos euaserit, sanus fit. Alius tetanus. Hic tetanus minus lethalis est q̄ priores. Fit autē ab iisdem. Multi uero etiam ex casu in partes posteriores, à morbo correpti sunt. patitur igitur æger hæc. Totū corpus cōuellitur. Aliquādo uero quacūq; corporis parte id cōtigerit conuellitur. & primū quidē obambulat. Postea tēporis progressu in lectū cadit. & rursus remittit & dolor, & cōuulsio, & si surrexerit, & fortassis ad paucos dies obambularit, postea rursus in iisdē afflictionibus iacet. Atq; hæc patitur ac transmutat, per multū tempus. & si quid comedit, nō secedit infra, nisi difficulter, atq; hoc cōbustū. At in pectoribus hæret cibus, & suffocationē inducit. Hūc si iisdē curaueris quibus priores, celerrime sanū facies. clysterē uero ex pūsana cocta tenui, ac melle adhibeto.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE VIRGINVM MORBIS, IANO CORNAR

rio Medico Physico interprete.



PRINCIPIUM sit mihi compositionis eorum quæ perpetua sunt in arte medica: Non enim possibile est morborū naturam cognoscere: si quidem artis est inuenire: nisi quis nouerit naturam in diuisibili, ex qua in principio discreti sunt: primum de morbo sacro appellato, & de attonitis siue syderatis, & de timoribus, ex quibus adeo fortiter pauent homines, ut delyrent, & dæmones quosdam uidere se putent, ipsi infestos, quandoq; nocte, quandoq; interdiu, aliquādo uero utroq; tempore. Postea ab huiusmodi spectris multi iam se strangulauerunt, plures autē mulieres, q̃ uiri. Est enim muliebris natura animi magis deiecti ac imminuti. Ceterum uirgines nobiles & maturæ uiro, hoc magis patiuntur, unā cum mensium descensu, antea non ualde hinc afflictae. Postea enim sanguis in uteros cōfluit, uelut effluxurus. Quū igitur osculum exitus nō fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit, propter cibos & corporis augmentum, tunc sanguis nō habens effluxum, præ multitudine resilit ad cor, & ad septum trāuersum. Quum igitur hæc repleta fuerint, cor fatuum fit, deinde ex fatuitate torpedō, postea ex torpedine delyrium apprehendit. Quemadmodum quum aliquo lōgo tempore desidente, sanguis ex coxis ac femoribus depressus, in tibias ac pedes torporem inducit. A torpore autem, pedes ad iter faciendum impotētes fiunt, donec sanguis ad seipsum reuertatur. Reuertitur autem celerrime, quum steterit in aqua frigida, quæ ultra malleolos madefaciat. Atq; hic quidem torpor facile cedit. Cito enim propter uenarum rectitudinem refluit. Et locus corporis nō est periculosus. At ex corde & septo transuerso tarde refluit. Venæ enim obliquæ sunt, & locus periculosus, et ad delyrium ac insaniam paratus. Quum enim hæc partes repletæ fuerint, & horror cum febre ingruit, erroneas febres appellant. his autem sic habētibus, præ acuta quidem inflammatione, insanit: præ putredine uero, clamat: præ caliginositate autem, timet ac formidat: præ compressione uero circa cor, strangulationes parat: præ sanguinis autem malicia, animus mœrens ac anxius malum attrahit. Sed et alium horribiliter cōpellat, et in pueros prosilire ac incidere iubet, et strangulari, tanquam meliora sint hæc, & omnem uitæ utilitatem excedentia. Aliquādo uero sine spectris ac phantasmatis, uoluptas quædam adest, ex qua mortē, uelut bonum aliquod, amat. postquam autē respuīt homo, mulieres tum alia multa, tum pretiosissimas muliebres uestes Dianæ consecrant, à uatibus id iubentibus deceptæ. Cæterum curatio ut hinc liberentur, est sanguinis detractio, si nihil fuerit quod impediāt. Ego uero iubeo uirgines quū huiusmodi patiuntur, q̃ citissime uiris cohabitare. Si enim conceperint, sanæ fiunt. Si uero huiusmodi non affuerint ipsis, simul cum puertate, aut paulo post corripientur, si non uiro nupserint. At uero ex mulieribus uiro iunctis, steriles magis hæc patiuntur.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE NATVRA MVLIBRI, IANO CORNARIO Medico Physico interprete.



De muliebri natura ac morbis hæc dico. Maxime quidem natura in hominibus causam esse. postea uero naturas mulierum, & colores. Nam quæ superalbidæ sunt, humidiores sunt & fluidiores. Nigræ uero duriores acerbioresque ac adstrictiores. Quæ uero uini colorem referunt, medium quid inter utraque habent. Sic autem & in ætatibus contingit. Iuenculæ enim humidiores sunt, & multo sanguine plerumque repletæ. Aniculæ uero sicciore, & modicum sanguinem habentes. Mediæ autem, medium quiddam inter utraque habent. Oportet autem eum qui hæc recte tractare uelit, primum quidem ex dijs ordiri. Deinde mulierum naturas discernere, itemque ætates, & tempora, & locos, in quibuscunque degunt. Frigidi enim loci, fluidi sunt. Calidi uero, sicci & stabiles. Initium autem faciam ab humido secundum naturam. Si aqua intercus in uteris oboriatur, menses pauciores ac deteriores fiunt. Deinde repente deficiunt. & uenter intumescit, & mammae siccae fiunt, & reliqua male habet. Et in uentre sibi habere uidetur, et ex his cognoscet, quod aqua inter cutem laborat. Sed et in ore uterorum significationem de se præbet. Tangentibus enim gracile apparet. & calor & aqua ipsam corripit. Quum autem tempus amplius processerit, dolor in uentre, & lumbos, ac laterum mollitudinem occupat. Hic morbus maxime fit ex abortu. Accidit item ex alijs. Quum sic habuerit, calida lauare oportet, & tepescatoria adhibere, donec dolor sedetur. pharmacum autem deorsum purgans bibendum dare oportet. post pharmacum uero, uteros bubuli stercoris fomento fouere, et postea medicamentum cum cantharide præparatum apponere. Et interpositis tribus diebus, id quod cum felle paratur. Vna uero die interposita, per triduum aceto infuso colluatur. & si quidem uenter mollis & uacuus fiat, & febres sedatae fuerint, et menses prodeant, uiro cõdormiat. Sin minus, rursus eadem facito, donec menses processant, & aliquibus subdititijs utatur. Intermedijs autem diebus crethmi corticem bibat, & pæoniæ grana nigra, & sambuci fructum, ieiuna in uino. & Mercurialem quæ plurimam edat, & allium coctum ac crudum. & cibus mollibus, & polypis, ac alijs mollibus, utatur. Si uero pepererit, sana erit. Si uteri ad hepar accesserint, muta de repete fit, et dentes cõserit, & color niger fit. patitur autem hæc de repete dum sana est. Fit autem huiusmodi affectio uirginibus maxime antiquis, et uiduis, quæ iuenculæ sunt & pepererunt, ac uiduæ manent. Quum sic habuerit, depulsione per manum infra facta, sub hepate aut sub præcordijs, fascia deligato, & aperto ore uinum odoratisimum infundito. Et graueolentia naribus adhibeto ac suffito. Sub utero uero bene olentia. Postquam autem resipuerit, pharmacum infra purgas bibendum dato, & lac asininum postea bibendum exhibeto. Deinde uteros odoratis foueto, & medicamenta cum buprestis præparata apponito. Postridie uero Netopon unguentum. Intermisis autem duobus diebus, uteros cum odoratis colluito. Et postridie pulgiu apponito. die uero una interposita, aromata suffito. Atque hæc quidem uiduæ facito. Virginem autem ut uiro cohabitaret persuadeto. ad uteros uero nihil adhibeto, neque pharmacum bibendum dato, uerum conyzam et castoreum in uino ieiunæ exhibeto.

& caput odoratis ne ungat, neque odorata olfaciat. Si uteri prociderint, & foras egressi fuerint, calor habet maxime pudenda, & sedem. Et urina paulatim destillat, ac mordet. hæc patitur si ex partu progressa uiro cōdormierit. Quum autem sic habuerit, myrti baccas & loti ramenta, in aqua coquito, & aquam per noctem sub dio exponito, & pudenda cū eo decocto quæ frigidissimo perfundito, & eadem trita pro cataplasmate adhibeto. postea bibens aquam lentium, & mel, et acetum, donec uteri fuerint eleuati, uomat. Et lectum à pedibus altiore facito, & graueolentia sub pudenda suffito, odorata uero sub nāres. Cibis uero utatur mollissimis ac frigidis. Et uinum aquosum album bibat, Ne lauetur autem, neque cum uiro dormiat. Si uero penitus ex pudēdis exciderint, dependent uelut scrotum. Et dolor corripit imum uentrem, & lumbos, & quum tempus processerit, ad locum redire non uolunt. Morbus autem corripit, quum ex partu progressa uteros doluerit, aut cū uiro in puerperij purgatione concubuerit. Quum uero sic habuerit, frigefactoria ad pudenda apponere oportet, & quod foris est depurgatū, & cum uino nigro, in quo malum punicum coctum est, ablutum, intro detrudere. Deinde mel & resinam mixta infundere. Decumbat autem supina pedes sursum extentos habens. postea spōgias imponito, & ex lumbis deligato. Quum autem sic habuerit, à cibis quidē abstineat. potu uero, quæ paucissimo utatur, donec septem dies præterierint. & si quidem sic ingredi uoluerint, bene habet: Sin minus, summas uteri oras deradito, calefacito, abluito, ac cerato picato illinito, & alligata ad scalam muliere, scalam iuxta caput pulsato, & uteros cum manu intrudito. postea crura ipsius alternatim colligato, & sic per diem ac noctem finito. & modicū ptisanæ succum frigidum dato, aliud uero nihil. Postera die decumbenti cucurbitam quæ maximam ad cōxendicem affigito, & multo tempore trahere finito. postquā uero detraxeris, ne scarificato, sed reclinatam finito, & nihil aliud quæ succum exhibeto, donec septē dies præterierint. Si uero sitiat, aquam dato frigidam quæ paucissimam. Vbi uero septem dies præterierint, cibis mollissimis ac paucissimis utatur. Si uero uētre exonerare uelit, decubens exoneret, donec quadraginta dies prætereāt, postea surgat, et parcissime obambulet, et ne lauetur, sed intra pudendum graueolentium suffitum admittat, et modica edat. Si uteri adglutinati fuerint, incumbunt, et si contigeris, uidebis locum durum sub lateris mollicie, et dolor corripit imum uentrē, & laterum mollitudinē, & lūbos, & in crura dolor irruit, eaque extendere non potest. Sepe uero etiam suppurantur, et linamentis inditis curatæ ac fluentes moriuntur, si nō uisseris, aut secueris. Quum autem sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendū dare oportet, et multa calida lauare ac fouere, et quum recens lota aut fota fuerit, iuberē ut admota manu, cum digito os uterorum abstrahat, et myrrham caloniam suffiat, rosaceo affuso. Bibat autē pæoniæ grana nigra quinq; castorio ammixto, in uino odorato. et in coxam sanam decumbat, et apponat Baccarim unguentum, aut oleum album ad coxam sanam. et edat allium plurimum, et crudum, et coctū, et succum sorbeat, et cibis mollibus utatur. postquā autem dolor quieuerit, abduces euntem super sanam coxam, postea uero fomentum ex urina adhibetō, lauro inspersa, et a fomēto cyclaminum apponito. postera die lotæ suffitus ex aromatis adhibeatur. Cæterum ex hoc morbo maxime steriles fiunt. Si complicatum fuerit os uterorum

rorum, menses non prodeunt. Si uero prodeant, pauci ac prauī sunt. Et ubi cum uiro coit, dolet. & dolor inimum uentrem tenet ac lumbos. Et si cōtingat digitis & os requirat, nō est manifestum. Quum sic habuerit, urina humana foueatur, & post fomentū lenticulæ decocto lauetur, & postquā lōta fuerit, uteri unguento Aegyptio foueantur. Et si odor ad nares ascenderit, spes est ipsam sanam fore. Et quum dormire uoluerit, Aegyptium oleum in lana subdat. Postera uero die consideret an magis correcti sint uteri. postea odoratis foueto. & purgatoria quæ non mordeant subdito, & post subditiua medicamenta, parī mensurā aceti ad aquam ammixta eluito. Quum autē menses prodierint, ieiuna et illota; & suffita, cum uiro coeat. Maxime uero ex hoc morbo steriles fiunt. Si uteri ad coxam decurrerint, & menses non procedunt, & dolor ad inimum uentrem accedit, & ad lateris mollicie. et si digito contigeris, deprehendes os in coxa. Quū ita habuerit, calida lauato, & allia plurima edenda dato. Et lac ouillum purū bibat, & postquam lac purum exhaust, fomento adhibito, postea pharmacū infra purgans exhibeto. Quum autem purgata fuerit, rursus uterōs foueto, ex feniculo & absinthio permixtis. Vbi uero recens fota fuerit, os cū digito abstrahito, & scillam apponito, & interposita die postea id quod præparatur cū narcissino adhibeto. Si uero tibi purgata esse uisa fuerit, Netopon apponito. Et postridie rosaceum unguentum. Cæterum prima mensium decurrētium die ab apponendo cessato. postera uero incipito ubi defecerint. At in mensibus si quidem sanguis eruperit, satis est: Sin minus, cantharides quatuor bibat, pedibus & alis ac capite reiectis, & pæoniæ grana nigra quinq; & sepię oua, & apij semen, cum uino. Et si dolor habuerit, & urinæ stillicidium uexarit, in aqua calida desideat. & aquā mulsam bibat aquosam. Si uero à primo non fuerit purgata, rursus bibat donec fiat. postq; autem purgatio decurrit, ieiuna cū uiro coeat. In purgatione uero mercurialem edat, & polypos coctos. & cibis mollibus utatur. Liberabitur autem à morbo, si in uentre habuerit. Si ex partu non fuerit purgata, tumet uenter & crura, & rigor ac dolor inimum uentrem, ac lumbos tenet. Quandoq; etiam ad uiscera ascendit, & animo linquitur. Atq; hæc patitur incipiente morbo. progressu uero temporis, cauæ faciei partes rubescunt. Quū igitur sic habuerit, fomento uteris adhibito, cyclaminum apponito. Bibat autē medicamentum cum tæda præparatū, donec fluxus fuerit commotus. Ad os uero uterorum, adipem anserinum illinito, & myrrham, & resinam tepidam. & q; maxime deambulet, & ante cibū Mercurialem coctam edat, & allium ac porrum, & brassicæ succum sorbeat. & cibis mollibus utatur, & magis marinis. & calida lauetur. A pinguibus autem & dulcibus abstineat, donec sana fiat. Si uteri pituita impleti fuerint, flatus oboritur, et menses albi pituitosi superueniunt. Aliquando etiam sanguis tenuis pelliculis plenus. et præ humiditate cum uiro coire non uult. & pallida ac tenuis fit. Interrogare igitur ipsum oportet, an quod fuit mordeat & exulceret. & si non mordeat, pronunciare à cerebro fluxum esse. Si uero mordeat, à uentre. Si quidem igitur à uentre fuerit, à lenticulæ decocto uomat. Deinde ueratro purgato. postea idē in nares immittito. Postq; autem superior uenter tibi purgatus esse uidebitur, pharmacum infra purgans bibendum dato. A cibis autē pinguibus ac dulcibus abstineat. Acres autē exhibeantur, uelut commodi, nisi pudenda fuerint exulcerata. præstant autem fri

gidi. Et modice lauetur, non tamen calida, neq; caput. Ieiuna uero bibat hypericum, semen apij, saluiam, in uino aquoso. Quū autem cessauerit fluxus, cū succo grossorum eluito, & postea acerbis colluito. Est autem morbus grauis. Si uteri inflammati fuerint menses omnino non prodeunt, aut prauī & paucī. Et quum ieiuna est, uomitus ipsam corripit. Vbi uero quid ederit, uomit cibos. & dolor imum uentrē ac lumbos habet, & animi deliquiū inuadit. Venter autem aliquādo durus, aliquādo mollis est, & inflatur ac magnus fit. & putat se in uentre habere. Si uero cōtigerit, plenitudo illa uacua fit. Huic usq; ad decimū mensem tumor paulatim augetur, uelut in uentre habenti. Vbi uero decem menses præterierint, uenter aqua impletur, & umbilicus eminet. Et si digitum admoueris, os uteri gracile & collapsum cōperies. Et ubi menses apparuerint, pauci sunt & prauī. Et clauiculæ ac collum attenuantur. Et pedes intumescunt. Quū igitur sic habuerit, pharmacū infra purgans bibendū dato. & ad uteros quæ purgant & non mordent apponito. Et post appositionē uteros eluito, pari mēsurā aceti acerrimi ad aquā ammixta. & Mercurialem edat, & succū eius farina inspersa, ubi cocta fuerit absorbeat. Morbus autē est periculosus. Si ignis sacer erysipelas dictus in uteris oboriatur, tumor fit à pedibus exorsus, & ad crura & ad lumbos procedens. Quum autē tempus amplius processerit, intumescit etiam uenter, & rigor ac febris corripit, itemq; debilitas. Præ dolore uero, quiescere non potest, sed iactat seipsam. Dolor autē ex imo uentre ascendit ad lumbos, postea sursum uergit ad præcordia, & pectora, & caput. Et mori sibi uidetur. Quū autem remiserit, torpor occupat manus. Aliquando etiam inguina & crura, & poplites, & liuida fit, & modico quādoq; tempore sibi melius habere uidetur. Deinde rursus eadem patitur. & corpus pustulis impletur. & facies rubescit, & sitis fortis tenet, & fauces sicce sunt. Hic morbus si prægnanti fiat, moritur. Sin minus, curata sanatur. Quū igitur sic habuerit, adhibere oportet, si dolor habeat, frigefactoria, & uentrem turbare. Et si quidem in uentre habeat, cibus ac potibus utatur, à quibus foetus non corrumpitur. Si uero non secedant, clysterem adhibeto. Si autem in uentre non habuerit, pharmacum bibendum dato. & cibus paucissimis utatur mollissimis ac frigidis. & Mercurialem edat, & sambucū. & neq; salsa, neq; pinguis, neq; acris, uelut est origanum, aut thymus, aut ruta. Postquam autem calor & strangulatio remiserit, & tumor non fuerit sedatus, medicamentum fortius infra purgans postea bibendum dato. Morbum autem hunc paucae effugiunt. Si uteri præter naturam hient, & menses plus quàm oportet prodeunt, uiscosioresq; ac frequentiores. & genitura non manet intus. Et si digito contigeris, os hians cōperies. & febris ac rigor & dolor, imum uentrem & lumbos corripit. Hic morbus à fluxu sanguinolento corripit. fit autem quum menses suppressi derepente eruperint. Huic quum dolor maxime habuerit, tepefactoria apponito. Et quum remiserit, uteros foueto. & pharmacum infra purgans bibendum dato. Et quæ non mordent subdito. & post subditiua medicamenta, cum acerbis colluito. & quàm minimū lauato. Cibus autem siccissimis utatur. Si uero his factis sana non fiat, pharmacum bibendum dato, à quo sursum ac deorsum purgetur. Et quum menses moti fuerint, & quū quiesuerint, eiusdem modi uictum exhibeto. Morbus autem lethalis est. Si uteri ad medium lumborum processerint, dolor imum uentrem habet, & crura contrahunt.

trahuntur. & quum aluum exonerat, dolores acutiores fiunt, & sterus cum ui
 prodit, & urina destillat, & animo linquitur. Quum sic habuerit, fistula ad ues
 sicam alligata uteros sufflato, & fomentum adhibeto. Aut multo calido lauato,
 & male olentia sub pudenda sufflato. Sub nares autem odorata. Quum autē do
 lor cessarit, lenticulæ decocto præpotato, pharmacum sursum purgans bibendū
 dato, à quo uenter moueatur. postq̃ autem uteri ad locū suum redierint,
 medicamentum infra purgans bibendum exhibeto. & postea lac bibendū da
 to. Postea fomento ad uteros adhibito ex uino, medicamēta cum lauro præpa
 rata immittito, & apponito quæ non mordent, ammixto aceto. Postea aroma
 ta sufflato. Cæterum steriles & claudæ fiunt ex hoc morbo. Quum fluxus
 albus obortus fuerit, uelut urina asinina apparet. Et dolor in uentrē habet,
 & lumbos, & lateris mollitudinem. & tumores sunt crurum ac manuum, & ca
 ua eleuantur. & oculi humidi sunt, & color arcuatus ac albus fit. Et quū iter fa
 cit, anhelat. Morbus autem fit, si ubi natura pituitosa est, febricitarit, & bilis cō
 mota purgata non fuerit. Si quidem igitur uenter acuerit, uentris profluuiā fi
 unt. Si uero ad uteros uertatur, fluxus fit. Postquā igitur uentris profluuiū ha
 buerit, papaueris albi ac rubri corticem pari pondere, & spinæ fructum in uino
 diluto terito, & polenta recenti inspersa bibat. Si uero uelis, malicorium calido
 cinere torrefactum ac tritum ex uino bibat, pari polenta ac farina inspersa. Mi
 nimus uero lauetur. Cibis autem utatur q̃ siccissimis ac frigidis. Vbi uero flu
 xus quieuerit, pharmacum bibendum dato, à quo superna purgentur, & lac asi
 ninum bibat. Postquā autem infra purgata fuerit, bubulū lac bibat, ad dies qua
 draginta, si poterit meracum, sub dio per noctem expositum, quarta aquæ par
 te ammixta. Vespere uero ubi ebibit, alicam sorbeat. Quum autem decem dies
 fuerint transacti, lactis & aquæ decimam partem detrahit. Quantum autē de
 traxeris, tantam tepidi recens mulcti portionem additam bibat, postridie uē
 ro duas portiones, ut in decem portionibus pro modico diluto sit meracū, &
 ad quatuor dies bibat. Dum autem decimam partem detrahit, etiam de sorbi
 tione amplius addat. Postquam autē quatuordecim dies transegerit decimam
 lactis partem bibens, postea tertiam aquæ partem affundens, ad dies decem bi
 bat, & cibis utatur, & sic fiant omnes dies quadraginta. Quum conceperit
 & uterum ac partus gestarit, ea quæ natura sterilis est, primū quidem mēses
 deficiunt, & pauciores fiunt, & tēpus in quo prius fiebant, transmittūt. Postea
 derepente multi fiunt, & puri ac fortes. & si quidem semel facti fuerint, de cæte
 ro secundum rationem in uentrē habet. Sin minus, & primū fiunt & iterum
 atq̃ iterum in mēse, postea ex seipso desinet fluxus, pallidatq̃ ac tenuis fit. Phar
 macum igitur & sursum & deorsum purgans bibendū dare oportet. Et lac asi
 ninum postea bibendum aut serum. Postea adhibito fomento, uteros medica
 mento quod non mordeat purgato. Deinde cum aceto colluito. Postea aroma
 ta sufflato. Hæc autem facito ut prima mēsum die facta sint. Et ne sit illota & im
 pasta, cyceonem insulsum crassum bibens, & aromatis suffiatur, netopo affuso
 & unguento rosaceo. Postea cum uiro coeat. Si acetabula pituita plena fue
 rint, menses quidem bene succedunt, & in uentre habet. Corrumpit autem foe
 tum ubi fortior factus fuerit. Non enim retinere potest, sed abrūpitur. Cogne
 ueris autē hoc modo. Humida fit, & mucosum ac uiscosum defluit, & nō mor
 det

det. & in mensibus ubi à fluxu purgari cessauerit, per duos ac tres dies muclab
uteris prodeunt. Hâc grossorū succo eluito, & collutione per acerba postea bis
aut ter facta. de cætero apponito id à quo pituita purgatur. & mollia fomenta
adhibeto. Et post subdititia apposita, pari mensura aceti ad aquâ ammixta elui
to. & in mensibus aromata suffito. postea impasta & illota cum uiro dormiat.

Quum menses occultati fuerint, dolor inuē uentrem tenet, & onus incum
bere ipsi uidetur, & lumbos dolet, ac laterum mollitudinem. Quū uero ad præ
cordia uteri allapsi fuerint, suffocant. & ubi frequenter acida euomuit, ad modi
cum tempus melius habet. Dolor autē & ad caput & ad collū procedit. Postq̃
igitur allapsum parant, aut allapsi sunt, tepefactoria adhibeto; & graueolentia
suffito, infra autem odorata. & castorium bibēdum dato, & conyzam. Vbi ue
ro deorsum prociderint, infra graueolentia suffito. sub nares autē odorata. Ses
datis autem doloribus, pharmacum bibendū dato. Et lac asininū postea bibens
dum. Deinde succum à quo uomāt dato, & ad nares apponito. Postquā autem
purgaueris, fomēto uteris adhibito ex his quæ cū lauro præparantur, id quod
ex narcisso præparatur apponito. Et tribus interpositis diebus, fomento adhi
bito, id quod ex cantharide præparatur apponito, & postera die adipem anseri
num. postea intermissis tribus diebus, collutione cū aceto parata eluito. In pur
gationibus autem, mercurialem ante cibos edat, & cibis mollissimis utatur, &
acria edat. Et bis in die calida lauetur. Si uero menses non fiant, ubi hæc oppor
tuno tempore feceris, cantharides bibēdas dato. & postquā prodierint, ieiuna
& illota, ac suffita, cum uiro dormiat. Quum in uentre habens, foetum mens
struum aut bimestrem corruerit, & ad perfectionem gestare non poterit, & te
nuis præter naturam fiat. Huius uteros purgare oportet ac corpus pingueface
re. Non enim prius foetum perferre poterit, q̃ uteri ipsius crassi fiant, & robu
sti euadāt. Si uero crassifac̃ta fuerit mulier præter naturam, nō concipit in uen
tre. Nam omentum multum ac crassum incūbens uteros deprimit, & geniturā
non suscipit. Hanc attenuare oportet, & pharmacum infra purgans bibendum
dare. & ad uteros apponere quod purget ipsos, & flatus inducat. Si uero os
uterorum durum fiat, aut ceruix, digito intromisso id cognosces. Itemq̃ si ad
coxam fuerint auersi. Quum sic habuerint, nihil acre adhibeto. Si enim os exul
ceraueris, ubi inflammatum fuerit, periculum est ne penitus sterilis fiat. Verum
apponito quæ non mordent, à quibus purgetur. Si mulierem parere non po
tentem purgare uelis, & fuerit biliosa aut pituitosa. Cognosces autem utrū ho
rum sit, si arena substrata quum mēses fiunt, in sole sanguinem superfundas, ac
siccari sinas. Si enim biliosa fuerit, supra arenā sanguis pallidus erit. Si uero pi
tuitosa, uelut mucus erit. Et sanē utrum horum fuerit, infra purgato, & ad ute
ros subdititia apponito. Si menses omnino non fiant, si quidē præ dolore
id contingat, primum uentrem infra purgato, deinde medicamētum à quo san
guis ex uteris purgatur apponito. postea intermissa die una aut altera, rursus id
à quo sanguis purgatur apponito. Reliquo uero tempore corticem crethmi in
uino tritum bibat. Si humidius fuerit os uterorum quàm oportet, acria ap
ponito, quo morsum perreptet, & inflammatū ualde durum fiat. Si uero indu
ratum fuerit, acria adhibeto. Mordentia enim saniem diffundunt. Deinde mol
lia apponito. Sed & ad alios morbos non minus apponito. Si puerperæ
uteri

uteri in coxam incubuerint, aut ad lateris mollitudinem, ad sanam coxam oleum Aegyptium album, aut haccharim unguentum apponere oportet. & in sanam coxam decumbat, & pæoniæ grana nigra quinq; bibat, & fructus sambuci conchæ testam maiorem, & castorij magnitudinem fabæ in uino. postea lota suffiatur. & potibus ac cibis mollibus utatur, & mercuriali. & acribus omnibus, excepto raphano ac cepis.

Quum suffocarint uteri, graueolentia omnia suffire oportet, bitumen uidelicet, sulphur, cornu, lucernarium funiculum, phocæ adipem, castorium. Odorata uero subter pudenda.

Si uero puerperæ inflammāti fuerint uteri, ardet, & suffocatio habet. Quum autem sic habuerit, muscum marinum tenuem tritum super linteolo extentum pro cataplasma te adhibeto. postea crudam ordeaceam farinam, & cinerem sarmētitiū, ac lini semen, oleo & aceto affuso coquito, donec uelut farinæ subactæ massa fiat. Deinde quàm calidissima ferre potest imo uētri imposito.

Si uero fixi fuerint uteri, lentem & mentam multam in aceto coquito, ut uaporē inde in os trahat, & nares adhibeat. & graueolentia suffito. & mercurialem edat, & in succo eius farinam coctam sorbeat. Quā celerrime aut & priusquā dolor occupet, exhibere oportet pharmaca, quæ uteros à dolore leuant, & cibos per aluū secēdentes assumat. Si uero uenter calefiat, clysterem adhibeto.

Si ex partu inflammāti fuerint uteri, solani succum in pudenda infundito. & ubi hic calidus factus est, alium infundito, Si uero hic non fuerit, lentisci aut rhamni, aut betæ, aut cucurbitæ succum expressum infunde. & quod in medio huius est tenerrimum, dera sum longa forma inde. postea cerusam aqua tritam & lana exceptam appone. Si uero horruerit, tolle.

Si mulier ab utero debilis sit, & bilis ipsam suffocet, & opus sit ipsam leuiter purgare, & dolorem sedare, peucedani succū trium cyathorum mensura bibendum dato.

Si in lumbis aut lateris mollitudine fuerint uteri, & transmouere uelis, sulphur & bitumen terito, & melle cocto affuso, glandulam crassam facito, & in sedem indito. & uteri si sicci fiāt, hæc quàm celerrime apponito.

Mulier si uteri sicci fiant, & ad pudenda promineant, & inguina dura fiant, & calor in pudendis insit, cancerari incipit. Quum sic habuerit, cucumeris syluestris internam partem aridam terere oportet, & aquæ hemina affusa, in sedem immittere, & purgari sinere donec purgetur.

Quum autem mulieri pharmacū dederis, ammisce ad pharmacum ea quæ uteros purgant, & quæ expellunt.

Potiones, & subdititia medicamenta, quæ secundas educere, & menses detrahare possunt.

CAntharides quinq; auulsis alis & pedibus ac capite, deinde tribolos ad mare nascētes unā cū radice, mensuram quanta est conchæ testa terito. & anthemī pallidam siue luteam internam partē siccā tritam, cōchæ testam addito, & seminis apij tantundē, & sepiæ oua quindecim, & in uino dulci diluto bibenda dato. & quum dolor habuerit, in aqua calida desideat, & aquam mulsam aquosam bibat.

Aliud. Ranunculi foliorum & floris triti Aegini stateris pondus, in uino dulci bibat. Quum autem dolor habuerit, cicer album & tuas passas in aqua coquito, & perfrigeratam bibendam dato. & ubi urinæ stillididum uexarit, in aqua tepida desideat.

Aliud. Adianti staterem Aeginæ um, in uino albo pari aqua ammixta, bibendum dato. Aliud. Violæ albæ

B ; semen

semen quantum tribus digitis apprehēdi potest, in uino albo eodē modo temperato, bibēdum dato. Aliud. Leucōij nigri radicem, in uino eodem modo sumat. Aliud. Crinanthemum quod in domibus nascitur, eodem modo misceto ac bibēdum dato. Aliud. Anchusæ foliorum pugillos duos, in uino albo æquali aqua ammixta, bibendos dato. Aliud. Chamæleonis radicem, uelut ueratri potionem, derafam in uino albo, aqua pari mensura ammixta, bibendam dato. Aliud. Brasicæ & porri succum, ad utrunq; fueci filij obolis tribus ammixtis, ex uino albo cū pari aqua bibendū dato. Aliud.

Oliuas albas priusquā oleum insit cōpunctas siccato, postea tufas & cribratas ac in uinum iniectas bibendas dato. Hoc & menses detrahit, & secundam expellit. Aliud. Dictamni cretici obolum in aqua bibendum dato. Et si hoc in potu dato, secundam eijcere non potes, sambuci succo cocto immisso fomento, & cantharidem apponito. Hoc etiā foetum expellit. Quum autem morsum intulerit, auferat, & rosaceo unguento tinctum apponat donec elapsa fuerit.

Aliud. Populi nigrae creticae grana nouem trita, in uino bibēda dato. Cum hoc etiam abluatur, si difficulter pariat. Aliud. Conyzæ testam conchæ maiorem cum porri succo diluito, & netopi testam conchæ maiorem ammisceto, & hæc in uino bibenda dato. Aliud quod menses detrahit. Peucedanum & panaces, & pæoniæ radicem, in uino bibēda dato. Aliud quod foetū mortuum & secundas eijcit. Viola & portulacæ semen contundito ac misceto, & in uino albo ueteri exhibeto. Aliud quod menses detrahit. Seminis uiolæ albæ quantum tribus digitis apprehendi potest, & stercoris caprini pilulas quinque aut sex, in uino odoratissimo permisceto, & bibenda dato, ubi prius fomentum ex aqua & oleo immiseris. Adhibeto autem fomentum in sella, & ubi hæc bibit, quā celerrime lotam reclinato. Brasicam uero edendam exhibeto, & succum eius sorbendum. Aliud. Seminis uiolæ albæ quātum tribus digitis apprehendi potest, in uino bibendum dato. & in aqua calida desideat. Si uero id nō habeat, foeniculi radices cōtusas, in aqua multa tepida macerato, & exhibeto. Aliud. Fraxini grana decem, in uino bibēda dato. Hoc in omni uterorum morbo commodum est, & ualde ciet urinam. Aliud. Succum filij magnitudine erui, & nasturtij semen terito ac ammisceto, & in uino aut lacte canino bibenda exhibeto. Hoc etiam foetū expellit. Aliud foetum eijciēs.

Ranunculum herbam, & parum elaterij, in aceto temperato mixta bibenda dato. Aliud ad idem. Brasicæ caulem tenerum, extremitate ex netopo illita, affricato. Aliud si menses non fiant. Terebinthi fructum tritū, in uino & aqua dilutū ac excolatum, ieiunæ bibendum dato, & calida lauetur. Aliud menses ciens. Rubra pæoniæ grana, in uino ieiunæ bibēda dato. Aliud ad puerperij purgamēta purganda. Foeniculi semen, & crethmi corticē, & thus, in uino bibenda dato. Aliud. Tædam q̄p pinguisimam in uino coquito, & pæoniæ grana quinque in uino terito, & heminae quadrantē bibendum dato. Aliud. Mercurialis semen & folia, in uino bibenda præbeto. Aliud.

Pæoniæ grana nigra quinque, & sepiæ oua in uino bibenda dato. Ad omnem puerperam. Ad irionē & polentam, oleū affunde, & coctū sorbeat, & cibis q̄p mollissimis utatur. Aliud. Scāmoniam in lacte muliebri trita, lana exceptam appone. Aliud. Mercurialis folia trita in linteo subde. Aliud.

Herbam

Herbam artemisiā tritam, & unguento rosaceo imbutā appone. Aliud.

Albam radicē tritam ac rosaceo unguento subactā appone. Aliud. Pæonia radicem melle, unguento rosaceo & Aegyptio subactam, in lana subde.

Aliud. Farinā non lotam eodem appone. Aliud. Lolij & tritici farinā, simul melle subactas, in lana subde. Aliud quod menses et puerperij purgamentā purgat & aquam ducit. Radicis struthij tusi triti quātum tribus digitis apprehendi potest, melle subactum appone. Nascitur aut in Andro in littoribus.

Aliud ad uteros depurgādos. Mercurialis cōtusā, & cucumeris syluestris modicū, in uino tere, & melle subacta appone. Aliud. Pilos leporis cōbustos, ac tritos in uino, & melle cocto & aqua subactos, bibēdos dato, & aqua calida lauētur. Aliud partus purgatoriū. Polentā crassius fresam dimidij hemichœnicis mensura, in aquā heminis quatuor coquito, & ubi efferbuerit, bis aut ter sorbendā dato. Aliud purgās puerperij purgamenta. Sambuci folia coquito, & oleo affuso bibēda dato. Edat & brassicas coctas, & porrū. Aliud purgans uteros. Rhœis folia & irionem terito, & in uino, polentā inspersa, bibēda dato. Aliud. Misyos obolos duos tritos & uino subactos apponito.

Aliud. Lini semen tritū, uino subactū apponito. Aliud. Trifolij semen in uino bibēdum dato. Si uero ad lumbos uteri incubuerint, polypos coctos edat, itemq; assatos, & uinum bibat nigrum, odoratū, meracum q̄ plurimum.

Aliæ potiones, medicamentā subdititia ac purgatoria. Rhoem rubrum, & uinacea, in aqua coquito, & farina tritici recentis in aquam inspersa, bibendam dato. Aliud. Farinam in aquā iniectam bibendā dato. Aliud. Mora rubi ficcato ac terito, & polenta recēti ammixta, amborū acetabuli mēsuram, in uino odorato & aquoso, bibat. Aliud. Terram nigram samiam in aqua tritā, tali magnitudine bibendam præbeto. Aliud. Hypocistidem in uino bibendam dato. Aliud. Mala punica uinosa exsuccato, & polentā cū succo subactam ficcato. Postea tritam in uino bibendam dato. Aliud. Baccas myrti nigras tritas in aqua diluito, & polenta inspersa, bibēdas exhibeto. Aliud. Mali punici dulcis assati drachmā, in uino tritā bibēdam dato. Aliud. Triticū & ordeum torrefacta, trita, & ad farinā redacta, in uino nigro bibēda dato. Aliud.

Mali punici dulcis internam partem, pari aqua ammixta bibendam dato. Aliud. Cicutæ quantū tribus digitis apprehendi potest, cū aqua bibendū dato. Aliud. Farinæ tritici recentis, & gypsi, æquales partes mixtas in aqua bibendas dato. Aliud. Mali punici dulcis corticē ac corium, in uino bibendū dato. Aliud, si sanguis ex uteris fluat. Vitis folia in uino nigro bibenda dato. Aliud, ad fluxū ac dolorem. Rosmarini radicē in uino bibendam dato. Alias item potiones ad uteros habes. Cedri fructus, seseli, cuminum Aethiopicū, casia fructum, iuniperi baccas, milium, lentisci fructum, nigellam, dauci radicē ac semen. Aromata uero, thymū, thymbrā, ericē, hypericū, papauer album, crethmi radices ac semen, maluę radices, mercurialis semen, & folia, urticae semen, saluiam, populū nigram, dictamnū, pseudodictamnū, amomum, cardamomū, heleniū, aristolochiam, castoriū, adiantū, draconitū, peucedanū, rutæ folia, ac semē, apij semē, foeniculi semē, hipposelinī semē & radices, hippomarathri semen & radices, struthij semē & radices, hyssopū ciliciū, irionē, pæoniā, panaces. Quodcūq; horū uolueris, & cū altero permixtū, & per se in uino

aut aqua prout uolueris coctum, exhibeto bibendum. *Commoda sunt & purgatoria, & quæ dolores sedant.* Maluæ radicem in aqua dato. Aliud.

Pæoniæ semen modico cedrino oleo ammixto, in uino bibendum dato. Et uterorum dolores sedabis. Aliud, quum uteri suffocarint. Castorium & conyzam in uino albo bibenda dato. Si uero ad nares accesserint, cniidij internam partem albam, melle ammixto, naribus illinito. Aliud sedans dolores. Maluæ radicem, & foeniculi ac crethmi corticem, ex aqua bibenda dato. Aliud.

Stellas marinas nigras, & brasicam misceto, & in uino odorato bibenda præbeto. Aliud. Myrrhæ obolos tres, coriandri parum, refinam, pæoniæ radicem, cuminum Aethiopicum, hæc trita in uino albo diluta, leuiter tepefacta bibenda dato. Aliud, quod secundas expellit. Ricini radicem bibendam dato.

Aliud, si ad cor allapsi uteri strangularint. Vitis & pæoniæ semen, in uino bibendum dato. Apposititia acria sanguinem ducetia. Cantharidas

quinque thuri ac myrrhæ ammisceto, & glandulam longam magnitudine gallæ formato, & lana obuolutam linteo albo circumdato, & unguento Aegypto albo aut rosaceo madefactam apponito. Aliud. Buprestim si parua fuerit, totam, si magna, dimidiam, ad prædicta ammisceto, & eodem modo apponito. Si uero mollioribus uti uelint, buprestidas in uinum mitte, & cuminum Aethiopicum, & seseli, ac anisum addito ac feruefacito, ad decem uero buprestidas, acetabulum olei ammisceto, reliquis omnibus æquali portione acceptis. Ammisceto etiam myrrhæ ac thuris parum. Ex hoc pugillum accipito, & uelut priorem glandulam subdito. Aliud. Nigellam terito cum melle, & uino subactam in glandulam redigito, ac utere uelut superiore. Aliud. Philistium eodem modo præparatum apponito. Aliud. Telephium eodem modo præparatum subdito. Aliud. Anemonæ folia trita linteo excipito, & myrrhæ parum ammisceto, & eodem modo utitor. Aliud, quod sanguinem ducit. Glandem Aegyptiæ terito, & fusinū unguetum quod est in terra Aegypcia addito, & aqua diluta, ac lana inuoluta apponito. Aliud bilem purganis. Cucumeris syluestris medullam tritam, ac melle subactā, & ad glandis formā redactam apponito. Aliud.

Colocynthidis syluestris internā partem terito, & melle subactā eodem modo subdito. Aliud. Elaterij portiones quatuor, adipe anserino & caprino, & misy ammixto, in glandulam formato, & in linteo apponito. Aliud. Thlaspi tritum, & melle imbutum apponito. Aliud. Foliorum fici saniem decuradito, & elaterij portiones duas ammisceto, & nitri tantundem, melleque subacta apponito. Aliud, si uteri inflammati fuerint. Nitrum rubrum, ficus pinguedinem internā, utriusque pares portiones tritas, & ad gallæ magnitudinem efformatas subdito. Aliud. Cumini folia cum uino trita, in linteo subdito. Aliud. Radicem albā terito, & melle affuso feruefacito, & glandulam inde factā subdito. Aliud. Succū silphij, et sicū, mixta in glandē formata apponito. Aliud. Cucumeris syluestris semen tritū eodem modo. Aliud. Fel tauri, nitrum rubrum, netopon, cyclaminū terito, et de singulis gallæ magnitudinē, de cyclamino uero plurimū, melli ammisceto et apponito. Aliud. Cyclamini caput purgatū, in aqua tritū ac linteo illigatū apponito. Aliud. Myrrhā, salē, cuminū, fel tauri, hæc melle subacta ac linteo excepta subdito. Aliud. Grana cniidia triginta deligito, et tria Indici pharmaci oculorum, quod piper uocatur, et alia

tria de rotundis. Hæc tria in uino ueteri trita, & oleo dulci diluta ac subacta, la-
 naq; excepta subdat, & urina eluatur. Aliud. Tithymali succū melle sub-
 actum, ac linteo exceptum apponito. Aliud. Scillæ radicem longitudine
 digitorū sex sumito, & duobus digitis lana obuolutis subdito. Alia molli-
 entia, à quibus aqua purgatur, & sanguis ac menses ducuntur, si nō diuturni fue-
 rint, & os uteri mollietur. Narcissinum, cuminum Aethiopicum, thus, ab-
 sinthium, cyperum: aliorum quidem singulorū æquales portiones sumito, nar-
 cissini uero partes quatuor. Hæc trita & in glandulam efformata, linteoq; cru-
 di lini excepta apponito. Aliud. Cyclaminum magnitudine tali, & florem
 æris magnitudine fabæ terito, melle subigito, & efformatam hinc glandulam
 subdito. Aliud. Pulegium, myrrham, thus, fel suillum, melle subigito, & in
 glandulam efformata subdito. Alia acerba. Rhoem uino nigro subac-
 tum apponito. Aliud. Cnicum eodē modo præparatū subdito. Aliud.
 Loti ramenta eodē modo apponito. Aliud. Rhoem melle ammixto sub-
 dito. Alia mollientia. Sulphur, adipem, uitellum oui, farinā, melle sub-
 igē, & tepēfacta in lana subde. Aliud. Pinguedinem anseris, adipem ouillū,
 ceram albā, resinam, unguentū rosaceū, tenui linteo excepta appone. Aliud.
 Medullam cerui & adipem liquefacito, & in lana apponito. Aliud. Adi-
 pem ouillum aut caprinum, & oui candidū, rosaceo unguetō subactum, ac lana
 exceptum apponito. Quæ ad eluendos uteros infunduntur. Grossos
 hybernos in aquam missos ad lentum ignem coquito, & oleo ad decoctum as-
 fuso eluito. Deinde uero malicoriū, & gallam, & loti ramēta, in uino acerbo co-
 quito, & hoc excolatū infundito. Aliud. Fecem uini combustam in aquam
 mitte, & postea cum aqua collue. deinde malicorio, myrti baccis, folijs rhois in
 uino coctis, uinum excolatum infunde. Aliud. Lentisci, saluiæ, hyperici fo-
 lia, in uino nigro coquito, ac infundito. Aliud. Si quid in uteris fuerit exul-
 ceratum. Butyrum, thus, myrrham, resinæ parum, infunde. Aliud. Porrum
 in aqua coquito, & excolatam aquam ad uinū ammixtam infundito. Aliud.
 Sambuci fructum, anisum, thus, myrrham, uinum, sumito & horum succum
 infundito. Aliud. Brasicā in aqua coquito, & in brasicæ succo, mercuria-
 lem coquito, modico lini semine adiecto. et postea excolatū infundito. Aliud.
 Myrrhæ acetabulum, thus, fesele, anisum, semen lini, netopum, resinam, mel,
 pinguedinem anseris, acetū album Aegyptium, horū singulorum æquales por-
 tiones terito, et in uini albi heminis duabus diluito, et postea tepida infundito.
 Aliud. Mercurialē in aqua coquito ac excolato, & myrrhæ acetabulū, thu-
 ris, netopi, singulorū æquas portiones ammisceto, ac tepida infundito. Aliud.
 Saluiā & hypericū in aqua coquito, ac infundito. Aliud. Sābuci fructū, &
 lauri baccas, æquis portiōib. in uino coquito, deinde uinū infundito. Aliud.
 Pulegiū in aqua coquito, & oleo ad aquā affuso immittito. Aliud. Pingue-
 dinē anseris, & resinā, colliquefacta infundito. Aliud. Butyrū, oleū cedrinū
 modicū, cū melle liquefacito, & tepida infundito. Aliud. Cyperū, iuncū ro-
 tundū odoratū, calamū aromaticū, pari portione myrrhæ ammisceto, & cū his
 Sisymbriū in uino coquito, ac infundito. Aliud. Semē apri, anisi, fesele, nigel-
 lam, in uino coquito ac infundito. Aliud. Cedrū creticam in uino coctā in-
 funde. Aliud. Bryoniam albam et myrrhā, in aqua diluta infunde. Aliud.

189 Argenti florem cum uino et aqua infunde. Aliud. Elaterij potiones duæ aqua dilutas infunde. Aliud. Cucurbitas siue colocynthidas syluestres duas, in uini aut lactis cocti heminis quatuor madefacito, excolato, ac infundito.

492 Aliud. Cucumeris syluestris medullâ palmi parui magnitudine, in aquæ heminis quatuor coquito, et melle ac oleo affuso infundito. Aliud. Radicis thapsiæ duas potiones, et mel ac oleum, in duabus aquæ heminis diluito ac infundito. Aliud. Veratri duas potiones in duabus aquæ heminis tepide infundito. Aliud. Thlaspios acetabulū melle admixto, in duabus aquæ heminis diluito, ac tepide infundito. Aliud. Cucumeris syluestris magnitudinem palmi parui, in aquæ heminis quinque coquito, et melle affuso infundito.

189 Aliud. Grana cnidia sexaginta, oleo et melle diluta infundito. Aliud. Si natura pituitosa fuerit. Cneori potionē tritam, in aquæ mulsæ hemina Aeginaea diluito, ac infundito. Aliud. Si biliosa fuerit. Daphnes potionē odoratæ illius drachmæ pondus, scāmōniæ potionē, terito et in aquæ mulsæ, aut aquæ uuæ passæ hemina Attica diluito. Aliud. Daphnoidis potionē eodem modo, et si biliosa fuerit, hæc infunde. Si uero pituitosa, grana cnidia electa, & succi tithymali potionē infundito. Similiter etiā cneoro, et peplo, utrisque his uti oportet. Immittito aut cum infuso nō ampliore quæ duarum heminarū. Sufficitus porro sunt hæc contusa. Gallam suffito. Aliud. Ramenta lotiad oleæ folia sicca contusa misceto, et oleo subacta suffito. Aliud. Prunas subijcito, et ordeï paleis humidis inspersis suffitū facito. Aliud. Superamphoræ oleariæ operculo stœben incēdito. Aliud. Cupressi ramēta suffito. Aliud.

189 Scammoniam, myrrhā, thus, unguento affuso suffito. Aliud. Bitumen, et ordeï paleas misceto, ac addita pinguedine phocæ suffito. Aliud. Fraxinū, cupressi ramēta, cyperi radicē, unguēto rosaceo subacta suffito. Aliud. Calamum, cyperum, bryoniam, muscū arboreum, apij semen, anisum, simul mixta & unguēto rosaceo subacta suffito. Aliud. Resinā siccam cineri feruido inspersam suffito. Aliud. Cinamomū, myrrham, casiam, paribus singula portionibus suffito. Aliud. Crocū ammixta myrrha, et musco, æquali cum croco portione suffito. Aliud. Calamum, cneorū, crocum, folia rosarū rubra suaue olentia trita et siccata ad crocū ammisceto, et styracē dimidia croci portione addito. Hæc trita mixta & siccata, melle cocto modico subigito. Horū uero omnium suffitus sit oboli Attici pondus. Suffiantur aut super stercore bubulo, Formetur autem stercus uelut acetabulum olearium, habeatque fundum tenue, et sit siccum. Ignis autem sit sarmentitius, in quo stercus iaceat, et ex illo mulier insidens contecta suffiatur. Aliud. Galbanum, resinam, mannam, unguento rosaceo subacta suffito. Aliud. Panacis et cupressi ramenta, unguento Aegyptio albo subacta suffito. Aliud. Cinamomū, nardum & myrrhā unguento rosaceo imbuta suffito. Aliud. Violæ albæ semen, cedri ramēta, & galbanū, melle subacta suffito. Aliud. Stercoris caprini pilulas, & leporis pilos, pinguedine phocæ subacta suffito. Aliud. Coaguli phocæ pelliculam contusam ac tritam, & spongiam, & muscum arboreū, trita simul mixta, atque phocæ pinguedine excepta suffito. Aliud. Stercus caprinū, & pulmonem phocæ, ac cedri ramēta suffito. Aliud. Stercus bubulū, cedri ramēta, & bitumen suffito. Aliud. Spinæ Aegyptiæ fructū, & cedri ramēta, & myrti sicca

folia. Hæc trita & unguento molli subacta suffito. Multa uero aromata in unguentum iniicito. Aliud. Vinacea tusa trita, & cedri baccas, & resinam pinus, simul mixta & passo cocto subacta suffito. Fomenta. Stercus bubulum contusum ac cribratum, aceti dimidia mensura, & decocti erui dimidia adiecta, leniter pro fomento adhibeto. Postquam autem fomētum adhibueris, lenticulæ decoctum bibendum dato ac reuomendum. Et farinam sorbendam, ac uinum in super bibendum. Postridie uero granum cnidium deuorandū exhibeto. Sequenti die quod urinam ciet, hoc scilicet. Ciceris albi partes duas tritas, uuæ passæ tertiam partem, affusa aqua ad dimidias coquito, deinde excolatam aquam per noctem sub dio exponito, & postridie bibendam dato. Et de cætero saluiam ac lini semen, polenta ad ambo hæc ammixta, bis per diem in uini diluti heminis quatuor dato. Aliud. Olei heminas dimidias tres, foliorum sambuci manus plenæ mēsuram. Hæc cocta in craterē calidum fundito, & per testas calidas immissas fomētum facito, muliere in sella collocata, ac uestimētis cooperta. Aliud. Foliorum sambuci manus plenæ mensurā, & myrti tantundem in aquam missa coquito, & ad excolatam aquam, ordeï paleas iniicito, coquito, & linteo excipito, ac cum hoc fomentū facito, prout maxime calorem ferre poterit. Aliud. Acetum, oleum, aquam, mel, hæc mixta ualde feruefacito, deinde accepta uesica capiente cōgium, aut utriculo ex tenui corio factō, infundito, & panniculo laneo obuoluto, foueto. Quū autem tepidus factus fuerit panniculus, aliū obuoluito. Aliud. Pini corticem, et rhois folia in aquā coniecta fortiter coquito: & in excolata aqua ordeï paleas coquito, oleo affuso. ubi uero simul coxeris linteo excipito, ac foueto. Aliud. Loti ramenta & cupressi, aqua & oleo affuso coquito. Deinde simul cocta linteo excipito, ac foueto. Aliud. Aromata in aquæ chœnicem coniecta coquito. & in excolata aqua furfures triticeos coquito, & foueto. Aliud. Eodem modo gallam contusam, & rhamni corticē in aqua coquito. & cū aqua furfures triticeos subigito, ac oleum ammisceto. Postea semiaffatum panem duos chœnices habentem facito, linteoque excipito, ac foueto. Aliud. Brasicam & porrum decoquito, & cum succo eodem modo fomentum facito. Aliud. Ordeï paleas coquito, oleo affuso, & linteo excipito, ac foueto. Aliud. Solanum & oleæ folia coquito, & eodem modo fomentum facito. Atque hæc sanē, si quidem humidis uti uolueris, pro fomento uelut scripta sunt adhibe. Si uero siccis, panes parato & exassatos, & semiaffatos, et cum his foueto. Sed et testis calidis linteo inuolutis foueto, itemque cum ipsis linteis calefactis, et cum lenticulis uasis testaceis, feruente aqua infusa. Apponito autē ad pedes. Aliud. Iridis radicē tridito ac coquito, et eodem modo foueto. Si aqua in uteris gignatur, menses pauciores fiunt, & deteriores, et per longius tempus, et prægnans est semper per duos menses, aut paulo amplius. Quum autem hoc tēpus aduenerit, et corumpit, et aqua multa in ipsa gignitur, huic autē lac bibendū dare oportet, et per plum, mecona dictū, donec foetus moueri inceperit. Plerūque uero ante hoc corripitur, et per abortū extruditur, et uteri sanguine manant. Hæc autē patitur nihil magis ex labore, quam aliter. Hoc autē cognoscere poteris quod hydrops inest, ex digiti cōtactu. Cōperies enim osculū ipsorū gracile, et obscuratū ac plenū humiditate. Si uero nō circa initia, sed dum iam mouetur, foetus ipsi corrumpatur ac suffo-

suffocetur, tunc & uenter imus intumescit, & ad contactum dolet, uelut ulcere
 præsentē. & febris ipsam ac dentium fremitus corripit. Et dolorem habet acu-
 tum & uehementē, circa pudenda, & imum uentrē, & lumbos, & laterum mol-
 litudinem ac coxendices. Quū sic habuerit, calida ipsam lauare oportet. Et qua
 parte dolor hæserit tepefactoria adhibere, experimento facto de eo quod maxi-
 me admittat. & pharmacū deorsum purgans bibendum dato. Interposito uero
 tempore quantum tibi sufficiens esse uidebitur, & collutione facta, & fomento
 adhibito, cyclaminum apponito, ita ut melle subactam, & linteo exceptam deli-
 ges, & ad os uterorum apponas. Cupressi etiam ramēta in aqua madefacta, eo-
 dem modo apponito. Verum hæc breuiore tempore, & per longius temporis
 interuallum, quanto magis mordent & exulcerant. Et specillum stamneum pa-
 ratum immittito, & digitum eodem modo. Pōtiones quoq; bibēdas dato, ex-
 perimentum faciens quas libenter admittat. & cum uiro dormiat, maxime op-
 portuno tempore præsentē. Si enim genituram cōceperit, & pręgnās facta fue-
 rit, ac pepererit, subexpurgantur & quæ prius in ipsa fuerant, cum ipso puerpe-
 rij purgamento. Atq; sic maxime sana fieri poterit. Si indurati fuerint uteri,
 & os ipsorum asperum sit, & menses occultantur. Quum uero apparuerint, ue-
 lut arena sunt. & genitura hoc tempore non fit. Si uero etiam digito cōtigeris,
 asperum comperies os uterorum. Quum sic habuerit, cyclaminum terere opor-
 tet, & sale ac ficum crudam ammiscere, & cum melle efformata apponere. &
 fomento adhibito, purgatoria infundere. Edat autem mercurialem, et brasicas
 coctas, et succum sorbeat, et calida lauetur. Si indurati fuerint uteri, et mens-
 es occultantur, et os ipsorum conuiet, et non concipit. Quum sic habuerit, si
 digito contigeris, comperies os asperum, et digitū non intromittit, et febris ip-
 sam corripit, ac dentium fremitus. Et dolor habet imum uentrem, et laterū mol-
 litudinem, et lumbos. Patitur autem hæc, si foetus in ipsa corruptus fuerit pu-
 trefactus. Quibusdam uero etiam ex partu cōtingit. Sæpe etiam aliter. Quum
 sic habuerit, multa calida ipsam lauare oportet. et fomentum adhibere. Quum
 autem recens lota aut fota fuerit, immisso specillo os aperito ac dilatato, et per
 digitum eodem modo, et uelut in priore scriptum est apponito. Et potiones si-
 militer bibendas dato, et eodem modo curato uelut priorem. Si uteri ad la-
 tus allapsi fuerint, tussis detinet, et dolor sub latus, et uterus durus uelut pila in-
 fidet, et ad contactum dolet uelut ab ulcere. Et contabescit, et uidetur peripneu-
 monia esse, et conuellitur, et gibbosa fit. Et menses omnino non apparēt. Qui-
 busdam uero prius conspecti, euanescent. Tunc autem fientes, debiles sunt ac
 pauci, aut deteriores quàm antea. et genitura non fit hoc tempore. Quū sic ha-
 buerit, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, et eo epoto, multa cali-
 da ipsum lauato. et ex tepefactorijs quod maxime admittit adhibeto. et a qui-
 bus sanguis purgatur ea apponito. et lini semen tostum, tulum ac cribratum, et
 peplum album, et saluiam cum polenta tenui, et caseum caprinum, sordibus et
 salis muria derafis: hæc misceto, ut casei sint partes duæ, reliquorum uero una;
 polenta autem sit antiqua nō falsa, et ieiunæ in uino bibenda dato. Vespero ue-
 ro cyceonem crassum melle affuso exhibeto, et ex potibus quemcunq; libenter
 admiserit bibendū dato. Et frequenter fōmētum adhibeto. Calidam uero asper-
 gito, et per ceratum leniter mollito, ac à latere detrudito. et latus fascia lata deli-

gato. & lac bubulum q̄ plurimum ad dies quadraginta bibendum præbeto. Cibis autem utatur q̄ mollissimis. Morbus hic uehemens est & lethalis. & pauca etiam si curentur ipsam effugiunt. Si os uterorum concludatur, forte fit uelut grossus ficus. Et si digito contigeris, comperies durum ac contractum. & digitum non intromittit. & menses occultantur. & genituram non suscipit hoc tempore. & dolor habet in uentre, & lumbos, & laterum mollitudinem. Quandoq; etiam sursum procedit, et suffocat. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum præbeto. & multa calida lauato. & quæ os molliunt apponito. & specillum immittito ac aperito. & digitum similiter. & calidam aspergito. Quum autem molle factum fuerit, ea quæ sanguinem purgant apponito. & ex potionibus dato, experimento facto quam libenter admittat. & brasicam edat, & succum eius sorbeat. Si uteri obliqui fiant, etiam os ipsorum obliquum fit, & menses ipsi nunc occultantur, nunc prius apparentes euanescent. & non similes fiunt, sed deteriores & pauciores q̄ antea. & genitura non fit hoc tempore. & dolor habet in uentre, & lumbos, & coxam, & attrahit ipsam. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet. & calida lauare, ac fouere. Vbi uero recens sota aut lota fuerit, digito immisso os uterorum corrigat ac dirigat. & odororum suffitum admittat. & ex potionibus dato, iuxta experimentum quam libenter suscipit. Cibis autem utatur mollibus. & allia edat cocta ac cruda. & cum uiro dormiat. & in sanam coxam decubat. Alteri uero fomentum adhibeat. Morbus autem difficulter cedit. Si inflati fuerint uteri, & uenter attollitur ac inflatur, & pedes intumescunt, & caue faciei partes. Color uero iniucundus fit. & menses non fiunt. & genitura hoc tempore non fit, & anhelat, et anxia moeret. & quum surrexerit, aut progressa fuerit, erectæ ceruicis spiratio ipsam tenet, et quicquid ederit aut biberit, ipsam molestat. & gemit, & magis ægre tristatur q̄ priusquam ederet. Sæpe uero etiam suffocatur. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum dato. & calida lauato, ac fomentum adhibeto. Interposito uero tempore quodam, apponito ea à quibus purgetur, ac non mordeatur. Frequentissime uero totum corpus foueto. Tunc autem & sub pudenda odorata suffiantur. Sub nares autem graueolentia, & potionibus dato quæ uteros purgant, & ad locum compellunt. Et Mercurialem edat. & lac bibat, uelut de latere dictum est. Morbus autem non est diuturnus. Si sanguinis grumi in utero coierint, os ipsorum uelut eruo plenum fit. & si attigeris, ita habere deprehendes. & menses non fiunt. Neq; genitura retinetur, q̄ diu sic habuerit. Quum igitur ita habuerit, cyclamini corticem detrahit, & allium, & salem, & ficum, & mellis parum terito ac permisceto, & glandulam hinc formatam ad uterorum os apponito. & alia uteris conuenientia medicamenta subdito, quæ uidelicet acria sunt ac corrodunt, & à quibus sanguis purgatur, & de potionibus dato eas quæ uteros purgant, & omnia circumradito. & uesicæ pellicula siue cuticula digitis obuoluta, os uterorum deradito. Si obtorti fuerint uteri, & menses non fiunt, & genitura non manet intus, & dolor habet in uentre, & lumbos, & laterum mollitudines, et si digito contigeris, os uterorum attingere non poteris, nam fortiter secessit. Quum sic habuerit, pharmacum bibendum dare oportet, à quo sursum ac deorsum purgetur, magis tamen deorsum, et os ipsum ac uteros q̄ maxime fouere, ac calida lauare bis

in die. & de potionibus dato quālibenter susceperit pro experimento. & uiro cōdormiat frequentissime, & brassicam edat. Si uteri cōmoti in loco nō manferint, quō prolapsi fuerint dolores exhibent, & incōspicui fiunt. Quādoque uero eminent, uelut sedes prolapsa, Et quum quidē supina decubuerit, in loco manent. Quum autē surrexerit, aut se inclinauerit, aut aliās se commouerit, exeunt. Sæpe uero etiā quietem habent. Hanc quē maxime quiescere oportet, & nō moueri. & lectum ad pedes altiore statui. & iisdem uti, uelut in superioribus. & cum acerbis infusis cōspergere. & graueolentia suffire. Sub nares autem odorata. & malum punicū in medio per umbilicū perforato, & in ipso picem quē maxime cōgruat cum uino tepefacito, & non ualde premens quē penitissime apponito. Quū autem quid apposueris, lata fascia exceptū ex lumbis deligato, ut ne dilabatur, sed maneat & faciat quod expetitur. & peplum cum casēo, & polenta, bibendum dato, uelut in allapsu ad latus dictū est. & ex potionibus quā maxime admiserit bibēdam præbeto. Cibis autē mollissimis utatur. & cum uiro quē maxime dormiat. Si hiauerit os uterorū magis quē solet, menses plures fiūt, & deteriores, & humidiores, & per longius tempus. & genitura ipsam nō contingit, neque intus manet, sed rursus foras effunditur. & si digito contigeris, os uterorum hians cōperies. & impotentia ipsam corripit præ mensibus, & febris ac rigor. & dolor tenet imum uentrē, & lumbos, ac lateris mollitudinē. patitur autem hæc maxime, si quid in ipsa fūsum fuerit, & corruptū computruerit, patiuntur etiam ex partu. & aliā aliter. Quum sic habuerit, pharmacū bibendum dare oportet, à quo sursum purgatur. & quum dolor habuerit, tepefactoria apponere. & calida lauare. & interposito tēpore, per infusa colluere, uelut scriptū est in priore. & de potionibus dare quam libentissime susceperit. & suffire quæ siccant. Edat autē polypos & mercurialem. Si leuigati fuerint uteri, & menses plures fiunt, & deteriores, & humidiores, ac frequentiores. & genitura intus non manet, sed rursus exit. & si digito contigeris, cōperies os leue. Et impotentia ipsam corripit præ mensibus, & febris ac rigor, et dolor imum uentrē, et lumbos, ac lateris mollitudinem, maxime si quid in ipsa corruptū computruerit, et ex partu, et aliās. Quū sic habuerit, curare oportet ubi dolor habuerit, uelut scriptū est in priore. Si uteri ad uentrē nutauerint, dolor acutus et uehemens coxendices, et lumbos, ac laterū mollitudinem habet. Et crus claudicat. Quum sic habuerit, pharmacū infra purgans bibendū dare oportet, postridie uero suffire hoc modo. Ordei chœnices duas, et oleæ folia probe cōtusa, et galiam contusam ac cribratā, et hyoscyami tertiam chœnicipartē. Hæc mixta, et olei hemina dimidia affusa, efformata, in olla per dies quatuor, ter in die suffito. Noctu uero lac bubulum, et mel, et aquam bibat, et calida lauatur. Si ad caput conuersi fuerint uteri, signum hoc est. Venas in naso et sub oculis dolere uidetur. Hanc calida multa lauare oportet, etiam in capite, lauro et myrto in aqua incoctis, et caput unguento rosaceo illinatur, et odorata subter suffiatur, et brassicam edat, et succū absorbeat. Si ad crura et pedes conuersi fuerint, ex hoc cognosces. Magnis pedum digitis cōuellitur sub ungues. Et dolor crura ac femora tenet. Quum sic habuerit, multa calida ipsam lauare oportet, et fomētum adhibere quod maxime libenter admiserit, et subter suffire graueolentia. Et unguento rosaceo unguere. Si mulier cibum auersans uteros doleat, et febris ipsam

ipsam ac rigor corripiat, pepli albi quintam dimidiæ choenícis partem, & seminis urticæ tantūdem, & casei caprini rasi dimidiā choenicem, simul cum uino uetere mollito, deinde cocta sorbēda dato. Si ex partu fluxus corripiat, & cibi in uentre non manēant, uuam passam nigram, & mali punici dulcis grana trita, & coagulum hœdi, uino nigro diluito ac utitor, ita ut caseum caprinum deraſum, & polentam tritici torrefactam adiicias, & bene tēperata bibenda præbeas. Si ex partu sanguinem uomat, hepatis fistula fauciatā est. & dolor ad uiscera procedit, & cor conuellitur. Hanc multa calida lauare oportet. & tepē factoria quæ maxime admiserit adhibere, et asininū lac bibendū ad dies quinq; dare. Postea uero uaccæ nigræ lac bibendū præbere, ita ut sine cibo degat, ad dies quadraginta. Ad uesperam uero sesamū tritum bibat. Morbus hic est periculosus. Si mulier diu non concepit, mēſibus apparentibus tertia aut quarta die, alumen tritum unguento dilutum, lana exceptū apponō. & per tres dies appositum, habeat. Tertia uero die fel bouis radito, & ramentū oleo dilutum ac subactum, linteō exceptum apponito. Et tres dies appositum habeat. Sequenti uero cum uiro coeat. Ad uterorum morbum sedādum, lini scissi unā cum stipula pugillum tenuiter tufum, in uino albo q̄ iucundissimo per noctem madefacito, deinde excolatum in ollula tepēfacito, & in eo lanam mollissimā tinctam apponito, & uicissim priore detracta aliam subdito. Si uteros purgare uoles, primum quidem ordeum oleo imbutum in prunis suffire oportet. Postridie uero carnem ouillā coquere, cum ordeī decocto sub dio per noctē exposito. Sit autē decoctum ordeī congij mensura, & ualde ipsas coquito. Vbi uero coctę fuerint, leuiter tepidas edat, & iusculum sorbeat. Postridie autē thus & pulegium tritum, melle subactum & lana exceptum ad triduum subdito.

Si uteri ad sedem conuersi fuerint, & secessus secedere prohibuerint, dolores habent & lumbos, & imum uentrem, & ilia. Quū sic habuerit, calida ipsam lauare oportet, & lumbos fouere, & graueolentia suffire. & apponere quæ purgant & impellunt ipsos uteros, & bibenda dare ea quæ maxime admittit. Si ulceratum fuerit os uterorum aut inflammatū, myrrham & adipem anserinū, & ceram albam, & thus, in leporis pilis qui sub uentre sunt misceto ac terito, & in lana mollissima apponito. Si secundæ decedere non possint, statim quidem a cibo abstinere oportet, Viticis autem folia trita in uino & melle, oleo affuso tepēfacito, & hemina mensuram bibendam dato. Si inflammati fuerint uteri, sambuci folia tenerrima in tritici recentis crassiore farina coquito, & leuiter tepida sorbēda dato. Si uteri transmoti fuerint, hederam siccissimam tritam, & linteolo tenui illigatam subdito. et pingue aliud nihil adhibeto. Bibendum uero dato triticum recens, & peplum tostum, & saluiam, & cyperū, & anisum. Hæc trita uino diluta cum furfuribus ordeī bis in die dato, pro uice dimidiā heminam. Si menses constituto tempore non fiant, brassicæ folia & rutam terito, postea paleas ordeī choenicis mensura madefacito donec flaccescant, & per noctē sub dio exposito. Mane uero in hemina inde excolata brassicam ac rutam diluito, & affuso oleo cōquassato, & bibenda dato. postea polympum uino albo suffocatū edendum dato, & uinū ebibendum. Si uero uolueris, pisces odoratissimos coctos edendos dato, & iusculū sorbēdum. Si ex feruore & superficiali ulcere pudēda fuerint exulcerata, myrti baccis in uino co-

ctis pudenda colluat. Et postea mali punici dulcis putamina in uino coquito, & myrrham ac resinam simul mixta uino diluito, & intinctū in his linteū subdito. Si urinæ stillicidiū corripiat, cucumeris siue cucurbitæ os & fundum refecato, et subiecta pruna cucumim circūponito, & inspersa in ignem myrrha, mulierem super cucumim locato, ita ut summam cucumeris partem q̄ penitissime in pudendum indat, quo uapor plurimus in pudenda transmittatur. Et ex potionibus urinam cientibus ieiunæ aliquas exhibeto. Si ad cor progressi uteri suffocent, & nō decedant, porri semen tritum, & pulegiū, in aquæ cyathis tribus, & acetī albi cyatho uno, & mellis tertia cyathi parte diluito, tepefacito, & ieiunæ sorbenda dato.

Si ex partu, aut abortu, rigor corripuit, iuniperi fructum & saluiam simul trita, in acetī albi cyatho diluito, & uini albi diluti poculum affundito, uersato ac stare finito. Mane uero excolato, & tepefactum bibendum dato. Si uteri inflati fuerint, & si uentus in utero fiat & dolor, saluiam & cyperum tusa madefacito per noctem, & mane excolato, & purum cremorem in ollam fundito, tritici farina crassiore adiecta, & acetī albi cyatho affuso, & succi silphij magnitudine fabæ addita, & cocta crudius sorbenda dato.

Si in pudendis graueolentia fuerit, & columella nascatur, & dolor habeat, dolorem quidem sedabit apij semen ieiunæ in uino datum. Graueolentiam uero, anisum eodem modo datum. Columellam uero refecare oportet. Si ulcera fiant in pudendis, & pruritus corripiat, olea & hederæ & rubi & mali punicæ dulcis folia trita in uino ueteri dilue, & postea carnem recentem folijs intege & appone. Et habeat subditam per noctem. Mane uero eximat, & myrtū in uino decoquat, & cum uino pudenda colluat. Si genituram non suscipiat, mensibus secundū naturam fientibus, membrana ante uteri os excreuit. Cōtingit etiam ex alijs causis. Cognosces autē hoc, si digitum admoueris, membranae prætextū continges. Ad hæc medicamentū subdititiū facere oportet. Resinam itaq; & æris florem melle diluito, & linteum ex his tinctū penitissime indito, filo ad extremam partem depēdente illigato. Quū itaq; hoc exiluerit, myrtum in uino coquito, & cum uino tepido eluatur. Si anhelationes corripuerint mulierem, sulphuris magnitudinem fabæ, & nasturtij tantundem, & rutam, & cuminū Aethiopicum, hæc trita & uino diluta, ieiunæ bibēda præbeto. Oportet autē & à cibis abstinere, & nō frequēter edere. Si pariens inflata fuerit, hepar ouillum aut caprinum calido cinere obrutū, edendum dato meracius ad dies quatuor. & uinū bibat uetus. Si lumbos doleat, anisum & cuminū Aethiopicum bibat, et calida lauatur, & subcalidam bibat. Si menses nō fiant, testam crassam exurito ac terito, & origanū in pinguedine anseris coctam terito, & ad testam in linteū ammisceto, ac tepida apponito. Si uteri conclusi fuerint, & menses nō apparuerint, colocynthidem syluestrem, & silphij semen, cuminum Aethiopicum, nitrū, salem thebaicū, adipem rhenalem, farinā, myrrham, & resinam, Omnia hæc feruefacito, simulq; mixta ac trita in glandulā efformato, & apponito. Si uteri ad uiscera cōuersi strangularint, uinū cedrinum, & cuminum Aethiopicum bibat. & calida lauatur. & subcalidam bibat. Si menses non fiant, adipem anseris, et netopū, et resinam, mulier lana excepta subdat. Si uero magis q̄ conuenit prodeant, fusinum, et raia linguā, in lana apponat. Si transinoti uteri aliquo allapsi fuerint, ordeum decortica-

catum tritum unā cum paleis fume, & cum cornu ceruino uino subige, & hinc uteros suffito. Si secundæ decedere non possint, fœniculum uino & oleo ac melle feruefactū bibendum dato. Si menses nō appareant, & uelis ipsos detrahare, crassiore tritici farinā & ordeum coquito, & oleo affuso edenda dato. Si inflammati fuerint uteri, cotyledonis folia, & porrū, in crassiore tritici farina coquito, & affuso oleo edēda dato. Si moti uteri aliquo allapsi fuerint, & dolorem exhibuerint, oleæ scabiem, & lauri ac cupressi ramenta, in aqua coquito, & linteo excepta apponito. Si uterus doleat, & ad uesicam fuerit dolor, porri semen in aqua tritum ieiunæ bibendum præbe, & tepefactoria adhibe. Si uteri prominuerint, lotos ipsos cum aqua tepida, & uino ac oleo illitos, rursus intrudito, & ex lumbis deligato, & graueolentia suffito, & si urinam emittere non poterit, calida lauato ac foueto, & cupressi ramenta suffito. Et potiones urinam cientes bibēdas dato. Si fluxus fiat, acerba suffito, & stercus asini derafum, lanæ illigatum subdito. Sit autē stercus siccum. Si in pudendis ulcera fiant, adipem bubulum illinito, & apponito, & cum uino in quo myrtus cocta est colluito. Si ex partu os uterorum fuerit exulceratum, florem rosarū tritum & uino imbutum, in pilis leporinis apponito, & acerbis colluito. Si uteros doleat, allij caput integrum, & nitrum tostum, & cuminum terito, & melle subacta subdito, & calida lauatur, & subcalidam bibat. Si ex feruido ac superficiali ulcere pudenda fuerint ulcerata, adipē bubulum, & butyrum, & anseris adipem, ac fusinum unguentū misceto, & ex his pudenda illinito, & aqua tepida colluito. Si uteri ascendentes suffocarint, fœniculum lucernariū accensum extinguito, & naribus admoueto, quo fumū attrahat, postea myrrham unguento dilutam, & lana exceptam apponito. Et resinam oleo dilutam bibendam dato. Si secunda nō secēdat, conyzam tritam lana exceptam apponito, & ignem in uino tritā bibēdam dato. Si caput doleat, & inum uentrē, & lumbos, bilis in uteris est. Huic itaq; pharmacū dare oportet, quod sursum ac deorsum purgare potest, & calida lauare, & apponere quæ bilem purgant. Et anisum ac nigellam uino diluito, & bibēda dato. Si fluxus oboriatur, caneros fluuiales in uino suffocato, & uinum bibendū dato, & quæ siccant suffito, & apponito. Si fluxus oboriatur, porri pugillum in uino tritum bibendū dato, & siccis & acerbis utatur. Si fluxus oboriatur, muli stercus combustum, tusumq; ac cribratum, uino dilutū bibat. Reliquis autem eodē modo utatur. Si fluxus oboriatur, & iam diuturnus fuerit, spongiā combustam ac tritam, uino odorato dilutam, bibendam dato, & per suffitus resicca, & quæ restringunt appone. Si uteros purgare uelis, nitrum, cuminū, allium, & ficus terito, & melle subacta apponito, & calida lauatur, et subcalidam bibat. Si uteros doleat, cyclaminī radicem in uino ieiunæ bibendā dato, et calida lauatur, et subcalidam bibat. Si lac extinctum fuerit, reliqua quidem eodem modo curato, fœniculi uero semen bibendū dato, et radices fœniculi decorticas, ac butyrum simul coquito. Quum autē cocta fuerint, frige facito ac bibēda dato. Commodum est etiam hippomarathrū et hipposelinum simul coctum. Si lac extinctū fuerit, porrum tritum aqua dilutū bibendum præbe, et calida lauatur, et porrū ac brassicam edat, simul coctis Cytisi folijs, et succum sorbeat. Si lac extinctum fuerit, saluiam, cedri aut iuniperi baccis

adiectis coquat, & ad diffusum, uinum affundat, ac bibat. & ad cætera farina in
 spersa additoq; bulbo, & modico oleo affuso, edat. Et acria, & acidâ, & salsa, ac
 cruda olera omnia uitet. Nasturtiū uero in uino potū commodum est. Nam lac
 purgat, & calida lauetur, & subcalidâ bibat. Si uelis mulierem prægnātem
 fieri, ipsam & uteros purgato, postea farinā ieiunæ edendam dato, & uinū me-
 racum in super bibēdum, & nitrum rubrū, cum inum, ac resinam, melle subacta
 in linteo subdito, & ubi aqua defluerit, nigros pessos mollitorios apponat, &
 cum uiro dormiat. Si prægnantē facere uoles mulierē, ipsam & uteros pur-
 gato, Deinde linteum tenuissimum resiccatū, ac melle imbutū in glandes effor-
 mato, & in fici succo tinctos apponito, donec fuerint aperti. Postea uero magis
 intrudito. Vbi aut defluerit aqua, uino & oleo colluta cū uiro dormiat. Bibat
 autē & pulegiū in uino cedrino, quū uiro condormire uolet. Medicamen-
 tum foetū ex uteris pellens. Cucumeris syluestris succū potionis mensura, in
 mazam cōspersum apponito, ubi ad duos dies antea ieiunauit. Aliud. Sta-
 phidis syluestris pugillos duos, in aqua malsa dilutos, bibēdos dato. Expe-
 rimentū fœcūdītatis. Caput aliij integrū dera sum uteris apponito. Postridie
 uero digitū immittat, ac contingēs cōsideret, et si quidē oluerit inde os, bene ha-
 bet: Sin minus, rursum apponat. Aliud experimentū. Netopū modicū in
 lana inuolutū apponat, & cōsideret an per os oleat. Alia subdititia medicamē-
 ta. Scorpīj marini fel, in lana inuolutū, & in umbra siccātū apponito. Pu-
 legium siccū tritum, melle imbutū in lana apponito. Cucumeris syluestris
 semen, & testam cōbustam, uino subactam, cū pilis leporinis, in lana subdito.

Alumen Aegyptiū, lana inuolutū apponito. Cantharidas uino subactas,
 in lana subdito. Herbam artemisiā uino subactā apponito. Nigellā in
 uino tritā, in lana subdito. Aliud ad recens enixam. Vnguentū rosaceū &
 ceram, in lana apponito. Bulbion ex tritico, tritū & uino subactum in lana
 subdito. Vini albi ueteris fecem cōbustam, et uino albo extinctā ac tritam,
 in lana apponito. Galbanū, netopum, & misy, cū unguento rosaceo, in lin-
 teo apponito. Elaterij portiones duas, & fauū cum uino, in linteo apponito.

Butyrū & alumen melle subactū, in linteo subdito. Scāmōniæ succū, &
 adipem, cū maza misceto, & uino imbuta, in linteo apponito. Si cōcipere no-
 lit, misyos fabæ magnitudinē aqua dilutā bibendam dato, & per annū non cō-
 cipiet. Si periculū facere uelis in muliere, an prægnās sit aut nō, rubro lapide
 siue terra erithrea oculos sublinito. Et si quidem ingrediatur pharmacum, præ-
 gnans est, sin minus, nō. Si prægnāti pudenda feruido & superficialio ulce-
 re fuerint exulcerata, amygdala trita, & medullā bubulā in aqua coquito, & mo-
 dica farina adiecta, pudenda illinito. & baccarū myrti decocto colluito. Si
 uirgo ex lapide laborarit, semen radices Aethiopicæ, in uino ueteri ad dies decē
 dato. Deinde in aqua ad dies uiginti, & bis in die multa calida lauato. Cata-
 plasmata. Alliū, portulacā, apium, loti & cedri ramēta, trita simul mixta aqua
 malsa diluito, & cataplasma hinc factū imponito. Rubi folia, myrti folia, si-
 mul trita aqua malsa diluito, & polēta ammixta subacta imponito. Sambu-
 ci folia, myrti folia, terebinthi folia tenerrima, eodē modo apponito. Loti ra-
 mēta, mori folia, simul trita mixta, aqua diluta cū uua passa imponito. Suffi-
 tus. Oviculæ aut capræ cornu tustum, & ordeū tostum ac fresum, oleo subigi

to ac suffito. Cerui cornu, & oliuas nondū habentes oleū, simul trita mixta suffito. Rhoem rubrū, & polentā tostam, oleo subigito ac suffito. Polentam, & stercus bubulum, & paleas, oleo subigito ac suffito. Loti ramēta, & rhois folia, & cupressi siccae ramēta, uīno nigro austero subacta suffito. Galbanū, mannam, & resinā, unguēto subacta suffito. Caprę cornu, & gallam, & adipē suillum, ac cedriā suffito. Terram ex asinorū pedibus deradito, & stercus asininum, cum uīno nigro subigito ac suffito. Collutiones. Folia myrti, & lauri, ac hederæ in aqua coquito, & cū hac tepida colluito. Rhois, & mali punicæ, ac rubi folia, in aqua mulsā coquito, & cū ea excolata colluito. Sambuci & lentisci folia in aqua coquito, & excolatā leuiter tepidā infundito. Fœniculi & brassicę radices tufas in aqua coquito, oleo affuso, & postea cū excolata colluito. Oenanthen, & cyperū, & uuas passas, in aqua mulsā coquito, ac colluito. Malagmara. Maluam & fœnogræcū in aqua feruifacito, & cū excolata aqua leuiter tepidā colluito. Cupressi ramēta & amaracū, in passo aqua tēperato coquito, ac colluito. Serpillū & uiolæ albæ radicem, in aqua mulsā coquito, ac colluito. Hypericū, & lentiscū, & baccas cedri in aqua coquito, et cū leuiter tepida colluito. Fauum, & butyrū, & resinam, & adipem anserinū, in aqua coquito, & colluito. Fomenta. Lolium tostum ac molitū, in posca meraciore coquito. Postq̃ autē coxeris, linteo illigato, & foueto. Lentē tostam, decorticatā, & in farinā crassiorē alicæ similem redactam, in aqua coquito, & linteo illigato, ac foueto. Eruū eodem modo parato, ac foueto. Cōmoda est & saluā eodē modo parata. Saluiam & hypericū in aqua coquito, et ordeī paleis in decocto coctis, et linteo exceptis foueto. Loti & cupressi ramēta in uuæ passę cremore coquito, linteoq̃ ipsa illigato ac foueto. Olea, & myrti, & hederæ, ac lauri folia, in aqua coquito, & in decocto, ordeī paleas coquito, deinde linteo illigato, ac foueto. Cupressi ramēta & cedri, & ordeī furfures, simul misceto, et in uuæ passæ cremore subigito, ac panē formato, & cū hoc assato, calido in linteū illigato, foueto. Violæ albæ semen, aut radices, in aqua coquito, & cū aqua furfures tritici subigito, ac panē formato, cū quo calido in linteū inuoluto, foueto. Serpillam in aqua coquito, & furfure triticeo in aquā coniecto, eodē modo foueto. Spongas calefacito & adhibeto, et cū mollibus lanis, & pāniculis laneis, & uasis testaceis aqua infusa, & utriculis eodem modo, & decoctionibus in utres infusis foueto.

Purgatorium. Si mulierē parere non potentē, facere uelis ut pręgnās fiat, cōsiderare oportet in mensibus, an biliosa aut pituitosa sit. Cognosces autē hoc, arena tenui sicca ad solem cōspersa, & quū mēses prodierint, sanguine super arenam in sole effuso, ita ut ipsum siccari sinas. Si enim biliosa fuerit, sanguis super arenā siccatus, pallidus sit. Si uero pituitosa, uelut mucus existit. horū igitur utrū tandem fuerit, uentrē purgato, siue fursum siue deorsum purgatione opus habere uisā tibi fuerit, postea paucis diebus interpositis, uteros purgato. Vterorum fomēta. Si duri fuerint uteri, & nō concipiat, Vinū q̃ iucundissimū cū pari aqua temperatū, trium semicongiorū Atticorum mēsurā, & fœniculi radices, & seminis fœniculi quartā partē, & unguēti rosacei semiheminā. Hæc in uas nouū fundito, & uinū affundito. Vasis autē operculū perforato, & imposita arundine foueto. Arundinē uero cum operculo tollito. Si enim sine opercu-

lo abstuleris, exuretur. Postq̃ autē fota fuerit, scillam apponito, uelut infra scriptum est. Apponito autē donec dixerit molle & amplū esse uterorū osculum, & si quidem exulcerata fuerit, & pustulæ in purgatione fuerint, si summa labia ulcerata fuerint, anisum, & adipē anserinū, in rosaceo oleo terito, et in lana inuoluito. & accepta carne bubula, magno pedis digito crassiore, sex digitorū longitudine, ipsam pharmaco illinito, et lana exceptā inuoluito, et ad extremā carnis partē quæ foras spectat filum alligato, & reliquā in uteros indito, ubi est ufcus.

Mensium purgatoria. Si non procedat mēstrua purgatio, cucumeris syluestris internā partem pōdere trium obolorum, & artemisiā herbam, & thuris obolum, terito & ammixto melle in lana inuoluito, & ad os uterī apponito, quinquies in die hoc faciens. Aliud. Vitem uiridē terito, & melle ammixto lana excipito, & eodē modo apponito. Aliud. Cupressi fructū, & cucumeris syluestris internā partem, & thus, terito & melle ammixto lana excipito, & eodē modo subdito. Aliud. Cupressi fructū & thus terito, & melle ammixto lana excipito, ac subdito. Aliud. Abrotoni obolos tres, cū melle lana excipe ac subde. Aliud. Elaterij obolū, & myrrhæ obolum terito, & cū melle lanæ inuoluito, ac subdito. Purgatoriū si mulier non cōcipiat. Tauri urinam collige trium heminarū mensura. Deinde artemisiā herbam, aut parthenium, aut adiantū, & laurū uiridem, & cedri ramenta simul contunde. Deinde in effossa scrobe carbones accēde, & imposita olla urinā tauri infunde, & contusa in mortario adijce, postea sellam circūpone, & artemisiā herbam, aut hyssopū, aut organū impone, & muliere super hæc collocata, donec sudet foue. Vbi uero sudarit, laua cum calida, et in lauacrū artemisiā & laurum immitte. Deinde subdititiū medicamentū adhibe. Aut artemisiā, aut bulbiū in uino albo tritū lanæ inuolutū subdat. Hæc ad tres dies faciat, & deinde cū uiro dormiat. Subdititiū pharmacum ad conceptū faciens. Ex nitro & thure, cū melle glandem formato, & apponito. Aliud purgatoriū molliens. Caricam coquito donec granula abijciat, & hanc expressā leuissime tritam in lana cū rosaceo unguento apponat. Aliud acrius. Brasicæ, rutæ, pares portiones tere ac utere eodem modo. Aliud molle & purgatoriū. Medullam anseris, aut bouis, aut cerui, magnitudine fabæ, assuso unguento rosaceo et lacte muliebri terito, uelut molle pharmacum teri solet. Deinde ex hoc os uterī illinito. Aliud tepidum purgatorium. Anseris medullam magnitudine nucis, resinæ lentissimæ aut terebinthinæ magnitudinem nucis. Hæc in unguento rosaceo ad lentū ignem liquefacito, & uelut ceratum facito. et deinde ex hoc tepido os uterī illinito, et pectinem madefacito. Aliud detrahens purgationem et sistens. Pæoniæ grana nigra aut rubra, tria aut quatuor in uino trita bibenda dato. Si uero magis detrahere uoles, grana nigra eodem modo trita bibenda præbeto. Aliud purgans ac detrahens. Lauri baccas ad summum uiginti, et seselis dimidium acetabulum, cum uino trita bibat. Aliud. Tauri fel trium dimidiorum obolorū Atticorū pondere, in uino ieiunæ bibendum dato. Et efformata quoq̃ ex ipso catapotia deuoranda dato. Aliud. Farinam recentem, myrrhæ obolos tres, croci tantundem, castorij obolū, Hæc cum unguento rosaceo trita apponat. Aliud purgatoriū. Semē urticæ, et maluæ succū, cū adipe anserino tritum subdat. Aliud. Si nō purgata fuerit ex partu, floris farinæ quantum

tribus

tribus digitis cōprehendi potest coquito, & melle affuso, uentri uelut cataplasma imponito, & bibendum dato. Aliud quod uteros aperit & purgat. Cantharidas quinque aceto albo affuso terito, & non ualde liquidum pharmacū facto, sed ut digitis effingi possit, & de ficu alba pingui, sine granulis & pelle, duplam cantharidū partem ammisceto, & efformatam glandulam tenui lana inuolutam subdito. Aliud. Si ex partu non fuerit purgata, trifoliū in uino albo bibendum dato, hoc etiam menses educit, & foetus expellit. Aliud purgans uteros. Quum puero immortuo sanguis intus manserit, colocynthidē syluestrem in melle tritā delingat, aut subdat. Aliud sanguinē purgans. Sanguinem ex uteris expelles, si uiolę albę semen tritū, uino dilutū bibendum dederis.

Aliud quod similiter sanguinē ex uteris expellit. Rhois seminis quū rubrū fuerit, grana uiridia triginta terito, & rosas caninas rubras, rubicundo ex ipsis delecto, in uino bibenda dato, quū sanguis eruperit. Aliud purgatoriū. Si menses non apparuerint, styracem & organū terito, cōmisceto, & adipe anserino affuso apponito. Aliud quod subditū uteros purgat ac euacuat. Absinthij radicem tritam cū melle, cum oleo apponito. Subdititia uteros purgantia, aperientia, & aquam ducentia. Scillę frustum longitudine sex digitorum, & digiti parui crassitudine accipito, & de hoc duos digitos circūderadi to ac leuigato, & reliquū lana sordida inuoluito, eam uero partem quę circūdata est ad os uterorum subditam, per diem ac noctem appositā finito. Postquam aut lauit & abstulit, aqua odorata colluatur. Aliud purgatorium molle, quod aquam & pituitam ducit, & pallidos ac subcruentos menses detrahit, si nō diu turni fuerint, & os emollit. Unguentum narcissinū, cum inū quod edimus, myrrham, thus, absinthium, cupressum, salem, rosaceū oleum sumito. Et de alijs quidem singulis cōgium accipito, narcissini uero partem quartā, & omnia in glandem efformata, ac crudi lini linteo excepta subdito. Aut linteum tenue pennę circūdato ac deligato, & in oleo albo Aegyptio tinctū apponito, & tota die appositum finito. Deinde ubi lauit & abstulit, aqua odorata colluatur.

HIPPOCRATIS COI DE MOR-

BIS MULIEBRIBUS LIBER I. IANO COR

nario Medico Physico interprete.



e muliebribus morbis sic sentio. Mulierem quę non peperit grauius et citius ē mēsis ægrotare, quā eam quę peperit. Quum enim peperit uenulę fluidiores sunt ad menses. Fluidas autem ipsas facit purgatio illa quę fit à partu. Et ubi hæc erumpit, uicinę maxime uentri ac mammis corporis partes discinduntur. Discinditur item reliquum corpus, à quo uero hoc fiat, dictum est à me in natura pueri in partu. Discisso autem corpore necesse est uenas magis aperiri, & ampliores ac fluidiores ad menses fieri: itēq; uteros magis aperiri, nimirū puero per ipsos egresso, qui & uim & dolorem induxit. & quum hæc sic se habeant, mulier purgationē à partu exapta, minus laboriose mēsis decurrentibus purgatur. Si uero etiā affectio aliqua mulieri quę iam peperit accadat, ut mēses uenientes probe purgari non possint

possint, facilius dolorem feret, quā si nō peperisset. Asueti enim sunt uteri, & corpus idoneum ut impleatur, utpote in uentre habēti, & simul multa amplitudo in corpore est. Maior autē fit etiā amplitudo ubi peperit, nimirū corpore discisso. & corpus in amplitudine existens, minus dolore affligitur, si non uenae superimpleantur, & nimium doleant. At uero ei quæ nō peperit, quū corpus non asuetū sit, si impleta fuerit, & fortius ac solidius & densius sit, si purgationē à partu experiatur: & quū uteri ægrius aperiantur, menses laboriose prōdeunt, et affectiones plures accidunt: ut propterea menses obturētur, si prius nō peperit. Habet autē res se hoc modo, uelut etiam prius à me dictum est. Dico mulierem rariore carne præditam & teneriorem esse quā uirum. & hæc res sic se habet. à uentre trahit humiditatē, & citius, & magis, corpus mulieris quā uiri. Etenim si quis super aqua, & per regionē aquosam, duobus diebus ac duabus noctibus, molles lanas ponat, & uestem puram & cōtextam æquali ad lanas pondere, sublatiis utriusque apponderationē facta, multo grauiores lanas cōperiet quā uestem. Fit autem hoc ex eo quod semper ab aqua sursum decedit in uasa ampliora oscula habentia. & lanæ quidem tanquā raræ & molles, ex decedēte amplius suscipiunt. Vestis autem ut quæ plena est & ex cōtextu obturata, explebitur, nō multum ex decedente aqua suscipiens. Sic sanē etiam mulier, uelut quæ rariore est, ampliorē à uentre humiditatē corpori attrahit, & citius quā uir. & tanquā teneriori carne præditæ mulieri, ubi corpus sanguine repletū fuerit, si non ab ipso secesserit, carnibus impletis ac calefactis, dolor oboritur. Habet enim mulier sanguinē calidiorem, & propterea calidior est quā uir. Si uero amplior accedēs sanguis secesserit, dolor nō fit à sanguine, neque calor. Vir autē ut qui solidiore carne præditus est quā mulier, neque in superna uētris parte adeo sanguine superimpletur, ut nisi aliquid sanguinis singulis mensibus secedat, dolorē fieri necesse sit: & sanguinis quantū satis est ad nutrimentū trahit: & quum corpus ipsi nō sit tenerū, non dolore affligitur, neque superincalescit à plenitudine, uelut mulieri. Multum autē confert ad hoc uiro, quod magis laborat quā mulier. Nam labor aliquid humoris abducit. Postquam igitur mulieri quæ nō peperit, occultati fuerint menses, et uiam foras reperire nō poterint, morbus fit. Hoc autē contingit, si uterorū os cōclusum fuerit, aut distortū, aut aliqua pudendi pars cōtracta. Si enim horum quid fuerit, menses exitū inuenire nō poterint, priusquam uteri ad sanā naturam redierint. Fit autē hic morbus his maxime, quæ angustos uteros habēt, aut cervice ultra pudendū sitam. Si enim horū alterum fuerit, et mulier uiro nō miscatur, et uēter magis quam oportet euacuetur, ab hac affectione uteri obtorquetur. Neque enim humidi in seipsis sunt, utpote muliere nō coeunte: & amplitudo ipsis spatiosa est, utpote quū uenter magis uacuuus existat. Quare obtorquetur, dum sicciore et leuiore est uēter quā conuenit. & aliquādo dum ipsi obtorquetur, etiā os ipsorū distortuū contingit, nimirū cervice ultra pudendū sita. Si enim humidi fuerint uteri à coitu, & uenter nō euacuetur, nō facile distortuentur. Hęc igitur causa est ut ipsi sint cōclusi, nimirū à uenere abstinentē muliere. In tertijs porro mēsis optime afficietur, si quæ prius insunt progressa fuerint educta. Sin minus, mulier hæc patietur. Suffocatio aliàs atque aliàs in ipsam irruet, & febris aliàs atque aliàs corripiet, ac horror, & lumborū dolor, hæc patietur in tertijs mēsis, si ipsi nō prodierint. In quartis uero si nō egressi prioribus exitū fecerint,

etiam

etiam tūc tertij mēsis afflictionibus omnibus magis affligetur, & maxime tempore mēsum. Deinde minus. Sæpe uero etiam à dolore libera sibi esse uidebitur. Erunt autem in quartis etiam hæc signa. Vrinam multam ac crassa eijciēt, aliās atq; aliās. Et uēter ipsius durus erit, & maior q̃ prius, & dentibus fremet, & cibum auerfabitur, & uigilabit. Hæc patietur in quartis mēsum. Si uero curret, etiā in his sana euadit. Et in quintis si non multi menses descenderint, dolor adhuc fortior accidit. In sextis uero iam incurabilis est. & iuxta priora quidē signa magis dolebit. Deinde ad ea etiā hæc aderūt. Anxia erit, & aliās atq; aliās seipsam iactabit, & animo deficiet, & pituitam uomet, & sitis fortis ipsam corripit. Nimirum dum exuritur uenter ab uteris sanguine plenis. & ad contactum dolebit, maxime pectinē. Et aliās atq; aliās acute febriet. & uteri aliās atq; aliās murmurabūt, dum uidelicet sanguis in ipsis commouetur ac discurrit. & uenter consueto modo nō secedet. Neq; uesica urinā excolabit, maxime quum uteri ad stomachum qui neruosus est, mulieri allapsi fuerint, & ad uētre irruerint, dolet spinam, & totū dorsum. & lingua ipsius refrenatur. & hanc non claram habet. & animi deliquium adest. Aliquibus etiam uocis priuatio. & stomachus mordetur. & flaua bilis exit. & spiritus offendens. & anxia est, & iactat se ipsam, & ardet. Postquam autē trāsmutati fuerint, & uesica tenuem sanguinem ab uteris trahet, tunc urina mingitur rubra. Et dolet quidem reliquum corpus, maxime uero collum, & spinam, & lumbos, ac inguina. Et ipsi ad hoc progressæ, & uenter attollitur, & crura supra modum intumescūt, & tibiæ ac pedes. & mors succedit. Et circa hanc quidē sic finit menstruæ purgationes ad sex menses occultatæ. fiunt item hæc. Quibusdam mulieribus menses bimestres in uteris existentes multi ad pulmonem procedunt. & ubi recepti fuerint, omnia patiuntur quæ in tabe dicta sunt. & non est possibile ipsam superesse. fiunt & hæc. Quibusdam suppurati fiunt menses, ubi per duos aut tres menses moram traxerint. Hoc autem maxime fit, si à febre fuerint cōbusti. Signa uero sunt si suppurati fuerint. dolores enim incidūt in pectinem, & pulsationes fortes, & contactum non sustinet. & si melius habitura est, menses ipsi erūpuntur in pudendum, & procedit pus ac sanguis, & procedit graueolens, ad septē, aut octo, autem nouem dies. In priore uero tempore dolet uelut dictum est antea. Postq̃ autem depurgata fuerit, optimū quidem est si non fiant ulcera. Si uero reliquantur ulcera, ampliore curatione opus habebit, quo ulcera non putrescant, & graueolentia fiant. Sterilis autem euadet, etiam si melius habebit, ubi magna ulceras fuerint quæ in uteris facta sunt. Si uero non cōtinget, ut menses ipsi in pudendum procedant suppurati facti, ad partes supra inguen, iuxta lateris mollitudinem erumpent, citra tuberculum, utpote pure rupto, & illa parte purulenta graueolentia procedent. & si hoc fiat, mulier non superstes manet. Si uero etiam superstes maneat, semper sterilis erit. Hac enim parte de cætero uia fit mēsum ut foras prodeant. Nam os uterorum ad hunc locum allapsum est. fit & hoc. Quibusdam ubi bimestres aut trimestres aut diuturniores fuerint menses, & ad lateris mollitudinem allapsi fuerint, quū non suppurati sint menses, uelut tuberculum fit supra inguen, sine capite, magnum, rubrum. & uulgus medicorū ignarum quid hoc esset, iam sæpe secuerunt, & sic in periculum induxerunt. Cæterum id quod uelut tuberculum fit, tali modo fit. Fruitur sanguine caro

caro ipsa, utpote osculo uterorū lateris mollitudini adiacente. & impletur caro ab ipso, & insurgit ac eminet, uelut sanguine repleta. Et aliquando si transmoū fuerit os uterorum, & ad pudendum cōuersum, & menses processerint per pudendum, id quod circa lateris mollitudinem eminuit sedatur. In uteros enim distribuitur, hi uero foras laxantur. Si uero non cōuersum fuerit os uterorum ad pudendum, circa lateris mollitudinem suppuratur, & hac parte trāsitus fit mensibus. & eadem pericula sunt, quæ prius sunt relata. Sed & ad uomitum cōuertitur, & quibusdam in sedem, uelut in uirginum morbis à me dictum est, & signa & dolores eosdem ostendit, quos isthic retulimus. At hanc uiam minus faciūt menses mulieribus quàm uirginibus. Quum menses fuerint occultati, dolor habebit imum uentrem, & onus quoddam incūbere uidetur, & lumbos & laterum mollitudinē mirum in modum dolet. Si uero omnino nō procedunt, præ morbo aut crassi & uiscoli, aut glutinosi fiunt. Primum igitur uentrem purgare oportet sursum ac deorsum. Deinde uteros subditio medicamento, à quo sanguis purgatur. Atq; ita quiescere, & potandū dare pharmacum, à quo sanguis prodeat. Bibat etiam Crethmon in uino tædaceo. Si uero fluxus ipsi non fiat, continget ut prægnans esse uideatur, & dum cum uiro coit doleat, ut putet quid incumbere. & grauitas sit in uentre. & uenter prominet, & desiderijs similibus afficitur, uelut in uentre habeat. & stomachi dolore afficitur, maxime ubi quinquaginta dies præterierint. Et dolor aliàs atq; aliàs habet uentrem, & partem circa umbilicum, & collum, et inguina, & lumbos. Et postquā menses duo aut tres præterierint, quandoq; menses acruatim ipsi in pudendum erūpunt. & quæ prodeunt uelut carnem esse putat, quemadmodū ex foetus corruptione & nigra. Quibusdam etiam ulcera fiunt in uteris, & opus habent diligenti animaduersione. Multis uero contingit ut putent se sex mensibus in utero habere, aut etiam paulo breuiore tēpore. & uenter prominet, et alia sibi fieri putat, uelut in uentre habēti. Postea sunt et quibus suppurati eruperūt supra inguen, simul cum quinto aut sexto mēse, et uiam ea parte patefecerūt. Quibusdam autem ulcera fiunt in uteris etiam infra sub inguine. et periclitatur mulier de uita. Si uero etiā superstes maneat, sterilis erit. Quibusdam etiam in pudendū erumpunt, et prodeunt ipsi putrefacti ac purulenti. Et ab his ulcera fiunt in uteris, & periclitatur. Et oportet ut ne antiqua fiant ulcera, cum attentione mederi. Sterilis autem et hæc fit, etiamsi fuerit curata. Si uero non eruperint menses sex mensibus intus conclusi, omnia patietur uelut ea quæ non peperit, in qua menses uia inuenire non possunt. Et si quidem curata fuerit, sana erit. Sin minus, etiam ad octo menses durans moritur. Multis uero contingit, ut menses pituitosi ad multum tempus prodeuntes, etiam pauciores sanis sint, sana aut talis fit, si conuenienti cura fuerit sanata. Si uero menses mulieri prodeant quidem, uerū pauciores q̄ conuenit, utpote osculo uterorum paululū à pudendo emoto, aut nuper concluso ad hoc, ut prodeant quidem, uerum obturentur ab ipsis etiam transitus, per quos penetrant ubi ad uteros descendūt: moderati sanè paulatim prodeunt, sanguine semper perfecte osculo incūbente. Et postquā dies præterierint quibus purgari solet, et conclusus fuerit sanguis in uteris relictus, et alij menses subdescendentes non expulerint conclusum sanguinem, sed semper paulatim grauant, et primis mensibus duobus aut tribus non ualde prodeunt.

Postquam

Postquam autem plures menses præterierint, adhuc magis dolebit. & non habet in uentre, quàm diu sanè sic habuerit. et febris corripit ipsam debilis, maxime in diebus quibus purgari solet. Verisimile est autem et in intermedio tempore ipsam febrire, et horrere, et stomachi dolore uexari, et ad multitudinem addere singulis diebus. Et dolet aliàs atque aliàs corpus, et maxime lumbos, et spinā, et inguina, et articulos manuum ac pedum. Verum his locis non simul dolet, sed aliàs atque aliàs, qua parte sanguis discretus, et in uteris esse non potens impetu suo grauarit. & qua sanè corporis parte incubuerit, tumor est, sitque etiam conuulsio fortis articularum corporis. Et aliàs aliud ex relatis antea signis ipsi apparet. Hęc siquidem iuxta debitum modum curata fuerit, sana euadet. Sin minus, morbus septimestris aut diuturnior factus, lethalis fuerit, aut claudam faciet, aut artes aliquas impotentes efficiet, si præ rigore & cibi fastidio, sanguis circa neruos compactus fuerit, quęcunque tandem locum occupauerit. Hic autem morbus magis fit his quę uirum non habent. Si uero hi morbi iam relati, aut quęcunque postea referentur, incidunt in eam quę partum non sit experta, diuturniores erunt, & minus dolorosi. Verum signa eadem, & iidem fines, tum ei quę non peperit, tum ei quę puerperia experta est, contingunt, si non curentur. Oportet autem statim curationem facere. Sin minus, statim comparēt morbi. Si uero menses plures quàm oporteat prodeant, & crassiores. Nimirum corpore natum fluidum existente, & osculo uterorum prope pudendum sito, & ad hæc multo cum uiro coitu utatur, & conuiuetur, semel aliquando multi descendentes, & cumulate prodeunt, os uterorum impetu suo magis dilatant. & si ad hæc non incidat uasorum euacuatio, sed rursus multus accesserit calor, & os amplius faciunt, & corpus: utpote dum cōuiuante & uoluptatem ac consuetudinem uiri cōsecrante muliere, facili fluxu ad uteros etiam calor defertur. & decolor erit quę diu sic habuerit. & si postea morbus aliquis aut affectio inciderit, ut corpus affligatur, & uteri similiter iuxta solitum morem ampli sunt, & corpus facili fluxu in ipsos præditum est. Et post hæc febris habet, & cibum auersatur, & anxia est, & tenuis ac debilis. & lumbos ex mensibus dolebit. & progressu temporis si non curata fuerit, omnia ipsam magis affligent in intermedio tempore. & periculum ipsi imminet, ne sterilis fiat, aut à tempore & morbo uexata, si alius morbus coincidat, ex hoc moriatur. prodeunt autem menses crassiores & plurimi, in intermedijs diebus. Incipientes autem & desinentes, pauciores & tenuiores. Moderati uero sunt menses prodeunt in omni muliere si sana sit, ut duarum heminarum Atticarum mensura secedant, aut paulo plures, uel pauciores. atque hoc ad duos aut tres dies. Longius autem tempus aut breuius, morbosum & sterile est. Coniectare porro oportet, mulieris corpus inspiciendo, & interrogare collatione ad priora facta, an semper morbosa uiuat, aut non. Si enim pauciores aut plures dies quę solent prodeant, aut ipsi pauciores aut plures fuerint, morbo si sunt: Nisi natura ipsa morbosa & sterilis fuerit. Si uero hoc fuerit, & ad salubriorem statum transmutatur, melius est. procedit autem sanguis uelut à uictima, & cito congelatur si sanā fuerit mulier. Quibus uero in natura est, ut plures quę quatuor dies purgentur, & menses ualde multi prodeunt, hęc tenues fiunt, & foetus ipsarum tenues, & emarcescunt. Quibus autem purgatio infra tres dies fit, aut pauci menses secedunt, hæc crassæ sunt, & bene coloratæ, uirilesque ac partus immemores.

& neq; concipiunt. Si suffocatio derepēte accesserit: fit autem maximē his quæ cum uiris non coeunt, & senioribus magis q̃ iunioribus. Leuiiores enim uteri ipsarum sunt: fit autem potissimū tunc, ubi mulieri uasa euacuata fuerint, aut plus solito laborarit: resiccati à labore uteri conuertūtur, ut qui uacui sint ac leues. Est enim ipsis locus spatiosus ut conuertantur, utpote uentre uacuo existente. Dum autem conuertuntur, impetunt hepar, & iuxta consistunt, & ad præcordia irruunt. Currunt enim & progrediuntur sursum ad humiditatem, tanquam à labore magis q̃ opportunum est resiccati. Hepar autem humidum est. Postq̃ autē impetiuierint hepar, suffocationem faciunt, derepente perspirationem circa uentrē intercipiētes. & aliquādo simul incipiunt hepar impetere, & à capite pituita defluit ad præcordia, uelut ab eo quod suffocatur. et aliquādo simul cum pituitæ defluxu, descēdunt ab hepate ad locum suum, & cessat suffocatio. Descendunt autē detrahentes humiditatē, & grauati. Stridor autē ab ipsis fit, dum ad suam ipsorū sedem procedunt. postquā autē eò deuenerint, aliquādo uenter post illa humidior fit, q̃ superiori tempore. Laxat enim iam caput pituita in uentrem. Vbi uero apud hepar & præcordia fuerint uteri, & strangularint, mulier albas oculorum partes subuertit, & frigida fit. Sunt autē & quæliuidæ fiunt. Quædam etiam dentibus frendunt, & saliuæ ad os fluunt. & similes sunt his qui ab Herculeo morbo detinētur. Si uero diutius morā traxerint uteri apud hepar & præcordia, mulier strangulatur. Quādoq; uero ubi mulier uasa euacuata habuerit, & insuper laborarit, uteri cōuersi ad uesicæ stomachum allabuntur, & urinæ stillicidium inducunt. Aliud autem nihil mali habet, & curata cito sanescit, quandoq; etiam sponte. Quibusdā uero ex labore aut inedia, ad lumbos aut ad coxas allapsi, dolores exhibent. Si mulier corpore male habuerit, & menses biliosi prodierint, ex hoc probe cognosci possunt. Nigri sunt ualde, quandoq; uero nigri aut splendidi. & paucissimi prodeunt, & cissime congelantur. & semen amborum, & maris & foeminæ euanescit. & non habet in uētre. & incipiente quidē morbo, purgatur diēbus quibus solita fuit, non pluribus. progredientibus autem mensibus, pluribus diebus purgatur, & menses pauciores singulis diebus apparent. Et febres succedunt erroneæ acutæ, cum horrore & cibi fastidio aliàs atq; aliàs, & stomachi dolor. & dolebit maxime ubi menses ipsi appropinquarent. Postquā autem purgata fuerit, & ad modicum tempus, superiorū respectu melius habuerit, postea rursus ad idem perueniet. Dum autem curatur, cito sana fit. Si uero non curetur, & tempus procedat, omnia prius relata ualde ipsum affligent. & dolor corripiet, nunc uentris partem infra umbilicum, nunc inguina, nunc lumbos & coxædicum ad sedem iuncturam, nunc collum, aliquādo uero strangulatio fortis accidet. & caligo ante oculos obuersabitur, & uertigo, utpote purgatione sursum uergēte ac alcescente. Si enim corpus male habuerit mulieri menses pauciores fiunt. & quibus corpus plenum fuerit, his menses plures prodeunt. At uero biliosæ si menses prodeant, pusillanimitas incidit, & cibi fastidiū aliàs atq; aliàs, & anxietas, ac uigilia, & eructat frequēter. & nō uult deambulare, & tristis est, & nō uidere sibi uidetur, & timet. Et si curetur, ex his sana erit. Si uero rēpus processerit, adhuc magis dolebit. Optime autē cum hac agatur, si uomitus biliosus succedat, aut uenter turbetur, non fortiter, & subeant biliosa. & si fluxus succedat ipsi nō for-

tis. Si enim quid ex his forte inciderit in corpus afflictū, periclitabitur. Si uero leniter depurgetur aliquid biliosi aut totum id quod molestum est, sana fiet. Si uero neq; curetur, neq; quicquā horum fiat, moritur mulier, plerūq; tamen cōtingit ut fluxus incidat biliosus ex hoc morbo. & si fluxus fiat, primū quidem pauca sunt quę comparent, per omnes autē dies omnino plura contingūt. Temporis autē progressu plerūq; etiā morbus acutus fit. & uteri à purgatione biliosa prodeūte mordentur, ac exulcerātur. Sed & in hoc adhuc sana fit, si curetur, & fluxus cōpescatur. Si uero uteri ab ulceribus fuerint inflammati, adhuc acutior morbus erit, & multa graeolentia ac purulenta prodibunt, ab ipsis uteris iam egressa, & semper uelut aqua de carnibus. & prius relata omnia ipsam magis affligent. & ulcera adhuc magis efferatiora erunt, donec ipsam uincāt. Si uero etiam sanata fuerit, sterilis erit à cicatricibus. Si mulier corpore male habuerit, & pituitosi menses prodierint, cognosci autem possunt si pituitosi prodeant. Pelliculosi enim apparent, & uelut araneorum casses distenduntur, & subalbidi sunt. Hoc autē contingit, si corpus & caput ipsi pituita repleta fuerint, & hæc non subpurgetur, neq; per nares, neq; per sedem, neq; per urinæ meatum. Sed in mensibus, & in turbatione sanguinis, unā cum purgatione foras exit. Et si hæc sic habuerint, ad duos quidē aut tres menses nihil ægrotat. postquam autem amplius tempus progressum fuerit, & nō curetur, magis dolebit. & febris erronea corripiet, & cibum aliās atq; aliās fastidiet, & stomachum dolebit, & maxime dolebit ubi menses appropinquant. Quū uero purgata fuerit, ad modicum tempus, superiorum respectu melius habebit, postea ad idem relabitur, & si non curetur, sed tempus procedat, fient ipsi omnia quæ ei cui biliosi menses prodibant, donec fluxus sistatur. Consequitur etiam ut hæc fluxus pituitosum habeat, aut alia quæ ego dicam paulo postea. Et si quidem fluxus succedat, semper procedunt per omnes dies, nūc acruata, nūc pauca. & quandoq; uelut à carnibus aqua prodit, quandoq; uelut sanies. & in hoc ipso multi sanguinis grumi insunt. & radit terram uelut acetum, & mordet ubicūq; mulierem contigerit, & uteros exulcerat. Et ubi ad hoc peruenit, reliqua quidem similiter patitur, uelut prior. Minus uero quā illa caput dolebit, et ulcera neq; deformia, neq; magna, neq; purulenta, neq; graeolentia, similiter uelut illi fiunt, sed minus huic. Si uero curetur, sana euadit, etiā ubi morbus progressum fecit, & non ualde moritur. Verum prægnans esse non potest quæ sic habet. Quæcunq; uiro cohabitantes in uentre habere non possunt, interrogandæ sunt, an ipsis menses prodeant, aut non: & an purulenti sint, aut frigidi.

Si quidem igitur responderit, interrogetur an statim exeat genitura, an postera die, aut tertia, aut sexta, aut septima. Si igitur dixerit statim exire ubi coeuit, uteri osculum rectum non est, sed distortum, & genituram non capit. Si uero dixerit, postera die, aut tertia, uterus perhumectus est, & semen eluitur. Si uero sexta aut septima, semen computrescit, putrefactū uero exit. Si igitur ab initio non suscipiat semen, os uteri primum curandum est, ut rectum sit. Si uero eluatur postera, aut tertia die, uterus & caput. Si uero computrescat & exeat, & uterus, & totum corpus curetur. Atq; hæc singula sic cognoscere oportet. Quali uero purgatione opus habeat, hoc modo cognoscit. Quum menses prodeunt, linteam complicatū palmi magnitudine super tenuem cinerem ex-

pandito, deinde ut quæ exeunt super hoc defluant curato. Præstat autem duo esse lintea, utrunque seorsim, alterum diurnum, alterum nocturnum. & diurnum quidem, postera die lauare oportet. Nocturnum uero, ubi per diem ac noctem super cinere situm fuit. In lotura uero considerare oportet, qualia nam fiant lintea lota, ubi in sole fuerint siccata. Optimum tamen est in tenebricoso loco ea resiccare. Si quidem igitur pituita fuerit quæ conceptionem impedit, mucosa lintea erunt. Si uero propter falsuginem & bilem impeditur, fulua & subliuida. His igitur consideratis, & diligenti animaduersione expensis, totum etiam corpus inspicito, an multa purgatione opus habeat, aut secus, ita ut & ad colorem, & ætatē, & robur, & anni tempus, & qua diætā utantur respicias. Curatio uero & totius corporis est, & uteros ac osculum ipsorum sanare. & si hoc conclusum fuerit, æ perire. Si uero illi distorti fuerint, dirigere oportet. Si autem humidi fuerint, resiccare. & alia quoque facere contraria. Færmè autem omnibus multa curatio eadē est, excepta mēsum detractiōne. Nam quibus nihil prodit, his detrachere oportet. Immo quicquid in mensibus mali inest, hæc auferre oportet: quum uidelicet pituitosi sunt, & pelliculosi, & saniosi, & tenues, aut albi, & grumosi; & quum nigri sunt, & carbūculosi, aut caliginosi, aut acres, falsi, turbati, purulenti. Hæ omnes causæ tollendæ. Prohibent enim in uentre conceptum. Quibuscūque igitur menses pituitosi ac pelliculosi sunt, hæ carnosæ sunt, & his os humectum est, et salua multa ac uiscosa. Et si acidum aut acre quid gustarint, sputum in ore liquidius erit, & insulsum. et ad omnia quæ ederint aut biberint, turbatio sequitur. & supprimitur ipsis ac attollitur uenter. & nausea adest, & anxietas ac iactatio multa. Et à capite fluxus defluit, & omnia obducit, & multam humiditatem inducit. & partes sub oculis liuidæ sunt ac inflatæ. Has totas fouere oportet, & frequenter uomere, & à cibis, et ieiunas. Infernum autem uentrem mollire, sed pharmacis omnino leuibus, quæ minime bilem ducunt. & semel in die cibum capere, & frequenter exerceri. Et cibo siccissimo uti, & potu paucissimo meraciore. Melius autem est ut uenter facile solubilis cōseruetur. Verum uteros si ad hanc diætā non paruerint, pharmacis subditijis non mordacibus purgare oportet. Fomentum tamē semper purgationibus præmittendum est, prius id quod ex sceniculo paratur. Deinde quod ex suffimētis. Fomento uera & subditiōes medicamentorum facito, cōiectura facta ut omnia fiant, & pro ratione adhibeantur, quo tempore menses prodeunt. Si quidē igitur puri & sinceri ac cruenti fiant, ita ad uirum accedat incipientibus mēsis. Optimū autem, desinētibus, & adhuc euntibus, magis quā ubi disparuerunt. Quū autem ad uirum itura est, suffimentum quoddam ex adstringētibus suffiat, atque hoc per canistrū, & arundinem, pharmaco calido cineri insperfo. Quū uero insperferis, & canistrū, siue operculum circumponito, & per arundinē insidenti fomentum adhibeto. Vbi uero opus fuerit ipsam suffiri, plūbea fistula utere, ut aperto osculo suffiatur. Deinde quū surrexit, rursus in lecto plumbeam fistulam apponat, Deinde ea subtracta cū uiro coeat. Et si ea quæ à uiro prodeunt, non fuerint ei manifesta, extensis & alternatim positis cruribus quiescat. Ieiuniū autem utile est in hac die, præterquā si cyceonem uelit non salsum in aqua. Hunc autem tunc bibat quum uult suffiri. Si uero ubi cum uiro coiuuit, postridie detineat genituram, & neque altera die exeat: à cibis quidem & balneis prohibeatur. Bibat autem polentam in aqua non sal-

fam, bis ac ter in die. Atq; hæc diæta sit per sex dies, aut quod melius est, septē;
 si non exierint ea quæ à uiro suscepit dum cū ipso coīuit. Illota uero maneat per
 omne tempus, et det operā ut motus uitet. Si uero deambulare uelit, deambulet
 in loco plano et leui, nequaquā accliuī, neq; decliuī. Desideat etiam super mollia, si
 conceperit. Reliquam uero diætā eandē faciat usq; ad dies triginta. Illota autē
 sit, aut si lauari opus habeat, pauca & nō ualde calida lauetur. Caput uero ne ma-
 defaciat. Cibus autē utatur & panibus, & maza si uelit. Ex carnibus autem, pa-
 lumbe, & similibus, ex marinis, his quæ aluum sistunt, prohibeatur ab oleribus
 acribus. Vinō uero nigro utatur. Carnibus autem assatis potius q̄ coctis, tum
 mansuetis, tum ferinis. Et hæc quidē si conceperit, hoc modo facere oportet. Si
 uero non cōceperit, sed secunda aut tertia die exeūt ea quæ à uiro immissa sunt,
 fluentia cū multa humiditate; manifestū est quod uteri sunt humidiores. Cura-
 re itaq; oportet iuxta relatū modum, donec sicci fiant. Quum autē sicci esse uide-
 buntur, sic curato. Optimū est pharmacū mollitoriū, & retro, & anteriori parte
 ipsi adhibitū, donec uteri ad naturam suam redeant, & rursus ad uirū accedat,
 quum menses nō amplius multi, sed pauci & bene colorati fuerint, & ad libidi-
 nem concitatur. Sed & in alijs diebus cum uiro cōsuetudinem habere oportet;
 si optime habuerint uteri. Quum autē in relatis diebus cōsuetudinem habuerit
 cum uiro, si probe parati fuerint uteri, & si geniturā ad decē aut duodecim dies
 detinuerit, ne adeat uirum. Si uero non concipiat, uteri autem sani sint: cōtin-
 git enim & hoc plerisq; quum debiles existentes uteri, ab affectione macilenti
 sunt; aut præ medicamentis & fomento multo, genituram ferre non possunt;
 priusquā a fueti fiant et cōualecant. Hoc autē sic cognosci potest. Quū ab ipsa
 exierint, secūda aut tertia die exeunt, aut adhuc prius, crassa & compacta uelut
 mucus: nisi mali quid sit, & propter aliū uterorum morbum genitura discedat.
 Quum igitur talia apparuerint, curatione quidē uterorum nō est opus, uerum
 reliqui corporis cura habenda est, quo huiusmodi bonus habitus sit ipsi, ut con-
 tractum simul sit corpus, & iusta mole præditū, ex paucorū balneorū, plurium
 uero & leuium laborum usu. Ab acribus autē & salsis prohibeatur. Vomitus
 utatur ante dies quibus menses fieri solent, & rursus fame maceretur, & alia per-
 ficiat quæ dicta sunt. Atq; hæc quidem harū curatio est. Quibus autē statim
 ubi coīuerint diffiuunt ea quæ à uiro sunt immissa, his os uterorū causa est. Cu-
 rare uero sic oportet. Si quidem ualde cōclusum fuerit, tædis & plumbeis fistu-
 lis immisis aperito, & molli fomēto ex fœniculo foueto, et subdititijs, quæ ute-
 ros attenuant, & in directū redigunt, purgato. Post purgationes autē & fomē-
 ta, ea infundito quæ causæ sunt cōtraria. Quibus uero os distortū est, & ad
 coxam allapsū, fiūt enim etiā talia prohibētia ne uterus semen suscipiat: Quū
 igitur tale quid acciderit, odoratis fomētis fouere oportet, post fomentum autē,
 per digitū auulsū à coxa detrahito. Quū autē discesserit, tædis & plumbeis fi-
 stulis immisis iuxta priorē rationem in rectitudinē dirigito. ubi uero rectifica-
 ti ac aperti fuerint uteri, medicamētis subdititijs purgato, & alia facito iuxta re-
 latam rationē. Quum autē magis q̄ oportet aperti fuerint uteri, purgatio-
 ne opus habent, post purgationes autē, collutionibus & suffimētis. Si uero pro-
 piores sint q̄ oportet, uomitibus uteri opus habent, & fomento foetido, donec
 ad suum locum redeant. Diætā uero utendū est relata. Si uero os pingue fuerit

& crassum, & propterea non concipiat, sinapi coctum ieiuna edat, & meracum insuper bibat. Apponat autem nitrū rubrum, & cuminum, ac resinam. Optimum autem fuerit nitrū uino ammiscere & resinā, unā cum cumino & unguento albo. Aut cornu cerui urito, & duplū crudæ ordeaceæ farinæ cū uino ammisceto. Si uero non melius habeat, porrum coquito, & ipsam insidere facito. Aut phagum id est glandem tritam apponat. Et allio recenti uescatur, & aqua multa insuper pota uomat. Quibus porro intus manet uiri semen & computrescit, & turbationem facit, his atriplicis semē aut succum, cum melle aut cum cumino delingendū dato. Quum autem à uiro immissa graueolentia fuerint, non concipit. Portulacam igitur & adipem anserinum misceto & apponito. Quibus uero sexta aut septima die, à uiro immissa prodeūt putrefacta, his ueris simile est ab utrisq; fieri, & bilis, & saluginis influxu. Curare autē sic oportet, per ueratrū, aut scammoniam, aut pepliū. Hæc enim sursum ac deorsum pituitam & bilem purgant, & flatus educunt. Ante purgationes aut fomentis utendum est ex suffimētis. Vbi uero fomentum adhibueris, per subdititia purgato, eodē modo uelut in prioribus. Et post subdititiōrū ac purgatiōnū usum, molliorij utere, & subdititio medicamento ex mercuriali & artemisia herba, & anemona, & ueratro albo aut nigro. Atq; hæc quidem medicationes hoc modo hinc cōducunt. Diætā uero respectū ad totū hominis corpus factō cōstituere oportet, siue siccior, siue carnosior mulier esse uideatur. Et si quidē siccior fuerit, balneis pluribus, & obsonijs omnibus coctis, tum marinis, tū carnibus utatur. Vino uero aquoso, & oleribus coctis, & pinguibus omnibus ac dulcibus. Hæc enim plerūq; faciūt ut humiditas sit, tū in reliquo corpore, tum in uteris. Si uero humidior fuerit, tales uteri nullo ex his opus habēt, sed uice uersa neq; cōtrecentur, neq; lauare recētū motu factō oportet, neq; suffire. Nam ad periculū hæc procedere solēt. Et si magis q̃ pro natura fuerint humectæ, siccare sanē ac suffire oportet. Si uero biliosa in ipsos cōfluāt, medicamentū dare quod bilē purgat. Si uero saluginosa, lac asininū, & uinū, & alia auxiliaria. Morborū porro uires cōsiderare oportet, & causas ex quibus morbi sūt exquirere, atq; sic ad alia procedere, & morbos circa locos curare. & quæ quidē ob causam osculorū hiantium prohibentur, ut ne detineant in uētre, horū oscula præparare, ut probe diducta sint. Quū uero humiditas prohibuerit, hāc inspicere ut ne impediāt, totis mulierū negotijs expēsis, siue ex toto corpore quid moueri uideatur, siue ex ipsis uteris, siue ex utrisq;. Vteros autē sic curare oportet, ut neq; humidi sint, neq; ualde sicci. Imò sicciores quidē, tātō magis bono succo, quāto sunt sicciores, eiusmodi humiditate ut pingues magis fiant q̃ graciles. Humectos uero & madidos siccare, ita ut relinquantur quo humidi sint, et nō ualde resiccētur. Excessus enim in his ualde sunt uitādi. Concipit autē in uētre, neq; ea quæ humiditatē habet, neq; quæ resiccata est, nisi quid horū in ueteri natura fuerit. Cæterū uirum adire ipsam oportet, post adhibitā curationem, desinētibus aut inchoantibus mensib. Optimum est etiā ubi quieuerint. Maxime uero in his diebus experiendū est, an prægnās fieri possit. hi enim sunt opportunissimi. Si uero nō statim cōcipiat, & reliqua bene habeāt, nihil prohibet etiā alijs diebus cū uiro coire. Nā hæc exercitatio alacritatē ipsi inducit, & uenulæ hinc laxātur. & si ea quæ à uiro prodeūt concurrerint secundū rectitudinē cum eo quod à muliere, citius cōcipiet. Hæc enim

causā

cauſſa eſt his, quibus ſiue ſtatim, ſiue poſteriore tēpore exeunt. Atq; hæc quidē de his dicta ſunt. Si uero humidius fuerit os uterorū, genituram attrahere non poſſunt. Vtendū autē eſt medicamētis ſubdititijs acribus. Cōmorſus enim & inflāmus ſtomachus, ſolidus ac firmus quādoq; fit, & aliquo modo accōmōdatur. Sed & ſi in callū indurati fuerint, præſtat acria apponere quæ mordeant. Quæ enim tenuia et feruida ſunt, calli duriciā diffundūt. Si uero mollitus fuerit callus, mollibus curato, & his quæ nō mordent. Quod ſi diu nō concipiat, menſibus nō apparētibus, quū tertia aut quarta dies aderit, alumen tritum, unguēto dilutū, & lana exceptum apponito, & habeat per triduū. Quarta uero die fel bubulū ſiccū in oleo feruefacito, & lanam tenerā eo imbutā ſubdito, & habeat per triduū. Poſtridie autē eximat, & cū uiro coeat. Si geniturā non ſuſcipiat mulier, mēſibus ſecundū naturam prodeūtibus, membrana præpoſita eſt. ſit etiā ex alijs cauſis. cognoſces autē ubi digito obicem cōtigeris. facito autē medicamentū ſubdititiū, reſinam et æris florē cum melle ſubacta in linteo apponito q̄ penitiſſime, filo ad extremitatē alligato, ubi uero hoc extraxerit, myrtū in uino coquat, & uino tepido perluatur. præſtat autē membranā auferre. Sūt autē mulieres quæ facile quidē in uentre cōcipiunt, geſtare uero nō poſſunt, ſed fœtus ipſis corrūpuntur, aut tertio, aut quarto mēſe, nulla cauſa accedēte, neq; cibo incōmodo ingeſto. et hæc eſt cauſa quæ relata eſt, & maxime quū uteri augmentum fœtus dimiſerint, aut uēter ipſis turbetur. Debilitas autē, & febris uehemēs, & cibi faſtidium incidit eo tēpore quo fœtus corrūpunt. Eſt autē & hæc cauſa, ſi uteri fuerint leues, aut natura, aut ulceribus in ipſis innatis. Si enim leues fuerint, quādoq; continentes ipſum pelliculæ, minus q̄ oportet cohærēt: utpote quū uteri ipſi pleni exiſtant. cognouerit autē quīs hæc ſingula, ſi de his exacte interroget. Deleuitate uero cognouerit, ſi alia mulier contigerit, dum uteri uacui ſunt. Non enim hoc tempore manifeſtū ſit. Si uero menſes prodierint his acruatim prodeunt. Quibuſdā tamen ipſarū contingit ut fœtus edant. Et ſi qua curetur, ſpes partus adeſt. & de his quidē ſic habet. Si mulierem puerperam facere uelis, aliàs concipere nequeuntē, menſes conſiderare oportet, an pituiſoſi ſunt aut biliſoſi. Cognoſces autē ſic. Arenā tenuem ac ſiccā ſubj̄cito, & quū menſes prodeunt, in ſole ſanguinē ſuperfundito, ac ſiccari finito. Et ſi quidē biliſoſa fuerit, ſanguis in arena ſiccatus pallidus erit. Si uero pituiſoſa fuerit, uelut muſcus. Vtrum igitur horū fuerit, uentrem purgato, ſiue ſupra opus habuerit, ſiue infra. poſtea uteros purgato. Si uero cōcipere uoles, hederæ grāna ſeptem, aut ſolia, ſingulis mēſibus in uino ueteri, ceſſantibus mēſibus bibēda dato. Et mali coriū in uino odorato meraco coquito, & glandem ex hoc factā in meridie ſubdito. Aut alumen Aegyptiū tritum lanæ illigatū apponito. Quū autē ſol occiderit, eo detracto, uino odorato perluatur. Hæc autē ceſſantibus mēſibus facere oportet. Sed & hoc ſic habet. Quū purgatæ fuerint mulieres, maxime in uētre cōcipiunt cū uiro conſuetudinē habētes. et genitura ipſis corroboratur, ſi quādo oportet coiuerint. Et ſemen uiiri facile ammiſcetur, & ſi præualuerit, illi accōmodatur ac appropriatur. Tunc enim maxime os uterorū hiat, & diſtentū eſt poſt purgationes. Et uenæ geniturā attrahūt. At in priore tēpore, et os uterorū cōduſum eſt, & uenæ magis ſanguine plenæ exiſtētes, nō ſimiliter geniturā attrahunt. Si uero genitura iugi curſu deſluat, mulier uiro miſceri non cupit,

& si misceatur, non concipit; & lumbi ac coxendices doloribus uexantur, & febribus debilibus corripit, & impotentia ac animi deliquium succedit. & aliquando uteri in suo loco non sunt. Si quidē igitur præ plenitudine defluat, sinere ipsam optimum est. Si uero uterus laxus fiat, diæta sit alica, caro suilla, aut palubis, & uinum nigrū. potiones uero, quæ ad fluxum describentur. Nunc porro dicam de morbis earum quæ in uentre habent. Pronuncio aut de muliere in uentre habente duos aut tres menses & ultra, si menses statim prodeant singulis mensibus, necesse est tenuem ipsam fieri ac debile. Quādoq; etiam febris ipsam corripit his diebus, q̄ diu menses prodierint. Et dum prodeunt, & postq̄ prodierint, pallida fit. Sed & pauci prodeunt. His uteri magis q̄ opportunū est hiant, & augmentū foetus dimittunt. Descendit enim quū mulier in uentre habet, sanguis paulatim in uteros à toto corpore. & in orbē circa id quod in uteris est circumstans, illud auget. Si uero hiarint uteri magis quā oportet, sanguinē singulis mensibus, uelut procedere solet, dimittunt. Et quod in uteris est, tenue ac debile fit. Si uero curetur mulier, melior & foetus, & mulier euadit. Si uero non curetur, foetus corrumpitur. Sed & ipsa periclitatur, ne diuturnum habeat morbum, si purgatio plus quā oportet prodeat. Quia & post corruptionem periculum imminet, nimirū uteris magis apertis. Si uero mulieri in utero habenti caput pituitosum fuerit, & pituita acris in uentrē descenderit, & à capite uentrem perripit, & febris debilis ipsam corripit, & palpitationes quibusdam debiles subexolutæ, augescentes acutæ. Si uero etiam cibi fastidiū, & impotentia corripiat, periculum est ne breui foetus corrumpatur. Sed & ipsa in periculum adducetur, si non curetur, ubi uero effugerit, utpote uentre fluido existente, statim concludere ac cōstringere oportet. Multa uero etiam alia sunt pericula, in quibus foetus corrumpuntur. Nam si mulier in uentre habens ægrotarit, aut debilis fuerit, aut onus leuarit, aut percussa fuerit, aut saltarit, aut cibum fastidierit, aut animi deliquio correpta fuerit, aut amplius aut minus nutrimentum accipiat, aut timeat, & consternetur, aut uociferetur, aut intemperanter uiuat foetum corrumpet. Nam et cibus corruptionis causa est, et potus multus. Sed & ipsi uteri naturas habent, quibus abortum faciunt, quum sunt flatuosi, densi, magni, parui, & alia his similia. Si mulier in utero habens, uentrem aut lumbos doleat, formidare oportet ne foetum per abortum edat, pelliculis qui ipsum continent ruptis. Sunt etiam quæ foetus corrumpunt, si acre quid, aut amarum ederint, aut biberint præter consuetudinē, dum adhuc paruus intus est puerulus. Si enim puero quid accidat præter cōsuetudinem, & si paruulus adhuc fuerit, moritur. Et si eiusmodi edat aut bibat, uelut diximus, ut necesse sit ipsi turbare uentrem, dum adhuc paruus est puer. Percipiunt enim & concitantur ipsi uteri, fluxione ex uentre secedente. Et si laborarit mulier plus quā oportet, et uenter ipsius concludatur, aut magnus fiat, etiam sic puer corrumpitur, uelut à labore calefactus, et à uentre pressus. Plerūq; enim dum parui sunt, debiles sunt. Quidam uero etiam magni corrumpuntur. Quare mirari non oportet mulieres, quod inuitæ corrumpunt. Nam custodia & scientia multa opus est, ut in uteris gestent puerum & enutrient, & ut euadant ab ipso in partu.

Si uero mulier in uentre habens, corpore male habeat, & fuerit biliosa & doloribus uexata, & aliàs atq; aliàs febricitet, & os examarescat, & lingua cum uirore

rore pallida fiat, oculi uelut morbo regio affecti, ungues biliosi, urina acris: hæc tum aliàs, tum si febricitet, aliàs atq; aliàs ipsi accident: postquã uero etiam purgationem contigerit biliosam esse, planè timendum est etiam pueros debiles fore: hæc si biliosa per secessum egerat (id quod ualde contingit) melius deget. Et si biliosa aut ualde nigra sunt partus purgamenta, etiam ut plurimũ pinguedo succedit, & prodeunt paulatim, & non cito congelantur. & primo quidem tempore leuius fert, postea uero grauius, & minus purgatur q̃ oportet. Si enim corpus male habuerit, etiam partus purgamẽta pauciora ac deteriora ipsi procedẽt. Patietur autem & hæc omnia, etiam si menses prodeant biliosi. Verũ breuiori tempore ægrotabit. Et morbus ad eadem pericula, & signa, & trãsmutationes deueniet. Aut enim ipsis uomitus biliosus, aut purgatio per uentrẽ, in hoc morbo fit, et uteri exulcerantur. Multa uero custodia mulier opus habet. Quum igitur tale quid factũ fuerit, ut ne moriatur, sterilis erit. Si uero nihil horum fiat, et non curetur, sed partus purgamenta fuerint ipsi occultata, in triginta et una diebus ut plurimum moritur. Huic pharmacum in potu exhibendũ est quod bilem ducat. Prodest & anisum, & quæ ad urinam ciendam dantur, Vomant autẽ, & sudores eliciantur, & alius succo ptisanæ, & melle, & ouis, & maluæ aqua infusa eluatur.

Quibus in uentre habentibus circa septimum aut octauum mensem, derepente mammarũ & uentris plenitudo collabitur, & ubera gracilescent, & lac nõ apparet, his dicendum est, puerum aut mortuum esse, aut uiuere & debilem esse. Si enim in uẽtre habuerint, & apparuerint menses: aut abortus fiunt, si plures fuerint & male olentes, aut fœtus morbosus fiũt.

Si mulier in uentre habẽs pituitosa fuerit, & caput dolet, et aliàs atq; aliàs febricit. & in capite obuoluitur pituita. Et grauitatẽ exhibet ac frigus. & in corpus procedit, & in uenas, quũ caput fuerit repletũ. Fit etiam colore plumbo similis, & uomit pituitã, lingua alba est, & urina cõmuniter exalbescit, frigida est, turbatio adest, & æger motus. Vbi uero pepererit, procedet ipsi purgatio pituitosa, & apparebit pelliculosa, & uelut araneorũ casses in hac distenti erunt. & patietur quidem eadem omnia etiam ea cui menses pituitosi prodeunt. uerũ breuiore tẽpore ægrotabit. & eadem pericula, & signa, & trãsmutationes morbus habebit. Continget enim ipsi uomitũ pituitosum fieri, & affectiones similes uel illi accident. Depẽdent enim eodem modo partus purgamẽta, & menses pituitosi, uerũ purgamenta partus breuiore tempore quàm menses. & nisi eruperit ipsa purgatio quæ diu morã traxit, moritur in quinque & quadraginta diebus, etiam si pituitosum partus purgamentũ ipsi prodierit. Curata autẽ mulier, sana fiet, et inflabitur ab initio si sanata fuerit. Grauis enim erit hic morbus. Huic dare oportet pharmacũ quod pituitã ducit. & lac caprinum coctum cum melle miscere. Si uero sæpe nõ obediãt, nasturtiũ, aut cnicum, aut cneorũ, aut polypodiũ, aut serũ, aut medicamentũ ex sale cõpositum exhibeto, & quæcũq; pituitã laxant, ac educũt. Si uero mulier in utero habẽs, lienosa sit à relatis affectionibus, in hoc morbo menses hydropi similes & pituitosos demittit. & partus purgamẽta procedẽt hydropi similia, et prodibũt modo multa, modo pauca, et fiũt quemadmodũ aqua à carnibus, uelut si quis carnes cruentas abluat. Aliquãdo uero paulo crassiora, et nõ cõgelantur. Et patietur eadẽ omnia etiã ea cui menses aquosi procedunt, & pericula eadem ac trãsmutationes morbus habebit. Con-

tinget

tinget enim ipsi fluxum aquosum fieri, aut purgationē occultari, & ad uentrem conuerti, & ad crura, aut ad pectus, aut aliquam harum partium. & pericula erunt eadem quæ prius sunt relata. Si prægnans intumescat, urticæ semen plurimum, & mel, & uinum dilutum odoratum potandum dato, bis in die.

Si prænantem bilis uexet, pitisanæ succum dato, rhoe rubro insperso, aut eo qui ex moris paratur. Sorbeat autem frigidam, & sistetur. Si suffocatio derepente accidat prægnanti. Fit autem hoc maxime ubi mulier laborarit, & cibum fastidierit, uteris à labore calefactis, & pauciore humore foetui accedente. Et quum uterus ac uenter inanior sit quàm oportet, procedit foetus ad hepar & præcordia, ut quæ sunt humecta, & suffocationem fortem derepente inducit. Intercepit enim perspirationem circa uentrem, et mulier uoce priuatur, et albas oculorum partes subuertit, et reliqua patitur omnia quæ relata sunt, si mulier non prægnans ab utero suffocetur. Quin et suffocatio fieri incipit mulieri in uentre habenti, quum à capite defluit pituita ad præcordia, utpote corpore respirationem trahere non potente. Et si quidem unà cum pituitæ descensu, foetus redierit ad suum locum, uelut qui humorem attraxit, et à pituita delatus sit, mulier sana fit. Stridor autem fit foetu locum suum occupante. Et uenter mulieris ut plurimum humidus fit. Si uero non breui redeat foetus in suum locum, duo iam fiunt quæ foetum affligunt, pituita quæ à capite descendit, grauat enim et insistentem frigefacit: et loci alienitas, et periclitabitur. Et si non breui quis commodiorem diætam adhibuerit, mulier suffocabitur. Et de his quidem sic habet.

Si uero mulieri in uentre habenti, tempus partus iam affuerit, et dolor paratus tenuerit, et ad multum tempus mulier puerum edere non poterit, omnino obliquus aut in pedes procedit. Vtile est autem in caput procedere. Et si obliquus procedat, difficilis fit affectio. Sicut enim si quis in uas oleariū angustioris nucleum immittat, nō procliuē est extrahere ipsum obliquatum. Sic sanè etiam mulieri grauis affectio est, ubi foetus fuerit obliquatus. Difficile est enim ipsum exire. Graue autem est etiam si in pedes processerit, et sæpe aut matres pereunt, aut pueri, aut ambo. Est autem et hæc magna causa ut non facile exeat, si mortuus, aut syderatus, aut duplicatus fuerit. Quum mulier in uentre habuerit, tota fit cum uirore pallida, quoniā purus ipsius sanguis semper quotidie ex corpore destillat, et in foetum descendit, et augmentum ipsi accedit. Et quum paucior sanguis sit in corpore, necesse est ipsam esse pallidam, et semper alienos cibos appetere, et sanguinea in uentrem intrare. Et debiliior fit, quoniā sanguis minuitur. Assero porrò mulierē ubi pariet, frequentem spiritum emittere. Et si purgatio inceperit, uenter plenus est, et calore pressus. Maxime uero frequēter respirat, ubi partus appropinquat. Et tunc maxime lumbos dolet. Nam et lumbi à foetu colliduntur. Dolet autem stomachum siue uentriculi osculum in intermedio tempore aliàs atq; aliàs, utpote dum uēter, maxime uero uterus, circum foetum obuoluitur. Et si puerperæ uterus inflatur, ouiculæ aut capræ hepar cinere obruito, deinde coquito, et hoc edat, ac uinum meracius uetus, si nihil prohibuerit, bibat ad diēs quatuor, si longius aberit à partu. Si uero lumbos doleat, anisum et cuminum Aethiopicum bibat. Et calida lauetur. Si uero anhelatio corripit, sulphuris magnitudinē fabæ, et cardamomi tantundē, et rutę ac cumini Aethiopici tantundē. Hæc terito, et uino diluta ieiunę bibenda

bibenda præbetò. Et à cibis frequenter absteineat. Si in partu purgatio multo prodierit, uterus contrahitur, & uesica, & intestinum, & neque stercus continet, sed & urinam emittunt. Oua igitur sorbenda dato, & panem cinericiu edendum, & reliqua quæ scripta sunt. Si uero ea quæ in partu est, sicca fuerit, & difficulter humectetur, oleu bibat, & locos oleo calido cum malua aqua iriget, & cerato liquido illinat, & anserinu adipem cum oleo infundat. Si uero parere non poterit, resina, aut cuminum, aut pinus corticem suffito.

Quicunque uero tumores uteri in partu, aut ex partu fiunt, eos adstringere non oportet, uelut medici faciunt: uerum pharmaca optima exhibeto. Cum minimum Aethiopicum quantum tribus digitis capi potest, & anisi, & seselis grana quinque aut sex, pæoniæ radicis aut etiam seminis testam conchæ maioris dimidia. Hæc in uino albo odorato maxime, ieiunæ exhibeto. Aut dauci Aethiopici radicem, seseli, pæoniæ radicem, eodem modo. Aut hipposelini, aut dauci Aethiopici semen, eodem modo. Aut crethmi radicem. Aut cuminum Aethiopicum quatuor oboloru Atticoru pondere. Aut piper, anisum, daucū, pæoniæ Atticæ radicē, hæc in uino terito, & bibenda dato. Aut myrtidani ramulos duos aut tres, & cuminu Aethiopicum, & pæoniæ radicē. Aut etiam lini semen similiter, quo etiam pueros tussientes nutriūt, cum oui affati uittello, & cum sesamo tosto.

Si prægnati pudenda superficiali ac feruido ulcere affecta sint, amygdalas tritas, & medullam bubulam in aqua coquito, & modica farina adiecta, pudenda illinito. & aqua à coctis myrti baccis perluo. Nunc uero dicam de puerperij purgamentis, & his quæ post partum exeunt.

Quum mulieri aut partus purgamenta non fuerint purgata, aut menses non prodierint, aut etiam uterus durus fuerit: dolor habet lumbos, & lateris mollitudinē, & inguina, & femora, & pedes amare dolet. & uenter attollitur. & horrores per corpus discurrunt. Ex talibus autem febres fiunt acutæ. Hanc ita habentem, si quidem sine febre fuerit, balneis curato. Caput autem oleo anthino inungito. Maluam autem coquito, & oleo cyprino in aquam eius infuso, mitigandi gratia insidere iubeto. In omnibus autem morbis in quibus fomentum auxiliatur, melius est postea oleo ungi. Si uero febris habeat, à balneis abstinere. fomentis autē & tepesfactorijs inum uentrem & lumbos curare. In potu autē exhibere pharmaca uterina, aut sepiæ ouis, aut castorio ammixtis. post hoc uero farinam cum ruta coctam, aut ptisanæ succu sorbendum dare.

Si uero mulieri cum puero in partu non prodierit humor uelut oportet, sed si quidem in capite habuerit humorem à calore attractum, in partu & ante, caput dolebit. Si uero in uentre ac ceruatim descenderit, ubi concitatus fuerit, ipsum turbabit. Et non oportet longè progredi sinere, sed auxilium ferre, ut ne ex partu uetris profluuiū succedēs, corpore male habente, ipsam dolore affligat. Si uero à capite delatus fluxus, ad puerperij purgationē uertatur, & multum concitetur, melius habebit. Si uero plus moderato, curam adhibeto. Si uero in uentrem, facilius utique exitus puero contigerit.

Si uero purgatio modica mulieri prodierit, dolor fortis contripit lumbos, & omnem circa pudenda locum, & intumescit, & femora ardent.

Et ex ore ac naribus pituita fluit fortiter aquosa. & dolet caput. & febris habet, & horror, & tumet. & dentes stridunt. & uenter, & uesica constringetur, & oculos subuertit. & caliginosum uisum habet.

Quum mulieri puerperæ purga-

purgatio non facile procedit, uelut uteris inflammatis, & osculo ipforum cluso. Obtorquetur enim stomachus uteri post pueri egressum. Si enim quid horum fuerit, purgatio non procedet. Si uero non processerit purgatio, contiget ipsam febrile, & horrorem habere, & uentrem magnū esse, & si ipsam attingeris, totum corpus dolere, maxime si quis uentrē attingat, & aliās atq; aliās stomachi dolore uexatur, & lumbos dolet, & cibi fastidium, & uigiliae, & punctura adest. postea quinto aut septimo die quandoq; uenter turbatur, & secedunt nigra, & ualde graueolētia aliās atq; aliās, et urina uelut asinina. Et si secesserint, uidetur sibi melius habere, et curata, breui sana fit: sin minus, periclitabitur profluuiū uentris forti ipsi illapso. Et puerperij purgamenta ipsi occultabuntur. Si uero uenter ipsi non turbetur, neq; purgatio prodeat sua sponte, neq; ea quae commoda sunt breui exhibeantur, tempus autē progrediatur, multo magis ex praedictis affligetur. Et insuper periclitabitur, ne liuida fiat uelut plumbū, et aqua intercutem incidat, et umbilicus extabit ipsi, ab uteris eleuatus. Et circumcirca nigrior erit, et ubi haec facta fuerint, fieri nō potest ut mulier superstes maneat. Pereunt autem alię alio tempore, pro corporis et affectionis ratione. Verū unā et uicesimā diem non excedunt, id quod plerūq; sic contingit. Si uero purgatio ipsi eruperit, siue à pharmacis, siue sua sponte: fit enim et hoc si uteri os laxarint, à sanguine acruatim derepente delato coacti: et si eruperit, graueolentia purulenta depurgatur, Quādoq; etiam nigra, et melius habebit, et curata sanescit. Fiunt autem et ulcera in uteris, utpote puerperij purgamentis putrefactis. Si uero fiant, maiore cura opus erit, ut ne ipsi ulcera magna et putredinosa fiant: periculum est autem ne aut moriatur, aut sterilis fiat. Signa uero haec fiunt, si ulcera intus fuerint. Quum purgatio ipsi prodierit, uelut spina per uteros transire uidetur, et calor ipsam corripit, ac maxime uentrem inuadit. Et si attingatur, partem infra umbilicum dolet, uelut si purum neruosum ulcus contingat. Post dolores fortes aliās atq; aliās in uteros incidunt. Et febris aliquādo ad contactum manus debilis, et aliās atq; aliās puerperij purgamenta procedunt, maligna, purulenta, graueolentia. Haec sunt signa, si ulcera in uteris fuerint, et multa cura opus habent. Atq; huius quidē morbi tot fines existunt. Si uero purgatio puerperij primis tribus aut quatuor diebus processerit, uerum postea derepente euanescit: easdem affectiones cōsimiles priori patitur, sed minus. et si trāsmutetur morbus, in idem trāsmutabitur. Diuturnus autē et debilior priore erit. Si uero curetur mulier, superstes erit, si cito curetur, et de hoc morbo sic habet.

Si uero ex partu non fuerit purgata, uenter intumescit, et splen, et crura. Et febris habet, et rigor corripit, et dolores prosiliunt ad lumbos. Aliquādo etiam ad uiscera. Et perfrigeratur, et febris habet, pulsus debiles sunt, et aliquādo acuti, et aliās attolluntur, aliās deficiunt. Haec patitur incipiēte morbo, et sic habet. Temporis autem progressu, caue faciei partes rubescunt. Quum sic habuerit, leues cibos exhibeto. Et si turget, pharmacū infra purgans bibendū dato, si biliosa fuerit, quod bilem purgat: Si pituitosa, quod pituitam. Postea uero uteros odoratis foueto, et mollitorium in die apponito. Si uero osculum solidū fuerit, tota die foueto, et mollitoria apponito. Deinde calida aqua lauato, et plumbeas fistulas indito. postea salis granā, et myrrham in linteum illigato, et picem coctam ammixtis aromatis lana excipito, et singulorum pares portiones ad gallegarum parat

pariū figuram efformato, & per diem ac noctem apponito. Deinde uero inter missis tribus diebus, iisdem foueto. Et grana cnidia decorticata duarum portionum mensura, & piperis grana trita, oleo Aegyptio albo, & melle optimo amixto, in lanam infarcito, & pennae obuoluta, tota die ac nocte apponito. Et si tibi purgata esse uideatur, melius est sinere. Si uero purgatione opus habere uideatur, duobus diebus interpositis, rursus id quod ex cucumere syluestri paratur, per diem ac noctem subdito. Deinde Netopon, et oleum rosaceū odoratisimum, & adipem cerui liquefacito, & die una in lana subdito. & multa calida, quantum eius fieri potest, leniter lauato. Statim autem ubi purgatorijs, & calida, fuerint purgata loca affecta, adipe anserino, & myrrha, et resina tepida os ueterorū illinat, & foueat. uteros uero postridie uino et oleo narcissino eluat. Aut sinarcissinum nō sit, uino solo. Atq; hęc die uno ante menses faciat. Postq; autem menses prodierint, primis diebus atramentum, hoc est spodium cyprium terat, & salis granū addat, & hęc lana excepta paululum in corpore habeat. Et ieiuna uinum meracum odoratum absorbeat. Vbi uero quieuerint menses, per diem id quod ex pulegio paratur apponat, & uirum accedat. Et si in uentre corceperit, sana euadit. Cibis autem in purgatione utatur. Ad hęc cōmodat, mercurialem coquere, & porrum, allium, brassicam, & grana mali punici ammiscere, & succum forbere. Alijs autē obsonijs marinis potius q̃ carnibus utatur. A dulcibus uero & oleosis prohibeatur. Bibat autē semper ieiuna id quod ex tæda paratur, donec purgetur. Et mensibus prodeuntibus idem ualde bibat. Si uero paulo pauciora q̃ oportet prodierint mulieri puerperij purgamēta, uelut uteris angusto ore præditi ac distorti, Aut aliqua pudēdi pars ualde fuerit cōdusa ab inflammatione: Mulier acutē febrit, & stomachi dolore uexatur, & dolet totum corpus, & molestē fert. & ad articulos manuum ac crurum & lumborum dolor procedit. & locum circa collū, & spinam & inguina dolebit. & quædam corporis partes impotentes fient. Postea calor quietus erit, & horror ualde manifestus. Vomunt autem & pituitosa, amara, acria. & de hac sic habet, & continget ut si curetur, sana fiat. Sin minus, clauda & quarundam corporis partium impotens erit. Non autem ualde sterilis est hic morbus. Si quidem ulcerati fuerint uteri, & puerperij purgamenta non prodierint, uelut oportet, omnia dolebit, & si non magna fuerint ulcera, curata breui sanescit. Oportet autem curationem ulcerū in uteris exacte facere, ut quæ in tenera & subtili sensu prædita sint parte, & in nervosa cavitatē. Multæ autē sunt partes cum quibus societatem habet, sinciput, stomachus. Mens percellitur, & improba fit, & non facile intelligit. Si uero uteri angusti oris ipsi fuerint, & puerperij purgationem non emiserint, inflammantur: & si non curetur breui, omnia magis ipsam affligent. Et odor malus erit, & exitus intumescit. Et si non inflammati fuerint uteri, sua sponte exit malum graue olens, & liuidū, aut nigrū grumosum. & mulieri puerperij purgamēta purgantur. Quādoq; uero non exit, sed mulieri mortem portendit, nisi quis breui uenā secet, aut uētre mēmolliat. præstat autē etiam clysterem adhibere. Si uero ad uomitū facilis fuerit, etiam uomitum inducere. Melius autem est lotium ciere & exudare. Verum in his occasio optima est, quum opus his fuerit. Si uero ex partu purgata mulier fuerit, paulo plura quam oportet. Contingit enim hoc, si uteri amplioris osculi fuerint, & uenę quædam

E ruptæ

ruptæ sint, quæ sub uteros tendunt, præ uolentia egressus ipsius foetus: febris & rigor habebit ipsam tenuis, & calor per totum corpus. Aliquândo etiam horror, & cibi fastidium, & omnino abominabitur. & tenuis erit ac debilis, & pallida, & tumida, & cibum auersatur. Si uero quid edat aut bibat, non cōcoquitur. Quibusdam uero etiam aluus & uesica erūpit. & horror magis obtinet. Et de hac sic habet. Si uero puerperæ aliqua pudēdi pars obturata fuerit: lam enim etiam hoc cognoui: si ulceratū fuerit os pudēdi, ubi sanè ulceratum fuerit, in partu à pueri exitu uiolatum, simile quid sit ulceri superficiali ac feruenti, & ualde inflammatur. Et labia præ inflammatione inter se coincidunt, & se mutuo contingunt, utpote quæ sunt exulcerata. Sed & frigus fit, & ambo labia clausa sunt, constringentia purgationē relictam. Si uero prodiret purgatio, ulcera nō conclusa essent. Nunc autē influit, & aliena carne crassescunt. Proinde ea sanare oportet, uelut in reliquo corpore, & ad cicatrices perducere. Locus autem leuis & concolor reddatur. Mulier quædam patiebatur eadem quæ patiūtur uteri dum à puerperij purgamentis non purgantur, & ad hæc dolebat pudendum. Et ex contactu cognoui, quòd obturata esset, et narrauit, & curata depurgata est, & sana euasit ac fecunda. Si uero curata non fuisset, neq; purgatio ipsi sponte erupisset, ulcus maius fecisset, & malo non remittente, periclitata fuisset ne ulcera cancerosa fierent. Si uero processerit mulieri puerperij purgatio ad caput, thoracemq; ac pulmonem: fit enim & hoc: moriuntur sæpe statim, si detineatur ac firmetur. Si uero probe exeat per os aut nares, sana euadit. Si uero morbus paulo diuturnior fiat, patietur sanè mulier ea quæ dicta sunt de uirgine, cui menses primum cōparentes sursum impetum fecerunt. Verum mulier longiore tempore superstes erit q̃ uirgo, et affectiones debiliores erunt, donec pulmo purulentus fiat. Si uero puerperij purgatio non exeat per os, sed sursum tamen impetum fecerit, occultabitur, & nō procedet iusto modo. Et tussis corripit, & anhelationes. Et impleto pulmone à sanguine, ualde dolebit latus & dorsum. Et quum tussiet, sicce tussiet. Aliquândo uero spumofum expuet. Temporis autē progressu sputū apparet subnigrum & turbatū. Et calor pectora tenet, magis q̃ reliquum corpus, nimirū sanguine ipsa calefaciente. Et febricit mulier, & uenter ipsi coarctatur. & cibum fastidit, & uigilabit, & abominabitur. & non superstes manet, sed moritur plerūq; uicesima prima die. Si uero purgatio sursum progressa, per os nō exeat, neq; in pulmonem uertatur: conuertetur ipsi ad faciem, & erit hæc ualde rubicūda, & caput graue, quod neq; mouere potest absq; doloribus. & oculi ualde rubicundi erunt, & ex ipsis sanguis tenuis fluet. Et quibusdam ex naribus sanguis manat. Et si hic exierit, diuturnior morbus fit. Et aures nō acute audiūt in hoc morbo. & stomachi dolore uexatur, & eructat, & mente alienatur, & deliria fiunt furiosa. Quibusdam autem adest oculorum distortorum ferocitas. Et reliqua omnia perpetietur, uelut si purgatio ad pulmonem uertatur. Verū non tussiet, neq; expuet eiusmodi, neq; dorsum similiter dolebit. Curata uero sana fit. Non multa uero spes est de uita ipsius. Et si etiam superstes maneat, surditas aut cæcitas omnino ipsi accedet. Atq; hic est huius morbi finis. Si ex partu fluxus corripiat, & cibi in uentre non manent, uuam passam nigram, & mali punici dulcis grana terito, & uino nigro dilutis utitor, ita ut caleum caprinum dera sum, & polentam tritici torrefactā in

spargas

ſpergas, & bene tēperata bibenda præbeas. Si ex partu ſanguinem uomat, hepatis fiſtula ſauciata eſt, & dolor ad uiſcera procedit, & cor cōuellitur. Hanc multa calida lauare oportet, & tepēfactōria quę maxime admiferit adhibere. & lac aſininum ad dies ſeptem uel quinq; bibendum dare. poſtea uero uaccæ niſgræ lac bibendum præbere, ita ut ſine cibo degat, ſi fieri poterit, ad dies quadraginta. Ad ueſpērā uero ſeſamum tritū bibat. Morbus hic eſt periculofus. Quo modo autem lac fiat, dictū à me eſt in pueri in partu natiuitate, & alia ſimiliter.

Si lac fuerit extincū, porrum tritū & aqua dilutum bibendū dato. Et calida lauetur, & in cibo porrū ac braſſicam edat. Sed & cytiſi folia ſimul coquat, et ſuccum ſorbeat. Bibat etiā ſceniculi ſuccū, & de radicibus ſceniculi. Et ordeū molitum ac butyrum ſimul coquito, frigeſcito, ac bibenda præbeto. Bonū eſt & hippomarathrū, & hippoſelinū, & cytiſus. Hæc omnia ſimul multum lac faciunt & augent. Capræ item Scyriæ, caſei autē maxime cōmodi ſunt. Sed & ſal uiam coquat: Aut à iuniperi baccis, aut cedri fructu, ſuccum diffundat, & uinō affuſo bibat. & reliqua oleo affuſo edat. & ab acribus, & ſaliſis, & acidis, & crudis oleribus omnibus prohibeatur. Naſturtiū uero in uino potum cōmodum eſt. Nam lac purgat. & calida lauetur, & ſubcalidā bibat. Viticis item fructum in uino bibendū dato. & betæ ſuccus potatus multū lac facit. Seſamum quoq; recens, & ordeū trimeſtre, in mortariū cōiecta terito, & ſuccū per lintēu expri mito, & mel aut amamelidas ammiſceto. deinde in uino nigro bibenda dato.

Quū mulier peperit, & à ſecunda non fuerit liberata, præſtat dare ea à quibus maxime purgantur puerperij purgamenta: allia cocta aut aſſata in uino & oleo, cum polypis ac ſepiolis ſuper prunis toſtis, quicquid tandē ex his uoluerit. Caſtorium uero aut nardum bibat. Bibat etiā rutam in uino nigro dulci ieiuna, aut ſine uino. Si uero uinum nō fuerit dulce, melius eſt mel ammiſcere. Edat etiā braſſicam coctam cū ruta & mercuriali. & ſemē aliquod utero cōmodum bibat. Si uero puerperij purgamenta in grumos fuerint coacta, & dolor in imo uentre fiat, porrū coctum, & quæcunq; ſylueſtria ac hortenſia olera dato, uerum omnia pinguia facito: & per tertiū quēq; diem ſub clemēti cœlo lauetur. Frigus enim his inimicū eſt. Et poſt balneū inungere melius eſt, & non multa calida uti.

Quum ſecunda non ſtatim exierit poſt partū, imi uentris dolores ſiunt, in laterū mollitudine, & rigores ac febres. Et ſi diſceſſerit ſecunda, ſanatur etiā mulier. Sæpe uero putreſcit, & diſcedit ſexta aut ſeptima die, aut etiā prius. Huic autē dare oportet pharmaca quæ ego deſcribam, & ſpiriſtum cōtinere iubere. Omnium uero optimū noui artemiſiam herbam, & dictamnum, & uiolæ albæ florem. Et ſilphij ſuccus optimus eſt fabæ græcæ magnitudine in aqua potus. Et ſi ſecūdas excludere nō poterit, à cibo abſtineat. Et poſtea uiticis folia trita in uino & melle, oleo affuſo tepēfacito, & hemina mēſuram bibendam dato, & exhibunt. Si mulieri ſecūda in uteris relicta fuerit, hoc ſic cōtingit. Si per uim ruptus fuerit umbilicus, aut ab obſtetrice umbilico ſeca per imperitiā reſectus, quæ uidelicet umbilicum pueri prius incidit, antequā ſecunda ex uteris exiſſet, & uteri ſurſum retrahunt ſecundam, utpote lubricam & diffuſam, & in ſeipſis detinent. Nam ſecūda ex umbilico pueri hæret. & umbilicus poſtremus ex uteris exit. Si enim prior exiret, non accederet per ipſum puero nutrimentum, quoniam ex ipſo dependet.

Quum in uentre habens
E 2 foetum

foetum corruerit menstruum, aut bimestrem, & secundæ exire non poterint, fuerit autem tenuis: huius corpus tunc purgare oportet ac pinguefacere. Non enim prius exeūt foetus putrefacti, nisi fortes fuerint uteri, & probe compacti.

Si mulieri secūda relicta fuerit, si non ampli fuerint uteri, purgatio ipsa minus quā oportet procedit, & uenter durus fit ac magnus. Et frigus detinet, & febris acuta. & dolor per totum corpus, & uentris maxime partē eam quæ est infra umbilicum, & grauitas fit in uteris, & tormē, uelut foetus insit. Et curata secundam breuī ei cit putrefactam, & sana euadit. Si ex partu uterus ulceratus fuerit, rosarum floribus curato. Sed & acerbis infusis colluatur. Si uero os eius ulceratum fuerit ac inflammatum, myrrham, & adipem anserinum, & ceram albā, & thus, pilis leporinis sub uentre enatis misceto, & simul trita in lana apponito. Si ex partu uteri fuerint inflammati, febris debilis corpus tenet, & caligo adest. Ex uentre uero nunquam deficit calor, & sitit, & coxas dolet, & uenter imus fortiter intumescit, & aluus turbatur. Secessus autē est malus & olidus. & calor uehemens corripit, & cibum auersatur, & dolor iuxta sinciput est, & uentris stomachus non potest trahere cibos ac potus, & cōcoquere nequit. & nisi curentur statim, plurimæ moriūtur. Venter autē est in causa. Sambuci igitur folia tenerrima, in crassiore tritici recētis farina cocta, leuiter tepida sorbeat. Dato & aquā mulsam, & uinum aquosum. Et pectinem cataplasmatibus frige factorijs integito. Cibum autē quā minimum edat, & uenter sistatur, & caput curetur. præcordijs uero & uterorum loco, cataplasmata adhibeto. Quum doluerit sedem, aut aliud quid, iuniperi baccas, aut apij & urticæ semē terito, ac bibendum dato. Si ex partu doleat, resinam terebinthinam, & mel, & uinum tepidum, sorbēda dato. Et si inflammati fuerint uteri, inde sedantur. Si uero nō doleat uterorum locū, amygdalas amaras tritas, & oleæ folia tenera, & anisum, & irionem, & origanum, & nitrū. Hæc misceto, terito, & uterorum collyria efformato. Si uero inflammati fuerint, & dolor habuerit, rosarum folia, cinamomum, & calsiā, simul terito, & netopo affuso, placentulas ac pastillos drachmales formato, easque in ollam nouā fictilem igne candētem mittito, circūlocataque muliere ac uestibus cōtectā, in uteros suffito. Hoc dolores sedat. Si uero ex partu uteri doluerint, calor debilis habet, uerum uenter imus intus igne ardet, & ad coxendicem aliquando intumescit. & dolor habet imum uentrem, & laterum mollitudinem. Et secessus bilioli sunt & graueolentes. & si nō sistatur uenter, derepente moritur. Quum igitur sic habuerint, uētre frigefacere oportet, cauendo ne horrescat. Bibat autem si non sistatur, aquam de crassiore tritici farina in ipsa macerata, & panis farinam edat. Sorbeat autē mali punici uinosi succum aqua dilutum, farina lentium inspersa. Et hoc coquito, misce lentem, & cuminum, & salem, & oleum, & acetum, atque hanc sorbitionem frigidam exhibeto. Lenticulam item acidam dato, et uinū uinosum pramnium insuper sorbendum. Ab alijs autē cibis abstinere oportet donec febris soluatur. Si uero uisum fuerit, etiam lauetur. Si uero debilis fuerit, polentam bibendam dato. Et si imbecillior sit, ex aqua frigida. Cibum autem exhibeto leuem, qui non euacuet, ubi calor remiserit. Morbus hic acutus est & lethalis. Si inflammati fuerint puerperæ uteri, uenter ardet, & magnus sit. & ad præcordia suffocatio habet. Quum sic habuerit, muscum marinū quem super pisces inijciunt, pro cataplasma

mate adhibeto. Verum in mortario misceto ac tundito, crudam ordeaceam farinam, & cinerem sarmentitium, & lini semen tostum, & hæc oleo & aceto subigito, & uelut cyceonem crassum facito, deinde coquito donec uelut farinæ subactæ massa fiat, atq; ita q̄ calidissima imposito, & si opus fuerit, etiam insidere facito. Si puerperæ inflammati fuerint uteri, intumescunt. & ubi puerperæ purgamenta intus manserint, occulte distenduntur. distenduntur autem ubi condensati fuerint à frigore. His si quidē perfrigeretur, calefacere cōducit. Si uero inflammati fuerint, & frigus discesserit, medicamentum subdititium facere, quod inflammationi aduersatur. & simul lauare, ac fouere, & pharmaca adhibere, quæ ego describam, & uaporem in os ac nares attrahere. Si uero suffocent, lentes in aceto, & sale, & origano multo coquere, & attractionē facere. Et mercurialem edat, & in succo eius tenuem farinā sorbeat. & quàm celerrime ac prius quàm dolor corripiat, pharmaca dato quæ uterorū dolores sedant. & cibos per aluum secedentes assumat. & si uenter sit inflammatus, clystere adhibito q̄ citissime subluatur. Si uteri pituita fuerint impleti, flatus in uteris fiunt, & menses procedunt pauciores, albi, pituitosi. Quādoq; etiam sanguis tenuis sincerus, pelliculis plenus. Quibusdam etiam conturbatur, & ter in mense compareret. & præ humiditate cum uiro commisceri non uult, neq; libidine ad hoc faciendum concitatur. & tenuis fit. Dolet autem imum uētre, & lumbos & inguina, & si mordeat id quod effluit, & exulceret osculi uteri circūferentiā summam, fluxionem diurnam fore pronūciato. Et si non multa fuerit fluxio, lenticulæ decoctum cum ueratro exhibeto ad uouendum. Deinde in nares infundito, & pharmacum deorsum purgans bibendum dato. A cibis autem acribus prohibeatur. Si uero grauetur, & frigeat, & torpedo habeat, lac præbetō, & uinum odoratum. Bibat autem ieiuna hypericū, apij semen, saluiam, in uino odorato aquoso. & uteros medicamēto ex uini fece colluat. & si ulcerati fuerint, interpositis diebus duobus aut tribus, pharmaco ex grano cnidio eluat, et postea cum acerbis lauēt, myrti ac lauri decocto, & medicamento ex flore argenti illinat. Morbus autē est grauis & pauca effugiunt. Si uero acetabula pituita plena fuerint, menses fiunt pauciores. & si in uētre habuerit, corrumpit ubi foetus fortior factus fuerit. Non enim corroboratur, sed defluit. Cognoueris autem hinc. Humida fit, & quod defluit mucosum & uiscosum uelut à uētre defertur, & non mordet, & in mensibus postquā sanguine purgari desierit, per duos aut tres dies, muci ex uteris prodeūt. & horror tenet, & calor non acutus, uerū non deficit. Hanc succo grossorum colluito, à quibus omnis aqua purgatur, & hoc iterum atq; iterum. Postquam autem purgata fuerit, de cætero acerbis utatur. Apponat autē mollia, à quibus pituita purgatur. & foueat uteros medicamento ex lauro, & colluat pharmaco ex aceto. & aromatis suffitū faciat, postquam menses cessarint. postea uero à cibis & balneis abstinere oportet. Coeat autem cum uiro, & cibos ac uinum parce sumat, & calide degat, & tegumēta cruribus circumdet, & oleo illinat. Si aqua intercus in uteris nascatur, menses pauciores & prauī fiunt, & ante tēpus deficiunt. & imus uenter intumescit. et mammae solidæ, molles fiunt, & lac malum. Et putat se in uentre habere. & ex his cognosces quod aqua intercus est. Sed & in uterorum osculo significationem deprehabet. Ad tactum enim gracile & humidum apparet, & rigor ac febris cor

ripit. Quanto uero magis tempus processerit, tanto magis dolor habet in uentre, & lumbos, & laterum mollitudinē, ac inguina. Hic morbus ex abortu fit. Sed & ex alijs causis, & quum menses fuerint occultati. Hanc multa calida lauare oportet, et tepefactoria adhibere si dolor habuerit. Postquam autem sedatus fuerit, pharmacū infra purgans bibendum dare oportet, & uteros medicamento ex bubulo stercore fouere. Deinde id quod ex cantharide paratur apponere, & biduum aut triduum intermittere. Et si robur affuerit, netopo colluere. & si uenter mollis fiat, & febres cessent, & menses secundū rationē prodeant cum uiro dormiat, & in medicamentis subditijs perseueret. & interposita die crethmi corticem bibat, & pæoniæ grana nigra quinq; & sambuci fructum in uino ieiuna. Et mercurialem q̄ plurimam edat, & allium crudum ac coctum, & mollibus ad somnū utatur, & multa potione, & alijs mollibus. & obsonijs marinis potius q̄ carnibus. & si pepererit, sana euadit. Si hydrops in utero fuerit, menses pauciores fiunt ac deteriores, & per longius tempus, & pauciores q̄ oportet, aut paulo plures, & uenter intumescit, & locus supra pectinē, & tibia, & lumbi. Vbi uero multum temporis processerit, & in uentre habuerit, corrumpit ac eijcit. & aqua cum ipso foetu effunditur. & mulier plerumq; moritur. Sanguis autem corrumpitur, & aquosus redditur. Huic lac bibendum dato, & per plum album potandum, donec foetus moueri poterit. Quin & ante hoc ut plurimum foetus corrumpitur, & per abortū eijcitur. & uteri sanguine & aqua manant. Hæc autem patitur nihilo magis ex labore, q̄ aliter. Cognoscere uero poteris quod hydrops est, ex digiti contactu. Deprehendes enim osculū ipsum gracile & plenum humiditate. Si uero foetus in ipsa non circa initia, sed iam bis mēstris corrumpitur ac suffocatur, tunc & uenter imus intumescit, & ad contactum dolet, uelut ulcere præsentē. & febris magna ipsam ac dentium fremitus corrumpit, & dolor acutus & uehemens pudenda, & imum uentrē, & lumbos, & laterum mollitudinē, & coxas. Quū sic habuerit, calida ipsam lauato. & si dolor habuerit, tepefactoria adhibeto, experimento facto de eo quod maxime admittat. & pharmacū deorsum purgans bibendū dato. Intermissione uero facta per tempus quantum tibi satis esse uidebitur, & colluito, & foueto, & cyclaminū melle subactum, ac lintheo exceptum, ad os uterorū apponito. Et cupressi ramēta in aqua madefacta, eodē modo apponito. Verū hæc breuiore tempore, & per longius tēporis interuallum, quāto magis mordent & lancinant. Et specillum stanneum paratū immittito, et digitū eodem modo. Potiones quoq; bibēdas dato, quas cunq; maxime libenter admiserit. & cū uiro dormiat, maxime opportuno tēpore præsentē. Si enim geniturā conceperit, & prægnās facta fuerit, ac pepererit, subpurgatur, & ea quæ prius in ipsa fuerūt, unā cum ipsis puerperij purgamentis subeuntia. Atq; sic maxime sana fieri poterit. Si mulier aqua intercutē laborarit, splene ipsius magno & aquoso existente. Fit autē splen aquosus ab hac affectione, quū febris habuerit, & nō dimiserit hominē, & sitis ipsum corripuerit fortis, & biberit, ac non reuomuerit. Nam quod in uescicam penetrat, per urinam eijcitur. Reliquū uero splen capit, abstrahēs à uentre ad seipsum, ut qui rarus est & spongiformis, & secundum uentrē situs. Et si his sic habētibus non exudarit, neq; aluus laxetur, ab hoc splen attollitur, & hoc magis si aqua fuerit potus, & si quis ipsum contingat, mollis est uelut mollissima pluma siue lanæ

quāto

quandoq; uero etiam renititur. Eleuatus autē & impletus, distribuit per uenas corpori, & maxime in omentū, & locos circa uentrē, et crura. Altera enim pars ad alteram delegat in corpore, ubi singulis plus q̄s oportet affuerit, & cōtinere non poterint. Succedit autem ex hoc semper hydrops, ubi splen ad seipsum trahere cōsueuerit, quū natura rarus sit ac mollis. Quibusdā uero hoc morbi principium sit sine febre, si calor quidam in uentrē constiterit, uelut pituita in ipsum collapsa, & si homo sitim non continuerit, neq; uesica, neq; uenter, urinā & stercus iusto modo excolarint: neq; cōmoda diætā homo utatur. Si uero hydropica fuerit, prodeunt menses multi derepēte, quādoq; uero pauci. Et fiunt aliquādo uelut aqua à carnibus, sicut si quis cruentas carnes abluisset: aliquando uero paulo spissiores, & non cōgelantur, & anhelatio ipsam corripit priusquā menses prodeunt. & dolor in splene, & magis si quid dulce ederit. & uenter attollitur ac magnus fit. Et ubi plura q̄s solita est ederit, dolet uētre, & lumbos aliās atq; aliās dolor uexat. & febris ipsam paulatim corripit, postq̄ autē depurgata fuerit, melius sibi habere uidetur. superiorū respectu. postea ad idem relabitur, & si curetur uelut conuenit, sana euadet. Sin minus, & fluxus compareret, & per omne tempus semper fluet paulatim uelut serosa sanies, & ampliore curatione opus habet. Si uero fluxus non succedat, sed uteri à prioribus menses non laxarint: tunc & uenter ipsi magnus erit, & grauitas intus erit, uelut in uentre habenti, et uelut puer in uentrē ipsius moueri uidebitur, nimirum dum uteri aqua pleni sunt, & aqua mouetur. Aliās enim atq; aliās fluctuat in ipsis aqua, uelut in utrē. & pars infra umbilicum ad contactum dolet, & clauiculæ, & thorax, & facies, & oculi attenuantur. & mammæ attolluntur. Quibusdam uero & uenter, & crura aqua implentur. Quibusdam autē alterum horum. & si quidem ambo impleta fuerint, nulla spes est de hominis uita. Si uero etiam alterum horum, modica spes est si curetur, & non ualde fuerit attenuata. Diuturnus est autem hic morbus. Et fiunt omnia magis his quæ non pepererunt, fiunt autem saepe etiam his qui pepererunt. Periculosa uero sunt uelut dictū est, & plerūq; acuta & magna, & intellectu difficilia, eo quod mulieres participant morbis, & aliquando neq; ipsæ sciunt quod ægrotant, priusquam morbos experiantur à mensibus, & seniores factæ fuerint. Tunc autem & necessitas, & tempus, ipsas morborum causam docet. & quandoq; non cognoscentibus ex quo morbo ægrotent, morbi incurabiles fiunt, antequam doceatur recte medicus ab ægrotante ex quo morbo ægroter. Verēt enim narrare, etiam si sciant: & præ imperitia ac ignorantia, turpe sibi id esse putant. Sed & medici si mul peccant non exacte causam morbi percunctantes, sed uelut uiriles morbos sanātes, et multas noui iam ab huiusmodi affectionibus corruptas. Quare statim causam exacte interrogare oportet. Multum enim differt muliebrium morborum ac uirilium curatio. Si uteri fuerint ulcerati, sanguis & pus purgatur, & foetor grauis oboritur, & dolor acutius corripit lumbos, & inguinā, & inum uētre. & dolor sursum procedit ad laterum mollitudinem, & ad costas, & ad scapulas. Aliquando etiam ad clauiculas peruenit, & mordetur, & caput uehementer dolet, & delirat. Progressu uero temporis tota intumescit, & debilitas ipsam corripit, & animi deliquium, & febris tenuis, & perfrigeratio. Intumescunt autem maxime crura. Morbus autem corripit ex abortu.

si qua corrupto ac putrefacto intus puero, nō fuerit expurgata. & calor totum corpus tenet. Corripit etiā ex fluxibus, & si in ipsis acria fuerint, & biliosa mordeant. Si in hoc modo habentē incideris, ubi quidem dolores habuerint, multa calida lauato. & tepefactoria adhibeto qua parte fuerit dolor. & si quidem superne fuerint dolores, & mulier fortis est, totam fomentato. & pharmacū deorsum purgans bibendum dato. & ubi tempus anni fuerit, serum coctum insuper bibendum præbeto, per dies quinque, si id facere poterit. Si uero non fuerit serū, lacasinum coquito, & per dies tres aut quatuor bibendū dato. Post lactis autem potum, cum aquis ipsam reficito, & cum cibis commodis, carnibus ouillis teneris recentibus, & uolucrum: & bera, et cucurbita. Abstineat autem à salis & acribus, et marinis omnibus. Et à carnibus porcinis, & bubulis, ac caprinis, Edat autem panes. Si uero animi deliquia teneant, & non ualida sit, & perfrige retur, sorbitionem accipiat. Sunt autē quidam qui his caput dolentibus lac bibendum præbent, quia caput dolent. Alij aquam, quia animo linquantur. Ego uero uice uersa, si caput dolent, & mente percellantur, aquam cōmodam puto. Quum autē mordentur, & acria sunt quæ pungunt, lac his lenitatem inducit. Vbi uero tibi ualida esse uidebitur, uteros colluito. primū medicamēto ex uini fece. postea interpositis diebus tribus aut quatuor, eo quod cum brassicæ decocto tepido paratur. Et rursus intermissis diebus tribus eo quod cū butyro paratur eluito. Et si ubi hæc feceris sanescant uteri, eo quod cum malicorio paratur colluito. Super ulcera uero argenti florem, & gallam, & myrrham, & thus, & spinæ Aegyptiæ fructum, & cenanthen syluestrem, & chrysocollam, & squamam aris, & loti ramenta, & crocum, & alumen Aegyptium combustum illinro. Horum singulorum una æqualis sit portio. Alumen uero & gallam, & crocum, una omnium portione sumito. Hæc omnia trita ac permixta in uino albo dulci diluito, deinde coquito donec mellis crassitudo fiat, et dato ut cū hoc pharmacō bis in die ulcera inungat, ubi aqua tepida prius lauit. Coquatur autem in aqua, & hedera, & saluia. Et ubi tibi hæc faciēti melius habere uisa fuerit, lac caprinum coctum præbibendū una die dato. Postea uero lac bubulū præbeto eodem modo uelut in prioribus. post lactis autem potum, per cibos quæ maxime crassificato, & ut in uentre habeat facito. Sana enim fiet. Plerūque uero ex hoc morbo euadunt, & steriles fiunt. Senioribus autem non ualde quid horū accidit. postea uero bibenda sunt pharmaca, lini semen torrefactū, & sesamum, et urticæ semen, & pæoniæ radix amara, hæc in uino nigro odorato trita bibat. Si uteri ulcerati fuerint, & sanguis, & pus, & serosa sanies fluit: putrescentibus enim uteris, morbus ab ipsis sit, & uenter imus eleuatur, & attenuatur, & ad contactum dolet, uelut ulcere præsentē. Et febris ac fremitus ipsam occupat, & dolor acutus ac uehemens inuadit pudenda, & pubem, & imum uentrem, & lateris mollitudinem, & lumbos. Morbus autem maxime corripit ex partu, si quid in ipsis diuulsum cōputruerit. Itēque ex abortu, & aliās sua spōte. In has si incidetis, aqua multa calida lauato. et qua parte dolor habuerit, tepefactoria adhibeto & spongiam ex aqua calida expressam. & colluito acribus & acerbis uiratis, mollioribus uero ammixtis, prout tibi tempestiuū esse uidebitur. & lini semen ac sambuci fructū tūdito, et ammixto melle pharmacū facito, atque hoc utitor. calida uero aqua lauato. Et acceptā spongiam, aut mollē lanam, in aqua calida tingito, & pudenda

pudenda ac ulcera expurgato. Deinde in uino meraco, rursus spongiam aut laniam tingens, eodem modo utere. Et postea pharmaco hoc inunge, quoties tibi tempestiuum esse uisum fuerit. Postea resina & adipe suillo mixtis simul illinito sæpe interdium ac noctu. postea uero lini semen torreto, tūdito, ac cribrato: & peplum album in polenta tūdito ac cribrato: & caseum caprinum assato, & sordes ac saluginem deradito, & pinguitudinem eius, & polentæ pollinem ammi secto. Sit autem una pharmaci mensura, & casei, & polentæ. Hæc bibenda dato mane ieiunæ, in uino austero diluto. Ad uesperam autem misceto, & crassum cyceonem præbeto, & quicquid muliercula maxime libenter admiserit, bibendum dato. Et donec quidem sanguis multus fluxerit, & dolores acuti habuerint, & modico tempore intermiserint, hæc facito. Postquā autem ulcus minus fuerit, & dolores debiles apprehenderint, & per longius tempus, pharmaca bibenda dato à quibus purgetur deorsum magis quā sursum, & intermisso tempore quantū opportunum esse uisum fuerit, lenibus fomētis foueto, muliere in alto collocata, prout tempestiuum esse uidebitur. Hæc si fecerit, sana euadet. Morbus autē est lenior & lethalis. & paucæ ipsum effugiūt. Si uero uehementer exulcerati fuerint, sanguis & pus purgatur, & odor fit grauis. Et quū dolor apprehēderit, uelut à partus dolore fiunt ea quæ circa fluxū contingere solent. Et quum tempus affuerit, crura & pedes intumescūt. Et curant medici hunc morbum uelut hydropem, uerum hic talis non est. Hanc si curandam acceperis, primum calida lauato, & calefacito. Et acribus ac mollibus et acerbis, & aqua & uino colluito. Et polycarpon, & polycnemon, ac mel simul coquito, deinde lanā in his tingito, & pudenda illinito. Et resinam, ac mel, & pinguedinem suillam illinito. Et bibendum dato semen lini ac sesamum torrefactum, & butyrum, & caseum caprinum, & polentam in omnibus. Bibat autem in uino ieiuna. Ad uesperam uero plurimum mellis affundito. Et donec quidem sanguis purgetur, & dolores acuti habuerint, & modico tēpore intermiserint, hoc facito. Quum autem ipsi minus prodierit, & dolores debiliores per longius tēpus tenuerint, pharmacum deorsum purgans bibēdum dato, ac finito. Hæc si fecerit, sana euadet. Sobolis autem spes non adest. Quæcūq; ulcerationes in uteris fiunt, ex abortu, aut alia quadam causa, eas omnes respectu ad totum corpus factio curare oportet, quacūq; curatione opus habere uisæ fuerint, siue ex uniuerso corpore hominem curandam esse putaueris, siue ex ipsis uteris. Cognosces autem an ab ipsis uteris sint, hoc modo. Quæ enim ulcerationes ab ipsis uteris sunt, purgationem exhibent purulentam & compactam: quæ uero non ab ipsis, tenuem & saniosam. Quum igitur tenues sunt fluxiones, cū pharmaco eas curare oportet, & dare quod & sursum, & deorsum purget. Primū autem sursum. Et si quidem post pharmaci potionem, fluxiones pauciores fiunt ac faciliores, intermissione facta rursus eodem modo medicari oportet. Post pharmaci uero potionem, talem uictum præscribito, ex quo homo ipsa quā siccissima fiat. Id autem continget, si toti ipsius corpori, per tertiam aut quartam diem, fomentum adhibueris, & à fomentis statim uomitus feceris. post uomitus autem & fomenta, diætā constituito ex illuue, & aquæ potu, & panis cibo, nullo uero obsonio, quā uino nigro meraco. Nullo item olere. Quum uero uomitum præparas, multis & acribus oleribus opus habes, quibus ipsam impleas, multis

tis etiam cibus, et obsonio quodcunque uoluerit. Et ut impleas ipsam multo uino aquoso, & ut à fomentis ipsam laues multa calida. Atque hæc quidem curatio est huiusmodi fluxionum. Melius tamen est ut utraque pharmacis cures, & uomitum procures, & sursum trahas. Diæta uero siccatoria melior est, & illuuiæ. Ceterum uteros hoc modo curare oportet. primum quidem fouere sambuci folijs in aqua coctis. Deinde post fomentum, smegmate ex uini fecce colluere. Et si quidem putredo in ulceribus fuerit, & quæ exeunt græueolentia, smegmate meraciore. Si uero nihil tale, aquosiore. post fecem autem, cum aqua in qua cocta est myrtus & saluia. Postea uero cum uino colluere, meraco, albo, tepido. Quum autem mordetur iam à collutionibus, tunc iam pura sunt ulcera. colluere igitur oportet fecce aquosiore, & uino nigro. post uinum uero, adipem suillum recetem liquato, & pinguedinem anseris si affuerit, sin minus, aliam, maxime gallinaceam, aut ex uolucrum gente. Si uero neque hæc adsit, oleum uetus ex oliuis ammisce to, atque hoc tepido colluito post uinum, per alium clysterem in os uteri infuso. Et si fuerit ulceratum, linamenta ex mollitorijs facta apponito. Et si hæc subdita ardorem induxerint, his ademptis mulierem aqua tepida lauare iubeto, tali quali colluebatur. Si uero ad hanc diætam fluxiones non discedant, pauciores tamen fiant, & uehementer mordeant, & ea quæ effluunt, bilis fuerint ac falgugo: & non solum internas partes, sed etiam externas exulcerent, diætam transmutare oportet, & totam humectare, quo fluxiones quæ aquosissimæ fiant, & minime mordaces, balneis multis calidis, maza, oleribus coctis omnibus pinguibus, piscibus carthilagineis, cum cepis & coriandro, in muria dulci coctis: coquantur autem pingui modo: carnibus coctis omnibus, excepta bubula & caprina: His enim per coctis cum anetho & fœniculo: uino mellis coloris, fuluo, aquoso, uberiore lactis potum cum uino dulci. Reliqua uero de collutionibus iuxta relatum modum facito. Atque hæc quidem est eiusmodi fluxionum curatio. Quum uero purulenta & compacta exierint, harum quidem totum corpus non mouere oportet. Verum colluere, & per collutiones totam curationem facere. Colluere autem oportet cum ipsidem infusis, quæ prius dicta sunt eodem modo. Cōscribentur tamen etiam aliæ collutiones. Vlcera curatio. Ceruinum adipem recetem ac uiridem subdito. Omnia uero statim uino sirgo siue sapa colluere oportet. Optimum autem est cerussa, si ulcera fuerint, & oleo narcissino. Cibus autem mollissimis utatur, & non acerbis. Si uero sordida fuerint, & proserpant, ac proximū locum mordeant, purgato, & nouam carnem producto, & carnem ad cicatricem perducito. facile enim resoluantur, & maligna fiunt, et frequenter lauato. Si uero mulier ex abortu uulnus accipiat, aut ex medicamentis subdititijs uteros exulceretur: Qualia multa semper mulieres faciunt ac medicando excitant, & foetus corruptus fuerit, et mulier non purgetur, sed uteri inflammati fuerint uehementer ac conclusi, et purgationem emittere non poterint, nisi primum emittant sanguinem qui est in foetu. hæc si quidem curetur, breui sana euadet, uerum sterilis. Si uero puerperij purgamenta ipsi sua sponte eruperint, et ulcera sanata fuerint, etiam sic sterilis erit. Si uero purgatio quidem ipsi fiat, ulcera autem non purgentur, periculum est ea putredinosa esse. Si uero purgatio prodierit ipsi iam afflictae ac extenuate, moritur. Quin et si in partu uteri ualde fuerint exulcerati, foetu non secundum naturam exeunte, eadem patientur quæ patitur ea quæ ex corruptione foetus uteros ulceratos habet

habet. Et transmutationes ac fines eisdem morbus habet, siue ex foetus corruptione, siue ex partu uteri fuerint ulcerati. et si puerperij purgamenta omnia prodierint, minus dolebit, nisi magna ulcera fuerint. Et si curetur, breui sanescit. Oportet autē curam cito adhibere, si ulcera in utero fuerint. Nam ut quæ in terno loco sunt, cito augescunt, & breui putrescunt. Curare uero oportet ulcera, uelut etiam ea quæ in reliquo corpore sunt. Nimirum ut inflammationem arceas, & repurges, & repleas, & ad cicatricem perducas. Danda est autē aqua in potum, uinū minime. cibos item paucos, ac minime multos exhibeto. Quicunque abortus facti discedere non possunt, dum aut toti, aut partes foetuum sunt maiores, aut minores & obliqui ac impotentes, tales siquidem secundum naturam siti fuerint, pharmaco aliquo dato ex his quæ ego referā expellito, ubi multa calida prælaueris. Et si prodire uolentes, non facile exeant, quū siti sint secundum naturam, talibus sternutatorium admooueto. Apprehendito autē nasum, & os cōprimito, ac sic sternūtet, quo sternutatio quæ maxime efficax sit. Utatur item cōcussionibus. Sic autem concussione facito. Lectum altum robustum ac instratū sumito, & mulierem supinā reclinato. pectus uero & axillas ac manus, fascia aut molli lato loro ad lectū alligato ac cingito, & crura incuruato, & maleolis apprehensam detineto. Quum autem sic disposueris, sarmentorum mollium fascem, aut aliquid huic simile parato, tantum quantus sufficit, ut lectum non negligat excipiendo ipsum, dum in terram projicitur, quo non pedibus iuxta caput, terram contingat. Postea uero ipsam manibus lectum apprehendere iubeto, & lectum ad caput sublimem habere, ut decliuus sit in pedes, animaduersione habita ne pronua sit homo ipsa. ubi uero hæc facta fuerint, & lectus sublimis fuerit, retro sarmentā supponito. maxime autem dirigito, quo pedes terram non contingant dum lectus projicitur, & ut sint intra sarmenta. Eleuent autem duo uiri ex utroque pede hinc atque illinc, quo in directum lectus cadat, planè ac æqualiter, & conuulsio ne fiat. Concutiendum est autem maxime unā cum paruo dolore. Et si quidem discedant, statim quiescendum. Sin minus, interstitio facto rursus concutito, & in lecto gestatam attollito, ac agitato. Atque hæc quidem sic facienda sunt, ubi recte & secundum naturam discedāt. Oportet autem cerato liquido præillinare, quod in omnibus huiusmodi circa uterum affectionibus optimum est: & maluæ aquam affundere, & scenigræci, aut potius ptisanæ triticeæ succum. Oportet autem usque ad inguina, sedem & pudendum fovere, & insidere, ubi partus dolores maxime infestant, & nihil aliud mente uersare. eā uero quæ medicatur, oscula mollibus aperire oportet, & leniter hoc facere. Umbilicum uero unā cum foetu attrahere. Quicunque uero duplicati complicantur, & in osculo uterorum incumbunt, eos siue uiui fuerint, siue mortui, rursus retro protrusos uertere oportet, quo secundū naturam in caput exeant. Quum autē retrudere uoles aut uertere, supinā ipsi reclinatæ molle quiddam sub coxas substernere oportet, & sub lecti pedes, quo altiores sint hi a pedibus, semper aliquid supponere. Sed & coxæ altiores capite sint, & ut nullum cervical sub capite sit prouideto. Quum uero retrusus fuerit foetus, & hinc atque illinc obuoluitur, ut secundum naturam constituatur, & quicquid sub lecti pedes supposuisti ac lapides, & quicquid sub coxas subdidisti, subtrahito. Capiti uero puluinar subiucito. Atque talia hoc modo curato. Quicunque

uero

uero foetus uiui, manum aut crus foras præmittunt, aut etiam ambo: eas oportet quam celerrime ubi exitum significarint, prædicto modo intro retrudere, & in caput uertere, & ad uiam reducere. Et quicunque foetus complicantur, ad lateris mollitudinem, aut coxam in partu collapsi, eos dirigere ac uertere oportet. & in aquam calidam desidere facere, donec mulier refocilletur. Quicunque uero foetus mortui, aut crus, aut manum, foras protendunt, eos optimū quidem fuerit, si id fieri posset, intro retrudere, & ambas has partes in caput uertere. Si uero hoc fieri non poterit, uerum intumescit, secare hoc modo. Dissectum per scalpellum caput, cum contusorio instrumento, ut ne in ramenta findatur contundito, & ossa per ossium uolsellam, aut tractorium instrumentum, iuxta clauiculam immisum, prout habuerint extrahito, nō multis simul, sed paulatim exemptis, ac rursus ablatis. Quum uero hæc foras extraxeris, & in ipsis humeris fueris, ambas manus in articulis cum ipsis humeris secato. Et ubi hæc extraxeris, si quidem fieri poterit ut exeant, etiam reliqua facile extrahito. Si uero non obediunt, totum pectus usque ad iugulum findito. Verum caueto ne in uentrem feces, & aliquid de intestino denudes. Exit enim uenter, & intestina, & stercus. Si uero horum quid excidat, maioris negotij iam res sit. Contundito autem costas, & scapulas contrahito. Et facile postea reliquum foetus procedet, nisi iam uentrem tumidum habuerit. Si enim tale quid fuerit, melius est uentrem foetus leniter perforare. Flatus enim solum à uentre exit, & sic facile prodibit. Si uero exciderit manus, aut crus, immortui foetus, si quidem fieri poterit, ambas partes retrudito, & foetum rite dirigit. Hoc enim optimum fuerit. Si uero fieri nō poterit ut hoc facias, quicquid sanè foris fuerit quantum potes penitissime resecato. & reliquū profunditate intus explorata protrudito, & foetum in caput uertito. Quū autem uertere ac secare puerum uoles, ungues de manibus tuis resecato. Scalpellum uero quo dissecas, incuruū potius sit quā rectum, & huius caput occulato per indicem digitū, eodēque interna explorato ac deducito, ita ut caueas ne uterum contingas. Cæterū molæ conceptus hæc causa est. Quū multi menses, modicum & morbosum semen conceperint, neque conceptus rectus fit, & uenter plenus est uelut prægnantis. Nihil autem in uentre mouetur, neque lac in mammis generatur. Mammæ aut turgidæ sunt. Hæc igitur ad duos annos, sæpe etiam tres, sic habet. & si quidem una caro fiat, mulier perit. Neque enim fieri potest ut superstes maneat. Si uero plures, erumpit ipsi per pudendum sanguis carnosus plurimus. & si hoc moderate fiat, seruatur. Sin minus, à fluxu correpta perit. & morbus quidem talis est. Iudicare uero oportet ex plenitudinis mole, & quod in uentre non mouetur. Nam mas trimestris, femina quadrimestris motum habet. Postquam igitur tempore hoc prætergresso nō mouetur, nimirum hic morbus est. est autem hoc magnum signum, quod lac in mammis non generatur. Hanc igitur maxime quidem ne curato. Aut certe cū prædictione. Et primum quidem totū corpus foueto. Deinde per sedem clysterem adhibeto, quo sanguis multus erūpat. Fortassis enim quod compactū est commoueris, id quod foetus esse putatur, muliere à pharmaco concalefacta. Sed & uteros colluito, quo sanguinē educas. Sin minus, subdititijs utatur fortissimis è buprestis. Et dictamnium creticum in uino bibat, sin minus, castoris testem. Et retrò cucurbitam ipsi ad laterum mollitudinē affigito, & plurimū sanguinem detrahito

detrahito. Atq; hoc maxime rerum ac uirium ipsarū coniectura facta facito. Et hactenus quidem dictum est de morbis à puerperij purgamentis fientibus. Sūt autē pericula in ipsis non parua, Acuti enim sunt & cito transmutantur. & magis affligūtur primiparae, q̃ quae sunt partuum expertae. Prodeunt autē puerperij purgamenta sanae mulieri sufficīeter, primū sesquiheminā mēsurā, aut paulo plura, postea adhuc pauciora iuxta hanc rationē, donec cessent. Prodeunt autem uelut sanguis à uictima, si sana uelut dixi, mulier fuerit; & sana futura est; & cito congelantur ac purgantur. & post partum plerūq; sanae mulieri contingit ut post puellae partum, in quadraginta duobus diebus diuturnissima purgatio fiat. Extra periculū autē est etiā si uiginti quinque diebus purgetur. post masculi uero partum, purgatio diuturnior fit in triginta diebus. extra periculū est etiā quae in uiginti diebus contingit. & in his quae foetus corruerunt secundum horum dierum rationem purgatio contingit. & in iunioribus quae corruerunt paucioribus diebus. In senioribus aut, pluribus. Eadem uero sunt affectiones ex puerperij purgamentis, & ei quae corrumpit foetum, & ei quae peperit, si menstruum corruerit foetum. & quae corruerunt magis periclitantur. Corruptiones enim grauiores sunt q̃ partus, Non enim fieri potest ut citra uolentiam foetus corripatur, aut pharmaco, aut potu, aut cibo, aut subdititijs medicamentis, aut aliqua alia re. Violentia uero malum est. In huiusmodi enim periculum est ne uteri exulcerentur, aut inflammentur. Hoc autē est periculosum.

At uero lac quomodo fiat, dictum est à me in natura pueri in partu. Postq̃ autem praegrans fuerit mulier, menses non ualde prodeunt, praeterquam quibusdam pauci. Dulcissimus enim humor ex cibis ac potibus ad mamas uertitur ac exsugitur. Et necesse est etiā reliquū corpus magis euacuari, & minus sanguine plenum fieri. Atq; hoc ita contingit. Sunt autē quae natura sine lacte sunt, & quibus lac deficit ante tēpus. Hae uero natura solidae sunt, & densae carnis. & propterea sufficiens humor non penetrat à uētre in mammas, quum uia sit densa. Ad menses detrahendos. Elaterij potiones duas sumito, & adipem ouillum de rhenibus, pari elaterij portione ammisceto, & nō conterito, uerum duas glandulas subdititijs facito. Aut melanthiū ex tritico terito, & aqua subigito, & duas glandulas formato, atq; has ante dies quibus affuturi sunt apponito. Si enim non prodeunt, rigores ac febres inducunt. Mollitoria, à quibus aqua & arena purgatur, ducunt etiā menses, si non fuerint diuturni, et osculum emolliunt. Narcissum, myrrham, cuminū, thus, absinthium, cyperū, singula aequalibus portionibus sumito, narcissi uero solum quatuor portiones: et puluillum stupae dum pectinatur crudum linum ammisceto, & haec cum aqua origani cocti terito, ac glandem formato & subdito. Aut cyclaminū magnitudine tali, & aeris florem magnitudine fabae terito, & cum melle glandem formato, ac apponito. Aut pulegium, myrrham, thus, fel suis ac bouis, cum melle subigito, et glandem efformato. Si menses non prodeant, adipem anseris, & netopum, ac resinam permixta ac lana excepta apponito. Medicamentum subdititium, purgatoriū, mollitorium. Caricam percoctā ac expressam leuissime terito, et in lana subdito cum rosaceo unguento. Aut acris brassicae & rutae, utriusq; dimidiū terito, ac utitor eodem modo. Purgatoriū. Medullam anseris aut cerui magnitudine fabae affuso unguento rosaceo et lacte mulie

bri terito, uelut pharmacū teri solet, & cū hoc os uteri illinito. Aliud subdititium molle. Medullam anseris magnitudine nucis, ceram magnitudine fabæ, resinæ lentiscinæ aut terebinthinæ magnitudinē fabæ. Hæc cū rosaceo unguento ad lentū ignem liquefacito, & uelut ceratū efficito. deinde ex hoc tepido os uteri illinito, & pectinem irrigato. Aliud purgatoriū. Farinam recentem, myrrhæ obol. iij. croci tantundē, castorij obolū, hæc trita cū unguento irino apponat. Aut urticæ semen, & maluæ succū, ac anseris adipem simul permixta subdat. Aliud subdititiū purgatoriū, si menses non cōpareant. Stryracem & organū terito, & permixtis adipē anserinū affundito ac apponito. Aliud quod uteros expurgat, ac sanguinē euacuat. Absinthij radicē tritam, melle ac adipē anserino ammixtis apponito. Aliud purgatoriū. De buprestis caput & pedes & alas tollito, & reliquū ipsius terito, ac ficus internā partē ammisceto. Sit autē pinguitudinis ficus portio dupla. Hoc uteros inflat. Hoc etiā desperatis optimum est. Aut mercurialis folia trita subdito. Hoc tenuē biliosam purgationē ducit. Sed & artemisia facit uelut mercurialis, & melius purgat. Verratum quoq; nigrum cū aqua tritum, uelut aquā a carnibus ducit. Sed & alumen ac resina idem facit. Cyperū, absinthiū, aristolochiam, cuminū, salem, mel. Hæc omnia simul terito ac apponito. Et ueratrū cum uino dulci, & farina locij ac tritici, melle subacta in lana subdatur. Subdititia si catapotia non purgarint. Mercurialem, myrrham, uiolam albam, cepam acerrimam, & melanthium ac mentā, si sufferat, permixta apponito. Subdititia acria sanguinem ducentia. Cantharidas quinq; demptis pedibus ac capitibus, & myrrham ac thus simul misceto, & mel addito. Deinde in oleum rosaceum aut Aegyptium tinctū per diē subdat, & ubi mordet, tollat. & rursum in lac muliebre ac unguentum Aegyptium tingat, & hoc per noctē apponat, & aqua odorata perluat, & adipem subdat. Cōduxerit & buprestis, si quidem parua fuerit, sine alis & pedibus ac capite. Si uero magna fuerit, nō cōmisceto eadem quæ cantharidibus, sed solam sumito ac similiter apponito. Si uero molliore opus habuerit, ad buprestem uinum & cuminū Aethiopicum ammisceto, uuam item passam & pollinem seselis ac anisi, & uinū feruefacito, eoq; affuso reliqua terito, & pastillos drachmales efformato, eosq; apponito myrrha ac thure ammixtis. facito autem eodem modo uelut cū cantharidibus. Aut melanthium ex tritico, tritum ac melle subactum apponito. Aut hoc ipsum melanthiū cum melle tritum uelut glandē efficito, circū pennam autē obducito. Subdititiū efficax. Succū mandragoræ & cucurbitæ syluestris, cū lacte muliebri apponito. Aut fecem siccam ex uino ueteri albo urito, & uino extinguito ac subdito. Cucurbitā item syluestrem, mercurialem, nitrum & irionem. Citius detrahit et mandragoræ radix, cantharis, serpyllum, lauri fructus, unguentū irinum, laurinū. Thymali succū permisceto ac agitato, et detracto uisco, erui magnitudine exhibeto. Optimum est et glandem subdititiā ex eo facere. Si uero amplius prodierit, uino proluatur. Aut æs ustum dissoluito, et tepidum lanā excipito ac apponito. Medicamentū ad conceptum. Cedriæ acetabulum, adipis bubuli drach. iij. simul terito, et talorū figurā efformato, quas ieiuna apponat, et dum appositas habet per diem ieiunet. Apponat autē bis, mane et uesper, post menses, post cenam uero lauetur, et cum uiro dormiat. Aut melanthium contundi

to, & in lintheum illigato, & adipe anserino addito, subdendū dato. Aliud ad conceptum. Quo cures mulierē ut in uentre cōcipiat, urinā sumito ueterem, & ferri recrementū tantum, ut in fragmēta resoluere possis. postea mulierem in sella collocato, & corpore & capite uelato, peluiq; ad pedes supposita, ignita re cremēti ferri fragmenta tria pro una uice iniicito. Sit aut uetus hæc urina cōgij mēsurā. & cum his triginta fomētis ipsam foueto. Dum aut fomentū adhibes, caput lauato, ita ut donec fota fuerit rursus lapides illos recremēti ferri in urina extinguas, & fomentū rursus calefacias. Postea uero caput lauato plurimū, polio & uiticis folijs q̄ plurimis in aqua coctis. Hæc autē facito ad dies septē. Ter uero per singula hæc fomenta suffito, anteq̄ laues. A balneo uero oleo laurino inungatur. post cenā autē, ubi cepas melle tinctas comedit, & aquam mulsam tepidam quatuor heminarū mensura bibit, et paululū continuat, uomat. & supina reclinata, rutā habeat auribus & naribus inditam. Et panē fermentatū sexta choenicis parte, in iusculum uolucris confringat, habeat aut hoc iusculum apij chemam, & sic assumat. & rursus tantundē in cena dato. Et hoc per dies septē facito. postea uero uentri per dies septē clysterem adhibeto. Sit aut infusum clysteris, resinæ drachmæ quatuor, mellis acetabulū, olei plataënsium tantūdem, fursurū recentiu succus, spuma nitri, oua tenuia. Sit autem infusum hemina octo, & ex his tres succi ptisanæ. Obliquæ uero clysterem adhibeto, & parum lauato. Apponat etiam glandes septē in die, & detineat donec fuerint liquefactę. Sint autē ex thure, nitro, galbano, melle cocto. Cibo uero eodem utatur. Suffito aut asini albi pilos, & lupi sterlus. De his plurimū prunis iniice, ipsamq; circumlocatā ac contactam suffito, cauēdo ne cōburas. Si uero mulier parere nequeat quę prius peperit, nitrū & resinam, & myrrhā, & cuminū Aethiopicum, & unguentū simul terat, & apponat. Aut pulegium siccum in lintheo subdat. Bibat autem pulegium ubi dormire uolet. Aliud ad conceptum. Victus rationem mulieri cōstituere oportet, quæ prægnans fieri cupit, & ad edendum ac bibendum exhibere ipsi, quæ libenter admittit. Viro autē mulieris reliqua dato, præter alliū, & cepam, & legumina fresa cocta, & silphij succū, & quæ inflant. Ab his sanē abstineat. Medicamentū quod similiter infunditur si non concipiat. Lac mulieris masculū alentis, grana mali punici recētis terito ac succū exprimito, & testudinis marinę partē inter anum & pudendum cōburito ac terito. & hæc in pudendum muliebri infundito. Aliud quod similiter infunditur nō concipienti. Lac & resinam, & mali punici dulcis succum, Hæc omnia melle ammixto infundito. Aliud ad conceptum. Bulbi albi semen, aut florem, cum melle terito, et lanæ inuolutū per triduum ad uterū apponat. Quarta uero die, maluam syluestre latifoliam terat, lacte muliebri ammixto, et lanæ inuolutam apponat. deinde cū uiro dormiat. præforbeat autē pulegium in farina coctum, et bibat pulegiū tenue in uino. Si uero huic nō obediat, conyzam odoratam cōtundat, & expressum succum uino mixtum ieiuna bibat. Aliud.

Asparagi semen similiter in uino bibat. Aliud. Secūdam mulieris, & uerum carnū capita, et alumē Aegyptiū, cum adipe anserino diluito, & in lana ad os uteri apponat. Aliud. Aeruginē, florem æris, utrūq; oboli dimidij pondere, thuris masculi, aluminis scissi, fructus uitis syluestris, gallæ, myrrhæ, malicorij, resinæ, polij, singulorum obolū, in melle tritū, per triduum bis in die

apponat. Si uero fortassis acrius fuerit, anferis adipē ac nitrum tostum ammiscero. Vinum aut exhibeto, fortitudinē in ipso uitans. Aliud ad conceptum.

Vermem carniū qui caudam habet accipito, & de ipso tres aut quatuor partes sumito. & origanum tenuem simul cū rosaceo ungueto terito. & hoc ad uteros apponat. Aliud. Portulacam cum adipe anferino, & myrrha, & porri semine, & felle bubulo terito, et lanę inuoluta ad os uterī apponito. Si menses quidem fiant multi, non cōcipit autem, floris æris obolos duos, et aluminis scissi tantundem, cum melle terito, & lana excipito. Illiget autem mulier lanam in linteum cū filo, & sibi ipsi subdat, ita ut filum extra promineat. Deinde quum probe purgata fuerit extrahat, & uino odorato myrti folijs iniectis feruefacto proluat, & uirum accedat. Subdititium ad conceptum. Mel, myrrham, myricæ fructum, resinam liquidam, adipem anferinum, omnia simul trita lanę inuoluta apponat. Aliud, quod uterum ualde aperire potest, quū conclusus est, & concipere non potest, & ad aquā expurgandam. Accipe anchusam par uam, & lentiscum, & cuminū, & cyperum, & cucurbitam syluestrem, & nitrum rubrū, & sal Aegyptium, & anchusam magnā. Hæc omnia trita per linteum rarum excernito, & acceptum mel ad lentū ignem coquito. Postquam uero efferebuit, ceram ac resinam ammisceto. Deinde etiam alijs omnibus ammixtis oleū affundito, ac ab igne tollito. & tepida lanę cōuolutæ inuoluta utero apponito, donec purgata fuerit. Aliud. Si mulierē concipere uelis, ad purgatoria quibus utitur, etiam uirū accedere oportet. Et baccas lauri nigras decem, thuris pugillos tres, & cumini modicū, cū melle trita in lanam succidam inuoluat, & semel in die subdat, & semel auferat, ad quatuor dies, & iisdem diebus à cibo abstineat. Conceptum impediens. Si uero cōcipere non oporteat, misyos magnitudinē fabæ aqua diluito, ac bibendam dato, & per annum ut ita dicam, non concipiet. Partum accelerans ægre parienti. Lauri radicē derafam, aut lauri baccas dimidij acetabuli mēsurā in aqua calefacta bibēdas dato. Aliud partū accelerans. Dictamni obolos duos tritos in aqua calida bibat. Aut abrotoni drachmā, & lauri baccas, & anisum, in uini dulcis ueteris cyatho terito, & aquæ cyatho affuso bibendū dato. Hoc bonum est si ante partus dolores fuerit datum. Aut dictamni obolū, myrrhæ obolū, anisi obolos duos, nitri obolum. Hæc cū uini dulcis cyatho uno terito, & aquæ calidæ cyathis duobus affusis bibenda dato. Deinde calida lauato. Aliud partū accelerās. Resinam terebinthinam, mel, oleū duplum horum, uinum odoratū q̃ suauissimū. Hæc mixta tepēfacta sæpe ebibēda dato. Oportet aut, & uteros sedare, si fuerint inflammati. Aliud. Cucumeris sylvestris quicūq; albus fuerit semen cerę infarcito, deinde lanæ rubræ inuolutū lumbis alligato. Si uero prægnans multo tempore cohibeatur, & parere non possit, sed diebus pluribus ex partus doloribus laboret: Sit aut iuuenis, in uigore, et multo sanguine referta, secare oportet uenas in malleolis, & sanguinē detrahare, uiriū respectu habito. & postea calida lauri corticibus incoctis lauato. Vitis aut semen, & dictamnū creticam, utrūq; pari portione, in uino albo aut aqua bibendū dato. Subdititiū autem medicamentum facito, galbano, et baccis lauri, et oleo rosaceo, in lana inuolutis ac subditis. Aliud. Filicis quercinæ radicē tritam in uino bibendā dato. & adiantum tritum in oleo dilutū illinendum, & in uino meraco bibendū dato. Aliud, quod puerperæ

puerperæ puerperij purgamēta melius purgat. Testudinis marinæ hepar uide adhuc uiuētis, in lacte muliebri terito, & cū unguento irino ac uino subigito, & apponito. Aut mercurialem tritam in lana apponito. Aut artemisiā tritam similiter in lana subdito. Aut mercurialis & cucumeris syluestris parū terito, & uino ac melle subactū apponito. Purgatoriū puerperij purgamentorum ex partu. Triticū trimēstre fractū ac fresum, dimidiæ choenici mensura, in aquæ heminis quatuor coquito. Quum aut efferbuerit ter aut quater, sorbendum dato. Aliud. Sambuci folia in aqua coquito, & aquā bibendam dato. Edat aut & brasicas coctas, & porrū, & fœniculum, & anethum, & polypos, & locustas pisciculos. Aut rhois folia & erysimū ex uino, aut polentę pollinem bibendū dato. Aut misy duorū obolorum pondere tritum ac uino subactū apponito. Purgatoriū mensium & puerperij purgamentorū. Ducit etiam aquā & alia. Radicis struthij tusi triti quantū tribus digitis apprehendi potest, melle subactū apponito. Nascitur aut in Andro in littoribus. Aliud similiter purgans. Erysimū in aqua coquito, & ubi ebullijt oleum affundito, ac bibendum dato. Comodum est etiam succū pro fomēto adhibere per suffitū. & cibis mollibus uti. Aliud quod puerperij purgamēta purgat. Erysimū placide terito, & corticem diffiato. Quum autē purū feceris, leuiter terito, & aquā adstillato, salemp; ac oleum ammisceto, & ubi polentā insperferis coquito, ac sorbendum dato. Aliud. Si nō descenderit purgatio, aut puerperij purgamēta nō prodierint. Cucumeris syluestris internā partem, trium obolorū pōdere sume, & artemisiā herbā, & thus oboli pōdere, & hæc trita, & melle ammixto, lanæ inuoluta, ad uteri os appone. Et hoc semper noctu ac interdū per dies quinq; facito. Aut uitis pampinos aut folia uiridia terito, & melle ammixto lana excipito, & eodē modo subdito. Aut cupressi fructū & thus simul trita, rosaceoq; ac melle diluta, & lana excepta apponat. Aut abrotoni drachmā, & cucumeris syluestris medullæ obolum, & thus cū melle terito, & in lana inuoluta apponito. Aut elaterij obolum, & myrrhā, cum melle terito, & lana excepta apponat. Aut cupressi fructū, & cucumeris syluestris internā partem, & thus, melle ammixto, in lanā subdat. Purgatoriū si ex partu non purgetur. Trifoliū in uino bibendū dato. Idem etiam appositū menses erumpere facit, & foetum eijcit.

Purgatoriū uterorum, quū puero mortuo sanguis in hoc manserit. Cucurbitam syluestrem tritam cū melle delingat, aut apponat. Ad omnia puerperij purgamenta si nō probē prodeant. Erysimū coquito cū polenta, & oleo affuso ubi coctū fuerit sorbeat, & cibis mollissimis utatur. Aut scāmoniam cū lacte muliebri tritam, ac lana exceptā apponito. Aut radicē dulcem melle, & rosaceo aut Aegyptio unguento subactā, in lana subdat. Aut farinā lotam similiter apponat. Bibat aut crethmi, & seselis, & rutæ, & silphij semen, ita ut de singulis obolos duos simul teras, & in uino meraco, si nō febricitarit, præbeas. Subdititiū quod secundā relictam eijcit. Ex sambuci foliorū decocto prius fomentum adhibeto, & id quod ex cātharide fit apponito. Hoc & ea quæ debilia sunt sanat. Si uero lancinet ac mordeat, statim tollito, & lanā rosaceo tinctā subdat.

Potiones quæ secundā educere possunt, & menses deirahere, itemq; foetū enectū. Cantharidas quinq; alis et cruribus ac capite auulsis, & tribulum ad mare natū cū radice ac folijs tritū conchæ mēsurā, & euāthemī, ac seminis apij

tantundē, & sepiæ oua quindecim, in uino dulci tēperato bibenda dato. Et ubi dolor habuerit in aqua calida desideat, & aquam mulsam aquosam bibat, & uinum dulce. Alia. Ranunculi foliorū ac floris triti, stateris Aeginēi pondus, in uino dulci bibat. Si uero dolor habuerit, cicer albū & uuas passas, in aqua coquito, perfrigerato, ac bibendū dato. & ubi urinæ stillicidiū uexarit, in aqua tepida desideat. Aliud quod eijcit secundas. Cucumeris syluestris succū in mazam cōspersum apponat, ubi prius ad biduū ieiunarit. Hoc nullū aliud præstantius inueneris. Fœcūdītatis experimentū. Caput alij integrū deraſum appone, & uide an per os oleat. Aliud experimentum. Netopon modicū lana inuolutū apponito, ac uideto an per os oleat. Alia subdititia. Scorpj marini fel, lana exceptū & in umbra siccātū appone. Aut pulegiū siccātum & tritū ac melle subactū, in lana apponito. Aut florē aeris cum melle linteolo illigatū subdito. Aut cucumeris syluestris semen, & testam cōbustam, cū uino subigito, & leporinis pilis ac lana excepta subdito. Aliud subdititium. Alumen Aegyptiū lanæ inuolutū apponito. Aut cantharidas tritas uinoq; subactas subdito. Aut artemisiā herbā uino subactam apponito. Aut melanthiū cum uino tritum in lana subdito. Aut bulbion ex tritico tritum & uino subactū apponito. Aut uini ueteris albi fecē comburito, & uino albo extinguito, teritoq; ac in linteo apponito. Aut galbanū, & netopon, & misy cū rosaceo unguēto in linteo subdito. Aliud. Elaterij portiones duas, & fauū cū uino in linteo apponito. Aut butyrū & alumen melle subacta similiter. Aut scāmōniæ succū & adipem cū maza misceto, & uino imbuta in linteo apponito. Portiones quæ possunt secundam in utero detentā educere. Colocynthis syluestris internā partem cū lacte muliebri tritā, in linteo apponat. Ad idem. Silphiū magnitudine sabæ in uino bibendū dato. Aliud quod foetū expellit. Mulierē sub alis apprehensam fortiter cōcutito. In potu uero dato, uiticis folia in uino. Aut dictamnū creticum oboli pōdere in aqua terito ac exhibeto. Aut conyzæ graueolentis manus plenæ mensuram cū porri succo diluito, & netopū chemæ plenæ mēsuram addito, atq; hæc trita in uino bibēda dato. Aut tādā pinguisimā cū uino dulci coquito, trium cyathorū mensura uini affusa, & galbani obolos tres, & myrrhā adijcito, & ubi cocta crassa facta fuerint, tepida bibēda dato. Aut porri succum, & myrrhā, & uinū dulce simul exhibeto. Aut portulacæ semē terito, & in uino albo ueteri dato. Aut populi nigræ creticę grana nouē in uino trita bibat. Aut ranūculi herbæ foliorum ac floris triti, drachmæ Aeginæ pōdus, in uino dulci bibat. Si uero adhuc secūda intus detineatur, Senectæ anguiū obolum in uino terito, ac bibendū dato. Aut apij radicē, & myrti baccas coquat, & per dies quatuor bibat. Aut cuminū Aethiopicū, & castorij obolū, & cantharidis parū, hæc in uino bibēda dato. Aut fœniculi radicē, in uino & oleo ac melle feruefactā bibat. Si secunda non prodierit, conyzā tritam in lana subdito. Melius autē est ut bibat. Aut conyzæ quantū manus capit, & porri succū, et netopū chemæ mēsurā misceat, & hæc in uino bibat. Aliud quod secundā eijcit. Holconitidis dulcis radicē, est autē uelut bulbis, & parua uelut oliua: Hanc in uino terito, ac bibendā dato. Et si quidem parua fuerit duas dato, Si uero maior, una sufficit. Ammisceto autē ex seminibus cuminū Aethiopicū, & feseli malsiliense. Aut silphij libyci semen siccū chœnicis dimidiæ mēsurā, in uini heminis tribus coquat

coquat, & ad dimidias redigat, & de hoc bibat. Aliud. Vitis semen, & fefelis, pari portione simul cū myrrha terito, & cū aqua bibēda dato. Alia secūdas expellētia. Vitis albae recētis acetabulū, in uīno albo odorato tritū bibēdum dato. Aliud. Castorij aut sagapeni obolū, bituminis drach. i. nitri drach. ij. Hæc omnia terito, & in uīno dulci, ac olei hemina dimidia obolos duos ieiunā bibēdos dato. Et calida probe lauato. Aliud similiter habēs. Herinaceos marinos tres totos tenuiter tritos, in uīno odorato bibēdos dato. Aliud. Mētæ fasciculū paruū, & rutæ & coriādrī, & cedri aut cupressi semē, in uīno odorato bibendū dato. Et de herinaceis si habuerit, plurimū sorbeat. postea uero similiter calida lauato. Aliud. Anisum, cedri baccas, semē apij, cuminū Aethiopicū, fefeli, singulorū dimidiū acetabulum, tenuiter tritū, ex uīno albo bibendum dato. Aliud. Dictamni fasciculū, & dauci seminis drach. ij. & melāthij tantundem, tenuiter terito & in uīno albo bibēda exhibeto. Et multa calida lauato. Da to aut iuxta corporis robur. Aliud. Galbanū oliuæ magnitudine, in oleo cedri no tritū apponat. hoc corrūpere & eiocere morātes secundas potest. Aliud secundarū expulsiōnū quod uteris infunditur. Quū secunda à frigore mortificata cōputruerit, ubi uentus frigidus fuerit, crocū leuiter tritū drachmæ pōdere, cū adipe anserino infundito, & ad plurimū tēpus finito. Potus ad idē probe cōferens. Conyzā suaue olentē, & mel, & resinā terito, inq; uīno odorato, aut in syrmaea potione moderate purgāte bibēda dato. et calida lauato. Alius similis potus ad puerū & mala intus existētia. Aeruginē tritam cū melle, & syrmaea potione, bibendā dato. Aliud subdititiū, ad eiiciendū foetum immortuū. Aeris ramēta in molle linteū indita, ad os uteri apponito, & profueris. Aliud. Testam recentē, & adipem anserinū terat ac apponat. Aliud. Nitrū cum resina cōctū, & in glandē efformatū, gallinaceo adipe tinctū appone. Aliud. Charien appellatur herba, huius radicē nō multo adeo tēpore ad umbilicū apponito. Aliud. Cucurbitā syluestre, et muriū stercus, leuiter trita apponito. Aliud quod alligatur. Resinā & adipem gallinaceū, trita ac simul mixta, super umbilicū ac uenitrē deliget. Aliud subdititiū. Hederæ albæ semē, & cedri ramenta terat, et glādes hinc factas subdat. Aliud. Testudinis marinæ cerebrū, & crocum Aegyptiū, et salem Aegyptiū terito, misceto, glādes formato, ac subdito.

Suffimentū expulsiōnū quod et sanguinē uentris expellere potest. Salicis folia in ignē posita suffito, et mulierē circulo catam finito, donec fumus in uterū intrauerit. Abortus sanatio. Quū mulier abortū fecerit, et puer nō fuerit egressus, siue putrefactus fuerit, et intumuerit, aut aliud quid eiusmodi passus fuerit. Porri & apij succū per linteū expressum, de utrisq; colligito, & olei rosacei heminā, & adipis anserini quadrantē adijcito, resinæq; obolos tres in oleo liquefacito. & ubi mulierē ad pedes altiorē feceris, in uteros infundito, ac decumbēs ad plurimū tempus cōtineat. deinde ad diēs quatuor desidere iubeto, et egredietur puer putrefactus. Sin minus, salē Aegyptiū et cucurbitā syluestre uiridē accipito, & melle ammixto trita edēda dato. Et postq̄ ederit, hinc & hinc moueatur. Aliud. Salem Aegyptiū, et muriū stercus, et cucurbitā syluestre sumito, et mellis semicocti quadrantē affundito, et resinæ drach. i. in mel inijcito, & cucurbitā ac muriū stercus, omnia probe cōterito, & in glādes efformato, easq; ad uterū subdito, q̄s diu oportunū esse uisum fuerit. Aliud expulsiōnū, quod puerū

enectum eijcit. Helxinem in uino tritam bibendā dato. Aliud eiectoriū, quod puerū liuidū expellit. Veratri nigri radices tenues tritas, quantū tribus digitis apprehendere potes, & myrrhā magnitudine fabę, in uino dulci bibēda præbe. Aliud expulsiuū. Coriandrū cum radice, & netopū apponat, ac deambulet. Aliud quod infunditur, si mortuus fuerit puer, ut ipsum eijciat. Crocum terito, & anserinū adipem affundito, & excolata in uteros infundito, & ad plurimū tempus relinquito. Ad foetū immobilem corrūpendum ac expellendum. Aluminiſ scissi drachmā unam, myrrhæ tantundē, ueratri nigri obolos tres, in uino nigro leuiter trita, in glādes afformato, & apponito donec paulatim fuerit exolutus. Collutiones uteros purgātes, si ex partu aut inflammatione fuerint exulcerati. Grossos hybernos aqua affusa feruefacito, et excolato. Deinde oleo tepido affuso misce, & duas heminas ad summum infunde. Omnes aut collutiones nō ampliore q̄ hac mēſura uteris infundantur. Malicoriū item & mannam thuris, in uino nigro austero coquito, & excolatū uinū infundito. Alia collutio. Fecem uini uſtam liquefacito, & cū aqua infundito. Deinde malicoriū, myrti baccas, iuncū odoratum, lentes, in uino coquito, et diffusum uinū infundito. Alia. Butyrū, thus, resinā, mel, simul liquefacito, & affuso uino, tepida infundito. Aut sambuci fructū in aqua coquito, & excolata aqua, apiū, myrrhā, anisum, thus, simul in ipsa terito, & uinū odoratum pari aquæ mēſura affundito, excolatoq̄ per lintē, & tepefactū infundito. Alia. Brassicā, & mercurialem, et lini semen, & linū uiride, in aqua coquito, excolato, ac infundito. Aut foliorū myrti acetabulū, myrrham, anisum, mel, resinam, unguentū Aegyptium, omnia terito ac unito, affusisq̄ uini albi odoratissimi heminis duabus, excolato, tepefacito, infundito. Aut lauri fructū & pulegium in aqua coquito, & unguentum rosaceū affundito, & cū hoc tepido colluito. Aut anseris adipem resinæ ammisceto, affusoq̄ ad hoc uino, tepefactum infundito. Alia. Butyrū & oleum cedrinū, in modico melle tepefacito ac infundito. Aut mel, butyrū, iuncum odoratū, calamum odoratū, muscum marinum ſumito, & in uino coquito, excolato, ac infundito. Aut apij semē, fefeli, myrrhā, anisum, melanthiū, in uino coquito, & excolatū uinum infundito. Aut cedrū in uino coquito, & cū uino colluito. Aut hederā in aqua coquito, et aquam infundito. Aut elaterij, aut cnestri potiones duas in aqua coquito, et duas heminas ex hac tepida infundito. Aut cucumeris syluestris interioris magnitudinem digiti, in duabus aquæ heminis coquito, et melle ac oleo ad aquā affuso infundito. Aut radiciſ thapsiæ potiones duas leuiter terito, affusoq̄ oleo ac melle, in duabus aquæ tepidæ heminis diluito, ac infundito. Aut ueratri nigri potiones duas, uino dulci et aqua dilutas infunde. Aut grana cnidia sexaginta terito, melleq̄ ac oleo & aqua affusa infundito. Collutio corroborās, si ulcera pura fuerint. Grossos hybernos terito, et aquā affundito, & per totā diem macerato, & oleo affuso colluito. Aut malicoriū, & loti ramēta in uino nigro coquito, & infundito. Quum autem impura fuerint, & sordes deferuntur, fecem uini uſtam, cum uino et aqua infundito. Aut malicorium, rhoem coriarium, myrti q̄ ac rubi folia, in uino nigro coquito ac infundito. Collutiones quæ infunduntur ad uetera ulcera. Succo brassicæ cocto collue. Et mercurialē similiter ac nitrū rubrum modicū ammiscet, et myrrhæ acetabulū, thus, fefeli, anisum, apij semen,

netopum

netopum, resinam, mel, adipē anserinum, acetū album, unguentū album Aegyptium, Hæc omnia simul trita, & uini albi heminis duabus diluta, tepida infunde. Aut mercurialem in aqua coque & excola, & myrrhæ acetabulū, thus, fefeli, netopum, singulorū pares portiones adde, ac tepida infunde. Aut saluiam & hypericū in aqua coquito, & cum aqua colluito. Aut sambuci fructū, & lauri baccas, æquis portionibus in uino coquito, & cum uino colluito. Aut pulegij aqua colluito. Aut adipem anseris in resina liquefacito, & similiter oleum cedrinum modicū affundito, & cū melle liquefacito, ac tepida infundito. Aut argenti florem in uino & melle ac cera liquato, & cyperū, & iuncū odoratum, ac calamum (quæ sanē etiam in unguentū ammiscuntur) & iridem ac muscurū in uino coquito & infundito. Aut apij semen, anisum, fefeli, myrrham, melanthium, in uino coquito ac infundito. Aut cedrum creticam in uino coquito, aut in aqua, & infundito. Aut hederā creticam in aqua coquito ac infundito.

Atq; hæc faciēda sunt si uulnus habet, & myrrham in aqua dilutam infunde. Aut elaterij portiones duas cum aqua infunde. Aut colocynthidas syluestres duas in uino aut in lacte cocto, quatuor heminarū mensura macerato, & excolato, ac infundito. Aut cucumeris syluestris interioris, palmi magnitudinem in aquæ heminis quatuor coquito, & melle ac oleo affuso colluito. Aut radicis thapsiæ duas portiones, in uino dulci dilutas, cū aquæ heminis duabus, tepide infundito. Aut ueratri portiones duas, in uini dulcis heminis duabus dilutas infunde. Aut thlaspios acetabulū, melle ammixto in aquæ heminis duabus dilue, & tepido utere. Aut cucumeris syluestris magnitudinem palmi, & cneori portione unam, in aquæ heminis quinque coquito, & melle ac oleo affuso colluito. Aut grana cnidia sexaginta, in melle aut in oléo diluta, cū aqua infundito.

Si ex partu alui profluuiū corripiatur. Bibat uiam passam nigrā, & punici dulcis malicoriū, & internū nucleum, & coagulum hœdi. Hæc uino nigro diluta, & caseo caprino, ac polenta triticea inspersis, bibenda dato. Triticū autem modice torreto. Si uero ex partu sanguinē uomat, huic hepatis fistula fauciat est. Hæc lac asini bibat, deinde uaccæ nigræ, ad quadraginta dies. Et sesamum tritū donec probe habeat. Bibat aut lac ieiuna. Si ex partu sedem doleat, iuniperi fructū & apij radicem coquat, & ad dies quatuor bibat. et lactucæ semen cū anserino adipe tritū edat. Si uero ex partu uteri inflāmati fuerint,

solani succū infundito, aut betæ, aut rhamni. Si ex partu crus ab uteris claudum factū fuerit, & exurgere nō poterit, semen hyoscyami chemæ mensura, in uino nigro ad triduū bibat. Si uero mēte percellatur ipsa bibēs, lactis asinini poculum bibendū dato. Deinde pharmacū a quo pituita purgatur, ex sandaracha aut & cerato, & pilis leporis, per triduū suffitus fiat. De inflammatione ex

partu. Si ex partu uteri inflāmati fuerint, solani succū intra pudenda infundito. Aut apij, aut rhamni, aut betæ, aut cucurbitæ succū expressum. Aut sambuci medullā ac tenerrimam partē derasam, oblongam indito. Aut absinthiū in aqua terito, & lana exceptū subdito. Si uero horruerit tollito. Aut cotyledonis folia, & porrū, in crassiore tritici farina coquito, & oleo ipsis affuso præbeto. Bilē ex utero purgātia. Cucumeris syluestris internā partē tritā ac melle subactā, in glandē efformato ac apponito. Pharmacū aut dare oportet, qd' sursum ac deorsum purget, et calida lauare. apponere uero anisum, aut melanthiū: aut colocynthidis

thidīs sylueſtris internam partē terito, & melle ſubaſtā apponito. Aut elaterij potiones quatuor, ammixto adipe anſerino aut caprino, in oblongiorē glandē redactās apponito. Aut nitrū, & cuminū, & allium, & ficū, omnia leuiter trita & melle ſubaſta apponito. Calida uero lauetur, & à balneo bibat. Aut thlaſpile uiter tritū, & melle ſubaſtū apponito. Aut ficus ueteris pinguitudinē de raſam elaterij potionibus duabus ammixtis, & nitro tantū quantū eſt elaterium, cum melle ſubigito ac apponito. Aut peucedani tres cyathos bibendos dato. Et an ſum ac melanthiū uino diluta bibēda dato. Aut elaterij potiones quatuor, adipe ouillo, ammixto apponat. Et hoc ablato aqua odorata lauet, quæ leniter adſtringat. Aut elaterij potiones tres cū ouillo adipe, in glādem circū pennā efformato, & ubi amouerit, ſufficiēti aqua probe eluatur. Aut thlaſpis potionē cum melle dato. Collutio ſi bilioſa fuerit. Elaterij potiones duas aqua dilue, & oleū narcifſinū affunde, & cū tepido collue. Aut colocynthides ſylueſtres duas in lactis aſinini cocti heminis quatuor macerato, & unā excolato, ac oleū narcifſinū ammiſceto, & infundito. Alia collutio bilioſa & pituitoſa. Cucumeris ſylueſtris internā partē palmi magnitudine, in aquę potabilis heminis quatuor coque, et melle ac oleo anthino ammixto infundito. Alia pituitā et bilē purgās. Grana cnidia ſexaginta, melle ac oleo anthino ammixto, cum aqua infundito. Aut cneſtrum in aquæ potabilis heminis quinq; coquito, & duabus excolatis, mel & oleū anthinū cum narcifſino ammiſceto, ac colluito. Collutiones purgatoriæ. Groſſi hybervi uſti in aqua macerātur, & ad aquā excolatā oleum ammiſcetur, ac infunditur. Poſtea uero collutio fiat ex malicorio, galla, loti ramentis. Hæc aut in uino nigro coquere oportet. Aut fece uini uſta utere cū aqua. Et poſtea hæc infundito, myrti folia & rhoem coriariū. Coquantur aut in uino nigro odorato. Et poſtea lentifci folia, & hypericū, & ſaluia, cū uino nigro odorato cocta infundito. Aut cū braſſicæ aqua, in qua mercurialis cocta ſit, modico nitro adiecto, colluito. Aut elaterij potionē, cū oleo narcifſino aut anthino, tepidam infundito. Si uero bilioſa fuerit, colocynthidas duas, in lactis aſinini cocti quatuor heminis macerato, & cū excolato colluito, oleo narcifſino aut anthino ammixto. Aut cucumeris ſylueſtris internā partem palmi magnitudine, in aquę potabilis heminis quatuor coquito, et melle ac oleo anthino addito, colluito. Hæc collutio pituitoſæ ac bilioſæ cōducit. Collutio pituitā trahēs. Grana cniidiū, & mādragoræ liquorē terito cū aqua, Nam purgatio multa & omnis generis ex hac collutione cōtingit. Aut alij caput integrū, nitrū, ficus internam pinguem partē, equis portionibus trita ad gallæ magnitudinē efformato, ac apponito. Aut cumini folia cū uino trita, in lana ſubdito. Aut radicē albam terito, & melle affuſo ſeruſaſtā in glandē redigito, ac apponito. Aut ſilphij liquorem cum ficis emollito, & glandem efformato. Bonum eſt & cucumeris ſylueſtris ſemen ſimiliter tritū ac præparatū. Aut fel tauri, & nitrū rubrum, & nepotum, ac cyclaminū, illorū quidem gallę magnitudinē, cyclamini uero ampliorē portionē, melle ammixto mulier quæ curatur apponat. Aliud ſubditium. Cyclamini caput purgatū aqua terito, & lana tenera exceptū apponito. Aut myrrham, ſalem, cuminum, fel tauri, cū melle eodem modo. Aut grana cnidia triginta, & Indici pharmaci oculorū, quod uocatur piper grana tria, decorato: & rotūdi item tria. Hæc autem terito, & uino ueteri tepido diluta, inſtar

glandis circum uolucris pennā efformato, & sic adhibeto. Aut tithymali succū melle subactum. Aut scillæ radicem longitudine digitorum sex, duobus digitis lana obuolutis subdito. Aut ipsam scillam absq; radice terito, & similiter lana obuolutam apponito. Collutio si pituitosa fuerit mulier. Veratri potiones duas in uini dulcis heminis duabus diluito, et permixta infundito. Si purgatione opus habuerit, porrum coquere oportet, aut sambuci fructū, anisum, thus, myrrham, uinum. Hæc omnia terito, & cum succo horum colluito. Aut brassicam in aqua coquito, & in huius succo mercurialem coquito, & nitri parum, & excolatum infundito. Aut cnestri potionem in melle dilutā immittito. Verum menses cōsiderare oportet, an biliosi sint, aut pituitosi. Ad hoc arenam siccam tenuem in solem subijcito, & quum menses prodierint, sanguinē superfundito, ac siccari finito. Et si quidem biliosi fuerint, sanguis in arena siccatus uiridis euadit. Si uero pituitosi, uelut mucus cōspicitur. Si igitur pituitosi fuerint, cnestri potionem cum aquæ mulsæ hemina infundito. Purgatorium molle, aquam ducit & pelliculas, ac saniem subcruentā. Detrahit & menses, nisi diu tuerint, & uterorū os mollit. Vnguentum narcissinū, & cuminum quod editur, myrrham, thus, absinthium, cyperum, unguentū rosaceum, Horum singulorum pares portiones, narcissini uero quatuor partes sumito, & crudi lini puluillo dum à stupa depectinatur ammixto, omnia terito, & glandem circum pennam efformato, & linteo tenui circumdato deligato, & in oleum album Aegyptium tingito, ac apponito, & per totam diem finito. Et ubi lauit & amouit, aqua odorata perluatur. Aliud purgatorium. Ducit aquam & pelliculas, & mucos, & saniem subcruentā. Myrrham, salem, cuminum, fel tauri, melle subacta & linteo indita apponito, & totum diem insita finito. Deinde ubi lauit & amouit, aqua odorata perluatur. Aliud. Salem, cuminum, fel tauri, melle subigito ac subdito. Et silphium ficui ammisceto ac apponito. Deinde unguento rosaceo illinito. Aut grana cnidia decorticato, potionēq; ipsorum terito, ac in glandem efformato. Aut allium & nitrum rubrū, & ficum, paribus portionibus melle ammixto subdenda dato. Et ubi amouerit, cerui adipē apponat in uino liquefactum. Aut piperis grana quinque cum modico elaterio, muliebri lacte instillato, in lana unguento tincta apponat, ac amoueat eodem modo. Aut pinguisimam ficus partē cum elaterij potione, & nitri rubri ac mellis æquali portione, eodem modo. Aut fel tauri, nitrum rubrum, netopum, cyclaminum, paribus portionibus eodem modo cum melle in glandem efformato. Aut fel tauri oleo Aegyptio tinctum apponat. Et eo amoto rosaceum illinat. Aut cucumeris syluestris longi internam partem, exēpto semine, cum lacte mulieris masculū alentis, & myrrham purā, & modicum mel, & unguentum Aegyptiū, terito & apponito. Aut cucumeris syluestris partē internā siccato, & sine semine tundito, & adiecto melle seruefacito, & glandē oblongā efformato, atq; oleo albo tinctū subdito. Aut syluestre cucurbitā eodē modo. Aut elaterij portiones tres cū farinæ massā terito, & glandem formato. Aliud similiter faciens. Grana cnidia decorticata trium potionum mensura coquito, & melle affuso apponito. Deinde rosaceum illinito. Quæcunq; uero glandem subdunt, eas prius lanam in glandem infigere, deinde linteum tenue circumdare oportet, atq; sic oleo Aegyptio tinctam apponere. Ducunt autem hæc

hæc maxime, & pelliculas auferūt. Subdititia purgatoria fortia, quæ aquâ ducere possunt, et mucos, ac pelliculas, magis q̃ priora. Piperis grana quatuor maxima, aut etiam parua, si opus fuerit, ad elaterij potionē ammixta terito, & muliebri lacte instillato, cum modico melle subigito. Atq; hæc in lanā mollem circum pennam obuoluito, & linteo circūdato apponito, ubi prius in oleū Aegyptium tinxeris. Maneant autem subdita per diem, & ubi amouerit, adipem cerui apponat. Potiones, similiter purgatoriæ, quæ secūdas eiꝑcere possunt, & menses detrahare, & foetum enectū educere. Cantharides quinq; alis & cruribus ac capite auulsis: & tribulum ad mare natum cum radicibus ac folijs tritū conchæ mensura: & euanthemi uiridem siue luteam internam partem, & seminis apij tantundem, & sepia oua quindecim, in uino dulci temperato bibenda dato. Et ubi dolor habuerit, in aqua calida desideat, & aquam mulsam aquosam bibat, & uinum dulce. Alia. Ranunculi foliorū ac floris triti, æginæ stateris pondus in uino dulci bibat. Quum autem dolor habuerit, cicer album & uuas passas in aqua coquito, & perfrigeratam bibendam dato. Et ubi urinæ stillicidium uexarit, in aqua tepida desideat, & uinum dulce bibat. Subdititia purgatoria si potiones non purgarint. Mercurialem tritam ac myrrham apponito. Aliud ad omnem morbū, & aperire, & purgare potens. Myrrham modicam & saluam, & anisum terito ac uitior. Purgatoriū quod sterilem purgare potest. Si os uteri non recte habuerit, sterus bubulum siccum tritum ac cribratum quatuor choenicum mensura, & aceti heminas decem, & urinæ bubulæ tantundē, & falsuginis marinæ heminas uiginti, pro fomento adhibeto, & ad multum tempus hoc leniter facito. Deinde lota ubi lenticulæ decoctum, & mel ac acētum mixta bibit, uomat. Et farinam sorbendam dato, & uinum odoratum uetus sub dio per noctem expositū, insuper bibendum. Cibum autem ea die ne gustet. Sequenti uerō granum cnidium deuorandum dato. Tertia uero pharmacum urinam ciens exhibeto, ita ut uuas passas & cicer album, duarum choenicum mensura sumas, & aquæ semicongios tres affundas. Deinde facta coctura excoles, & sub dio per noctē exponas, & postera die bibendum præbeas, & subdititijs pharmacis utatur. Aliud purgatoriū mēsum. Stercus bubulū uelut conchæ testam efformato, & cupressi ramenta ammisceto ac subigito, & in sole siccato, & in hoc suffimēta iniꝑcito, ac suffito. Aliud quod infunditur ad similem affectionē, si menses non prodeant. Spinæ albæ folia trita, & excolata ac tepesfacta infundito. Illitio purgatoria, quæ uteros purgat. Porri & nasturtij semen tritum, & uino ac lacte cocto dilutum, imo uentri illinito. Illitio mollitoria. Ducit aquā, & mucos, et pelliculas. Et puer perij purgamenta detrahit, & non exulcerat. Myrrhæ optimæ dimidiā partē, & salis granum, & picem aromatibus conditam, contūdito ac trita misceto. Sit autem myrrhæ dimidia pars, ad salem ac picē contusam, Hæc in linteum ad gal læ magnæ magnitudinem efformata immittito. Sint autem duo linteā, ut alterum in die, alterū nocte habeat, donec colliquefcaint. Lauetur autem calida. Et deinde ubi amouit, aqua odorata perluatur. Si uoles mulierem concipere, ipsam & uteros purgato. Deinde ieiunæ farinam edendam dato, & uinum meracū insuper bibendum, & nitrum rubrū, aut cuminum, & resinā, melle subigito, & in linteo subdito, & ubi aqua defluerit, nigros subdititios talos ad emol-

liendum

liendum apponito, & cum uiro cōcumbat. Si uero os cōclusum fuerit, etiam fici succum apponat, donec fuerit apertū, & statim aqua eluat. Cæterum accipitis stercus in uino dulci terat, & ieiuna bibat, & tunc uiro condormiat. Aut ubi menses desierint, anseris aut uulpis stercus, in rosaceo unguēto terat, & pendendum illinat, ac cōdormiat.

Si ulcera fuerint acria & inflāmata, hac collutione utere. Adipem anseris & resinam misce, & aqua tepida diluta infunde. Aut butyrum mellis ammixtum liquefacito ac infunde. Aut bryoniæ albæ conchæ testam paruam deradito, & myrrham ac mel similiter. Hæc in uino nigro odorato diluito, ac tepidū infundito.

Si ulcerata aut pustulis plena fuerint summa labra, carnem bubulam sumito, & butyrum siue adipem anserinum, & anisum aut crocum, aut spodium cyprium. Hæc omnia terito, & carni oblita apponito. Si ulcera fiant ac mordeant, Bubulam carnē adipe illinito, & carnem subdito. Et si sordida fuerint, eluito, & fomentū ex fici radice adhibeto. Et postea etiam de pinguedine in uino dulci bibat.

Si in pudendis fiant ulcera, bubulum adipem illinito. Et myrtum in uino coquito, & cum uino perluat. Aut oleæ folia, & rubi, & mali punicæ, eodem modo. Sit autē uinum pramniū. Atq; hac quidē sic facienda sunt. Et persæ arboris uidelicet folia terito, & ad pudenda apponito. Aut anethi & apij semen tritum illinito. Si feruido ac superficiali ulcere pudenda laborēt, sic curare oportet. Carnem bubulam longitudine duorum palmorum paruorum, crassitudine uero ligni quod in foramen bipennis immittitur, pudendi uidelicet uirilis forma, usq; ad uesperam apponat. Noctu uero auferat. Postera die autem rursus apponat usq; ad meridiem. & bibat uinum dulce, melle ad uinum ammixto.

Collutio si ulcerati fuerint uteri, & si urinæ stillicidiū uexarit. Porrum, sambuci fructum, seseli, anisum, thus, myrrham, & uinum æquali mensura ad horum succum. Hæc mixta & feruefacta frigefacito, & moderate colluito. Aut mel, butyrū, medullam, & ceram immittito, ac illinito.

Ad ulcera quæ in pudendo sunt ac enascuntur. Folia oleæ, & rubi, & hederæ, & mali punicæ dulcis terito, & uino ueteri diluta, noctu in lana pudendis apponito, & pro cataplasmate adhibeto. Quum autē dies uenerit, detrahito. & myrti baccas in uino coquito, ac colluito. Aut anseris adipem & resinam liquefacito ac infundito. Aut butyrum & oleum cedrinū, modico melle ammixto infundito.

Ad ulcera in utero resiccanda. Argenti florem in uino terito ac infundito. Aut butyrum cū melle infundito. Aut bryoniā albam, & myrrham, & mel, uino diluta infundito. Postridie uero uino nigro tepido eluito. Aut lentisci folia in aqua coquito, et cum hac postea colluito.

Si ulceratum fuerit os uterorū, Butyrum, thus, myrrham, resinam, medullam ceruinā infundito. Aut lenticulā in aqua coquito, & cum excolata aqua colluito. Quū uero aqua ex uteris fluxerit, & ulcera fuerint, & lancinarint, anseris adipem & ouū illinito. Aut ouillum aut suillum adipē. & lentem in uino coquito, & hoc pari aqua temperatū infundito. Quæ uero in pudendo sunt ulcera, cum hoc perfundito, & mannā thuris, rubum, pinī corticem inspergito. & cum aqua horum lauentur.

Expulsiuū si mortuus fuerit foetus. Galbani oliuæ magnitudine linteō inuolutū, ac oleo cedrino tinctum, ad os uteri apponat. Aliud. Calamum odoratū, & cucumeris syluestris medullam, cum adipe anserino terito, Deliget autē umbilicum & pectinem, & de hoc

modicum lanæ instillatū, ad os uteri apponat. Et ab hoc paulatim extrahetur. Aliud. Rubiā & cedri ramenta cōtundito, & aqua affusa sub dīo per noctem exponito. Deinde mane ad dolores partūs exhibeto. Aliud. Silphij drachmam unam, & porri succi acetabulum, cedrini olei dimidio cyatho paruo ammixto, bibēda dato. Aliud. Tauri fel oboli unius aut semioboli pondere, in uino terito ac exhibeto. Aut fermento oblitū, torrefactū deuorandum dato. Aliud. Cancros fluuiatiles quinq;, & rumicis ac rutæ radicem, & fuliginem de furno, omnia simul trita, et cum aqua multa unita, sub dīo per noctē exponat, & ieiuna ter bibat. Aliud. Cucumeris syluestris medullam tritam, in cedrina pice lanæ inuoluito, & cum filo ad pennam deligato, apponat autem intro, ita ut pennæ dura pars paululum foras promineat ex lana. Quum autem sanguis apparuerit, amoueatur. Aliud. Veratri nigri uirgulam longitudine sex digitorum lana obuoluito, extremam uero ipsius partem nudam finito. Deinde q̄ maxime intro apponat, & ubi extrema pars cruentata fuerit, amoueatur. Aliud. Veratrū nigrum, & cantharidas, & conyzam in aqua terito, & glandulam mollem sex digitorum longitudine efformato, siccato, & ubi dura facta fuerit, lana inuolutam apponat. Summam autem partem cedria illinat, sitq; ipsa nuda. Quum uero sanguis apparuerit, amoueatur. Aliud expulsiuum. Si foetus mortuus aut syderatus intus fuerit, ranunculum & elaterij parum in aceto meraco misceto ac bibēdum dato. Aut brasicę tener coliculus, in summa parte netopo illitus immittatur.

HIPPOCRATIS COI DE MOR-

BIS MULIEBRIUS LIBER II. IANO COR-
nario Medico Physico interprete.



LXXV s albus in senioribus mulieribus magis fit, q̄ in iunioribus. Fluxus fuluus in utrisq;. Fluxus ruber in iunioribus. Et ruber quidem fluxus fit ex febre. Magis autē ex abortu. fit & ex mensium interceptione, quum conclusi derepente eruperint. Fit etiā ex partu & febribus. & sanguis profluit ualde multus, & grumi excidūt. Et dolor fit clauicularum ac tendinū. & corporis torpōr, & crurū perfrigeratio. Aliquādo uero etiam nāsus effundit ad dentes, si amplior sanguis discesserit, & sudor multus diffunditur. Ad hæc & stomachi morsus fiūt, & perfrigerationes, & febris bilis meracæ ac pruriginosæ. & eadem die sæpe rigent, & rursus sudant. & aliquādo à supernis locis conuulsiones ipsis fiunt, aliquādo ab infernis. & ad inguina dolores acuti ac fortes irruunt, procedentes uelut dolores partus. Quandoq; etiam urinæ stillicidium adest, & os siccū est, & sitis premit. & lingua aspera est. & digiti pedum magni contrahūtur, & ad suras semper cū femore distenduntur. Et lumbi dolore uexātur. & manus impotentes fiūt. Quum autem huiusmodi fiunt, tunc etiam neruorum antrorsum ac retrorsum distentiones fieri solent, à clauiculis iuxta iugulum, ad maxillas & linguam. A talibus uero paulo post retrorsum, à tendinibus iuxta spinam, ad lumbos. atq; sic per uiolentiam pereunt. prædicere igitur oportet fluxibus inchoantibus, & diætā cōstituere hoc

hoc modo. Mane quidem dandū est pharmacum ad fluxiones, ex his quæ ego describam, quocūq; maxime opus habere uisæ fuerint. Dandū autem, & ter & quater, si multus sanguis discesserit. Diætā igitur cōstituatur, si quidem sine febre fuerint, ex cibis. Si uero febricitarint, ex sorbitionibus. Sunt autē ex sorbitionibus hæc cōmodissimæ, paniciū, lenticula, farina horni ac recentis tritici cocta, alica cocta sorbilis, zeā cocta. Ex potionibus uero polentæ pollen in aqua, &amenta à panibus derasa contusa. Et polentæ recētes, tenues in aqua madefactę, quas etiam insulas delingere prodest. Ex cibis uero panis exassatus in cinere. Obsoniū autem sit leporis caro, & colūbæ, ac palūbis, & cocta, & assata. Et hoc di caro assata, nullo ascititio cōdimento addito, sed ut in acetū saltē intingāt. Hepar item capræ aut bouis in cinere assatū. Oui tenue, aut ipsum luteum. Cæseus insulsus. Ex oleribus autē nullum gustent, neq; coctum, neq; crudum. Et à balneis abstineant. Et manus ipsis deligato, ita ut lana sordida ipsas circundes, & laqueū immittas supra cubitos, & ad poplites, supra genua. Et cū cucurbitis sub mammas affixis, ipsas eleuato, modo ad dextrā, modo ad sinistram partem translatis. Si uero spirādī difficultas oriatur ad cucurbitæ admotionē, cucurbitam amoueto, sanguinē autē ne detrahito. Verū subdititijs uterē, quæ ego describam, & ad sistendū sanguinem in talibus sunt apta. Et si quidē ex fluxionibus mulier euaserit, ubi multus sanguis discessit; et color est exalbidus, et facies eleuata, & sub oculis tumores laxi, & crura turgida, & uterus humidus, ac semper præter rationē hians. Et quæ discedūt aquosa sunt, uelut à crudis carnibus succus. Talibus si robustæ fuerint, uomitus, ciere oportet ieiunis, & post uomitus prandiū exhibere. His cōducit modicus cibus. Vinū nigrum meracius. Illuuiēs, aut frigide lotio. Deambulationes. Semel in diē cibū capere, omnis resiccatio. Si uero ad hæc nō sedentur, neq; cōsidant uterī, neq; à fluxionibus liberentur, respectu uiriū corporis habito, si quidē robusta fuerit, ueratrum dare oportet. Si uero nō obediat, caput purgare. facta autē purgatione, per diætā reliqua curare eodem modo uelut circa steriles. Cōsiderare porrō oportet etiam naturas mulierū, & colores, & ætates, & tempora, & locos, & uentos. Aliæ enim frigidæ, aliæ humidæ ac fluidæ, aliæ calidæ quidē, sicciores autē & stabiles sunt. Nam quæ superalbidæ sunt, humidiores sunt ac fluidiores. Nigræ uero, sicciores & acerbiores ac adstrictiores. Quæ uero uini colorē referūt, medium quiddam inter utraq; habent. Sic autē & in ætatibus cōtingit. Iuuenicula enim humidiores sunt, et multo sanguine plerūq; refertæ. Anicula uero sicciores, & modicum sanguinē habētes. Mediæ uero mediū quiddā inter utraq; habēt, ut quæ nunc æquales existunt. Oportet autē eū qui recte hæc tractare uolet, semper mulierum naturas discernere, & temporū occasiones, & ætates, & tempora, & locos, & uētos. Si fluxus in uteris obortus fuerit, sanguis multus fluit, & grumi cōpacti excidunt, & dolor occupat lumbos, & laterū mollitudinē, ac imum uentrē, & durus est uēter, & ad contactū dolet. & rigor ac febris acuta corripit, & debilitas oboritur. & omnia præter humeros ac scapulas dolet, & calor inuadit, & rubescit. & uenæ duræ fiūt ac renitētes. Morbus hic maxime fit ex abortu. Fit & quū menses multo tēpore retenti derepētē eruperint. Huic ubi sic habuerit, grossum siccū contusum ac cribratū in linteum alligato, ac apponito. & imo uentri perfrigeratiā imponito, cauens ne horreat. Postq; autē fluxus steterit

rit, oleæ syluestris folia in acerrimo aceto coquat, eoq; pudēda perluat. Bibat autem uinacea. & rhoem rubrū in aceti acerrimi hemina dimidia coquat, & eo pudenda perluat. Aut mora rubi rubra siccata ac trita, cū farina recenti, pari portione mixta, ieiunæ bibēda dato. Si uero fortius facere uoles, duabus farinæ partibus ammixtis, bibendum dato. Et ne lauetur. Cibis aut utatur siccis, & uino nigro uinoso. Si uero intumuerit, fluxu iam sedato, pharmacū deorsum purgans bibendū dato. post pharmacū autē uteros grossorū decocto colluito. & postea acerba infundito. Si uero his factis, humectā fuerit, suffitum faciat donec resicet. Ruber fluxus fluīt talis, qualis sanguis uictimæ recēs macātā, & grūmi pellucētes. Aliquādo uero etiam fluxū rubrū emittit, & uenter imus attollitur, & attenuatur, & impotēs fit, & indurescit, et ad contactū dolet, uelut ulcere preſente. & febris habet, & dentiū fremitus. & dolor ad ipsa pudēda, & pubem, & lateris mollitudinē, & lūbos, & tendinē, & uentrē, & pectus, & scapulas irruit. Et alias omnes partes dolet. & impotentia ac pusillanimitas occupat. & color mutatur. In principio quidē morbi hæc corripiūt. Si uero hæc omnia morā trahant, adhuc magis debilitatur. & manifestus est morbus. & cauæ partes attolluntur, & pedes intumescūt. Morbus hic ex partu maxime corripit, si quid in ipsa dilaniatū non prodierit, sed intus cōputruerit, & foetus exasperatus fuerit. Hæc si in principio cōtigeris, spōgiā humectā ipsi adhibeto, quū fuerit dolor. Aut linteū tenue molle rasum, aqua frigida madefactū, uentri imposito, & aqua perfundito. & lectū à pedibus altiorē facito, atq; sic insternito. & ad mēses ciendos medicamentū quodcunq; magis admiserit, bibendū præbeto. Apij semē torreto, tūdito, ac cribrato, & erysimū similiter, & peplij semen cū polenta cribratū, & urticæ semen similiter, & scabiem oleæ syluestris, & gallam, & rurā, & origanum, & pulegiū cum polēta cribrato ac misceto: polentā uero crassā torreto, & triticeam polentā cōmolito: & caseum caprinū sordibus derasis, & de alijs quidē singulorū æquales portiones misceto. Origani uero et rutę, & scabiei, & gallæ dimidiū. Hæc ieiunæ ante motū bibenda dato. Miscere uero etiā oportet ad usum, si aciora prodierint, & cyceonē exhibere. Et de pharmaco quidē pars una sit, & casei una, & una polentæ. Ad uesperā aut melle ammixto bibenda dato. & donec quidē principiū morbi fuerit, & sanguis multus prodierit, et modico tempore intermiserit, & dolores acuti tenuerint, hæc facere oportet. Si uero sanguis paucior fluxerit, & per breuius tēpus, ea quæ deorsum aut sursum ducunt bibēda dato. & pudēda lenibus fomētis foueto, prout semper opportunū uisum fuerit, & zeam unā cū cortice fractā, & grossos siccatos, tusos ac cribratos, & oleæ folia similiter, singulorū pares portiones in cataplasmate adhibeto. & lac bubulū coctū, aut crudum bibendū dato, respectu ad id quod recte habet factū, & prout opportunū esse uisum fuerit. & uidetur morbus hic debilis ac lethalis esse, & pauca ex ipso effugiūt. Quū mulieri sanguis ab articulis fluxerit, à partu aut à labore corruptę, quidā putāt ex medicis hoc fluxū esse. Est aut aliud. Nam hoc quod ex articulis, & ex lūbis, ac coxēdice aliud est, glutinosum est simul cū sanguine. Illud uero quod ab uteris & cauis uenis fluit, sanguis purus est. Hæc suffire oportet hoc modo. zeæ fractę semodiū aceto modico subigito, ut ne per totū uteros humectēs: & sulphuris uiui semiobolum ad zeas tritas ammisceto, & aceto subacta per noctē finito. Mane uero multo igne accēso, ob-

furamenta de dolijs olearijs imponito, & sordes officinæ fullonū, & serpentis semen ammisceto. Mox aut multū ignem tollito, & nō urito, sed maxime suffu-
 migare facito. Oportet aut sellam perforatā adesse, et mulierē uestibus contectā
 insidere, ut ne quid præterspiret. In ignē uero medicamentū cum aceto præpa-
 ratū inspergito, itēq; de semine serpētis. Sed & myrrha ammixta efficax est, ut
 suffita pudendorū cruentationē sedet. Si uero satis habuerit, erysimi semen tor-
 refactum terito, & in uino exhibeto. Fluxus saluus fluit uelut ex ovo uitioso
 multus & graueolens, & uteri inflammātur. & dolor ex lumbis & inguinibus
 emergit, & prodeūtia multa sunt, & si nō liberetur, celeriter fluētia. At etiam si
 tempus accedat, quæ restāt putrefacit, q̄ maxime id fieri potest. Riget enim, &
 uelut à carnibus assatis humor defluit. et cū his simul febres fortēs ac rigores fi-
 unt. Ex huiusmodi uero fluxibus multæ pereūt, paucae effugiunt. & si quidē in
 principio accesseris, sic curare oportet. Si sine febre fuerint ac robustæ, ueratū
 ipsis dato, et intermissis tribus aut quatuor diebus, pharmacū deorsum purgās
 exhibeto. Post purgationē uero sic diætā cōstituere debes, quō fluxiones aquo-
 sæ sint ac tēues. Mane quidē ieiunæ pharmacū aliquod ex his quæ ego descri-
 bam ad fluxū, ebibendū dato in uinū inspersum. Post pharmacū aut, alia diætā
 curato. Vteros uero sic curato. Si quidē inflammati fuerint ac conclusi, fomēta
 adhibere oportet mollia, donec os uterorū molle fiat. Post fomēta, infusis quali-
 bus opus habere uisæ fuerint colluito, siue magis purgātibus, siue mollioribus.
 Post collutiones, mollitoria apponito. Si uero nō facile solubile sit osculū, foue-
 ro & subdititijs mollito, quæ ego describā, donēc apertū fuerit. Quod si ad hæc
 fluxiones nō sedentur, caput purgato, & sic uictus rationē cōstituito. Si quidē
 sine febre fuerit, asininū lac bibat. & oleribus coctis hortēsisibus ac syluestribus
 utatur, excepto alliō, porro, brāssica & rāphano longō. Ex marinis aut, raia le-
 ui, scorpio, cōgro, torpedine, anguilla, passere, gobio: coquere uero oportet cū
 cepis & coriādro, in muria dulci ac pingui, ita ut probe percoquātur. Ex carni-
 bus aut, maxime suilla, deinde agnina, aut ouilla, coctis potius q̄ assatis, & ipsa
 rūiusculis. Vino uero albo mellei coloris, aut aquoso. Balneis aut nō ualde cali-
 dis, neq; multis, excepto capite. Si uero ex hac diætā, ab ulceratione & inflāma-
 tione liberētur, humidi uero sint uteri, pro balneis quidē, illuuiē, pro fuluis aut
 uinis, nigris. & pro aquosioribus, meracioribus. et pro polenta panibus, & pro
 piscibus carnib, assatis, & omnibus cibis siccātibus, quibus sanē in alui proflu-
 uijs utimur. à collutionibus aut omnibus abstineat, excepto uino et aqua. Suffi-
 tus aut fiat per adstringētia. Optimū aut esset si cōciperet. Si uero iuuenicula fue-
 rit, frēquēter ieiuna uomat, & postea parū prandeat. Atq; hæc harū fluxionum
 diætā est. Fluxus albus fluit uelut alba asini urina, & in facie sunt tumores al-
 bi, & partes ambę sub oculis tumēt. & hydropiformes ac nō ualde bona specie
 præditi sunt oculi, & splendor abest. & lachrymosi sunt oculi ac hebetes. & co-
 lor corporis exalbidus ac pustulosus. & uēter imus tumidus. & in maxillis pu-
 stulæ paulatim rubētes, paruæ, aquosæ ac malignæ. & in crurib, tumores laxi,
 & si presseris digito, notæ imprimūtur uelut in fermētō, & os saliuā impletur.
 & stomachi mōsus percipiūt quū ieiunæ fuerint, aut etiā uomuerint uelut aci-
 dam aquā, & si ad accliuem locū procedūt, anhelatio citius corripit, & strāgula-
 tio, & crurū perfrigeratio, et genuū impotētia, & in ore ulcēra feruida ac super-

ficiaria. & uterus præter rationē aperitur, & ad osculum procidit gravis, ueluti plumbū. Et dolores per femora tendūt. & omnia inferna perfrigerātur, ab imo uētre inchoantia usq; ad pedes. & plantæ torpēt, ac ingredi nō possunt. Tales difficile est à morbis liberare. Nam & ætate prouecta sunt, & afflictiones consenscūt. Nisi casus aliquis spontaneus forte fortuna allapsus ipsas soluat. Has exhaurire oportet quū redūdarint, per pharmaca quæ bilē flauā non purgāt. Sed urinā cientia his pota cōferunt, & capitis purgationes, & illuuiēs, & epithymi albi potus, & deambulationes. et omnis resiccatio in uictu. Hęc ubi fecerint, sanā quidē penitus nō fiunt, facilius autē degunt. Fluxus albi alterius curatio. Purgatur albū subluteū, & quū mingit, morsum percipit, & lancinatur, et uterus ulceratur. & febris corripit acuta, & calor multus, sitis, uigiliæ, & mēte mouētur. Et quū aliquid festināter egerit, anhelatio ipsam inuadit, & mēbra exoluuntur. Hanc mecona, hoc est peplum albū bibere oportet, & urticæ semē, & quod præstat, mali punicæ dulcis radicē, & rhoem, ac gallam. Hęc in uino acerbo bibēda dato, & mali punici succū, aut caseum caprinū ammisceto. Subter autē suffito zeam, & grossos hybernos, et oleę folia, & scabiē eiusdem, & cucumeris syluestris cortices ex tertia parte, reliqua paribus portionib. Sorbeat etiam olera cocta, & forbitiōes ex amygdalis & sesamo, & gestetur ac curru uehatur, & nō quiescat.

Alius fluxus. Desluit multū uelut urina ouilla. color est albus, & tota intumescit, & in tibijs eminētiæ laxæ & rubicundæ emergūt. & si digito attingas, notæ foueas præ se ferētes tibijs ac pedibus imprimuntur. & si quid edat, impletur ac inflāmur. & ubi iter fecerit, & opus aliquod obierit, anhelatio & dolor ipsam corripit, & color albus, quādoq; subluteus. huic si robusta & iuēcula fuerit, & alia apparuerint, ab initio pharmacū sursum ac deorsum purgās bibendū dato, & caput purgato, si pituitosa est, per ea quæ pituitā purgāt. Si uero biliosa, per ea quæ bilem. & si tēpus anni fuerit, & à natura nō est lienosa, & si quid ex relaxatis fuerit, serū dato. Decoquat autē hoc & bibat q̄ plurimo tēpore. & ad uesperam uinū dulce aquosum, si opus habuerit. Cibū uero ne cōtingat. Si uero debilis fuerit, forbitiōne modica utatur. & nō lauet. Postq̄ autē tempestiuū esse tibi uidebitur, à potu cesset. et post purgationē cibis utatur, ita ut abstineat à pinguibus, & acribus, & dulcibus, ac falsis. et ab oleribus acribus. Utatur autē piscibus petrosi, & carnibus ouillis, aut uolucrū, aut leporinis. pane frumētaceo, aut ex ordeo freso. & oleribus coctis utatur, & syluestribus quæ cruda edūtur, itemq; hortēsis, acribus exceptis, & deambulet mane & à cibo. Vbi uero his factis siccior esse uisa fuerit, uteros fece uini colluito. & tribus aut quatuor diebus interpositis, postea acerba infundito. & intermissione facta, si quidē sicca fuerit, quiescito. Et si à natura fuerit biliosa aut pituitosa, à uictu uero & pharmacorū potione attenuata, & se recolligere nō poterit, lac bubulū bibat per quadraginta dies, calidū de uacca. Præstat tamē pituitosam cibis q̄ paucissimis uti, quādiu lac biberit. Sit autē mensura sex heminarū Atticarū. Incipiatq; à duabus, et singulis diebus unā apponat, donec sex fiāt. & inde paulatim ad duas rursus descendat. & post lactis potū, cibis resicito & per uictus rationē. & post lactis potum, mane ieiunā adiantū bibat. hoc siccātū, tustum, & exacte cribratū, in uino nigro odorato diluto exhibeto. Si uero reuertatur morbus, totā ipsam foueto. & rursus pharmacis infra purgato. & postea uteros colluito, si quidē natura fuerit pituitosa.

tuitosa, per cnidiū granum, aut thapsiæ radicē. Si uero biliosa, scāmonia succo, aut colocynthide syluestri. hāc enim coniectā, duabus aquæ heminis affusis, coquere ad dimidias oportet, & huic mel, & oleū narcisi sinū aut anthinū ammiscere. Sit autē mellis quadrās heminae, olei uero hemiolū mellis, hoc est mēsurā ipsius tota, in superiōrē dimidia. Postea uero colluendū est melle, & uino, & oleo solo. & suffitus adhibēdī, & tribus aut quatuor diebus quiescendū. Bibat autē adiantū. & si in uētre non cōceperit, morbus reuertitur. & si morbus reuertitur, perit. Quū uero seniores morbus hic corripuerit, etiā uteri computrescūt. Valde uero paucae euadunt. Alius fluxus. Purgatur uelut ex ouo crudo luteū sub albidum, & ulcerat pudendū. & tument pedes ac tibiae. & caua oculorū partes intumescent. & oculi humidi ac lacrymosi sunt. & si iter faciat, anhelatio ipsam corripit, & debilitas oboritur. Si uero euaserit, morbus pituitosus fuerit, et si nō purgata fuerit, febricitat, bile uehemēter cōmota. Seniores autē hic morbus magis inuadit q̄ iuniores. Quū sic habuerit, si quidē uehemēter intumuerit, pharimacū deorsum purgās bibendum dato, quod pituitā & bilē purgat. Si uero nō fortiter tumuerit, & pituitā ipsam prēsserit, pharmacū sursum purgās dato. et si quidē potens fuerit, ueratro purgetur. Sin minus, pharmaco quod bilēm & pituitā ducit. Post pharmaca uero serū cōctum bibēdum dato, per plurimos dies, cum modico sale. Edat autē in super mentā. Ad uesperā cibum nē attingat, sed modicū sorbeat, & uinū dulce in super bibat, si opus habuerit. Si uero nō affuerit serū, lac asininū coquito, et exhibeto per quatuor dies. Ad uesperā uero eadē faciat, nisi febris noctu corripiat. Si uero natura fuerit lienosa, aut flatuosa, et exanguis, neq̄ serū, neq̄ lac bibat. Sed purgātibus inferne purgato. & ubi tibi tēpeliū uisum fuerit, uteros colluito, primū quidē medicamēto ex uini fece, bis aut ter. Post hoc scāmonia succo. Affundito autē ad hunc, uinū dulce, heminae Atticae mēsurā, & olei narcisi sinī maxime, quartā heminae partē. Postridie uero cū uini hemina colluito, et mellis quarta heminae parte, et resinē tertia mellis parte. Oleum autē sit mellis aequale. Si uero ea quæ ab infusa collutione secedūt prodierint pituitosa, etiā rursus colluito, interpositis tribus aut quatuor diebus. postea grani cnidij duas portiones decorticato, & ipsas infundito. Si uero non affuerit cnidium granū, radicis thapsiæ portione unam infundito. & postea isdem colluito. postq̄ aut purgata fuerint ea quæ secedūt ad has collutiones, & si prodierit aliquid cruētum, uelut ab ulcere, per acerba postea colluito. & si post hac ipsa interrogata, dixerit os uterorū durū esse, et dolorē habere, eodē modo eo quod paratur cū butyro colluito, donec uteri fuerint resiccati, & sana esse uidebitur. diebus uero inter collutiones intermedijs, sambuci fructū bibat, & leporis coagulū, & pepli corticē, & urticae semē, & mali punici dulcis corticē, ita ut de singulis pares portiones terat, & polentā ac adiantū ammiscat, & in uino nigro odorato ieiuna bibat. cibus autē utatur mollibus, nō salis, neq̄ acris. Carnes autē praeſtāiores sunt pisciū, aut uolucriū, aut leporinae. & laetetur calida nō multa. Si uero non quiescat fluxus, sed relinquatur, & uteri humescāt, medicamentū ex malicorio suffito. & postea uirū accedat. & si in uentre cōceperit, sana euadit. At seniores à morbo leuari nō possunt, sed pereūt prae debilitate. Fluxus alius. Fluit subluteū uelut ex ouo, & uiscosum, & uēter imus intumescit, ac durus fit. & si cōtingas dolet, & dentibus stridet, & febris occupat, & dolor

ad pubem, & ad pudenda, & ad imum uentrē, & ad lūbos irruit. & animi deliquiū, & anxietates, & perfrigerationes, & sudor multus, & pulsus ad manum accelerātes, debiles, deficientes, & statim pereunt. Si uero superstes manserit, & color ipsi mutatur, & fit uelut fauus aut cera, & si corpus digito prematur, mollescit, & notae uelut in massa farinae subacta fermēto imprimuntur: & pedes intumescunt ac crura. Hic autē morbus fit maxime, si in ipsis aliquid dilaniatum fuerit, aut intus computruerit in partu. Seniores autē magis afficiuntur. & huiusmodi morbus non est ualde leuis. Alius fluxus. Purgatur uelut à carnibus assatis humor, & pudendum exulceratur, & ad quācunq; aliam corporis partem destillarit. Et rigor, & febris acuta, densa, magna, & simul horror corripit. Dolores autem quales in omnibus fluxibus. Hæc tota intumescit, & infra umbilicum, & cruribus. & color fit morbi arcuati. Talis autē fluxus ex hoc fit. Postquā sanguis exhaustus, subbiliosus factus fuerit, & nō fuerit purgatus. Quū sic habuerit, pharmacū bibere oportet, si quidē fortis fuerit, ex ueratro. Si uero debilis, radicē & elateriū, & posteriore tempore lac caprinum. Aut pharmacū deorsum purgans dato, quod bilem & pituitam ducit. Vteros autē medicamento cū brasiacæ decocto parato colluito. Bibat autē saluiam, hypericum, apij semē, singula in uino nigro austero. Ieiunæ autē hæc bibenda dato. Si uero ulceratū fuerit pudendū, postea butyro colluito. Deinde pharmacū bibendū dato, & ulceram butyro, resina, myrrha, flore argenti illinito. Perluantur autē myrti ac saluiæ ex aqua decocto tepido. Cibus utatur neq; salis, neq; acribus, ut ne mordax uirina fiat, & à marinis prohibeatur, & carnibus bubulis, & ouillis ac porcinis. Alijs autē carnibus utatur coctis. Edat etiam panē, & uinum uetus odoratum nigrum bibat. Si uero hæc fecerit, & sana nō fiat, totam foueto, & postridie pharmacū sursum purgans dato. Deinde intermissione facta, rursus quod infra purget, & si quidē manserit fluxus post pharmaca, decoctū serum quotidie bibendū præbeto. Vesperī uero sorbitionibus, & uino dulci albo utatur. Si uero non affuerit serū, lac asininū coctum per dies quatuor bibat. Ad uesperā autē isdem utatur. Postea per dies quadraginta lac bubulū calidum bibat. & per diem nihil edat, ut ita dicā. Optimū enim hoc est. Nam & purgatur, & nutritur, & fluxus obtunditur ab huiusmodi lacte. Vesperī uero cœnet carnē uolucris modicam assatā, & panem modicū subcineritiū. Bibatq; insuper uinum nigrū uetus uinum, quādiu lac biberit, si multa prodierint, & acrimonia uexarit. & si his factis in uentre conceperit, sana fit. Quæcūq; uero seniores sunt, in his morbus quādoq; reuertitur, & pereunt. Iuenculis autē nō est lethalis. Diuturna porro est saniosi fluxus curatio. fluit autē talis subcruentus, uelut à carnibus assatis humor, & mordet uelut muria, & corrodit ac exulcerat pudenda. & uterus exulceratur circūcirca, et femora, & aliæ partes. & ubi super uestes destillarit, tinguntur & egre elui possunt. & uēter attollitur ac durus fit, & ad contactū dolet. & calor corripit. & dolor ad pudēda, & sedē, & imū uentrē, & laterū mollitudinē, & coxas, & lūbos irruit. & impotētia adest. & color mutatur, uelut morbi arcuati. Si uero tēpus & morbus producat, hæc omnia amplius corripiūt. & cauæ partes attolluntur, & pedes tumēt, & crura à lūbis. At hic morbus corripit ubi quid de foetu dilaniatū fuerit, aut in abortu, aut in partu. Oportet autē fomēta adhibere, & suffire, & bibēda præbere omnia ea quæ fluxū sistūt, & lac asininū et alia exhibere

bere. et uomere si opus fuerit. Si uero sine febre fuerit, & debilis febris habuerit, siccum fomētum adhibere melius est. Quū ad caput cōuersi fuerint uteri, & hac parte suffocatio desinit, caput grauat. Verū alijs alicubi aliās finis habetur. Signū autē hoc est. Venas in naso, & partes sub oculis dolere dicūt. & sopor altior tenet. & spumat, ubi leuius habuerit. Hāc multa calida lauare oportet. Si uero nō obediāt, frigida etiā circa caput, ita ut laurū et myrtum in aqua coquas, ac frigefacias. Vnguento aut rosaceo caput illinatur, & odorata subter suffiantur. graeolentia uero sub nares. & brasicā edat, & succū sorbeat. Si uero ad cor progressi uteri suffocent, & aer impeditus uiolenter attrahatur, anxia est & uomit. & quibusdā statim tractus deorsum cedit, & flatus exit. & aliqua quidē uomit spumosa, alicui uero quies cōtingit. Quibus aut non decedunt, his porri semen, & peplū, trita & tribus aquae cyathis diluta, bibēda dato. Auxiliatur & acetū albi cyathus potatus. Aut iuniperi fructū & saluiam dato, aceto aut uino ad has species ammixto. Oportet aut ipsam calefieri. Aut adipē sumere anserinū, & ceratū resinatū ac picem, in ipso liquefacere, & subdititias glādulas efformare. Quū aut ad praeordia allapsi strāgularint, ubi hic fuerit affectionis soliditas, & uomitus feruidus acris corripit, & modico tēpore mitior fit, & dolor ad caput & ad collū penetrans. Tepesfactoria igitur apponito, si sursum strangularint. Sub nares uero graeolentia suffito, sensim progrediēdo: Si enim aceruatim uteri infra decedūt, turba oboritur: Odorata uero inferne. & castoriū ac conyzam bibēda dato. Quū uero deorsum tracti fuerint, abomināda subter suffito, sub nares aut odorata. Si uero dolores quieuerint, pharmacū deorsum purgans bibendū dato. & postea lacasininū aut serum bibendū praebeo, si nō lieuosa fuerit à natiuitate, aut exanguis, aut decolor, aut auriū sonitus habuerit, uelut hae quibus propter cognationē morbi à iuuētute sunt familiares. At supernum uentrē ne moueto. caecutiēt enim, aut circa fauces turbationes, & alia instabūt. Verū prisanā succū dato. Si uero etiā ualde facilis sit ad uomitū, uomat. Collutio aut optima est ex narcisso. Subdititiū uero id quod ex cātharidibus praeparatur. Quū uteri apud praeordia cōstiterint, suffocatur uelut à ueratro. & recta ceruice spirat. & stomachus fortiter uellicatur. Quā dā etiam uomunt quandoq; saliuā acidam. & os aqua impletur. & crura perfrigerātur. Tales si nō breuī à praeordijs uteri discedant, loqui nō possunt. & partes circa caput ac linguam torpor occupat. Proinde ad uteros quidem lanam q̄ maxime fieri potest ad foramē apponito, ita ut pennae obuolutā, unguento albo aut Aegyptio, aut Bacchario, aut amaracino tingās. In nares uero, de pharmaco nigro ad caput praeparato, specillo exceptū infarcias. Si uero hoc nō fuerit, silphij succo nares illinas. Aut pennā aceto tingito, & immittito, naresq; illinito. Aut stērnutato rīū apponito. Quū aut conclusum fuerit osculū & internus trames, castoriū in uino bibendū dato. Nares uero phocae adipe illinito. Lanā aut appositā finito, donec cōsidant. Quū aut quieuerint, auferre oportet. Si uero ea ablata rursus recursarint, lanā rursus eodē modo apponere. Sub nares uero cornu caprae nigrū, aut ceruinū suffire, scalptum & in cinerē calidū inspersum, quo maxime suffumigetur, & nidorē sursum per nares q̄ maxime potest trahat. Suffito etiā phocae adipē, prunis testae impositis, ipsaq; obuelata, et capite imminēte, quo odor maxime ingrediatur, ita ut de adipe instilles, & ipsa odorē sursum trahat, os ue

ro clausum habeat. Et si quidem sursum allapsi fuerint uteri, hæc facere oportet.

Si uero ad hepar cōuersi fuerint uteri, mulier derепente uoce destituitur, et dentes cōserti sunt, & color liuidus fit. Derепēte uero hæc patitur sana existēs. Contingit autē maxime uirginibus antiquis, & uiduis quæ pepererūt aliquando, & uiduitatem agūt. Maxime uero contingit omnino nō ferentibus uterū, & sterilibus ex partu. Non enim prodit puerperij purgamentū, & non intumescit uterus, neq; molliuitur, neq; uomūt. Quum sic habuerit, tumorē ab hepate cū manu infra leniter detrudito, & præcordia cū fascia deligato, & os aperito. Vinum uero odoratissimū dilutum infundito, quādo sanē etiā graueolētia ad nares adhibere ac suffire cōuenit. ad uteros uero odorata & suffimēta. & postquā sic curaueris, pharmacū deorsum purgans bibendū dare oportet, si quidē biliosa fuerit, quod bilē purgat. Si uero pituitosa, quod pituitā. Et postea lac asininū cōctum bibendū præbeto. & uteros odoratis foueto. & medicamentū quod cū buprestis præparatur apponito. postridie uero netopum. Interpositis autē duobus diebus rursus uteros odoratis colluito. & postea intermisso die, aromatis suffito. Atq; hæc uidua faciat. Optimū autē in uentre habere. Virgine uero persuadeto ut uiro cohabitaret. Ad nares autē nihil adhibeto, neq; medicamentū ieiuna bibat. Verū castorium & conyzā in uino odoratissimo bibat per dies uiginti, & caput odorato aliquo ne ungat, neq; aliquod odoratū olfaciat. Si uero uteri inflammati fuerint circa latus, si cōtigeris durū apparet. & quum ad præcordia allapsi fuerint, strāgulant, & uomit pituitam acidam. & dentes stupefcūt, & ubi uomuerit, melius habere uidetur. Quū uero deorsum processerint, discedunt de uētre aliās alio, Maxime uero ad laterū mollitudinē quandoq; incidunt, & ad uesicā, & urinæ stillicidiū corripit, & ad sedem, & cacare sibi uidetur. & mēses prius aut posterius solito fiunt, aut nō statim huic apparēt. In hoc morbo si sursum strangularint, tepefactoria apponito. & graueolentia ad nares suffito, ad uteros autē odorata. & conyzā fœminam, & castoriū, in uino ieiuna bibat. postq; uero ad naturā suam cōfederint, placide suffito. Bibat autē urinam cientia. Atq; hæc faciat q; diu dolores tenuerint. Vbi uero quieuerint, totā foueto. Deinde pharmacū deorsum purgans bibendū dato, si biliosa fuerit, quod bilem purgat; si pituitosa, quod pituitā ducit. & lac asininum bibendū dato, aut serum caprinū decoctum. Si uero lienosa fuerit, lac ne bibat, neq; serū. & in purgationibus, cibis utatur mollibus, & per aluum secedentibus. pisces autē meliores sunt carnibus. & uteros foueto, aut subdititijs purgato, ipsosq; colluito. & ubi suffitum admisit, ad uirum accedat. Solutio uero morbi cōtingit, ubi in uentre cōceperit. Si uteri ad latera allapsi fuerint, tussis obtinet, & dolor sublatus. et insidet uterus durus uelut pila. & ad contactū dolet, uelut ab ulcere, & cōtabescit, & uidetur ipsi peripneumonia esse, & cōtrahitur, & gibbosa fit, & mēses non apparēt. Aliquibus autē quibus prius apparuerūt, etiam pereūt. & si tūc prodeāt, imbecilles sunt, & pauci, ac deteriores. & genitura nō fit hoc tempore. Quū sic habuerit, pharmacū deorsum purgās bibendū dato. & multa calida lauato, & ex tepefactorijs quęcūq; admiserit adhibeto. et à quibus sanguis purgatur ea apponito. Et lini semē torreto, tūdito, ac cribrato: & peplū albū, & saluā cū tenui polenta, et caseum caprinū muria derafa. Hęc misce, ut casei sint partes duæ, reliquorū uero, et polētæ nō salis pars una, et ieiunæ in uino bibēda dato.

Vesper

Vesperī uerō cyceonē crassum melle affuso exhibeto, & ex potibus quencūq; admiserit bibendum dato. Et frequenter fōmentum adhibeto. & calidam aspergito. & per ceratum leniter mollito, ac à latere detrudito. & latus fascia lata deligato. Et lac bubulum q̄ plurimum ad dies quadraginta bibendū præbeto. Cibus autem utatur q̄ mollissimis. Morbus hic uehemens est & lethālis, & paucæ etiā si sic curentur effugiunt.

Si uero in lumbis fuerint uteri, aut in lateris mollitudine, & spiritus sublimis iuerit, et suffocatio habeat, et anhelatio denā ipsam corripit, & moueri non uult: sulphur, aut bitumen, aut cicutam, aut myrrham terito, & melle cocto affuso, glandulam longā efformato ac crassam, eamq; in sedem indito.

Si uteri deuoluerint seipsas ad intermediam lumborum ac coxarum partem, dolor habet imum uentrem, & crura cōtrahuntur, & iuncturas coxarum ad sedem dolet. & quū aluum exonerat, dolores emergunt acuti, & stercus cum uiolētia prodit exiguum, & urina destillat, & pusillanimitas ipsam corripit. Quū sic habuerit, fistulam ad uesicam alligare oportet, & oleum calidum in uteros infundere. Et fomentū adhibere, aut multa calida aqua lauare. & in oleum & in aquam desidere. Suffire autem subter pudenda, graueo lentia, sub nares uero odorata. postquam dolor quieuerit, pharmacū sursum purgans dato. Infernum uero uentrem turbare non oportet. Vbi uero uteri consederint, pharmacum deorsum purgans bibendū dato, & lac asininum, si non fuerit liēnosa. Postea fomēta adhibeto uterosq; aspergito. et subdititiū purgatorium quod cum lauro præparatur, & non mordet, apponito. Deinde aromatis suffita, ad uirum accedat. & si in uentre habuerit, sana sit. Verum pleræq; steriles & cruribus mutilatæ fiunt.

Quibuscunq; osculum aliò inclinatur, & ad coxam allabitur. Contingunt enim & hæc, quæ uterū purgari prohibēt, & geniturā fuscipere, & liberos gignere. Hanc odoratis fouere oportet. & post fomētum, digito reuellere & à coxa disparare. & postea tædulis ac plumbeis fistulis immisis dirigere. Nō enim uelociter cogi potest, uelut dictum est. Quū autem ad naturalem situm redierit, & uteri aperti fuerint, subdititijs mollibus purgato, & alia cōuenienter facito.

Quibuscunq; uteri ad coxam collabuntur, si non breui discedant, & rursus in locum suum redeant, ad coxam resiccantur. Necessarium est autem osculum auersum esse, & in supernis detineri. Quū uero auersum fuerit, conclusum esse. Ex auersione uero ac conclusionē, durum fieri, & mutilatum esse. Vbi uero uteri conclusi fuerint, menses sursum ad mammās delegare, & ad pectus ascendere facit. & imus uenter attollitur, & inexpectatē in uentre se habere putant. Talia enim patiuntur, qualia prægnātes, usq; ad septem aut octo menses. & uenter pro temporis ratione crescit. & pectora eleuantur, & lac innāsci uidetur. Quum autē hoc tempus præterierit, & mammæ graciles cū ac minores fiunt, & uenter idem perpetitur. & lac euanescit. Venter item eo tēpore in quo se pariturā sperabat, euanescit ac concidit. His uero contingentibus, uteri modico tempore fortiter contrahuntur, et osculum ipsorum reperire non datur, adeo omnia contrahuntur ac resiccantur. & in mammis tubercula fiunt dura, partim maiora, partim minora. Hæc autem non fiunt suppurata, sed semper duriora. Deinde ex ipsis nascuntur cancri occulti. Quum autem cancri futuri sunt, prius ora amarescunt, & quicquid ederint, omnia amara esse uidētur. & si quis plura dederit, accipere renuunt, & compescenda faciunt.

Mente

Mente uero percelluntur, & oculi duri fiunt, & non acutè uident. & ex mammis dolores ad iugulum transfiliunt, & sub scapulas. & sitis tenet. & mammae graciles, & ipsae per totum corpus attenuatae sunt. & nares siccae ac obstructae sunt, & non leuantur. Spiritus est imminutus, & nihil omnino olfaciunt. & in auribus dolor quidem non oboritur, uerum aliquando callosa concretio. Quum igitur ad hoc temporis progressae fuerint, sanae fieri non possunt, sed pereunt ex his morbis. Si uero priusquam huc perueniant curatae fuerint, & menses soluti fuerint, sanae fiunt. At uero curare tales oportet hoc modo. Primum quidem omnium si adhuc fortem assumpseris, reliqui corporis respectu habito, quacumque tandem purgatione opus habere uidetur, medicamentum exhibeto. Vbi uero corpus praeparaueris sic ad uterorum medelam procedito. Si uero totum corpus minime mouendum esse uideatur, neque morbi causae hinc proficisci, uerum uteri à seipsis morbum habeant, curam hoc modo auspicare. Primum quidem uteros sic foueto. Ollae duas sextulas capiendi, operculum imposito ac adaptato, ut nihil praeterpiret, deinde uero operculi fundum pertundito ac foramen facito. In foramen autem arundinem indito longitudine cubitalem. Oportet autem arundinem operculo probe adaptari, ut penitus nihil praeterpiret. Quum autem haec paraueris, operculum ollae obdito, lutoque oblinito. & ubi haec feceris, fossam duorum pedum altitudine effodito, ea magnitudine quae ollam capere possit. postea uero ligna immissa urito, donec fossa ab igne excandescat. Quod ubi factum fuerit, ligna ac prunas quae crassissimae ac ignitae fuerint eximito. Cinerem uero ac fauillam in fossa relinquito. Quum autem olla efferbuerit, uapor sursum processerit, si quidem ualde calidus fuerit uapor, abstineat. Si uero non, summam arundinis parti insideat, ipsamque in uteri stomachum indat. Atque sic fomentum admittat. Si uero perfrigeretur, prunas ignitas adijcito, cauendo ut ne acutum fomentum facias. Si uero adiectis prunis, acutum fiat fomentum, magis quam conuenit, prunas detrahitto. At uero hoc fomentum clementi caelo parare oportet, ubi uentus non afflarit, neque perfrigeret. Ipsam autem indumentis obuelata esse oportet. Caeterum in ollam allium siccum injicere oportet, idque magis comminutum quam ea quae sunt contusa, & aquam affundere, quo ipsum permadescat, & aqua tribus digitis ipsum excedat. & phocae oleum superfundere, atque sic calefacere, ac fomentum adhibere per multum tempus. post fomentum uero si potens fuerit, lauetur toto quidem corpore ad uoluptatem, lumbis autem & partibus infra umbilicum, amplius. In coenam porro dato mazam, panem, & allium coctum. Postridie uero si quidem exoluta fuerit à fomento, eam diem intermittito. Sin minus, rursus fomentum adhibeto. A fomento uero si considerare hoc potest, osculum contingere iubeto, num fomentum ipsum uteros flatu implet. Si enim flatu implentur, osculum ex ualida auersione, & ad coxam allapsu magis dirigunt, ac aperiuntur. Tanquam igitur tale sit fomentum, & haec facere possit, sic fouere oportet. Quum autem fomentum adhibebis, allium injicere oportet, & phocae adipem superfundere. Atque hoc faciendum est, donec uteri uidebuntur inflati, & osculum fortiter sursum tractum. Nam ad hoc fomentum talia contingent. Post fomentum uero dietam constituito, uelut priusquam fouebatur. Quum uero commoti fuerint uteri, ac facile solubiles fiant, sceniculi radicibus foueto, & aliam ollam eodem modo praeparato. Radices autem sceniculi elotas cotundie

to, & in ollam mittito, & affusa aqua eodē modo fomentū facito. Postea uero la uato. & ad uesperam mazam cœnet. Si uerò panem uoluerit, & bolbidia parui polyporum generis, & sepiolas paruas, in uino ac oleo coquito, & edēda dato. At inter fomenti adhibitionem, osculum contingere cōneris, an fomentū uteros propinquissimē adducat, Hos fouere oportet ad dies quinq; uel sex, hominis consideratione habita. & si quidē exoluatur ac debilis sit, differre ad sufficiens tempus. Si uero non exoluatur, fouere per omnē diem. Post fomenta uero, subdititia apponere conare, ex albicante tæda pinguiissima. Illitio autem sit oleum. facito autem hæc lōgitudine quidē digitorū sex. numero uerò quinq; uel sex. figura uero in angustum abeunte. Sit autē alterū altero paulo breuius. crassitudo uero eius quod crassissimū est, sit digiti indicis, & forma similis digito, summa parte tenuissima, in processu uero crassior. Hæc autē leuissima ac rotundissima facito, cauendō ne ulla adsit fissura. Apponat autem primum id quod tenuissimum est, & ubi apposuit quiescat, obseruans ne excidat. Apponatq; primum summā partem, deindē semper amplius, simulq; obtorqueat ac circumcirca tædam intro trudat. & ubi parum susceperit, in hoc paruo se contineat, cauēdo ne excidat. postea rursus eodē modo intro trudat, donec quatuor digitorum mensura intra osculum uterorum recipiatur. Quum autē hoc susceperit, alterum postea apponat simul ut prius insitum aufert, quo priusquā osculum conuiueat recipiatur, dum adhuc rectum est & apertū. Hoc autē ita continget, si alterū eximatur, alterum autē indatur. Oportet autē & plumbū simile figura crassissimæ tædæ formatum intrudere, quod cauum sit, quo continere quid possit. plumbi uerò amplitudo sit talis fabricata, qualis in ulcera impellitur, ita ut os ipsius leuē sit, & non sauciet. formato autem hæc uelut etiam subdititia ex tædis. Quum autem factus fuerit huiusmodi plumbeus penicillus, adipe ouillo trito ipsum expleto, & ubi ita præparatus fuerit, tædam quidē subtrahito, plumbum autem indito. Si uerò plumbum appositum ardorē exhibeat, plumbū quidē detrahito, tædam uero rursus apponito. Et plumbum in aquam frigidam immergito, & postea rursus apponito, ac tædam eximito. Semper autē aliquid appositum esse oportet, & interdū quidem melius est tædam habere, noctu autem plumbū. Si uerò surgere uoluerit, cū cautione hoc faciat, quo penicillus intus quiescat. Sin minus, statim rursus subdatur. Si uero ex tædis apposis nullam suscipiat, tenuiorem facito, donec suscipiat, ex his ad illa trāseundo, & obediētes uteros faciendo. Si uero neq; osculum aperiri poterit, neq; uteri prope accesserint, rursus ad ueterem medicinam redito, à prima ad secūdā, donec mollescant, & propinquissime accedant. Et postquā aperti fuerint subdititia facta apponito. Sint autem magnitudine oliuæ. Horum autē alterum appositū sit donec lique scat, & deindē alterum apponito. Quum autem apponere uoles, ipsum subditium medicamentū ex resina præparatū, in oleum rosaceum aut irinum tingito. Nam aliās ab osculo uterorū recedit. Prius tamē plumbum appositum esse oportet, quo recto osculo, in internam osculi partē attrahatur. Postea uero mollitoria apponito. Lauet autem calida, & ante, & post subdititia medicamēta. Et in cœna exhibeto quid ex relatis marinis. Exhibeto autē duobus aut tribus diebus ab appositione, consideratione habita an osculum uterorum bene habeat, & purum sit. Quod si est, ab hoc subditio quiescito. Postea uero

H

mollitoria

mollitoria apponito. Quum uero inflammatū fuerit os uterorum, rursus eodem modo pharmaca apponito, reliquaꝓ facito iuxta relatum modum. Vbi uero probe habuerit corpus, uelut dictum est sufflato. Sed & osculū, & uteros sufflare oportet sic. Subdititiū factū cum ficu apponito, duo autē subdititia facito, & antequā subdas fomentū adhibeto ex feniculo prius relatum, post tridie uero post fomentum, apponito medicamentum. & quum apponere uoles, præ omnibus subdititijs ubi prius laueris ipsam ita apponito, postera autē die mollitoria auxiliantur quandiu inflammati fuerint. post inflammationem uero, alia facito iuxta priorem rationē. facito item de hoc subdititio talia, qualia de priore. Et si quidem in mēse semel appositū, satis uidebitur inflasse uteros, quiescito. Si uero aliqua opus habuerit, rursus apponito eodem modo quo prius. Postea uero ubi bene habere tibi uisa fuerit, et tempestiuū esse, fomentū ex suffimentis præparato. præparatur autem hoc modo. Cyperū tusum præparato testæ conchæ mensura, & calamum unguentariū eadem mensura, & iunci unguentarij tantundē. cardamomi tantundē. Cumini item Aethiopici, & anisi, & rutæ siccæ, & hyperici ac feniculi seminis. Quū autē hæc præparaueris, uini aut steri albi odoratissimi hēminas sex in ollam infundito, & de cōtulis quadrantē inspergito ac permisceto. Deinde unguēti Aegyptij optimi, aut amaracini, aut irini, triū obolorū pondus affundito, permisceto, & molli fomēto plurimo tempore foueto. Ante fomentū uero lauato, & duos aut tres dies foueto. Quū autē foueri desierit, operculū quoddam fomento imponere oportet, ut ne trāspiret. postea uero tædis & plumbis utere. Quū autem duobus aut tribus diebus fomentū adhibueris, alias duas aut tres intermittito. Intermedijs autē diebus bis in die lauato. Edat autē porrum coctū & crudum, & raphanos, & nasturtium, & allium assatum ac coctum. & potus sit meracior. & marinis prædictis utatur. Quum uero intermedij dies præterierint, rursus fouere oportet, ita ut modicū de singulis contulis ad prius fomentū inspergas, & uinum insuper affundas, si opus esse uidebitur, itemq; oleum, atq; cū hoc foueas. Postquā autem fomenta bene habere tibi uisa fuerint, & osculum molle esse ac apertū, uelut conuenit, & ipsi uteri prope: postera die à fomento, pharmacū quod cum myrrha præparatur apponito. Sunt autē apposititia duo. postridie uero post purgationem, mollitoria subdito, quandiu uteri fuerint inflammati. postea uero tædis ac plumbis penicillis utere. Post hæc intermissis diebus quotquot uisum fuerit respectu ad inflammationes uterorū habito, & uiriū corporis coniectura facta, rursus uelut scriptum est refoueto. Si quidem prius fomentū adhuc sufficiens esse uidebitur, cōiectis ad hoc suffimētis uelut prius, & uino ac oleo affuso. Si uero inutile esse prius illud fomentū uideatur, aliud ex integro præparato. Oportet autem hoc pharmacū renouare in singulis adhibitionibus, quādiu subcruenta purgātur. Si uero talia purgata fuerint, quiescat. Diæta porro hoc modo constituatur. Interrogato in quibus diebus menses ipsi prodierint, & ab his initio factō, hanc diætā præscribito. Primū quidem multa calida lauetur, capite excepto. Quum autē cessauerit, caseum acrem, & rutam, uino nigro pari aqua temperato diluito, & postea polenta inspersa, statim ex balneo bibenda dato. Deinde prandium tempestiue exhibeto. Edat autē mazam aut panem, & porrū coctum aut crudum, & de huiusmodi omnibus acribus præscriptis, & aliquando legu-

minis fractū decoctum: spumam autē ne detrahito, & silphiū multum deraſum addito, ac multa allia incoquito. Obſonijs autē utatur piſciū, chartilagineis omnibus coctis aceto mulſo dulci, aut fauorum cremore cocto: bolbidijſ, polypodijſ, in uino & oleo. & ſilphij ſemen tritum bibat. & q̄ plurima tum in pradio, tum in cœna edat. Laetetur autē poſt cœnam, quum requieſcere uolet. Hæc diætā ad dies quinque uel ſex utatur. poſt hos dies, mane ieiune ſambuci fructus baccas ſex, in uino meraco dato, & ſepiæ oua decem aut duodecim. Hęc trita ſimul mane ieiunæ bibenda præbeto. poſt hoc uero pharmacū, potionē dato. At ubi interquieuit laetetur. Sit autē potio, ruta & caſeus, atq; ſic prandeat præſcripto modo. Serius autem cœnet, & ſemper bis in die laetetur. Hæc aut diætā ad dies tredecim aut quatuordecim procedat. Quū uero hi dies præterierint, catapotia ex ſucco ſilphij fabæ magnitudine formato, atq; hæc primū dato, poſtea uero alia præſcripta facito. Quum aut dies trāſacti fuerint uiginti quinque in hac diætā, reliqua quidem facito eodē modo. Ante prandium uero ubi prandere uolet, alij ſegmēta quatuor, & caſeum acrem tali magnitudine, terito & polentā modicam ammiſceto, ac maſſam efformato, eamq; primū edendam dato. Ante cœnam uero meracū abſorbeat, atq; ita cibum capiat. De cætero uero eadem diætā utatur. Quum autē nouem dies reliqui fuerint ad tempus menſiū, primum hoc dato. Cum ouis & ſambuco, cuminū Aethiopicū, et caſtorij obolum. Vbi uero duo dies reliqui fuerint, ab his omnibus potionibus ac catapotijs abſtineat. Verum pharinacū cum tæda præparatū ieiuna ubi lauit, ſumat. Poſt medicamenti uero potum, mercurialem & braſſicā ſimul in aqua cocta dato, cū aceto mulſo dulci, aut fauorum cremore cocto, ſale, ſilphio & oleo cōdita. Atq; hæc in pradio edenda præbeto, & ſuccos ſorbendos. & potum meraciorem bibat. Obſonijs autē utatur polypodio cocto aut ſepiolis. & hæc quidem in pradio. In cœna uero ſumat carnem caprinā, aut ouillam, aut agninam percoctā. & porrum, & alia acria, quæcūq; uoluerit. A cœna uero laetetur. & hæc ſit diætā poſtremis duobus diebus. Si uero ex hac diætā menſes non fuerint detracti, ſequēti menſe eandem diætā ab initio repetito, uſq; ad poſtremos duos dies. In quorum priore appoſititia facta apponat, iuxta ſuperiorē rationē, ex pharmacō in aqua facto. Apponat autē prælota. Verum cōſiderare oportet etiam uteros quomodo habēt, quo ſemper omni tēpore bene habeant, & os rectū ac apertum ſit, & ſi ita uiſum fuerit ante appoſitionē fomenta adhibeto. Quod ſi eruperint menſes, ſi quidem frequentes fuerint, paucioribus lauacris utendum eſt, & reliquā diætā ac curatione. Si uero pauciores, pluribus. Si uero ſignificationē de ſe præbuerint, ruruſ eadem diætā utendū eſt, ac curandū donec mēſes apparuerint. Quum autē ſemel talibus prodierint, optimū fuerit in uētre concipere. Atq; hæc eſt omniū huiuſcemodi morborū cūratio. Si uteri cōtingāt cōxam, & incūbant, dura ac ſolida ſit coxa ad lateris mollitudinē. & dolores imi uentris. & ad ipſam lateris mollitudinē, & lumbos, ac crura dolor incidit ac extenditur. & ſuppurantur, & linamentis opus habent, et pereunt, niſi quid ſecēs aut uras. Quū ſic habuerint, pharmacū deorſum purgans bibendū dato. & multa calida lauato, & uteros foueto, ita ut urinā ueterem in peluim infundas ac ſeruſ facias, & ſupra ipſius cavitatē mulierem colloceſ uestibus cōtectam, ut nē præterſpiret. & ſi frigefiat urina, ferri ignitū fruſta in urinā immittas, et fomentū facias do

nec se obscure uidere, & animo deficere dixerit. Lauato autem calida aqua, & postea digito cōtingens os uterorū ad sanam coxā trahat. Et noctu mollitoria apponat. Postq̃ autē dixerit directū esse, facto prius cū odoratis fomento, rursus mollitoria quædam apponito. Imò & plūbeos penicillos per triduū, singulis diebus unū. post hos uero bryoniā albam, aut scillam per triduū. postea uero cōsideratis mensibus disce, an bilioli sint, aut pituitosi, aut an sanguis sit corruptus. & si opus fuerit ipsi sanguinē purgare, quocūq; maxime opus habere tibi uisa fuerit, id apponito. Et postea cū eiusmodi colluito. Apponito autē subditiua medicamēta, donec sanguis purus educatur, & hoc per triduū facito. Deinde ceruinum adipem liquatū, molli lana eo imbuta apponat. postea per diē purlegium subdat. & aromatis suffita sic ad uirū accedat. Si uero ex partu morbus fiat, ubi ex urinæ fomēto penitus purgata est, statim ad odorata accedat. & postea lota, oleum albū Aegyptiū ad sanam coxā apponat, & super hanc decūbat. Si uero neq; ad hæc trāsmoueātur uteri, ieiuna pæoniæ grana nigra quinq; in uino odorato bibat. Et in cibo sumat allia cruda, & assata, & cocta. Obsonijs autem utatur paucissimis. Si uero sana nō fiat, similiter ipsam purgato uelut in priore dictum est. Cæterum in hoc morbo si nō statim in uentre habuerint, steriles fiunt. Si uero sic habuerint, mēsesq; non fiant, neq; febrilis calor corripiat, primū pharmacis sursum maxime purgato. Si uero debilis fuerit, deorsum. Et post pharmaci potionē, si pituitosa esse uisa fuerit, uomat ieiuna, & accepto cibo. & plerunq; sana fiet. Si uteri ad coxam decurrerint, menses crassi existentes non prodeūt. Verū dolor ad imum uentrē procedit, & ad lateris mollitudinem, & morsum percipit. Quū sic habuerit, multa calida lauato, & allia plurima edenda dato, & lac conuenienter bibendū. deinde uinum meracum. & totam foueto. & pharmacū sursum purgans exhibetō. Si uero debiliior fuerit, infusa. Si uero curata fuerit, uteros cū fceniculo foueto, & absinthium ammisceto. Postquā autē recens fota fuerit, os uterorū sensim cum digito ad sanam coxam detrahito, ita ut & ipsum os, & partes circūcirca affectas leniter mollias, & mollitoriū quoddam apponas, & postea plumbeos penicillos, & mox scillam, deinde narcissinū una die interposita. Quum uero pura esse uisa fuerit, netopū apponat in lana. & postridie oleum rosaceū. At mensibus prodeuntibus, melius est nō apponere. Si uero nō prodeant, cantharidas quatuor sine alis, sine pedibus, & sine capite, & pæoniæ grana nigra quinq;, & sepia oua, & apij semē modicum, in uino bibat. Et si dolor affuerit, & urinæ stillicidiū uexarit, in aqua calida desideat. & aquā mulsam aquosam bibat. Si uero nō purgetur, rursus pharmacū bibat. Si autem purgatio prodeat, ieiuna cum uiro coeat. Si uero nō prodeat, dato quod detrahat ipsam, respectu ad uires mulieris habito. & tūc tutum est ut ad uirū accedat. Si enim in uētre habuerit, sana euadit. In purgatione uero si multa prodeat, mercurialē edat, & polypos teneros coctos. & cibis mollibus utatur. Si puerperæ uteri in coxam incubuerint, aut ad lateris mollitudinē, ad alteram coxam oleum Aegyptiū album, aut rosaceum apponito. Sed & in sanam coxam decūbere melius est. Bibat aut pæoniæ grana nigra quinq;, & sambuci fructus in tēdis cōchæ testam maiore, & castoriū magnitudine fabæ. Et cibis utatur mollibus. Cōuenerit aut mercurialis ante cibum, cocta uelut brassica. Sorbeat autē & ipsam decocti aquā. & acria comedat, exceptis raphano &

cepis ac nasciturio. Optima est & lactuca. Quot uero morbos ex uteris fieri contingit: Dico autē quum uteri ex loco moti fuerint, aliō aliās allabuntur. Ad quēcunq; uero locum allapsi fuerint, dolores ingētes incumbunt. Et si quis uesi cam cōtingat, dolorem exhibēt, & urinam nō suscipiunt, neq; geniturā in seipsos trahunt, & ambo dolent, & si nō celeres solutiones fiāt, uteri postea suppurantur iuxta eosdē locos, si ad ipsos decurrerint. Cōtingit autē hoc & in laterum mollitudinē, & in inguinibus, & super pectine. Cæterū in principijs quum dolor habuerit, sic curare oportet, & tepefactoria adhibere, & in aqua calida sedere. Bonum enim & hoc est: aut spōgijs ex calida aqua expressis fouere. & phar maca uteris cōmoda bibere. Si uero ad hæc nō soluat, pharmaco sursum aut deorsum purgare, utro tandē opus fuerit, cognosces autē id hoc modo. Si enim ad inguina, & pectinē, & uesicam irruerint, hæc purgatione sursum opus habēt. Si uero ad laterum mollitudinē, & præcordia, hæc pharmaco deorsum purgātē indigēt. At uero huiuscemodi morbi omnes senioribus magis q̄ iunioribus fiunt, ad mēses suppressos. fiunt etiā iuueniculis, ubi multo tēpore uiduæ manserint. Si uero ad sedem cōuertantur uteri, secessus recemēta impediuntur, & dolores occupāt lumbos, & imum uentrē, & intestinū rectum ac podicē. Quū sic habuerit, calida ipsam lauare oportet, & lumbis fomentū adhibere, et postea graueolentia subter suffire, & apponere quæ purgāt & impellunt uteros. & bibenda dare quæcūq; libēter admiserit ex maxime cōferentibus. Si uero incumbant in inguina, & urinæ meatus, dolores fiunt fortēs, & torpor in cruribus. & urinæ meatus obturatur, & urinā nō emittit. Curare uero oportet hoc modo. Ad nares quidē odorata apponito, & unguēta. Ad uteros uero graueolētia suffito. Porro omnis occasio uteros propellere potest, si quid mali habeāt. Nam & à frigore pedum ac lumborū, & à saltatione, & terrore, & lignorū sectione, & cursu ad accliuē ac decliuem locū, & ab alijs multis propelluntur. Proinde hæc cōsiderare oportet, ad totū corpus respectu habito, quū præsentēs morbi affuerint, propter talia enim omnia necesse est plus aut minus ægrotare. & postq̄ hæc reluxerint, maxime hac parte repētini morbi manifesti fiūt. Quū igitur hæc aduenerint, penitius ex tota homine deprehēdere oportet. Nam quæcūq; perfrigerationes crurū, aut stupefactiones ex frigore fiunt, hæc omnes etiā in uterorū morbis uteros eleuāt. In talibus itaq; aquā calidam affundere oportet uteris & circūsitis locis. & ipsos ac crūra excalefacere, quū allapsi fuerint. Si circūuersi fuerint uteri ex partu ad dextrā partem, et puerperij purgamēta nō fiant, & dolor imum uentrē habet, & lumbos, & laterum mollitudinē. & dextrū crus grauiatur, & torpor occupat, & nō tremit, & osculum uterorū contingere non potest, sed ipsos leues ac fortiter planos deprehēdet. Quū sic habuerit, pharmacū bibēdum dato, à quo sursum ac deorsum purgetur, magis uero deorsum, & totum corpus foueto, & præsertim uteros leniter. & calida bis in die lauato. & ex potibus quēcunq; libēter admiserit, experimēto facto præbeto. & uiro frequēter cōdormiat. & brasica edat. Si uteri ad sinistrā partem, aut coxam declinauerint, dolor acutus ac uehemēs habet lumbos, & laterum mollitudines, ac ipsū crus. & claudicat. Quum sic habuerit, pharmacū infra purgans bibendum dare oportet, & postera die suffire hoc modo. Ordei choenices duas, & oleæ folia parum cōfringito. & gallam cōtundito ac cribrato, & hyōscyami tertiā choenice partem. Hæc mixta & olei hemina dimidia subacta in olla noua, per dies

quatuor suffito. Nocte uero lac bubulum, & mel, & aquam bibat. & calida lau-
uetur. Si uteri transuersim sitū habeant, & obliqui fuerint, itemq; os ipsorū,
menses ipsi partim occultantur, partim prius cōspicui euanescent, & non similes
sūt, sed deteriores & pauciores q̄ antea. & genitura nō fit hoc tempore. & do-
lor habet inum uentrē, & lumbos, & coxā, & ipsa attrahitur. Quum sic habue-
rit, pharmacū infra purgans bibēdum dare oportet. & calida lauare, ac fouere.
Vbi uero recens fota & lota fuerit, digito immisso os uterorū corrigat ac dirigi-
gat. & odoratorum suffitum admittat. & ex potibus dato iuxta experimentū,
quē libenter susceperit. Cibis autē utatur mollibus, & allia edat cruda ac cocta.
& cum uiro dormiat. et in sanam coxam decumbat. Alteri uero fomētum adhi-
beat. Morbus autē hic ægre cedit. Si uero propinquissimi fuerint uteri fre-
quenter uomat. Vteros autē graeolentibus suffiat, donec in locū suum firma-
ti fuerint. Diæta uero uentrē non emolliente utatur. Si uteri extra naturam
progressi fuerint, febrilis calor habet pudendū & inum uentrē. & urina fre-
quenter ac paulatim destillat. & pudendū uehementer mordetur. Patitur autē
hæc si recens ex partu uiro cōdormierit. Quum igitur sic habuerit, myrti bac-
cas, & loti ramēta, in aqua coquito, & aquā per noctem sub dio exponito, atq;
sic frigidissimā pudendo affundito, & leuiter trita hæc apponito. Postea aquā
lentium cum melle & aceto bibens uomat, donec uteri fuerint retracti. Sed et le-
ctum à pedibus altiorē facere oportet. & pudēdum graeolentibus suffire, na-
res autē odoratis. Cibis uero utatur mollissimis ac frigidis. & uinū aquosum al-
bum bibat. & ne lauetur, neq; cū uiro coeat. Si penitus ex pudendo exciderint
uteri, dependent uelut scrotū. & dolor corripit inum uentrē, & lūbos, & ingui-
na. & quum tempus processerit, nō uolunt in suum locum redire. Morbus autē
hic corripit, quū recens ex partu laborarit, aut fatigata fuerit, ut uteros cōtactū
leserit: aut cū uiro coiuerit in puerperiorū purgatione. Quū sic habuerit, frigida
cictoria mitigantia apponere oportet ad pudendū. & quod extra propendet de-
purgatum, malo punico in uino nigro cocto abluerē, & intro protrudere. De-
inde mel & resinam pari utriusq; portione colliquare, & in pudendum infun-
dere. Et decumbat supina pedes sursum extētos habens. Postea spongiās ap-
ponat, & ad lumbos deliget. Quandiu uero sic habuerit, à cibis quidem absti-
neat, potu uero parcissime utatur, donec septem præterierint dies. & si quidem
sic obedire uoluerint & redire, satis sit. Sin minus, summas uteri oras derasas &
ablutas, picato cerato illinito. Deinde pedes ad scalam deligato, ut caput deorsum
pendeat, & manu intro detrudito. Postea lauato, & crura ipsius uicissim
colligato, atq; sic per noctem ac diem finito. & modicum ptisanæ succum fri-
gidum dato, aliud autem nihil. Postera uero die reclinato, & cucurbitam quā
maximam ad coxam affigito, & multo tempore trahere finito, & ubi ipsam de-
traxeris ne scarificato, sed reclinatā finito, & nihil præter succū ptisanæ exhibe-
to, donec septē præterierint dies. Si uero sitis uexet, modicū aquæ bibat. Quū
autē septē transierint dies, cibis mollissimis ac paucissimis utatur. Vbi uero uen-
trē exonerare uoluerit, decumbens id faciat, donec quatuordecim prætereant
dies. Deinde tepidis fomentis colluatur, melius autē est calida uelut ex sole. & q;
parcissime deambulet, & ne lauetur. Ventrē autē ne solueris. Cibis uero paucis-
simis utatur, neq; acribus, neq; falsis. & pudendū graeolentibus suffiatur. &
postquam obambulare inceperit, subligar gestet. Si uero extra pudendum

os uterorū exciderit, utpote ceruice uterorū prope pudēdum sita, & ampla exi-
 stente: sit aut hoc magis sterilibus, contingitq; maxime ex fatigatione, quū mu-
 lier laborarit, & uteri calefacti fuerint ac exudarint: tūc euertitur os ipsorum per
 ceruicē ut quod in humidiorē ac lubriciorē & calidiorē sit loco, q̄ in priori tēpo-
 re. & ubi hoc cōtigerit, procedunt uteri foras ad frigus, & osculum ipsorū euer-
 sum prodit. Et si quidem breuī curata fuerit, sana sit. Verū sterilis penitus relin-
 quitur. Si uero non breuī, osculū dūrum semper ipsi extra erit, & fluēt illic aliās
 atq; aliās saniosus humor uiscosus ac graueolens. Et si menses prodierint, si ad-
 huc eius ætatis fuerit, in lecto decumbet. Temporis aut progressu huiusmodi
 morbus incurabilis sit, & consenscūt uteros foris habētes. Si uero uteri ex-
 tra prominuerint, ablutos ipsos aqua tepida, oleoq; ac uino illitos rursus indito
 ac deligato, & graueolentia subter suffito. Sub nares autē odorata. Si uero
 multo tempore uteri promineant, & stupide perfrigerentur, multam calidam
 aquam affundito, quo refocillentur. Si uero iam inflētur, etiam aceto ad aquam
 ammixto foueto: Sitq; hæc aqua aut lauri aut myrti decoctum, & leniter pro-
 trudit, & cerato unguento illinito, & si paruerint, fatis est: Sin minus, cum a-
 qua abluito, & aceto modico tepefacto perfundito. Deinde illinito. Vbi uero
 cōfederint, ablutos uelut dictum est indito, & alia prædicta facito. Oleum uero
 ne adhibeto, neq; aliud pingue, aut pinguitudinem habens. Si quid ex os-
 culis uteri complicatum fuerit, menses non fiunt, aut pauci & prauī ac dolori-
 fici, & quum uiro condormierit, dolet. & quicquid uir immiserit ex coitu exit,
 & contingi nō uult, neq; attrahit genituram. Et dolor habet imum uentrem ac
 lumbos. & os uterorum ad contactum non comparet. Quum igitur sic ha-
 buerit, urina ueteri foueto. deinde uomat à lentis decocto, melle & aceto ammi-
 xto. postea aqua calida lauetur. Deinde oleo albo Aegyptio in phialā argēteam
 aut aenēā infuso, & sale addito cōtectā phialæ insideat, & si quidē odor olei per
 os ipsi penetrarit, ipsam parituram esse, & postera die sanam fore pronūcia, ac
 cōfidere iube. et ubi dormire uolet, oleum Aegyptiū in lana apponat. Postridie
 uero cōsideret an os uterorū magis sit directum. & si esse dixerit, per tridū o-
 doratis foueto, & subdititiā quæ nō mordeāt apponito, purgatoq; & cū odora-
 tis ac mollibus postea colluito, totidem diebus uelut prius. Quum aut menses
 prodierint, ieiuna, & illota, aromatis suffita, ad uirum accedat. Pleraq; uero ex
 hoc morbo steriles fiūt, si nō curatus fuerit. Si ulcerati fuerint uteri, & extre-
 me foras procefferint, oleo illitis manibus indito. & myrrhæ puræ pilulas tres
 deuorandas præbe. & laurū uiridem tritam bibat uino dilutam. & sic sana fiet.
 Si in arcum contracta fuerint pudenda, subdititiū apponito. Anisi uidelicet
 semen & apij tritum pudendis subdito. Si uteri nō in loco manserint, sed mo-
 do huc, modo illuc trāsierint, ut dolores exhibeāt, & nunc incōspicui fiant, nūc
 exeāt uelut sedes. & quum quidem supina fuerit, in loco maneant, quū uero sur-
 rexerit, aut ex somno expergiscatur, aut se inclinauerit, aut aliū quēdam motū
 fecerit, exeunt. sæpe uero etiā dum quiescit. Hanc q̄ maxime quiescere, & non
 moueri oportet. & lectū à pedibus sternere altiore. & uomitibus uti. Oportet
 enim ipsos sursum reuellere, & acerbis perfundere. & graueolētia subter suffi-
 re. Sub nares autē odorata. & ex malis punicis quodcūq; maxime cōuenit &
 nihil impedierit, in medio per umbilicū perforatū, in uino tepefactū q̄ penitis-
 sime subdito. deinde lata fascia deligato ac circūdato, ut ne elabatur, sed maneat

& quod opus est faciat. & de peplo, cū caseo, & polenta bibendū dato, quemadmodū supra in allapsu scriptū est. et de potionibus experimēto facto, quancūq; maxime admiserit, bibēdam præbeto. Cibis autē mollissimis utatur. & cū uiro ne dormiat, donec ad locū suum redierint. Si uteri exciderint, hederā siccissimam tritam, ac linteo illigatā apponito. & nihil pingue adhibetō. In potu autē exhibeto triticum recēs, & peplum albū, & saluiam, & cyperū, & anisum. Hæc trita uinō diluta, cū fursuribus ordeī bis in die dato, pro uice heminā dimidiā.

Si ad crura & pedes uteri cōuertantur, cognosces sic. Magni pedū digiti cōuelluntur sub ungues, & dolor habet crura ac femora, & incūbit ac premit nervos circa femur. Quū sic habuerit, multa calida frequēter lauare oportet, & fomentum adhibere si ferre poterit, & graueolētia subter suffire. Et femora rosaceo oleo inūgat. Si uero loqui nō poterit, crura derepēte frigida reperiis, & genua, & manus. & si uterū contigeris, nō in suo mundo est, & cor uibratur, & dentib. frendit, & sudor est multus, & alia quæ à sacro morbo correpti patiūtur, et quæ ab aure exsudāt. His frigidā aquam multā affundere oportet super crura & manus, & alia facere uelut prius dictū est. Si cōmoti uteri aliquo allapsi fuerint, & dolorē exhibuerint, oleæ scabiem, & lauri ac cupressi ramenta in aqua cocta, lana excepta subdito. Quū mulier recens enixa, onus maius q̃ pro natura leuarit, aut timuerit, aut ligna secuerit, aut cucurrerit, aut alia quādā huiusmodi fecerit, uteri excidunt ob hæc maxime: aliquādo uero ad sternutationē. Non enim uiolatur, si per uim sternutans, nō apprehēderit nares. Proluere itaq; aqua tepida uteros oportet. Deinde betæ succo seruēfacto similiter. postea uino nigro meraco. Si uero non obediat, mollitoria facere oportet. Verū hæc facere oportet priusq; perfrigerētur, & leniter intro indere. Deinde crura extendere, ac subalternatim ponere, & molle quiddā ipsis supponere. à potu uero coerceri oportet tales q̃ maxime, & uentrē custodire, ut ne exturbetur. Naribus autē odorata adhibere. Huiusmodi uero postea si nō quieuerint, sed moueantur, ueratro purgare oportet. Et si nō satis fuerit, etiā uomitus facere, & non lauari, tacereq; ac quiescere. Si inflati fuerint uteri, uēter attollitur, & inflatur, ac sonitū edit, & pedes & cauæ faciei partes intumescent, et color iniucūdus fit. Et mēses occultantur. & genitura hoc tēpore non manet intus. & anhelat, spumatq; ac anxiosa est. & quū expergiscitur ē somno, recta ceruice spiratio ipsam corripit. & quicquid ederit aut biberit, ipsam molestat, & suspirat, ac tristatur magis q̃ priusq; edit. & suffocatur, & nerui cōtrahuntur. Et uteri ac uesciæ dolent, & manus cōtactū non admittunt. Neq; lotiū emittunt, neq; genituram suscipiunt. Quum sic habuerit, pharmacū deorsum purgans bibendum dato. & calida lauet, ac frequenter insideat toto corpore. Quandoq; etiā usq; ad umbilicū fomentum adhibeto. & interposito tempore ea apponito à quibus purgetur, & nō mordeatur. Suffumiget autē odorata subter pudenda; sub nares uero graueolentia. Et portiones dato quæ uteros purgāt, & ad locum impellunt. Et mercurialem edat, & postea lac bibat, uelut de latere scriptū est. Morbus autē hic non est diuturnus.

Si uelut in callū indurati fuerint uteri, & osculū exasperatur, & mēses occultantur. Quum aut prodierint, asperi apparēt uelut arena. Si uero etiā digito cōtingerit, os uteri asperum cōperiet, & semper uelut callus accrescit. Quū sic habuerit, cyclaminū terere oportet, et salē ac ficū simul miscere, & cū melle glandulā efformare ac subdere, & fomēto adhibito, purgātibus eluere. Edat aut mercurialem

& brasica coctam, & succum sorbeat. Itemq; porrū. & calida lauetur. Si uero uelut in callum indurati fuerint, & menses obtorquentur, & osculū ipsorum clauditur, & non cōcipit, & uelut aliud quid est. & si contigeris, uelut lapis illic esse uidetur. & est os asperum ac multis radicibus præditū, & nō leue aspectu, & qui ipsum cōsiderat, digitū intromittere non potest. & febris circūfrigerans corripit, & fremitus. & dolor uteros habet, & imum uentrē, & laterum mollitudinē, ac lumbos. Patitur autem hæc, si ipsi corrupti mēses cōputruerint. Quandoq; uero etiam ex partu, & frigore, aut mala diæta, & aliter. Medicamentū igitur bibendū dare oportet, & multa calida aqua lauare. Oleo itē utere, & fomentum adhibe. Quum autē recēs lota aut fota fuerit, specillo immisso aperito, & os ipsorū dilatato, idemq; cū digito similiter effcito. & mollitoria uelut dictū est apponito. & potiones similiter bibēdas dato, & eodē modo curato. Si uero obduruerint uteri, osculū ipsorum durū sit, & clauditur, & mēses non prodeūt, sed pauciores & deteriores. & dolor incidit, & febris & rigor corripit circa imū uentrē, & lumbos, & laterū mollitudinem. Quū sic habuerit, multa calida lauat, & tepefactoria adhibeto, si dolor habuerit. & uteros multo tēpore cū aqua decocti cucumeris syluestris foueto. deinde mollitoria apponito. Atq; hæc per triduū facito. & si ex contactu osculum uterorū molle apparuerit, ex crudo lino tres penicillos suppuratorios indito, primū tenuem, secūdum paulo crassiorē. Crassissimus autē sit magnitudine digiti parui, lōgitudine uero quinq; digitorum, ita ut hos adipe anserino illitos subdas. Sed & ubi fomentum adhibueris ex odoratis, glandē mollitoriā apponito: Aut nitrū tali magnitudine illitū, ut ne sauciet. Non enim pungerē oportet. & appositū sit ad duos dies. Decedit autē uelut cortex & pellicula crassā. Intermisis uero tribus diebus, cyclaminū cum narcissino subdito. Si uero hæc nō purgarint, cum multa cōsideratione apponito id quod cū buprestī paratur, & appositū maneat per diem. & ubi fortiter momorderit, glandē extrahat, & pudendū colluat cū aqua calida, & in oleo infideat. postridie uero lota, ceruinū adipem liquatū, & molli lana exceptū apponat. & si tibi adhuc purgatiōe opus habere uideatur, tribus interpositis diebus, id quod cū narcissino paratur subdito. postridie autē netopū. Deinde rursus tribus diebus interpositis, uteros odoratis & pinguibus colluito. postridie uero pulegiū per unū diem apponito. & sequēti die cū aromatis suffito ac foueto. Vtatur autē cibus acribus, marinis, aut carnibus. In mensibus uero castoriū bibat. & ieiuna illita suffita, & cyceonē bibens ad uirū accedat. Si uero os uterorū non suscipiat geniturā, sed durum fuerit ac cōclusum, plumbeū penicillū apponat, uelut dictū est per triduū, ubi calida lota est. & mollitorijs utatur, & supina decubat. & in aquā calidam infideat. & lanam unguetō imbutā apponat. Verū noctu magis apponere oportet. Iuxta coxas uero uestes laneas aut lineas molles supponat, ut ne corpus in alterutrā partem dilabatur. Vtatur & subdititijs mollibus, ex myrrha pinguisima, pice, cera, & adipe anserino. Sit autē myrrhæ dimidiū, reliquorū uero duplū, et in lana subdat. duo uero sint subdititia quorū alterū lota per diē subdet, alterū per noctē, donec molle factū fuerit. & ubi hoc detraxerit, aqua odorata colluatur. Aut grana cnidia decorticata quindecim, & Indici medicamēti aliquantulū, si ita uisum fuerit, in lacte mulieris masculum lactantis terito, & cerui medullā, & alia quę dicta sunt, ac modicū mellis ammisce

to. Sit autē lana quā hāc excipiuntur mollis & pura, & ad diem subdat. Si uero fortius facere uoles, myrrhā parū quid ammisceto. Optimum autē est oui candidum, & adeps caprinus, & mel, & oleum rosaceū: his ammiscere farinam, & tepescere ad ignē oportet, & quod destillat lana colligere ac apponere. Aut adipem rubrum anseris aromatibus conditum, & unguentū rosaceum, permixta & lana excepta apponito. Præstat autē anseris adipem, & adipē ouillum, ceram albam, refinam, netopum, oleū rosaceum, hāc simul liquare ac miscere. Vbi uero lota est, hāc tepida intro ad uterorū osculum apponat. Aut cerui medullam, & anseris adipem liquato, & rosaceo aut irino oleo ammixto, in ualde molli lana apponito. Quum mulieri uteri duri facti fuerint, & ad pudēda exierint, dura sūt inguina, & ardor in inguinibus est, & omnia cancerantur. Quū igitur sic habuerit, cucumeris syluestris internā partem, & fauū terito, & aquæ hemina affusa in sedem infundito, & purgatur. Si os uterorū durum fiat, & ceruix, præ siccitate, & morbus leuiter hæserit, ex digiti cōtactu cognosces. & si ad coxam deuoluatur, nihil acre adhibeto. Si enim exulceretur aut inflāmetur, periculū est ne penitus sterilis fiat. Verū apponito eā quæ non mordent, à quibus purgetur. Quū uero duri fuerint uteri, & sic doluerint, subdititia apponito, uelut est cerui medulla, aut anserinus uel suillus adeps. & unguentū irinum cum melle, & ouī luteum, ac ceram albā, uelut cataplasma emollito, et ordeaceam aut triticeam farinam, cū aqua & ruta coquito. Si uteri conclusi fuerint, oscula ipsorum dura fiunt, & genituram non amplius suscipiūt, sed statim ubi cum uiro cōdormierit, dum crura mouet, exit. & dolores inum uentrē, & lumbos, & inguina occupant, & mēses omnino non prodeūt. Si uero eant, pauci & prauī ac decolores prodeunt. Quū sic habuerit, multa calida lauato. post balneum uero castorium cum pæoniæ radice, in uino nigro odorato permixta bibenda dato. Cibis autē uelut puerpera utatur, & si manifesti fuerint menses, diem unā intermittito, & totam foueto, & pharmacū potandum dato, si adfuetæ fuerint, sursum purgās, aut si egere uisa fuerit, deorsum. Lac itaq; asininū, aut serum exhibeto, & leniter foueto, & mollitoria utero apponito, & cyclaminū, & narcissinum. Cucumerū uero paruorū syluestrium internam partē sumito, & ex diuulsis semen eximito, ac lacte mulieris masculū lactantis affuso terito, myrrha pura & melle optimo ammixtis, oleoq; Aegypto albo. & ne liquidū facito medicamentū, sed siccum, atq; hoc in lanā mollem purā infarciat, & in oleo Aegypto albo tingat, & lota apponat. Subligetur autē & sub tecto maneat quū purgatur. Postq̃ autem sufficiēter habere tibi uisa fuerit, quiescat. Sin minus, rursus aliud apponat. postea uero obuolutam lanam mollem, rotūdā faciat, & netopū immittat, & diem unā subdat. postridie uero oleum rosaceū itidem in lana. Deinde rursus cerui adipem, etiā ipsum liquatum in lana. Lauetur autē calida aqua semper antē subditiōnū appositionē. Et odoratis leniter foueatur multo tempore. Postea uero una interposita die, colluito. si quidē pituitosa fuerit, eo quod cū grano cnidio paratur. Si uero biliosa, eo quod cū scāmonia. post hāc cambo, postridie etiā narcissino cū uino dulci colluito. Si uero narcissinū non fuerit, cū anthino aut irino q̃ optimo. Sit autē olei tertiā uini pars. deinde interpositis duobus diebus, id quod cū pulegio præparatur unū diem apponat. Si uero prodierint mēses, ieiuna per tridū bibat castoriū, cū uino odorato albo: ubi uero desierint

uerint menses, & stabiles fuerint, lauetur. & aqua frigida perluta, cyceonē bibat non salsum. Cibus autem ne cōtingat, et cum uiro dormiat duobus aut tribus diebus. Quanto uero tempore purgatur, mercurialem in aqua coquens, ubi cocta fuerit exprimat, & alliu ac cuminū, & salem subterat, & oleū his ammisceat, & modico succo affuso feruefaciat. Atq; hoc edulium ante cibos edat. Allium item coctū ac assatum q̄ plurimum accipiat. Si uero mercurialis non fuerit tenera, tritam cū brasicā coquere oportet, & condire, & lenis erit. & si in uentre conceperit, sana euadet, & omnia ipsi iuxta ornatum procedent. Si os uterorum conclusum fuerit, fit forte uelut grossus. & si digito cōtigeris, deprehendes durum ac cōuolutum, & digitū non admittit. & menses occultantur, & geniturā non suscipit hoc tempore. & dolor habet imum uētre. & lumbos ac laterum mollitudinem. Quādoq; uero etiam sursum ascēdit & suffocat. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibēdum dare oportet, & multa calida lauare, & apponere ea quæ os molliunt. & specillum immittere ac aperire, itemq; digitum, & similiter leuigare. Quum autē molle fuerit, apponere ea quæ sanguinem purgant. & potiones exhibere, & experiri ut præbeas quodcunq; aliud libenter susceperit. Brasicam autem edat, & succum sorbeat. Si uteri conclusi fuerint, & menses non apparuerint, colocynthidem syluestrem, & filiphij semen, & cuminū Aethiopicum, & nitrū, & salem thebaicū, & adipem rhe-nalem, & farinā, & myrrhā, & resinam, omnia simul feruefacito, & trito mixta, & in glandē efformata apponito. Si grumosi facti fuerint uteri, os ipsorū uelut eruo plenum fit, & si contigeris, uidebis ita habere, & menses nō fiunt, neq; genitura intus manet. Quādiu sic habuerit, cyclaminū cortice detracto, & alium, & salem, & ficum, ac modicum mellis, terito, misceto, ac glandem formatō, & ad os uterorum apponito. Itemq; alia subdititia, quæ acria sunt ac corrodunt, & à quibus sanguis purgatur. & de potionibus dato eas quæ uteros purgant. Si uteri præter naturā hiarint, menses plures prodeūt & uiscoli, & frequenter. & genitura intus nō manet, & osculum hians est. & fieri nō potest ut genituram attrahat. & febris ac rigor corripit infernū uentrē, & lumbos. Morbus autem corripit ex fluxu sanguineo. fit & quum menses suppressi dērepente eruperint, Diætā itaq; ratio prius relata est. Oportet autē subdititijs curare, in principio quidē purgatorijs simulq; mollibus. Deinde leniter adstringētibz. & partes infra umbilicū per spōgias fouere, cū myrti aut rubi aqua, aut ex oleæ aut rosarum, aut cenanthes, aut uitis foliorū decocto. Si os uterorū hiarit amplius q̄ in mēsisbus solet, menses ita fiunt plures & deteriores omnes, & li-quidiores, & per longius tēpus. et genitura nō attingit, neq; manet, sed rursus exit. & si permāserit, osculum cōperies disparatum, & impotētia præ mēsisbus obtinet. & leuis est ac debilis uterus, & ulterius procedit. & uires laxantur. & febris debilis, ac rigor, et dolor habet imum uentrem, & laterum mollitudinem ac lumbos. patitur autem hæc maxime, si quid in ipsa corruptum computruerit ac compactum fuerit. Quædam uero etiam ex partu patiūtur. aliæ etiam aliter. Quum itaq; sic habuerit, pharmacum bibendum dare oportet, & facilius iudicabitur. & si dolor habuerit, tepefactoria adhibeto. & frigida lauato, ac in-termissione facta colluito. & ex potionibus dato quamcunq; maxime libenter admiserit, & suffito ea quæ resiccant. & polypos edat ac mercurialem. Si ue-

tatur. & si quis digito contingat, rursus peius habet. & pūgitur. & caput dolet ac sinciput. & caligo adest, & sudor frontis. Extremæ partes perfrigerantur ac tremunt. & sopor profundus aliquando occupat, & audire nō potest. Neq; reliquus sensus operatur. fastidium cibi est multum, & stomachus & uenter omnino nō continent cibum. & uociferatur, & exilit. & pectinem dolet, & inguinæ, & lumbos, & occultos pudendi locos. & cito moriūtur. Si uero dolores ad extremam debilitatem deduxerint, spōgijs calidis ex aqua & oleo expressis foueto. & subdititia mollia apponito, medullam cerui, adipem anserinū, & ceram albā, & oui luteū. Aut ceratum picatū cum resina subdito. Vino uero aut lacte caprino purgato, aut uolucris iusculo. Vinū autē ne bibat, & pīsanæ succū forbeat. Ad dolorem uterorum medicamentū infusile. Si dolor solum fuerit uehemens & uiolentus, caligo in uteris inest, & flatus non exit, sed isthic manet malum. Oportet igitur sic curare. Atriplicis syluestris semen, & betas simul trita ac tepesacta, in uteros infundito. Aliud dolores uterorū sedans. Vini suauissimi pari aqua temperati tres semicongios Atticos sumito. & sceniculi radices ac seminis eiusdem triētem. & olei rosacei heminā dimidiā. Hæc in ollam nouā immittito, & uinum superfundito, deinde foueto. Apponito autem & scillam, donec osculum molle factū fuerit & ad lationē idoneum ac apertum. Et quum in purgatione pustulæ circa osculum uteri exortæ fuerint, sic curato. Carnem bubulam, cum butyro aut adipe anserino & aniso tritis illine, & ipsam carnem in pudendum inde. Si ignis sacer habuerit uteros, intumescunt pedes, & mammæ, & corpus. & dolor ipsam corripit. & recta ceruice spiratio fit, & dolet laterum mollitudinē, & partes sub uētre, & pectora, & caput. & tremor occupat, & torpor manus, & inguina, & poplites tremūt. Quādoq; uero & in poplitibus liuidæ fiūt, & modico tempore melius habent ex hoc colore. Maxime uero mammæ attolluntur iuxta gentilitatis cognationē. Attamē nō ualde dolet, & febris ac rigor corripit. et facies rubicūda fit. & sitis fortis est. & hepar resiccatur. Hæc si prægnaanti acciderint, moritur, & nō poterit effugere. Si ignis sacer in uteris fiat, tumores fiūt liuidissimi, à pedibus exorsi usq; ad crura tota, & ad lumbos. Quanto uero tempus amplius progressum fuerit, etiam pectus percipit, & intumescit. & tota perfrigeratur. & febris habet magna, & rigor superuenit, & spiritus densus, & animi deliquium, & debilitas, & dolor totius corporis, & tristatur, & mente uariatur. Et affectio ascendit ex inferno uentre ad lumbos, & ad dorsum, & præcordia, & pectora, & collū, & caput, & stomachum, & mortua esse uidetur. Quum autē dolor solutus fuerit, torpor habet lumbos, & inguina, & crura. & in poplitibus liuores fiunt, & modico tēpore melius habere sibi uidetur, deinde rursus affligitur. & corpus pustulis completur, & rubores cōspicui ac manifesti faciem occupant. & guttur siccū est, & lingua aspera. Hic morbus si prægnaantē inuaserit, occidit. Sin minus, melam adhibere oportet, & lac asininum bibendum dare ac purgare. Si uero sic non soluatur, uentrem mollibus frigefactorijs perfrigerare, & subdititijs non molestis & leuibus paulatim purgare. Itemq; uomere. Ad hoc commodum est sambuci folia sumere cocta, cum origano, aut thymo, aut ruta. Si uero febris dimiserit, etiam uinū ac cibos dulces dato. Verūtamen pauca curātur. Aqua intercus si in uteris fiat, menses prodeunt arenosi & aquosi, & non ualde cruen-

ro non conclusi fuerint uteri uelut oportet, in aqua desideat in qua cocta sit myrtus, aut lentiscus, aut uitis aut oleæ folia, aut rosarum. Diæta uero sit quæ relata est in rubro fluxu. Optimum uero ipsi auxilium est sitis, frequētes uomitus, & prohibitiones balneorum. Quum uteri magis q̄p cōuenit fuerint aperti, & non conclusi, & purgatione opus habent, & collutionibus, & suffimētis. Si uero menses effloruerint, plures fiunt & deteriores, & liquidiores, & frequentes. Et genitura non manet intus, sed quando illi prodierint, perit. Et si os cōtingas digito, comperies ipsum leue. Et impotentia ipsam præ mēsisbus corripit. Et febris ac rigor obtinet. & dolor inum uentrē, & lumbos, & laterū mollitudinem corripit, maxime si quid in ipsa corruptum cōputruerit, itemq̄ ex partu, & aliter. Quum igitur sic habuerit, curare oportet, ubicūq̄ tandem dolor fuerit, uelut in superioribus scriptum est. Si uteri inflammati fuerint, menses obtorquentur, & ceruix multis tenuibus uenulis, ad telarum aranæ similitudinē uariatur. Et febris est acuta, & mentem percellens, & menses prauī ac pauci ipsi comparent. Et quum ieiuna fuerit, uomitus quidam ipsi superuenit. Quū uero quid comederit, reuomit. Et dolor occupat inum uentrē & lumbos. & animo linquitur. & per totū corpus perfrigeratur. Venter autē nunc durus, nunc mollis est, & incenditur & attollitur. & putat se in uentre habere. Quandoq̄ uero uētris moles uacua apparet, & alius aqua impletur, & umbilicus prominet, & osculum gracile fit. & derepente apparent menses stridentes, & pauci ac prauī. & attenuatur circa clauiculas & collum, & pedes intumescunt, & præsertim pedum extremitates. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendū dato, & subdititijs utatur, & fomentis uteri foueātur odoratis. Per diem uero plūbeis penicillis utatur. & ante appositionem, aqua calida nō mordenti colluito. & post appositionem hoc infuso colluito. Cnestri duas potiones in aquæ hemina coquito, & aquam excolato ac infundito, oleo narcissino aut anthino ammixto. Post hæc tres dies intermittito, deinde cum eo quod cū aceto paratur colluito. & ante cibum, mercurialem cum aliquātulo uino coquēs edat uelut brassicam, & succum sorbeat. Si uero permanferit, pharmaca bibēda dato à quibus aqua de uteris purgatur. Cibis autem utatur panibus, & oleribus coctis, flaccidis. Marinis autem potius q̄ carnibus. Aut extremis partibus coctis, flaccidis. & laboret q̄ plurimum, & ante & post cibum & q̄ minimum lauatur frigida. & à dulcibus ac pinguibus omnis generis arceatur. Diebus autem purgationū intermedijs, adiātum bibat ieiuna in uino diluto. At morbus hic lethalis est, & pauca effugere possunt, si non in uentre conceperint. In uterorum inflammatione menses obtorquentur, & quū ieiuna est uomit. Vbi uero comedit, dolor habet inum uentrem & lumbos. Et totus uenter modo durior, modo mollis fit, & non ualde confidet. Alius magna fit, & non purgatur, & sibi prægnās esse uidetur, & patitur quæcūq̄ prægnantes perpeti solent. Et si uentrem contigeris, leuem comperies tumorem uelut in utre. & quum partus tēpus esse uisum fuerit, uteri concidunt, & menses pauci ac deteriores fiunt. Huic pharmacum deorsum purgans bibendum dare oportet, & purgatoria apponere. Purgata uero sana euadit. Si inflammatus fuerit uterus, uellicatur. Si uero quid corruptum fuerit, ac uitiatū recruduerit, febris corripit acuta et magna, et horror durus, partes circa pudenda, & horribiliter afficitur, & mordetur, & concitatur

ti. Intumescit & uterus, & uenæ, & propinquissimæ partes. & prægnans fit, de inde suffocatur, & mammæ fluunt, & imus uenter durus est, ac intumescit, & omnis circūcirca locus, & dolet si quis ipsum attingat. Et febris ac stridor denuū corripit, & dolor uehemens laterū mollitudinē ac lumbos. & semen in somnis effundit, & prius habet. Hanc calida lauare oportet ac tepefacere. pharmacū autem bibendum dare, & cum debilibus fouere. & cyclamini obolos tres in linteo deliget ac apponat. Et cupressi succū in aqua madefaciat, ac cantharidas eadem terat, & modico tēpore apponat, & per multū temporis interuallū. Efficax est.

Subdititium. Cuminū chemæ mensura, uua passā alba. Aliud. Vrticæ semen, ari radix. Horū quodcūq; uoles leuiter apponito, ubi uero expurgaueris colluatur, ita ut detrahas & cū infuso pudenda colluas. & simul cū uiro dormiat. & si foetum ad partus tempus gestarit, tota expurgatur, & sana fit. Alia aqua intercus uterorū. Subcruentū quiddam fluit saniosum, & purgatur, & mordet ualde, & ulcerat pudenda uelut muria, & circūstas partes. & quocūq; destillarit ulcerat, & color est morbi arcuati. De cætero uero purgatur copia uelut in alijs fluxionibus. Morbus autē hic & debilior est, & aliquādo lethalis fit, si uteri egressi fuerint. Hāc curato uelut eam quæ à fluxu albo uexatur. & lac asinum bibendū dato, & extenuato, & prædictis pharmacis curato. Eclegma.

Quod delingitur ad aquam intercutē. Si aqua ex uteris fluat, sulphur & anseris adipē delingat. Si uentus in uteris fuerit, flatus exit, & stridet, & tota intumescit. & febris habet & ardor. & ad hæc ualde exilit præ dolore. & uirū non admittit, & ualde ægre fert coitū, & erigi nō potest, & uelut onus graue ipsi in uteris iacet, & caput dolet, & anxia est, & loqui non potest. Si uero dolor accesserit, clamat, & dolet omnia, & lumbos, & pubem, & sedem. & urina supprimitur, & uēter suffocatur. & mori cupit. & præcordia distenduntur. & stomachus mordetur. & os amarum est. & uomit acida & pura ac meraca. & frequēter ructat, & melius habet. Sin minus, intumescit. & si attigeris, renititur & dolet. Proinde uterū cum aqua mulsa, & aceto mulso ac oleo colluere oportet. Et cuminū aut anisum tritū, sumere, & lini folia terere, & uolucrinū adipem cū ouis in aqua infundere. Subdititijs uero ac potionibus utere, quæ ego describam. Desideat autē in oleo calido, & aromata in ipsum immittito, iunci odorati florem. Aut in aqua lauri, aut marina desideat. Optimū autem est mollibus infusis uentrem purgare, aut glandem apponere quemadmodū puero uēter soluitur, lanā illotam cū melle. Si uero antiquior fuerit, cepam in oleū aut mel tinctā apponito. Aut taurinū fel, aut nitrū cum melle. Aut mali punici acidi nucleū, cum melle & ordeacea farina. Si mola ipsa innascitur à crassā genitura intus retenta, thymbrā tritam in aceto & aqua, liquidam bibendam præbeto. Aut hyoscyami semen tritum. & cū muria ac silphij succo & aceto colluito. Aut si opus fuerit cū aqua. Optimū uero est aquam mulsam infundere, cum aqua lentium, aut erui, aut floris uiolæ. Si uero purgata fuerit à talibus quæ sunt uelut igne ambusta, myrtū coquito ac perluito, & myrrham ac netopū cum lana apponito. Si uentus in uteris fuerit, ac momorderit, & qua transit colorem facit, & præ ardore intumescit, & dolet, & uirū auersatur, & coitum ualde ægre fert. & tenditur ac intumescit pecten, & erigi non potest, nec dirigi. Quum sic inueneris, sato quod uentus & genitura in uteris est, & propterea nunc ægrotet. Accipe itaq;

mel, ceram, lini folia trita, & adipem uolucrinū, & hæc in uino odorato tepescita per clysterem in uteros infunde. Apponat aut folia lini. Aut semen lini terito, & in lanam inuoluito, & ad os uteri apponito. Sin minus, efficaciore utere. Linum & crocū, & lini folia, & adipem uolucrinū terito, & lacte muliebri diluta, rasura de tenuibus linteolis derafa excipito ac illigato, & ad uteri osculū apponito. Et si pinguitudo carnosior enascatur, quod cōsumat indito, & medio criter attenuato. Quæ enim ualde attenuātur, raræ fiunt & abortiūt. Si uero geniturā non suscipit uterus, sed dimittit, & calorē in seipso nō habet, instrumentum parare oportet, cui insidens uaporem intra uterū recipiat, ita ut uestes circūcirca ponātur. Suffire autē oportet casia, cinamomū, myrrham, singulis pari portione uino siræo siue sapa subactis, et super prunas cōiectis. Modice uero lauetur, & modice cibū sumat. Opitulatur & subdititiū huiusmodi. Myrrhā mollem cū melle efformato. Sit aut oblonga uelut glans. & sæpe hæc facitō uirium respectu habito. Profunt & pelecini in frumento nascētes, cū myrrha triti. Mel quoq; coquito, & cū tædis agitatū permisceto, & fabæ Aegyptiæ magnitudinem apponito. fel item taurinū, & rhoem rubrū pari portione. Conyza herba est similis apio crispo, nascitur aut prope mare in locis arenosis, odor uero eius ægre tolerari potest. Hanc cū melle & uino apponito. Aut bulbion, cōspicitur aut in tritico, maxime Aegypto, acre simile cumino Aethiopico: hoc & allium & nitrū simul apponito. Verū antea lauatur. Quum mulier caput dolet, &inciput ac collum, & uertigo præ oculis obuersatur, & timet, & tristis fuerit, & urinæ nigræ, & similia etiā per uterū proueniunt, & anxietas ac moeror ipsam tenuerit: atra bilis in uteris inest. Curetur autē sic. Cucumeris syluestris anniculi internam partē, fel tauri, florē æris, cū bacchare terito, & subdititiā formato. & pharmacū bibendum dato, ac lauato. Quū uero mulier uteros mordeatur, & dolet, lancinaturq; & bilem flauam mingit, & uterus hiarit, & oculi fuerint uelut morbo regio affectorū: scito quod bilis in uteris est. Quapropter optimum est expurgare totū corpus, & ipsos uteros subdititijs, quæ bilem educūt. Quū uero perfrigeratur uterus, & onus insitum esse uidetur, & color non est clarus, & cōpactus est uterus. Quum sic habuerit, purgare oportet cum eo quod pituitam ducit, & attenuare, ac frequēter uomere. Quum mulieri male oluerit ex ore, & gingiuæ nigræ fuerint ac prauæ, caput leporis, & mures tres seorsim exure, & ex duobus muribus uentrē exime, hepar autē & rhenes non. & in pila lapidea marmor, aut lapidem album tere ac cribra, deinde singulorum pares portiones miscere, ac dentes confricare oportet & locos in ore. & postea lanā succi dissimā fricet, & cū aqua colluat. Tingat autē lanam succidam in melle, & confricet dentes ac gingiuas, & internas ac externas partes. Terat item anisum, & anethi semen, & myrrham pondere duorū obolorum, atq; hæc in uini albi meraci hemina dimidia diluat, & cum his os colluat, & multo tempore in ore contineat. Hoc autē frequenter faciat, & ieiuna gargarisset, & post cibum. Optimū uero est modico cibo uti, & optima quoq; ingerere oportet. Hoc pharmacum dentes purgat, & bene olentes facit. Vocatur autem Indicum medicamentum.

Quum mulieri mamma aspera facta fuerit, stoebeis aut rubi fructum, cū aqua & oleo coquito, & cataplasmate facto mammas integito, & betæ folia superponito. Deinde ex linteo uelut pileum consuito, & magnitudine ut mam-

mam capiat, atq; sic mammam indito. Si uero suppuretur, secato, & ex lana succida linamētum siue penicillum immittito, & eadem superponito. Postea uero ex lenticula cocta cum polenta permixta, cataplasma adhibeto. Si in pudendo mulieris, aut intestino recto ascarides nascatur, uiticis semen aut folia, cū felis bubuli obolo permiscantur, & oleo cedrino subiguntur, & lana succida molissima excipiuntur. Induntur autem tertio quoq; die, per noctē ac diem. Postridie uero ubi amouit, calida lauetur, & allium coctum ac crudum edat. & Ascarides exeunt ac moriuntur. Muria uero etiam colluere oportet. Ad faciem ornandam. Hepar tauri terito cum oleo, illinito autē cum uino meraco. Fel autē fures exterit. Sed & ptisanæ succus similiter illustrat, & ouorū candidum, & farina lupinorum, & erui, cum ficis in cataplasmate adhibita. Et brasicæ radix ac semen. Hæc etiam lentigines tollunt. Itemq; alcyonium. Et si puluis faciem læserit, ceratum liquidum ex rosaceo præparatū sublinito, & aquam frigidā affundito. Et rugas leuigat hoc. In pila lapidea plumbaginē terito, & mēstrua ex situ aqua affusa pastillos formato, qui ubi reficcati fuerint, oleo dilutos rugosæ faciei illinito. At si capilli defluant, ladanū cum rosaceo aut anthino unguento terito, & cū uino illinat. Aut terrā cimoliā cum uino, aut rosaceo, aut omphacino, aut acacia. Si uero calua facta fuerit, cuminum impone, aut stercus columbinum, aut raphanum tritum. Aut cum cepa confricet, aut cum beta, aut urtica.

Cæterum solares appellatās maculas tollit, erui decoctum, betæ succus, ouorum candidum, ptisana, cucumeris syluestris radix sicca, cum uini fece trita, ac illita. Aut fici folia adhibita. Ite sesamio trito fricari, aut amygdalis amaris, & urtica semen, & allij cortex superligatus, & lepidium. Impetigines omnes extrahit. Acetum, manna thuris, pumex, sulphur cum aceto, nasturtium syluestre ustum & in cinerem redactum, uiperæ exuium, rumicis syluestris radix. Teratur autē cum aceto uinoso. Si uero pustulæ emergant, etiam spuma argenti utere. Potio ad fluxum rubrum cōmoda. Cornu cerui ustum, ad duplū crudæ ordeaceæ farinæ ammisceto, atq; hæc in uinum pramiū inspersa bibat, & sistitur. Alia. Adianti radicē tritam, & cicer torrefactum, & lentium farinam ex melle bibat, aut uelut potum exhibeto. Aut farinæ tritici recentis acetabulum, gummi albi dimidiā, mannæ thuris tertiam partem, & iunci odorati parum. Aut de pinu, uel cupresso aqua dilue, & bibendū præbe. Bibat autem in die. Aut cornu cerui comburito ac terito, & crudam ordeaceam farinam cum cedri baccis quinq;, & uinum austerum nigrū cum tædis ammisceto. Aut mali punici dulcis assati succū, cum uino nigro bibat. Aut cupressi baccas tres aut quatuor, & myrti baccas nigras, & simul, & ipsas per seipsas, ad robur corporis mulieris respectu habito. Cum uino uero potio fiat. Aut castorij obolum in uino nigro austero terat, ac bibat. Potio ad fluxum, & omnes morbos qui ab uteris fiunt. Pæoniæ semen & radices, cuminum Aethiopicum, & melanthium in uino albo exhibeto. Aut ferulæ rasā acetabulū, & porri succum, in uino albo diluto. Hoc etiā ex naribus manantē sanguinem sistit. Aut malū puni cū in uino nigro coquito, ac decorticato, et interna in uino nigro terito, & cū polentæ farina exhibeto. Aut linū, uel erysimū tostum, & oleæ folia uiridis, & radicem nigrā aspalathi, & peplum plenū, hæc trita in eodē uino diluto bibēda dato. Aut coagulū asininū & mali punici dulcis radicē, & gallā, omnia aquis

portionibus, & mali punici dulcis succū, cū uino bibat. Aut rumicis semen, cū gallæ parte externa circūrasa. Hæc simul terito, & postea cyceonē facito ac exhibeto. Si sanguis largus ex uteris fluat, uiticis folia cum uino nigro dato. Acer ba item omnia fluxū sistunt, uino nigro ammixto. Ad fluxum & dolorem.

Canchryos radicē in uino nigro bibat. Si uero amplior fuerit, terebinthi fructus tritus prodest. Oportet autem uino & aqua diluere ac bibere. Si fluxus fiat, cancrōs fluuiatiles in uino suffocato, & de tali uino cū aqua bibendū dato. Si uero adhuc feratur fluxus, promalon siue myricam torreto, et tritam in uino dato. Aut porri succū. Si uero multus defertur fluxus, muli stercus cōburito, terito, & cū uino dato. Si autē diuturnus fiat fluxus, spongia combusta auxiliatur. Terēda est autē spongia, & cū uino odorato exhibenda. Cataplasma ad fluxus. Allium & portulacam, & apiū, & loti ac cedri ramenta trita simul misceto. & cū aqua mulsa diluito, & cataplasma facito. Aut rubi, & rhamni, & oleæ folia trita simul misceto, & in aqua mulsa diluito, & cū polenta in cataplasmate adhibeto. Aut sambuci & myrti folia in cataplasmate adhibeto. Aut loti ramenta, & mori folia, ac rosæ folia, cū uua passa ad cataplasma redigito. Fomenta ad fluxus. Loliaceam farinā torrefactam in posca meraciore coquito, & linteo illitam pro fomēto adhibeto. Aut lentes torrefactas ac decorticatas in crassiorē instar alicæ farinā redigito, & in aqua coquito, ac similiter adhibeto. Aut eruum eodē modo. cōmoda est & saluia. Aut paleas ordeī in saluæ & hyperici decocto coquito, & imponito. Aut loti ramēta & cupressi, in uuæ passæ cremore cocta, linteo inducito, ac pro fomēto adhibeto. Aut oleæ folia, aut hederæ, aut myrti, in aqua coquito, & cū his etiam ordeī paleas coquito. Aut furfures triticeos in aromatum aqua coquito. Aut furfures triticeos in uuæ passæ cremore coquito. Aut uiolæ albæ semen, uel radices coquito, & ad aquam decocti furfures triticeos inijcito, ac foueto. Aut cum eo decocto furfures triticeos subigat, & panē faciat, eoq; calido lanæ inuoluto foueatur. Aut in serpilli decoctum furfures triticeos inijcito, & eodē modo foueto. Sed & fomentū adhibendum est cū spongijs calidis, & cū mollibus lanis, si dolore uexetur. & cum uasis testaceis aqua infusa, & cū uescicis oleo calido plenis. Collutiones ad fluxus.

Myrti folia, & lauri, & hederæ in aqua coquito, & cum hac tepida colluito.

Sambuci & lentisci folia in aqua coquito, & cum excolata leuiter tepida colluito. Aut cenanthen, & cyperum, & uuas passas in aqua mulsa coquito, ac colluito. Aut cum scenogræci aqua, aut rubi decocto, aut oleæ uiridis, aut cupressi, aut serpilli, aut mali punicæ, aut radices uiolæ albæ, aut lentisci decocto leuiter tepido colluito. Aut medicamentū ex butyro, et resina, & adipe anserino infundito. Aut id quod ex medulla & adipe suillo præparatur. Suffitus ad fluxus.

Ordeum tostum prunis inspersum suffito. Aut cerui cornu cum oliuis immaturis. Aut rhoem rubrū, & polentā torrefactam, cum oleo & uino duplo. Aut paleas ordeī, & stercus bubulum similiter. Aut loti ramēta, aut rhoem, aut cupressum siccam, cum uino nigro austero suffito. Aut galbanū, aut mannā thuris, aut resinam uino subactam. Aut capræ cornu, & gallam. & sistetur fluxus. Alij suffitus. Effodere oportet scrobem, & uinaceorū uuæ duarū chœnicum Atticarū mensuram torrefacere, & de cinere in scrobem mittere, & uinū odoratū irrorare. Mulier autē circūinsidens, ac seipsam cōtegens ac cōuoluens,

suffitum admittit. Aut sordes pilorū circa sedem caprae siccas tundito, & torreto, atq; cū ordeo fracto, & oleo subactas suffito prunis insperfas. Aut ordeipaleas iisdem prunis inijecto. Aut cupressi ramenta ungueto subacta suffito. Aut cicutam, aut myrrham, aut thus, ungueto affuso suffito. Aut bitumen & ordeipaleas similiter. Aut cupressi radicē rosaceo oleo perfusam suffito. Aut ad calamum, iuncum odoratū, cyperum, apij semen, anisum, oleo rosaceo affuso suffito. Similiter aut & resinā, prunis inijecto. Et cinamomū, & myrrham, cū rubi folijs, aut rosarū folijs, aut menta, addito modico croco & styrace. Hæc omnia si mul terito ac suffito, oboli Attici pōdere, in cinere sarmentorū uitis, aut in stercore bubulo instar acetabuli formato. Sit autē ignis ex sarmentis uitis. Mulierē uero imponito prius, ut ne odorē percipiat. Nam si odorem senserit, melius est non suffire. Subdititiā ad rubrū fluxum. Myrrha & bulbion cū melle tritum, optimum præstant subdititiū. Aut rosæ in aqua coctæ, quas sanè cū rosaceo ungueto tritas, ac lanæ inuolutas apponito. Aut loti florem in aqua coquitoto, & deinde cū rosaceo ungueto terito, & in lana ad uteri os adhibeto. Aut cyperum, & irim, & anisum, singula pari portione, cū rosaceo ungueto trita, intro in uteri osculū detrudito. Aut myrti nigrae folia, in uino albo terito, & pini corticem ammisceto, & similiter facito. Aut cupressi fructū, & thus, pari portione simul ambo in ungueto terito, & apponito. Si resiccare fluxū opus fuerit, calamintham in uino nigro coquito, et linteo inuolutā apponito. Aut hyoscyami folia, & cicutā simul coquito. Similiter porrū, & maluā: & ceram ac anseris adipem ammisceto. Deinde tepida ad pudenda subdito. Aut uinū meracum, cum resina & malicorio cocto terito, ac similiter apponito. Aut cnicum cū uino tritum subdito. Aut loti ramēta similiter. Aut lētisci folia. Aut rhoem melle cocto ammixto apponito. Si uero nō cesset, Suisinum, aut blitum herbā, quæ uelut lingua est, in lana ad subdititiū efformato. Ad fluxum aquæ subdititiū & infusile. Si mulieri aqua fluat ex pudendis, resinā siccā, & myricæ folia, & lini semen, in uino terito, & uolucrinū adipem ammisceto, & per clysterem in pudenda infundito. Aut farinae purissimæ chemam, siue cōchæ testam cauiorem, aut amyllum in lana ad uteri stomachū apponat. Aliud similiter infusile. Quum aqua ex pudendo fluxerit, myricæ folia, & thus, & resinam, cum anserino adipe terito, & per clysterē in pudenda infundito. Si pecten præ fluxu aquoso doleat, uiticis semen cū melle terito, & in cataplasmate pectini probe adhibeto. Si fluxus sanguinolentus, aut albus, aut qualiscūq; fuerit, Sulphur & mandragorā in uino meraco terito, & lana excepta apponito. Et supina dormiat, & imnota maneat. Aut malicoriū siccū in uino pramnio terito, ac bibendum dato. Ad fluxū album potus. Hederæ albæ semē, & pini corticem, in uino austero exhibeto. Aut cornu cerui usti partē unam, crudæ ordeaceæ farinae partes duas, & cedri baccas quinq; aqua terat ac bibat. Quum ab uteris strangulatur, castoriū & conyzam in uino, & seorsim, & simul utranq; bibat. Aut bituminis obolos tres. Aut phocæ adipis quantū duobus digitis apprehēdi potest. Aut radicis pæoniæ dimidiā potionem, in uino odorato bibendam dato. Quū uero uteri suffocarint, & simul tulsierint, sandaraches obolū, & sulphuris uiui tantūdem, & amygdalas amaras depurgatas tres aut quatuor, misceto & in uino odorato exhibeto. Si uero adheferint uteri, ordeū terito, & unā cum

paleis, & cornu cerui, oleo subigito, & suffito. Quum aut sursum ascēderint, & cor ac stomachus prematur, & substiterint, myrrhā aut resinā, aut netopū, aut castoriū, aut silphij succū bibendū dato. Quū uterus strangularit, spiritus autem aceruatim sursum cōmotus fuerit, & grauitas incubuerit, & mens perculsa fuerit, & loqui nō potuerit, & perfrigeratio adest, ac spiritus offendens, & oculi obscurantur: caput q̄ citissime radito, & per fasciā supra umbilicū, si opus fuerit, deligatā detrudito. Dato aut castoriū, & conyzā, & rutā aquā, cuminū Aethiopicū, raphani semē, sulphur, myrrhā. Ad nares graueolētiā, ad uteros benevolentia adhibeto. Si uero sustinuerit, etiā grani cniđij internā partē, albā illam, melle subactā ac mixtā, naribus illinito. Aut schinū scillae speciē quae mordeat. Quū aut dolor habuerit ac suffocatur, maluae radicē, aut acetū mulsum, aut foeniculi corticē, aut crethmū in aqua bibendū dato. Optimū uero est eructare, & sedentē collocare, & sternutationē facere, aut ueratrū naribus admouere. Si uero sub septo trāsuerſo ac prae cordijs uteri sedere uideatur, derepēte uoce destituitur, & praecordia dura fiūt, & strāgulatur, & dentes cōserit, & uocata non audit. Oportet igitur sub nares suffiri lanā accēsā, bitumē in ignē coniectū, & castoriū, & sulphur, & picē. Inguina uero & femora unguēto odoratissimo intus inūgere. Aut stellas marinas nigras, & brasiā uino odorato misceat, ac bibat. Aut myrrhā obolos tres, coriādri parū, resinam, paeoniā radicē, cuminū Aethiopicū, hęc in uino albo & aqua trita, aut cū aqua mullā diluta, leuiter tepida bibat. Auxiliatur & peucedanū, aristolochia, cepae lachryma, panaces in uino aut aqua leuiter tepida datū. Vteros ad locū suum reducit, crotonis radix pota, aut cuminū Aethiopicū, aut apiū, aut foeniculi & anisi semen, aut piper, aut myrrha, et papaueris succus potus. Si cor strangulatur, ab utero reprimitur, & spiritus habet, et anhelatio: Viticis, & paeoniā semē in uino bibere oportet. Aut abrotonū, & panaces, & ammoniacum. Aut rutam, aut somnificū papaueris succū. Rursus igitur si similiter habet, melanthiū terito, & melle subigito, & uelut glandulam efformato, ac pennae circūdato, & apponito. Aut philistion similiter subdito. Aut telephiū, aut anemones folia trita, in lintēū indito, & modica myrrha ammixta apponito. Si in lumbos uteri incubuerint, suffocatio uero caput nō contigerit, polypos coctos edat, & uinum nigrū odoratum meracū q̄ plurimum bibat. Quū uero uelut ad uiscera conuersi strangularint, uinum cedrinū, & uinum Aethiopicū bibat. & calida lauetur. & odoratis fomentis utatur. Si uento inflati fuerint uteri, aromata omnia in unguentū immittuntur, & laurus, & myrtus, & saluia, & cedri ac cupressi ramenta. Haec cōtundito, & trita cribrato, & in uinū odoratum inspergito, & oleum rosaceum superfundito. Quum uero transmoti uteri preſſerint, ordeum unā cū paleis, & myricam, & cerui cornu, uino subigito, ac suffito. Quū assistētes strāgularint, funiculū lucernariū accendito, & prae naribus extinguito, quo fuligo & nidor ipsas ingrediantur. & picem, & castoriū, & peucedanū, & myrrhā, unguento irino diluito, & subacta apponat. Bibat autē resinam oleo dilutā. Si ualde strangularint, Aut testudinis iuxta mare natae obolos tres, in uini albi hemina, uel cyathis tribus tritos, bibendos dato. Aut cedro in lucernam infuso, lucernam accendito, & ubi extincta fuerit, ad nares adhibeto. Aut coenum foetidissimum similiter. Aut lanam incensā sub nares mulieris suffito.

Aut bituminis parū tritum in uino albo bibat. Aut erysimi conchæ testam, & castoriū in uino albo bibenda dato, & lauato. Si uero etiam tussiat, sandarachæ obolū, sulphuris uini obolos duos, amygdalas amaras depurgatas tres aut quatuor, & castorij obolum, cum uino odorato misceto, & bibenda dato. Si uero strangularint uteri, & strangulatio cor contigerit, & os conclusum fuerit, acetum calidum sorbendum dato, & os paxillo aut radio aperito, & uinū in odorū similiter exhibeto, & cum aceto mulso. Si uero ualde strangularint, & uoce destituta fuerit, cepam in uino tepido tritā, in nares instillato, & excitato. Si uero usq; ad hepar ascenderint, & suffocatur, uoce destituitur, & nihil uidet, & dentes conserit, & dura sit, & nihil sentit, & frequēter respirat, & nō audit. Hæc sub præcordijs manibus comprehensam frequēter inungito. Et dentibus cum paxillo diductis, uinum meracū tepidum infundito, si nihil prohibuerit. Et per unq; statim melius habet. Si ad inguina incūbant ac innitantur, caprini stercore pilulas, & leporis pilos, phocæ adipe subigito ac suffito. Aut hederæ fructum, aut folia, aut corticem siccato, et quercus folia ac resinā ammisceto, oleoq; subigito ac suffito. Aut coaguli phocæ pellem cōterito, & spongiā ac muscū, cum phocæ adipe ammisceto ac suffito. Aut stercoris caprini pilulas, & phocæ pulmonem, ac cedri ramenta suffito. Sed & bubulum stercus suffito. Aut cornuum bouis ramenta, & bitumen. Aut spinæ Aegyptiæ fructū, & cedri ramenta, & myrti folia sicca. Hæc molli unguēto subacta suffito. Multa uero aromata in unguētum inijcito. Aut uinacea tusa trita, & cedri baccas, & resinā pineam, simul mixta & passo cocto subacta suffito. Fomenta à quibus discedunt.

Stercus bubulum cōtusum, acetū dimidiā mēsurā, & decocti erui ex aqua marina aut dulci similiter dimidiā adiecta, pro fomēto adhibeto. foueto aut leuiter & lenticulæ decoctū bibendū dato, ac reuomendū. Et farinā sorbendā, & insuper uinū. Postridie uero granū cnidiū dato. Sed & quod urinā ciet. Ciceris partes duas tritas, uuæ passæ optimę tertiā partē, affuso aquæ cōgio coquito, deinde excolatā aquam per noctē sub dio exponito, & postridie bibendā dato. et de cætero saluā, & lini semē, & polentā, bis per diē in uini diluti heminis quatuor dato. Aut olei heminas dimidiās tres, foliorū sambuci manus plenæ mēsurā, hæc coquito, & cū calidis foueto. aut testis calidis immixtis fomentū facito, muliere in fella collocata, & uestimētis cooperta. Aut sambuci folia eum myrto coquito, & in excolata aqua paleas ordeï coquito, & fomentū facito, si calorē sufferre poterit. Aut acetum, oleum, mel, aquā. Hæc permixta ac ualde seruefacta, in uelicā infundito. Aut pini corticē, et rhois folia in aquā inijcito, & fortiter coquito, & in excolatā aquā etiā ordeï paleas immittito ac coquito, & affuso oleo foueto. Aut loti & cupressi ramēta, aqua et oleo affuso, probe coquito, ac foueto. Aut cū aromatis unguentū infundito, & gallā inijcito, & rhamni corticē, & polentā triticeā cū aqua. Si uero uteri extra prominuerint, & dependēt uelut scrotū: myrti baccas, loti ramēta, rubi & oleę folia, simul coquito, & leuiter tepide foueto. Aut cū uino unā cū illis & cū graueolētibus, similiter. Externas aut partes cū oui candido oblinito. Quū uero perfrigerātur, & liuidæ factæ fuerint, cū aqua calida. Mollitoria uteri. Adipem ouillū, ouorū uitellū, mel, oleū rosaceū sumito, & cū his farinā subigito, & ad lentū ignē tepefacito, & quod destillat lana exceptū emollito ac apponito. Aut adipē ouillū aromatis conditū, et

nitrum rubrū, anferis adipem, & oleum rosaceum colliquata & lana excepta apponat. Aut anferis adipem, ouillum adipē, ceram albam, netopū, rosaceum oleum. Hæc q̄ optime permisceto, & tenuibus linteis excipito, & statim ubi lota est, apponat tepida osculo uterorū. Aut cerui medullam, & anferis adipē, in rosaceo oleo liquefaciat, & molli lana excepta subdat. Mollia subdititia, quæ aequam ducūt, & mucos, & pelliculas, & non exulcerant. Myrrham q̄ optimā, & salis granū, & picem aromatis imbutā, terito & apponito. Aliud. Grana cnidia decorticata triginta, Indicum quod Persæ piper uocāt, & in hoc inest rotundū, quod appellant myrtidanū, cū lacte muliebri simul terito, & melle diluito. Deinde lana molli ac pura excepta, & pennæ obuoluta subdito, & per diem finito. Si uero fortius facere uoles, modicū myrrhæ ammisceto, tertiā uidelicet partem, siue trientē, & lanam mollem purā semisuccidam. Ex uteris educūt, & osculū molliūt, narcissus, cuminū, myrrha, thus, absinthiū, cyperis. Hæc ipsa per se ipsa, et cū oleo rosaceo, aut albo, aut Aegyptio. Apponantur autē ubi lota est. Aliud quod saniem cruentā educere potest. Cū tēdis misceto myrrhā, salem, fel taurinum, cuminū, mel, & in lana subdito. Aut cumini folia similiter in uino trita. Aut silphij succum ad ficum ammisceto, et glandulam inde factā subdito. Idem facit & mori radix cū melle. & postea rosaceo illinito. Efficax est & alij caput integrū, & nitrū rubrum, & ficus pinguis, pari portione. misceto autem & gallam paruā, & glandē facito, eamq̄ liquore aliquo tinctam subdito. Et postea lota cerui adipem in lana subditū habeat. Aliud quod cruenta omnia magis prioribus ducere potest, & mollire. Piper, elaterium, & lac muliebre misceto, & cū his terito etiam mel, & oleum albū, & cerui adipē, & linteo excepta subdat. Vehemēter uero ducit omnigena hoc. fici pingue, elaterij portiones duas, nitrum rubrum quantū elaterij, mellis parum, cū linteo aut cū lana glandem facito. Aliud. Netopum, fel tauri, nitrū, cyclaminū, gallam, cū melle terat. Postea uero lota adipem cerui subditū habeat. Aut pulegiū & fel tauri tritum pennæ obducāt, & in oleum Aegyptium tinctū subdat. Aut cyclaminū magnitudine tali cum æris flore. Aut anemones caput cum farina tritū pennæ obducito, & in oleo albo tingito. Aliud quod omnia ducit. Cucumeris syluestris oblōgi internam partē, exempto semine, cū lacte terito, & myrrhā puram unā cum ipsis, adiectoq̄ modico melle, & oleo Aegyptio, molli lana excipito. Aut cucumeris syluestris internā partem siccato, & melle affuso terito, ac glandē formatō. Postq̄ autē lota fuerit, adipē subdat. Aut elaterij portiones tres cum aqua.

Mollitoria. Oui candidū, farinā, mel, ceram albam. hæc simul tepesfacito, & quod destillat lana exceptū apponito. Aut adipē anferis, ceram albam, resinam; unguentū rosaceum, cerui medullā liquefacito. Aut ouillū uel caprinū adipem; oui candidū, unguentum rosaceum. Ex his aut glandē facito, aut lana excipito.

Fomēta per quæ uteri purgātur, si duri fuerint. Vinū suauissimū pari aquā temperare oportet, triū semicongiorū Atticorū mēsurā & fœniculi radices ac seminis eiusdē quadrātem, & olei rosacei heminā dimidiā, in ollam mittere, cuius operculū foramē habet, & uinū superfundere, et arūdine indita fomentū facere, & postea scillā apponere. Si dolores repētini irruerint, et animi deliquia affuerint, rosarū folia, cinamomū, myrrhā purā, netopū, papaueris succū, hæc in papillos drachmales efformato, & super frusto amphoræ candēti ponito, & pro

suffi

suffimento utitor. Aut styracis modicū in oleum mittito, ac utitor uelut priore. Omnia quæ in unguenta iniiciuntur tundito ac cribrato, & super stercus bubulum mittito, itemq; styracē, & netopum, rosaceū oleum q̄ optimum, & Aegyptium albū affundito, & post purgationes suffito. Aut lauri & myrti folia tundito, & cyperi fructū, cum unguento albo Aegypto subigito, addito etiā netopo, & super stercore bubulo suffito. Auxiliatur & manna thuris, & cupressiamenta, & cyperi radix tusa. Sed & iuncū odoratum aromaticū, & cardamomū, & iridem tundito ac cribrato, atq; hæc omnia misceto, & rosaceū oleum ac netopum ipsis affundito, & utitor in crassiore tritici farina. Aut resinā in recens formato fictili suffito, castorio, aut aliquo ex aromatis adiecto. Caput uero oleo rosaceo tingito, in aures autē myrteum, aut melinū oleum infundito. Et cicer album, & uuas passas coquito, ac decoctū bibendum dato, & in aqua calida desideat. Et oliuas albas priusquā oleum remittunt lancinato ac siccato, & in uino odorato terito, & acetabulum Atticum præbeto. Aut cantharidū uentres, aut adiantum, & nitrū rubrū Aegyptium, & ferulæ radicem, & apij semen tritū, hæc exhibeto. Si uero urinæ stillicidium corripiat, in aqua desideat, & uinū dulce bibat. Si maxime strangulatur in uterorū dolore, uinum suauissimū pari aqua temperatū, trium semicongiorū Atticorū mensura, & foeniculi radices, & seminis eiusdem trientē, & olei rosacei heminam dimidiā. Hæc in nouam olam mititto, & uino superfuso foueto. Et scillam apponat, donec osculū molle & amplū esse dixerit, & si exulceratū fuerit, ac pustulę ubiq; in ipsis fuerint, præstat adipe anserino cū thure curare. Ad uterorum dolorem. Peucedanū, aristolochiam, panaces, hæc simul in uino dulci misceto, & tepefacta bibēda dato. Et peplum album sorbeat, & urticæ semen. Aliud fomentū siue suffimentum. Si dolor habuerit, malicoriū punici dulcis, loti ramēta oleæ folia sicca tusa. Hęc cū oleo subigere oportet, & super ignitū stercus bubulum mittere. Aut galbanum, myrrhā, thus, oleum albū Aegyptiū, super uitis farmēta. Aliud fomentū fortius ex bitumine. Bitumen, radicē xanthij, pilos leporis, rutā, coriandrum siccū, hæc omnia terito, & formatas inde placētulas siue pastillos suffito. Aut ad picem, & sandarachā tusalā tritā, cupressi ramēta ammisceto, & unguento affuso placētulas formato, & in ignē missas suffito. Aut cornu capra in ramēta confectū oleo subigito, & in ignē missum suffito. Aut effossa scrobe, uinacea uuæ torreto, & cinerē in scrobē mittito, & uino odorato insperso, mulieri circūinsidenti fomentū facito. Sint autem uinaceorum choenices duæ, atq; hæc ipsa quàm maxime sicca. Si uero uterus doleat usq; ad uesicam, porri semen cum aqua tritum bibat, Aut cyclamini radicem, in uino albo ieiunæ bibendam dato, & calida lauetur, & subcalidam ieiuna bibat, & tepefactoria apponat. Aut alij caput integrū, & nitrū tostum, & cuminum, trita ac melle subacta apponito, & calida lauetur, & subcalidam bibat. Ad omnem uterorū morbum curandū. Lini scissi unā cū stipula pugillū tenuiter tufum, in uino albo q̄ suauissimo per noctē madefacito, deinde excolatū in ollula tepefacito, & in eo lanā mollissimā tinctā apponito, & uicissim priore detracta aliam subdito. Opitulatur autem & crocus, & myrrha, & ponticæ nuces, alba & pura lana excepta, & cum adipe anserino ac unguento irino apposita. Si dolor uexarit ex subditijs purgatam, myrrhæ acetabulum, thuris tantundem, melanthium, cyperum

cyperum, fefeli, anifum, apij semen, netopū, mel, resinam, adipem anferinū, oui candidum, unguentū Aegyptiū, singula paribus portionibus in uino albo dulci, duarum heminarū mensura terito, & tepidis infusis colluito. Si dolor uehemens habuerit, cantharides, cyperus, calamus, iuncus odoratus, & iris profunt. Hac in uino nigro coquito, ac utitor. Alia collutio. Si dolor & urinæ stillicidiū uexarit, porri succum, sambuci fructū, fefeli, anifum, thus, myrrhā, uinum, in succum redigito, misceto, ac infundito. Aut myrrhæ acetabulū, thuris tantundē, melanthij & cyperi tantundē, fefeli, anifum, apij semen, netopū, mel, resinam, anferis adipem, oui candidū, unguentū Aegyptiū, singula paribus portionibus in uino albo dulci diluito, ac infundito. Aut mercurialis aquā decoctā cum myrrha, thure, netopō. Aut saluiam, & hypericū, in aqua coquito ac infundito. Aut apij semen, anifum, melanthiū, fefeli, myrrham, casia fructū, in uino coquito ac colluito. Alia collutio. Si dolor fuerit uehemēs post purgationem. Sambuci fructum, & lauri baccas, in uino nigro coquito ac colluito. Aut sambucū in aqua coquito, et aquā excolato, et uino dulci affuso colluito. Si post collutionē infusam dolor oboriat, aromata quæ in unguēta inijciuntur coquito, & de aqua duas heminas excolato, misceto autem adipem anferis, & oleū rosacū, & tepida infundito. Amplius autē infusum nulli, ut semel dicam, cōpetit q̄ duarum heminarū. Aut mercurialem in aqua coquito, & ad succū, myrrham ammisceto, aut thus, & netopū pari mensura, & tepidum infundito. Si uero uteros doleat cyclamini radicē in uino albo ieiunæ bibendam dato. Et calida lauetur. & subcalidam bibat. Si ex feruido & superficiali ulcere pudēda fuerint exulcerata, myrti baccis in uino coctis colluat. & melilotū apponat. Et mali punici dulcis putamina in uino coquito, & myrrhā ac resinam simul mixta uino diluito, & intinctū in his linteū subdito. Et si urinæ stillicidium corripiat, fomentū adhibeto, & pectinem illinito. Desideat autē in decocto rosarū, aut rubi, aut myrti, aut oleæ, aut pampinorū uitis, aut iuniperorū baccarū, aut saluiæ. Si uentus in utero obortus fuerit, & dolor uehemens, & flatus nō exit, cuminum apponat. Et saluiam ac cyperū tusa madefacito per noctē, & mane excolato, & lucidum ac clarum cremorē in uas infundito, et crassiorē tritici farinā cum uino albo ammisceto, & silphij succū magnitudine fabæ, cū farina coquito, & crudius sorbenda dato. Si columella in pudendis nascatur, dolor obstat. Et doloris quidem medela est apij semen. Columellam uero resecare oportet. Si ulcera in pudendis oboriantur, & pruritus corripiat, oleæ folia, & heræ, & rubi, & mali punici dulcis trita, & uino ueteri diluta, cum recenti carne apponito, ita ut folia carni oblinas. Et habeat subditā per totam noctem. Mane uero eximens, & myrtum in uino coquens, cum uino pudenda colluat.

Notha ad finem primi libri De morbis muliebribus adiecta.

Ad tussim pueri. Thapsiam in polenta edendam dato. Aliud. Ex ouo affato uitellum acceptum terito, & sesamū album tostum, et salem, cū melle delingēda dato. Ad aluū pueri soluendam. Lanam illotā melle tinctam infundito. Si uero antiquior fuerit puer, ceparū internas partes tritas cū melle indito.

Si lac nō fuerit. Recentis tritici farinā elotam, melle ac oleo ammixto, tepidam sorbendā dato. Ad anhelitū pueri facit. Thus in uino dulci, & illuuies.

Purga

Purgatorium. Glandulas facito ex mellis hemina, anisi acetabulo, bituminis drachmis duabus, felle bouis, myrrhæ drachmis tribus, elaterij potiōe. Hæc in uase æneo coquito, & anferis adipem ammisceto. & ubi uti uoles, glandulis anferino aut ouillo adipe illinito. Iana autem utere molli. Vomitus soluit.

Ocymi succus in uino albo. Aliud. Farinæ tritici recentis exsuccata qua. Aut de malis punicis dulcibus & acidis succum exprimito, & deinde mel ammisceto. Corrosiuum sic paratur. Veratrum nigrum, sandaracham, squamam æris, singula paribus portionibus seorsim terito. Quum autem trita fuerint, ad unam partē, duplam calcem ammisceto, & cedrine subacta illinito.

Aliud corrosiuū pharmacū sic paratur. Florem æris pure cōbustum donec ruber fiat, terito ac utitor. Pharmacū nigrum. Squamā æris, & florē æris, seorsim ambo terito. Vbi uero contriueris, ita misceto. Duas aut tres pharmaci species facito. Vnam fortissimā quæ habet ad squamam, tertiam floris partē. Alteram, quæ quartam. Tertiam, quæ quintam. Hoc pharmacū ad omnia conueniens est. Illitio ad anginam. Roris marini semen, staphis sylvestris, absinthium, elaterium, mel.

In doloribus podagricis. Abscessus nitro trito aqua diluto, cataplasmatibus modo integito, & tribus diebus non lauato. Vbi uero laueris, rursus nitrum rubrum crudū cum modico melle terito, & hoc semper utitor. Inflammata illine portulaca cum farinæ massa, & lactucæ rubræ drachma, ex aqua dissoluta. Medicamenta occultatoria. Aes ustum, ærugo, fel capræ, myrrha, hæc dissoluuntur, & omnia simul trita uino albo diluuntur, postea in arundinem coniecta, sicca in usum ueniant. Puluillus.

Misy præparatum in pila terito, & spumæ argenti chrysitidis appellatæ cinerē lotum ammisceto, Sint autē cineris partes tres, misyos una. At misy in maza comburito uitans ne diffuat. Nam dum torretur liquefit, ubi uero probe tostum fuerit, puniceum fit. Alius puluillus. Cerusa eodem modo cum misy tosto miscetur, uelut chrysitidis cinis. Alius puluillus fortior priore. Spodium cyprium ex fuligine lota, & cerusa, & misy torrefactum. Sunt autem duæ partes cerusæ de spodio, una uero misyos. In hæc anemonæ folia cōtusa exprimito, & in æris rubri uase ad solem exponito, & ut nihil illabatur cōtegito. Quum uero crassa facta fuerint, pastillos formato, deinde siccato, & siccatos q̄ maxime fieri potest comburito, & postea perfrigeratos leuiter terito, & de spodio ex fuligine loto parem portionem misceto, deinde netopon instillato, & parum terito, deinde melle diluito, & resiccata in uase æreo asseruato, ac utitor. Puluillus mollis.

Spodium cyprium, chalcitis non lota leuiter trita, flos æris. Hæc paribus portionibus misceto ac terito. Alius. Spodium cyprium, chalcitis leuiter trita, & cinis chrysitidis illotus. Hæc inter se terito. Alius. Spodium lotū, chrystitis, & æris flos, paribus partibus trita. Alius. Vuæ acerbæ succus, & spodium cyprium. Vuam immaturam in uigore constitutā fume, & succum per linteū, in uas æris rubri exprime, & aceti albi acerrimi tertiam partem ammiscet, atq; sic in sole coque, & quinquies in die agita ac cōturba. Et ubi crassus factus fuerit succus, spodium cyprium tritum adijce ac permisce, ita ut ubi sex aut septem dies in sole positus steterit, ad heminam succi Atticam, spodium drachmas octo immittas. Si uero acrius efficere medicamentū uoles, minus de spodio: sin mollius, plus. Postea uero siccato hæc, donec in pastillos formari possunt.

possunt. Deinde domi siccato, sursum in fenum suspenſa, atq; hoc tandiu donec testacea fiant, ut inter terendū non adhæreāt. postea sic utere. Reponito autem in loco humiditatē nullam habente. Alius. Spodium, chalcitidem, aceto albo subigito. deinde factos inde pastillos siccato, & ubi oculū sublinire uoles, q̄ optime terito, & uino ueteri dulci concalefacito. Ad argemon oculi ulcus. Populi nigræ lachrymam, lac muliebre, misce ac utere. Si oculus lachrymetur, & dolor uexet. Mali punici dulcis succum expressum in aëro uase coquito, ut niger fiat instar picis. Si uero æstas fuerit, ad solem exponito, deinde liquidum sublinito. Si uero dulci lachryma fluat oculus, quum uua fuerit alba, ualde matura, & gracilis in uite, decerptam exprimito ac excolato, deinde in sole siccato, & ubi siccus factus fuerit succus deradito, & æruginis dimidium obolum attici ponderis ammisceto. Deinde hoc sublinito. Puluillus inasperilis. Plumbum & spodium, æquis partibus, myrrhæ decimam partem, succi papaueris parum, uinum uetus, arida tere ac utere. Alius. Accipitur scoria siue recrementū plumbi, & spodij tertia pars, & cerusæ tertia, & chartæ uisæ tertia, & myrrhæ pars decima. Si pilos ex corpore extirpare uoles, uitis lachrymā cum oleo illinito. Si uero etiam circa oculum tollere uelis, euellito & illinito, & cum tenui cuticula discedet, et locus rubicundus ac boni coloris erit.

Ad intestinorum leuitatem. Lentes ac triticum recens duarū chœnicum mensura aqua macerato, & ubi mollia facta fuerint, in pila aut mortario fortiter conterito. deinde aquæ heminis sex affundito, ac fortiter cōmoueto. & ubi purgamēta discesserint, in ollam infundito, & modico melle affuso coquito, & ualde cocta torrefacito, ac edenda præbeto. Si uero sitierit, uinū uetustissimum bibat, atq; hoc utatur donec sanus fiat. Ad grauedinem. Si quis grauedinem habeat, myrrham tritam ammixto melle, linteo excipiat, & nares cōfricat.

Infusum sedis pituitam ducens. Thapsiæ potionem, & uuas passas quadraginta; aut grani cnidij, aut cnestri potionem sumito; & mellis dimidiam heminam, ac olei tantundem ammisceto, & aqua marina diluito, in qua fursures cocti sunt, aut ptisana, donec pinguis facta fuerit. Aut adipē betæ succo ammisceto, & nitri drachmas decem. Aut salis heminam plenam aquæ marinæ ammisceto. Si uero bilem ducere uoles, succi silphij potionē, elaterij drachmam unam & dimidiam, colocynthidis drachmā, terito & iisdem quibus prius diluito. Si autem uehementius ducere uelis, cucumeris syluestris internam partem quarta drachmæ parte in dimidia aquæ hemina macerato, & per sedem infundito, & si in egressu mordeat, ptisanæ succum postea infundito. Aliud. In lacte asinino cocto, aut in betæ succi heminis tribus, internā cucumeris syluestris partem macerato, & sale, mel, ac oleum ammisceto. & postea ptisanæ succum infundito. Aliud. Colocynthidis drachmam terito, & in lacte asinino macerato, eademq; misceto. Aliud. Cucumeris syluestris interioris drachmam, elaterij potionem, salis quantum tribus digitis apprehendi potest, mel, oleum, aqua marina diluito. At si sterqus educere uoles, nullum pharmacū bibito, sed alij utere. Infusum ad dysenteriam. Punici dulcis malicorium in uino ad dimidias coquito, & olei, quartam heminæ partem ammisceto, & thuris quartam drachmæ partem. Aliud. Vnguenti rosacei dimidia hemina, ptisanæ succus, aqua marina cocta. Aliud. Veratri potiones duas tritas, in aquæ di

midia hemina diluito, & olei tantundem affundito. Potio. Mala cotonea diffecato, & in aqua macerato, & ubi aqua odorem acceperit, bibendam dato. Alia. Ptisanæ farinam in congiū aquæ missam, coquito donec pinguis fiat. Alia. Mala concisa siccata, & fauū mellis, in aqua macerato, ac simul terito, & ubi subdulcis facta fuerit excolato, & apij folia iniicito. Alia. Vuam passam albam, & calaminthen, & fauum mellis, in aquam mittito ac terito, donec aqua subdulcis fiat.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE STERILIBVS, IANO CORNARI

rio Medico Phifico interprete.



DE his quidem quæ accidunt mulieribus in singulis affectionibus, prius dictum est. Nunc autem ostendam ob quas causas mulieres omnino steriles fiunt, & cur non pariūt antequam sanentur. Causam uero hanc esse dico, si os uterorū omnino auersum fuerit à pudendo, non concipiunt. Non enim suscipiunt uteri genituram, sed statim foras exit. contingit autem hoc etiam si parū distortum fuerit os uterorū præter naturā à pudendo. Et si omnino cōclusum fuerit os uterorum, neq; sic suscipiūt. Neq; si recens cōclusum fuerit magis q̄ oportet. Singula uero relata manifesta sunt. Etenim si omnino auersum fuerit, aut cōclusum, mēses non prodeūt omnino, aut prodeūt uiolenter cū morbo, si sanguis coegerit uteros pro more conuerti. Et si purgata fuerit mulier, aliquādo os uterorū ipsi à pudēdo auertitur. Si uero parū distortū, aut recens conclusum fuerit, prodeunt quidē menses, prodeunt autē uiolenter, & paulatim per multos dies. Hæc autem omnia manifesta fiunt, si sic habent, contingenti mulieri. & si horū aliquid fuerit, curata mulier fecunda fit. Quandoq; uero etiam sua sponte. Hæc autē singula cur fiant, dicetur. Dictum autem est & in muliebribus morbis. Si leues fuerint uteri, Cōtingit autem hoc & ex natura quibusdā, & si ulcera innata magnas cicatrices reliquerint: Si leues igitur uteri fuerint, mulier in uentre non cōcipit. Nam genituram suscipiunt quidem uteri, si non alia aliqua causa obstiterit, non autem concipiunt, sed semen foras emittunt. Hoc autem maxime clarum fit contingenti, & si interrogetur an aliquando ulcera in uteros ipsi oborta fuerint. Menses uero sano quidē modo prodeunt in hoc morbo. Verū talis plerunq; incurabilis est, & hæc causa est, ut in uentre ne concipiat. Si ulcus in uteris factum fuerit ab affectione quadam ex relatis, & nō statim sanatum, sed impurum factum fuerit, permanet ulcus ad multum tempus, quemadmodū & id quod in aure existit, & male olet mulier, & quandoq; sanies male olens ipsi ex pudendo fluit, & quā diu sanē ulcus habuerit, in uentre non concipit. Non enim concipiunt uteri genituram. Huic autem menses sano modo procedunt. Verum ex cōtactu, & in interrogatione, maxime clarum fit de relatis. Curata uero fecunda fit, exigua tamen spes est. Si quid ex mensibus in uteris remanens scissuram ac segmen tum habeat, quod circa osculum aut paulo penitius cale scat, et rursus frigescat, neq; sic in uentre concipit. Impedimētum enim hoc incumbens, geniturā quō oportet

oportet transire nō permittit. Et si quidem in principio curetur, sanescit, & fecunda fit. Si uerō tempus accesserit, sterilis manet. Manifesta est autem affectio maxime ad contactū. Durum enim quiddam intus est. Et si magis q̄ cōuenit uteri hiarint, neq; sic prāgnans fit. Non enim concipiunt uteri semen genitale. Sed & hoc ad contactum clarum fiet, & menses aceruatim prodeūt, & per paucos dies. Fit autē & natura hęc affectio, & à relatis morbis. Et si quidē à natura fuerit, incurabilis est morbus: Sin minus, nō sani prodeunt menses, utpote muliere non existente sana, neq; sic prāgnās fit. Non enim cōpingitur semen à sanguine morbofo. Sed sanguis qui à corpore morbosus descendit, geniturā serosam facit. Serosa uero facta genitura, tēpore modico aut multo, foras progreditur unā cum sanie. Atq; hoc ex corpore mulieris, & ex mēsis manifestum fit. Prodebunt enim ipsi mēses uelut dictū est, siue biliosa, siue pituitosa, siue aquosa fuerit. At breui curata fecunda fit: Sin minus, non. Si uerō mulieri menses non prodeant omnino, aut ab omnibus relatis, etiam sic nō concipit. Veng enim sanguine plenae, geniturā non suscipiūt, & in uteris aliquid inueterati sanguinis inesse necesse est, quod geniturā nutrirī prohibet. Si uerō pauciores q̄ debeant menses prodeant, neq; sic prāgnās fit, causae uero in priore morbo relatae sunt, fit autē hoc manifestū ex interrogatione. & si quidem à natura pauci menses prodeunt, incurabilis est. Si uero ab affectione aliqua ex relatis, breui curata, fecunda erit. Et si plures q̄ debent menses mulieri prodeāt, neq; sic in uentre cōcipit. Vteri enim sanguine euacuato, geniturā non concipiūt, prae debilitate. Si uero etiam cōceperint, sanguis multus derepente in uteros mulieris descendens, geniturā suffocat. Manifestū autem & hoc est ex mēsis qui multi prodibūt. Et si quidem natura mulier multos menses demittit, sterilis fit. Si uero non natura, sed ab aliqua ex relatis affectione, breui curata fecunda erit.

Et si os uterorū ex pudendo exciderit, neq; sic concipit, Nam os durum fit, & geniturā non suscipit, & intumescit, & propterea in totū infœcunda fit. Manifesta est autē hęc affectio, ex eo quod cōtingit. Et si nō prodeant menses uelut debent, sed deorsum processerint in sedem, neq; sic in uentre concipit. Manifestum est enim, quod os uterorū à pudēdo auersum est, aut cōclusum. & si quidem ad sedem auersum fuerit osculū, aut cōclusum, curata fecunda fit. Vtrunq; uero ex interrogatione ac responsione manifestū fit. Si enim menses semper sic prodierint, clarū est quod his morbus causa est. Atq; tot ac talia mulieribus cōtingunt, propter quae nō pariuut antequā curētur, & propter quae omnino steriles fiunt. Quare mirari mulieres nō oportet, quādo coeunt quidē, non autem saepe pariunt. Experimenta per quae indicatur an prāgnans fiet mulier. Si cognoscere uoles an mulier prāgnās fiet, Butyrū & lac mulieris masculū alēntis bibendū dato, & si eructauerit, cōcipiet, Sin minus, non. Aliud. Neropū modicū lana exceptū subdat, & postea mane, an quod subditū est per os oleat, consideret. & si quidem oleat, concipiet, Sin minus, non. Aliud. Cuicunq; mulieri à subdititijs nō ualde fortibus, dolores ad articulos processerint, & stridor dentium ipsam habuerit, & uertigine affecta fuerit, & oscitarit. Huic maior spes est ut prāgnans fiat, q̄ ei quae nihil horum patitur. Aliud. Caput alij integrum depurgatū ac derafum, ad uterū apponat, & postridie uideat an per os oleat, & si oluerit, concipiet, Sin minus, non. Aliud. Si cognoscere uoles

an mulier cōcipiet, anifum in aqua tenuissime tritū bibat, ac dormiat. & si quidem pruritus ipsam circa umbilicū corripuerit, cōcipiet. Sin minus, non. Prægnantem mulierem si nō ex alio cognoscas, ex hoc cognoscas. Oculi uidentur distracti ac cauiores, & candidū in oculis, albedinis naturam non habet, sed liuidius apparet. Quæ in uētre habent, maculā solarem in facie habēt, & postq̃ conceperunt, uinū odio habent, & cibos auersantur, & oris uētris morfu, ac salua plenæ fiunt. Mel & anifum tenuissime terito, deinde in aqua diluito, ac exhibeto, & dormire finito. & si quidē tormen ipsi fiat circa umbilicū, prægnās est. Sin minus, non est. Post hæc autē omnia, farinam bibat, & mel, & origanū, in uino & oleo. Quæcūq̃ in utero habentes, maculam solarem in facie habent, foemellam gestāt. Quæ uero bene coloratæ permanēt, masculum plerūq̃ gestant. Si papillæ sursum cōuersæ fuerint, masculū gestat. Si deorsum, foemellam. Accipe de lacte, & farinam misce, & pastillum forma, & ad lentum ignem assa. Et si quidē comburatur, marē gestat. Si uero diffundatur, foemellā. Aut idem hoc lac super folia emulctum cōtemplare. Et si quidem condensatur, masculum gestat. Si uero diffusum fuerit, foemellam. Curationes ad conceptionem experimēto cognitæ. Si quā liberorū generationē expetat, quæ sine liberis sit, & si quā iam antea prægnās fuerit, nuncaut non pariat. Quum sto machus uteri durus fuerit totus, aut summa parte, & cōclusus ac nō rectus fuerit, sed ad alteram coxam auersus, aut ad intestinū rectum inclinatus, aut in seipsum contractus, aut labium stomachi sibi ipsi incubuerit. Vnde cūq̃ igitur aut asper fuerit, aut callosus, sit autē durus & à cōclusionē, & à callositate. His menses non apparent, aut multo pauciores aut peiores q̃ oportet apparent, & per longius tempus, Et menses quidem iuxta sanitatem corporis & uterorū, exitum inueniūt. Itemq̃ iuxta naturalem ac iustum modum, & à calore & humiditate mensium, & stomacho non ualde læso. At genituram rursus non suscipit, propter læsionem, quæcūq̃ tandem impedierit susceptionē à stomacho non bene habente. Huic post fomentū toto corpori adhibitū, pharmacum bibendū dare oportet, & corporis purgationem primum facere, siue sursum & deorsum, siue deorsum solum. Et si quidē sursum purgans pharmacū dederis, ante purgationem fomentum ne adhibeto, sed postea. At fomēto prius facto, pharmacū deorsum purgans bibendū dato. Si uero sursum purgante nō opus habere uideatur, præmisso fomento, deorsum purgans bibendum dato. Quum autem corpus probe habere uisum fuerit, postea fomentū adhibeto, ita ut uteros frequenter insidere facias, in fomēto quod maxime cōferre uisum fuerit. Inijcito autē in fomēta, cupressi ramenta, & lauri folia cōtusa. & multa calida sepe lauato. Quū uero recens lota & fota fuerit, uteri osculū dilatato, simulq̃ dirigito si opus fuerit, cū specillo stanneo aut plūbeo, à tenui auspicatus. Deinde cū crassiore si admiserit, donec probe habere uidetur. Tīngito autē specillum in mollitorio diluito, quodcūq̃ liquidum factū conferre uidebitur. Specilla uero retro lata facito. Deinde lignis longis adaptato, ac sic utitor. At uero hoc tempore, in uino albo dulci q̃ suauissimo, tædam pinguissimā in tenuia frusta concisam coquens bibat, & apij semen cōtusum, & cumini Aethiopici semen, & thus q̃ optimum. De hoc ieiuna bibat moderata copia, per quot dies bene habere uisa fuerit, et edat catulos pingues percoctos, & polypū in uino dulcissimo coctū, & de iusca

lo bibat, & brassicā cōctam, & uinū album insuper bibat, & ne coenet. & his in die lauetur. A cibis uero hoc tēpore absteineat. Postea uero si processerit secundum stomachū, & purgationē aliquam foras ostenderit, de potione aliquid bibat, per unum atq; alterum diem, & à specillorum usu cesset. & conetur uteros purgare subdititijs, & medicamentis. Cuiuscūq; uero, stomacho recto, & molli & sano, & probe habente, & in debito loco sito, menses omnino nō apparuerint, aut pauciores, & per amplius tempus, & non sani: morbum perscrutatus quem uteri habēt, et an corpus etiā aliquid conferat, comperies causā à quā prāgnans non fit, & quū quidem sic habet, curationē facito adhibens id quod conuenit, si admiserit, curationē incipiens à fortibus, prout tempestiuū esse uidebitur, desinens autē in molliora, donec uterus probe purgatus esse uisus fuerit, & stomachus consistere recte habens in sufficiente loco situs. Si uero à pharmaco & à potione non processerit, neq; ubi ipsum bibit moderatō tempore, à potione quidem hac cesset. Quum uero probe habuerit, per usum specillorum os stomachi mollito, & ut hiet facito, ad uiam subditio prāstandā, tum à medicamentis suffumigabilibus, tum à mollitorijs. Postquam autem probe mollitum ac suffitum esse uidebitur, apposis phar macis uteri purgationē facito, donec probe habere uisum fuerit, incipiens à mollibus ad fortiora, desinens autem rursus in mollia odorata. pleraq; uero ex fortibus medicamentis stomachum exulcerant, & prohibent ne rectus cōsistat, & probe habeat ad geniturā susceptionē, & uterum siccum faciunt. Si uero mulier à pinguedine uteros sibi laesos esse putet ad cōceptionē, attenuato ipsam q̄ maxime, & ad reliqua gracilem facito. Vernū autē tempus optimū est ad conceptū. At uir nō sit ebrius, neq; uinū albū bibat, sed fortius ac meracius, & cibos edat fortissimos. & calida ne lauetur. & robustus sit ac sanus, & à cibis absteineat qui ad rem nō conducunt. Quum aut mulier purgata uisa fuerit, & stomachus uteri recte habere, lauetur, & caput fricetur, & nihil omnino illinatur. Postea linteo inodoro loto capillis circumdato, reticulo loto nihil olente deliget, linteo primū supposito. Deinde ubi galbanū ad ignem aut solem calefactū, ac probe mollitū subdit, quiescat. Postea mane exoluto reticulo ac linteo, caput suū alicui olfaciendum exhibeat. & si probe fuerit purgata, olet. Sin minus, non olet. Verū hæc à cibis abstiniens faciat. Si uero nō fecundæ apposueris, nunq; olet, neq; purgata, neq; aliās. & si prāgnāti apposueris, neq; sic olebit. Quæ uero sepe concipit, & fecūda est ac sana, ei si apposueris, etiā si nō purgaris, olebit ipsius uertex, alibi uero non. Quum uero cognoueris ipsam recte habere, ad uirum accedere iubeto. & mulier quidem à cibis absteineat. Vir autē non sit ebrius. Verū frigidus lotus, & cibis paucis cōducentibus pastus. & si mulier geniturā se cōcepisse cognouerit, primo tempore non amplius ad uirū accedat, sed quiescat. Cognoscet autem si quidem uir dixerit se emisisse, Mulier autē prae siccitate ignorat. Si uero uterus rursus reddiderit geniturā eadem die, humidus erit, & si humidus factus fuerit, rursus cū uiro misceatur, donec concipiat. Alia curatio. Vbi fomentū toti corpori adhibueris, medicamentū bibendum dato sursum ac deorsum purgans. Deinde lacte asinino postea in potu exhibito, uteros per fistulam duobus diebus foueto, cū urina muliebri putrida, nitro iniecto. Tertia uero die, cū urina bubula, Quarta aut & quinta, foeniculi semen tritū, & sambuci

folia ac lauri, & cupressi ramenta. Hęc coquito aqua affusa. Oportet aut post formentū, multa calida lotā, apponere ad ipē aromatis imbutū, statim à fornēto, & ad noctem. Postea uero hoc pręparato. Myrrham stacten, butyrū, adipē anserinum, medullā cerui, resinā, & netopū. Horū singulorū æquales portiones permixtas ac liquefactas apponat in lana Milesia molli q̄ optima. Deinde plūbeis penicillis quinq̄, ad octo digitorum longitudinē fabricatis, uterū aperito. Primus ex his sit tenuis, alter crassior, & reliqui alius alio crassior sit. Aperiantur aut per dies quinq̄, & semper lota apponat, & ex lūbis deliget, ut ne excidāt, & semper ulterius intrudat. Postremū uero q̄ penitissime. Postq̄ aut aperueris, purgatoriū appone, cātharidas tritas quinq̄, et colocynthidis lōgē internā spōgiosam partē, & myrrham. Hęc melle cocto subacta, & in glandē efformata, lana inuoluito, excepta summa parte. Deinde in oleū suauissimū tingito ac apponito. Vtere aut & hoc purgatorio, felle tauri, et flore gris affato, et nitro, & myrrha modico melle dilutis, ac linteo tenui deligatis, & linteo superne pharmaco obducto apponito. Vtere & buprestis cū myrrha. & elaterio cū melle cocto, & cantharidibus cū elaterio & myrrha. Postq̄ aut purgata fuerit, postridie ubi lauit uterū colluito. Cuminū Aethiopicū tritum, & melanthiū, & resinā, & oleū, & mel, ac uinū dulce. Hęc mixta & tepesacta infundito. Postq̄ uero infuderis, erectā obambulare iubeto, quo collutio infusa cōcutiatur. Subdito aut crocū, et myrrhā, et thus, singula paribus portionibus sicca linteo illigata, ita ut anserinū adipē ammisceas ac linteo oblinas. Atq̄ hęc apponito per dies septē. Octauo uero suffitū facito, cum myrrha, bitumine, & ordeo, oleo odorato subactis: his lento igni iniectis, ac suffito per fistulā factō. Postq̄ aut suffitum feceris, postridie castoris testē terito, uino albo affuso, & ipsum melle oblitū, & lanæ inuolutū, apponat in noctē. Mane uero eo sublato ac emollito, ad uirū accedat, & ubi condormiūt quiescat, & si nō prima uice cōceperit, eodē rursus appposito, uirum adeat. Ceterū hunc medicationis ductū incipere oportet ubi mēses prodierint. Desinētibus aut mensibus, cōceptorio medicamēto appposito cōdormire. Priore uero tēpore neq̄ mulier ad uirū accedat, neq̄ uir ad mulierem. Quum aut mulier nō conceperit, prius cōcipere solita, uteri uero uiri geniturā in seipso suscipiūt: penitus necesse est mulierē, serosam hanc facere. Quādoq̄ enim in uteris pus innascitur, pus aut in uteris à tuberculis fit. Et sanē ob hoc genitura uiri, quādo cū uiro coit, uteros nō contingit, quo uidelicet ipsa uiri genitura compingatur. Nam pus ipsam dissipat, ut ne afferatur. Mortificat enim pus, & putrefacit geniturā, proinde & pus ex uteris expurgare oportet. et tuberculū in utero sedare, quo de cætero ne impediāt geniturā compingi ac afferri. Festinare itaq̄ oportet ad expurgandū, priusq̄ pus in uteris in callū cōcrescat. & uteros colluere hoc modo. Lac equinū coctum exacte colato, ut tenuissimū & purissimū euadat, & hoc infundito, clysteris instrumēto idoneo factō. Et summa quidē clysteris pars leuis sit, argētea uelut specilli, & statim modico intercedente spacio foramē perforetur. Sint autem & alia foramina, nō magna, sed angusta, hinc atq̄ hinc, ex trāsuerso clysteris æquali interstitio distātia, et clysteris quidē apex solidus sit. Reliquū uero totū cauum sit, uelut fistula. Alligare aut oportet uesticā suis scēminā, atq̄ hāc probe radere ac cōfricare. postq̄ aut alligaris, lacin uesticā infundito, foramina uero tenui linteo obstruito, ne lac affluat. Vbi uero obturaueris

obturaueris, uesicā deligato, & ipsi mulieri dato, cui collutionē infundere paras. Illa uero exēptis obturamentis, in uterū indat. Ipsa em̄ sciet ubi indere oportet. Postea aut̄ tu uesicā manu premīto, quādiu pus foras effluxerit. Manifestū aut̄ hoc erit, ubi nō amplius pus simul cū lacte exierit, palām em̄ clarū est, quod nō amplius inest. Atq; tūc cessare oportet. & post hoc ubi paululū recreata fuerit, ad modicū tēpus, cucurbitę siccę fundū refecato, itēq; apicis suinmā partē, quo perforata sit, ita ut simīlē efficias in reliquis, excepto apice, uelut clysterē: crassitudine uero paulo tenuior sit q̄ uirile pudendū. Hāc cucurbitā sic formatā uasi circūponito, uase uino impleto. Sit aut̄ uinū odorū fragrantissimum, & siccissimum ac uetustissimū, deinde lapidē nigrū pellucidū in uinū inijcito, deinde cucurbitā ex aere albo factā circūponito, & mulier circūinsideat, pudendū circum cucurbitę glandē adhibens qualiter oportet, quo cucurbita uera super aëream emineat, duorū digitorū intra pudendū mensura. Quū mulier geniturā suscipere nō poterit, necesse est mēbranam superexcreuisse in osculo uterorū. Oportet igitur æruginē æris, & fel tauri, & serpētis adipē, simul miscere, deinde phar maco hoc lanā imbuiere, & in bysinū linteū inuoluere, linteo melle sublito, & facere substitutū magnitudine maximæ oliuæ, & apponere ad pudendū per totam noctē. Supina aut̄ iaceat. & in die auferat, & calida aqua lauetur q̄ plurima ex myrti decocto. Apponat autē & postea singulis noctibus. & deinde cū uiro coeat. Alia curatio. Marrubij foliorū manus plenæ mensurā, in uas Atticū inijcito, & aquæ potabilis heminas Atticas quatuor affundito, & ubi per nouē dies præmacerauit, per alios nouē dies ieiuna, lota, duos cyathos de hoc bibat, pari mēsurā passi albi ammīxta. Quum aut̄ tertiam diē potando trāsegerit, fomentū adhibeatur, cicutæ folijs in ignē missis, per nouē dies. & post fomētum lauetur. Atq; sic rursus de hoc bibat. Quū uero per triduū fomentū adhibuerit, marrubiū ipsum tritū in die apponat per triduū. & mercurialē tritam in melle Attico bis in die. præmaceretur autē in uini albi cōgio, hippomarathri & fœnici culi radix, et tædæ pinguissimæ ramuli, & rubiæ quarta pars, & fœniculi semē, & uerbenacæ radices multæ. præmacerēturq; diebus non minus q̄ nouē. & postea loto capite, in balneo heminā per diē de meri cremore bibat. et postea redinata seipsam cōcalefaciat. Atq; hinc post potū, alternis diebus id quod ex felle paratur, per diē ad dies sex apponat. Quū autē iam uirū accedere uult probe purgata, hyoscyami folia ac radices in aqua feruefaciat, & ex his q̄ calidissimis per triduū ad noctem fomētum adhibeat, & lota uirum accedat. post hoc uero fomētum, etiā cerui pudendū siccum sufficit: & de hoc in uinū album dilutū de radēs, per triduū bibendū, & quū partus dolor institerit, bibēdum dato. Nam hoc partū accelerat. Alia curatio. Fel tauri feruefacito, & alumē melium, & cornu cerui ustum terito, & permixtis ac in glādulas efformatis utitor. Aliud curatiū. Cuminū in uino nigro coctū tritū, in glandē efformato, & ad noctē apponito, post hæc uero fecem uini albi, tenuissimā uidelicet fecis partē, comburito, & cōbustum in penna auferas, linteōq; illigatā, ad noctē subdas. & porū coctū edat. post hoc tragiū terat, & melle dilutū in noctē apparet. & deinde tragiij fructū tritū, in uino albo dilutū, tædæ ramētis adiectis bibēdum dato. & postea organū alternis suffito, et sic ad uirū accedat. Alia curatio ad mulierē parere nequeuntē. Si mulierē parere nequeuntē, puerperā facere uelis, in mēsis.

considerare oportet; an biliosa sit, siue pituitosa. cognosces autem utrū horum magis sit, si ubi mēses prodeunt, arenam tenuem & siccam in sole substraueris, & de sanguine infuderis, & si quidē biliosa fuerit, sanguis in arenā siccatus, luteus fit. Si uero pituitosa, uelut mucus. Vtrū igitur horū fuerit, uentrem purgabis, siue sursum siue deorsum opus habere uidetur. Deinde intermissis tribus diebus, uteros purgato. & si humidius uterorū osculum fuerit, acria apponito, quo cōmorsum & inflammatū os uterorū durū euadat. Si uero mulier interinis partibus non febrat, neq; prae uteris concipiat, neq; uiro misceri queat, sed dormiat, & cibū auerfetur, uinū melle ammixto pudēdis infundatur, et myrrhā suffito. In sedē uero glandes indat. & uinum adipe anserino ammixto, in pudēdum infundat. Deinde etiā oleum pari melle mixtū infundat. Si mulieri uteri gracilescāt, & osculū ipsorū exasperetur, & cōcludatur, & mēses ipsi nō appareant, neq; cōcipiat. Sed febris corripit lenta, & dolores incidunt ei in lūbos, & imū uentrē. Morbus autē hic maxime fit, quū quid in ipsa fuerit corruptū. fit autē & ex partu. Hanc calida lauare oportet, & fouere. Quū autē lota ac fota fuerit, os uterorū dilatare cū specillo. & myrrhā tritam cū pari netopo apponat. Aut unguentū, aut oleū rosaceū in linteo. & plumbū instar glandis formatū apponat, felle bubulo illitū. Et in quatuor diebus infecundas cognosces. & fomentū adhibeto, & pharmacū bibendū dato. Si uero prae naturā mulier fuerit crasse facta, in uentre nō concipit. Nam omentū crassum ac multū incumbens, os uterorū deprimit, & geniturā non suscipiunt. Hanc attenuare oportet, & pharmacum deorsum purgās bibendū dare. & ad uteros apponere quod purgat, ac flatum inducit. Si os uterorū durū fiat, aut ceruix, ex digiti cōtactu cognoscet. Itemq; si ad coxam auersi uteri fuerint. Quū sic habuerit, nihil acre adhibeto. Si enim os uterorū exulceraueris, quū inflammatū fuerit, omnino periculū est ne sterilis fiat. Verū apponito quē nō mordent, à quibus pituita purgatur. Quū menses mulieri prodierint, & praeierint, primū quidem caput purgare oportet. Deinde ueratū exhibere, siue semel siue bis opus fuerit. Postea uero fomentum adhibere, fomētatorio ex cucurbita cōstructo, sic autē facto. Aquam marinam in uas infundito, & porro immisso, fistulam cucurbitis imponito, & cū luto q̄ optimo illinito, ut ne transpiret. Deinde per sellam erectam quadrangularem, transmittito ipsam fistulam, quo duorū digitorū mensura emineat ultra sectionē. deinde prunas subaccendito. & in desessu caueat, & quū desidet, & quū surgit, ut ne cōburatur. Sed desideat dum adhuc frigidum est fomētatorium, & surgat dum fistula est perfrigerata. In hoc uero fomento plurimam diē partem cōsumat, & in huiusmodi fomenti usu ad quinque dies perseueret. Per decē uero dies pro porro, aliū in fomentū immittito. & huius fasciculū cōtusum in aquā marinam inijcito. Postea uero reliquis diebus, ipsa sola aqua marina foueatur, ut ultra ne procedat per totam curationē. Ceterū postremū fomētum quū à curatione desistere uoles sic facito. Catulū recentissimū refecato, & aromatū omnis generis odoratissimorū ac siccissimorū species cōtundito, et interaneis catuli exēptis, aromata indito ac expleto. Subiectis autē lignis, & catulo in uas misso uinū odoratissimū affundito, & fomentū per fistulā facito. & si uires permittūt, totā diē cū hoc fomento ipsam foueto, ac interrogato, an odor aromatū per os olere uideatur. nō enim exiguū hoc signū est ei quae curatur, ad cōceptionē.

Subditis

Subdititijs uero utere, croci quantū uoles, & myrrhæ magnitudinē fabarum duarum, & salem sufficiētem permisce illorū respectū, & fellis taurini fabarum duarum magnitudinē. Si uero mitiore uti uoles, minus fellis ammiscce: Si fortior, plus. Hæc trita melle instillato tere, donec id quod teritur fiat tale, ut digito efformare possis. Quāto aut magis triueris, tāto siccior, & uiscosior, ac melius erit. Vbi aut efformaris crassius q̃ glandē, & summā partē acutā, & medium crassius, & deinde cōsequenter quo ad uterū apponatur, in hoc ipsum surculos origani duos leuigatos infigito. Sint aut longitudinis sex digitorū. Deinde lana mollissima surculos inuoluito, & filo tenui superne deligato, & præmineat filum quatuor digitorū longitudine præ surculis infixis, postq̃ aut perfudit & purā seipsam fecit, ipsum ad uteri os apponat, linteū sub coxas subiiciēs, & per noctem appositū sinat. Erit autem ipsi purgatio aquosa. postridie ubi surrexit, laetetur, & ea diē super fomentū ne insideat. Quū autem fomētum adhibuerit, & de fomēto surrexerit, ceratū sit q̃ optimū prima illa diē factū, & in ipsum cerui maxime medullam cōmisceto: Sin minus, adipē anserinum, & quū a fomēto surrexerit, quotidie ubi se perfudit, & purā circa uētre m fecit, cerato uterū inungat. Aut reliqua quidem omnia superioribus ammisceto, excepto felle, organū uero leuissime tritū in glandem permisce, & apponat. Aliud. Reliqua quidem omnia ad eundem modū facta, uerum pro origano absinthiū ammisceto, & eodem modo efformata apponat. Aliud. Ex tritico melanthium deligato, & probe terito, mellēq̃ ammixto in pilæ formam redactū apponat. Verum febres inducit, & articulū tumefacit, & uehemēter mordax hoc est. Aliud. Mel, & ueratrū nigrum tenuē non multū, coquito. Vehementer enim mordax euadet. Sed & hoc febrificum est. Eodem modo mel coctū, & elaterij potionē coquito, & factā inde glandē subdendam dato, & hoc febrificū est. Ducit autē & sanguinē. Quædā uero ex his etiam pelliculās. Si uero uoles, etiā draconium derade (Est aut lene) & hoc cū melle cocto aut crudo, in pilæ figurā uelut magnā gallam efforma. Cæterū conare ut physicus sis, ad hominis habitū ac robur respiciēs. Ex his enim nullus est qui nō omnia ad aimulsim faciat. Proinde ex his ipsis coniecturā faciēs, totius corporis, & capitis purgationibus, medicamentis, & uteri fomentis, ac apposititijs uti conare. Hæc autem elemēta tibi sunt. Verū medela horū unicuiq̃ particularis est. Et ubi horū quid nō feceris, semper in fomēto perseueret. Hoc em̃ est quod mollit, & ducit serofos ac sanios humores. Postq̃ uero ab hac curatione desueris, his quæ secundū naturam sunt desinētibus, sanguinem de manu detrahēre oportet. si quidē fortis fuerit, de ambobus brachijs. si uero debiliior, de altero sufficit. At uero diēta qua in his curationibus uti oportet, alibi à me indicata est. Si uero suffire uoles, lolīū ex tritico deligito, & molito, factōq̃ igne sarmēticio lentissimo, in catinū mittito, & mulierē super sellam impositā, mollibus linteis instratā, sedere iubeto, cruribus q̃ maxime diductis. Atq̃ hæc curatio si quidē sufficiēs tibi fiat in quatuor mē-sibus, bene est: Sin minus, ad hæc præcipe etiā ut ad uirū ne accedat, eo tēpore quo curatur. Inter curandū autē, tædam in aqua macerato, & ieiunē cyathū bibendū dato, & penicillū stanneum assidue subdiū habeat, & cotyledonas siue umbilicos ueneris, unā cū sale & cumīno, in aqua coquito, & tepidā sorbendā exhibeto. Et latæ quidē cotyledones foemellas gignere uidentur: paruę uero &

conclusæ

conclusæ, masculos. Conceptoriū summum. Melanthium mulieri in uino nigro acerbo bibendum dato. Mulierem iuueniculam fluxus ruber infestabat, & medicamentis datis, & capite purgato, ac uena secta, nihil melius habebat. Videbatur autem hæc causa ipsi esse, ut ne conciperet. Dabam itaq; ipsi uinum album, in quo aspalathi radices efferbuerant, mane & ante cœnam. & fluxus sedatus est, & nō longē post cōcepit, & peperit masculum. Erat autē corpore coloris candicantis, & probe carnosæ. De mola. Molæ porro cōceptus causa hæc est, Quū multi menses, modicum & morbosum semen conceperint, neq; foetus rectus fit, & uenter plenus est uelut prægnantis. Nihil autē in uentre mouetur, neq; lac in mammis generatur. Mammæ autē turgidæ sunt. Hæc itaq; & ad duos annos, sæpe etiam tres sic habet. Et si quidem una caro fiat, mulier perit. Neq; enim fieri potest ut superstes maneat. Si uero plures, erūpit ipsi per pudendum sanguis multus ac carnosus. Et si hoc moderate fiat, seruatur. Sin minus, à fluxu correpta perit. & morbus quidem talis est. Iudicare uero oportet ex plenitudinis mole, & quod in uentre non mouetur. Nam mas trimestris, foemina quadrimestris motū habet. Postquā igitur tempore hoc prætergresso non mouetur, nimirum hic morbus est. Est autem hoc magnum signum, quod lac in mammis non generatur. Hanc igitur maxime quidem ne curato, aut certe cum prædictione. Et primum quidem totum corpus foueto. Deinde per sedem clysterem adhibeto, quo sanguis multus erūpat. Fortassis enim quod compactum est commoueris, id quod foetus esse putatur, muliere à pharmaco calefacta. Sed & uteros colluito, quo sanguinem educas: Sin minus, subdititijs utatur è buprestis. & dictamnū creticū in uino bibat. Sin minus, castoris testem. & retro cucurbitam ipsi ad laterum mollitudinem affigito, et plurimū sanguinem detrahito, atq; hoc maxime coniectura uirium ipsius facta. Ad uteri purgationes, quum non fiunt, siue ex partu, siue etiam aliis. Taxam pinguis simam contusam in uino albo coquito, & trium cyathorū mensura utatur. Aut pæoniæ grana quatuor, cumini Aethiopici parū, & seselis paulo plus. Aut cedri baccas. Si uero suffocationes affuerint, castorij parum. Si uero purgatione moderata ex partu facta, uenter maneat, aut etiam flatus conclusus, & dolore uexetur, siue cum febre, siue citra febrem, succi scammoniae quintam portionis partem, aut seseli, aut aliud quoddam ex odoratis, & rutam in uino albo bibendam dato. Si autem bibere nolit, illitionem ad sedem facito, uelut uerbij causa, ex felle taurino, & melle, ac litro. Si uero ex purgationis corruptione dolore uexetur, & odoratis exhibitis nihil cedat, & febris adsit, lactis caprini heminas duas decoquito, deinde eo perfrigerato pinguedinē detrahito, excolatoq; & aquæ mulsæ tertiam partē ammisceto, quo dulcius fiat. Bibat autem hoc ter ieiuna. Si uero dolor non quiescat, neq; uenter subeat, ad uesperam in calidam aquam in folio insideat. Quum autem perfota fuerit, ubi inde surrexit, cum uino nigro austero aqua diluto, olei dimidia parte addita, tepide colluito. & inde dormiat. Subdititium uterorum. Si conclusum fuerit, aut durū osculum uterorū. Ficum albam expurgato, & nitrum Aegyptium purissimū tritū ammisceto, & subdititiū facito magnitudine gallæ non magnæ, quod in lana molli in unguentum irinū tinctum apponat, per tres aut quatuor dies, prout uisum fuerit. Post hoc cōducit fomētum odoratum, postea uero molli quodam opus est.

est subditio, quod saniosa maxime ducat. Deinde mercurialē, si tenera fuerit, cum unguento rosaceo, in linteo ad diem ac noctē subdat. Ad idem. Fel taurinum & salem feruefacito, & sulphure trito ammixto, in oblongam spiram ac tractum efformato, & ad duos dies ac noctes nudam, ad ipsos uteros apponito. Et deinde rursus mercurialē. Post hoc myrrhā puram inspergito, & rosaceo acirino unguēto ammixto diluito, indeq; uteri osculum q̄ penitissime illinat.

Ad idem. Iridem odoratam contusam ac cribratā seorsim, et cyperi tantundem, & crocomagma magnitudine massæ manū implentis, uino odorato diluito, & ad unguēti formam redigito, & splenijs palmi longitudine inducta ac illita, in paruam pyxidem reconde, ut ne transpirent, & apponat. Si uero ulcerati fuerint uteri, aut osculū exasperatum fuerit, aut ab aliquo subditio compositi fuerint, adipē in lana illinito. & rosaceum ac ceræ parū inungito. Quū pragnans corruerit foetum menstruū, & ad finem perferre non poterit, & tenuis præter naturā fiat, huius uteros purgare oportet, & ipsam medicamentis curare, & crassificare. Non enim ad perfectionē gestare poterit, donec seipsam refecerit, & uteri robusti facti fuerint. Si uero concipiat quidem, corruat autem foetus bimestres, exacte eodē tempore, & neq; prius neq; posterius. & hoc perpeffa fuerit bis aut ter eodē modo. Aut etiam ad amplius tēpus progressum corruat eodem modo. Huius uteri nō amplius extenduntur, foetu in ipsis augescēte, & ex bimestri aut trimestri, ad ampliorē modum excedente. Verū foetus quidem augefcit. Vteri uero nō crescunt, & propterea multæ eodē tempore corrumpunt. Huius uterū colluere oportet, & subdititijs q̄ maxime inflare, aut hisce medicamētis. Colocynthis internā partem tusam cribrato, & silphij parū, cum paulo ampliore melle cocto ammisceto. & hæc circū specillum obducito, ea crassitudine quantam stomachus ad uteri os suscipere potest, et semper ultra protrudito, donec ad internā uteri partē penetrarit. Quū autem pharmacum colliquuerit, specillum eximito, & rursus eodē modo paratum elaterium, & colocynthidem syluestrē, similiter uelut prius medicamentū apponito. Edat aut hoc tēpore allium multū, & silphij caulem, & reliqua diæta utatur, quæ flatū maxime in uentre inducere potest. Apponat aut subdititiū tertio quoq; die, donec bene habere uisa fuerit. Quandoq; uero pluribus diebus interpositis. & in summa, prout libēter admiserit. Interiectis aut diebus, utatur mollibus. postquam uero per emollitoria osculum uteri præparauerit, & mēses apparuerint, paulum remorata, ubi iam sicca fuerit, cū uiro coeat. Quū autē flatum in uterū inducere uoles, allij caput integrū, & silphij succum, ad subdititia ammisceto. Quod si qua pragnans decē mēses perficere nō possit, sed corripit, & hoc sæpe patitur, ex huius utero aquam purgato, & ipsam medicamentis curato, quo aqua purgetur. Si uero genituram continens, non pragnans fiat, id quod multis contingit, stomacho uteri præter naturam hiante: menses plures quàm conuenit, & humidiores prodeunt, ut & id quod à foemina prodit semen, ad foetificationem non concipiatur, & uiri genitura insuper accedens corrumpatur. Contingunt autem hæc, & corpore, & uteris ægrotantibus. Verum oportet huic medicamenta deorsum purgantia dare, & interposito aliquo tempore, totum corpus fouere, & uteros cum aceto & aqua marina, specillis ac ferramentis ignitis immisisis. Conſiciantur autem in fomentū cupressi ramenta, & lauri uiridis

uiridis folia contusa, & polycnemi folia. faciendum est hoc fomētum tempore opportuno. post hoc uero lauetur, & fomētum adhibeatur ex loti ramentis, & rosis, ac polycnemi folijs aceto incoctis: Ad finem autem suffitus fiat; ex uerbasci folijs contusis ac loti ramentis. Verum ante lotionē suffito myrrhā & thus, utraq; æquis partibus trita, & myrti ac lauri folia. His permixtis & in lentum ignem coniectis, recens adhibito fomento suffito, bis in die, fomentū autem adhibeatur recens lotæ. Sed & post suffitum lauet, & uteri stomachū ad pristinam naturam reducat. Et si uires sufficiant, ante hæc omnia uenam in manu sinistra secato, atq; ita reliqua facito. Si uero stomachus sic habeat, menses autē nō prodeant, aut uitiose, aut minus, ad reliqua omnia ampliorē purgationem adhibeto, & sic curato, subdititijs etiam utens si opus habeat, & ex prioribus lauās, & suffitum faciens, ac siccans. Si mulier inuita abortū faciat, nec ita ejcere uelit, triticum torrefactum & molitū, & uuam passam albam cōtusam, aqua multa dulci diluta, modico oleo affuso, ieiunæ bibenda dato. postea raphani semen tritum, & acetum ac adipem anserinum, permixta bibat, et lauri folia trita apponatur. Deinde bibat origanum, & pulegium, & polentam ex aqua, ita ut lauri folia tusa ac trita ammixto gummi, aquę inspergat, diluat, ac bibat. Aut adipem ouillum, & anserinum, & mel simul mixta ac trita delingenda præbeto. Aut pastinacæ semen leuissime terito, & lacti superstantem cōcretionem ammisceto, & adipem anserinum eliquatum. Hæc feruefacta sorbenda dato. Aut origani folia uiridia, si haberi possunt, sin minus, sicca leuissime trita, ex aqua bibenda dato. Aut lauri baccas leuissime terito, & suis sceminæ adipē liquatum, & mel ammisceto, & simul omnia trita delingenda præbeto. Aut pastinacæ semē leuissime tritum ex uino diluto bibendum dato. Si uteri genituram non contineant, plumbum, & lapidem qui ferrum ad se rapit, leuiter terito, et linteo illigato, quo in muliebri lacte tincto, subdititio utatur. Aut æris florem tritum ac melle dilutum subdat. Quum uteri genituram uiri eructant tertia die, necesse est mulieris, quæ hæc patitur, uteros callo repletos esse, & non potest uiri genitura intus in utero manere, sed excluditur, & propterea concipere non potest, quandiu callus in utero fuerit. At calli expulsio sic fit. Pennas sumito minutissimas ac mollissimas; hisq; simul colligatis uteros illinito, quemadmodū oculos illinere solent, ita ut pennas exæques, ipsarūq; summās partes tenuissimo filo deliges, & multo rosaceo illinas. Sic autē facito. Supinā reclinato, et sub medios lumbos puluinar subiycito, & specillum immittito, ita ut cruribus mulieris extentis, & hinc atq; illinc diductis, specillū sursum ac deorsum uertas donec promineat. postquā autem uideris in osculo uteri callum, optimū quidem hoc fuerit, si non adhæreat in coxa, sed ultro sequatur, Si itaq; in osculo uteri in hæret, uolsella tenuissima prehensum extrahere conare, prouidus ut placide hoc fiat, & non uiolenter. Et postea uiro condormiet. Si prægnantī menses compareant, stercus asininum siccum, & rubricam, & sepia testam terito, & linteo illigata apponito. Aut pæoniæ semina nigra, in uino diluto trita bibenda dato. Si uero à coitu, imum uentrem dolet, & sanguis recens ipsi appareat, lini semen tufum, & muscum mollem, & adipem anserinū, mixta ac molli lana excepta imponito. Si uteri extra naturam progressi fuerint, calor habet maxime pudenda, & sedem; & urina paulatim destillat & pudendū mordet. patitur autem

tem hæc si recēs ex partu uiro condormierit. Quum sic habuerit, myrti baccas & lotiamenta in aqua coquito, & aquā per noctem sub dio exponito, atq; sic frigidissimam pudendis affundito, et trita hæc apponito. Postea aquam lentius bibens, melle & aceto ammixtis, uomat donec uteri fuerint retracti. & lectus à pedibus altior sit, & graueolentia sub pudenda suffito, odorata uero sub nares. Cibis utatur q̄ mollissimis ac frigidis. & uinum aquosum album bibat, & non lauetur, neq; cū uiro dormiat. Si uero omnino ex pudendis exciderint, dependent uelut scrotum, & dolor corripit. Hoc autē contingit quum ex partu laborarit, ut uteros cōcussit, et cū uiro dormierit in puerperij purgatione. Quū sic habuerit, frigefactoria apponat, & quod foris est depurgatū, ac cum uino nigro uinoso, in quo malum punicum coctū est ablutum, intro detrudat. Deinde mel & resina, pari mensura eliquata, in pudenda infundantur, & decumbat supina pedes sursum extētos habens. postea spōgias apponat, & ad lumbos deliget. Quandiu uero sic habuerit, à cibis abstinere oportet. Potu uero q̄ paucissimō uti, donec septem dies prætereāt, & si quidem sic redire uoluerint, bene est: sin minus, summas uteri partes deradito, lauato, & cerato picato illinito. Deinde pedes ad scalam deligato, scalamq; iuxta caput pulsato, & cum manu intrusito. Postea crura ipsius alternatim colligato, & diem ac noctem finito in quiete, & modicum ptisanæ succum frigidū dato, aliud autē nihil. Postera die ipsam reclinato, & cucurbitam q̄ maximam ad coxam affigito, & multo tempore trahere finito: & quum detraxeris, reclinatā iacere finito, & nihil aliud præter ptisanæ succum exhibeto, donec septē præterierint dies. Cibis autē tunc mollissimis ac paucissimis utatur. Si uero uentrem exonerare uoluerit, decubens id faciat, donec quatuordecim dies prætereant. postea surgat, & q̄ parcissime deambulet, & ne lauetur, & cibis modicis utatur, sub pudenda uero suffitus per graueolentia fiat. Et postquam obambulare inceperit, subligar gestet.

HIPPOCRATIS COI DE MOR-

BIS POPVLARIBVS LIBER I. IANO COR
nario Medico Physico interprete.

SECTIO PRIMA.

Constitutio temporis prima.



IN Thaso autumnni tēpore, circa æquinoctiū & sub pleiadas, aquæ multæ, assiduæ, molles, uelut in austrinis. hyems austrina. parui uēti aquilonares, squalores. & omnino hyems quale uer fieri solet. Ver autē austrinū, frigidum, pluuiæ paruæ. Aestas plerumq; nubila, aquarū inopia. Etesiae parum, modice, sparsim spirant. Quum autē totus hic aeris status ad austrina uergeret, ac cum siccitatibus fieret: ante uer quidem ex priore statu, subcontrario & aquilonio fiente, paucis obortæ sunt febres arden-tes, atq; his omnino boni status. & paucis sanguis erupit, neq; ex his moriebatur. Tubercula uero circa aurem alteram multis erant, plurimis ex utrisq; citra febrem erecte obambulantibus. Quibusdam uero etiam parum incalescebant.

L Extincta

Extincta sunt omnibus absq̃ nocumento. Neq̃ cuiquā suppurarūt, quēadmodum ea quæ ex alijs causis sunt oborta. Erat autē natura ipsorū hæc, laxa erāt, magna, diffusa, nō cum inflammatione, doloris exortia. omnibus obscure euasuerūt. Fiebant autē hæc adolescentibus, iuuenibus, in uigore cōstitutis, & ex his plurimis qui circa palæstram & gymnasia exercebantur. Mulieribus uero paucis fiebant. Plurimis uero tusses siccæ, qui tussiebant & nihil reieciabant, & uoces non longe postea rauosæ. Quibusdam uero etiam interposito tempore inflammationes cū dolore, in altero testiculo, quibusdam in utroq̃. Et alijs quidem febres, alijs non. Hæc autē plurimis laboriose fiebāt. De cætero uero, quantum ad ea quæ in officina medica ad chirurgiā pertinentia fiunt, sine morbo debebant. At uero ante ætatis initium, & per ætatem ac hyemē, multi ex his qui longo iam tempore subcorrupti erant, tabidi decubuerunt. Nam & multis qui ambigui erant, tunc tabes cōfirmata est. Quibusdā uero primum cœpit. Et his natura ad tabem uergebat. Moriebantur autē multi, & plurimi ex his. Et de his qui decubuerūt haud scio an quis etiam modico tempore superuixerit. Moriebantur autem citius q̃ tales morbi transigere solent. Nam alios & lōgiore, & cum febribus cōiunctos, facile ferebant, & nō moriebantur. De quibus paulo post scribetur. Solus enim & maximus ex his qui tum uigebant, tabidus morbus multos occidit. Erant autē plurimis ipsorum affectiones huiusmodi: febres horridæ, continuæ, acutæ, in totū non intermittentes. Modus autē erat semitertianus, una die leuiore, altera amplius exacerbescentes, & in summa acutiores increbescentes. Sudores uero semper, non per totū. frigiditas extremitatū multa, & quæ uix recalesceret. Alui turbata, biliosæ, ex paucis, puris, tenuibus, mordacibus. frequenter ad exonerandos se surgebant. Vrinæ tenues, & crudæ, & decolores, & pauca: Aut crassitudinē habentes, & subsidentiam paruam, non probe desidentes, sed cum cruda quadam ac intēpestiua subsidētia. Tussiebāt autem, pauca, condensata, concocta, paulatim uix educentes. Quibus uero uio lentissima accidissent, his neq̃ modice concoctio aderat, sed cruda spueri perseuerabant. Fauces autem plurimis horum ab initio, & perpetuo dolebāt, ruborem habentes cum inflammatione. fluxiones paruæ, tenues, acres. Breui collisquescebant, & affligebantur, omnes cibos perpetuo fastidientes, sitis exortes, & pleriq̃ circa mortem deliri. Et circa tabidos quidem hæc. Cæterū æstate iam & autumnō, febres multæ, continuæ, nō uiolentæ, diu quidem ægrotantibus, non autē aliās ita male habentibus oboriebantur. Plurimis alui turbata, ita ut ualde toleranter ferrent, & nihil memorabile lædebāt. Vrinæ item plurimis boni quidem coloris & puræ. Verum tenues, & post tempus circa iudicationem cōcoctæ. Tussiebant autem non ualde, neq̃ ea quæ per tussim reieciantur difficultatē exhibebant, Neq̃ cibum fastidiebant, sed etiā ualde licebat ipsis offerre. In summa subægrotabant tabidi, nō tabido modo, febribus horridis parum insudantes, aliās alij, ut qui erroneo modo exacerbarentur, febribus quidem in totū non intermittētibus, sed quæ iuxta naturæ febris tertianæ morem exacerbarentur. Iudicabantur autē quibus inter hos breuissimæ essent, circa uigessimū diem. plurimis circa quadragesimū. Multis circa octoagesimū. Quibusdā neq̃ sic, sed uago modo & circa iudicationē deficiebāt. horum autē plurimis febres rursus non multum tempus intermittentes reuersæ sunt. Ex recidiuis autem in

ijdem circuitibus iudicabantur. Multis uero ipſorū producebātur, ut ſub hyemē ægrotarent. Ex omnibus porro in hac temporis cōſtitutione deſcriptis, ſolis tabidis lethalia acciderunt. In alijs autem febribus, non.

SECTIO SECVNDA.

Conſtitutio temporis ſecunda.

IN Thaſo ante autumnū tempeſtates non tempeſtiue, ſed derepente in aquilonijs & auſtrinis multis, humidæ & prærumpentes. Huiuſmodi uero durabant uſq; ad pleiada, & ſub pleiade. Hyems autem aquilonia. Aquæ multæ, largæ, magnæ. Niuēs. Plerūq; mixta aeris ſerenitas, et hæc quidē fiebāt omnia. frigora uero nō admodum intempeſtiua. Iam uero poſt brumale ſolſtitium, & quando fauonius ſpirare incipit, poſterior hyemſ magna erat. aquilonia multa. Niuēs & aquæ aſidue multæ. & cœlū procelloſum ac nubilum. Hæc autē durabant & nō remittebāt uſq; ad æquinōctium. Ver autē frigidum, aquiloniū, aquoſum, nubilum. Aeſtas nō ualde æſtuoſa fiebat. Et eſiæ aſidue ſpirarunt. Mox circa arcturū in aquilonijs, aquæ ualde multæ. Quū autē annus totus humidus & frigidus et aquilonius eſſet, per hyemē ſano modo plerūq; habebant. Ante uer autē multi quidā, & plurimi morbide degebāt. Primū igitur cœperūt ſippitudines fluidæ, doloroſæ, humidæ, crudæ. Lemæ paruæ & multis difficulter erumpētes, plurimis reuertebātur. defecerūt ſero ad autumnū. Aeſtate iam & adtumno, lienteria, & dyſenteria, & tēneſmi, & alui profluuia ex bilioſis, tenuibus multis, crudis, & mordacibus: quibuſdā uero etiā aquoſis. Multis autē & urinae fluxiones cū dolore bilioſæ, aquoſæ, ramētoſæ, purulente, cum ſtillicidio, nō rhenales. ſed hiſ alia pro alijs. Vomitus pituitoſi, bilioſi, & ciborum crudorum reiectiones. Sudores. Omnibus undiquaq; multa humiditas. Fiebāt autem hæc multis erecte obambulantibus, nō febrētibus. Multis itē febrētibus, de quibus paulo poſt ſcribetur. In quibus autē omnia hæc præſcripta apparebant cum dolore, tabidi fiebāt. Iam uero autūno & ſub hyemē, febres cōtinuæ, & quibuſdā ipſorum paucis ardētes, diurnæ, nocturnæ, ſemitertianæ, tertianæ exactæ, quartanæ, erroneæ. Singulæ uero prædictæ febres multis fiebāt. At ardentes & pauciſſimis obortæ ſunt, & ex ægrotis hi minimum laborauerunt. Neq; enim ſanguis erupit, niſi ualde parum, & paucis. Neq; delirabant, aliæq; omnia tolerabilia erāt. Iudicabantur autē plurimis ualde bono ordine, cum intermittētibus in ſeptē ac decem diebus. Neq; mortuum aliquem tunc in febre ardente noui, neq; phrenitim tunc cuiquā factam ſcio. At uero tertianæ plures quidem q̃ ardētes febres erant ac grauioreſ, uerū ordinate in hiſ omnibus, à prima acceſſione quatuor circuitus habebāt, in ſeptem autem perfecte iudicabantur, neq; ulli horum reuerſæ ſunt. Quartanæ uero multis quidē ab initio ex ordine quartanæ cœperunt. Quibuſdā autē non paucis, ex alijs febribus ac morbis abſceſſus ad quartanas fiebant, atq; hoſ diu, quemadmodum ſolent, & adhuc diutius tenebant. Diurnæ uero quotidianæ, & nocturnæ, & erroneæ multæ, multis & multo tempore permanebāt, & erecte obambulātibus, & decumbentibus. Pluriſimos horum ſub pleiada, & uſq; ad hyemē, febres cōſequebantur. Multos cōuulſiones, magis autē pueros ab initio, & febriebāt. & in febribus cōuulſiones fiebant. & erant hæc pleriq; diuturna, uerum innocua, niſi ad hæc, etiā ex alijs omnibus perniciēſ aſeſſet. At continuæ quidē in totum, &

nihil intermittētes, exacerbescētes autē omnibus ad naturæ tertianæ modum, una die subleuantes, & una exacerbescētes, omniū quæ tunc fiebant uiolentiſſimæ erāt, & longiſſimæ, ac cū maximis doloribus, leniter auspicātes, & in totū semper augescētes, & in iudicatorijs diebus exacerbescētes, & in peius procedentes, parū alleuantes, & statim rursus ex intermissione uiolentius exacerbescētes, in iudicatorijs plerunq; diebus peiores fientes. Rigores uerō omnibus quidē inordinate & erroneo modo fiebāt, parcissimè autē & minime his. Verū in alijs febribus maiores. Sudores multi, his minimi, nihil alleuātes, sed subcontrario modo damna inferentes. Frigiditas extremitatū his multa, & uix recalcens. Neq; somni in torū, maxime uero hi etiā rursus soporosi. Ventres aut omnibus turbati & mali, his aut longe pessimi. Vrinæ uero plurimis horū aut tenues, & crudæ, & decolores, & post tēpus parum cōcoctę iudicatorio modo. Aut crassitudinē quidem habētes, uerum turbata, neq; cōsistentes, neq; subsidentes neq; cōcoctæ. Aut paucae, & crudæ, ac malæ, & subsidētes. Pessimæ autem hæc omnes. Et tusses quidē ad febres comitabantur. Verum non habeo quod scribam, an detrimentū aut utilitas tunc ex tussi cōtigerit. Diuturna igitur & molesta, & ualde inordinate ac erroneo more, & citra iudicationē, plurima horum perseverabant, tum his qui perniciosè habebāt, tum his qui non. Si enim aliquos ipsorum paululū relinquerent, statim rursus reuertebantur. Quibusdā uero paucis ipsorū iudicabātur, quibus breuissime adessent, circa octogesima diem. & horū aliquibus reuersa sunt, ut plurimi ipsorū per hyemē adhuc ægrotarint. plurimis autē citra iudicationē defecerūt. Hæc uero pariter acciderūt, & his qui superstites manserunt, & qui non. Quum aut multa & uaria fieret iudicationis impeditio ex morbis, maximū etiam ac pessimū signum perpetuo comitabatur, quod pleriq; omnes cibos fastidirent, & ex his maxime hi, quibus etiā alia exitialia erant. Siticulosi uero nō adeo intempestiue in his febribus erāt. Quū uero tēpus produceretur, & dolores essent multi, ac colliquatio mala, his abscessus succedebant, aut maiores q̄ ut ferre possent, aut minores q̄ ut quicquā prodesse: sed statim recurrerēt & ad peius courgerēt. Erāt autem quæ his fiebāt hæc: dysenterię, tenesmi, lienterię & alui profluvia. Quibusdam etiā hydropes, partim cū his, et partim absq; his. Quicquid aut ex his uiolenter accedebat, statim uires deieciat: aut rursus nihil proderat. Papulæ paruæ, & nō pro dignitate rationis excretionis morborū, & statim rursus euanescentes. Aut iuxta aures tumores, qui nō soluebantur, & nullā de se significationē præbebāt. Quibusdā in articulos, maxime uero in coxendicem, paucis iudicatorio modo cessantes, & statim rursus ad habitū ab initio inualescentes. Moriebātur autē ex omnibus, & plurimī ex his pueri iam ablactati, & maiores natu, octennæ ac decēnes, & nondū puberes. Fiebant aut hæc his, non sine prius scriptis. Priora uero multis, sine his. Solū uero bonū & maximū inter ea quæ fiebant signum, & quod plurimos in maximis periculis constitutos liberauit, quibus ad urinæ stillicidiū conuertebātur, & ad hoc abscessus fiebāt. Accidit autē plerisq; urinæ stillicidiū, maxime his ætatibus. Fiebat & alijs multis, tum erecte obambulantibus, tum in morbis. Statim uero etiā magna quædā mutatio omnium, his fiebat. Alui enim etiam si humectæ essent, maligno modo mox sistebātur, cibosq; omnes libēter sumebāt. Et febres postea mites erāt. Verum urinæ stillicidiū

dium his diuturnū & laboriosum erat. Vrinæ uero his erāt multæ, crassæ, uariæ, rubræ, purulentæ cū dolore. Atq; hi omnes superstites manserūt, & nullū ex his mortuū noui. Quæcunq; uero nō periculosæ fiunt, concoctiones ex cremetorum omnes undiquaq; tempestiuas aut bonas, & iudicatorios abscessus, cōsiderare oportet. Concoctiones celeritatē iudicationis, & securitatē sanitatis significant. Cruda uero & incōcocta, & in malos abscessus cōuersa, aut iudicationis sublationē, aut dolores, aut diuturnitatē, aut mortē, aut eorundem recidiuas. Quod uero ex his potissimū futurum sit, ex alijs considerandum est. Præterita dīcīto, præsentia cognoscīto, futura prædicīto. Hæc tractato. Exercetō circa morbos duo, ut iuues, aut non noceas. Ars ex tribus cōstat, morbo, ægroto, & medico artis ministro. Aegrotū cum medico aduersari morbo oportet. Capitis & colli dolores ac grauitates cū dolore, cum febribus, & sine febribus, Phreniticis quidem cōuulsiones, Sed & uirofa uomunt, et quidā ex his subito moriūtur. In ardentibus autē & alijs febribus, quibus colli dolor, & tēporum grauitas, & caligo uertiginosa circa oculos, aut etiam præcordiorū distentio, non cū dolore sit, his sanguis per nares erumpit. Quibus autē grauitates quidem totius capitis, oris autem uentriculi morsus adsunt, & nauseabundi sunt, hi biliosa & pituitosa uomūt. Pleruncq; uero pueris in talibus afflictionibus cōuulsiones fiunt. Mulieribus autem tum eadem, tum ab uteris dolores. Senioribus autē & quibus iam calor superatur, paraplegiæ uocata, leues siderationes, aut insaniæ, aut oculorum priuationes.

Constitutio temporis tertia.

IN Thaso paulo ante arcturum, & sub arcturo, aquæ multæ, magnæ, in aquilæ lonijs. Circa æquinoctiū autē & usq; ad pleiada, austrinæ pluuiæ paucae. hyēs aquilonia. siccitates, frigidī uenti, magnæ niues. Circa æquinoctiū hyemes maximæ. Ver aquiloniū, siccitates, pluuiæ paucae frigida. Circa solstitium æstiuū aquæ paucae, magna frigora usq; ad canem. Post canem usq; ad arcturum, æstas calida, æstus magni, non ex accessione augescentes, sed continui ac uiolenti. Aequa non delapsa est. Etesiæ spirarunt. Circa arcturū pluuiæ austrinæ usq; ad æquinoctium. In hac autē constitutione, per hyemem quidem receperunt resolutiones ex sideratione, & multos inuaserunt. & quidā ex ipsis subito moriebantur. Nam hic morbus satis popularis erat. Cætera incolumes degebant. Antequam autem coeperunt febres ardentes, & usq; ad æquinoctiū, & ad æstatem durabant. Quicunq; igitur uere & æstate ineunte statim ægrotare coeperunt, plerimi seruabantur. pauci uero quidam moriebantur. In autumno iam & quū pluuiæ fierent, lethales erant, & plures peribant. Erant autem febrium ardentium affectiones. Quibus quidē bene ac large sanguis per nares erupit, per hoc maxime seruabantur, & nullum noui qui in hac constitutione mortuus esset, si recte ipsi sanguis profluxisset. In Philisco enim & Epāminone ac Sileno, quarta ac quinta die parum de naribus stillauit, & moriebantur. Pleriq; igitur ægroti circa iudicationē rigeabant, maxime hi quibus sanguis nō erupisset. Iidem uero etiam postea insuper riguerunt, & exsudarunt. Quibusdam morbus regius accidit sexta die. Verum his purgatio per uescicā, aut alius exturbata profuit, aut larga sanguinis eruptio. Velut Heraclides qui decumbēbat apud Aristocydem, nam huic & ex naribus sanguis erupit, & aluus turbata est, & per uescicam

purgatus est. Vigesima die iudicatus est. nō uelut Phanagoræ seruus, cui nihil tale factum est, & mortuus est. Sanguis autē plurimis erupit, maxime adolescentibus & in uigore cōstitutis, & taliū pleriq; perierūt, quibus sanguis nō erupit. Senioribus uero ad morbum regiū res deuenit. aut alui ipsis turbatae sunt, aut dysenterici facti sunt. Velut Bioni apud Silenum decūbenti contigit. Populariter grassabātur etiam dysenteriae per aetatem. & quibusdam qui aegrotarunt, quibusq; etiam sanguis erupit, ad dysenteriam transitus factus est. uelut Eratonis filio & Mylo, qui multa sanguinis eruptione facta, in dysentericū statum delapsi superstites manserunt. Multis igitur maxime hic humor redundauit. Nam & quibusdam circa iudicationē sanguis non erupit, sed tubercula iuxta aures excitata euauerunt. Quae ubi euauissent, iuxta sinistri lateris molitudinem, & ad summā coxam grauitas fuit. Quum autē dolores post iudicationem fierent, & urinae tenues prodixissent, parū sanguinis profundere coeperūt. Verum circa quartā & uigessimā, abscessus ad sanguinis eruptionem fiebant. Antiphōti Critobuli filio, quae sedata est, & perfecte iudicatus est circa quadragessimā. Mulieres porro multae quidem aegrotarūt, pauciores autē q̄ uiri, & pauciores etiā mortuae sunt. Plurimae uero grauiter ex partu laborarunt, & post partus insuper aegrotarunt, & hae maxime perierunt. Velut Telebuli filia, quae sexta à partu die mortua est. Plurimis itaq; in febribus mēses apparebant. Quibusdam uero ex naribus sanguis erupit. & uirginibus multis id primū factum est. Quibusdam & ex naribus sanguis, & mēses proruperūt. Velut Dætharsei filiae uirgini apparuerūt tunc primū, & sanguis largus ē naribus fluxit. Neq; ullam mortuā noui, ex his quibus aliquid horū probe factum esset. Quibus autē praeſtantibus cōtigat aegrotare, omnes foetus perdiderūt, quas ego noui. Vrinae uero plurimis boni quidem coloris, uerum tenues & subsidentias modicas habētes, excrementis tenuibus ac biliosis. Multis autē alijs iudicatis ad dysenterias res deuenit. Velut Xenophani & Critiae. Vrinae aquosae, multae, purae, tenues post iudicationē, & subsidentia bona facta, & alijs probe iudicatis. Mentionē faciam eorū quibus factae sunt, Bioni qui apud Silenum decūbebat. Cratiae quae apud Xenophanē. Aretonis filiae uxori Mnesistrati. Postea uero omnes hi dysenterici facti sunt. Quod urinas minxerūt aquosas, cōsiderandum est. Circa arcturū autē multis undecima die iudicatio facta est, & bis reciduae nō pro ratione fientes reuersae sunt. Erant autē soporosi circa tēpus hoc, plures aut pueri. & hi omnium minime moriebātur. At uero circa æquinoctiū, & usq; ad pleiada, & sub hyemē, comitabātur quidem febres ardētes. Sed & phrenitici plurimi tūc fiebant, & pleriq; horū moriebātur. fiebant autē & per aetatem pauci. Quū igitur febres ardentes inciperēt, significationē de se praebebāt quibus pernicies immineret. Statim enim ab initio febris acuta, parū insuper rigebant, uigiles erant, siticulosi, anxii, parum exudantes circa frontem & clauiculas, nullus per totū, multum delirabant, tumores, tristitia, extremitates subfrigidae, pedes summi & maxime manuum summæ partes. Exacerbationes in diebus paribus. Plurimis autē quarta die dolores maximi, & sudores plerumq; subfrigidi, & extremitates non amplius recalescentes, sed liuidae, subfrigidae, & neq; sitiebant. Ad hanc urinæ his nigrae, paucae, tenues, & alui sistebantur. neq; sanguis ē naribus erupit ulli ex his quibus haec accidissent, sed parum stillauit.

Neq;

Neq̃ ad recidiuam ulli horū res deuenit. Sed sexta die mortui sunt cū sudore. Phreniticis autem acciderunt præscripta non omnia. Iudicabantur autē his ple-
 runq̃ die undecima, quibusdā uigesima. Quibus non statim ab initio phre-
 nitis cœpit circa tertiam aut quartā diem, sed moderate habebāt primo tempo-
 re, his circa septimam morbus ad acumen transiit. Magna itaq̃ erat morbo-
 rum multitudo. Ex ægris aut maxime moriebātur adolefcētes, iuuenes, in uigo-
 re ætatis cōstituti, leues, subalbicante cute, rectos itemq̃ nigros capillos habē-
 tes, & oculos nīgros, & qui in quiete & ocio uixerant, & alta uoce, aut gracili,
 aut aspera præditi, balbi, iracundi, & mulieres plurimæ ex hac specie morieban-
 tur. At in hac constitutione ex quatuor signis maxime seruabantur. Quibus
 uidelicet s̃guis ē naribus probe erupisset. Aut urinæ multæ, & multam substi-
 dentiam habentes per uesicam prodissent. Aut per uentrē turbata, biliosa tem-
 pestiue processissent. Aut qui dysenterici facti essent. Acciditq̃ multis ut non
 ex uno præscriptorum signorum iudicarentur, sed per omnia percurrerent. &
 grauius quidem habere uidebantur, cōseruabantur autem omnes quibus hæc
 accidissent. Mulieribus autē & uirginibus accidebant item præscripta signa o-
 mnia. Quibus autem uel horū quippiā bene accideret, aut menses large appare-
 rent, per hæc seruabātur ac iudicabantur, neq̃ ullam interisse noui, cui ex his
 aliquid accidisset. Philonis enim filiæ sanguis ex narib. large fluebat. Septimā
 autem die intēpestiuius cœnauit & mortua est. Quibus in febribus acutis, ma-
 gis ardentibus, lachrymæ inuitæ defluūt, his sanguinis à naribus eruptionem
 expectare oportet, si etiam alia perniciose non habeant. Nam his qui male ha-
 bent, non sanguinis eruptionem, sed mortem significant. Tubercula iux-
 ta aures in febrientibus cum dolore oborta, quibusdam febre iudicatorio mo-
 do deficiente, neq̃ sedantur, neq̃ suppurantur: hæc biliosum alui profluuium,
 aut dysenteria, aut crassarum urinarū subsidencia soluit. Velut Hermippo Cla-
 zomenio. Iudicationes autē ex quibus cognoscimus, aut similes sunt, aut
 dissimiles. Velut duo fratres qui simul eadem hora ægrotare cœperunt. De-
 cumbebant autem iuxta theatrum Epigenis fratres. Horum seniori sexta die
 iudicatio facta est, iuniori uero septima. Recidiua facta est utrisq̃ simul eadem
 hora. Intermissit dies quinq̃. Ex recidiua iudicatio facta est utrisq̃ simul in to-
 tum, die decima septima. Plurimis autem sexta die iudicatio facta est, intermis-
 sit sex. Ex recidiuis autem iudicatio facta est quinta die. Quibusdam uero septi-
 ma iudicatus est morbus, & septem diebus intermissit. Ex recidiua uero iudica-
 tus est tertia. Quibusdam autem iudicatus est quinta, intermissit septem, redijt
 per tres, intermissit unam, in superq̃ unam rursus occupauit. Aliquibus uero iu-
 dicatus est sexta, intermissit sex, redijt per tres, intermissit unā, & una iudicatus
 est. Velut Euagonti Daipharris filio. Quibusdam autem iudicatus est sexta, in-
 termisit septem: ex recidiua uero iudicatus est quarta. Velut filiæ Aglaidæ. ple-
 riq̃ igitur ex his qui ægrotarunt in hac constitutione, hoc modo ægrotarunt.
 & nullum noui ex his qui superstites manserunt, cui nō redijissent recidiuæ se-
 cundum rationē fientes, & seruati sunt omnes quos ego noui, quibus hoc ge-
 nus recidiuæ factæ sunt. Neq̃ ægrotantiū hoc modo ullum aliquē noui, quem
 recidiua iterum repetisset. Moriebantur autem in morbis his plurimi sexta
 die: uelut Epaminondas, & Silenus, & Philiscus Antagoræ filius. Quibus

autem tubercula iuxta aures facta essent, his iudicatio facta est uigesima die. Restincta autem ac sedata sunt omnibus, & non suppurata sunt, sed ad uescā conuerſa. Cratistonacli qui apud Heracleum habitabat, & Scymni fullonis ancillæ suppurauerunt, & mortui sunt. Quibus autem iudicatus est septima die, intermisit nouem, reuersus est morbus. Iudicatus est ex recidiua quarta die. Quibus autem iudicatus est septima die, intermisit sex, deinde redijt, & iudicatus est septima uelut Phanocrito, qui decūbebat apud Gnathonem pictorē. Sub hyeme circa solstitium hybernum, & usq; ad æquinoctiū, perseverabant quidem & febres ardentes, & phrenitides, & multi moriebantur. Iudicationes tamen transmutatæ sunt, & iudicatio facta est plurimis ab initio die quinta, intermisit quarta, recidiua facta est, ex recidiua uero iudicatio facta est quinta die. In summa quatuordecim diebus. Sic autem facta est iudicatio pueris plurimis, immo etiam senioribus. Quibusdam uero morbus iudicabatur die undecima. Reuertebatur decimaquarta, iudicabatur perfecte uigesima. Si uero aliqui insuper riguissent circa uigesimā, his iudicabatur quadragesima. Superriguerūt autē plurimi circa iudicationē ab initio. Qui uero circa iudicationē ab initio riguerūt, etiā in recidiuis unā cū iudicatione riguerūt. Riguerūt autē paucissimi uere, æstas te plures, autūno adhuc plures, hyeme longe plurimi. At sanguinis eruptiones cessabant.

SECTIO TERTIA.

Morbos dinoscimus edocti, ex cōmuni omniū natura, & ex uniuscuiusq; propria, ex morbo, ex ægroto, ex his quæ offerūtur, ex eo qui offert. Ex his enim & breuiiores, & grauiores redduntur: ex tota ac partiali constitutione coelestiū, & uniuscuiusq; regionis, ex uictu, ex uitæ studijs, ex ætate cuiusq; sermionibus, moribus, taciturnitate, cogitationibus, somnis, uigilijs, insomnijs quibusdā & quando, uellicationibus, pruritibus, lachrymis, exacerbationibus, secessibus, urinis, sputis, uomitibus, & quæ ex quibus, in quos, successiones morborum: & qui abscessus ad perniciem, & ad iudicationem: Sudor, rigor, frigiditas, tussis, sternutationes, singultus, spiritus, ructus, flatūs silentes, strepentes, sanguinis eruptiones, hæmorrhoides. ex his autē, & quæ per hæc fiunt, cōsiderandū. Febres quædam cōtinuæ sunt, quædam interdiu tenent, noctu intermittunt. Aut nocte tenent, die intermittūt. Semitertianæ, tertianæ, quartanæ, quintanæ, septimanæ, nonanæ. Sunt autē acutissimi, & maximi ac grauissimi morbi, & maxime lethales, in cōtinua febre. Securiſsima uero omniū, et facillima ac lōgissima est quartana. Non enim solū ipsa à seipsa talis est, sed etiā ab alijs magnis morbis liberat. At in semitertiana appellata, contingit quidem & acutos morbos fieri, & est hæc præ cæteris maxime lethalis. Sed & tabidi, & quicunq; ex alijs lōgis morbis ægotāt, ex hac maxime ægotāt. Nocturna nō admodū lethalis est, uerū lōga. Diurna lōgior. Quibusdā autē & ad tabem uergit. Septimana lōga est, uerū nō lethalis. Nonana adhuc lōgior, & nō lethalis. Tertianæ exacta cito iudicatur, & nō est lethalis. Quintana pessima omniū est. Nam & ante tabem, & iam tabidis superueniens, occidit. Sunt autē modi, & constitutiones, & exacerbationes singularum harum febrium, æque cōtinuarum ac intermittentium. Velut uerbi causa, Cōtinua quibusdā ab initio floret, & uiget maxime, & ad deterius procedit. Circa iudicationem uero & unā cum iudicationē, imminuitur. Quibusdam uero molliter incipit & submisſe, augetur

autem

aũt & exacerbatur quotidie, Circa iudicationē uero & unā cū iudicatione, acerrimam elucet. Quibusdā leniter auspicata augetur & exacerbatur. & ubi aliquādiu in uigore fuit, rursus remittit usq; ad iudicationē, & circa iudicationē. Atq; hæc cōtingere solent in omni febre, & in omni morbo. Oportet autē uictus rationem ex horū consideratione offerre. Multa uero etiam alia signa his sunt cognata, de quibus partim scriptū est, partim scribetur. Ad quæ ratiocinari oportet, examinareq; ac cōsiderare, cui horū acutus ac lethalis sit morbus, aut a quo superstes sit futurus. & cui offerendū sit, aut non, & quādo, & quantū. & quid offerendū erit. Quæ uero paribus diebus exacerbantur, paribus iudicantur. Quorum autē exacerbationes in imparibus fiunt, ea in imparibus iudicantur. Est autē primus iudicatorius, ex circuitibus diebus paribus iudicantibus, quartus dies. Deinde sextus, decimus, decimusquartus, decimus octauus, uigessimus, uigessimus quartus, uigessimus octauus, trigessimus, trigessimus quartus, quadragessimus, sexagesimus, octogessimus, & ceterisim uigessimus. Ex circuitibus uero in imparibus diebus iudicantibus, primus est dies tertius. deinde quintus, septimus, nonus, undecimus, decimus septimus, uigessimus primus, uigessimus septimus, & trigessimus primus. At uero nosse expedit, si aliter iudicatio fiat, extra præscriptos dies, reciduias fore significat, & fuerit sane perniciofa. Oportet autem animaduertere nosse, in his temporibus iudicationes futuras esse, ad salutem, aut perniciem: aut inclinationes ad melius, aut deterius. Erroneæ porro febres, & quartanæ, & quintanæ, & septimanæ, & nonanæ, in quibus circuitibus iudicentur considerandum est.

AEGROTI QVATVORDECIM.

PRIMVS

Philiscus prope muros habitabat, decubuit. Primo die febris acuta, sudauit, noctem laboriosam habuit. Secūdo die omnia exacerbata sunt. Vesper ab infuso per clysterē adhibito bene habuit, noctē quietā. Tertio mane & usq; ad meridiem, uisus est à febre liber esse. Ad uesperā febris acuta cū sudore, siticulosus erat, lingua resiccabatur, nigra minxit, noctē molestā habuit, nō dormiuit, omnino delirauit. Quarto omnia exacerbata sunt, urinæ nigra, nox tolerabilior, urinæ melioris coloris. Quinto circa meridiē parū de naribus stillauit nō mixtum. Urinæ uariæ, quæ habebāt innatantiā quædā rotunda, genituræ similia, dispersa, nō subsidebāt. Subdita glande, flatuosa pauca prodierūt. noctē habuit laboriosam, somni parui, sermones, deliramēta, extremitates undiq; frigida, et nō amplius recalescētes. minxit nigra, dormiuit parū, ad diē uoce destitutus est, frigidū sudauit, extremitates liuidæ. Circa meridiē sexta die mortuus est. Huic spiritus ad finē usq; uelut reuocātī, rarus & magnus. Splen eleuatus est orbiculari gibbositate. Sudores frigidi perpetuo. Exacerbationes diebus paribus.

AEGROTVS II

Silenus habitabat in Platamone, prope filios Eualcidis. Hūc ex lassitudinibus & potationibus, ac exercitijs intēpestiuis febris corripuit. Coepit autē ægrota- re ex lūbis, & caput grauitas tenebat. & colli distētio erat. Ab aluo prima die biliosa, mera, spumosa, abūde colorata, multa prodierūt. Urinæ nigrae nigram subsidentiā habentes, siticulosus, lingua resiccata, noctē nihil dormiuit. Secūda die febris acuta, secessus plures, tenuiores, spumosi. Urinæ nigrae, nox molesta, parum delirauit. Tertia omnia exacerbata sunt, præcordij distētio utrinq; oblonga

oblōga ad umbilicū submollis. Seceſſus tenues, ſubnigri. Vrinæ turbatæ, ſubnigræ. Nocte nihil dormiuit, ſermones multi, riſus, cantus, continere ſe nō poſtuit. Quarta per eadem. Quinta ſeceſſus meri, bilioſi, leues, pingues. Vrinæ tenues, pellucidæ. parū reſipicebat. Sexta circa caput parum ſudauit. extremitates frigidæ, liuidæ. lactatio multa. ab aluo nihil prodijt. Vrinæ ſuppreſſæ ſunt, febris acuta. Septima die uoce deſtitutus eſt. extremitates non ampliùs recaleſcebāt. nihil minxit. Octaua ſudauit frigidū per totū ſudorē. papulæ cum ſudore rubræ, rotundæ, paruæ, uelut uari permanebant, nō abſcedebāt. Ab aluo uero cū parua irritatione, ſtercora tenuia uelut incōcocta, multa prodibāt cū dolore. Vrinā reddebat cū dolore mordacē. Extremitates parū recaleſcebāt. Somni tenues, ſoporofi. Vox intercepta. Vrinæ tenues, pellucidæ. Nona per eadem. Decima potum non ſuſcipiebat. Soporofus erat, ſomni autem tenues. Ab aluo ſimilia. Minxit acruatim ſubcrāſſum, deſiſit ſubſidens. ſubſidentia crāſſæ farinę ſimilis, alba. Extremitates rurfus frigidę. Vndecima mortuus eſt. Ab initio huic & ad finem uſq; ſpiritus magnus rarus, præcordij palpitatio aſidua. Aetas erat circa annos uiginti.

ÆGROTVS III

HErophonti febris acuta. Ab aluo pauca ab initio uelut in teneſmo. Poſtea uero tenuia prodibant bilioſa, frequētiora. Somni nō aderant. Vrinæ nigra, tenues. Quinta mane ſurditas. Exacerbata ſunt omnia. Splen eleuatus eſt. Præcordij diſtentio. Ab aluo pauca, nigra prodierūt. delirauit. Sexta delirabat, ad noctē ſudor, frigiditas. delirus permanebat. Septima perfrigerabatur, ſiticuloſus, delirabat, noctu reſipicebat, obdormiuit. Octaua febricitauit, ſplen minuebatur, intelligebat omnia. doluit iuxta inguen, tumor primū ē directo ſplenis. Deinde dolebat utraſq; tibias. nox tolerabilis. Vrinæ coloris melioris paruā ſubſidentia habebant. Nona ſudauit, iudicatus eſt morbus, intermiſit. Quinta reuerſus eſt. Statim autē ſplen eleuatus eſt, febris acuta, ſurditas rurfum. Poſt recidiuā tertia die ſplen minuebatur, ſurditas minor erat, crurā dolebant, noctu ſudauit. Iudicatus eſt die ſeptimadecima. Neq; delirauit in recidiua.

ÆGROTVS IIII

IN Thaſo Philini uxorem, quæ filiam pepererat, quum purgatio ſecundū naturam facta eſſet, & aliàs leuiter degeret, decimaquarta à partu die febris uehemens corripuit cum rigore. Ab initio uero cor dolebat, & circa præcordium dexterū. muliebrium partiū dolores. purgatio ceſſauit. Vbi uero glandē ſubdiſſet, hæc quidē leuiora facta ſunt. Capitis autē colli & lumborū dolores permanebant. Somni nō aderant. Extremitates frigidæ. ſiticuloſa erat. aluus combuſta. pauca egerebat. Vrinę tenues, ab initio decolores. Sexta die ad noctē multū delirauit, et rurfus reſipicebat. Septima ſiticuloſa, ſeceſſus bilioſi, abūde colorati. Octaua ſuperriguit. febris acuta. cōuulſiones multæ cū dolore. multū delirabat. Glāde ſubdita exurgebat, multaq; cū fluxione bilioſa prodibāt. Somni nō aderāt. Nona cōuulſiones. Decima parū reſipicebat. Vndecima dormiuit. omniū recordata eſt. Statim autē rurfus delirauit. Vrinā autē reddebat cū cōuulſionibus, acruatā, multā. illis autē parū admonētibus, crāſſam albā: qualis eſt ex his quæ ſubſiderūt, ubi multo tēpore ſita, fuerint cōturbata. non ſubſidebat. color & craſſitudo talis, qualis eſt in urinis iumētorū. Talia mingebat, quæ & ego ui

di. Circa decimum quartū diem palpitationes per totū corpus, sermones multū, parū resipiscebat. Verum statim rursus delirabat. Circa decimum septimū uoce destituebatur. Vigesima mortua est.

AEGROTVS V

Epicratis uxorem, quæ decumbebat apud Archegetem, partui iam propinquam, rigor fortiter corripuit, non incaluit, uelut dicebant. Et postridie eadem erant. Tertia die peperit filiam, & alia omnia iuxta rationē uenerunt. Postridie à partu febris acuta eam inuasit, cordis dolor & muliebrium partiū. Vbi uero glandem subdidisset, hæc quidem leuiora facta sunt. Capitis aut & colli ac lumborum dolor. Somni nō aderant. Ab aluo modica biliosa, tenuia, pura prodibant. Vrinæ tenues, subnigræ. Sexta die à quo febris ipsam corripuit, ad noctem delirauit. Septima omnia exacerbata sunt, uigilans delirauit, siticulosa, secessus omnes biliosi abūde colorati. Octaua superriguit, plus dormiuit. Nona per eadem. Decima crura laboriose dolebat. Cordis dolor rursus, capitis grauitas, non delirauit, magis dormiuit, aluus restitit. Vndecima sudauit, minxit melius colorata, multam subsidentiā habentia, leuius degebat. Decimaquarta superriguit, febris acuta. Decimaquinta uomuit biliosa, flaua, satis multa. Sudauit sine febre. Ad noctē febris acuta. Vrinæ crassæ subsidētiā albam habētes. Decima sexta ad noctem exacerbata est, & cum molestia non dormiuit, delirauit. Decima octaua siticulosa, lingua combusta est, non dormiuit, multū delirauit, crura dolebat. Circa uigesimam mane parū riguit, soporosa, quiete dormiuit, uomuit biliosa, pauca, nigra. Ad noctem surditas. Circa uigesimā primam lateris sinistri grauitas, per totū cum dolore, parum insuper tussijt. Vrinæ crassæ, turbatae, subrubrae, quæ depositæ non subsidebant, cætera leuiora, non sine febre. Statim ab initio fauces dolebat, rubor aderat, columella reuulsa, fluxio acris, mordax, salsa, perpetuo perseverabat. Circa uigesimā septimā febris libera, in urinis subsidētia, latus dolebat. Circa primam & trigessimā febris corripiebat, aluus ex biliosis turbata est. Quadragesima die uomuit pauca biliosa, ludicata est perfecte libera à febris die octogesima.

AEGROTVS VI

Cleanactiden qui supra Heracleum decumbebat, febris corripuit erroneo modo. Dolebat aut caput ab initio, & latus sinistrū. & aliarū partiū dolores aderant, lassatorū modo, febres exacerbabātur aliàs aliter inordinate. Sudores quādoq; quādoq; nō. Exacerbationes ut plurimū in iudicatorijs diebus magis accedebāt. Circa uigesimā quartam summas manus dolebat. Vomuit biliosa, flaua, satis multa. Paulo post aut æruginosa. Ab omnibus alleuatus est. Circa trigessimam sanguis ex utrisq; naribus erūpere cœpit, atq; hoc erroneo modo paulatim usq; ad iudicationē. Nō autem fastidiebat cibum, neq; siticulosus erat per totū tempus, neq; insomnis. Vrinæ tenues, non decolores. Circa quadragesimam minxit subrubra, subsidētiā multam ualde rubram habentia, alleuatus est, post hæc autem urinæ uariæ, quādoq; subsidētiā habebāt, quādoq; non. Sexagesima urinis subsidētia multa, & alba, & leuis. Remiserūt omnia febres intermittebant. Vrinæ tenues quidem, uerū boni coloris. Septuagesima à febre liber permāsit diebus decem. Octogesima riguit, febris acuta corripuit, multū sudauit. Vrinis subsidētia rubra, leuis, perfecte iudicatus est.

AEGROTVS VII

Metonē febris uehemens corripuit, lumborū grauitas dolorosa. Postridie Mubi aquam bibisset satis multā, ab aluo probe prodijt. Tertia capitis grauitas. Secessus tenues, biliosi, subrubri. Quarta omnia exacerbat sunt. Fluebat à dextra nare bis sanguis modicus. Noctē moleste tulit. Secessus similes tertiæ diei. Vrinæ subnigræ, habebant quiddam in medio innatans, subnigrū, diuulsum, non subsidebāt. Quinta effluxit ex sinistra nare sanguis largus, merus. Sudauit, iudicatus est. Post iudicationem insomnis, delirabat. Vrinæ tenues, subnigræ. Capitis lotionib. usus est, dormiuit, resipiscebāt. Huic recidiua facta non est. Sed sanguis erupit sæpe etiam post iudicationem.

AEGROTVS VIII

ERasimum qui habitabat circa Bootæ torrentem, febris uehemēs corripuit post coenā, nocte turbatus fuit, diem primam quiete, noctē laboriose trāsegit. Secunda omnia exacerbat sunt, ad noctē delirauit. Tertia dolorose, multum delirauit. Quarta molestissime, ad noctem nihil dormiuit. Insomnia & ratiocinationes, deinde peiora, & magna, & periculosa, timor, molestia. Quinta mane resipiscebāt ac intelligebāt omnia. Verum ad meridiem multū insanijt, continere se non potuit. Extremitates frigida subliuida. Vrinæ inconcoctæ. Circa solis occasum mortuus est. Huic febres perpetuo cum sudore, præcordia sublimia, distentio cum dolore. Vrinæ nigræ habentes quædam in medio suspensa innatantia rotunda, non subsidebant. Ab aluo stercora prodibant. Sitis perpetuo non ualde. Conuulsiones multæ cum sudore, circa mortem.

AEGROTVS IX

CRitoni in Thaso erecte obambulanti, pedis dolor fortis à magno digito coepit. Decubuit eadem die, horridus, anxius, parū subcalescens, nocte desipuit. Secunda die tumor laxis per totū pedem, & circa malleolum subrubens cum distentione. Pustulæ nigræ, febris acuta, insanijt. Ab aluo uero mera, biliosa, satis multa prodibant. Mortuus est altera ab initio die.

AEGROTVS X

CLazomenium qui ad Phrynichidæ puteum decumbebat, febris uehemēs corripuit. Dolebat autem caput, collum, lumbos ab initio. Statim aut surditas, Somni nō aderant. Febris acuta inuasit. Præcordium eleuabatur cum tumore, distentio non ualde, lingua sicca. Quarta ad noctem desipuit. Quinta laboriose omnia exacerbat sunt. Circa undecimam parum remiserunt. Ab aluo uero ab initio & usq; ad decimā quartam, tenuia multa aquei coloris prodibāt. Toleranter ea quæ ad secessum pertinent ferebat. Postea aluus restitit. Vrinæ perpetuo tenuēs quidem, uerum boni coloris, & multa in medio suspensa habebant diuulsa, non subsidebant. Circa decimā sextam minxit paulo crassiora, habebant subsidentiam parua, paululum alleuarūt, resipiscebāt magis. Decima septima rursus tenuia. Circa utraq; aures tubercula extiterunt cū dolore. Somni non aderant, delirabat. Circa crura dolebat. Vigesima à febre liber iudicatus est, nō sudauit, omnia intelligebāt. Circa uigesimā septimam coxæ dextræ dolor fortis, cito quieuit. Tubercula uero iuxta aures neq; sedata sunt, neq; suppurata, uerum dolebāt. Circa trigessimā primam profluuiū alui ex multis aquosis, cum eiusmodi quæ in dysenteria prodire solent. Vrinæ crassas mingebat.

Tubercula

Tubercula circa aures sedata sunt. Circa quadragesimū oculum dextrum dolebat, obscurius uidebat. Restitutus est.

AEGROTVS XI

DRomeadæ uxorem quæ filiam pepererat, & alijs omnibus secundū rationem factis, secunda die rigor corripuit, febris acuta. Cœpit autē prima die dolere circa præcordia fastidiosa ac nauseabūda, horrida, anxia. & sequentib. nō dormiuit. Spiritus rarus, magnus, statim reuulsus. Altera à rigore die, stercora ab aluo benè prodibant. Vrinæ crassæ, albæ, turbatæ: qualis sit ex his quæ subsiderunt, ubi multo tempore sita, fuerit conturbata: nō subsidebant. nocte non dormiuit. Tertia circa meridiem superriguit. Febris acuta. Vrinæ similes, præcordij dolor, fastidiosa ac nauseabunda, nox molesta, nō dormiuit. Sudauit per totum subfrigida. Statim autē rursus recalefacta est. Quarta die circa præcordia parum alleuata est. Capitis grauitas cum dolore, in soporem incidit, parū de naribus stillauit, lingua sicca, siticulosa. Vrinæ tenues, oleosæ, parum dormiuit. Quinta siticulosa, fastidiosa. Vrinæ similes, nihil ab aluo. Circa meridiem multum delirauit, & statim rursus parum resipiscebat, exurgēs in soporem incidit, frigiditas parua, nocte dormiuit, delirauit. Sexta mane superriguit. Statim autē recalefacta est. Sudauit per totum. Extremitates frigida, delirauit. Spiritus magnus, rarus. Paulo post conuulsiones à capite cœperunt. Statim mortua est.

AEGROTVS XII

HOmo quidam calefactus cœnauit, & bibīt amplius. Vomuit omnia noctu, febris acuta. Præcordij dextri dolor. Inflammatio submollis ex interna parte, noctem moleste tulit. Vrinæ ab initio rubræ, crassæ, depositæ nō subsidebant. Lingua sicca, non ualde siticulosus. Quarta febris acuta. Dolores omnium. Quinta minxit leue, oleosum, multum, febris acuta. Sexta uesperī multū delirauit. Nec nocte dormiuit. Septima omnia exacerbata sunt. Vrinæ similes, sermones multi, continere se non potuit. Ab aluo cum irritatione prodierūt liqua quida turbata, cum lumbricis. Nox laboriosa. Mane riguit, febris acuta. Sudauit calidum. A febre liber esse uisus est, non multū dormiuit. A somno frigiditas, sputatio. Vesperī multum delirauit. Paulo post uomuit nigra, pauca, biliosa. Nona frigiditas, multū delirabat, non dormiuit. Decima crura dolebat. Omnia exacerbata sunt, delirauit. Vndecima mortuus est.

AEGROTVS XIII

MVlierem quæ decumbebat in littore, trimestri foetu grauidam febris uēhemens corripuit, statimq; lumbos dolere cœpit. Tertia dolor colli, capitis, iuxta clauiculam, & manū dexterā. Statim lingua uoce destituta est. dextra manus resoluta est cum conuulsione, uelut his qui aliqua siderantur parte contingere solet. Delirabat penitus, noctem moleste tulit, nō dormiuit. aluus turbata est, ex biliosis, meris, paucis. Quarta die lingua uoce soluta est. Cōuulsiones eorundem, dolores omnium permanebāt. Iuxta præcordia tumor cum dolore, non dormiebat, penitus delirabat, aluus turbata. Vrinæ tenues, non boni coloris. Quinta febris acuta, præcordij dolor, planè delirabat. secessus biliosi, ad noctem sudauit, à febre libera. Sexta resipiscebat. Ab omnibus alleuata est. Verū circa sinistram clauiculam dolor permanebat, siticulosa. Vrinæ tenues, nō dormiuit. Septima tremor, in soporem incidit, parum delirauit, dolores iuxta clauic

M. ūlam

culam, & sinistrum brachiū permanferunt. Reliqua alleuata sunt. Omnia intellegebat. Tres dies à febre libera māsīt. Vndecima reuerfa est, superriguit, febris uehemens corripuit. Circa decimam quartam uomuit biliosa, flaua, fatis multa, sudauit. A febre libera iudicata est.

AEGROTVS XIII

MElidia, quæ decūbebat iuxta lunonis templum, capitis & colli, & pectoris dolor fortis coepit. Statim autē febris acuta corripuit. Mēses pauci apparebant. Dolores omniū horum cōtinui. Sexta die soporosa, anxia, horrida, rubor in maxilla, parū delirauit. Septima sudauit, febris dimisit. Dolores permanebant. Redijt. somni pauci. Vrinæ perpetuo boni coloris, uerū tenues. Secesus tenues, biliosi, mordaces, ualde pauci, nigri, graueolentes prodibant. In urinis subsidencia alba, leuis. Sudauit, iudicata est perfecte undecima die.

HIPPOCRATIS COI DE MOR-

BIS POPVLARIBVS LIB. II. IANO COR-

nario Medico Physico interprete.

SECTIO PRIMA



ARBVNĀVLĪ in Cranone æstiuī, pluebat in ardorib, aqua larga. Cōtingebat hoc per totū, & maxime ab austro. & subnascebantur quidem in cute sanies. dum autē intro concipiuntur, calescebant, & pruritū inducebant. Deinde pustulæ uelut ab igne inustæ excitabantur. & sub cutem uri sibi uidebantur, in ardoribus siccitatis. Febres plerūq; citra sudorē. In his uero si minutæ imbris guttæ deciderint, magis sudatorie fiunt ab initio. At hæc difficiliora iudicatu manent, q̃ aliter: At tamen minus, si non propter hæc fuerint, sed propter morbi modum. Febres ardētes in æstiuīs magis fiunt, & in alijs temporibus. Resiccantur autem magis æstate. Autumno maxime ferinū, & oris uentriculi dolor, quanquā & ipse minus maleficus fuerit, ipso morbo tali existente. Ascarides uesperī similiter huic. & illæ tunc infestant in die plerūq; nō solum ideo quod magis affligūt, sed etiā ipsæ per se ipsas. In autumno acutissimi morbi & maxime lethales. & omnino similitudinē habent, eo quod uesperī exacerbantur: tanq̃ annus ipse habeat circuitū morborū. Quale est dies morbi, quale est uespertinū tempus ad exacerbationē: Tale est morbi, & uniuscuiusq; cōstitutionis inter se, ubi non quid in superiori specie fuerit innouatum. Sin minus, alia sanē constitutione hæc imperiū obtinuerint. Quare etiā annus ad seipsum hoc modo se habet. In quietis ac constantibus temporibus, & annis tempestiue tempestiua præbētibus, boni status & iudicatu facillimi morbi fiunt. In incōstantibus uero, inconstantes & qui difficulter iudicantur: quum sanē in Perintho defecerit aut abūdauerit quid, ut aut uenti sint, aut non uētī: aut aquæ, aut siccitates: aut ardores, aut frigora. Verum autem omnino saluberrimum, ac minime lethale. Circa principia morborum cōsiderandum, an statim florent. Clārum autem hoc fit ex incremento. Incrementa uero ex circuitibus, & iudicationes quoq; hinc manifestæ fiunt, itēq; ex acerbationibus

bationibus in circuitibus, si citius accedant, aut non: & si diutius durent, aut non: & si magis affligant, aut non. Ex omnibus autem continuis aut intermittentibus, & diuturnis, & uulneribus, & sputis, & doloribus. Itemq; tuberculorum inflammationes, & quaecunq; alia posterius apparēt, fortassis autem & ex alijs communibus rebus, quæ quidem citius fiūt, breuiora sunt: Quæ uero tardius, lōgiora: quum etiam in circuitibus citiorem recursum, ac reliquum augmentum, morbus neget. Nam & eorum qui statim pereunt, uelociores sunt iudicationes, quoniam & dolores, & continui ac fortes. Quæ uero ad melius iudicant, non statim apparent. Iudicatoria non iudicantia, partim lethalia sunt, partim difficilis iudicationis. Quæ præiudicata sunt, si crudè iudicata fuerint, recidiuæ fiunt: Sin minus, iudicationis impeditiōes aut malæ iudicationes. Possunt etiam fieri pernicioſa, ea quæ non parua sunt. Quaecunq; iudicatoria signa fiunt, eadem hæc si non fiunt, difficilis sunt iudicationis. Quæ uero contraria significant, malum: non solum si recurrant, sed etiam primariæ naturæ contraria repētia. Quemadmodū etiam malorum signum, ea quæ ad contraria repunt. Considerare uero sic oportet, in cibis, compressionibus uenarum, tumoribus præcordiorum, sursum uergētibz, deorsum uergētibz. Sed & multa sunt eiusmodi, uelut abortientium mammæ grāciles fiunt, neq; enim contrarium est: Neq; tusses diuturnæ, quoniam ubi testis intumuit cessant: & testis tumor à tussi cessat & alleuatur: quæ res commune facit nos communis pectorum, mammarum, genituræ, uocis. Abscessus aut per uenas, aut per ossa, aut neruos, aut cutem, aut alias emōtiōes. Boni autē sunt qui infra morbum fiunt, uelut uarices, lumborum grauitates ex supernis. Optimi uero potissimum sunt inferni, & longissime infra uentrem, & remotissimi à morbo: & qui per effluxiōem fiunt, uelut sanguis è naribus, pus ex aure, sputum, urina, quæ per effluxiōem fiunt. At abscessus quibus hæc nō fiunt, sunt uelut dentes, oculi, nasus, sudor. Sed & quæ sub cutem abscedunt foras tubercula, uelut putrescentia, & quæ suppurantur, aut ulcus, aut eiusmodi pustulæ, aut squamæ, aut defluuū capillorum, uiriliginēs, lepræ, aut eiusmodi quæ abscessus sunt acruatim fluentes, & non semirepētes, & quæcūq; alia dicta sunt. & si nō pro rationis excretionis morbi dignitate fiant, uelut Temeni nepti, ex morbo forti ad digitum decubuit, qui quum non sufficeret ad suscipiendū morbum, recurrit, Mortua est. Abscessus aut per uenas, aut per aluum, aut per neruos, aut per cutem, aut iuxta ossa, aut secundum spinalem medullam, aut secundum alias effluxiones, os, pudendum, aures, nares, ex utero menses. Iudicationes postridie fiunt, uelut ad lumbos, aut ad femur, & ad testes: Quādoq; ex tussi, & testis ipse à seipso. Tufsiculosi abscessus, qui supra uentrē sunt, non similiter perfecte liberant. Sanguinis eruptiones largæ ex naribus plerunq; liberant, uelut Heragoræ, quod medici non animaduenerunt. Qui uoces asperas natura habent, his etiam linguæ subasperæ sunt, & quæcūq; asperitates à morbis similiter. Quæ igitur duræ sunt linguæ à natura, etiā sine morbo hoc habēt. Molles uero tardiores sunt, & ad peccatum, & ad bonum, quā prior natura. Consideranda sunt etiam longa capita, ex uiuendi ratione, & ceruices longæ, ab inclinationibus. & uenarū amplitudo & crassitudo, ab eadem, & angustia, ac latitudines, & breuitates, ac tenuitates, ex contrarijs.

Quorum uenæ amplæ, & uentres, & ossa ampla, hi sunt qui tenues sunt. Pingues uero his contraria habent. & in his qui fame macerantur, mediocritates. Ab his considerata ea sunt quæ præpropera incrementa unicuique detrahunt, & quæ diminutiones adaugent. & ea quæ incrementa coadaugent, & quæ corroborant. Et quæ sint communes uenarum dissectiones. Pectinum ruptiones quæ quidem circa pubem fiunt, ut plurimum statim sunt innoxie. Quæ uero paululum supra umbilicum in dextera parte, hæc dolorosæ sunt & anxiosæ, & stercoreis uomitum inducunt, uelut etiam Pittaco accidit. Fiunt autem hæc, aut à plaga, aut uulsura, aut alterius insultu: Quibus id quod medium est inter abdomen & cutem inflatur, & non sedatur. Color est uelut qui multum pallidus est, & qui ex candicante pallet: quoniã omne huiusmodi ab hepate est, & ex hoc sunt hepatici in his morbi. & morbi regij ab hepate, ad subalbidum colorem uergunt. & qui ex aqua inter cutem, & ex pituita alba laborant. Qui uero à splene sunt, tum hydropes, tum morbi regij, nigriores sunt. Sed & ulcera quæ ægre persanantur ex albidorum sunt, qui ferè lentis colorem referunt: & cutis diffringitur ac labia, uelut Antilochus habuit & Aleuas, ab humoribus ex corpore salsuginoso, quod sub cute maxime, & à capite contingit, quum à pulmone fuerit calefactum. Occasiones unde quis ægrotare coepit, considerare oportet, siue capitis sit dolor, siue auris, siue lateris. Signum autem sunt in quibusdam dentes, & in quibusdam inguinum tumores. Vicia sentia ac iudicantia febres, & tubercula: Quibus hæc non fiunt, iudicatio sublata est. Quibus intus relinquuntur, certissimæ recidiuæ ac celerrimæ. Crudos ac liquidos secessus, milium solidum in oleo coctum sistit. Exemplo est nautæ puer, & Myriochaune.

SECTIO SECVNDA

Mulier cor, hoc est os uentriculi dolebat, & nihil remittebat dolor. Huic polentæ pollen in mali punici succum inspersus, & semel in die acceptus in cibo satis fuit, & non reuomebat, uelut Charioni contigit. Mutationes profunt, si non ad praua mutantur, uelut his qui à medicamentis uomunt febrium gratia. Fines in meraciore desinentes, putrefactionem significant, uelut Dexippo. Serapis ex liquida aluo intumuit. Pruritus autem haud scio quot diebus, non ultra. Habebat autem & abscessum quendam in lateris molitudine, qui nigrefactus occidit. Et Stymargi uxor ex uentris per paucos dies turbatione, ubi multum in sistendo laborasset, & post pueri sexus foemine quadrimestris ex corruptione discessum sana facta esset intumuit. Moscho è calculo laboranti fortiter, in superna palpebra ordeolum obortum est magis ad aurem. Deinde intro exulceratum est. Quinta & sexta die ex internis pus erupit. Infernas affectiones soluit. Glandularum tumor ac inflammatio circa aurem erat, itemque inferne in collo, è directo superni tumoris. Aristæi uxoris frater fatigatus in uia incalescebat. Deinde in tibia tumores fiebant terebinthi fructui similes. Postea febris continua fiebat, & postridie sudor factus est, & alijs paribus diebus semper idem fiebat. Adhuc autem febris tenebat. Erat autem sublienosus. Ex sinistra nare sanguis erumpebat frequenter & paulatim. Iudicatus est. Postridie iuxta sinistram aurem tumor. Sequenti die etiam circa dextram, sed hic minor, & insuper tepefcebat. Hi euauerunt,

& non suppurati sunt. Qui ab Alcibiade uenit, ei ex febris modicis ante iudicationem testis sinister intumuit. Habebat autem splenem magnum, & sanè tunc iudicata est febris uigesima die. Deinde aliàs atque aliàs subincaleſcebat, & subfloridum ſpuebat. Cuidam manus dextra, & crus ſiniſtrum; quum ex tuſſi parum & nihil memorabile eieciſſet, ſiderationis modo reſoluta ſunt: alia uero nulla re alterata eſt, neque facie, neque mente: Nec uero adeò fortiter illis partibus. Coepit ad melius procedere circa uigefimam diem. Factum autem hoc eſt illi ſerè circa mēſium eruptionem, & fortaiſis tunc primum apparebant. Erat enim uirgo, Apocemantus & pater fabri illius qui caſput fregit, & Nicoſtratus non extuſſiebant quicquam. Erant autem alibi circa rhenes dolores. Interrogationes factæ ſunt, dicebant ipſos ſemper repleti potu aut cibo. Dolores fortiſſimos quò modo dinouerit quis conſpicatus, fuga, tolerantia, experientia, & timiditates indicant. Aqua quæ cito caleſcit, & cito frigefcit, ſemper leuior eſt. Cibi & potus experientia opus habent, an ad æqualitatem maneat. Dicendum quòd ubi ſanguis effluxit, excaleſcunt, & quæcunque alia huiuscemodi. Abortus maſculus ſexaginta dierum, in partiū ſuppreſſionibus ſalubris. Hercules intumeſcebat mali ipſius die octaua. Magis ex dyſenteria laborat, quiſquis ſanè etiam è reneſmo uexatur. Quædam lactans puſtulas per corpus ubique habebat. Poſtquam autem lactare ceſſauit, ſedatæ ſunt per æſtatem. Coriarij illius qui coriacea præparabat, uxori, quum peperiſſet & perfecte exoluta eſſet, uiſum eſt de ſecunda membranofum quiddam remanere: diſceſſit autem quarta die male. Nam urinæ ſtillicidio uexabatur. Statim concipiens peperit maſculum. Habebat autem iam multos annos, & poſtremum neq; mēſes prodibant. Quando autem peperiſſet, urinæ ſtillicidium paululum intermittebat. Quædam priuſquam conciperet, coxam dolebat. Poſtquam autem concepit, non amplius dolebat. Vbi uero peperit, uigefima die rursus doluit. Peperit igitur maſculum. Prægnanti in tibia inferne dextera, tertio aut quarto mēſe puſtulæ, ad quas manna thuris utimur, itemq; in manu dextera iuxta magnum digitum: haud ſcio an peperit, reliqui enim ipſam ſemeltrem, habitabat autem uelut ego puto, in ædibus Archelai ad rupem. Antigenis uxor habitabat iuxta Nicomachum, peperit puerum carnoſum quidẽ, uerum qui haberet maximas partes diſcretas, magnitudine uero eſſet quatuor digitorum, & ſine oſſibus, deinde cræſſus ac rotundus. Hæc autem anhelofa erat ante partum. Deinde ſimul cum partu pius reuomuit modicum, uelut ex furunculo uocato tuberculo. Quæ filias peperit gemellas, & difficulter peperit, & non ualde purgata eſt, tota intumuit. Deinde uenter ipſi magnus fiebat. Reliqua uero reprimebantur. & rubicunda prodibant uſque ad ſextum mēſem. Deinde alba ualde per omne iam tempus. Atque hæc fluxiones ueneri officiebant, & mera rubicunda ipſi profluebant. In diuturnis inteſtinorum leuitatibus ructus acidus ſiens, antea nūquam factus, ſignum bonum; uelut Demænetæ contigit. Fortaiſis autem licet etiam arte parare. Nam turbationes eiufmodi alterāt. Fortaiſis autem & ructus acidi inteſtinorum leuitatem ſoluunt. Sanata eſt ueratri potione Lycia, poſtremum ſplen maſ-

gnus, & dolores, & febris, & ad humerum dolores. Et uena quæ in splene est, in cubito secabatur. & saliebat quidem sæpe, Aliquando uero etiam non est secta, sed unà cum sudore sanguis penetrauit, aut sua sponte. Ex quo autem prodibat, Splen dextera parte intendebatur, spiritus intus duplicabatur, non tamen magnus, mente mouebatur, contegebatur, flatus inerat, non prodibat inferne quicquam, nec mingebat. Mortua est ante partum. Quæ circa fauces ad alterutram partem repentina processerunt, exulcerata non sunt, ad sinistra transiuerunt, ad splenem dolor uenit citra iudicationem. Hic roni iudicatio facta est decima quinta die. Coi sorori hepar eleuatum est splenico modo. Mortua est secunda die. Bion simul multum mingebat quod non subsidebat, & sanguis ex sinistra nare manabat. Erat enim & splen sursum in gibbum eleuatus, ac durus, superstes mansit, recidiua. Erant autem anginosorum affectiones hæ. Colli uerticula intro uergebant, quibusdam amplius, quibusdam prope. Et collum forinsecus conspicuam cavitatem intro habebat, & hac parte ad contactum dolebat. Erat autem & cuidam infra os dentis appellatum, quod non similiter acutum est: quibusdam uero etiam ualde rotundum, maiore circumferentia. Si non cum dente appellato, fauces non inflammatae, uerum iacentes. Partes sub maxilla tumida, non inflammatis similes. Neque glandulae ulli intumuerunt. Sed magis secundum naturam. linguam non facile uertebat, ipsisque & maior esse uidebatur, & prominentior. & sub lingua uenae conspicuae. deglutire non poterant, aut ualde difficulter. Immo ad nares fugiebat, si ualde cogerent. & per nares loquebantur. Spiritus autem his non ualde sublimis. Quibusdam uero uenae in temporibus, & in capitibus ac ceruice eleuatae. At recrudescentibus, ex his, parum quiddam tempora calida, etiam si alias non febricitarent. Non suffocabantur plurimi, nisi quum deglutire cupiebant, aut saliuam, aut aliud quiddam. Neque oculi intus desidebant. Quibus igitur tumor erat rectus, nec in alteram partem uergebat, hi neque leuiter sideratorum modo resolvebantur. An uero aliquem perisse uiderim, in memoriam reuocabo. Quos autem nunc noui, superstites manserunt. Erant autem partim celerrime aleuantia. Plurima uero ad quadraginta dies deueniebant. & in hoc plerique etiam sine febre. Multi uero etiam ad ualde longum tempus, partem aliquam tumoris habebant. Et deglutitio, & uox indicabat. & columellae liquecentes significationem quandam prauam exhibebant, quamuis nullum grauius malum habere uidebantur. Qui uero tumores ad alteram partem uergentes habebant, hi unde uerticula inclinata fuerunt, isthic resolvebantur. Atque inde ad alteram partem distrahebantur. Erant autem hæc in facie maxime conspicua, & in ore & intersepto iuxta gurgulionem. Sed & maxime inferne pro ratione immutabantur. Caterum resolutiones leuiter sideratorum modo, non per totum corpus fiebant ueluti ex alijs, sed usque ad maxillum, ab anginosa affectione. Atque hi & matura expuebant, eaque pauca ac difficulter. Quibus autem in rectum tumor tendebat, iidem expuebant. Quibus uero etiam cum febre, hi multo magis & difficulter spirabant, & aliena loquebantur, & uenae his magis eleuatae. Et pedes omnibus quidem

quidem frigidissimi erant, maxime autem his. Et hi ad erecte standum impotentiores erant. Et quidam non statim moriebantur. Quos autem ego noui, omnes mortui sunt.

SECTIO TERTIA.

Constitutio temporis.

IN Perinthum circa solstitium ferè æstiuū uenimus. facta autem est hyems Clementi ccelo, austrina. Ver & æstas ualde sine aquis usq; ad pleiadum occasum. Nam si etiam quid aquæ cecidisset, id erat uelut minutæ roris guttæ. Et Etesia non ualde spirarunt. Et qui spirarunt, diuulse id fecerunt. Aestate febres ardentes populariter grassatæ sunt multæ. Erant autem sine uomitu. & alui turbatæ ex tenuibus, aquosis, non biliosis, spumosis, multis, quæ aliquando deposita etiam subsidetiam habebant, ex quibus sane etiam id quod sub dio noctu exponebatur, simile erat. Aequales specie alui secessus semper, malum. In his multi soporosi erant, & mente moti. hi uero ex somnis tales fiebant. Quum autem suscitati essent, omnia intelligebant. Spiritus sublimes, non tamen ualde. Vrinæ tenues quidem plurimis & pauca, aliæ autem non decolores. Sanguinis eruptiones e naribus non fiebant, nisi paucis: neq; parotides iuxta aures, de quibus postea scribam: neque splenes attollebantur, neque dextrum præcordium, neq; dolorosum ualde, neque fortiter intentum erat. Erat tamē quid quod iudicationem faciebat. Et maxime iudicabantur omnia plerūque circa decimam quartam diem, pauca cum sudore, pauca cum rigore. & ualde paucis recidiuæ fiebant. At uero sub minutas uelut roris guttas quæ in æstate fiebant, apparebat sudor. In febricitantibus etiam quidam sudores statim ab initio fiebant, non tamen maligno modo. & quibusdam sub hoc tempus etiam iudicatio facta est cum sudore. Fiebant autem in febris æstiuis, circa septimam, octauam & nonam diem, aspretudines in cute miliaceæ, culicum morsibus maxime similes, nō ualde pruriginosæ. Hæ perseverabāt usq; ad iudicationem. Nulli equidem masculo tales eruisse uidi. Mulier autem nulla mortua est, cui hæ fiebāt. Et graui auditu præditæ & soporosæ erant. Prius autem non ualde soporosæ erant hæ, quibus illæ affuturæ essent. Non tamen in totum durabant, Verum soporosæ & somnolentæ erant per æstatem, & usque ad pleiadum occasum. Postea uero magis uigiliæ aderant. Sed neque in totum ab hac constitutione moriebantur. Aluum igitur per cibos sistere non dabatur, immo præter rationem putasset quis mederi conducere, etiamsi minus multa quibusdam prodirent, per hoc quod in frigore quis iaceret strato supposito. Nam ulcerat quidem frigidum, calefacit autem eiusmodi species sensim progrediendo adhuc magis, etiamsi nulla afflictio naturæ accedat. & in quibus, & qualia signa, & plura aut pauciora fientia, oscitatio, tussis, sternutatio, distentio cum oscitatione, eructatio, flatu: omnia talia corrumpunt. Quibus in febris anxiosis, horridis, rubescunt facies, lassitudines, oculorum dolores, capitis grauitates, resolutiones leuiter sideratorum modo, & menses si apparuerint, maxime quibus primum, sed & uirginibus & mulieribus, quibus per tempus: Sed & quibus non in quo solet tempore, aut uelut oportet apparent. Deinde pallidæ

fiunt. Magnum autem in omnibus, id quod & cōsequenter fit, & in quo tempore, & in quibus. Valde biliosis, in febribus maxime, omnino quibusdam ad crura purgatio. Medicamentorum modos scimus, ex quibus qualia, & quæ fiunt. Non enim omnes similiter, sed alij aliter componuntur. Et alibi citius, aut serius, in manuum tractationes assumuntur, uelut est aut ficcare, aut tundere, aut coquere, & eiusmodi. Omitto plurima, quæ unicuique, & in quibus morbis, & quo tempore morbi, ætatem, speciem, uictum, qualis hora anni, & quæ, & qualiter procedat, & huiusmodi. Zoilo iuxta murum ex tussis matura, febris acuta, & faciei rubor, & aluus intercepta, præterquam ad necessitatem coactè, lateris sinistri dolor, & auris è directo ualde dolorosa, & caput non usque adeò. Spuens semper suppuratum ægrotabat. Sed alia iudicata sunt, & iuxta aurem pus multum erupit, circa octauam aut nonam diem. Principia uero noni diei ex dolore auris. Haud scio quomodo sine rigore iudicatio facta est. Sudauit caput ualde. Et hic sudor firmus erat, quod quidem ardor etiam sinistri lateris esset. Superne unà cum aure dolor sedatus, maxime circa scapulas: Sed & ante sputa multa, ab initio florida reiecta, & circa septimam aut octauam diem. Deinde laboriosa. Aluus restitit usque ad nonam & decimam diem. Dolor extinctus est. Tumor remittebat, & sudores fiebant parui, non autem iudicabant. Manifesta autem erant hæc tum ex alijs, tum ex secessu. Nam incipiente auris dolore, etiam uenter turbatus est. Erupit autem ex aure nona die, & iudicatus est morbus decima quarta sine rigore eadem die. Sed & sputum largius ibat, & maturius, postquam auris erupit. Sudores autem, & serpentina ulcuscula ad multum tempus, in capite fiebant. Resiccata sunt tertia die. Quæcunque sine signo iudicationis iudicatorio disparent, male iudicata sunt, uelut Erysipelas ancillæ Polemarchi. In glandularum tumoribus febres, malum, exceptis diarijs. Et in febribus glandularum tumores, deteriores, qui in acutis ab initio uigorem remiserunt. Spiritus, præcordijs eleuatio mollis, & intentio neutra, in ipsis superne rotundum, in dextris uelut circumferentia suppuratoria, aliud longius magis, aliud diffusum, aliud deorsum repens, & hinc atque hinc distentio usque ad umbilicum. In omni sursum uersus è directo latione, si reuocetur, & in rotunditatem concludatur, quatenus quidem spiritus fuerit, citra iudicationem calore attenuatur. Si uero hunc effugerit, ad suppurationem procedit.

Spiritus densi, parui: magni, rari, parui, rari: extra magnus, intra paruus, alius quidem extendens, alius uero urgens, dupla intro reuocatio, uelut superinspirantibus, calidus, frigidus. Medela assiduarum oscitationum spiratio longa. Non potantibus, & uix, spiratio breuis. E directo etiam laterum intentio dolorosa, & præcordiorum intensiones, & splenis eleuationes, è naribus eruptiones. Quæ relinquuntur post iudicationem, reciduas facere solent. Primum itaque lienis eleuationes, si non ad articulos finierint, sanguinis è naribus eruptio fit, aut præcordij dextri intentio, si non penetrauerint urinæ. Hæc enim est interceptio utrorumque, & reciduas horum merito fiunt. Abscessus igitur horum facere oportet si non fiant, eos uero qui iam fiunt declinare. Eos autem excipere, si prodierint iam, & qualia

oportet

oportet, & quia parte oportet. Qui uero non ualde, eos coadiuuare. Eos uero auertere, si omnino incommodi fuerint, maxime si hi affuturi sunt: sin minus, si iam ueniunt.

Quarta die fientes sanguinis è naribus eruptiones ægre iudicant. Febres quæ una die intermittentes, altera superrigent, unà cum iudicatione, ad septimum circuitum durant. Scopo ex mucosis, biliosis, & faucium inflammatione, malo uictu uso aluus suppressa est, & febris acuta facta, & lingua florida, & uigil sine somno. Pectinis intentio fortiter, æqualiter, paulatim ad infernam partem in dextris. Spiritus subdensus, præcordia dolebat, & respirans, & quum uerteretur. Sine tussi uero excreabat subcrassa.

Peplus ipsi data, à præcordio quidem depulit, transiuit autem nihil. Postridie glandes duæ appositæ non apparuerunt. Vrina crassa & turbata. Subsidentia leuis & plana. & restitit aluus in turbulentia, uenterq; mollior erat. Et splen eleuatus, & deorsum uergens factus est. Potu utebatur aceto mulso dulci, aut fauorum cremore cocto. Decima sanguis ex sinistra nare aquosus paucus uenit: non autem ualde infirmus erat ob hoc ipsum, & urina subsidentiam habens. In subsidentia uero subalbum quiddam adhærens uasi, tenue, neque genituræ simile, neque dissimile. Defluxit hoc breui. Postridie iudicatus est, à febre liber, & subiit subuiscosum undecima die. Hoc uero circa defluxum erat quid biliosum. Vrinæ uero purgatio multa, tum copia, tum subsidentia. & priusquam uinum bibere inciperet, ferè pituitæ similis. Penetrauit autem undecima die, ut quæ non esset multa. Viscosa uero erant stercora & turbata.

Huiusmodi autem iudicatorio modo fiebat. Nam & Antigenis in Perintho tale erat.

Quæ circa linguas eleuantur collectiones, & humiles calculi, & quæ podagricis fiunt, circa debiles illorum articulos sunt. Nam ossium natura causa est, ut hæc & indurentur, & distendantur.

Collectio Hippostrati uxori ex quartana annua ad fastigium eleuata est, quum subfrigida palam esse uideretur, impetus in totum corpus factus est, & sudor. iudicata est hoc modo, & postea menses plures copia & tempore. Tunc enim suppressi fuerant. Abscessus non consistere uisus est.

In pulsantibus sanguinem fundentibus figura ampla, & in totum si ex omnino decliui accliuæ fiat. Quapropter etiam deligationes in uenarum sectionibus impetum faciunt. fortes uero sanguinem impediunt.

Sanguineum & subbiliosum, ructum acidum facit. Fortassis autem ad atræ bilis morbum his desinet.

Rigores incipiunt mulieribus quidem magis à lumbis, per dorsum ad caput. Sed & uiris posteriore corporis parte magis quàm anteriore, uelut cubitis, femoribus. Sed & cutis rarsa. Indicat autem pilus animantium.

Quibus nihil intra constitutum tempus accidit, singulis partus uitales fiunt.

Apparentia in quibus mensibus fiunt. Labores in circuitibus, Quicquid in septuaginta mouetur, in triplicatibus perficitur. Post menses, dextera & sinistra hiant.

Humiditas per prodeuntia, requirit dietam siccissimam.

Quod citius motum est ac discretum, rursus augetur etiam tardius, & ad longius tempus.

Labores, circa quinquagesimum tertium diem, & circa centesimum sextum.

Labores tertio, quinto, septimo, nono mense, & secundo, ac quarto.

Quæ nosse oportet ad septimum mensem, aut à mensium fluxu numerandi sunt nouem menses,

aut à conceptione, & ad septuaginta ac ducentos dies, græci menses fiunt. & si

quid

quid amplius ultra hos est, & aut masculis, aut etiam foemellis, hæc sunt, aut contraria. A cibis & potibus humeri ac mammae inflantur, & impotentia, & inflationes in capite, incrementa faciunt, donec ossa fuerint solida facta.

Menstruorum purgationum circuitus est. Quæ ante has sunt grauitates, similes sunt laboribus octimestribus. Primipararum lac, alimento quidem transmutatione accipiente, octimestri uero perficiente. Si in uulneribus fortibus, tumor non appareat magnus, malum. Laxi bonum: sursum pascētes, peius. Menstruæ purgationes similes octimestribus, in tendentibus ad decimum mensem fientes, malum. Quibus tumores in ulceribus, non ualde cōuelluntur, neq; infaniunt. His autem dērepente dissipatis, quibus quidem ad posteriores partes, conuulsiones cum doloribus, quibus autem ad anteriores, aut infania, aut dolores lateris acuti, & dysenteria rubra. Tumores præter rationem alleuantes, prauum: uelut Andronici filio Erysipelas recurrit: si non ad eundem locum rediens, bonum quid significet. Hoc ex natiuitate circa aurem, ad pubem distributū est. Alteri tertia ex natiuitate die factum, suppuratū est nona. Hic septima die sanus euasit. Maligniora sunt quæ dērepente disparent.

SECTIO QUARTA.

De uenis.

Hepatitis in lumbis usq; ad magnum uerticulum, inferne etiam uerticulis se ingerit: hinc subleuata per hepar, & per septum transuersum ad cor, & quæ quidem recta est, ad clauiculas: hinc alia quidem ad collū, alia uero ad scapulas, alia deorsum deflecentes, ad uerticula & costas declinant. Et ex sinistris quidem, una prope clauiculas. Ex dextris uero ad quendam ipsarum locū. Alia uero utrinq; deflexa. Alia paulo inferius deflexa, ubi quidem illa deficit, costis se ingerit, donec ad uenam in ipsum cor accesserit, ad sinistras deflexa. Infra autem decurua ad uertebras descendit donec perueniat, & inde incipit eleuari ingerēs se costis reliquis omnibus, hinc atq; hinc singulis ramulos præbens, quum sit una: à corde quidem ad locum quendam à sinistris magis procedens. Deinde infra arteriā, donec consumpta fuerit, & uenerit eò unde hepatitis subleuata est. Priusquam autem eò uenit, circa extremas duas costas diuisa est, & partim ab hac, partim ab illa uerticulorum parte progressa consumitur. Quæ uero recta à corde ad clauiculam tendit, supra arteriā est: & ab hac, uelut etiam iuxta lumbos infra arteriam, ad hepar insilit, partim in portas & pinnas, partim in reliquum deinceps procedit paulo infra septum transuersum. Septum autem transuersum adhæret hepati, neq; facile est ipsum separare. Duplices porro uenæ à clauiculis, alteræ hinc alteræ isthinc, sub pectus ad pectinem procedunt: quò uero hinc, nondum scio. At Septum transuersum infra iuxta uerticulum quod est infra costas, qua rhenes ex arteria, ea parte consurgunt: Verrum arteriæ ex ipso rhene oriuntur, hinc atq; hinc ab arteria neruum habentes. Atque hac parte alicubi in recurrente à corde Hepatitis desinit. Cæterum ab hepatide per septum transuersum maximæ duæ, altera hinc, altera isthinc, sublimes feruntur, multitudineq; per septum sunt, & circa ipsum cōsistunt in superiora parte, atq; hæ magis sunt conspicuæ. Duo uero nerui à cerebro sub os magni uerticuli, ex supernis & ad gulam magis, ab utraq; arteriæ parte descendunt, & uterque in seipsum incidens, uni similis, ubi uerticula & septum sunt,

ibi definūt. & quidam ambigui, ex hac societate ad hepar & splenem ipsos tendere putauerūt. Alius nervus ab utraq; uerticulorum parte iuxta clauiculam ad spinam procedit, ex obliquo uerticulorū, & ad costas distribuitur, & quemadmodum uenæ, sic hi per septum, ad mesenterium mihi tēdere uidentur. Vbi autem hæ deficiunt, rursus hinc ubi septum exoritur, ab eo cohærentes ac continui existentes, iuxta medium infra arteriam, deinceps ad uerticula distribuuntur, quemadmodum uenæ, donec ad sacrum os progressi consumuntur. In Aeno ex assiduo leguminum esu, sceminæ & masculi, crurum impotētes facti sunt, ac uitam degerunt. Sed & his qui eruo uescuntur, genua dolent. Diligentia adhibenda est ut excandescencia inducatur, & coloris reparandi, & sanguinis in uasa subter cuticulam colligendi gratia: itemq; læticia, & timor, & huiusmodi. & si quidem reliquum corpus simul ægrotarit, simul curare: Sin minus, satis est. Stymargi famula Idumæa erat, quæ ubi filiam peperisset, cōuersum est ei uteri osculum, & dolor ad coxam & crus. Iuxta malleolum secta uēna liberata est, & quidem quum etiam tremores totum corpus detinerent. Verū ad causam deuenire oportet, & ad causæ principium.

SECTIO QVINTA.

Naturæ indiciorum notio.

Quicunq; fului, naso acuto, oculis paruis, mali. Quicunq; fului, simi, oculis magnis, boni. Hydropici rauos oculos habent, & calui sunt. Vocis gracilitatem soluit uarix, ad sinistrum & dextrū testem, absq; horum altero fieri non potest ut soluatur. Magni, calui, balbi, gracili uoce præditi, boni. Morbos autem habent, balbus, aut caluus, aut gracili uoce præditus, aut hirsutus, fortiter atrabiliarios. Qui lingua offendunt, & labiorum non sunt potentes, eos necesse est dum illa soluuntur, suppuratos fieri. Dolorem in locis infernis fortem, surditas soluit, itemq; sanguis multus ex naribus erumpens. Insania magni morbi ex more fientis solutio. Si puerperis conuulsio fiat, febrem excitato: & cerato multo tepido in uesicam immisso, ac per clysterem infuso colluito.

Si capitis os fractum fuerit, lac, & uinū ammixta aquæ pari mensura, bibenda dato. Si uero ulcus fuerit, internas uenas secato, si non febricitet. Si autem desipiat, caput irrigato, si non præcordia fuerint eleuata. Si caput doluerit, ad pectus descendit, deinde ad præcordia, postea ad coxam, Omnia uero ut doleant fieri non potest. Ventositatem flatuosam uenæ sectione, fluxionem pharmaco illito sistito. Fluxus enim ex uena magna est. Si uero sua sponte multum fluat, ieiunct: aut aquæ partes duas, lactis quatuor bibat. Infoecundas fomentis ac medicamentis curato. Quicunq; derepente uoce destituuntur, si sine febre fuerint, ipsis uenā secato. Pituitæ fluxiones ex mammis trahunt oculi, & eructant per nares ad pulmonem. Quibus tussis sicca est, his non soluitur, nisi dolor fortis ad coxas, aut ad crura, aut ad testem irruat.

Si hydropicum tussis corripiat, siquidē statim animo linguatur, calidis omnibus utatur: Sin minus, inebriato, ac cibis ipsum impleto. Venas autem internas secato, dum morbus magnus in intentione est. Solutio coxarum doloris, oculorum distortionis, cæcitas: testium tumoris, mammarum eleuatio.

Si febre tenente, partes circa faciem graciles fuerint, in die impari, sequenti dissoluetur. Hydropicus si tumorem in cruribus habens tussiat, malum.

Si aures

Si auris doleat, lacte utatur. Si non in die impari febris dimittat, recidiuare necesse est. Cui uena in cubito pulsarit, insanus & iracundus est: cui uero quie uerit, stupidus. Vulnus si sanguinē fundat, ulcus ne madefacito, uerum caput calida rigato. Si os uentriculi doleat, panē calidum cum uino meraco exhibeto. Vomitus solutio. aquam calidam bibendam dato, & uomat. Quæcūq; corrupta torpescunt, euulsa uena ulcerato, ac sanato. In conuulsione digitorum manus citra febre, uenam secato, si non caput doleat: Sin minus, aquam calidam affundito. Ad oculos. Spodij partem duodecimam, croci quintam, nucleoli oliuæ unam, cerusæ unam, myrrhæ unam. Aquam frigidam super caput fundito. & allia cum maza edenda dato. Varices caluorū si nō magni fuerint, furiosi sunt. Ad uiriliginem & lepram. Calcem in aqua adhibeto, ut ne exulceres. Secundarum purgatio si non discedant. Sternutatorium ad nares apponito, ut sternutet, & sternutantis nares ac os apprehendito.

SECTIO SEXTA.

Naturæ indiciorum notio.

CApit magnum, oculi parui, balbi, iracundi sunt. Qui longæ uitæ sunt, plures dentes habent. Balbi, celeri lingua præditi, atræ bilis humori obnoxij, biliosi q; sunt, oculis non nictantes, iracundi. Magnum caput, oculi nigri & magni, nasum crassum & simū habentes, boni. Oculi rai magni, caput magnum, ceruix tenuis, pectora angusta, cōgrue adaptati hominis sunt. Caput paruum habens, neq; balbus esse poterit, neq; caluus, nisi fuerit glaucus. In conuulsionibus si uox in die impari soluitur, à magno morbo liberat. Puerperæ febricitanti & dolenti aquam affundito, & ptisanam crassam ter in die calidam dato. Puer nutritur septimo mēse, aut nono, aut decimo, & uoce firmatur, & robur sequitur, & manibus ualidus fit: dum uox soluitur, omnia soluitur. Solutio enim similis est uoci. Soluitur autem in die impari. Si uenæ pulsauerint in manibus, & facies sana ac robusta fuerit, & præcordia non fuerint mollia, diuturnus fit morbus, qui sine conuulsione non soluitur, aut sanguinis multi ex naribus eruptione, aut dolore ad coxas. In gutturis dolore, aquam calidam super caput fundito, si non frigus fuerit: Sin minus, farinam q; calidissimam dato, & uinum meracum. In turbatione uentris, fabas coctas dato, si non supernæ partes abunde fuerint biliosæ. Aut cuminū cum fabis edendū dato. At interceptio morbi fieri nō poterit, nisi in die impari. Neq; principiū fieri poterit, nisi in die parī, itemq; mense ac anno parī. Nitrum autem Aegyptium, & coriandrum, ac cuminū cum oleo terito, & uentri illinito. Qui moriuntur eos necesse est die impari, & mense impari, & anno impari mori. Bonū autē fuerit prædicere mortem, aut dolores fortes. Quorū oculi robusti non sunt, his mors breui imminet. Si uero in impari anno fiat, ab utrisq; impares fieri necesse est. Si aut in anno parī & die parī, necessariū est in impari die mori. Ex numero tertia fortissima est. Anginā & lippitudinē uenæ sectio. Vulnerato intestino, respiratio prodit inferne incōspicua iuxta uulnus, & euacuatur pectora. Dato igitur lac & uinū, pari aquæ mēsurā ammixta. Quorum pectora bilem generant, balbi, furiosi, & calui sunt. Quicūq; horum ex natiuitate etiam strabones, hi imprudentes sunt, aut calculosi aut insaniētes. Quibus autem non, alterius mali solutio fit. Circa naturam plurimam uim habet mamma dextera, oculus

oculus dexter, & quæ infra sunt hac parte. Nā & masculi dextris inhærēt. Mulieribus menses ut sistas, cucurbitam maximam ad mammam affigas. Trimestris puer omnia præ se fert, & lac tunc habet. Si multum fluat lac, necesse est foetum debilem esse. Si solidiores fuerint mammae, sanior est foetus.

Vena crassa est in utraq; mamma: quapropter maximam habent prudentię partem. Vrinæ stillicidium soluit uenæ sectio. Si superni loci turgent qui sunt circa caput, ulcerum purgatio, uomitus, hydrops. Auentris turbatio-

ne, aut à tussi, si cancer fiat, os amarescit. Dato aut elaterium bibendum bis aut ter, si non balbus fuerit. Deligare uero oportet florem eris ustum, donec fuluus euaserit, & spongiam, si non balbus fuerit. In anxietate, horrore, oscitatio-

ne, dato uinum pari aquæ mensura ammixta. Ad auris dolore cucurbitam affigito. Quicquid supernarū partiū doluerit, dolor ad coxas, aut ad genua, & anhelatio fiens, omnia hæc soluit. In uoluulo molli, frigidum uinū mul-

tum meracum pro ratione dato, donec somnus, aut crurū dolor fiat. Soluit autem & febris, & dysenteria citra dolorem. Si præcordia distenta fuerint, manu comprimito ac lauato. Ad paronychiam unguium abscessum, gallin-

gra cum melle. Aqua secedente, lactis heminas octo bibendas dato. Si uero uomat, & non bibat, allij aut ceparum intritum dato. Ut mulier in utero concipiat, polypos paruos super flamma calidissima affatos, & ferè semiambu-

stos, edendos dato. Et nitrum Aegyptium tritum, coriandrūq; ac cuminū, in pastillos efformato, in pudendumq; subdito. Si ex crapula caput doleat, uini meraci heminam bibat. Si uero aliter caput doleat, panem q̄ calidissimum cum uino meraco edat.

Si hominem calor corripiat, nō à bile, neq; à pituita, sed aut à lassitudine, aut aliàs febriat, aquam multam calefacito, deinde ea superinfusa caput rigato, donec pedes sudarint: & farinam crassissimā coquito.

Postquam autem pedes sudarint, farinam plurimam & calidissimam edens, ac uinum meracum in super bibens, uestimētis contactus facile quiescat. Aut narcissi duo aut tria capita in coena edat. Qui insania corripitur, ei hoc signū præfagit, sanguis colligitur ipsi ad mammas.

HIPPOCRATIS COI DE MOR-

BIS POPVLARIBVS LIB. III. IANO COR
nario Medico Physico interprete.

SECTIO PRIMA.

AEGROTVS I.



PETHION qui habitabat iuxta telluris templum. Coepit tremor à manibus prima die, febris acuta, delirium. Secunda omnia exacerbata sunt. Tertia eadem. Quarta ab aluo pauca, mera, biliosa prodierunt. Quinta omnia exacerbata sunt, tre mores perseverabant, somni tenues, aluus restitit. Sexta sputa uaria, subrubra. Septima os distractum est. Octaua omnia exacerbata sunt. Tremores perseverabant. Vrinæ ab initio

quidē, & usq; ad octauā tenues, decolores, in medio pendens nubilosum quidam habebant. Decima sudauit. Sputa aliquantulū matura, iudicatus est, & uri

N næ

næ subtenues circa iudicationem. Post iudicationē uero, quadraginta diebus postea suppuratio circa sedem, & abscessus factus est cum urinæ stillicidio. p. m. v. q. s. hoc est, probabile multitudine urinæ quadragesima sanatum.

AEGROTVS II

Hermocraten qui ad nouum murum decumbebat, febris uehemens corripuit. Cœpit autem dolere caput, lumbos. Præcordij distentio molliter. Lingua ab initio adusta est. Surditas statim. somni non aderant. Siticulosus non ualde. Vrinæ crassæ rubræ, depositæ non subsidebant. Ab aluo uero non pauca combusta prodibant. Quinta minxit urinas tenues, habebant quid in medio pendens, non subsidebant. Ad noctem mente motus est. Sexta morbo regio correptus est. omnia exacerbata sunt. non resipiscebat. Septima molesta fuit. Vrinæ tenues similes, similiter etiam sequentibus diebus. Circa undecimam omnia uisa sunt alleuata esse. Sopor cœpit. Vrinæ crassæ subrubræ, infra tenues, non subsidebant. Placide resipiscebat. Decima quarta à febre liber, non sudauit, dormiuit, intelligebat omnia. Vrinæ consimiles. Circa decimam septimam redijt, calefactus est, sequentibus diebus febris acuta. Vrinæ tenues. Rursus autem uigesima die iudicatus est, à febre liber, non sudauit. Cibus fastidiebat per totum tempus. resipiscebat, loqui non poterat, lingua arida, non sitiebat, dormiebat soporosis. Circa uigesimalam quartam calefactus est. aluus lubrica multis tenuibus fluens. & sequentibus diebus febris acuta. lingua combusta est. Septima & uigesima mortuus est. Huic surditas perpetuo perseverabat. Vrinæ crassæ & rubræ non subsidentes. Aut tenues decolores, & in medio quid pendens habentes. gustare autem non poterat. p. s. s. v. s. m. hoc est, probabile secessibus suppressis uigesima septima mortuum.

AEGROTVS III

Qui in Dealcis horto decumbebat, capitis grauitatē, & tempus dextrum dolorosum habebat multo tēpore. Cum occasione uero febris corripuit, decubuit. Secunda die ex sinistra nare modicus merus sanguis fluxit. Ab aluo stercorea probe prodierunt. Vrinæ tenues, uariæ, in medio pendens quiddam habentes minutim dispersum. uelut farinæ crassiores, & genituræ similes. Tertia febris acuta, Seccessus nigri, tenues, spumosi, subsidentia secessibus liuida, somno grauiore aliquātulum premebatur, moleste surgebat. Vrinis subsidentia liuida, subuiscosa. Quarta uomuit biliosa, flaua, pauca, paulo post ærugiosa. De sinistra nare modicus merus sanguis fluxit, Seccessus similes. Vrinæ similes. sudauit circa caput & clauiculam. splen eleuatus est. femoris dolor è directo. Præcordij dextri distentio submollis. nocte non dormiuit. parum mente motus est. Quinta seccessus plures, nigri, spumosi, subsidentia secessibus nigra. nocte nō dormiuit, mente motus est. Sexta die seccessus nigri, pingues, uiscosi, graueolentes. dormiuit, intelligebat magis. Septima lingua sicca, siticulosus, nō dormiuit, mēte motus est. Vrinæ tenues, nō boni coloris. Octaua seccessus nigri, pauci, cōpacti. dormiuit, intelligebat. siticulosus non ualde. Nona riguit, febris acuta. sudauit. frigiditas. mente motus est. dextro oculo distortus est. lingua arida, siticulosus, infomnis. Decima circa eadē. Undecima intelligebat per totum omnia, à febre liber. sudauit, urinæ tenues circa iudicationem. Duobus diebus

diebus à febre liber fuit, decima quarta redijt. Statim autem nocte nō dormiuit, penitus mente motus est. Decima quinta urina turbata, qualis ex his quæ subſiderunt fit, quum fuerint agitata. febris acuta, penitus mente motus est, non dormiuit, genua & tibias dolorosa habebat. ab aluo ſubdita glande, ſtercora nigra prodierunt. Decima ſexta urinæ tenues, habebant quid in medio uehens nubilolum, mentē motus est. Decima ſeptimā mane extremitates frigidae, contegebatur, febris acuta. ſudauit per totum. alleuatus est. intelligebat magis. non à febre liber, ſiticulosus. Vomuit bilioſa, flaua, pauca. Ab aluo ſtercora prodierunt paulo poſt nigra, pauca, tenuia. Vrinæ tenues, non boni coloris. Decima octaua non reſipiſcebat. ſoporofus. Decima nona per eadem. Vigefima dormiuit, omnia intelligebat. ſudauit. à febre liber. non ſitiebat. Vigefima prima parum mente motus est, paululum ſitiebat. præcordij dolor, & circa umbilicū palpitatio perpetuo. Vigefima quarta urinis ſubſidentia, intelligebat omnia. Vigefima ſeptima coxæ dextræ dolor. Vrinæ tenues, & ſubſidentiam habebant. in reliquis commodiſſime habebat. Circa uigefimam nonam oculi dextri dolor. Vrinæ tenues. Quadrageſima egeſſit pituitoſa, alba, aliquanto plura. multum ſudauit per totum. perfecte iudicatus est.

SECTIO SECVNDA.

ÆGROTVS IIII

IN Thaso Philiſtes caput multo tempore dolebat. & quādoq; etiam aliquando grauiore ſomno preſſus decubuit. Quum autem ex potationibus febres continuæ obortæ eſſent, dolor exacerbatus est. nocte excalefactus est primum. Prima die uomuit bilioſa, pauca, flaua primū. poſtea uero plus æruginōſa. Ab aluo autem ſtercora prodibant. noctem habuit moleſtam. Secūda die ſurditas, febris acuta. præcordium dextrum diſtētum est, declinauit ad internas partes. Vrinæ tenues, pellucidæ, habebant quiddam in medio pendens genituræ ſimile. Parum infaniuit circa meridiem. Tertiam diem moleſtam habuit. Quarta conuulſiones. exacerbata ſunt omnia. Quinta mane mortuus est.

ÆGROTVS V

CHærionem qui decūbebat apud Demegetū, ex potu febris corripuit. Statim aut capitis grauitas dolorosa. nō dormiuit. aluus turbata ex tenuibus bilioſis. Tertia die febris acuta. capitis tremor, maxime autem labij inferni. paulo poſt rigor, conuulſiones, penitus mente motus est. Noctem moleſte tulit. Quarta per quietem, parū dormiuit. parum delirauit. Quinta laborioſe omnia exacerbata ſunt. deliriū. noctem moleſte tulit. non dormiuit. Sexta per eadem. Septima ſuperriguit. febris acuta. ſudauit per totum. iudicatus est. Huic perpetuo ab aluo ſecēſſus bilioſi, pauci, meri. Vrinæ tenues boni coloris, in medio nubilolum quiddam pendens habentes. Circa octauam minxit urinas melioris coloris, habentes ſubſidentiam albam, paucam. reſipiſcebat. febris intermiſit. Nona redijt. Circa decimam quartam febris acuta, ſudauit. Decima ſexta uomuit bilioſa, flaua, ſatis multa. Decima ſeptimā ſuperriguit. febris acuta. ſudauit. à febre liber, iudicatus est. Vrinæ poſt recidiuam & iudicationē, melioris coloris, ſubſidentiam habentes. Neq; mente motus est in recidiua. Decima octaua parum caleſcebat. inſuper ſitiebat. Vrinæ tenues, quod in medio pendebat nubilolum erat. parum mente motus est. Circa decimā nonam à febre liber, collum doloroſum habebat. Vrinis ſubſidentia, perfecte iudicatus est uigefi-

ma. P. M. B. V. V. s. hoc est, probabile multitudine biliosarum urinarum uigesima sanatum.

AEGROTVS VI

EVryanactis filiam uirginem febris corripuit. Erat autē sine siti perpetuo, nihil ad gustandum admittebat. Ab aluo pauca prodibant. Vrinæ tenues, paucae, non boni coloris. Incipiente autem febre circa sedem dolebat. Sexta die à febre libera, non sudauit. iudicata est. Quod uero circa sedem erat, parum superatum est. erupit unà cum iudicatione. Post iudicationem septima die riguit, parum incaluit, sudauit. post iudicationem octaua die, riguit nō multum, postea uero extremitates frigidae semper. Circa decimam post factū sudorem, mente mota est. & rursus breui resipiscebat. Dicebant autem ex gustato botro ipsam hæc pati. Die uero una intermissa, rursus duodecima multum delirabat, aluus turbata est ex biliosis, paucis, meris, tenuibus, mordacibus. frequēter surgebat. Die septima ab ea qua mēte mota fuit, mortua est. Hæc incipiente morbo fauces dolebat. & perpetuo ruborem habebat. & gurgulio reuulsus. fluxiones multæ, paruæ, tenues, acres. Tussiebat, maturum nihil educebat. Omnes cibos per totum tempus fastidiebat, neq; ullum aliquē appetiuit. sine siti erat, neq; quicquam memorabile bibit. Tacens nihil loquebatur. Tristitia desperata rursus corripiebat. Erat autem & innata quædam tabes.

AEGROTVS VII

ANginosa illa quæ apud Bitonem erat, primum à lingua coepit. Vox non clara, lingua rubra resiccata fuit. Prima die horrida, incaluit. Tertia rigor. febris acuta, tumor subruber, durus, colli & pectoris ex utraq; parte. extremitates frigidae, liuidæ. Spiritus sublimis. potus per nares fundebatur, deglutire nō poterat. alui secessus & urinæ suppressa erant. Quarta omnia exacerbatata sunt. Mortua est anginosa. P. s. s. Q. M. hoc est, probabile secessibus suppressis quinta mortuam.

AEGROTVS VIII

ADolecentem qui decumbebat in mēdacium foro, febris corripuit, ex lassitudinibus, & laboribus, ac cursibus insolitis. Prima die aluus turbata ex biliosis, tenuibus, multis. Vrinæ tenues subnigræ. nō dormiuit. siticulosus. Secunda omnia exacerbatata sunt. Secessus plures, in tempestiuiores. nō dormiuit. Mens turbata. parum sudauit. Tertia moleste habuit. siticulosus, anxius. multa iactatio. desperatio. mente motus est. Extremitates liuidæ ac frigidae. præcordij intensio submollis utrinq;. Quarta non dormiuit. Malum in peius procedebat. Septima mortuus est. Aetate circa uigesimū annum erat. P. N. s. M. hoc est, probabile nouationibus septima mortuum.

AEGROTVS IX

QVæ apud Tisamenum decumbebat mulier, ei uoluulosa moleste procedebant. uomitus multi. potum continere non poterat. Dolores circa præcordia. Et in infernis partibus iuxta uentrem dolores, tormina continua, non siticulosa. incalcescebat. Extremitates frigidae perpetuo. anxia. insomnis. Vrinæ paucae, tenues. secessus crudi, tenues, pauci, prodesse non amplius quicquam poterat. Mortua est.

AEGROTVS X

MVlierem ex his quæ apud Pantimedem degebāt, ex abortu infantis, prima die febris corripuit. Lingua arida. siticulosa. anxia. infomnis. Aluus turbata ex tenuibus, multis, crudis. Secunda die superriguit. febris acuta. ab aluo prodire multa. non dormiuit. Tertia die dolores maiores. Quarta inētē mota est. Septima mortua est. Aluus semper lubrica, ex secessib. multis, tenuibus, crudis. Vrinæ pauca, tenues. febris ardens.

AEGROTVS XI

ALteram ex abortu circa quintum mensem, febris corripuit. Ab initio soporosa erat. & rursus infomnis. lumborum dolor. capitis grauitas. Secunda aluus turbata est paucis, tenuibus, meracis primum. Tertia plura, deteriora. nocte non dormiuit. Quarta mente mota est. Timores. Tristitiæ. dexter oculus distortus est. sudauit circa caput sudorem modicum, frigidum. extremitates frigida. Quinta omnia exacerbata sunt. multū delirabat. & rursus breui resipiscebat. Sitis. infomnis. Ab aluo multa, in tempestiua, perpetuo prodibant. Vring pauca, tenues, subnigræ. Extremitates frigida, subliuida. Sexta per eadem. Septima mortua est phrenitide.

AEGROTVS XII

MVlierem quæ decumbebat in mendacium foro, primum tūc enixam dolose masculū, febris corripuit. Statim ab initio siticulosa. anxia. cor dolebat. lingua arida. uenter turbatus est tenuibus, paucis. non dormiuit. Secunda die parū riguit. febris acuta. parum circa caput sudauit frigidū. Tertia laboriose ab aluo cruda, tenuia, multa prodierunt. Quarta riguit. Omnia exacerbata sunt. Infomnis. Quintā laboriose tulit. Sexta per eadē. Ab aluo uero prodierunt liquida, multa. Septima riguit. febris acuta. sitis multa. iactatio. Circa uesperā frigidū sudorem per totū sudauit. frigiditas. extremitates frigida, nō amplius recalescebant. & rursus ad noctem riguit. Extrēmæ partes nō recalescebāt. non dormiuit. parum mente mota est. & rursus breui resipuit. Octaua circa meridiem recalescēta est. Siticulosa. soporosa. fastidiosa ac nauseabunda. Vomuit biliosa, pauca, subflaua. Noctem moleste tulit. non dormiuit. Vrinā minxit multam acruatam in scia. Nona remiserunt omnia. soporosa. Ad uesperam parum riguit. Vomuit pauca, biliosa. Decima rigor. febris exacerbata est. nihil dormiuit. Mane multam urinam subsidentiā habentem minxit, extremitates recalescētae sunt. Vndecima uomuit uirosa, biliosa. Nō ita longē postea superriguit. & rursus extremitates frigida. Ad uesperā sudor, rigor. Vomuit multū. noctem laboriose transegit. Duodecima uomuit multa, nigra, graueolentia. singultus multus. sitis laboriosa. Decimatertia nigra, graueolentia, multa uomuit. rigor. Circa meridiem uoce destituta. Decimaquarta sanguis per nares. Mortua est. Huic perpetuo aluus lubrica. horrida. Aetas circa annum decimūseptimum.

SECTIO TERTIA.

Constitutio temporis pestilens.

ANnus austrinus, pluuius. Venti perpetuo quiescentes. Quum squallores fuissent superioribus temporibus ad annum, in austrinis circa arcturum aquæ multæ. Autumnus umbrosus, nubilus. aquarum copia. Hyems austrina, humida, mollis. Post solstitium longē postea, prope æquinoctium seræ hye-

mes. Et iam circa æquinoctium aquilonares uenti niuosi non multo tempore. Ver rursus austrinum, sine uentis. Aquæ multæ perpetuo usq; ad canem. Aestas serena, calida. æstus magni. Etesiæ parum dispersum spirarunt. Rursus circa arcturum in aquilonaribus aquæ multæ. Quū autem esset annus austrinus, humidus, & mollis, per hyemē quidem sani degebant, exceptis tabidis, de quibus scribetur. Ante uer autem simul cum fientibus frigoribus, sacri ignes multi, quibusdam cum occasione, quibusdam non, atq; hi maligni multos peremerunt. Multi fauces doluerunt. Voces uitiatæ. febres ardentes. phrenitici. ora ulcere feruido affecta. in pudendis tubercula. Lippitudines. Carbunculi. Alui turbatæ. Ciborū fastidia. Aliqui siticulosi, aliqui non. Vrinæ turbatæ, multæ, malæ. Diu soporosi, & rursus insomnes. Multæ iudicationes penitus interceptæ. Quædam ægre fientes. Hydropses. tabidi multi. Atq; hi quidē erant populares morbi. In singulis aut relatis speciebus ægroti, & moriebantur multi. Acciderūt autem singulis horum hoc modo. Multis equidem ignis sacer cum occasione, ex uulgaribus & ualde paruis uulnusculis, in toto corpore, maxime sexagenarijs, circa caput si uel parum neglecta essent. Multis uero etiam in ipsa curatione, inflammationes magnæ fiebant. & sacer ignis multus, breui, undiq; depascebatur. Plurimis igitur ipsorum abscessus ad suppurationes contigerunt. carniū & neruorum ac ossium elapsus magni. Erat autem & fluxio collecta non puri similis. Sed alia quædam putredo, & fluxio multa ac uaria. Quibus igitur circa caput horum quid fieri contigit, his glabrics totius capitis ac menti fiebat. & ossium denudationes ac elapsus. & multæ fluxiones, & hæc in febribus, & sine febribus. Erant autem hæc horrenda magis quàm mala. Quibus enim ad suppurationem talium maturatio peruenit, horum pleriq; seruabantur. Quibus uero inflammatio quidem & ignis sacer discessit, talem autem nullum abscessum fecit, horum multi perierunt. Similiter autem & si alibi in alia corporis parte horum quid oberraret, hæc acciderunt. Multis enim brachium, & totus cubitus defluxit. Quibusdā uero hæc affligebant latera, aut anteriorem aut posteriorem aliquam partem. Quibusdam autem totū femur, uel tibiam denudabantur, & totus pes. Erat autem ex talibus omnium grauissimum, ubi circa pubem & pudenda accidisset. & circa ulcera quidem, & cum occasione, huiusmodi erant. Multis autem in febribus, & ante febrem, & ex febribus ignes sacri inciderunt. & qui quidem horū abscessum fecissent per suppurationem, aut per aluum turbatio quædam tempestiua, aut urinarum bonarum excretio contigisset, per hæc soluebātur. Quibus autem nihil horum accidisset, uerum obscure disparuisset, hi lethales erāt. Plerunq; igitur plurimis accidit sacer ignis uere. consequebantur autem & per ætatem, & sub autūnum. Multa uero turbatio quibusdam, & circa fauces tubercula, & linguæ inflammationes, & abscessus circa dentes. Vocesq; multis significationem de se præbebant, quod essent uitiatæ ac impeditæ & inuolutæ, primū quidem, tabidis incipientibus, immo etiam ardenti febre correptis, & phreniticis. Cœperunt igitur febres ardentes ante uer, itemq; phrenitis, post facta frigora. & plurimi tunc ægrotarunt. Acuta uero & lethalia symptomata his aderant. Erat autem constitutio febrium ardentium hoc modo. Ab initio soporosi, anxij, horridi. febris acuta, non ualde siticulosi, non deliri. De naribus parum stillauit. Exacerbationes

bationes plerisque diebus paribus. Circa exacerbationes obliuio, exolutio, & uocis priuatio. Extremitates manuum ac pedum semper his frigidiores, praesertim circa exacerbationes. & rursus tarde ac non bene recalescebant: rursusque & intelligebant & loquebantur. Detinebat etiam ipsos sopor continuus, non somniculosus. Aut uigiliae cum doloribus, plurimis horum alui turbulentae, secessibus crudis, tenuibus, multis. Urinae multae, tenues, nihil neque iudicatorij, neque boni habentes. Nec uero aliud aliquod iudicatorium ita habentibus fiebat. Neque enim sanguis bene erumpebat, neque alius aliquis abscessus iudicatorius fiebat. Moriebaturque unusquisque prout contigit erroneo modo, plerumque circa iudicationes. Quidam uero diu uoce priuati. Multi sudantes. & his quidem qui perniciose habebant, haec accidebant. Consimilia uero etiam phreniticis. Sine siti autem hi erant. Neque quisquam phreniticus insaniuit, uelut ex alijs, sed alia quadam mala ac lenta in somnum delatione grauiter peribant. Erant insuper etiam aliae febres, de quibus scribetur. Ora multis ulcere feruido affecta, ulcerosa. Fluxiones circa pudenda multae, ulcerationes. Tubercula foris, intus, circa inguina. Lippitudines humidae, longae, diuturnae, cum doloribus. Eruptiones palpebrarum foris, intus, multorum oculos corrumpentes, quas ficus uocant. Erumpebant etiam in alijs ulceribus multa, & in pudendis.

Carbunculi per aetatem multi, & aliae quae seps uocantur, pustulae magnae. Herpetes multis magni. At uero circa aluum multis multa & nocua acciderunt. Primum quidem tenesmi multis dolorose, plurimis autem pueris, & omnibus qui erant ante pubertatem, & plurimi horum peribant. Lienterici multi, dysenterici, neque hi ualde dolorose. Seccessus autem biliosi, & pingues, & tenues, & aquosi. Et multis quidem ipse morbus ad hoc decubuit, & sine febribus & in febribus. cum doloribus, tormina, & uoluuli maligni, multorum quae in corpore erant, & suppressa erant exitus. & exeuntia progressa dolores non soluentia, & his quae offerebantur difficulter cedentia. Nam purgationes plurimos amplius laedebant. Ex his autem qui sic habebant, multi quidem cito peribant. Multi uero longius uitam degebant. & in summa, omnes & qui longis morbis aegrotabant, & qui ex acutis, maxime ex his quae per aluum secedebant mortui sunt. Omnes enim aluus sustulit. Cibum autem fastidiabant omnes, ob cunctos praescriptos morbos, in quos sane ego incidi. Multi uero, & maxime hi ipsi, & qui tales erant, sed & alij, perniciose habebant. & siticulosi alij erant, alij non. Ex his qui febribus alijsque laborabant, nullus siticulosus in tempestiue. Sed licebat circa potum uictus rationem constituere, prout uelles.

Urinae autem prodeuntes multae quidem erant, non pro potus ingestis ratione, sed multum excedentes. Verum multa quaedam malitia urinarum eiectionum erat. Neque enim crassitudinem, neque concoctiones, neque purgationes bonas habebant. Nam in multis morbis purgationes per uesicam fientes, bonae sunt. Significabant autem plurimis colliquationem, & turbationem, & dolores, & nullam iudicationem. Soporosi uero maxime phrenitici, & febre ardente laborantes erant. Sed & in alijs morbis omnibus maximis, qui cum febre fiebant. In totum autem plurimos aut grauis sopor comitabatur, aut paruus ac tenuis, somnos habebant. Multa praeterea alia febrium genera populariter grassata sunt, tertianarum, quartanarum, nocturnarum, continuarum, longarum.

erronearum, anxiarum, inconstantium. Omnes aut hæc cum multa turbatione fiebant. Nam alui plurimis turbatae, horrores, sudores non iudicatorij. & urinae uelut præscriptum est. Atque hæc plerisque horum longa erant. Neque enim abscissus his sientes iudicabant, uelut in alijs. Et omnia quidem omnibus difficulter iudicabantur, & nullæ iudicationes fiebant, & diuturnæ, maxime uero his, paucis autem horum iudicatio circa octogesimum diem fiebat. Plurimis prout contigit defecerunt. Moriebantur autem horum pauci ex hydropæ erectè obambulantibus. Multos uero etiam in alijs morbis tumores infestabant, maxime uero tabidos. Maxima autem & grauissima erat tabes, et plures occidit. Nam multi per hyemem incipientes, partim decumbebant, partim erectè obambulabant. Ante uer autem plerique ex decumbentibus moriebantur. Aliorum uero tussis nihil defecerunt. Verum æstate remiserunt. At sub autumnū omnes decubuerunt, & multi mortui sunt, plurimi uero horum diu ægrotauerunt. Cœpit igitur plurimis horum derepente ex his afflictio, frequentes horrores erant, sæpe febres continuæ, acutæ. sudores intempestiui, multi, frigidi perpetuo. Multa frigiditas, & uix rursus recalescebant. Alui uarie adstrictæ, & rursus breui humescentes. Et quæ circa pulmonem erant omnia, infra distribuebantur. Multitudo urinarum non bonarum, colliquationes malæ. Tussis autem aderant quidem perpetuo multæ, & multa educentes matura ac liquida, non autem ualde cum doloribus. Sed etsi aliquantulū dolerent, ualde tamē leniter omnibus purgatio à pulmone fiebat. fauces non ualde mordaces, neque salugines quicquam infestabant. Viscosa tamē, & alba, & liquida ac spumosa multa de capite descendeant. Magnum aut malum & hos, & alios comitabatur ciborum fastidium, uelut præscriptum est. Nam neque potum cum cibo libenter sumebant, sed ualde sine siti degebant. Grauitas corporis. Soporosi. Plurimis ipsorum tumor, & ad hydropem deueniebant. Horridi, deliri circa mortem. Forma tabidorū erat leuis, subalbida, lentis colorem referens, subrubra, raua. Pituita alba referti. Scapulas alarum modo eminentes habentes. & mulieres sic. Atre bilis item forma, & sub sanguinea, febres ardentes, & phrenitides, ac dysenteria hos tentabant. Tenesmi iuuenibus pituitosis. Iōga alui profluuiā, acresque secessus & pingues, biliosis. Erat autem omnibus præscriptis grauissimum quidem uer, & multos occidit. Aestas autem facilima, & paucissimi perierunt. Autumno uero & sub pleiada rursus multi moriebantur quartanarij.

ÆGROTI SEDECIM.

PRIMVS.

IN Thaso Parium quendam, qui decūbebat supra Artemisij aedes, febris corripuit acuta. ab initio cōtinua, ardens, siticulosa. Principio soporosis, & rursus insomnis. Aluus turbata in principio. Urinae albæ. Sexta die minxit urinam oleosam, mente motus est. Septima exacerbata sunt omnia, nihil dormiuit. Sed & urinae similes, & mens turbata. Ab aluo uero biliosa, pinguis prodierunt. Deinde octaua parum de naribus stillauit. Vomuit uirosa pauca, parum dormiuit. Nona per eadem. Decima omnia remiserunt. Undecima sudauit, non per totum. Circumfrigit quidem, uerum breui rursus incaluit. Duodecima febris acuta. Secessus biliosi, tenues, multi. In urinis quiddam in medio uehebatur. mente motus est. Decima septima laboriose trāmissa est. Neque enim somni, neque febris augescebat. Vigesima sudauit per totum, insomnis, secessus

secessus biliosi. cibum fastidiēs. soporofus. Vigesima quarta recidiua facta est. Trigesima quarta à febre liber. Aluus non suppressa est. Et rursus incaluit. Quadagesima à febre liber. aluus non multo tempore suppressa fuit. Cibum fastidiens. parum rursus febricitauit, & semper erroneo modo. partim sine febre, partim non. Nam etsi reliquisset & alleuata esset, rursus reuertebatur. Edulij quoque multis & uitiosis utebatur. Somni mali circa recidiuas. mente motus est. Vrinæ crassitudinem quidem habentes tunc mingebat, uerum turbatas & prauas. & aluus iam adstricta erat, & rursus soluta. febriculæ cōtinuæ. secessus multi, tenues. Centesima uigesima die mortuus est. Huic aluus assidue à prima die lubrica erat, ex biliosis, liquidis, multis: Aut adstricta ex feruidis ac crudis. Vrinæ uero perpetuo malæ, Sopores plerumque. cū doloribus insomnis, cibum fastidiens. febris ardens continenter.

AEGROTVS II

IN Thaso decumbentē apud frigidam, à partu ubi filiam peperisset, & purgatio facta non esset, febris acuta, horrida, tertia die corripuit. Multo autē tempore ante partum febriculosa erat, decumbens, cibum fastidiens. Postquam autem tenuissimè, febres continuæ, acutæ, horridæ. Octaua multū mente mota est, & sequentibus diebus. & breui rursus resipiscebat. Aluus turbata, ex multis tenuibus, aquosis, bile permixtis. sine siti erant. Undecima resipiscebat. uerum soporosa erat. Vrinæ multæ, tenues, & nigræ. insomnis. Vigesima parū circumfrigit, & breui rursus incaluit. parum delirauit. insomnis. Alui secessus isdem. Vrinæ aquosæ, multæ. Vigesima septima à febre libera. aluus adstricta est. Nō multo tempore postea coxæ dextræ dolor fortis multo tempore. Febres rursus comitabantur, & urinæ aquosæ. Quadagesima dolores circa coxam alleuati sunt. Tussis autē assiduæ, humidæ, multæ. aluus substitit. Cibum fastidiens. Vrinæ in isdem. febres autem in totum quidem non deficientes, erroneo uero modo exacerbescences, partim ita, partim non ita. Sexagesima tussis quidem obscure defecerunt. Neque enim aliqua sputorū concoctio fiebat, neque alius conuetus abscessus. Maxilla uero ex dextris diuulsa est. soporosa. rursus delirabat. & breui resipiscebat. Cæterū à cibus auersum animū habebat. & maxilla quidē ad locū suum rediit. Aluus autē biliosa, pauca egressa. febricitauit acutius. horrida. & sequentibus diebus uoce destituta est, & rursus resipiscebat ac loquebatur. Octogesima mortua est. Vrinæ huic perpetuo erant nigræ, & tentres, & aquosæ. & sopor comitabatur. Cibum auersans. Tristis. Insomnis. iræ, molestiæ, Mens melancholica.

AEGROTVS III

IN Thaso Pythionem qui supra Herculeum templum decumbebat, ex laboribus, & lassitudinibus, & neglecta uictus ratione, rigor magnus, & febris acuta corripuit. lingua arida. siticulosus. biliosus. non dormiuit. Vrinæ subnigræ. quod in medio ipsarum pendebat, sublime erat. Secunda die circa meridiem frigiditas extremarum partium, & magis circa manus & caput. loquela & uoce destitutus. Breuispirus ad multum tempus, rursus incaluit. Sitis. Nox quieta. Sudauit parum circa caput. Tertia dies quieta. Vespero uero sub solis occasus parum frigit. Turbatio nocte dolorose, nihil dormiuit. Ab aluo parua compacta stercora prodierunt. Quarta mane quietus. Circa uesperam omnia

nīa exacerbata sunt. frigiditas. loquela & uoce destitutus. in detērius recalcēctus est post tempus. Vrinās minxit nigras in medio quid pendens habentes. Noctē quiete dormiuit. Quinta uisus est alleuatus esse. Verū iuxta aluum grauitas cū dolore. siticulosus. Noctē laboriose tulit. Sexta mane quietus. Vesperi dolores maiores. exacerbatus est. Vesperi clystere adhibito. ab aluo probe egeffit. Noctē dormiuit. Septima die anxius. submolestē ferebat. Vrinā minxit oleosā. noctu turbatio multa. delirabat. nihil dormiebat. Octaua mane parū dormiuit. Mox autē frigiditas. Vocis interceptio. Spiritus tenuis imminutus. Vesperi rursus excalefactus est. mente motus est. Iam autem ad diem parū alleuatus est. Seceffus meri. pauci. biliosi. Nona soporosus. anxius. quum excitaretur. non ualde siticulosus. Circa solis occasus molestē ferebat. delirabat. noctem malam habuit. Decima mane uoce destitutus. frigiditas multa. febris acuta. Sudor multus. mortuus est. dolores huic in diebus paribus.

AEGROTVS IIII

Phreniticus prima die decumbens uomuit æruginosa. multa. tenuia. febris horrida. sudor multus. continuus per totum. Capitis & colli grauitas cum dolore. Vrinæ tenues. in medio ipsarum pendentia. parua. diuulsa. non sudauit. Ab aluo stercora aceruatim egeffit. multum mente motus est. nihil dormiuit. Secunda mane uoce destitutus. febris acuta. sudauit. non intermisit. Palpitationes per totum corpus. Noctē conuulsiones. Tertia exacerbata sunt omnia. Quarta mortuus est.

AEGROTVS V

IN Larissa caluus. femur dextrum doluit derepente. ex his quæ offerebantur nihil proderat. Prima die febris acuta. ardens. quiete tenebat. dolores autem consequebantur. Secunda femoris quidem remisertunt dolores. febris autē acuta est. submolestē ferebat. non dormiebat. extremitates frigidae. Vrinarum non bonarum copia prodibat. Tertia femoris dolor quieuit. Mentis emotio. & turbatio. & multa iactatio. Quarta circa meridiem mortuus est celerrime & acutissime.

AEGROTVS VI

IN Abderis Periclem morbus corripuit acutus. continuus. cum dolore. Sitis multa. anxietas. potum continere non poterat. Erat autem sublienosus. & capite grauatus. Primo die sanguis ē sinistra nare erupit. multa tamē febris augescēbat. Vrinam minxit multam. turbatam. albam. deposita non subsidebat. Secunda omnia exacerbata sunt. Vrinæ tamen crassæ quidem erant. uerum magis subsidebāt. & anxietas leuata est. dormiuit. Tertia febris emollita est. Vrinarum copia: quæ concoctæ multam subsidentiā habebant. Nox quieta. Quarta circa meridiem. multum calidum sudorem per totum exclusit. A febre liber iudicatus est. non rediit. morbus acutus.

AEGROTVS VII

IN Abderis uirginem quæ decumbebat in sacra uia. febris ardens corripuit. Erat autem siticulosa & insomnis. Menses autem primū ipsi descendebant. Sexta anxietas multa. rubor. horrida. mœsta. Septima per eadē. Vrinæ tenues quidem. uerum boni coloris. Venter non uexabat. Octaua surditas. febris acuta. insomnis. anxia. horrida. intelligebat. Vrinæ similes. Nona per eadē. itemq; sequentibus sic surditas perseverabat. decimaquarta mens turbata. febris remi-

fit

fit. Decima septima sanguis per nares fluxit multus. Surditas parum remisit. & sequētibz anxietas. surditas aderat. & delira erat. Vigesima pedum dolor. surditas. delirium intermisit. sanguis paucus per nares erupit. sudauit. à febre libera. Vigesima quarta febris redijt. surditas rursus. pedum dolor permanfit. mentis emotio. Vigesima septima sudauit multū à febre libera. Surditas defecit. pedum dolor restabat. De cætero perfecte iudicata est.

AEGROTVS VIII

IN Abderis Anaxionē, qui decumbebat ad Thracias portas, febris acuta corripuit. lateris dextri dolor assiduus. Siccā tussim habebat, neq; expuebat primis diebus. Siticulosus. Insomnis. Vrinæ boni coloris, multæ, tenues. Sexta delirus. Ad calefactoria nihil remisit. Septima dolorose agebat. Nam & febris augescebat, & dolores non remittebāt, & tusses uexabant, difficulterq; spirabat. Octaua cubitū secui. effluebat sanguis multus, uelut debebat. Remiserunt quidam dolores, tusses tamen siccae comitabantur. Vndecima remiserunt febres. parum circa caput sudauit. Tusses adhuc. & quæ à pulmone prodibant, liquidiora erant. Decima septima incepit pauca, matura spuere. alleuatus est. Vigesima sudauit, à febre liber. post iudicationem alleuatus est. Erat autem siticulosus, & à pulmone prodeuntium purgationes nō bonæ. Vigesima septima febris redijt. Tussijt, eduxit matura multa. Vrinis subsidia multa, alba. Sine siti erat. bene spirans. Trigesima quarta sudauit per totum. à febre liber. penitus iudicatus est.

AEGROTVS IX

IN Abderis Heropythus erectè obambulans caput dolebat. Non multo autem tempore postea decubuit. habitabat prope superiorē uiam. febris ipsum corripuit ardēs, acuta. Vomitus ab initio multorum biliosorum. siticulosus. multa molestia. Vrinæ tenues, nigrae, id quod in medio ipsarū pendebat, sublime erat aliquando, quandoq; non. noctē dolorose transegit. Febris aliàs aliter exacerbescerebat, plerūq; inordinate. Circa decimā quartam surditas. febres augescebant. Vrinæ per eadē. Vigesima multum mente motus est, itemq; sequētibz. Quadragesima multus sanguis ex naribus erupit. & magis intelligebat. Surditas aderat quidem, sed minor. febres remiserūt. Sequentibus diebus sanguis erumpebat frequenter & paulatim. Circa sexagesimā sanguinis eruptiones cessarunt. Coxæ autem dextræ dolor fortis. & febres augescebāt. Non longo tempore postea dolores omnium infernarum partium. Contigitq; aut febres esse maiores, & surditatem multam: aut hæc quidem remittere & leuiora fieri, infernarum autem partium circa coxas, dolores esse maiores. Iam uero circa octogesimam omnia remiserunt. Nihil tamē defecit. Vrinæ enim boni coloris, & plures subsidentias habētes prodibant, & deliria minora erant. Circa centesimam alius multis biliosis turbata est, & tempore nō modico multa talia prodibant, & rursus dysenterica cū dolore. Reliquorum uero quies erat. In summa, & febres defecerūt, & surditas cessauit. In cētesima uigesima perfecte iudicatus est. febris ardens.

AEGROTVS X

IN Abderis Nicodemum ex uenere & potu, febris corripuit. Initio autem erat anxius. & cordis dolore uexabatur. siticulosus. lingua combusta fuit. Vrinæ tenues, nigrae. Secunda febris exacerbata est. horridus. anxius. non dormiuit. Vomuit biliosa, flaua. Vrinæ similes. Nox quieta. dormiuit. Tertia die remise

remiserunt omnia, & quies erat. circa solis occasus rursus moleste ferebat. nocte laboriose tulit. Quarta rigor, febris multa, dolores omnium. Vrinae tenues, & quid in medio ipsarum pendens. Sexta mente multum motus est. Septima quies. Octaua alia remiserunt omnia. Decima & sequentibus diebus aderant quidem dolores, uerum omnes minores. Exacerbationes autē & dolores huic ad finem usque in diebus paribus magis erant. Vigesima minxit urinam albam, quae crassitudinem habebat, & deposita non subsidebat. Sudauit multum. uisus est sibi à febre liber esse. Vespero uero rursus incaluit, & dolores iidem, horror, sitis, parum mente motus est. Vigesima quarta multam urinam albam, multam subsidentiam habentem minxit. Sudorem multum calidum per totum exudauit, à febre liber iudicatus est.

AEGROTVS XI

IN Thaso mulier morosa, ex mœrore cum occasione, erecte obambulans, insomnia facta est, & cibi fastidians. & erat siticulosa, & anxiosa. habitabat autem prope Pyladae aedes in Leio. Prima die sub initium noctis timores, sermones multi, tristitia, febricula tenuis. Mane conuulsiones multae. Quum autem intermisissent conuulsiones illae multae, delirabat, turpia loquebatur. Dolores multi, magni, continui. Secunda per eadem, nihil dormiebat, febris acutior. Tertia conuulsiones defecerunt. Sopor autem & in somnum grauiorem delatio aderat, & rursus uigiliae, exiit, continere se non potuit, multum delirauit, febris acuta. Ad hanc noctem multum sudorem calidum per totum corpus exclusit, à febre libera, dormiuit. Penitus respuit, iudicata est. Circa tertiam autē diem urinae nigrae, tenues: quod in medio ipsarum pendebat aliquandiu rotundum, non subsidebat. Circa iudicationem menses multi prodierunt.

AEGROTVS XII

IN Larissa uirginem febris corripuit ardēs, acuta, insomnia, siticulosa, lingua fuliginosa, arida. Vrinae boni quidem coloris, sed tenues. Secunda die laboriose degebat, non dormiuit. Tertia ab aluo multa prodierunt aquosa cum uiore pallida, itidemque sequentibus diebus prodierunt eiusmodi tolerabiliter. Quarta urinam egessit tenuē, paucam: habebat in medio pendens illud sublime, non subsidebat, mente mota est ad noctem. Sexta per nares sanguis multus large fluxit, quumque inhorruisset, sudorem multum calidum per totum effudit, à febre libera, iudicata est. In febris autē, & iam iudicatae, menses tunc primum prodierunt. Erat enim uirgo. Perpetuo uero anxiosa erat, horrida, faciei rubor, oculorum dolor, capitis grauitas. Huic non rediit, sed iudicata est. Dolores diebus paribus.

AEGROTVS XIII

A Pollonius in Abderis erecte titubans obambulabat multo tempore. Erat autem magnis uisceribus praeditus. & circa hepar dolor multo tempore familiaris ipsum comitabatur, & sanè tunc etiam morbo regio tenebatur, flatuosus, coloris subalbi. Quum autem edisset ac bibisset intempestiuus carnem bubulam, incaluit parum primum, decubuit. Lacte uero usus coctio & crudo, multo, caprino ac ouillo, & uictu malo, omniū lesiones magnae sequutae sunt. Nam & febres exacerbatae sunt, & aluus nihil memorabile de ingestis egessit. Vrinae tenues & paucae prodibant. Somni non aderant, inflatio mala, sitis multa, soporosa, praecordij dextri eleuatio cum dolore, extremitates undique subfrigidae, parum delirabat

delirabat. Obliuio omniū quæ loquebatur. mente mouebatur. Circa decimam quartam ex qua quum riguisset incaluit, decubuit, & insaniit. clamor. turbatio. sermones multi. & rursus quies. & tunc sopor accessit. postea uero alius turbata, multis, biliosis, meris, crudis. Vrinæ nigræ, paucae, tenues. Multa molestia. Secessus uarie habebant. Aut enim nigri, & pauci, ac æruginosi erant: aut pingues, crudi, & mordaces. Per tempora uero uidebatur etiam lactosa egere. Circa uigesimalam quartam lenitas erat. & reliqua quidem in iisdem perseuerabant, parum autem resipiscebant: ex quo uero decubuit, nullius meminit. Rursus autem breui desipiebat. Omnia in peius procedebant. Circa trigesimalam febris acuta. Secessus multi, tenues, delirus. extremitates frigide. uoce destitutus. Trigesima quarta mortuus est. Huic perpetuo ex quo ego noui, alius turbata. Vrinæ tenues, nigræ. soporofus. insomnis. extremitates frigidae. delirus perpetuo. phreniticus.

AEGROTVS XIII

IN Cyzico mulierem, quæ gemellas filias magna difficultate peperit, & non ualde purgata est, primum inuasit febris horrida, acuta. Capitis & colli grauitas cum dolore. Insomnis ab initio, taciturna ac tetrica, & non obsecundans. Vrinæ tenues et decolores. siticulosa. anxia plerumque. alius erroneo modo turbata. & rursus adstricta. Sexta ad noctem multum delirabat. nihil dormiuit. Circa undecimam insaniit. & rursus resipuit. Vrinæ nigræ tenues. Et rursus tempore interposito oleose. Et alius multis tenuibus turbata. Decima quarta conuulsiones multæ. extremæ partes frigidae. nihil amplius intelligebat. Vrinæ suppressæ sunt. decima sexta uoce destituta est. decima septima mortua est. phrenitis.

AEGROTVS XV

IN Thaso Dealcis uxorem, quæ decubebat in Leio, febris horrida, acuta, ex imcerore corripuit. Ab initio contegebatur, & ad finem perpetuo, semper tacita manibus palpabat, uellebat, scalpebat, pilos legebat. Lachrymæ, & rursus risus. non dormiebat. ab alio irritationes. nihil prodibat, parum comonita bibebat. Vrinæ paucae, tenues. Febres ad manum tenues. extremarum partium frigiditas. Nona multum delirabat. Et rursus sedata est. tacita. Decima quarta spiritus rarus, magnus, per tempus. Et rursus breuispira. decima septima ab alio irritatio turbulenta. postea uero ipsi potus percurrerant, neque consistebant. omnino nihil sentiebat. Cutis aridae circūtensio. Vigesima sermones multi, & rursus sedata est. uoce destituta. breuispira. Vigesima prima mortua. Huic perpetuo ad finem usque erat spiritus rarus magnus. Omnino nihil sentiebat. semper contegebatur. Aut sermones multi, aut tacita perpetuo. phrenitis.

AEGROTVS XVI

A Dolefcens in Melibcea, ex potationibus & uenere multo tempore calefactus decubuit. Horridus autem & anxius erat. insomnis. & non siticulosus. Ab alio prima die stercora multa prodibant, cum multa defluxione. & sequentibus multa aquosa cum uirore pallida prodibant. Vrinæ tenues, paucae, decolores. Spiritus rarus, magnus, per tempus. Præcordij intentio submollis, oblonga ex utrisque. Cordis palpitatio perpetuo continua. Vrinam minxit oleosam. decima sensim mente motus est. moderatusque erat ac quietus. Cutis arida & circūdistenta. Secessus multi & tenues, aut biliosi & pingues. Decima quarta

ta omnia exacerbata sunt, mente motus est, multū delirauit. Vigesima insanit, iactatio, nihil mingeat, paucos potus continebat. Vigesimaquarta mortuus est, phrenitis. Videtur porro mihi æstas illa quæ tunc fuit, iuxta rationem commoditatem attulisse. Nam æstiuos morbos hyems succedēs soluit. Et hyemales æstas succedens transmutat. Quamvis ipsa in seipsa quæ tunc erat æstas, non stabilis erat: sed derepente calida, & austrina, & sine uentis. Attamen ad aliam tempestatem transmutata profuit. Magnam uero artis partem esse arbitror, etiam de his quæ scripta sunt recte, posse considerationem facere, ac iudicare. Qui enim hoc nouit, & his utitur, nō uidetur mihi in arte multum falli posse. Oportet autem exacte perdiscere unāquamque temporū constitutionem, & ipsum morbum. Et quid boni cōmunis sit in cōstitutione, aut in morbo. & quid mali communis sit in statu, aut morbo. & qui morbus longus sit, & lethalis. & qui longus, & non perniciosus ad uitam. & qui acutus, ac lethalis. & qui acutus, & superesse sinens. Ex his enim ordinem dierum iudicatoriorū considerandi, ac prædicendi facultas datur. Et harum rerum gnaros scire cōtingit, quibus & quando, & quomodo uictum præscribere oportet.

HIPPOCRATIS COI DE MOR-

BIS POPVLARIBVS LIB. IIII. IANO COR
nario Medico Physico interprete.



POST æquinoctium & post pleiada, qualia sunt erodentia & mucosa, quæ caput aperuerunt, supra aurem prodierunt. Et qui apud Leocydis ædes habitabat, in pede. Phanodico digitus in pede, in pectore. Qui tibiam sectus est, hac parte etiā nigrefactus est. Erat ulcus magnū in externa tibiæ parte, & retro prodibat. Quum purum factum esset, lateris dolor & pectoris sinistri ē directo, & febres. Mortuus est à febre. Biliosum restiario abunde coloratū. Et uistoria adhibenti circa æquinoctium, sanguis multus deorsum prodijt. Seni ualde uehementer abscessit, non ultra quatuordecim dies. Vulnerato ab Antiphilo, usto iudicatio facta est die septima, bilioso, stupido. Tertia post iudicationē, sanguinē spuit, superstes manebat. & recidiua facta est postea. Iudicatus est uelut par erat, circa pleiadū occasum primum. Post pleiadum autem occasum, biliosus ad insaniam usque. Iudicatio facta est, superuixit, circa nonam diem, absque sudore. Circa æquinoctiū Chalcidionius à portis delatus ad forum, ex ruptione circa māmam dextrā dolens, spuebat aliās atque aliās pallens subuiride. Venter egerebat. Sudor auspiciatus septima, tenuit plerumque usque ad octauā. iudicatus est decimaquarta. Circa quadragesimam tubercula exorta ipsi circa utraque aures, haud immerito putabatur suppuratus fore, non factum est. Pectus Aristodemo ustum est. Philidis filio quum abscessus factus esset ex casu, & ipsi pectus ustum est. Erat autem dolor quidam etiam antea. post æquinoctium autumnale recidiua. & aliās usque ad solstitiū hyemale, & cum sole æstiuo. Acheloi uxor sexta die abortiuit, quum esset sanguinea, & horrida. & sudores. Iudicatio facta est decimaquarta, quot mensiū fuerit foetus, haud scio. Masculum autem etiam aliū ad

dies uiginti se abortiuiffe dixit, an uera dixerit non scio. Circa solstitiū hybernum aquilonares uenti erant. Morbo regio corripiebantur abunde colorati. & partim horridi, partim nō. Linguae cōbustae tertia diē. Et turbationes circa sextam & septimā, atq; hae diu durantes. Decimaquarta uentres resistentes, & in medicationibus nō obedientes. Pro ratione febrīū etiam nulli sudores. Splenes quibusdam parui ad praeordia dextra extēti, & ad manū submurmurantes. Sanguinis fluxiones. & urinis purgatio ac iudicatio. Multo autē magis infra nitebantur. Nam & hoc sub illud tempus corripiebat. Quibus non sic erat, splenes uero etiam eleuati, his sanguis ex sinistra nare. Solstitiū praeierat, hyberna hyberno modo in Aquilonaribus, paulo uero post austrina erant, ad quindecim dies. Postea uero niues quatuordecim diebus. Circa hanc anni constitutionem, morbi regij abunde colorati uigebant, qui non sincere iudicabantur, recidiuabant. Post niues, austrina succedebant, & pluuia, grauedines eruperunt, & cum febribus, & sine febribus. Cuidam uero etiam ad dentes, qui arieta ex medio doluerat: ad dextra, superciliū, & oculos. Erant autē & raucofi, & fauces inflāmatae. & glandulae isthic spōgiae appellatae intumescēbāt. & tubercula circa aures, & maxillam mollia, & cū febre sedabantur. Incipientibus febris citare fiebant supernē, & in utraq; partes pleraq; horum. & Spongiae quibusdam sub autumnū & hyemem. Sed & porrigines. Et multae omnibus modis abortiebant, & difficulter pariebant. Sexta die uirgini iudicata, sexta reuertuntur, iudicata uero sunt per sextam. Omnia in his tēporibus sexta & octaua iudicabātur, circa pleiadum occasus. Meandri caeci uxor statim cū pallore uiride, & statim purulentū spuit circa sextā, & hepatis feruor, & deorsum secessus modicus, carnopurulenta sursum pauca, alba, lata expuebat. cibum fastidians. Mortua est prope uigesimā diem. Ex uicinīs Thiestoris famula, ex uistorijs: secessu bilioso, multo: praecordio intenso: Sexta die ex suppressione aluius ipsi tenuia, multa, una uice egeffit. & statim sudauit, & iudicata est. & aluius substitit, eadem autem hora quum riguisset febricitauit. & rursus eadē hora. Thersandri uxor quum pituita alba praedita non ualde esset, lactans acuta febre correpta est. Huic lingua cōbusta est, dum alia cōburerentur, sub hoc tempus: linguaq; exasperabatur, uelut grādine multa. Et lumbrici per os. Circa uigesimā autem non perfecte iudicata est. Circa pleiadum occasus Metrophanti filius, caput percussus ab alio puero, per testam: quum peruenisset ad duodecimam diem febricitauit. Occasio autem erat quod quū detergeret partes circa ulcus perfricuit, & perfrigeratus est. & labia statim sunt eleuata. Attenuata est autem cutis, multis locis ulterius ab ulcere, quum autē sectus esset non tarde, neq; pus effluxit, neq; alleuatus est. Iuxta aurem uero uidebatur suppurari, in maxilla ad dextram. Hac enim parte etiam ulcus erat. Postea & hoc nō suppuratum est, & humerus dexter suppuratus est cito. Mortuus est circa uigesimam quartam. Post pleiadum occasum is qui aurē doluit, circa uigesimā diem postea uoce destitutus est, & dextrarū partium impotens, sine febre sudauit, dextra auris, dexter oculus, consistebat non ualde, & attrahebat quid ex inferna parte. A sinistris autē distortus est oculus grauiter dolens. collum durū factum est, tertia hora posteaquā doluit. Post pleiadum occasum, seruus Attici à quarta na correptus, stupidus sedatus est. Alius eodē tempore uera stupida insania, ex

phrenitide ac lethargo mixta, correptus est. Ad coxas et crura uenit dolor, quē uit, quoto die haud scio. Eodem tempore horridi, uomentes, & post iudicationem cibū auersantes, & biliosi, & splenes magni, duri, dolorosi, & sanguinis eruptiones. Quibusdā uero eodem tempore, post pleiadum occasum, ex naribus sanguis biliosus ob splenes. In Cranone uxorem Nicostrati correptā decima quarta die, statim occupauit impotentia colli, & aliarum partiū. & cibus inclusus fuit usq; ad decimā. Spiritus densus paruus. impotētia. palrans digitis. delirans. sudores. distracta sunt ad dexterā partē, collum, os, oculus, nasus. Vrinarum subsidentia alba, eruiū referens. alia alba. alia ramentosa, cum pallore subuiridis, farinam lentiū referens. Huic quādoq; uelut adiposum quiddam superstabat, atq; hoc aceruātū, non multū dispersum, uelut quod in medio ipsarū pendere solet disparatū. uelut extrinsecus ex ouicula. postea uero etiā non subsidens mingeatur. & alia quidem talis erat, alia subsidens. alia talis modice ad latitudinem dispersa. alia conturbata. alia talis. Quod in medio uehi solet, nubes culae subnigræ simile, quæ putaretur crassitudinem habere. Laxum autē aliud tenue. aliud tenue tale. aliud uelut equi. aliud uelut sunt caliginosa. Qui primus delatus est adolescēs, huic urina pura tenuis. Omnium secessus tenuis, multus, sine bile. lingua ualde aspera. Febris adurens. insomnis. aluus gibbosa. Hic mente motus est octaua arbitror die, proteruum in modum. exurgebat. pugnat. turpia fortiter loquebatur, quum talis non esset. Huic quū urinae multae tēues prodixissent ex suppressione, somnus obortus est continuus. & sudor, qui iudicatorius esse putabatur, ex quo talis erat forte circa decimā diem. Verum postea rursus insanijt, et breui mortuus est undecima die. Occasionem fuisse puto quod meracum multum bibisset, priusquam insaniret. Paucos habebat annos, propemodum uiginti. Eumenis uxor autumnō uomuit bilem atram. Sed & odores manifesti erāt. & febres horridae. & cordis siue osculi uentris dolores. biliosa pauca uomebat, & lumbricum. Secessus tēues per omne tempus. Ante pleiadū occasum desinebant statim sanguinis eruptiones. & breuiiores erant febres ac statim reuertentes breuibus recidiuis. & cibū auersantes, & uelut excocti, & anxij, & cor dolentes, & ferini in iudicationibus, & rigore affecti, & biliosi. Adolescens peregrinus erat, cui tertia die sanguis ex naribus multus fluxit, itemq; quarta ac quinta. Sexta compositae consistebat. mente motus est. Septima die aluus substitit. soporofus erat. Recidiua tertia die. aluus eniti cessauit. Vrinam non uidi. Circa iudicationem uelut debebat. At uero circa pleiadum occasum austrina, & pluuiæ erant. & tunc Adolescens mucosa, subbiliosa, uiscosa, multa recrementa egerebat. febris uehemens continua. lingua arida. Sexta iudicatus est. Septima rursus inuasit, dimisit eadem die cum tremore. auris sinistrae fluxio uiscosa, crassa, die sexta. Puero ab ulcere Phagedæna eroso, dentes inferni, & ex supernis ac infernis anteriores, emergebāt, cavitatem habebant. Quibus os ex palato discedit, his medius confidet nasus. Quibus uero superni dentes anteriores, his latus est summus nasus. Qui quintus dens ab anterioribus numeratur, quatuor radices habet, singulis paribus ad utrumq; uicinum dentem connexis, extremitatibus omnibus ad internam partem reflexis. Circa tertium dentem suppurationes plures q̄ iuxta alios omnes. Et ex naribus fluxiones crassae, & à temporibus dolores, ex hoc ma-

xime fiunt. Corroditur hic, maxime quintus, ex medio quidem nodum habebat unum, duos autē antē. Paruus primus intrinsecus iuxta duos corrodebatur. Septimus radicem unam crassam, acutam habebat. Athenadæ puer masculo doluit à sinistra parte infernus dens, à dextra supernus. Huius auris dextra suppurata est, dum non amplius doleret. Post pleiada clemens cœlum, nubilosum, & caligines. iudicationes quintanæ, & sextanæ ac septimanæ. Iam uero etiam diuturniores. febres reciduiantes, & quandoq; erroneæ, & cibum auersantes, & biliosæ, & dysenteriae cibum fastidiētes, febriculosæ. Circa pleiadum occasum, austrina fortiter erāt, sanguinis eruptiones. & febres tertianæ naturam referentes, & lenes.

Qui in sutrina decūbebat, sanguinem abūde biliosum è naribus effudit. Secessus modicus. iudicatus est septima cum rigore.

Seruus in extrema caupona, quarta die sanguinem è naribus effudit. multa statim nugabatur. aluus renitebatur. Præcordium dolorosum, durum. Ad subditam glandem sexta die subierunt mala, cum pallore uiridia. Septima mane iactatio. clamor multus. uenarum pulsationes circa umbilicū. In acutissimis febribus pulsus densissimī, & maximi. Quale est ad uesperā exacerbari, tale erat in omni morbo.

Cæterum ad principia, cōsiderandæ sunt etiam exacerbationes, & an citius redeant, & continuitas, & anni tēpus. Post pleiadum occasum, austrina. Quæ quinta die iudicabātur, intermissa una repetebāt.

At uero laxa, pustulosa erant, uelut Acanthio Lapyto. Circa pleiadū occasum, subscabra, & aspera erant pruriginosa, nullas lachrymas emittentia. & magis quidem hoc tempore. Sed & impetiginosa turgentia. Hæc erant in Pythodori uxore, & Capelio, cum febre, sub cuius initū ferè Pythodori uxori coxæ impotentes.

Post pleiadum occasum horrores. sanguinis è naribus eruptiones.

Sutor quidam septima iudicatus est, una intermissa, altera redijt. Rursus quarta iudicatus est. Alius ex his qui à Leocyde uenerant, septima iudicatus est. Alius quarta. Moschus nona.

Largus sanguis ex sinistra, modicus è dextra nare. Ad decimam quartam ad iudicationē, si quatenus debebant ab initio exacerbarentur. Delinquentes circa edulia decima septima fiebāt.

Circa aurem in dextra parte tuberculum, paruum intus durū, foris paruum laxū, dolorosum, nihil remittens, decima nona noctu factum est.

Valde biliosis suppuratis, purgatio sepiæ atramento maxime similis. Qui cucurbitā affixit, quum in coxa esset dolor, huic ad crus deorsum uenit, & melius habuit.

Qui in Ceramico ab equo lapsus est, cui non statim cucurbita affixa est: uisus est intro, & uigesima die recruidit malum. sanguinis eruptiones fœculenta, & erodentes.

Tenedia quarta die abortiuit, masculum triginta dierum. aluus liquida, tenuia, egressit. lingua combusta fuit. iudicatio quarta die.

Post pleiadum occasum lienosa, usque ad quintum diem fluebant. iudicata sunt.

Cuidam septima die urina uelut erui lotura, similis ipsa sibi ipsi. postea parua recidua. Intermitit etiam Megaris filio, uerum sanguis non fluxit. Vrina uelut Antigenis alba, crassa, similis.

Circa solstitium hybernum, sydus non paruum, quinta & sexta postea terræ motus.

Quæ in Perintho morabatur anhelosa, Antigenis uxor, quæ non sciebat an prægnans esset, menses comparentes rubri. Venter aliàs atq; aliàs paruus, aliàs magnus. Tussiens semper, uelut si celerius iter perfecisset. Mensis erat octauus, sedata est prius febricitans.

Apemāti fratris uxor, septima die abortiuit foemellā uelut dixit sexaginta dierum. Circa nonam turbata est. post iudicationem, dextras partes dolebat, uelut à recidiua. Hæc & concipiebat cito, & perdebat. Alia quædā in albis mensibus filiam peperit. Alia in rubris, uelut conueniebat. Horridi, anxij, cibum auersantes, recidiuantes, biliosi, sanguine manantes, subsplenici, doloroso modo plurimi ex sinistris affecti. Apemanti uxori hac parte oculus distortus est dexter, ad alteram uero partem lateris mollitudo. Aristophontis filia tertia & quinta febricitauit. sicca plerumque perseverauit. Venter tamen huic turbatus. ægre iudicatio fiebat. ultra triginta dies cessauit. Pustulæ ex lassitudinibus non ualde fortibus, perueniunt ad septimam liuidæ. Rigor ancillæ retro Heroum obortus est. At uero albæ magnæ, neque ipsæ ualde bonæ, graui sopore pressorum, & somnolentorum, & non confidentium, & bile renitente: & siue lubrica, siue dura fuerit aluus, non confidentes. Zoili fabri pulsus tremuli tardi, Vrina & alui secessus moderate decolor. pectinis distentio utrinque in directum, usque ad umbilicum, cum febre acuta. cibum auersans. siticulosus. Filia ædilis apud Tecomæum, quum obscurum esset ipsi quod uterum gestaret, secundi mensis initio erupit uomitus pituitosus, aliquando uero biliosus. difficulter peperit. perfecte purgata est. Vomitus similiter usque ad trigessimam diem perseverauit. postea uenter turbatus est, & uomitus cessauit. Lienteria. menses non prodibāt per duos annos hyeme habuit hæmorrhoidas. Duo fratres Cecropis familiares, quibus nigra ab initio prodibant, subfeculenta, edulia ex sanguine confecta colore referentia, ea ex spumosis bile abunde coloratis uiridia erant. Qui alinum ex pacto eleuauit, statim febricitauit. Tertia & quarta, & quinta, & septima, & octaua sanguis erupit. iudicatus est. aluus lubrica.

Vir metallicus. præcordium dextrum intentum, splen magnus. aluus intenta, subdura. spirituosus. decolor. Huic ad genu sinistrū. recidiua. per totum iudicatus est. Temenæ filius habebat quid spiritus, ut uiridantis palloris esset, ad dorsum: ad manus uiridantis palloris. Maritus Lechus puerperæ apud Sitodochum, arquato morbo infestatus, ad quem septima die ingressus sum, octaua moriebatur, neque mingens, neque egerens. Præcordia magna & dura, & spiritus densus. Hic moriens ne frontem quidem sudore humectauit præ dolore. Huius uxor eiecit foemellam septimestrem, septima die. Apparuit autem quarta die. Hanc à principio quidem pedum dolor tenebat. Desinente uero febre, spiritus non est solutus, sed intus relictus. dolor ad manus & brachium. Recidiua per longissimū tempus corripuit eos quibus urinæ ante iudicationem suppressæ fuerant. Quæ erat apud Temenen ipsius soror, cum rigore iudicata est. Quum autem uiridans pallor cito desineret, manus & humeri doluerunt: horum autem cessante dolore, caput: oculorum palpebræ supernæ eleuatæ sunt, & lachrymæ profluebant. reliqua non noui. Iudicata est primum septima die. Menandri uinitor similiter, uerum aluus ab initio tenuia egerebat. postea suppressa est, itemque urina iudicata est, non riguit, septima die: quoniam aluus antea turbata fuit. Potamonis filio aluus non egerebat septima die. duobus diebus ante iudicationem non riguit, quapropter neque urina supprimebatur. Dens Hegesistratio, cui suppuratio iuxta oculum, suppuratus est iuxta extremum, & rursus sanatus est oculi
lus

lus. & secundum nares pus descendit crassum. Iuxta gingiuam carunculae paruae rotundae abscesserunt. Huic circa tertiam diem suppuratio affutura putabatur. postea auertebatur. Derepente uero intumuit maxilla, & oculi. Quibus abscessus ad oculos in febribus ardentibus, hi maxillas rubent, & sanguinem ex naribus fundunt. Sed & quibus ad aures fiunt. Fortassis autem & abscessus ad articulos magis, non tamen clare noui. Rigores tremulis, praecordij intentio. Menses apparuerunt decima septima, iudicatio fiebat ita perpetuo. Si tamen non sic intus permanissent, iudicabantur tertia. quaedam quinta. quaedam septima. Hegesistratio postremi duo dentes parte inter se contigua corrodebantur. postremus habebat supra gingiuam duos nodos, unum iuxta cauernam, alterum ex altera parte. Qua uero parte duo nodi erant, ibi radices latae similes singulis paribus coincidebant, ad alteram partem medietas una rotunda. Mulier cui sanguis e naribus erupit quarta & sexta. Septima iudicata est, rubicunda erat. Mulieri ex capite fortiter grauata, iudicatio facta est circa uigessimam. Vigesima praecordia aestuosa. Septima die non ualde sanguis e naribus erupit. Secessus tenues. ad oculum dextrum circa octauam. Viro eadem, uerum septima iudicatus est. Sublienofus e sinistra parte. Huic octogesima die, & diuturniores oculi affectiones: fortassis quoniam post iudicationem, & quia multae. Vxor Temenae spiritiuosa praecordia, & intenta. Menses per tempus apparuerunt. An uero etiam praegrans fuerit, haud scio. alius primum suppressa, & tunc uomebat. postea non amplius. alius enim multa viscosa ac biliosa egerebat. praecordium non impediebat. Vndecima ad magnum dextrae digitum inflammatio. alui egestio etiam pernitius procedebat. Quibus contingentibus, melius habebat. Nam & in somnum delatio minor erat, & febris: & quodammodo facilius spirabat, quoniam suapramalum uomitum, uomuerat. Decimasexta sensim factus est spiritus densus, & febris. mortua est. Hec febricitauit ante abscessum. Septima post abscessum perijt. Erat & haec rubicunda. Filius mulieris ipsius Apemanti sororis, praecordia magna & splen, spiritus, secessus amarae bilis, aliquantulo stercore ammixto, lassus ex operibus. Vigesima die ad pedes, & iudicatio certe lassis ad articulos, non ad oculum. praecordia uero erant intenta. & sane erat etiam rusticula quaedam modice sicca. Quae relinquuntur post iudicationem recidiuum faciunt. & in ipsis morbis quae excernuntur, sputum praematurum, alui secessus, intemperies, & similia. Apemantus cui dolores in sede, in dextri lateris mollitudine, & iuxta umbilicum paulo inferius, & e dextra parte: ante dolorem urinam cruentam mingebat. desit tertia die. Et faber in altera parte, ex eadem in directum, & hic quoque urinam cruentam eiciebat. Quae ubi cessasset, ambo subsidientias in urinis habebat, & hoc tertia die. Apemantus aut plurimum fouebatur. Alter uero non sentiebat, nisi in dextra parte. Et Nicostrato accidit aliquid iuxta ultimas partes a dextris, inferius quam quibus in sinistris. longe uero subter lateris mollitudinem, usque ad umbilicum utrisque. Anicula apud Sosileum alba pituita referta: Tibiae duris tumoribus, albis, laxis, itaque pedes, uerum minus. Erant autem et in partibus infra femora, etiam si plerisque difficilis huc exitus patet: immo & in lumbis. & ueter tenuis erat, praecordia submollia, spiritiuosa non ualde. Erat autem desinentibus plurimis, etiam alia cura

ubi glauci facti erant oculi. Atque oculorum quidem cura paulo moderatior erat. Coxæ uero ac cruris affectiones uterinæ erant, quum dolores esse putarentur. Apposito enim ac subditio medicamēto odorato, ex farina & unguento, contigit ut breuī discuterentur ac desinerent. Tempus autem abscessus ad oculum, annus. Circumcirca durus fuit, cui etiam pustulæ non perfecte contabuerunt. Sunt autem & à disquamatis talia. Seruus in Hippolochi uilla, cui in præcordiis utrinque quid collectum erat durum, & fulgorem aliquantulum habens inferne, qualis erat in fabri ferrarij uxore hydropica: Cui tenuia recrementa progressa partem aliquam euacuauerunt. Erat autē & hoc ipsum ad dextrū, planum quiddam, supra ea quæ circumferentiam habet eleuatum. Huic umbilicus ex natiuitate denigratus erat, & ulcus profundum fiebat, & umbilicus nō ualde cicatricem contrahebat. & pudendum summā parte denudatum erat, quum non statim tale fuisset, neque conuātū, & adhuc magis fiebat. Hic plurimum uomebat, febris, cibi fastidium. sanatus est. Verum circa septimā à decubitu diem (nam & antea ægrotarat) aquam multam bibens, & fortassis aliter contemnens, iactabatur & aliquantulum conuellebatur. Desinente autē contusione, circa animaduersionem extinctus est. Ante hoc uero urinam acervatam minxit, & flatus cum crepitu prodierunt. & supernæ partes minime sunt euacuatae. Quum autem mortuus esset, statim etiam & illæ fortiter emollitæ sunt, & reliquæ rubefactæ sunt, uelut à flagris per totum corpus, excepta ea parte ubi tumor ille maxime eleuatus erat. & multum quoque calidus erat.

Cuidam uero in Abderis deorsum erupit. Cuidam autem anteriore parte intumescere sine febre. Tumor ad contactum suppurato similis erat.

Famulæ anhelosæ, quum uasa menstruum sanguinem funderent, anhelationes illæ cessabant: febris fiebat, mamma sinistra superne suppurata est. & ab initio etiam auris. Olympiodori famulæ sanguis ex sinistra nare, & iudicata est ad uigessimam, quemadmodum etiam febricitantibus. & secessus quales etiam æstate populariter grassati sunt, & quales Hipponactis. Hyle famula Aristidis, octaua die in pharmacorum purgatione, inferne signa habuit, qualia facile ferunt, & si non præter rationem debilitantur, & neque spumosa, neque sub sanguinolenta, sed qualia sunt oua, uelut Heraclidæ uxor purgata est multum, & facile tulit.

Quæ in Bulagoræ uilla depurgata erat, coepit febricitare ex splene (Qui uero dextrum præcordium habent, non quidem sublime, uerum intentum, hi etiam magis rubicundi fiunt) rubicūda quum esset, aluum in principio turbatam habuit, expectabam ad oculum decubitum. Huic septima die saluginea lachryma mordax ex oculis prodijt, & secundum nasum, & fauces, & aurem sinistram. Decima quinta sudauit cum rigore, non iudicabatur ante rigorem, pallida facta est ualde. & faciei circumtensio ac contractio. Aurem è directo splenis ac lateris dolebat. Pueris uentres turbati, & tussis sicca: quandoque ad humerum suppuratio fiebat in tussibus, posterioribus diebus.

Fullo collum, caput, septima manus torpida. Nona crus torpidum, tussis cessauit. Cui maxilla distracta fuit, in quinto mense in uentre distracta erat ad sinistram partem.

In Cranone Lycino Grammatico, ex febre biliosa ex splene, capitis grauitas, stridebat secundum pulmonem, in labijs utrisque ulcera, intus rotunda, parua. postea etiam sanguinis quid ex nare è directo manauit

manauit. Famulæ quam recens emptâ uidi, cui duricies in dextris erat magna, nō ualde dolorosa. & uēter magnus ac circūtenſus. nō ſimilis hydropicæ, & aliās pinguis ac mollis. & nō ualde difficulter ſpirans, uerum decolor. Menſes ſeptem annis non prodierant. facta eſt dyſenteria, & nō tenefimo tentata. Et ſub hæc duricies in dextra doloroſa erat. & febres tenues. & non ultra ſeptem dies etiam aluus turbata eſt, ſeceſſus electrum referens, ſubuiſcoſus, multus ad aliquot dies. Sanata eſt. & menſes poſtea prodierunt. & partes ſecundum uentrem molles fiebāt. & corpus boni coloris ac craſſum ipſi erat. Minois uxor ex ſectione, preſſa ab eam adminiſtrātibus durius, marcorē ac corruptionē incidit, malo ad pulmonem deueniēte, breui ſignificationē de ſe dedit quotquot diebus ſupērerat. erat & aliud quiddam intrinſecus. Quæ induntur in nares ſi febricitarint, ſi quidem ſolutus fuerit dolor, craſſa per nares effluunt. Si uero neq; dolor, neq; febris, tenuia: & fortaiſis feruida: Veluti tenue quidem Hegiſippo, quum ad noctem quid indidiſſet. Craſſum uero illi in Corintho eunucho ſimili, Celeuris filio erat. Maturi in morbis abſceſſus an iudicent, ſi ſignum eſt, ſi dum feruida ſunt mala, non febricitarint: & dum moleſta ſunt, facile portarint: Velut quæ in ſede acciderunt Charoni. Leambio uero quū inteſtinum ulcerōſum eſſe putaretur, in dyſenteria pharmacis curato, humerus & ſedes ulcerata ſunt in ſiniſtra parte, citra febrem. Cui à flatibus laterū mollitudo eleuabatur, & aliquantulum dolebat, huic quū lac uberius & meracius biſſet, & in ſuper dormiſſet, ſtatim nauſea & calor accedebat. Deinde ignē incendenti, & pro cibis farinam craſſiorem in craticula coctam comedenti, aluus ſubſtitit. & purulentū tamen quiddam egreſſit. Quum autē ſedes eſſet inflāmata, ſine febre & ſine dolore ſufficienter erat. hoc aſſero. Senex in lapideis ueſtibulis, lūbos doluit, & ambo crura, & utriq; dolores deſcēdebant ad femora, & quandoq; tibias, & aliquando ad genua. & quū diutiſſime durarēt, reſuſcitatio multæ fiebāt. tumor in pedibus, lumbis, tibia. breues inguinū tumores. uenter durus. & totus pecten intenus ac doloroſus. Plerūq; cōpertus eſt etiam ueſica durā habere ac doloroſam. & papularū eruptiones, & calores oculis, auriſus, naribus, manu. ludicationes, & alia per quæ cognoscimus de ipſo ægro, an ſudet, aut tangat, aut aliquid olfecerit, aut guſtauerit, itemq; alia cognoscuntur. Pili, color, cutis, uenæ, nerui, muſculi, carnes, oſſa, medulla, cerebrū, & à ſanguine uiſcera, uenter, bilis, aliq; humores, articuli. & poſtea an doluerit iuxta aurem, iuxta ipſam collectum tuberculum, glandulam nō attingens, os nō ſuppurans, & hoc diſparuit. & tunc ſtatim febricitauit. Pulſus, tremores, conuulſiones, ſingultus, circūſpiratio, ſeceſſus, per quæ cognoscimus. Suppuratis oculis, & dum erumpunt, ulcera magna fiunt, & dum ſecantur, profunda. & utroq; modo oculi ulcerantur. Ariſteas ex pago Amphiloſchi quarta die mentem motus eſt. aluus ſubuiridia egerebat. & ſomni ſalubres. albicantis coloris.

Quibusdā ab initio ſubtremuli digiti, & labia ubi loquerētur, itidemq; aliarum partes: & proterue lingua citiore ac uolubiliore præditi: his rubor in facie maxime erat. Hi ebrioli erāt, aut uomitu cōmode uſi intumeſcebāt. Qui iuxta Medoſadē egedes habitabat, cui tenuia, nō biliōſa, aquoſa, multa, per ſeceſſum prodiebāt. præcordiū cedēs & gibboſum: ſoporofus fiebat. Circa decimā quartā ad iudicationē maxime progreſſo, rigor ſine tremore. diſſolutio. reſolutio. cōtractio. ſeceſſus

secessus & egestionēs. soporofus. mente motus. ex fomno non infanſit. iudicatus eſt circa decimā quartā. nihil ē iudicantibus contrarium. Alius ſimiliter in principijs ſeceſſus ſubuiſcoſi, ex quibus quod craſſum eſt iudicatorium eſt. inſomnis. poſtea ſubuiſcoſi, ſubbiſioſi, maturi, bilioſi, non tenues : qui ubi compaſti fieri coepiſſent, iudicationes celeres. Præcordiū intentū apparuit inflammati, aut uenarū intentarum modo, circa ſextam. Poſtea dormiuit ſeptima, iudicatus eſt circa nonam. albicantis coloris ambo, non fului. Quū ſeceſſus aquoſi ſub diō expoſiti eſſent, ſuperne leues, tenuēs, iſatidi ualde ſimiles fuerūt: inferne uero ſubſidentia habebant. Quibus in dextris diſtentio ſubmollis, phrenitici ſunt: ſi non ſoluatur febre deſinente. Quibus autē à mollitudine uentris in hac ipſa febre, quiddam collectū aut durum doloroſum fit, & ualde malignum diſſundi non poteſt, ex talibus fortaiſis ſuppurantur. In dextris tumores eleuati, ſi quidem ſi quis plurimum ac maxime premat, ſubmurmurant, non ualde maligni putandi ſunt. Velut in dextris illi qui ex Amphiloſchi pago erat, & ei qui iuxta Medoſadæ ædes habitabat. Hi ſoporofī erant, & inſomnis mente moti. Conſtitutiones quales in quibus temporibus ac regionibus magis & minus ſiunt. Vigores morborum, & ad iudicationem, & quotidie. & an citius ſiant aut ſerius, tertia, quarta, circuitu. & in quibus circuitibus iudicantia, tumentia, cruenta, & non. Quibus abſceſſibus recidiuæ ſiant, uenæ temporū, & cōtractiones, & colorū mutationes ante iudicationes, ex rubro ad uiridem ac pallidum, ſi non iudicent. & cutis circūtenſiones abſq; iudicatione. & oculorum cōtractio, corporis duricia ſicca. Qui quidem uolentes lachrymantur, non malum eſt. Quibus autē inuitis lachrymæ profluūt, malum. Quibus in dentibus circūcirca uiſcoſa ſiunt, malum eſt ſubhiare ac fixis oculis intendere. Qui in tibia ulcus habebat, & Attico uſus eſt, huic puſtulæ eleuata, rubræ, magnæ: atq; hoc pro tuſſi quæ poſtea acceſſit, prius enim non tuſſijt. In Aeno quicunq; capite uulnerati horridi erāt, maligni & ſuppurati ex tenefmo, ex peregrinatione ac itinere dolor pedum, & in turbationibus laſſitudines. Clinia cibum auerſans, colliqueſcens, purulentū, aliquādo parū cruentū, purulentū tumidum eiecit. Hippeæ uxor hydropica, quæ etiā per tres annos uere incipiēte tuſſijt, amplius aut ſuppurata eſt, ad hyemem aquoſa facta eſt, ab illis aut pharmacis curata melius habuit. Mortua eſt ancilla. Ex tuſſientibus qui manibus laborabant, uelut ſeruus ille qui ſarmenta obtorquebat, & Amyntæ filius, ambo ſola dextra reſoluti ceſſauerunt, quādo quidem perpeſſi ſunt hoc tuſſientes. Qui uero aut equitarūt, aut iter fecerunt, in lumbis ac femoribus reſoluti ſunt. Plurimæ uero tuſſes ſiccæ erant: ſimul minus, uiolentæ ſanè. Vxor Emmyris modo nō morboſo, abſq; febre, ſtupida eſſe uidebatur. poſtea ad tremorē totius corporis res ipſi deuenit, et ad colliuationē. & cibi faſtidium ac ſitim. & frigida erat. Nyctalopes qui plurimā minxiſſent, poſtea parū quiddā mingebant. Verū tuſſientes & inſuper febrientes tubercula ad aures habebant, erumpentia circa ſeptimam aut octauā diem; Emmyris filia febricitabat, & ex aure purulentum fluebat, circa octauam haud pro comperto habeo. Quibuſdam uero etiam dens corroſus fuit, tertius maxime ex ſupernis. Præ omnibus autem hic reperitur corroſus. ad hunc dolor, & quibuſdam etiam circumſuppuratio. Quibus uero ad aures, hi

magis tussiebant q̃ illi. Quibus autem cū febribus ad suppurationē, septima recedit. Cuidā postq̃ exacerbatus fuit, præcordium solutum nō est. aluo autem emollita, inērant pauca subuiscosa, compacta, non bona utrina cruēti coloris. spuebat autem sputum spumofum. Ille ad quē Cynicus me induxit, septima exacerbatus est. circa decimā quartam iudicatus est. Disparentia, mala sunt, purus fauces. pauca, lata, matura expuens. ex naribus parū sanguinis stilauit. capite grauatus erat. Manuum ac pedum dissolutio. aluus soluta profuit. pedes semper calidi. somni aderant ipsi. & iuxta aurem nō extuberabat, quoniā matura spuisset. Demarati uxor, pedes etiam in horroribus calidi: siue ad suppurationem, siue non tendebat, pert̃t. Senex qui ē uita decessit, agrotabat simul cū uxore sua, furiosum quiddam in se habebat. Postea uero ubi prodijisset ab ipso lumbricus subcrassus, & modicus cibus, statim sedatus, & dormiuit, & sanus erat hic senex. & corporis cutis circūtensio. extremæ partes frigida. mollis. tremulus ab initio & labijs, & manibus, & uoce. mente motus est moderate. hiabat ac fixis oculis intendebat. non ualde difficulter spirabat. diebus haud scio quot ultra uiginti mortuus est. Quibusdam præcordia & aluus subegerunt compressa, aceruatim, nō cum murmuratione, uelut in Abderis uermium speciem præ se ferentia. Quicquid contingit priore iudicatorios dies præcedente die, & mala & bona signa fiūt in diebus, quibus qui exacerbantur diuturniores fiunt: & quibus desinētes remorantur. Quædā non fideliter alleuabant, & quædam per seipsa exacerbabātur. Spura peripneumonici quibusdam biliosa, quum desinere uolunt. Valde flaua breuia fiunt. Si qualia sunt quæ in principijs adsunt, talia postea appareant, hæc nō ualde concoqui puto: sed iudicare uelut ei qui apud præceptorē erat, & uelut aliàs quoq̃ uidi. Nicippus in febribus per somnū semen effudit: & nihil ad prius profecit. & hoc ipsum sæpe ipsi factum est, & nihil læsit. Prædictum est ipsi id destitutum, postquam febres iudicatæ forent. & sic factum est. Critias in febribus ab insomnijs uexabatur quæ nouimus, & cessauit etiam ipse eadē somnia reuā cum iudicatione. Alcippus quum haberet hæmorrhoidas, à curatione prohibebatur. Curatus insanijt. febre acuta succedente cessauit. In febribus acutis siticulosi, à medicis potu interdicto, aut etiā à seipsis abstinentes, multum sibi bibere posse uidentur: his aqua frigida data ut reuomant, prodest. Biliosa enim aderunt. Quod nerui ipsi in seipsos trahunt, signū est. Si quidē enim nerui in supernis manus fauciati fuerint, manus deorsum nutabit, dū ab infernis neruis trahitur. Si uero contrā, uice uersa. Tussient siccam tussim: qui testes affectos habent, & ex tussi uena secta, ad testem solutio fit, & inflammati tussiuunt. & in febribus ex inguinum tumoribus insuper tussiuunt.



IN Helide olitoris uxor. febris corripuit ipsam acuta. & medicamenta bibens nihil sentiebat opis. In uentre infra umbilicum erat quid durum, & altius altero, & dolores exhibebat fortes. Huc enim manibus cum oleo fortiter compressum ac emollitum est. & postea sanguis frequens ipsi deorsum processit, & sanata est, & uixit. In Helide Timocrates amplius bibit. Infaniēs autē ab atra bile, bibit pharmacū. hic purgatus est. purgatio multā pituitam ac hilem atrā egerebat per diem. & ad uesperā purgatio cessauit, & dolorem pertulit in purgatione multum. & quum polentā bibisset, somnus ipsum corripuit, & tenuit per noctem, donec sol oriretur. In somno autem praesentibus nihil respirare uidebatur, sed mortuus esse. & neq; quid diceretur, neq; quid fieret, sentiebat. Extentū autē fuit corpus et rigidum. Verū uiuebat, & excitatus est. Scōmphus in Oeniadis pleuritide correptus, mortuus est septima delirus. Pharmacum autem bibit infra purgās. priore ante positionem die mentis compos erat, & purgatus est non multum. quum autē purgaretur, delirauit. Phoenici in Oeniadis & Andreae fratribus maxilla altera intumuit, & labium quod est ante maxillam & oculum. & neq; intrinsecus quicquam spectanti apparebat, neq; forinsecus suppurabat. Sed tumens arida putredine putrescebat. Et alter eadem perpeffus est. Mortuus est autē alter septima die, & pharmacum bibit, & nihil profuit. Verū Phoenici circulus putridus exfectus est. & ulcus purgatum est magna ex parte priusquam moreretur. Mortuus est autem & hic, ubi diutius uixisset. Euridamus in Oeniadis, in peripneumonia decima die incēpit delirare. curatus ad mētem redijt, & sputa erāt puriora, et morbus ad melius procedebat, & somno multo perusus est. & oculi morbū regium contrahebant. & mortuus est ad uiginti dies. In Oeniadis uir quidam morbo tenebatur, quum sine cibo esset, fortiter in uentre ipsius fugebat, & dolebat. & quum edisset ac cibi contriti essent, tempusq; post cibum accessisset, non lōge postea idem hoc patiebatur. & tabescebat corpus ac consumebatur. & alimentum ipsi non cōtingebat à ciborum esu. & per aluum secedebat cibus prauus & combustus. Quum uero recens cibum accepisset, eo ipso tempore minime fugebat, neq; dolor aderat. Hic omnis generis pharmaca bibens sursum ac deorsum purgātia, nihil opis sentiebat. Vbi uero uena ipsi secta esset in utraq; manu, donec exanguis redderetur, postea utilitatem percepit, & à malo liberatus est. Eupolemus in Oeniadis, dolebat coxam dexteram, & inguen, & cōmissuram propinquam ad coxam, ab inguine & coxa in anteriore parte. Huic sanguis detractus est à talo, multus ualde, et niger, ac crassus. & pharmacum bibit aluum deorsum purgans, & multum purgatus est. & melius quidem habebat, dolores autē non remittebant. Sed suppuratam habebat & coxam, & cōmissuram in ipsa ad sedem, & partem circa inguen, quibus locis etiam amplius dolebat. Pus autem ad os magis fiebat, q̃ ad carnē, in profundo, & per tempus sic habens negligebat, donec ualde debilis fiebat. postea crustæ

tristia ipsi inusta sunt, ualde multae & magnae, ac inter se propinquae. & pus effluxit multum ac crassum. & mortuus est postea paucis diebus, tum praemagnitudine ac multitudine ulcerum, tum ex corporis debilitate. Huic si una amputatio incisa fuisset, & per sectionem pus emissum esset, & si opus fuisset, etiam altera sectio facta esset: Haec sane in tempore si facta fuissent, mihi quidem uidetur quod sanatus esset.

Lycon in Oeniadis, reliqua quidem eadem patiebatur, Verum dolores etiam ad crus non ita ualde progrediebantur, & non factus est suppuratus, sed sanus multo tempore. Bibebat autem pharmaca. & cucurbitas adhibebat. & uenam secabat. Atque his factis melius habere uidebatur.

Homo quidam Athenis prurigne toto corpore uexabatur, maxime autem testibus ac fronte, uexabatur autem ualde uehementer. & cutis crassa erat per totum corpus, & uelut lepra aspectu, & ex nulla parte cutem apprehendere potuisset, praecrasitudine. Huic nemo opitulari potuit. Transgressus autem ad Mesolum, ubi sunt calidae balneae, a pruritu quidem & cutis crasitudine liberatus est, uerum hydropicus factus mortuus est.

Athenis uirum cholera corripuit, uomebatque & deorsum egerebat, & dolebat. & neque uomitus, neque per aluum secessus, sisti poterat. & uox ipsum destituebat, et ex lecto moueri non poterat. & oculi caliginosi ac caui erant. & conuulsiones tenebant ab aluo & intestino, & singultus. Verum secessus multo copiosior erat quam uomitus. Hic ueratrum in lentium succo bibit, & alterum lentium succum insuper bibit, quantum potuit, & postea uomuit, & coacta sunt ac adstricta ipsi ambo, frigidus autem factus est. & lauabat inferne usque ad pudenda, calida ualde multa, donec etiam supernae partes calefactae sunt. & uiuebat. postera uero die, polentam bibit ex aqua.

In Larissa uxor Gorgiae menses suppressi erant per annos quatuor, praeter ualde modicos. Verum in utero, ad quamcunque partem se inclinasset, pulsus exhibebant ac grauitatem. Haec mulier concepit, & peperit, & puella uiua nono mense edita est, ulcus habens in coxa. & secundae consequentes, ac sanguinis fluxus ualde multus, successerunt. postridie, & tertia die, ac quarta, etiam grumi sanguinis concreti. & febris tenebat usque ad decem primos dies. & de caetero prodijt ipsi sanguis ruber, & facies fortiter intumescerebat, itemque tibiae, ac pedes ambo, & alterum femur. & cibos non admittebat. Sitim autem habebat uehementem, & frigidissima aqua conferebat. Vinum autem nequaquam. At uenter post primum puerum modice emollitus est, ualde autem non considit, sed durior erat. dolor autem non aderat. Quadragesima uero die a prima superfœtatio excidit, caruncula quaedam, & uenter considit omnesque tumores. & fluxio tenuis, ac sanguis oculus prodijt, & sana euasit.

Mulier in Pheris caput circūcirca dolebat multo tempore, & nemo poterat illi quicquam opis conferre, neque dum caput purgaretur. Melius autem habebat, quum menses ipsi facile prodibant. Haec quum caput doleret, ex subdititijs odoratis ad uterum apposis opem sentiebat, & modice depurgata est. & quum concepisset, dolores caput relinquebant.

Mulier in Larissa praegnans erat. Huic decimo mense sanguis prodijt multus per quatuordecim dies. Plurimus autem tribus diebus ante pueri editionem. Decima quarta excidit ex utero puer mortuus, habens dextrum brachium lateri adhaesum. & tertia die noctu eadem hora qua puer, prodijt secunda, & purgamenta alba, deinde post haec per tres dies ac noctes multa moderate prodierunt. Postea

febris corripuit, per duos dies totidemq; noctes, & dolebat omnem uentrē, & coxas, maxime uero pectinem. In Larissa Hippoſthenes peripneumonia

apprehenſus eſſe medicis uidebatur, erat autem nequaquā. Verū principio luētans in duro loco cecidit ſupinus, aduerſario ipſi illapſo, & lauatus eſt frigida, & cœnauit, et grauior factus eſſe ſibi uidebatur. Sequenti autem febricitauit, & tuſis apprehendit ſiccior, & ſpiritus denſus. Quinta die cruentum exſcreauit, non multum, & delirare incipiebat. Quando tuſiebat, dolebat pectus & dorſum. Sexta autem ubi ſternutaſſet, ſanguis fluxit è naribus, quatuor heminarū menſura. Ad ueſperam neq; loquebatur, neq; ſentiebat, neq; quid fieret, neque quid diceretur. Vndecima mortuus eſt. Per quinq; uero dies, modo ſapiens erat, modo non. Erat & ſine febre. Spiritū autem nullum recipiebat, neq; ſtortorem habebat. Non enim erat ſputū.

Scamandrus in Lariffa, & in coxa marcorem habuit, & in oſſe diu diſparato. Ipſe uero ſectus eſt ſectione magna, etiā ad os ipſum, & poſtea uſtus eſt & tunc die duodecima poſt ſectionē cœpit cōuulſio, & ualde obtinuit. cōuellebatur autē crus hoc uſq; ad coſtas, & ad aliam quoq; partem cōuulſio progrediebatur. flectebatur autem crus, & extendebatur: & alia membra mouebat. & maxillæ compactę riguerunt. Hic mortuus eſt cōuulſus octaua die poſt cōuulſionis inuaſionē. Curabatur autem tepeſactorijs utriculis, & fomētis erui, per totū corpus. & inuſum per clyſterem immiſſum eſt, & tunc modicum ſtercoris prodijt. & pharmacum bilem abunde purgans bibit, ac in ſuper catapotii deglutiuit, & ſeceliſit quidē, nihil autem à catapotio opis ſenſit. & ſomnus modicus uenit, & ruriſus pharmacū idem forte ad ueſperam bibit, ac ſole emergente mortuus eſt. Videbatur autem multo tempore morbum ferre potuiſſe, niſi ex pharmaci ui periſſet.

Equiſo Palamedis in Lariffa undecim annorū, percuſſus eſt in frōtem ſupra oculum dextrum, ab equo: & uidebatur os non ſanum eſſe, & exiliebat ex ipſo modicus ſanguis, & ſectus eſt ſectione magna uſq; ad ſecundam laminā, & curabatur ſic habens ipſum os, quod etiam antea ſtatim os peperit. Vigefima tumor cœpit circa aurē, & febris & rigor. & in die magis intumeſcebat ac dolebat tumor. & ab initio febricitauit ex rigore. & oculi intumuerunt, & frons, & tota facies. Patiebatur autem hæc in dextra magis capitis parte. Progreſſus eſt autem tumor etiam ad ſiniſtram. nihil tamen hic læſit. Demum febris cōtinua corripiebat. Atq; hæc minora erant, uſq; ad octauam diem. Vixit autem uſtus, & per catapotium purgatus, & cataplaſmate tumori impoſito. At uero ulcus nullius malī cauſa erat.

In Lariffa Theophorbi filius ueſicam ſcabioſam habebat, & uiſcoſam urinam mingebat, & dolebat dum & inciperet mingere, & dum deſineret. & conſtricabat pudendum. Hic quum bibiſſet pharmacum urinam ciens acre, in ueſicam quidem nihil proceſſit, uerum multum purulentum & bilem euomuit, & deorſum alia huiuſcemodi egerebat. & uentrem dolebat, & intrinſecus ardebat. Reliquum uero corpus frigidum erat, & totus reſolutus eſt. & nihil aſſumere uolebat. Huic exulceratus eſt uenter fortiter ualde, à ui medicamenti, & mortuus eſt tertia poſt potionem die.

Vxor Antimachi in Lariffa, prægnans erat diebus circiter quinquaginta, & reliquo tempore præ ſtudio à cibo abſtinebat, & per ſeptem dies uterum dolebat, & cor. & febris corripiebat. eo tempore nihil per alium egerebat. huic datum eſt catapotium deorſum

purgans fortius q̄ conueniebat, & euomuit bilem combustam, præ cibi abstinentia & febre. Nam neq; ullo potu utebatur. euomuit autem paucā uiolenter, & grumosa. & ubi concitata fuisset, ac ipsam emisisset, debilis esse uidebatur. & non uolebat aquam bibēs euomere. Postea uero dolor fortis tenebat infernum uentrem: exulceratus enim erat à medicamēto, & prodibat ipsi statim post steræcus, subcruentū ramentosum. Semper aut̄ amplior fiebat & debilitas, & cibi fastidium; & purgamēti erant hemina quinque. Siscebatur autem aluius, aqua multa super uentrem affusa, aliud autē nihil potuit admittere. Mortua est circa mediam noctem. Videbatur uiuere potuisse, si aquā bibere potuisset, ac statim uomere priusquam deglutiuiisset. Famula Onesidemi in Larissa, ulcerata est aluium & intestinum, à bile sponte cōmota, & prodibat fursum ac deorsum bilis & sanguis. & febris tenebat. Huic debili datum est pharmacū deorsum purgās in potu, debile, aquosum, ac modicū. & uomuit ab ipso multum. & infra amplius subiit. & uestperi rediit. Postridie febris erat, sed debilis. Aluius autem ulcerabatur, & adhuc eadem egerebat. Tertia die ad uesteram mortua est, quum febris ualde fortis ipsam corripuisset. Quapropter omnino moritura esse uidebatur. Minime uero ideo quod aquam frigidam biberat, donec uomitus tenebat. Postquam autē perfrigeratus est supernus uēter, depurgatus per aquam, succo frigido postea poto, sic postea infusum per clysterem immissum est. Eudemus in Larissa, hæmorrhoidas habens fortes, ac diurnas, quum exanguis esset, bilis commota est, sed leniter in corpore. & aluius turbata deorsum biliosa egerebat, & hæmorrhoides intumesciebāt. Pharmaco deorsum purgantē poto, probe depurgatus est. & rursus bibit succū, & amplius aluius turbata est. & dolor ad præcordia consistebat. Huic quum uenter non probe haberet, sed adhuc curatione indigeret, manus hæmorrhoidibus admotæ sunt, & uomuit. Postea quum cancer successisset, febris irruit, & non dimisit antequā occideret. Quamdoq; etiam quum rigor subrepēs dimisisset, febris uenit; & prodijt ipsi bilis & flatus, & partim prodibat, partim intus erat. & dolor in uētre. Hæmorrhoides autem extra intestinum rectum erant, reliquo tempore à purgationibus auspicatæ. & flatus per ipsas prodibat. & ad sternutationem principium fiebat.

In Larissa uir quidā sauciatus est cominus ex manu per hastam latā à tergo, et summum eius penetrauit infra umbilicum per multum spatium, quod liuidum erat & tumidum: postquam autem uulneratus fuit, dolor obtinebat primū fortis, & uenter intumescibat. Huic postridie datum est pharmacū deorsum purgans, & egessit modicum cruentum, & mortuus est. Videbantur intestina huius non esse sanā, & uenter sanguine plenus esse. Apellæus Larissæus ætatem habebat annorum circiter triginta, aut parū aberat. Corripiebatur autem morbo, à quo uexabatur noctu magis in somno, q̄ interdiu. Aegrotabat autem ad duos annos ante mortem. Vomebat bilem fuluam aliquando ubi exciatus esset. Vomebat etiam nigrā. Hic purgatione à capite forti ualde ad multum tempus purgabatur. & quum pharmacum bis bibisset, sex menses ipsum penetrauit. Erat ualde uorax multi cibi. & quum corpus haberet biliosum, multum luctatus, ualde riguit. & febris corripuit, ac morbus ad noctem. postridie sanus esse sibi uidebatur, & rursus altera die. Sequenti uero nocte morbus inuasit cœnatum à primo somno, & per noctem ac diem, & usque ad cœnam te-

nebat. Mortuus est priusquam resipisceret. Conuellabatur primum circa extraspates, faciemque ac reliquum corpus. postea in sinistris. et quum uideretur quietus esse, soporem habebat ac sternebat. & rursus succedebat morbus.

Eumelus Larissæus rigida habuit crura, & manus, & maxillas. & non poterat neque extendere, neque flectere, si non alius flecteret ac extenderet. Et neque maxillas diducere poterat, si non alius diduceret. Aliud uero nihil neque dolebat, neque edebat, nisi mazam, & aquam mulsam bibebat. Vigesima die sedens cadit supinus, & caput ad lapidem uehementer offendit, & uertigo ipsi caliginosa offusa est. & paulo post surgens, sanus erat. & soluta erant omnia, præterquam post somnum ubi excitaretur, articuli modice ligati erant. Erat autem duodecim aut tredecim iam annorum. & agrotauit mensibus tribus aut quatuor.

In Larissa uirgo quæ sanguinem uomuit non multum, suppurata facta, febribus corripientibus, non liberabatur priusquam moreretur. Mortua est tertio mense. Ante mortem uero obsurduerunt ei aures, & non audiebat, nisi quis ualde exclamasset. Verum ante sanguinis uomitum debilis erat. Formula Dyseridis in Larissa, quum iuuencula esset, ubi uenere uteretur, fortiter circumcirca dolebat. Aliàs autem sine dolore erat. Concepit autem nunquam. Et quum sexaginta esset annorum dolebat à meridie, uelut ex partu uehementer laboraret. Hæc quum ante meridiem porrum edisset multum, postquam dolor ipsam corripuit uehementissimus, & priores omnes excedens, exurgens asperum quiddam in ore uteri deprehendit. postea quum ipsa animi deliquium incideret, alia mulier immissa manu, expressit lapidem asperum, magnitudine uerticilli fusi. Et sana tunc statim, & postea erat. Malienfi currus onustus inductus est supra costas, & costas confregit. & per tempus substitit ipsi pus infra costas. Vstus sub splenem penicillis ac linamentis utebatur, & peruenit ad decem menses. Resecta uero cute, cauerna apparuit ad tenue intestinum utrinque procedens, & ad rhenem, & ad ossa procedebat putrida. In hoc non animaduersum est, quod & corporis habitus biliosus erat, & in corpore putredo sicca tenuis intestini multa, & aliarum carniū, quas statim eijcere oportebat, si quis potuisset sicco pharmaco, dum robur aliquod homo habebat. Nam ab humidis nihil remittebant, sed putrescebant. A linamentis uero inditis quum humor sisteretur, rigor corripiebat & febris, & magis putrescebat, affluebat autem isthic putridum quiddam, subnigrum, graueolens. Priusquam uero curationis aggressio fieret, quotidie multum foras penetrabat. Erat autem non probe, fluidum. Cognitum est naturam morbi esse magis remotam, quam subter cutem. Quod si uero etiam omnia recte facta essent, tamen non uidebatur seruari posse, etiamsi uetris profluuium ipsum corripuisset.

Autonomus in Omilo, ex capitis uulnere mortuus est die decimasexta, in media æstate lapide ex manu ictus, in futuras in medio sincipite. Quare non animaduerti ipsum secari opus habere. deceperunt enim me futuræ habentes in seipsis iaculi læsionem, postea enim conspicuum id fiebat. Primum quidem ad clauiculam, postea ad latus dolor fortis ualde. & euulsio ad ambas manus uenit. In medio enim capitis ac sincipitis ulcus habebat. Sectus est autem die decimaquinta, & pus prodij non multum. Membrana uero cerebri imputrefacta apparebat. Formula in Omilo ex capitis uulnere, duodecim annos nata, moritur in media æsta

te, decimaquarta die. Ianuam quidam ipsi impegerat, & os contuderat ac ru-
perat. Suturae uero in ulcere erant. Quare cognitum est recte sectione opus ha-
bere. Secta est autem non uelut oportebat, sed quantum relictum est, pus in ip-
so factum est. Octaua, rigor, febris inuasit, habebat autem non uelut oportebat,
sed quantum etiam prioribus diebus quando febris non tenebat. Nona ue-
ro die reliquum resectum est, & ualde modicum pus cum sanguine subtus ap-
paruit, & membrana cerebri pura erat, & somnus quidem occupabat, febris au-
tem non diimittebat. Conuulsio uero manum sinistram inuadebat. Nam in dex-
tris magis ulcus habebat. Cyrenius in Omilo suppuratus factus, infer-
num uentrem uetus est, triginta diebus serius quam oportebat, & mansuete se
habebat, & resiccatus est pus in uentre. Verum in calidissimo tempore edens
fructus pomorum, & alios cibos non cōferentes, à febre correptus est, & à uen-
tris profluuiio, & mortuus est. Hecafon in Omilo, uelut etiam alter serius
ustus est, attamen resiccatus est uenter, modico excepto. Dysenteria uero arri-
piebat ipsum, quā ubi effugisset, omnia edebat donec totus intumuit, & erupit
ipsi pus deorsum, & uentris profluuiio mortuus est. Hecafon in Omilo, ab
immundicia non purgata, & à praua purgatione, dolorem acutum in coxa ha-
bebat, & hic quidem discessit, successerunt autem ipsi febres, & multo tempo-
re in lecto decumbebat, neque bibens quicquam, neque sitiens, & debilis, & horri-
dus. Huic commode quidem abiatus est morbus uelut conueniebat. Opein au-
tem percipiebat ex his quae offerebantur. Tandem uero erupit morbus deorsum,
& totus secessit praemulta bile, & mente motus est, & mortuus. Videba-
tur autem morbum euasurus esse. Qui in Salamine in anchoram incidit,
in uentrem fauciatus est, & circumcirca dolebat. Bibit autem pharmacum, & non
egessit deorsum, neque reuomuit. Mulier quae iugulauit seipsam, suffocaba-
tur, & datum est ipsi longe postea pharmacum deorsum purgans, & per seces-
sum ipsi exijt. Qui ex Euboea uenit adolescens, quum multum esset deorsum
purgatus, intermissione facta quietus febricitauit. Deinde quum putaret
se purgatione sursum uersus opus habere, non ualidam radicem ueratri bibit,
& post potionem quarta die mortuus est, nihil expurgatus. Verum somnus ip-
sum tenebat, & sitis sedari non poterat. Serua illa cui à catapotio sursum
quidem pauca prodibant, ac suffocabant: deorsum uero multa, nocte mortua
est. Erat autem barbara. Quidam homo Euboeus poto pharmaco deorsum
purgante, per tres dies purgabatur, & mortuus est. Habebat autem manum
suppuratam usque ad cubitum. Symmachi filius à bile suffocabatur, noctu
quum dormiret, & febris eum teneret. Pharmacum autem ubi bibisset, non
continuit, neque purgatus est diebus sex antequam moreretur. Qui iuxta
curriculum habitabat, quum noctu sanguinem uomuisset, postridie mortuus
est, sanguinem uomens multum, & strangulatus. Ad splenem uero, & deorsum
multus sanguis ipsi prodibat. Puer à mulo percussus uentrem & he-
par, mortuus est quarta die. Spiritum autem densum habebat, & non intelli-
gebat quicquam, & febris tenebat. Hermophili filius aegrotabat diebus undecim.
Febris autem tenebat, & cibi non deorsum prodibant, & primum quidam
delirauit, nocte uero cessauit. Sequenti autem die uoce destitutus ia-

cebat stertens, distortos habens oculos, febricitans. Penna uero immissa uomuit bilem atram, & quum infusum per clysterem immissum esset, stercus prodijt multum. Seruæ Aristionis pes sua sponte marcore corruptus obtorpuit, iuxta medium pedis intrinsecus ex obliquo; & ossa putrida facta abscesserunt, & prodibant paulatim fistulosa. & uentris profluuiū succedebat, & mortua est.

Mulier sana, crassa, à catapotio conceptus gratia accepto, dolorem habebat uentris, & tormen in intestino, et intumuit. Spiritus autem sistebatur. & desperatio erat cum dolore, & sanguinem uomuit non multum. & emortua est quinquies, ut uita decessisse putaretur. & neq; uomitu facto ab aqua frigida laxabatur, neque dolor præsens, neque spiratio. Superfusæ uero sunt ipsi aquæ frigide amphoræ circiter triginta super corpus. & sanè hoc solum prodesse uidebatur. & postea deorsum processit bilis multa. Quum autem dolor obtrineret, nihil poterat secedere. & uiuit. Antander à catapotio accepto, cætera sanus erat. Verum circa uescam dolorem habere uidebatur, purgauit ipsam celeriter multo purgamento. & à meridie dolor tenebat fortis ualde. & in postquam diem strangulatio, & desperatio, & iactatio. & uomebat, & nihil per secessum egerebat. & noctu patiebatur. & somnus non accedebat. postridie uero egerebat multum, & postea sanguinem. & mortuus est.

Athenadē puero masculino à Phagedæna ulcere corroso, doluit à sinistra parte dens infernus, à dextra supernus. Huius auris dextera suppurata est, dum non amplius doleret.

Sutor in Pityo dum soleas ueteramentarias fueret pupugit seipsum supra genu in femur. & ferme longum digitum immerisit. Huic sanguis quidem nullus effluxit. Vulnus autem cito clausum est. femur autem totum in tumore eleuabatur, & procedebat hic tumor usq; ad inguen & lateris mollitudinem. Hic tertia die mortuus est.

Quidā iuxta inguen sagitta percussus, quē nos uidimus, maxime præter omnem opinionem seruatus est. Neq; enim cuspis exempta est, erat enim ualde in profundo: neq; sanguinis eruptio ulla memorabilis fiebat: neq; inflammatio: neq; claudicauit. Cæterum cuspidem inuenimus nos, ipsamq; exeminus, quū sex iam essent anni, ex quo sauciatus erat. Suspicio autem erat hæc, inter medios nervos cuspidem occultatā fuisse, nullamq; uenam aut arteriam dissectam esse.

Qui percussus est spiculo acuto retrorsum paulo infra collum, uulnus quidem habebat nō memorabile aspectu, neq; enim in altum ferebatur, uerum non multo tēpore postea exempto spiculo, distendebatur in posteriorem partem tractus, uelut opisthotonici. & maxillæ ligatæ erāt. & si liquorem aliquem in os sumeret, eumq; deglutire conaretur, rursus relidebatur ad nares. Cæteraq; statim peiora fiebant. & secūda die mortuus est. Adolefcens per asperam uiam cursu facto, dolebat pernam, maxime inferna parte. Abscessum autem locus accepit nullum, uelut qui colligeret humore. Verum tertia die totus locus nigrescebat, usq; ad talum, astragalum appellatū, & usq; ad cavitatem quæ est ad pectus pedis. & quod denigratum erat nō diffringebatur, sed prius moriebatur. Viginti uero dies ex toto à cursu uiuit.

Qui ad oculum percussus est, percussus quidē est in palpebram, descenderat autē cuspis alte satis, barbæ uero summum supereminebat. Secta palpebra, sublata sunt omnia. Nihil erat mali. Oculus enim permansit, & compendio sanus factus est.

Sanguis

Sanguis autem effluxit large, & multa copia. Virgo illa pulchra Nerij filia, erat quidem annorum uiginti, uerum à muliercula amica ludente, lata manu percussa est in sinciput. & tunc quidem uertigine capta est, & sine spiritu erat. & quum ad domum uenisset, statim febris uehemens corripiebat, & caput dolebat, & rubor circa faciem erat. Septima die circa aurem dextram pus processit graueolens, subrubrum, amplius cyatho. & uidebatur sibi melius habere, & alleuata est. Rursus augebatur febris, & in soporem deferebatur, & loqui non poterat. & faciei pars dextera trahebatur, & difficulter spirabat. & conuulsio ac tremor aderat. & lingua detinebatur. et oculus stupidus erat. Nona mortua est.

Cleomenis filius hyeme initio facto cibum auersabatur, & eius fastidio contra febrem uexabatur. & uomebat cibos ac pituitam. & per duos menses cibi fastidium durabat. Coco in spina gibbositas facta est ex phrenitide. Huic nulla medicamenti potio conferebat. Verum uinum nigrum, & panis esus, & balneorum abstinentia, & frictio, & lenis fons non cum multo fomento, sed placide.

Cuidam quæ circa uigesimum ætatis annum, biberat pharmacum ad foetum perdendum, accidit dolor, uomitus biliosorum, multorum, pallidorum ac prasinorum. Quum bibisset, conuulsio tenebat, linguam cõmandebat. Ad quartam diem ad ipsam ingressus sum. & erat ei lingua magna, nigra. Oculorum autem alba, erant rubra. insomnis. Quarta mortua est ad noctem. Origani potum, oculis, & dentibus malum est.

Puella quæ de rupe cecidit, uoce destituta. iactatio aderat. & uomuit ad noctem sanguinem multum. quum ad sinistram aurem impegisset, amplius inde fluebat. Aquam mulsam difficulter deglutiebat. stertor. spiritus densus, uelut morientium. Venæ circa faciem distentæ. decubitus supinus. pedes tepidi. febris debilis. uocis interceptio. Septima uocem rupit. calores tenuiores tenebant. superstes mansit. Pythodes ægrotantibus aquam, & lac multa aqua ammixta dabat. Perniones percutiendi, & calefaciendi sunt pedes sic ut maxime excalefacias igne & aqua.

Oculis incommoda sunt, lenticula, fructus pomorum dulces, & olera. Doloribus circa lumbos, & crura, & coxam, ex laboribus abortis, aquæ marinæ, acetiq; calidum fomentum confert, ita ut uel aspergas, uel spongiam his imbutam adhibeas. Deligare uero oportet lanis succidis, & pellibus agninis. Fulonibus inguina extuberabant dura, & sine dolore. & circa pubem, & in collo, similia erant tubercula magna. febris ante decimum diem. Tussi uexabantur à ruptionibus. Tertio mense autem quarto uenter colliquiuit. Calores successerunt. lingua sicca. sitis. egestionem deorsum malignæ. mortui sunt. Qui lapide in caput percussus est à Macedone, & corruit. Tertia die uoce destitutus erat. anxietas. febris tenuis. pulsus non ualde in temporibus. Nihil omnino audiebat, neque sapiebat. non quietus, sed quarta mouebatur. humiditas circa frontem, & sub nasum, & usque ad mentum. & mortuus est. Eniastes in Delo iaculo ictus retro in latus, in sinistra parte, ulcus quidem sine dolore habuit. Tertia uero uentris dolor uehemens. non egerebat. Infuso uero per clysterem immisso, stercus prodijt ad noctem. afflictio intermittebat. Sedes ad scortum extabat. Quarta & ad pubem, & uentrem, dolor irruebat. quiescere non poterat. biliosa uomuit abunde colorata. Oculi quales animi delis-

quum incidētium, Post quintum diem mortuus est. Calor quidā tenuis inerat.

Ei qui hepar percussus est iaculo, statim color qualis est mortuorum per corpus diffusus est. oculi caui. anxietas, molestia. Mortuus est priusquam concio solueretur, quum sub diei exordium percussus fuisset. Polemarchi uxori

hyeme anginosæ, tumor sub guttur, febris multa. uena secta est. cessauit suffocatio ex faucibus. febris comitabatur. Circa quintam genu dolor ac tumor finis stri. & circa cor uidebatur ipsi aliquid colligi. & respirabat uelut hi qui submersi fuerunt respirant. & ex pectore substrepebat, uelut qui concluso ore loquuntur, Engastrimythi quasi ex uentre loquentes Græcis appellati. Tale quiddam contingebat. Circa septimam aut nonam ad noctem aluus deorsum prorupit, & multa liquida quæ mala putantur egressit. Ipsa uero uoce intercepta mortua est.

Ventres subpurgare oportet in morbis, quū matura fuerint. infra quidem, ubi confidisse uideris. Signum habes, si neque anxij, aut capite grauati fuerint: & quum calores mitissimi fuerint, aut quum post exacerbationes cessarint. Sursum uero, in exacerbationibus. Tunc enim etiam sua sponte eleuantur, quum anxij, & capite grauati fuerint, ac se iactarint. Ex casu uulnerato cubito, ob corruptionem cubitus suppuratur. Quum autem iam maturus est, uiscosa sanies exprimitur. Velut etiam Cleogenisco, & Demarcho Aglaotelis filio. Similiter autem & ualde ex iisdem pus nullum. Velut Aeschyli filio contigit. Suppuratis autem plurimis horror & febris succedebat.

Parmenisci filio surditas accidit. Contulit clysterem auricularium non adhibere. Verum lana solum indita perpurgare. & oleum infundere, aut netopū. Præcipere uero ut deambulet, mane surgeret, & uinum biberet album.

Aspasi uxori dolor dentis uehemens, & maxillæ in tumore eleuatæ sunt. Quum uero castorium & piper collueret, opem sentiebat. Callimedontis puero contulit ad tuberculum, quod habebat in collo durum, & magnum, & crudum ac dolorosum, sectio uenæ brachij: & lini torrefacti cataplasma imponere subactum uino albo, & oleo imbutum, ita ut deligetur neq; calidum, neq; ualde coctum. Aut cum aqua mulsa coquatur fœni græci, aut ordeï, aut tritici farina. Melissandro quum gingiua dolore corriperetur, & uehementer intumesceret, sectio uenæ brachij: & alumen Aegyptium in principio sedabat.

Hydropicum laboribus fatigari oportet, sudare, panem edere calidum, in oleo bibere, non multum lauare, & caput tepide. Vinum autem album & terne, & somnus auxiliatur. Bianti pugili quū natura uorax esset, contigit ut in affectiões cholicas, bilis sursum ac deorsum exeūtis, delaberetur, ex carnis esu. Maxime uero ex porcinis carnib, crudioribus, & ex ebrietate uini odorati, & placentis ac dulcarijs ex melle, & cucumere pepone, & lacte, & polenta recepti. In ætate uero affectiones cholicæ, & febres intermittētes. Timochari hyeme destillatio, maxime in nares. quū uenere usus esset, resiccata sunt omnia. lassitudo, calor successit, caput graue, sudor à capite multus, defluebat autē & per totum corpus. Erat autē etiam sanius sudare aduētus. Tertia die euasit sanus. Post canem febres fiebāt sudorosæ: & nō perfrigebantur omnino post sudorē, sed rursus amplius incalescebant: & lōgæ, & leniter sine iudicatione, & nō ualde siticulosæ. paucis in septē & nouē diebus cessabāt. Vndecima & decima

cimaquarta, & decima septima, & uigesima iudicabantur. Polycratem febris inuadebat, & sudor qualis præscriptus est. Purgatio à pharmaco deorsum facta est. & febris erat lenis. Rursus in temporibus sudores parui, et circa collū, ad uesperam. Deinde in totū. & rursus incaluit. Circa duodecimam & decimā quartam diem febris augescebat, & secessus pauci, post purgationē sorbitionibus usus est. Circa decimā quintam uentris dolor circa splenem, & lateris molli tudinem sinistram. Calidorū adhibitiones minus profuerunt, q̃ frigidorum. Quum autem leni ac molli per clysterē infuso usus esset, dolor cessauit. Magnæ nauis gubernatori anchora digitorum indicem, & infernum os dextræ manus confregit, inflammatio successit, & marcor, & febris. Subpurgatus est moderate. Calores lenes, & dolores. de digito quid decidit. Post septimū diem, sanies exibat lenis. postea per linguam dixit se non omnia posse enunciare. Prædictum est opisthotonum aduentare. Ad hoc conferebant maxillæ cōsertæ, & ad collū rigidæ. Tertia uero die totis cōuellebatur in posteriorem partem cum sudore. Sexta à prædictione mortuus est. Harpali filius ex liberta Telephane, luxationem infra in pede magni digiti accepit. inflammatus est, & dolorosus erat. & ubi repositus est, & dolor remisit proficiscebatur ad agrum. rediens lumbos doluit, lauit, maxillæ ad noctem conferebantur, & opisthotonus aderat. Saliua spumosa uix per dentes foras prodibat. Tertia die mortuus est.

Thrinon Damonis filius, habebat circa tibiæ malleolum ulcus, iuxta neruum sanè iam purum. huic à pharmaco corroso contigit, ut opisthotono more retur. Profecto in omnibus suppurationibus, & his quæ circa oculū sunt, dolores ad noctem. Tusses hyeme, maxime in austrinis, crassæ & multa alba exscreantibus. & febres succedebant leniter, & quinta die cessabant. Tusses autem circa quadraginta, uelut Hegesipoli. Eutychides ex cholericis affectionibus, in cruribus ad neruorum distentionē desiuit. una cum secessu deorsum. Bilem multam abunde coloratam uomuit ad tres dies ac noctes, ualdeq̃ rubram. & impotens erat, & anxius. Nihil autem continere poterat, neq̃ ex potibus, neq̃ ex cibis, & urinæ ac transitus deorsum suppressio multa. per uomitum sex mollis prodijt, & deorsum quoq̃ erupit. Androphani uocis interceptio. ignorantia. delirium. His solutis supererat adhuc diu multis annis, & recidiuq̃ fiebant. Lingua uero per totum tempus permanebat sicca. & si non collutione uteretur, loqui non poterat, & plerunq̃ erat ualde amara. Aliquando etiam dolor ad cor, quē uenæ sectio soluit. Huic aquæ potus, aut aqua multa contulit. Veratrum nigrum bibit. neq̃ biliosum prodibat, sed modicum. Tandem hyeme decubuit, & mente motus est. & linguæ affectiones similes. calor tenuis. sine dolore. lingua decolor. Vox peripneumonica. de pectore stragula reijciebat, & se educi iubebat. Nihil autem poterat clare loqui. Ad noctem mortuus est. Nicanoris affectio erat, quū ad conuiuīū progredetur timor tibiæ: quū sub initium uocis tibiæ, in conuiuio tibia canere audiuiisset, præ timoribus turbationes. Vix se sufferre posse dixit, quum nox esset. Interdiu uero audiens, nihil cōmouebatur. Talia comitabātur ipsum multo tēpore. Damodes qui cū illo erat, cecutire, & corpore exoluto esse sibi uidebatur: & nō accessisset sanè ad præruptū locū, neq̃ trās pontē, neq̃ minimi scrobis altitudinē trāsgredi poterat, sed per ipsum scrobē. Hæc per tempus aliquod ipsi affuerūt. Phœnicis

Phoenicis affectio ex oculo dextero talis quædam erat, plerunq; uelut fulgur elucere putabat. Quum autem non diu ipsum continuisset, dolor ad tempus dextrum instabat, & per totum caput ac collum. Caput intumescerebatur ad uerticula, & distentio, & duricies circum tendines, & ubi caput commouere, aut dentes diducere conabatur, non poterat, ut qui ualde distendebatur. Vomitus ubi facti fuissent, prædictos dolores auertebant, & leniores faciebant. Sed & uenæ sectio proderat, & ueratri potio. eduxit autem uaria & omni gêna, maxime uero prasina. Parmenisco etiam prius incidebant tristitiæ, & decedendi è uita cupiditas. Quandoq; uero rursus lætitia. Cononis serua ex capitis dolore incipiente, mente mota est. clamor. querelæ multæ. raro quies. Circa quadragesimum diem mortua est. Decem autem diebus ante mortem uoce destituta, & conuulsa fuit.

Adolescens quidam multo meraco potio, supinus in habitaculo quodam dormiebat. Huic serpens Arges appellatus in os ingressus est, & sanè quum sensisset, & loqui non posset, dentibus stridit, & serpentem deuorauit. & dolore magno tenebatur. & manus prætensas adhibebat, uelut qui strangularetur. & iactabat seipsum. & conuulsus mortuus est.

Timocharis seruus, ex atrabiliaris esse putatus, à talibus ac tot uiris, similiter mortuus est circa easdem dies. Nicolai filius circa solstitium hybernum ex potationibus horruit. ad noctem febres. postridie uomitus biliosus, merus, modicus. Tertia die quum concio fori adhuc plena esset, sudor totius corporis, cessauit. Diopithis forori in semitertiana, circa accessione etiam cor grauius dolens, & concomitabatur etiam is dolor tota die. & huiusmodi cordis dolor etiam alijs similiter aderat. Verū tamen sub pleiadis occasum, uiris talia rariora fiebant.

Epicharmi uxori antequam pareret, dysenteria erat. dolor uehemens, secessus recrementa, subcruenta, mucosa. Vbi peperisset, statim sanata est. Polemarchi uxori in morbo articulari, coxæ dolor qui dam uehemens. causa erat quòd menses non prodirent. Vox intercipiebatur, per totam noctem usq; ad meridiem. Audiebat autem & sapiebat, & per maximum significabat, quòd circa coxam esset dolor.

Epicharmo circa pleiadum occasum, dolor humeri, & grauitas in brachium, anxietas, uomitus multi. aqua potus. Euphranoris filio pustulæ uelut culicum morsus, uerum modico tempore, postridie febricitauit.

Siccitates multæ post Fayonium factæ sunt, usq; ad æquinoctium autumnale. Sub canem æstus magni, calidi uentri. Febres sudorificæ. Tubercula iuxta aurem multis oborta sunt.

Tychon in obsidione circa Datum, à catapulta percussus est in pectus. & paulo post rursus erat circa ipsum tumultuosus. Videbatur autem mihi medicus eximens lignum, reliquisse aliquid de spiculo in septo transuerso. Et quum ipsi uideretur, ad uesperam infusum per clysterem adhibuit, & pharmacum deorsum purgans dedit. Noctem primam transiegit moleste. Statim uero ubi dies illuxisset, & medico, & alijs, melius habere uidebatur. Erat enim quietus. prædictio facta est, quòd ubi conuulsio fieret, breui esset moriturus. Sequenti itaque nocte moleste habens, insomnis, plerunque in uentrem decumbens, tertia exoriente die conuellebatur, & tunc mortuus est.

Billo percusso in dorsum, spiritus multus per uulnus cum strepitu processit. sanguis erumpēbat. Vbi uero medicamentum cruentis uulneribus destinatum adhibitum ac deligatum esset,

sanatus

sanatus est.

Contigit & infelicissimo Philes filio, denudatione in fronte facta, nona die febris. deinde os liuefactum est. mortuus est. Et Phaniae & Euergetæ filio, liuefactis ossibus, & febricitantibus, cutis ab osse discessit, & pus non comparuit. Aristippus in supernum uentrem uiolenter ac grauius sa-

gittæ ictu petitus est. uentris dolor uehemens, & breui ardebat. deorsum uero non egerebat. anxius erat. biliosa abunde colorata quum uomuisset, melius habere uidebatur. paulo post rursus dolores uehemētes, & uenter uelut in uoluu-

lis. calores. sitis. & in septem diebus mortuus est. Neapolis similiter percussus, eadem passus est: acri infuso per clysterem immisso, aluus deorsum erupit. color per corpus diffusus est, tenuis, pallidus, niger. oculi sicci, stupore rigidi, intus conuersi, intuentes in corde. Metrodori filio ex dentis dolore, ma-

xillæ marcor, & gingiuarum carnis superexcrecentia. Moderate suppuratus est. exciderunt dentes molares, & ipsa maxilla. Mulieri in Abderis, carci-

noma obortum est circa pectus. & per mammam fluebat sanies subcruēta. ob-

turata uero fluxione, mortua est. Pleriq; ex destillatione secundum dimi-

diam capitis partem dolebant. & humore secundum nares procedente febrici-

tabant leniter. & in quinque diebus perfrigerabantur. Et quæ in partu con-

cussa fuit, dolor circa pectus & latus factus est. excreationes purulentæ. Ta-

bes cōstitit. febres per sex dies. Rursus alui profluuium. quies. febris. aluus ad-

stricta est: & circa septimam diem mortua est. Anginosa quædam dextram

manum & crus doluit. febris tenebat debilis. strangulatio tertia die remisit.

quarta conuulsa, uoce destituta, stertor, dentium contritio, maxillarum rubor.

Mortua est quinta aut sexta die. Signum circa manū subliuidum. Alia quoq;

in palato stertorosa. lingua sicca, peripneumonica. non desipiens mortua est.

Et in Olyntho hydropicus, derepēte uoce destitutus, desipiēs per noctem

ac diem, mortuus est.

HIPPOCRATIS COI DE MOR-

BIS POPVLARIBVS LIB. VI. IANO COR-

nario Medico Physico interprete.



VIBVS CUNQVE ex abortu circa uterum, et tumoribus, ad

capitis grauitatem conuertitur, & iuxta sinciput maxime do-

lores, & quicumq; alij ab uteris: his in octo aut decem mensi-

bus ad coxam morbus desinit. Acutum habētes caput,

qui quidem ualidam habēt ceruicem, robusti sunt tum aliās,

tum ossibus. Qui uero caput dolent, & aures fluentes ha-

bent: his palatum cauum est, & dentes inter se non è directo

respondentes. Quibusunque os de palato discessit, his medius confidet

nasus. Quibus uero inde unde dentes prodeunt, his summus nasus simus fit.

Puerorū elucescentiæ simul cum pubertate, in quibusdā mutationes habent

etiam aliās. In rhenem dolor grauis, quū implentur cibo, uomūt pituitam.

Quum uero redūdarint dolores, æruginosa. & melius quidem habent. Soluunt

iuuenes

iuuenes ueratro purgare, poplitem secare, urinā cientibus purgare, attenuare, & mollire. Menſes aquoſis diu permanent. Quū uero non breuī prodieſ rint, intumeſcunt. In Cranone antiqui dolores frigidi. recentes autem calidi. ex ſanguine uero plurimi. & quæ ex coxa, frigida ſunt. Quæ ad rigores fortes progreſſa ſunt, non ualde mitigantur, niſi prope uigorem. Ante rigorem urinarū ſuppreſſiones, ſi ex bonis fuerint, & alius egerat, & ſomni ad ſint. fortaiſis autem & febris modus. fortaiſis etiam quæ ex laſitudinibus.

Absceſſus non ualde, quibus rigores. Crurum effoeminationes, ueluti ſi aut ante morbum iter feciſſet, aut ſtatim ex morbo: eo quod fortaiſis ex laſitudinibus in articulos abſceſſit ex quo crurum effoeminationes. Tubercula extra extuberantia, & acuta, & ſtigmata, & æqualiter matureſcētia, & non obdura, & deorſum uergentia, & non biſida, meliora: contraria uero, mala: & quanto plus contraria, peſſima. Ferinum autumnino, & oris uentriculi dolores, & horrores, & atra bilis. Circa initia exacerbationes conſidera, & in omni morbo, quale eſt ad ueſperam exacerbari, & annus ad ueſperam, & aſcarides.

Infantibus tuſſicula cum uentris turbatione, ac febre cōtinua, ſignificat poſt iudicationem bi-meſtri, in totum uigeſima die, etiam tumores ad articulos. Si quidem infra umbilicum conſtiterint, in infernis articulis ſuperna, bonum: ſi uero ſupra, non ſimiliter morbū ſoluunt, niſi ſuppurata fuerint.

Quæ uero in humeris ſuppuratur tantillis, muſtella cubito præditos, paruumq; ac macilentum brachium habentes faciunt. Soluerit autem & ulcuſ ſcutorum inferne eruptio, ſi non rotunda & profunda fuerint. Talia enim pernicioſa etiam aliàs ſunt pueris. Soluerit itidem ſanguis fluens. Magis autē in perfectioribus is apparet. Lachrymæ in acutis male habentibus, ultro neæ quidem bonæ. Inuoluntarie uero deſluent, malæ. Quibus circūtenditur palpebra malum. Malus eſt etiam oculus inareſcens, uelut ſpuma, & obſcuratio oculorū mala eſt. Et ſqualliditas mala. & qui intrinſecus corrugantur, & rigētes, & qui uix conuertuntur, & qui intus conuerſi ſunt, & quęcunq; alia omittūtur. Febres aliæ quidem mordaces ſunt manui, aliæ lenes. Aliæ uero non quidem mordaces, uerum augeſcentes. Aliæ autem acutæ quidē, ſed quæ à manu uiuantur. Aliæ ſtatim adurentes, aliæ ſemper debiles, ſiccæ. Aliæ falſuginosæ. Aliæ inflatæ, horrendi aſpectus. Aliæ ad manum humectæ. Aliæ rubicundæ ualde. Aliæ ualde pallidæ. Aliæ liuidæ. & alia id genus. Diſtentiones corporis, & articularum duricię, malum. & ipſe diſſolutus, & cōfractiones articularum, malum. Oculi audacia delirij ſignum eſt, & oculorū deiectiones ac peruerſiones, malum.

SECTIO SECUNDA.

Dilatare, conſtringere, alia quidem, alia uero non. Humores alios quidem expellere, alios uero ſiccare. alios autem indere, & alia quidem parte, alia uero non. Attenuare, craſſefacere, corpus, cutē, carnes, & alia. & aliqua quidem, aliqua uero non. Leuigare, exaſperare, indurare, mollire, alia quidem, alia non. Excitare, torpeſcere, & quæcūq; alia huiuſcemodi. Deriuare, ſubcedentia ſtatim reuellere, renitentibus concedere. Alium humorem nō prodeuntem ducere, prodeuntem uero ſimul effundere. operari ſimile, uelut dolor dolorem ſedat. Diſſimilia, ſi uergant ſurſum eleuata, inferne ſolue

uere, & contraria per eadē: uelut est capitis purgatio, uenæ sectio, quando non temere detrahitur. Abscessus uelut glandularum tumores, signū quidem sunt earum partium quæ germina habent, sed & aliarum: Maxime uero circa uiscera. Maligni autem hi sunt. Spiritus parui densi, magni rari, parui rari, magni densi: extra magni, intus parui: intus magni, extra parui: alius extensus, alius uergens: dupla intro reuocatio, uelut superinspirationibus. calidus: frigidus. Medela assiduarum oscitationum, spiratio longa. In non potantibus, & uix, spiratio breuis. E directo & laterum, et præcordiorū intentiones, & splenis eleuationes, & e naribus eruptiones. & aures e directo. Horū plurima etiam ad oculos. Vtrum igitur omnia: aut quæ quidem ex infernis sursum, e directo: qualia sunt quæ iuxta maxillas; aut circa oculū aut aurē: quæ uero ex supernis deorsum, non e directo. Atqui & anginosi rubores, & laterū dolores e directo. Aut etiā quæ infra hepar sunt ex supernis distributa, uelut in testes ac uarices: Consideranda sunt hæc quo, & undē, & propter quid. Venæ temporum non confidentes, neq; uiriditas splendida; si spiritus intus relinquatur, aut tussis sicca, non ferina: ut in articulos decumbat expectare oportet, e directo distentionum secundum uentrem ut plurimum. Habēt autem horum plurimi, & facies rubicundas, & ex natura sunt modi albidioris; & de naribus sanguis nō erumpit, aut parum erumpit. & si quidem ex affusis intus relinquatur, paratus est abscessus. Sitis intus relicta, & oris resiccatio, & iniucunditas, & cibi fastidium; eodem modo. Febres autem non acutæ, eiusmodi sunt, uerum reuertentes. Quæ relinquuntur post iudicationem, reciduias facere solent. Primum itaq; splenis eleuationes, si non ad articulos finierint, aut sanguinis e naribus eruptio sit, aut dextra præcordij intensio: si non penetrauerint urinæ. Hæc enim est interceptio utrorunq; & reciduiæ horum merito fiunt. Abscessus igitur horum facere oportet, si non fiant. Eos uero qui iam fiunt declinare. Eos autem excipere, si prodierint iam, & qualia oportet, & qua parte oportet. Qui uero non ualde, eos coadiuuare. Eos uero auertere, si omnino incommodi fuerint, maxime si hi affuturi sunt: sin minus, si iam incipiunt. Quarta tanæ sanguinis e naribus eruptiones ægre iudicant. Febres quæ una die intermittentes, altera superrigent unā cum iudicationē, ex quinq; ad septem circūcūctis durant. Quæcunq; tertianæ naturam habent, his nox molesta ante exacerbationem: Quæ uero sequitur, tolerabilior plerunq; est. Tussis sicca parum irritantes a febre adurente, non pro ratione siticulosa, neque linguæ torrefacta, non feritate, sed spiritu. Constat id inde. Quum enim loquuntur, aut hiant, tunc tussunt: quum uero non, minime. Hoc autem in febribus ex lassitudinibus obortis maxime contingit. Nihil temere affirmandum, nihil contemnendū. Contraria paulatim facta accessione adhibenda sunt, & inter quiescendum. Dolenti capitis partem posteriorem, recta uena in fronte secta profuit. Successiones præcordiorum ex qualibus qualia alterant, & uiscerum inflammationum qualia possunt, siue ex hepate spleni, & uice uersa: & quæcunq; huiusmodi. Reuellerē oportet, si non qua oportet repāt, Si uero qua oportet, his oscula aperire oportet, qualiter singula repūt. Latæ pustulæ nō ualde pruriginosæ sunt: Quales Simon habebat hyeme, qui ubi ad ignē intraretur, aut calida lauaretur, opem sentiebat. Vomitus non proderant. Arbi

tror si quis calidā fomēta adhibuisset, opem ferre potuisse. Quæcūq; con-
coqui oportet, conclusa esse conuenit. Contraria uero siccare, & aperta esse.

Oculorum fluxiones, si aliās conducere uidetur, reuellere ad fauces conue-
nit. Et ubi eructatio conducit, & quæcūq; alia huiusmodi. Transitus
apertos esse oportet, ueluti nares, & alia quibus opus est, & uelut opus est, &
qualia, & qua parte, & quando, & quantū opus est: uelut sudores, et alia sanè o-
mnia. In magnis malis facies si fuerit bona, bonū signum est. In paruis au-
tem, cōtraria significans bonæ significationi, malum. Apud magnū Thea-
trum ubi mulier retro heroum, morbo regio superueniente, permanfit ipsi.

Apud Temenæ neptim ille nigricantis erat coloris. In Perintho geni-
turæ similis urina talis, quæ esset iudicatoria, etiam peccinis affectionum. Nam
huiusmodi urinæ talia sanāt: quoniam neq; flatu multo, neq; stercore multo e-
gresso euacuabantur. Non enim profecto magnū erat præcordium. Bras-
cam septima die quis comedit, quū adhuc difficulter spiraret, postquam peccen
emollitus est, recte spirans factus est. aluus ipsi expulit. De sanguine sero-
so, quoniam in pauidis talis, aut in his qui uigilarunt: & siue malus, siue bonus.

Quibus splen deorsum uergit, pedes & manus, & genūa calida sunt: nasus
& aures semper frigida. Num propter hoc quod tenuis sanguis? Num & natu-
ra talem hi habent? Suppurationibus umbilicus terminus, quibus suppu-
raturis uentres turbantur. Splen durus non superne, inferne. rotundus. la-
tus, crassus longus. tenuis longus. Minus capitis grauedine laborantibus.

Circa ægrotantē administratio, & de morbo interrogatio: quæ narrat qua-
lia, quomodo accipiendi sermones: quæ ad ægrotantē, quæ ad præsentēs, quæ
ad externos. Quod in calidiore, solidiore, in dextris: & nigri propterea, &
uenæ extrinsecus, & multo biliosiores. Concretū est, cōpactum est citius:
ubi morū est, desinit, & tardius augefcit, & ad amplius tempus. Quod soli-
dum factū est, & biliosius, & sanguinolētius est: Hic calidior est locus animalis.

SECTIO TERTIA.

CVtis raritās, uentris densitas: cutis constrictio, carniū incremētum: uen-
tris torpor, uniuerforum confusio: uasorum immundicia, cerebri consum-
ptio. Quapropter & caluicies, instrumentorum attritio. Detractio cursi-
bus, luctis, quiete, multis celeribus deambulationibus, carne ouilla, maza cocta
plerūq; panis modicus. Detractionis signum, eandem horam diei seruari.
re. derepente enim trahitur. Remittito labores, aut defluet. Similiter enim totū
concidit. Quum uero iam cōciderint, carnes suillas affatas exhibeto. Quū
autem implentur, signū est, quod corpus rursus floridū fit. In exercitatio-
nibus signum, sudor fluens guttatim, qui exit uelut ex canalibus: aut collapsio
ex eleuatione. Mulier quam primū curauī in Cranone, splen ipsi magnus
natura, febris ardens, rubicunda, spiritus, decima sudor plerūq; superne. Sed &
inferne, decimaquarta. Minus his qui ex capite grauedine ac raucedine la-
borant, ubi febre correpti fuerint, recidiuæ uelut puro fiunt. Quicquid sup-
puratur, non reuertitur. Ipsa enim maturatio, & iudicatio simul, & abscessus.
Quibusdam ubi uenere utuntur, uenter inflatur, uelut Damagoræ. Qui-
busdam uero in hoc strepitus, Arcesilao uero etiam intumescibat. Flatuo-
sitas simul causa est in his qui scāpulas alarum modo eminentes habent. Sunt
enim

enim flatuosi. Frigidum ualde, uenas rumpit, & tuſſim mouet, uelut nix, glacies: & conſtringit, uelut ſunt eminentiæ oblongæ, & rotundæ, Pheræ & Gôngronæ, à ſatyrorum circa aures eminentijs, & arborum quarundam tuberculis appellatæ. Simul cauſa ſunt etiam duricies. Poſt miſtionem concretio, pueris magis, num quod calidiores? Figuræ magis alleuantès, uelut qui ſarmenta manu neſtebat & obtorquebat, præ doloribus decumbens, arrepta paxilli ſumma parte ſupra ſeipſum infixæ, inhærebat, & melius habuit. Quem ex montano labore circa pontē ego uidi crura iactantē, altera tibia minime extenuabatur, femoribus autem ualde. Vrinę & genitura nō ſupprimebantur. Quæcunq; laterum naturæ, ſcapulas alarum modo eminentes habent, propter cauſæ debilitatem, in deſtillationibus malignis, ſiue excretio fiat, ſiue non fiat, malum. Rigores incipiunt mulieribus quidem magis à lumbis, & per dorſum, & tunc ad caput. Sed & uiris poſteriore corporis partē magis quàm anteriore. Horremus enim magis exterioribus quàm interioribus corporis partibus, uelut cubitis, femoribus. Sed & cutis rarior, Indicat autē pilus. A quibus autem alijs rigent, fortaiſis ulceribus, incipiunt à uafis. Summa, ex natiuitate, & cauſa, & plurimis rationibus, & paulatim in cognitionem uenientibus colligentem ac addiſcentem, an ſimilia ſint inter ſe, & an non ſimilia ſint inter ſe: quo ex diſſimilitudinibus ſimilitudo fiat una, Sic ſanè fuerit uia. Sic etiam eorum quæ recte ſe habent probatio, et non recte ſe habentium redargutio. Sanguinis ex naribus eruptio, aut ſubpallide nigricantibus, aut rubicundè pallentibus, aut ſubpallidis. Parum dimittentem craſſefacere oportet ſicco. Alijs uero minus craſſificatione opus eſt. Sicco autem opus eſt albo, uelut galla, alumen. Poſtquā uenere uti inceperint, aut hircire, ſanguis iſtis eſt naribus erumpit. In accēſibus alijs quidem ſtrepitum edunt, uelut Arceſſiſlaus. Alijs uero accēſuri, horridi ſiunt ac rugoſi. Alijs poſtquam acceſſerint, uentre inſtantur, uelut Damnagoras. Mutationes cauendæ. Cibus modicus, non deſaſſari, non ſitire. Omnis attenuatio laxat cutem, deinde circumtenditur. Renutritio uice uerſa. Cutis cōſidentis corrugatio, renutritæ extēſio. Rugoſum, læue, utriuſq; ſignum: itemq; ſubbilioſum & ſubrubrum: Sic etiam deſtractas eſſe mammas, graciles autem ſurſum tractas eſſe & circūtenſas, etiamſi quis non propterea putauerit id fieri, ſed in carnoſis. Clauiculæ conſpicuæ, uenæ pellucidæ. Herodicus febricitantes interficiebat circuitibus, luētis, multis fomētis, mala eſt febriculofitas, inimica fami, luētis, circuitibus, curſibus, frictioni: laborem labore. Iſtis uenarum rubor, liuor, pallor, laterum dolores molles. Non ſitire faciunt, continere os, tacere, uentum cum potu frigidum inducere. Occaſiones unde ægrotare cōperint, conſiderare oportet, ſiue capitis fuerit dolor, ſiue auris, ſiue lateris. Signum ſunt dentes, & in quibusdam inguinum tumores. Ulcera ſientia ac tubercula iudiciā febres. Quibus hæc non ſiunt, iudicatio ſublata eſt: Quibus intus relinquuntur, certiffimæ recidiuæ ac celerrimæ. Sputa rotunda delirium ſignificant, uelut in Pleno. Qui hæmorrhoidas habent, neq; pleuritide, neq; peripneumonia, neq; phagædena, neq; furunculis, neq; tuberculis terebinthi figuram habentibus corripuntur, fortaiſis autem neq; lepris, fortaiſis neq; uiriliginibus. Multi tamen intempeſtiue curati, talibus non tarde correpti ſunt, & ſic pernicioſæ

fuerunt: & quicunque alij abscessus, uelut fistulae, aliorum medela sunt. **D**ecubitus humorum ad aliquem locum, in quibus factos affectus liberat, in his prius ipse factus, illos impedit. Alterius loci morbos loca excipientia, aut ob dolorem, aut ob grauitatem, aut propter aliud quiddam liberant, aut quod alijs sunt communicationes. Propter inclinationem non amplius sanguis prodit, sed iuxta humoris cognationem talia spunt. Conuenit quibusdam sanguinem detrahere, tempestiue in talibus. In alijs autem uelut in his, non conuenit. Impedimentum in spuentibus cruenta, tempus anni, pleuritidis, bilis.

SECTIO QUARTA.

Tubercula circa aurem quibus circa iudicationem exorta, non suppurata fuerint, his disparentibus recidua fit, pro ratione recidiuarum. Recidua uero fiene, rursus intumescunt, & permanent, uelut febrium recidua in simili circuitu: his spes est ad articulos abscedere. **V**rina crassa, alba, qualis Archigenis familiari erat, in lassitudinis febribus quarta die aliquando prodit, & liberat ab abscessu. Si uero ultra hoc, etiam sanguis e naribus large eruperit, etiam ualde. **C**ui intestinum in dextra parte dolebat, & articulari morbo correptus est: erat quietior. Postquam autem hic curatus fuit, magis dolebat.

Agasis filia quum esset puella densum spiritum habebat. Mulier autem facta, a partu non diu dolore correpta leuiter, magnum onus sustulit. & statim quidem in pectore aliquid crepuisse uisum fuit. Postera die & anhelationem habebat, & coxam dexteram dolebat. & quum haec doleret, tunc etiam anhelatio habebat: coxae uero dolore cessante, etiam anhelatio cessabat. Spuebat spumosa, ab initio uero florida. Vbi uero confidisset sputum, uomitui bilioso tenui simile erat. Dolores maxime erant quum manu laboraret. Hanc ab alio arcere uisum fuit, porroque, ac ouicula, & boue. In rebus autem agendis, a clamore, & excalescencia. **C**ui in capite tumor depascendo proserpebat, ei primum alumen ustum profuit. Habuit alium abscessum, forte quod os abscessurum esset. Abscessit sexagesima die supra aurem, sursum ad uerticem uulnus erat.

Intestina crassa habet, qualia sunt canis, uerum maiora. Dependent autem ex medianis membranis, Mesocolis hac parte appellatis. Haec uero ex nervis, de spina, sub uentrem. **A**egrotantibus gratificationes, uelut est pure praeprare potus ac cibos, & ea quae uidetur molliter ea quae contingit. **A**liae gratificationes, quae non magnopere laedunt, aut facile reparari possunt, uelut frigida, ubi hac opus est. **A**liae gratificationes sunt, introitus, sermones, habitus, uestitus aegrotanti, tonsura, ungues, odores. **A**qua decocta partim ut aërem admittat, partim ut uas non plenum sit, & operculum habeat. **Q**uod ex sanguinis eruptionibus, aqua inter cutem corripuntur. **S**i qualia oportet purgari, purgantur, facile ferunt. **I**n Aeno legumina comedentes assidue, foeminae, mares, crurum impotentes facti sunt, & permanferunt. Sed & erium comedentes, genuum dolores habebant. **P**alam uigilans calidior externis partibus, frigidior autem internis. **D**ormiens uice uersa. **C**alidae naturae frigiditas, potus aqua, quiescere, somnus in frigore, contesto, somnus sedentium, erectorum nictatio. **D**ebiles uictus, frigidi: robusti uero calidi. **A**quarum arte non praepratarum, quae quidem ab aethere excreta est, aut cum tonitruo, aestiua: procellosa uero mala. **A**qua uorax, uigilia uorax.

Percali

Percalidam naturam calido tempore, in frigore cubile crassescit: in calido attenuat. Exercitatio sanitatis, est uesci citra saturitatem, non refuges relaborem. Inter uigilandum siti leui somnus medela est. Siti uero ex somno, uigilia in quibusdam. Quibus plurimus calor est, maxima uoce prædicti sunt. Nam & plurimus est frigidus aer. Ex duobus autem magnis, magna etiam quæ generantur existunt. Ventriculo calidi, carne frigidi & tenues, hi eminentes uenas habent, & iracundiores sunt. Terra siccitatibus squalida, uolucrum genus abundat. Hircire incipiens, uter testis extra apparuerit, si quidem dexter, masculum: si uero sinister, foemellam portendit.

Oculi prout ualidi fuerint, ita etiam corpus: Sed & color in peius aut melius uergit. Iustum est autem, prout se habuerit alimentum, ita & quod foris secus est sequi. Signa lethalia, per cutem, nares, calidus uapor: ubi prius nares frigidum spiritum emisserunt. Signa uero uitalia, contraria sunt.

Labores cibos præcedant.

SECTIO QUINTA.

MOrborum naturæ medici. Inuenit natura ipsa sibi ipsi aggressiones; non ex præmeditato, partim uelut est nictare, partim uero & ea quæ lingua subministrat, & quæcunque alia huiusmodi, non edocta natura, & nullo magistro usa, ea quibus opus est facit. Lachrymæ, narium humiditas, sterutationes, auris sordes, oris saliuæeductio, spiritus introitus, exitus, oscitatio, tussis, singultus, non eiusdem omnino modi. Vrinæ secessus, & flatus, & huius alterius, alimenti, & transpirationis, & ea quæ foemini solis adsunt, & in reliquo corpore sudores, pruritus, corporis distentiones cum oscitatione, & quæcunque huiusmodi. Hominis anima semper producit usque ad mortem. Si uero efferbuerit, una cum morbo etiam anima corpus depascitur.

Morbi connutriti, in senecta, & per concoctionem, & per solutionem, & per rarefactionem desinunt. Sanatio, contra sentientem non consenti re affectioni. Frigidum & auxiliatur, & occidit quæcunque ex calido sunt.

Excandescencia retrahit cor & pulmonem in seipsa: & ad caput calida ac humidum. Læticia uero relaxat cor. Labor articulis & carnibus: cibis, somnus, uisceribus. Animæ deambulatio est cura hominibus. In uulneribus sanguis concurret, opitulandum igitur ut uacuum expleatur. Si auris doleat, lana digito obuoluta oleum calidum instillato. Deinde lanam intus in uolam manus positam, sub aurem subdito, ut aliquid ipsi exisse uideatur. postea in ignem immittito, Dolus. Lingua urinam significat. Linguae uirides cum pallore biliosa, Biliosum autem à pingui: Rubicundæ uero à sanguine. Nigræ ab atra bile. Sicca à fuliginoso ardore, & uterina parte. Albæ uero à pituita. Vrina concolor cibo, & potui, & qualis intus est humidi colliquatio.

Lingua concolor attingentibus ipsam humoribus: quapropter per hanc humores cognoscimus. Si salsæ carnes gustanti, redundantiæ signum. Si mammarum papillæ, & rubor pallidus fuerit, morbosum uteri uas est.

Homini sordes in auribus, dulcis quidem lethalis, amara uero non. Terram mutare commodum est in longis morbis. De-

biliores cibi breuem uitam habent. In fluxionibus ad coxam, uenas retro

aures fecato. Coitus morbis ex pituita commodus. Calido uentriculo præditos, fortes potus ac cibi perturbant. Atrae bilis uelut similis est hæmorrhois. Augescentes morbos coitus. Frigiditas ea quæ in uentre sunt indurat. Coitus ea quæ in uentre sunt indurat. Eum qui ueratrum bibit, si citius purgare uolueris, lauare oportet aut comedere. Sanguis in somno intro magis fugit. Rigor à superiore uentre, febris ab inferiore magis. Attractio, pulmo, siccus ardor: Superuacuatum siccat & somnus multus. Frigidissimus cibus, lentes, milium, cucurbitæ. Ulcera exoriantur si quis dum impurgatus est laborauerit. Mulier, capra, elaterium aut cucumerem syluestrem comedentes, pueris purgatio. Calido corpori, id quod comedit, intrinsecus frigiditas est. forinsecus autem dolor à sole, igne, uel situ, in tempore æstiuo. Contratio uero cōtrario modo. Cibi partim celeriter superantur, partim tarde.

SECTIO SEXTA.

Carnes attractrices, & ex uentre, & extrinsecus. Indicio est sensus ipse, quod expirabile ac inspirabile est totum corpus. Calidissima uenula sanguinis multitudine, id quod fuliginosum est exerit, & statim secernit. Ex quibus quidem pingue, bilis flaua: quibus autē sanguis, atra. Mentis, memoria, olfactus, aliorum etiam famis instrumentorum exercitatio. Labores, cibi, potus, somnus, res ueneræ, omnia mediocria. Frigidior in frigido tempore ac regione calidior erit. In doloribus proximum uentrem purgato, sanguinis autem uentrem fecato. Vstio, sectio, calefactio, perfrigeratio, sterutationes, plantarum succi, in quibus uim habent, & cyceonis mixtura. Maleficorum autem lac, allium, uinum feruefactum, acetum, sal. Homo ex his similitudinibus ex itinere, imbecillus, grauatus, expuit. Tussiuit enim ex uertice: febris acuta, ad manum submordens. Secūda die capitis grauitas, lingua combusta fuit, naris unguibus conscalpta sanguinem non effudit. Similiter splen magnus & durus dolebat. A quartana correpti, à magno morbo non corripiuntur, si uero corripiantur prius; & succedat quartana, liberantur.

Pro qualibus qui morbi. Biliis sit, uelut de uulneribus dixi, quod sint biliosæ. Caliditas acrimoniæ signum est. Turbationes, transitus. Nam mente motis dolores laterum definunt: quibusdam & febres, quibusdam non. Sed cum sudoribus. quibusdam autem cum turbatione. quibusdam uero cutis arida & circumtensa ac saluginosa. Torpefactiones quales ex quibus, & quales illi cui coxa. Per aures, ex auribus, plerumque tertio die moriuntur. Quibus cutis circumtenduntur aridæ ac duræ, sine sudore: quibus laxæ sunt ac raræ, cum sudore moriuntur. In recidiuis mutationes profunt. His transmutare oportet ad ea quæ conueniunt, antea quàm malecathisiantur, uelut Cherioni. Quæ irritantur ex quibus, stridulæ faucium asperitates terminum præscribunt. Quibus quidem id quod sanum est relinquitur, causa deorsum submissa, eos aut purgato, aut deligato, aut eijsito, aut refecato, aut exurito. Quibus uero non, non. Quibus sanguis multus fluit ex naribus, qui quidem decolores mero modo sunt, his parum prodest. Quibus uero colores rubicundi, non similiter. Et quibus capita sunt quæ facile to-

lerant, prodest: Quibus secus, non. Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior ac copiosior, hi morbosius sani sunt. Plurimis autem quibus ex morbo, uice uersa. Sputa rotunda, mentem emouent, uelut illi in Plinthio. Huic sanguis ex sinistra nare erupit, & solutus est quinto die. Vrina multam subsidientiam habens, à mentis emotione liberat, qualis erat Desippi. Post pilorum destiuuium, quartana febris non ultra annū. Aurium eruptiones estate quinta die fiunt. Quandoq; uero etiam diutius durant. Ita & circa gingiuas, & circa nares suppurationes. Quibus in dentium dolore, de supercilio tenuia descendunt, his à pipere probe affricto postredie crassiora descendunt, si etiam alia non obtinuerint. Nam Hegesippo soporiferum inditum non obtinuit, sed magis & uiolentius insuper prouocauit.

Ofsium naturam ex capite colligere oportet, deinde neruorum, & uenarum, & carniū, & aliorum humorum, & supernorum ac infernorum uentris colorum, & mentis, & morum, & eorum quæ per annum fiunt, tempore quodam anni præcociore, uelut pustulæ & huiusmodi. Simile enim est his quæ quotidie citius aut serius accipiuntur. Similiter & biliosum, & sanguineum corpus atrabiliarium fit, si non habet euacuationes. Lycino postremū splen magnus dolorosus, in quarta aut quinta.

SECTIO SEPTIMA.

TVsses cœperunt circa solstitia hyberna, decimaquinta aut uigesima die, Ex frequenti australium & aquilonarium ac niuiforum transmutatione. Ex his aliæ breuiores, aliæ diuturniores fiebant, & post has multæ peripneumonice affectiones. Ante æquinoctium rursus plerisque reuertebantur, quadragesima ut plurimum ab initio die: & aliquibus sanè ualde breues ac iudicatu faciles erant, aliquibus autem fauces inflammatae sunt, quibusdam Anginae obortæ. quibusdam leues syderationes, alijs Nyctalopes, atque hi magis pueris. Verum peripneumonice affectiones ualde breues erant. Fauicium uero inflammationes posttussim, aut omnino parum pro tussi fiebant, atque hæc breues, magis autem Nyctalopes. Anginae uero & leues syderationes, aut duræ & siccae, aut paruæ & raro matura educentes: quibusdam uero etiam ualde. Qui igitur aut uocibus amplius se fatigarunt, aut rigorunt, in anginas magis desierunt. Qui uero manibus laborarunt, manibus tantum syderati ac resoluti sunt. Qui uero equitauerunt, aut amplius iter fecerunt, aut alios labores cruribus perfecerunt, his ad lumbos aut crura impotentiæ resolutoriae obortæ sunt, & ad femora ac tibias lassitudo ac dolor. Durissimæ autem & uiolentissimæ tussis erant quæ ad leuem syderationem ac resolutionem perducebant. Verum omnia hæc in recidiuis fiebant. In principijs uero non ita ualde. Plerisque autem horum tussis in medio remiserunt, sed perfecte non defecerunt, uerum cum recidiua affuerunt.

Quibus uoces frangebantur adtussim, horum plurimi ne febricitarunt quidem, Quidam uero parum. Sed neq; peripneumonice affectiones ulli horum fiebant, neque leues syderationes, neque ullus alius morbus de se significationem præbuit, sed in sola uoce iudicabantur. At uero Nyctalopice affectiones firmabantur, ut quæ etiam ex alijs causis fiebant. Fiebant autem

pueris maxime. Oculorum autem nigrae partes aliquantum uariabantur, quae pupillas paruas habebant. In summa oculus niger ut plurimum erat. Et magnos magis quam paruos oculos habebant, & plurimi rectos capillos acnigros. Cæterum mulieres non similiter à tussi afflictæ sunt. Verū paucae febricitarunt, & ex his ualde paucae ad peripneumonicam affectionem deueniunt, atque hæ seniores, & omnes superstites euaserunt. Causabar autem hoc fieri, eo quod non similiter uelut uiri prodirent, & quod nequaquam similiter ut uiri morbis corripiuntur. At Anginae liberis duabus oboriebantur, atque hæ mansuetissimi moris erant: abundantius autem famulas corripiebant, quibus & uiolentissimæ fiebant, ipsasque celerrime perimebant. Viris uero multis fiebant, qui partim euaserunt, partim perierunt. In summa, qui solum deglutire non poterant, his ualde mites ac toleratu faciles erant. Qui uero etiam insuper obscure loquebantur, his molestiores ac diuturniores. Quibus uero etiam uenæ circa tempora & ceruicem attollebantur, his aliquantum malæ erant. Pessimæ uero his quibus & spiritus sublimis coeleuabatur. Hic enim etiam incalcescebant. Nam sicut scriptum est, ita cōsortia affectionum habebant. Et quæ quidem primum scripta sunt, etiam sine posterioribus fiebant.

Quæ uero posterius, non sine prioribus. Celerrime autem moriebantur, ubi febrili rigore insuper rignissent. His ita pressis nihil memorabile proderat, non uentris turbatio, non uenæ sectio, neque quæcunque alia tentauimus. Secui etiam uenam sub lingua, quosdam & sursum purgaui. Hæc igitur omnino in æstate fiebant, sicut etiam eruptiones omnino multæ, & potissimum in siccitatibus lippitudines dolorosæ populariter grassabantur. Sanguinis uenarum suppressiones faciunt animi deliquium, figura alterata, interceptio, linamentum intortum, appositio, deligatio. Inguinum glandularumque tumores plurimi fiebant, eo quod hepatitis affecta esset. Erat autem & ab arteria male affecta malum signum, uelut Posidoniæ. Quibus sanguis erumpebat, morientes fronte non exudarunt, sed uelut contracti præ siccitate erant. Et anhelosi, ac cum sudoribus pereuntes, male habebant. Ventrium abundantia turbationem ferunt, uelut Posidoniæ: & quæ animalcula in aluo inducunt. In attenuatione circumtensio ante obitum, & umbilicus oblongus ipsi protractus est: & gingiuarum dentes ambientium exulcerationes.

Multa de unoquoque recte præcipi possunt, quæ partim eadem possunt, partim non: uelut est talia diffundi, exolui, & educi, & indurari, & maturari, & ubi mutatione opus est, de lecto propellere timidos, & torpentes excitare ad ea quæ relinquunt. Hydropicos citius secare oportet, tabescētes statim uirere, caput secare, & huiusmodi. Hydropicorum pestinem ne contingito, neque internas partes. Simile est enim multis genibus. Affectiones circa cor siue uentriculi osculum Xenarcho, & calidum acruatim exspirare, & uulcus per euacuationem ab initio fouere. Vox qualis est irascētibz, si talis fuerit non irato, ex natura fuerit. & oculi tales fuerint ex natura turbulenti, quales sunt ubi irascuntur hi qui tales non sunt. Et alia iuxta morborum rationem, uelut uerbi causa, Morbus tabidam speciem inducit, si talis ex natura æger fuerit, ex tali morbo superstes euadet: & alia eodem modo.

ses laboriosæ contingunt locos læsos, & maxime articulos. Sed & in febribus lassitudinem inducentibus, tusses sicæ ad articulos decumbunt cum febre, si intus relinquuntur. Spiritus tabescentibus obscuri mali, & non parientibus, & quicumq; alij tales ab eadem constitutione. Tabescentibus autumnus malus. Malum item uer, quum fici folia cornicis pedibus similia fuerint.

In Perintho uere plurimi ægrotarunt. Simul causa fuit tussis per hyemem populariter uagata, & alijs quicumq; diuturni sunt morbi. Nam & in ambiguis confirmati sunt. Quibusdam uero diuturni non sunt oborti, uelut his qui dolores rhenales habent. Sed & alijs, uelut homo ille ad quem Cyniscus me adduxit.

Dolorum in lateribus, & pectore, & alijs partibus, tempora an multum differant considerandum est. Nam quum melius habuerint, rursus deterius habebunt, non delinquentes. In longis dysenterijs cibi fastidia multum aliàs, tum si insuper febrerint. Vlcera circumglabra maligna sunt.

Lumbos dolenti recursus ad latus, & pustulæ quæ seps uocantur. Rheum affectiones non uidi sanatas supra quinquagesimum annum. Quæ in somnis exacerbantur, & quibus extremæ partes perfrigerantur, & mens turbatur, & alia quæ circa somnum fiunt eiusmodi, & quibus contraria. Quibus nihil intra constitutum tempus accidit, singulis partus uitales fiunt.

Apparentia in quibus mensibus fiunt. Labores in circuitibus, quicquid in septuaginta mouetur, in triplicitate perficitur: & quicquid in nonaginta mouetur, in triplicitate perficitur. Post menses, dextera & sinistra hiant.

Humiditas per prodeuntia, diæta sicca opus habet. Quod citius discretum ac motum est, rursus augetur tardius, & ad longius tempus. Labores tertio, quinto, septimo, nono mense: & secundo ac quarto.

Hæc ex parua tabula considerata sunt.

Victus ratio fit repletionem, uacuationem, ciborum, potuum. Mutationes horum qualia ex qualibus, prout se habent. Odores delectantes, offendentes, impletes, placantes. Mutationes ex qualibus, prout se habent. Illabentes, ingressos aut egressos spiritus, aut etiam corpora. Sermones qui audiuntur, alij meliores, alij offendentes. Et a lingua ex qualibus qualia alliciuntur.

Spiritus, tantæ caliditas, frigiditas, crassities, tenuitas, siccitas, humiditas, plenus, imminutus et copiosior, a quibus mutationes, quales ex qualibus, prout se habent. Continentia, aut cõtenta, aut intus permeantia corpora. Sermonibus, silentio, dicere quæ uult, sermonibus quibus dicit, an magni aut multi, ueri aut conficti. Prodeuntia & egressa nosse oportet, unde cœperunt: aut ubi desinuerunt, aut quantum diuulsa sunt, itemq; colores, in quibus aut caliditas, aut salsuginem, aut dulcedinem, aut tenuitatem, aut crassiciem, equaliter aut inæqualiter, corpus, tempus: Mutationes quales ex qualibus habent. Incoepit eructationem, non obtinuit. Lachrymæ uolenti, nolenti, multæ, paucae, calidæ, frigida, crassities, sapor. Sputum an per se excreet, aut tussiendo rejciat, itemq; uomitum. Solis calor, frigus, humectatio, siccitas: Mutatio per qualia, ex qualibus, ad qualia se habet. Labores, ocia, somni, uigilia.

Quæ in somno fiunt, insomnia, cubilia, & in quibus, & ex quibus. Mentis intelligentia ipsa per seipsam, citra instrumenta ac negotia, tristatur, lætatur

tur, timet, confidit, sperat, desperat: uelut Hippothoi domestica famula mentis suæ per seipsam gnara erat, & quæ in morbo acciderant sciebat. Aetatem ab ætate discernere oportet, & an prius aut posterius quàm cōuenit, quid fiat. ueluti si resolutus est hyeme, & senī ætate, aut infanti, & ætate aut prius, aut posterius quàm conuenit. Dentium emissiones, pilorum productiones, genitura magis & minus, pilorum augmentum, crassitudo, robur, imminutio, quod cognatum est, & quod per seipsum, quanto magis & minus. Anni tempus, in quo & citius aut serius. Tempus in quo factum est, pluuiosum aut siccum, frigidum aut calidum, sine uentis aut cum uentis, & qualibus uentis. Temporis in principio, aut medio, aut fine, aut semper, præterito aut præsentē. Morbi tempus & hora, accidentia, circuitus, & ex circuitibus maiores, & per amplius tempus: incrementa, & totius morbi incrementum, remissio, uigor, & magis & minus perficiens, & quando, & qualiter, & in quali hora ætate. Populariter grassantium morborum modi, & si quis ex incipientibus incoeperit sine uomitu, ueluti aut ubi biberunt quid continentes, aut parum purgati. Febriculosi fortassis ualde candidi, quorum etiam labia, qualis modus, tempora. Corpus, actio, in considerationem ducatur. Visus, auditus, nasus, tactus, lingua, cogitatio consideretur. Tumores in superius palpebris relictī, dum alia circumcirca gracilesunt, reciduias faciunt: In extremitate uero subrubicundi, duri, & ualde uiscosi, & insurgentes ac inhaerentes in his sunt, uelut Pharsalio Polymedi. Erumpentes tumores aut liuores, in lippitudinibus aut ulceribus: Sed & quæ deferuntur ex tuberculis ac suppurationibus, quia signa sunt. Circa messem tormina circa umbilicum, & dolores, quandoq; à porro: Sed & ab aliis his postea. Sacri ignes quibusdam à collo, & circa has partes, in facie iudicabuntur: Nigri etiam quibus à collo, mali erant: & si pustulæ essent, malæ erant: & quibus alius turbata esset. Adamantus atrabiliarius à peplis pluribus uomuit aliquādo nigra, quandoq; à cepis. Febres in quibus ulcerantur labia, fortassis intermittentes: & tertianis perfrigerationes. At amburentes statim ad manum soluuntur semper. Quale inest in articulis considerandum, an non suppurantur. Consuetudo autem, ex qualibus sani degimus, uictus modis, tegumentis, laboribus, somnis, rebus ueneris, mentis affectionibus. Quomodo morbos ferant, à quibus quæ figuræ, ad quos locos conuersi sunt, quando coeperunt, affuerunt, desuerunt. In quibus intemperans horrendus. Contraria in morbo uictus rationes, qui facile, qui agre toleratur. Victus rationes quantum fieri potest cognoscendæ. Nam non nosse, multarum calamitatum res est. Bonis autem medicis similitudines pariunt errores ac difficultates. Verum contraria facit causa & occasio. Scio quod difficile est ratiocinari ac cognoscere uias, ueluti si sit acuto capite, simus, subaridus, biliosus, agre uomens, facile uomens, niger, iuuenis qui temere uitam degit: Hæc simul inter se consentire difficile est. Cui fistula refringebatur, tulsiculæ permanere impediebant. Cui apex hepatis complicatus erat, eum concussi, derepente dolor sedatus est. Satyrus in Thaso cognomento Grypalopex uocabatur, hic quum annorum uiginti quinque esset, sæpe per somnum semen effudit: & interdū quoque frequenter ipsi prodibat. Quum autem ad annum trigēsi

trigesimū peruenisset, tabidus fiebat, & mortuus est. In Abderis palæstræ cultos, qui Stheneus dicebatur, multum luctatus aduersus fortio rem, & in caput lapsus, digressus multam bibit frigidam aquam. Postea illa nocte uigiliæ obortæ sunt, angustia, & extremarum partium frigiditates. Postridie ingressus ad domum, & glandula aluo subdita, non subiit, uerum parū minxit, prius aut nihil minxerat: ad noctē lauit, nihilo minus uigiliæ et angustia aderat. delirauit. Tertia die frigiditas extremarū partiū, excalefactus sudauit. pota aut aqua mulsa tertia die mortuus est. Atrabiliarij, etiam comitiali morbo corripi plerunq; solent, & uicissim comitiales fieri solent atrabiliarij. Vterq; uero morbus magis fit, prout ad alteram partem inclinarit. Si quidem enim ad corpus inclinarit, comitiales fiunt. Si uero ad animum, atrabiliarij melancholici dicuntur.

In Abderis Phaethusa Pythæ uxor, priore quidem tempore foecunda erat: quum autem maritus ipsius in exilium abiisset, menses multo tempore suppressi sunt. postea dolores & rubores ad articulos oborti sunt. Hæc autem ubi contigissent, & corpus uirile factum est, & hirsuta penitus euasit, & barbâ produxit, & uox aspera facta est. Et quum nos omnia tentassemus, quæ ad menses detrahendos conferre uisa essent, non prodierunt, sed mortua est, quū non ita multo tempore postea uixisset. Idem hoc contigit etiam Namysia Gorgippi uxori in Thaso. Visum est autem omnibus medicis, in quos sanè ego incidi, unam spem esse, si menses secundū naturam prodirent. Verū & huic proficisci non potuerunt omnia nobis molientibus, sed paulo postea mortua est.

HIPPOCRATIS COI DE MOR

BIS POPVLARIBVS LIB. VII. IANO COR
nario Medico Physico interpretè.



POST canem febres fiebant sudorificæ, & non perfrigerabantur penitus post sudorem; sed rursus incalescebant: & leniter longæ, & iudicatu difficiles, & non ualde siticulosæ. paucis in septimo & nono desinebāt, alijs undecimo, & decimo quarto, & decimoseptimo. Polycrati febris, & sudor, qualis descriptus est. à medicamento purgatio deorsum uehementer. & febris adeo lenis facta est, ut obscura cōsisteret, præterquam in temporibus. & sudores ad uesperam, circa caput, collum, pectus. Deinde rursus etiam per totum uentrem, & rursus inalescebat. At circa duodecimum & decimum quartum febris aucta est, & modicæ alui subegestiones. post purgationem usus est sorbitionibus. Circa decimum quintum dolores uentris iuxta splenem, & sinistram lateris mollitudinem. Calidiorum appositio minus profuit quàm frigidorum. Quum infuso per clysterem molli usus esset, cessauit dolor. Idem quoq; Cleocydi profuit, ad dolorem similiter habentem, itemq; febrem. Circa decimā sextam calores leniores esse uidebantur, & egestiones bilis meracæ, & animus audacior. spiritus aut moderatus. Quandoque uero acruatim attractum, rursus acruatim expirabant, uelut præ animi deliquio, aut uelut in umbra desidens respirare solet, is qui per æstum iter fecit. Decimā septima itaq; die desidēs in sellam, animi deliquiū incidit, & multo tempo

tempore sine uoce ac sensu iacebat, & uix aquam mulsam suscipiebat, fibras in collo distendens, utpote faucibus resiccatis, ac omni uirium exolutione praesente. Vix itaque intra seipsum erat, & calores leniores fiebant. Postea uero desinit morbus uigesima secunda die. Pythodoro eodem tempore febris continua, octaua die sudor obortus est, & rursus incalcescebat. Decima rursus sudor, duodecima sorbuit succum, & usque ad decimam quartam obscura erat, in temporibus autem comparebat, & sine siti erat, & ipse sibi ipsi sanus esse uidebatur. Sudores fiebant omni die. Decima quinta iusculum pulli sorbens uomuit bilem, & aluus infra exturbata est, & febris exacerbata est, rursus desinit, & sudores fiebant multi, & corpus totum perfrigeratum erat, exceptis temporibus. Pulsus non defecit. Videbatur quieuisse modico tempore ut incalcescere se putaret. Vigesima quarta quum iam gustaret cibos multis diebus, & pransus esset, multa erat febris, & ad uesperam delirium, accedente simul etiam somno. Detinebat itaque iam continua & uehemens, & quandoque unam, quandoque duas noctes uigilabat, reliquo uero tempore somnus abunde contingebat, ut operosum esset excitare, & delirium in somno, & si quando ex somno excitatus esset, uix ipse suus ipsus erat. Sitis exors. Spiritus moderatus, talis aliquando, qualis Polycrati. Lingua non decolor. Post septimam reciduae succi exhibebantur, post decimam quartam cibus. Circa primos septem eructabat, ac reuomebat: quandoque cum potu subbiliosum, citra anxietatem, donec aluus deorsum soluta est. Sudores post reciduiam defecerunt, nisi quis circa frontem esset tantillus ut uix significationem de se praeberet. Lingua ex somno si non collueretur, subbalba prae siccitate, & ruptiones ulcerum circa ipsam, & in labio inferno, & circa dentes. Alui egestionem paucam. Circa decimam quintam ut recidua facta est, frequentiores & uiscosae. Decoctum malicorij sedauit ipsas. Urinae quales sunt diuturnae. Sub ultimum tempus dolor pectoris deglutienti potum, & manus in pectore. Cum inu & ouum absorbenti sedatus est. Linguae raritas profuit. Quinquagesima a prima circa arcturum, sudores breues iuxta lumbos & pectus, & corpus perfrigerabatur, exceptis temporibus, ualde modico tempore. Prima & quinquagesima remisit, nec iterum apprehendit. Eratolai filius circa aequinoctium autumnale dysentericus fiebat, & febris tenebat. Egestionem alui erant biliosae, tenues, multae, & moderate subcruentae. Dolor autem uentris uehemens. Vbi serum & lac bibisset, filice candefacta immissa, dolores & subcruentae egestionem moderatiores fiebant, sed biliosae comitabantur, & saepe ad exonerandum aluum surgebat, sed minore dolore. Febricula uero et agrote, & multis, omnino non adesse uidebatur per omne tempus, post primos sex dies, adeo obscura erat. Verum iuxta tempora pulsus erat, & lingua prae siccitate subbalba, & moderate siticulosus, & sine somno. Sorbitionibus autem iam utebatur & uinis. Quum iam ad decimum quartum diem peruenisset, tubercula circa aurem oborta sunt, tum altera, tum utraque, dura ac cruda: omnia disparuerunt, moderate autem dolorosa erant. Quum autem non desinerent egestionem, & semper biliosae essent, absorbenti herbam in farina, biliosae egestionem & dolores ad tempus aliquod mitiores facti sunt. liquidas uero multas saepe egerebat, & cibos ualde auersabatur, & omni necessitate coactus admittebat. Calor autem, & lingua, & sitis tales sequebantur quales dicti sunt, & sudores nulli. Obliuio uero huiusmodi quaedam. Vbi interrogasset

terrogasset de eo quod paulo antea audiuiſſet, modico interpoſito tempore rursus interrogabat: & rursus repetebat, uelut qui non dixiſſet. & ſe deſidere obliuiſcebatur, niſi quis ipſum commonefeciſſet. & ipſe ſibi ipſi conſcius erat huius affectionis, neq; ignorabat. Spiritus qualis ſano. Ultra trigēſimū uero uſq; ad quadageſimum diem, & dolor uentris multum augeſcebat, & ſupinus decumbebat, & ſe conuertere nē tantillum quidē poterat. & quia dolor uehēmēſ erat, alijs qui cibum exhiberent opus habebat. Alui egeſtio erat multa, & diſcreta, tenuis, & calores uinoſi, quęcunq; tandem ingeſſiſſet, & quādoq; ſubcruenti. & corporis dolor. colliquatio extrema, & impotentia. & ne alio quidē ſubſeuerante ſurgere amplius poterat. In medio uero umbilici ac oſis pectoris, circa hanc ſedem adhibita manu, talis palpitatio erat, qualis neq; à curſu, neq; à timore circa cor generari poſſit. Bibenti lac aſininum coctum, nouem heminaſum Atticarum menſura ad duos dies, bilioſa purgatio uehemens oborta eſt, & ceſſauerunt dolores, & ciborum appetentia acceſſit. Poſtea uero bubuli lactis crudi quatuor heminaſ Atticas bibit, pro uice una cyathos duos, in diem, primum ſextam aquę partem ammiſcens, & uini nigri auſteri parum. Semel autem in die cibum capiebat ad ueſperam. Panis erat ad menſuram dimidię choeniciſ ſubcineritius, & piſciculus petroſus ſimplex, aut carūcula caprę aut ouiculę. Potus lactis poſt primos decem dies, ad quadraginta uſq; ſine aqua, cum uini nigri modica parte. Poſt ſeptuageſimum iam à primo diem, à balneo ad noctem, ſudor exiguus obortus eſt. Utebatur autem modico potu, & poſt cibum potu auſteriore. Cteſicrati lac in farina magis q̃ ſerum caprinū contulit, quum dolor eſſet circa totum uentrem, & dolores cum multa ad egerendum ſurrectione, ac ſubcruentā egeſtione, & tumor circa pedes, ferē iam ad dies uiginti quinq; eſſet. Et Adriano eadem contulerunt. Verum Cænę filio lac aſininum coctum. Cydis filio circa ſolſtitium hybernū rigor & febris, & auris dextrę dolor, & capitis dolor. Talis autem auris dolor ſtatim à paruo puero ipſum comitabatur, fluidus, fiſtuloſus, & grauīs odoris. Quum autem ita ſe haberet, plerunq; doloris exors erat. Tunc autem dolor erat uehēmēſ, & capitis dolor. ſecūda aut tertia die bilis uomitus. deſidenti exonerādi uentris gratia, prodiit excrementum ſubbilioſum uiſcoſum, uelut ex ouo ſubpallidum. Quarta & quinta ad noctem aliquantum delyrabat. & dolor capitis ac auris uehēmēſ, & febris. Sexta alui egeſtio à mercuriali. & calor, & dolor ceſſaſſe uidebatur. Septima uelut ſanus. In temporibus autem dolor non defecit. ſudor nullus obortus eſt. Octaua ſuccum ſorbuīt. ad ueſperam autem betę ſuccum. & in noctē ſomnus. & ualde doloris exors. & nona lætabatur ad ſolis occaſum. Verum ad noctem capitis & auris uehēmēſ dolor. Contigit quoq; aurē purę manare circa hoc tempus quum maxime doleret ſtatim à principio. Totā uero noctem nonam, & ſequentem diem, ac noctis magnā partem, neminem noſcebat. Verum ſuſpirās perſeuerabat, in die uero intra ſeipſum erat. & dolores ceſſabāt, & calor moderatior erat. Quū aut ſorbuīſſet mercurialem, undecimā egeſſit per aluū pituitoſa, mucoſa, maleolentia. duodecima & decima tertia moderate habebat. Decima quarta initio mane facta, uſq; ad meridiem per totum corpus ſudabat, cum ſomno & ſopore multo, ut operoſum eſſet ipſum excitare. ad ueſperam experrectus eſt, & corpus quidē moderate perfrigeratū eſt,

in temporibus autē pulsus perseverabat. decimaquinta & decimasexta succis
 usus est. Decimasextima uenit rursus dolor eorūdem ad noctem, & delirium.
 & pus fluebat. Decimaoc̄taua & decimanona ac uigesima, infanti modo dege-
 bat. Vociferabatur autem attollere seipsum nitens, sed capiti dominari non po-
 tens, manibus protentis semper aliquid frustra uenabatur. Prima & uigesima
 sudor exiguus circa latus dexterum, & pectus, & caput. Vigesima secunda su-
 dor circa faciem plurimus erat. Voce autem hoc tempore, si quidem ualde co-
 naretur, quæ uolebat perfecte loquebatur. Si uero ex tempore citra conatum,
 semiperfecta. & os exolutum, & maxillæ & labia semper in motu, uelut qui lo-
 qui uellet, & oculorum frequens motus ac intuitus. & color in dextro oculo ue-
 lut dictum est, subcruentus. & palpebra superna intumuit, & iuxta maxillam
 rubor in fine. & uenæ omnes in facie manifestæ adeoq̃ contractæ. & oculis nō
 amplius nictabat, sed intente intuebatur, & palpebras diducebat ad supernam
 partem, uelut fieri solet ubi quid in oculum incidit. & quum biberet, descēdens
 tis potus in pectora & uentrem strepitus audiebatur, qualis & Chartadi. Spi-
 ritus leniter semper moderatus. lingua qualis est peripneumonici cum pallo-
 re albicans. ab initio & semper capitis dolor. Collum semper immobile ut unū
 cum capite circumageretur opus habebat. & pars secundū spinam ex collo res-
 cta ac inflexibilis. decubitus quales dicti sunt, & non semper supinus decum-
 bebat. At pus iam serosum album, multum negocij ad detergēdum cum spon-
 gijis exhibebat. odor eius ualde excellens. circa postremū tempus pedum con-
 tactum non ualde percipiebat. Harpalidæ sorori prægnanti circa quartum
 aut quintum mensem, tumores circa pedes aquosi fiebant. & oculorum cauæ
 partes intumescabant. & totum corpus in tumorem eleuatum erat, uelut in pi-
 tuita alba affectis, tussis sicca. rectæ ceruicis spiratio, & eiusmodi anhelatio. &
 quandoq̃ strangulationes à spiritu, ut sedens in lecto perseveraret. decumbe-
 re autem non poterat, sed etiam si qua somni expectatio esset, desidebat. Sine fe-
 bre erat leniter. & foetus ad plurimū tempus immobilis erat, ueluti corruptus,
 & translabebatur. Comitabatur autē anhelatio ferè ad duos menses. At quum
 fabis melle ammixto, & eiegmate mellis usa esset, & Aethiopicum cuminum
 in uino bibisset, melius habuit. Postea tussiēdo eduxit multa, matura, pituito-
 sa, alba, & spiratio illa cessauit. peperit autem fœcellam. Polycratis uxori
 æstate circa caniculæ sydyus febris. Spiritus matutinus minor, à meridie magis
 & paulo densior spiritus. Tussis & excreatio statim ab initio, similis purulen-
 tis. Intus circa arteriam & fauces subsibilabat stridula asperitate. facies boni co-
 loris. in maxillis rubor, non abunde coloratus, sed leniter floridus. Progressu
 uero temporis & uox raucosa, & corporis colliquatio. & circa lumbos eruptio-
 nes. & aluus circa postremum tempus liquidior. Septuagesima die febris ex-
 trinsecus ualde frigit. in temporibus autem quies. Spiritus uero frequentior
 fiebat. Verum post hanc quietem spiritus densior, adeo ut sedens perseveraret,
 donec mortua est. In arteria strepitus multus inerat. & sudores prauī. & intui-
 tus ualde modesti, usq̃ ad extremum tempus. Dies acceperunt ipsi perfrigeratæ
 plures quàm quinq̃. Post primos autem purulentum excreare persevera-
 bat. Mulieri supra portas habitanti iam seniori febricula oborta est: quæ
 quum iam desineret, colli dolor usq̃ ad spinam & lumbos, & harum partium

non ualde potens erat. Maxillæ erant cōpactæ, & dentes in seipsos, plus quàm ut specillum admitterent. & uox balbutiens, eo quòd resolutum, & immobile ac debile esset corpus. prudens tamen erat. Calefactorijs & aqua multa tepida, tertia ferè die hæc laxauit, & postea succis & iusculis sana euasit, id quod ad finem autumnalis temporis contigit. Apud Harpalidem unctor, crurum ac manuum impotentior circa autumnum factus, bibit temere medicamētum sursum ac deorsum purgans. ex purgatione febris. & ad arteriam desluebat fluxor, qui loquentem impediret, & faceret ut inter loquendum anhelaret, similiter ut anginosus raucosus. Strangulatio deglutienti, & alia quæ in angina. Verum tumor non erat. Febris autem & tussis augeſcebat, & excreatio liquidæ ac multæ pituitæ. Progressu temporis & dolor circa pectus ac mamam sinistram. Quum autem exurgeret, aut commoueretur, anhelatio multa, & sudor à fronte & capite. & faucium affectio mollior erat, dolore ad pectus descendente. Ab initio igitur fabis melle ammixto utebatur. Postquam autem febres detinebant, magis aceto mulso calido, & mellis delinctu multo. Vbi præterisſent dies quatuordecim omnia desluerunt, & manuum ac crurum non longe postea potens factus est. Chartadi febris ardens, uomitus bilis multus, & infra alui egestio, uigiliæ. & iuxta splenem tumor rotundus. Tertia die mane surrexit, strepitu circa uētre[m] citra dolorē percepto. Vbi uero aluum exoneraret, sanguinis recentis plus quàm congij mensura subiit. & ubi iterum atq; iterum cohibuisset, grumi concreti. anxietas circa cor & os uētriculi & sudor per totum ferè corpus. & febricula frigesce[re] uidebatur. & primum prudens erat, progrediente uero die, & inquietudo maior, & anxietas, & spiritus paulo densior. & confidentius ac benignius quàm pro tempore hominēs compellabat, ac excipiebat. & quædam animi deliquia accedere uidebantur. Quum autē exhiberent aliqui succos, & aquam de farina crassa in ipsa macerata, nō cessauit: sed spiritus, ad uesperam ualde multus erat, & iactatio multa, et ad dextera, et ad sinistra transmouens seipsum nullo tempore quiescere poterat. pedes frigidi. In temporibus et capite calor magis propinqua iam morte. & sudores multi. & habenti strepitus audiebatur, circa pectus & uētre[m], descendens potus. Quod uero pessimum erat, ubi dixisset sibi aliquid infra subire uelle, & oculis intentē intuitus esset, non diu se cohibens mortuus est. Hermoptolemi uxori hyemis tempore febris. & capitis dolores. & quum bibisset, ut quæ difficulter deglutiret, surrexit, & cor se sanasse dixit. lingua liuida ab initio. Occasio uidebatur ex horrore post balneum facta esse. Vigilabat & nocte & die. Post primos dies interrogata, non adhuc solum caput, sed & totum corpus se dolere dixit. Sitis quandoq; uehemens, quādoq; moderata. Quinta & sexta & usq; ad nonam ferè delirium. & rursus ad seipsam loquebatur semiperfecta cum sopore. & aliquādo manum ad dealbatum parietem protendebat, & puluinū quendam frigidum ad caput situm, etiam pectoribus adhibebat. & stragula quandoq; reſciebat. & in oculo dextro subcruentum quid erat. & lachrymabatur. Vrina autem erat quæ in pueris semper pessima est. Ex aluo egerebat ab initio quidem subfulua. postea uero aquosa ualde, & huiusmodi coloris. Undecima moderatius calida esse uidebatur. & quādoq; sitis exors fiebat, adeo ut nisi quis dedisset, non peteret. Somni post primum tempus cōtingebant modes-

rate interdiu, ad noctem uigil erat. & ad noctem magis dolebat. Nona uenter exturbatus est aquosis excrementis. Similiter etiam undecima. Sequentibus uero moderate multum ad egerendum surgebat, & talis egestio erat. Erant autem in prioribus diebus indignationes & eiulationes, uelut pueri, & uociferatio, & timores, & circumspeditiones, ubi sopore excitata esset. Verum decimaquarta operosum erat ipsam continere exilientem ac clamantem derepente & pertinaciter, uelut ex plaga, & uehementi dolore ac timore, uelut si quis ipsam apprehensam modico tempore detineret. Deinde rursus quietem habebat, & sopore pressa dormiens perseuerabat omnino non uidens, quandoque neque audiens. & totam hanc diem ad utrumque, modo ad tumultum, modo ad quietem transmutabat. Sequenti nocte per aluum subiit quid cruenti, uelut mucosum: & rursus uelut limosum: postea prasina ualde ac nigra. Decimaquinta repentinæ iactationes, & timores, & uociferatio lenis fiebat. Sequebatur autem efferatio, & indignatio, & eiulatio, nisi ipsi cito quod uellet porrectum esset. & cognoscebat quidem omnes & omnia statim iam post primos dies, & oculi subcruentum illud sedatum est. Verum infania iuxta temporis occasionem, & uociferatio, & mutatio prædicta sequebatur ad soporem, audiebat inæqualiter, aliqua ualde, & si submisit quis loqueretur: aliqua uero clarius eloqui oportebat. Pedes semper æqualiter cum reliquo corpore calidi, usque ad extremos dies. Verum decimasexta minus. Decimasextima moderatius quam alijs diebus habens, ad noctem horrore ipsi oborto, se contrahens magis febricitabat. & sitis multa erat, reliqua similia sequebantur. Tremores autem circa manus fiebant, & aliquantum concutiebat caput. & oculorum intuitus prauus. & sitis uehemens, ubi bibisset rursus postulabat, & rapiebat ac large bibebat: neque auellere ipsi poterant. lingua sicca, ualde rubicunda. & os totum ac labia ulcerata erant ac sicca. & ambas manus ad os admouens manducabat quum tremula esset. & si quis aliquid ad manducandum aut sorbendum obtulisset, large ac furiose deglutiebat ac sorbebat. & signa circa oculos mala. Diebus autem tribus aut quatuor ante obitum, horrores quandoque incidebant ipsi, adeo ut contraheret corpus, & contegeretur, & anhelaret. crura distendebantur, & pedes frigidi erant. Sitis similis. & mentis affectiones similes. & surrectiones ad egerendum aut inanes, aut paucis & tenuibus prodeuntibus, cum modica quadam tensione. Postrema tertia & uigesima, oculus magnus mane erat, & circumspectio breuis, & quietem agebat, quandoque etiam absque cōtectione ac sopore. Ad uesperam uero dextri oculi motus, qualis uidentis, aut aliquid uolentis, ab externo angulo, ad nasum, cognoscebatque & interroganti responderebat. Vox post multa subblata, & præ uociferatione fracta ac raucosa. Amphiphradis filio ætate lateris sinistri dolor, & tussis. & alui egestionem multæ, aquosæ, & subbiliosæ. & febris cessasse uidebatur circa septimam. Tussis aderat. Color subalbidus ac subpallidus. Circa duodecimam cum uirore subpallidum spuebat. Spiritus progressu morbi semper densior, & anhelatio, & stridula asperitas circa pectus & arteriam. Sorbitionibus utebatur, prudens per omne tempus. circa uigesimam octauam mortuus est. Sudores quandoque fiebant foras. Caupo peripneumonius. aluus statim subibat. Circa quartam sudor multus, febricula cessasse uidebatur, tussicula nulla, ut ita dicam. Quinta, sexta & septima detinebat febris

hīs. sudor octaua. Nona excreauit pallidum. decima subibat aluus acruatim non sape. circa undecimam initius habebat. Decimaquarta sanus. Her-
moptolemo post pleiadis occasum febris accessit. Tussis non ualde. lingua pe-
ripneumonica. nona exudaui. totus frigefactus est, uelut uidebatur. obtule-
runt ipsi succum. circa meridiem caleſcebat. Vndecima sudor. & aluus erupit
bilioſis egeſtionibus. Tuſſicula accessit. Decimaquarta pallidum excreauit.
& ſtertebat. Decimaquinta quum per totum tempus prudens manſiſſet, mor-
tuus eſt. Alius quidam in palato ſtertens. lingua ſicca, peripneumonica,
prudens mortuus eſt. Et Poſidonius adhuc æſtate inſtante, iuxta pectus,

& præcordia, & latus, multo tempore dolebat, citra febres. Multis autem an-
nis antea ſuppuratus fuerat. hyeme uero quum inhoruiſſet, dolor augeſcebat.
& febricula tenuis. & excreatio purulenta, tuſſis cum ſtridula aſperitate circa
fauces, & ſtertens, quum prudens eſſet mortuus eſt. Balis filius quum ex
monte penitus aberrāſſet, ſexta lingua præua, ſubruba. & uocem læſerat inter
aberrandum. oculi colorati, natantes uelut dormitantium. color reliqui corpo-
ris non ualde uelut in morbo regio, ſed ſubpallidum, liuidum. uox præua. lin-
gua obſcura, peripneumonica. non prudens. Spiritus ad manum malus, non
denſus, neque magnus. frigidi pedes lapidoſi. Circa nonam mortuus eſt.

Quædam apud Metronem anginoſa, dexterā manum ac crūs doluit. Fe-
bricula tenebat debilis. ſuffocatio die tertia remiſit. Septima conuulſa. uox in-
tercepta. Stertor. dentiū colluſio ac conſertio, maxillarum rubor. Hæc non lon-
ge uitam prætraxit, quinta aut ſexta mortua eſt. Signum circa manum ſubliui-
dum. Bion ex hydropico diuturno cibū auerſabatur ad multos dies. & u-
rinæ ſtillicidio uexabatur. In ſiniſtro genu abſceſſus fiebat. ſuppuratus eſt. mor-
tuus eſt. Cteſiphon hydropicus ex febre ardente multa. & prius hydropi-
cis ac ſplenicus, ualde repletus eſt & ſcortum, & crura, & peritonæū membra
nam aluū ac inteſtina ambiētem. Ad finē tuſſis & ſuffocationes fiebant ad no-
ctem, magis à pulmone, uelut pulmonicis ac tabeſcentibus. Tribus aut quatuor
diebus ante diem obitus, rigor. febris, circa femur dextrum intus ad uenam
mediam ab inguine collectio uelut ignis feri, ſubliuidum habens ruborem. ad
noctem cordis ac oris uentriculi dolor. & non longe poſtea uocis interceptio.
ſtrangulatio cum ſtertore. & mortuus eſt. Et in Olyntho hydropicus, de-
repente uocē priuatus, noctem & diem deſipiens, mortuus eſt.

Prodro-
mi filius, æſtate ſubblæſus, æſtuoſus. lingua ipſi ſubarida, obſcura. egeſtio alui
deorſum multa. Superſtes euasiſit. Leophorbidae febris acuta poſt ſolſti-
tium hybernū. præcordiorum & uētris dolor. alui egeſtiones liquidæ, bilioſæ,
multæ. & interdium ſoporofus. lingua peripneumonica. tuſſis non inerat.
Duodecima nigra pauca & præſina egeſſit. Decimaquarta febricula ceſſaſſe ui-
debatur. Poſtea uero ſorbitioſibus utebatur. Decimaſexta os ualde ſalfugino-
ſum ſiccum fiebat. ad ſummam ueſperam horror, febris. Vigefima prima cir-
ca meridiem rigor, & ſudor. febris deſiit. uerum calor adhuc ſuberat tenuis. ad
noctem ruruſ ſudor. & uigefima ſecunda ad noctem ſudor. & calor remiſit.
At prioribus diebus omnibus ſine ſudore erat. Aluus autem humecta fuit etiā
am in putata poſtea recidiua.

Quæ ſuperne habitabat Theodis cognā

ta, sub pleiadas febris acuta, sexta uidebatur cessasse. lauit uelut febre sedata. sexta mane maxilla ualde rubicunda, utra non memini. In uespera febris uenit multa. & animi deliquium, & uocis interceptio erat. non longe uero postea sudor, & quies cessante morbo septima die. Theodori uxori in febre uehementi sanguinis eruptio facta est, hyeme. ubi febris desisset circa nonam, non longe postea, lateris dextri uelut ab utero grauitas. Sed & primum, & sequentibus diebus, obortus est dolor uehemens iuxta pectus. & fomento ad latus dexterum adhibito, remiserunt dolores quarta die. spiritus densior. arteria uix respirans subfibilabat. & supina difficulter se uertere poterat. ad noctem febris acutior. & delirium breue fiebat. Quinta mane mitior esse uidebatur. sudor de facie diffundebatur primum modicus, deinde multo tempore per totum corpus ac pedes. Postea uero uidebatur ipsi febris remisisse. Erat autem ad manum frigidius corpus arteriarum. Quae uero in temporibus sunt etiam magis saliebant. & spiritus densior. & alia atque alia delirabat. & omnia ad deterius. lingua perpetuo alba ualde. & tussis non inerat, nisi tertia ac quinta die ad breue tempus. Sitis non erat. Sputatio erat. Praecordium dextrum ualde eleuabatur circa quintam. uerum postea mollius. egestio tertia die a balneo stercoris modici. Quinta rursus liquidi modici. Venter autem mollis. Urinae acerbae, cineris speciem referentes. oculi uelut delassatae, difficulter suspiciebat ac circumferebat oculos. Quinta ad noctem aegre affecta fuit. & delirium sequebatur. Sexta rursus eadem hora, qua plenum solet esse forum, multus sudor diffundebatur, incipiebat a fronte ad totum corpus. ad multum tempus prudenter res suas disponebat. ad meridiem uero ualde delirabat. & perfrigeratio similis erat. omnia uero circa corpus grauiora. Ad uesperam tibia ipsius ex cubili decidit, & puero praeter rationem minabatur, & rursus silebat, & ad quietem conuertebatur. Circa primum somnum sitis multa, & insania, & erecta sedebat, & praesentibus conuiciabatur. & rursus conticuit, ac in quiete erat. & uidebatur reliquum noctis sopore pressa esse. Verum oculos non clausit. Ad diem indicabat pleraque nutibus, corpore quiescens, & moderate intelligens. Sudor rursus eadem hora. similiter oculi demissi, ad infernam palpebram magis incumbentes, rigide ac stupide intuentes. albae oculorum partes pallidae & mortiferae. & totum corpus pallidum ac nigrum. manum plerumque ad parietem, aut ad stragula habebat. strepitus autem bibenti magni fiebant, respuebat, & sursum ad nasum absorbebat. & floccos legebat. & faciem obuelabat. Post sudorem manus uelut in glaciem congelatae. sudor sequebatur frigidus. corpus ad manum frigidum. exsiliabat, uociferabatur. insaniebat. spiritus multus. manus tremulae fiebant, sub mortem progressae iam etiam conuulsae. septima die mortua est. Sexta die in nocte stratum modice perminxit, quod minxerat de festucis detrahebatur, uiscosum, geniturae simile. Vigilabat per omnes dies. post sextam urina subcruenta.

Antiphanis filio hyeme, lateris dexteri dolor, tussis. febris. edebat, deambulabat etiam febriens. Videbatur ruptio facta esse. nona remisit. febris non reliquit. tussis multa. & crassa ac spumosa spuebat. latus dolebat. Circa decimam quartam & rursus uigessimam febres desinere uidebantur, & rursus corripiebant. erat autem calor tenuis, & parum quid relinquebat, Tussis quandoque deficiebat, quandoque

quandoq; abundabat, cū multa suffocatione, Tunc uero remittebat, & exscretio post hos dies multa, cum strangulatoria tussi. & purulenta supra uas effluentia ac spumantia prodibant. & in faucibus plerumq; stridula asperitas sublabat, anhelatio semper detinebat, & spiritus densior, raro bene spirabat. Ultra quadragesimū diem, prope sexagesimum opinor, oculus sinister excacatus est, cū tumore, sine dolore: nec lōge postea etiam dexter. & pupillæ ualde albæ ac siccæ fiebant, & mortuus est post excacationē, non progressus ultra septem dies, cum stercore ac multa deliratione.

Similia & ex similibus eodem tempore contigerunt etiam Thessalioni. feruentia, & spumantia, & purulenta. & tusses, & stridulæ asperitates.

Polemarchi uxori hyeme anginosæ tumor sub gutture. febris multa. uena secta est. cessauit strangulatio ex faucibus, febris comitabatur. Circa quintam genu dolor & tumor sinistri, & circa cor dixit sibi uideri aliquid colligi. & respirabat uelut respirāt, hi qui sub aquam mersi fuerunt, & ex pectore substrepebat, uelut qui concluso ore loquuntur, engastrimythi, quasi ex uentre loquentes appellati. Tale quid continebat. Circa octauam aut nonam ad noctē alius prorupit, ac liquida multa, aceruata & graueolentia egressit. uox interceptabatur. Mortua est.

Aristippus in superum uentrem uiolenter ac grauiter sagittæ ictu petitus est, uentris dolor uehemens. & breui ardebat. deorsum uero nihil egerebat, anxius erat, biliosa abunde colorata quum uomuisset, melius habere uidebatur. Paulo post dolores rursus uehementes. & uenter similiter ardebat, uelut in uoluulis, calores & sitis, in septem diebus mortuus est.

Neapolis percussus similiter, eadem passus est acri infuso per clysterem immisso, alius deorsum erupit, color per corpus diffusus est tenuis, pallidus, niger. oculi squallidi, stupore rigidi, intus conuersi, intente intuentes.

Ei qui in hepar percussus est iaculo, statim color qualis est mortuorum per corpus diffusus est, oculi caui, anxietas, molestia. Mortuus est prius q̃ concio solueretur, in qua die percussus est. Qui caput percussus est lapide à Macedonē, supra tempus dextrum, ita ut fissura saltem facta dissectio contigisset, uertigine affectus est & cecidit. Tertia die uoce destitutus erat, anxietas, febris non ualde uehemens. pulsus in tēporibus uelut tenuis calor, nihil audiebat, neq; sapiebat, neq; quiescebat, humiditas circa frontem, & sub nasum, usq; ad mentum. Quinta mortuus est.

Eniates in Delo iaculo percussus est retrorsum in latus, iuxta sinistram partem, ulcus quidem sine dolore. Verum tertia die uentris dolor paruus, non egerebat, infuso per clysterem immisso, stercus prodibat, & dolor deficiebat, sedes extra ad scortum extabat, quarta die etiam ad pubem, & totum uentrem, dolor uehemēter irruebat, quiescere non poterat, biliosa uomuit abunde colorata, oculi cum uirore pallidi, quales in animi deliquijs. Post quintam mortuus est. Erat autem calor quidam tenuis in ipso. Billo percusso in dorsum, spiritus multus per uulnus cum strepitu prodibat, & sanguinem fundebat. Verum deligatus emplastro cruentis uulneribus commodo, sanus euasit.

Contigit & infelicissimo Philes filio, denudatione in fronte facta, nona die febris. Deinde liuefactum est os, mortuus est.

Et Phaniæ & Evergetæ filio, liuefactis ossibus, & febricitantibus, cutis ab osse discelsit, & pus subtus depascebatur. His dum perforarentur, ex

ipso osse egressa est sanies tenuis, serosa, subpallida, graueolens, lethalis. Con-
tingit autem talibus etiam uomitus accedere, & ad finem conuulsiones: & ut
clangorosam uocem edant, ac impotētes fiant, & si in dextris fuerit uulnus, in
sinistra parte: si uero in sinistris, in dextra. Theodori filio nona die in sole
uersato, febris accessit decima die, ex denudatione iuxta os nullius momenti.
In febre uero denudatum est, discessit cutis. multum clangorosus erat. Vigesi-
ma secunda uenter eleuatus est maxime circa præcordia. Vigesima tertia mor-
tuus est. Quibus ossa fracta fuerint, his septima die febres. Si uero calidi-
us fuerit tempus, etiam citius. At si magis fracta fuerint, etiam euestigio.

Et Exarmodi famulus similiter dolorē habebat ad femur, non è directo uul-
neris, & factus est clangorosus. & colli erat dolor. Et Posidocreon tertia
conuulsio. calor non relinquebat, mortuus est die decimo octauo. Isagora
filius percussus est retro in caput, contuso osse ac nigrefacto quinta die super-
stes euasit, os autem non discessit. Magnæ nauis gubernatori anchora di-
gitum medium, & os dextræ manus confregit, inflammatio successit, & mar-
cor, & febris, subpurgatus est, quinta calores moderate remiserūt, itemq; dolo-
res. de digito quid decidit. Post septimum diem sanies exibat leniter. Postea
per linguam dixit se non omnia posse enunciare. Prædictio facta est opistho-
tonum aduentare. Ad hoc conferebant maxillæ consertæ, & ad collum rigi-
dæ. Tertia die totus conuellebatur in posteriorem partem, cum sudore. Sed à
prædictione mortuus est. Harpali filius ex liberta Telephane, luxationem
infra in pede magni digiti accepit, inflammatus est, & ualde dolorosus erat.
& ubi repositus est, & dolor remisit, proficiscebatur ad agrum, rediens lumbos
doluit, lauit, maxillæ ad noctem conserebantur, & opisthotonus aderat, sali-
ua spumosa uix per dentes foras prodibat. Tertia die mortuus est. Thri-
non Damonis filius, habebat circa tibiam aut malleolum ulcus, iuxta neruum
iam purum. Huic à pharmaco corroso contigit, ut opisthotono moreretur.

Menoni sub arcturum & prius, ex febre æstiuā, & alui profluuiū ægre as-
fecto, & ex itinere delassato, dolor lateris sinistri, & tussis, quæ ex destillatio-
ne quidem etiam prius aderat, uerum tunc ualde intenta erat, & uigilabat, &
febrem statim ab initio ægre ferebat, & erectus sedens tertia die spuebat palli-
dum, arteria ex stertore subsibilabat. Circa quintam spiritus moderate densus,
pedes, tibiæ, extremæ partes plerunque frigidæ, & extra stragula, alui egestio
ab initio fiebat biliosa, neque ualde modica, neque multa. septima, octaua, &
nona, leuius ferre uidebatur, & somni aliqui contingebant, & quæ excreabat
crudiora erant. decima, & usque ad decimam tertiam, alba & pura, & præcor-
dium mollius fiebat, sinistrum tamen distentum, & melius spirabat. Subdita
glandē moderate aluus subiit. Decimatertia rursus pallidum spuebat. Decima
quarta magis. Decima quinta prasinum. Aluus autem maleolentia, biliosa, li-
quida, multa demisit. Sinistrum præcordium eleuabatur. Decimasexta autem
etiam ualde intumuit, & spiritus iam stertorosus. sudor circa frontem & cer-
uicem, raro ad pectus, extremæ partes, & frons, leniter permānebant frigidæ.
Saltatio uero uenarum circa tempora detinebat. Somni soporosi noctem ac
diem postremo tempore. Urina ab initio cruda, cineris speciem referens. Circa
decimam

decimam, & usque ad decimamtertiam tenues, & non decolores. Verum à decimatertia quales ab initio. Cleocho lateris dolor & febris. remisit febris. sudauit per totum corpus. In urina multa erant quæ ferebantur ac innatabant. postea turbata est. Circa Pleiadum occasum Olympiadæ uxorem, foetum octimestrem gestantem, ex casu febris acuta corripuit. lingua æstuosa, sicca, aspera, pallida. oculi pallidi. & corpus mortiferum. foetum corripuit quinta die. facile liberata est. & somnus ut uidebatur soporosus. uesperī excitantes non sensit. sternutatoriū adhibitum percepit. potionem suscepit & succum, deglutiens potionem aliquantum tussiuuit. uox non soluebatur, neq; ipsa quicquā alleuabatur ex morbo. oculi tristes ac submissi. spiritus sublimis per nasum trahebatur. color prauus. sudor circa pedes, & crura, ubi iam morti propinqua esset. mortua est. Nicolai cōcubinæ ex febre ardenti, abscessus iuxta aurem fiebant ab utraq; parte, paulo posterius alter, quum iam febris remittere uideretur, uelut tumor laxus. Circa decimum quartum magni citra signa sedati sunt. recidua facta est. Color qualis mortuorum. lingua aspera, ualde densa, subalbida. Siticulosa. alui egestio deorsum multa, liquida, male olēs per omne tempus. Ante finem corruptum est corpus, præ multitudine egestionis. Mortua est circa uigesimum diem. Andrean ante pleiadem horror, febris, uomitus. Ab initio semitertiana apparebat. Verum tertiana erat. Quum rursus in foro uersaretur, inhorruit. febris acuta, uomitus bilis meracæ. delirium ad noctem. quarta rursus melius habebat. Quinta difficulter. Sexta à mercuriali probe egeffit aluius. Septima difficilior. & sequentibus iam diebus febris magis continenter affligebat. & sine sudore ab initio, & siticulosus. Maxime uero os resiccabatur, & potionem nullam libenter admittebat, quum multa iniucūditas circa os esset. lingua sicca, inarticulata, asperitas efflorescebat, cum pallore albicans. Vigilantius. exolutus. fractus. lingua præ siccitate quādoq; subblæsa, donec madefecisset. succū maxime admittebat. Nona aut decima circa aurē sinistrā, atq; etiā alterā, tumores parui citra signa apparuerūt. Vrinæ semper non decolores, uerū sine subsidencia. Decimaquarta sudor circa supernas partes non multus, sed moderatior. Calor circa decimamseptimam euauit. Aluius post decimam sicca, citra glandem subditam non egerens. Circa uigesimam quintam pusulæ per totum corpus pruriginosæ calidæ, uelut igne ambugta. Dolor autem erat circa locos sub alis, & latera: transiuit ad crura citra signa, & desiuuit. Balneum proderat & unguenti illitio cum aceto. Mense uero secundo aut tertio fortassis, ad rhenes dolor, qui etiam antea quandoq; fuerat, sedatus est. Aristocrati circa solstitium hybernum lassitudo; & horror, & calor. Postea tertia die incepit lateris dolor itemq; lumborum. & tumor sub alis initium sumens, per totum dextrum latus durus, rubicundus, liuidus, uelut ab igne calefactus & inustus. anxius. omnia moleste ferens. ualde siticulosus. lingua subalbida. Vrinæ non procedebant. crura subfrigida. alui egestio à mercuriali modica, liquida, subalbida spumosa, ad noctem spiritus eleuabatur. sudor circa frontem. partes infernæ frigidæ. collum inflabatur. tussis non inerat. mortuus est prudens. Onesianacti circa autumnū lippitudo. postea uero febris quartana. Incipiente quartana cibos ualde auersabatur, in progressu uero libenter accipiebat. Sed & Polychari in quartana, similia circa cibum accidebant.

Mnesianacti alui egestio ante febrē, et postea, ad multū tempus sequebatur, multis albis mucosis prodeuntibus : & quandoq; pauco sanguine, citra dolorem. Strepitus autem in uentre. Post febrē abscessit circa sedem tuberculum durum, quod multo tempore incōcoctum comitabatur. erupit ad intestinum, & foris fistulosum fiebat. Deambulante uero ipso in foro, splendorēs prae oculis obuersabantur, & solem non ualde uidebat. Quum autem parum discessisset, extra seipsum erat. & collum conuulsum est. Postquam autem domum deportatus est, uix suspexit, & ipse uix sui ipsius erat. Primum autem collustrabat circumstantes. & corpus perfrigeratum est. uix uero recalfactus est utriculis & fomentis adhibitis. Postquam autem ipse intra seipsum esset, & exurgeret, non uolebat exire, sed timere dixit. Si uero quis de grauib; morbis discerneret, subducebat se prae timore. Quandoque etiam caliditatem sibi ad præcordia allabi dixit, & oculorū splendorēs comitari. & alui egestio multa, & saepe, & similis hyeme contigit. facta est uenæ sectio, datum est ueratrū. bibit lac bubulum, prius autem asininum. cōtulit, & alui egestionēs sedauit. Aquæ potus ab initio, deambulationes quoq; & capitis purgationes. Anecheti filio hæc contigerunt. hyeme in balneo dum ungeretur ad ignem, calefactus est. & statim in comitiales cōuulsiones incidit. Postquam uero multæ factæ essent conuulsiones, circūspexit. non apud sese erat. quum autem intra seipsum esset, rursus postridie mane correptus est ac conuulsus. spuma non ualde. Tertia lingua inarticulata. Quarta per linguam significabat. Quinta loqui nō poterat, sed in principijs nominum hærebat lingua ualde. & cōuulsio fiebat. & extra sese erat. Quum uero hæc remitterent, lingua uix in suū statum restituebatur. Sexta abstinebat ab omnibus, & sorbitione, & potu. & à nulla amplius affectione corripiebatur. Cleocho ex lassitudinibus ac exercitijs melle per dies aliquot uententi, tumor ad genu dextrum obortus est. Immo potius ad infernam partem circa tendines sub genu. circumibat subclaudicans. & sura intumescibat, ac dura erat, & ad pedem, & ad malleolum dexterum. & tubercula ad gingiuas circa dentes magna, uelut uuæ acini, liuida, nigrefacta, doloris exortia, ubi cibum non caperet. Sed & crura doloris exortia erant, si nō exurgeret. Venit enim & ad sinistrum tumor, uerum minus liuescebat. In tumoribus circa genua ac pedes uelut suppurationes erant. Tandem uero fieri nō poterat, ut staret, aut calcaneis insisteret, sed in lecto decumbebat. Calores manifesti. quandoq; cibum auersabatur. nō ualde siticulosus. neq; ad sedem surgebat. anxius. & quandoq; etiam pusillānimitas tenebat. ueratrū exhibitum est, & capitis purgationes. Ad os pharmacum ex manna thuris, cum alijs ammixtis profuit. Ad ulcera in ore, sorbitio lenticulæ commoda erat. Circa sexagesimam sedati sunt tumores à secundo ueratro. dolores tantum ad genua decumbēti uenerunt. Humor autem & bilis abscessit ad genua, etiam pluribus diebus ante ueratrū. Pisistrato humeri dolor, & grauitas diuturna deambulanti & aliās sano. hyeme uero incidit multus lateris dolor, & calor, & tussis. & excreatio sanguinis spumosi. & in faucibus steritebat. Verum facile ferebat, & apud seipsum erat. & calor remisit, simulq; & excreatio, & stridula asperitas. & circa quartam aut quintam diem sanus. Simonis uxori in partu concussæ dolor circa pectus & latus, tussis, febres, excreationes purulentæ, tabes, ad sex menses febres. & alui profluvia

profluua semper. Ad finem febres cessauerunt. post cessationē substitit aluus. & post septem dies mortua est. Euxeni uxorem ex fomentis ut uidebatur, calores nullo tempore relinquebant. magis tamen ad uesperam augeſcebant. sudores fiebant per totum corpus. Febre ad augmētum tendente frigiditas pedum, quandoq; etiam tibiārū & genuum fiebat. tussicula sicca ad modicū tempus, febre exacerbari incipiente. deinde cessabat. per multum aut tempus etiam totius corporis rigor fiebat. Sitis exors semper. Vbi medicamētum bibisset, & serum, magis læsa est. Ab initio omnino sine dolore erat, & bene spirabat. Medio uero tempore lateris dextri dolor fiebat. & tussis commota est, & anhelatio. & excreationes paruæ albæ ac subtenues. & horror non amplius ex pedibus, sed de collo & dorso. & aluus liquidior. remisit febris cum multo sudore, & perfrigerata est. Anhelatio uero erat uaria. mortua est post remissionem septima die quum esset mente prudens. Polemarchi uxor æstate incepit febrere. dimisit autem ipsam febris sexta die. titubans obambulabat. ad noctem calores. Rursus interposito tempore corripuit febris, & non dimisit tribus ferme mensibus. tussis multa. excreatio pituitæ. Postquam uero uiginti durasset diebus, spiritus semper densus. in pectore strepitus. plerumq; sudor. mane febris mitior. & horrores quandoq; corripiebant. somni fiebāt. & aluus aliquando humectabatur, & rursus restitabat. moderate cibū gustabat. At medio tempore ad genua & tibias dolor. & ad flectendum ac extendendū alio opus habebat. Perseuerabāt crurū affectiones usq; ad finem iam propinquū. & intumuerunt pedes usq; ad tibias. & ad contactum dolebat. & sudores ac rigores desierunt. Febris autem semper intendebatur. Ante obitum aluus erupit. prudens permanebat. Tribus ante obitum diebus, in faucibus stertebat, & spiritus reuertebatur. Mortua est. Hegesipolis filiulus quatuor ferē mensibus dolorem circa umbilicum corrodentem habebat. Progressu temporis augebatur dolor. Percutiebat uentrem. uellicabat. calores corripiebant. contabescebat. ossa reliqua erant. pedes tumebant. Testes, uenter, partes circa umbilicum inflata. Num & quibus futurum est ut aluus exturbetur, cibum auersabatur. lac solum admittebat recens. & aluus liquida erat, & subcruenta sanies subibat, male olens: aluus ardebat. mortuus est ubi uomuisset modicū pituitosum, adeo ut quis genituram putasset. Plateæ filio ubi mortuus esset futura capitis ualde cauata est. Quum autem ægrotaret, semper manu sinciput contingebat, maxime morti propinquus. Non dolebat autem caput. & in femore sinistro sub inguen partes inferiores liuidæ. Testes autem graciles erant. Similia etiam Hegetoridæ filio. mortuus est. Præterquam quod uomitus plures sub obitum contigerunt. Hippix soror hyeme Phrenitica. mente aberrans. manibus negotium exhibens. lancinans seipsam. Quinta & sexta ad noctem uocē destituta, soporosa. inflans in maxillas & labia, uelut dormientes. septima mortua est. Osander ubi inhorruit, lateris dolor, & ad genua dolor, itemq; ad femur. ubi comedisset delyrabat. breui mortuus est. Cleotimo sutori alui uoliquē facta multo tempore, & calore oborto, iuxta hepar tumor tuberculosus ad imum uentrem descendit, & aluus liquida fiebat. & aliud ipsi tuberculum iuxta hepar sursum ad præcordium. mortuus est. Quibusdam capitis dolor uehemens cum calore: quibusdam quidem ad dimidiam capitis partem,

& secundum nares humor quidam decedit tenuis, aut maturus: aut ad aures: aut ad fauces ex capite securius. Quibusdam uero hæc sicca. At marcor uehemens periculosus est. Si uero affuerit anxiosus, aut biliosus uomitus, aut stupor oculorum, aut uocis interceptio, et raro quid loquitur, aut delirium, lethalia hæc sunt & conuulsoria. Quicumque uero ex destillatione dimidiam capitis partem dolent, & humore secundum nares decedente insuper febrierint leniter, in quinta aut sexta perfrigerantur. Echecrati cæco capitis dolor uehemens magis ad posteriorem partem, & colli quo loco connexio est, & ad uerticem procedebat. Progrediente tempore & ad aurem sinistra, & dimidia capitis pars dolorosa erat: mucosa semper procedebant leniter combusta, & calor comitabatur tenuis, & cibum auersabatur, in die melius habebat, ad noctem uero dolebat. Postquam autem pus per aurem erupit, cessauerunt omnia, erupit autem circa hyemem. Num & omnibus suppurationibus, & affectionibus circa oculum, dolores ad noctem? Quibus tussis hyeme maxime austro spirante crassa & multa exscreantibus, febres accedunt, leniter autem quinta die sedantur. Tussis uero circa quadragesimam, uelut Hegesipoli. Quibus calores multi quandoque sedantur, hi non per totum corpus, sed aut circa ceruicem, aut sub alis, aut capite sudantes liberantur. Chariti hyeme ex tussicula populariter grassante febris aduentans, acuta corripuit, stragula reiciebat, sopor cum dolore. Urinae erant rubrae uelut erui lotura, subsidencia statim ab initio multa, alba, postea etiam subrubra. Septima à glande subdita pauca prodierunt, sopor detinuit sine dolore, humiditas in fronte, somnus ad noctem, et calor mitior, octaua succum admisit, soporofus permanisit usque ad undecimam. Hac autem die etiam calor maxime cessauit. Postquam uero tussis erat, excretio perseuerabat semper multa, facilis, primum uiscosa, alba, crassa, postquam autem concocta esset, similis purulentis. Urinae ab undecima die puriores, subsidencia aspera, decima tertia dolor ad dexteram, usque ad lateris mollitudinem, ad imum uentrem. Urina suppressabatur. Potus callyphylli contulit. Decima quinta rursus dolor, decima sexta ad noctem magis dolor præcordij incipiebat ad uentrem, Mercurialis aqua subduxit, Calor intra uiginti euauit, & excreationes sequuntur sunt crassae. Melius habuit ad quadragesimum. Subpurgandi sunt uentres in morbis, ubi purganda matura fuerint: Inferni quidem, ubi confidisse uideris, signum habes si non anxij fuerint, neque capite grauati: & quum calores mitissimi, & quum post exacerbationes cessarint, Superni uero, in ipsis exacerbationibus. Tunc enim & hi eleuantur, quum anxij, & grauati supernis partibus fuerint, propterea uero in principijs purgandum non est, quoniam sua sponte in his temporibus expurgantur. In cubiti processu ex casu fauciato, cubitus marcore corruptus suppuratur, maturatione uero fiente, uiscosa sanies ac glutinosa exprimitur, & breui suppressitur: uelut & Cleogenisco, & Demarcho Aglaotelis filio. Similiter autem et ualde ex ipsodem pus nullum: uelut Aeschyli filio contigit. At ubi suppuratur plurimis horrores & febres accedunt, Alcmani ex rhenum affectionibus se recolligenti, & sanguine deorsum detracto, sursum ad hepar conuersus est morbus, & ad cor dolor uehemens, & spiritus præ dolore detinebatur, & aluus difficulter egerebat parua caprini stercoreis pilulis similia, anxietas non inerat. Verum rigor quandoque & febris corripiebat, & sudor, & uomitus, & in dolore

dolore non conferebat aqua marina per clysterē infusa. Verum fursurum decoctum infusum contulit. A cibo abstinuit ad dies septem. aquam mulsam meriorem bibit. postea lentis succum, quandoq; uero ex lenticula fresa decoctum. Inde bibit aquam. postea catulum coctum: & mazæ parum, quæ potissimū diu antea confecta esset. progressu uero temporis, aut ceruices bubulas, aut extremas partes suillas coctas, unā cum priore aquæ potu, quies, tegmē. ad rhenum affectionem infusum per clysterem ex cucumere syluestri. Parmenisci filio surditas. contulit clysterem auricularium non adhibere. Verum lana expurgare, & solum oleum, aut netopum infundere. deambulare. mane surgere. uinum album bibere. oleribus abstinere. pane & piscibus petrosis nutriri. Aspasii uxori dentis & maxillæ dolor uehemens. Castorium & piper colluens, ac in ore tenens, remisit. Et stillicidij urinæ affectionem ipsi sedauit farina cum rosaceo.

Capitis dolores ex utero sedat castorium. Plurimas uteri affectiones flatus faciunt, Signum sunt ructus, & strepitus circa uētem, & lumborum tumores, & dolores circa rhenes ac coxas. Ad hos autem confert, aromatū tertiam partē, faring duas, in uino odorato albo coquere, & linteolo illita cataplasmatismodo imponere, qua parte uentris dolores ab utero affligunt. Callimedontis filio contulit ad tuberculum, quod habebat in collo durū, & magnū, & crudū ac dolorosum, uenæ brachij sectio: & seminis lini torrefacti cataplasma, uino albo ac oleo subactum ac imbutū, ita ut neq; calidum, neq; ualde coctum deligatur, Aut cum aqua mulsā coquatur fœni græci, aut ordeī, aut tritici farina. Melissandro quum gingiua dolore corripetur, & uehementer intumesceret, sectio uenæ brachij, & alumen Aegyptium in principio sedabat.

Eutychidi ex cholericiis affectionibus, ad neruorum in cruribus distentionem defuiit, unā cum secessu deorsum. Bilem multā abunde coloratam uomuit ad tres dies ac noctes ualde subrubram. sub uomitū bibit. & impotens erat, & anxius. Nihil autem continere poterat, neq; ex potibus, neq; ex cibis. & urinæ ac transitus deorsum suppressio. per uomitus fex mollis prodijt, & deorsum quoq; erupit. Regio morbo correpto prodest laborare, sudare, panem edere, bibere non multū, lauare caput calida multa, sed potius tepida, uinum albū, somno non multo uti.

Calligeni circa uigesimum quintū ætatis annum de stillatio, tussis multa, quod defluebat per uim educebat. nihil infra persistebat. annos quatuor perseuerabat. Ab initio calores tenues fiebant. Veratrum non profuit, sed modicus cibus, & comprimi corpus, edere panem, bibere uinū nigrum, obsoniorum quorūcunq; esus, abstinentia ab acribus, salsis, pinguibus, succo silphij, oleribus crudis, multa deambulatio. Lactis potus non cōtulit, sed sesamum purum, crudum, acetabuli mensura bibere, cū uino molli. Timochari hyeme destillatio, maxime in nares. Quū Venere usus esset, resiccata sunt omnia. lassitudo, calor successit, caput graue, sudor à capite multus, defluebat autem & per totum corpus. Erat autem etiam sanus sudare aduersus. tertiā die sanatus est.

Cleomenis filius hyeme initio facto cibum auersabatur, & eius fastidio citra febrem uexabatur. & uomebat cibos ac pituitam. Duobus autem mensibus cibi fastidiū durabat. Coco in spina gibbositas facta est ex phrenitide. Huic nulla medicamenti potio contulit, Verum uinum nigrum, & panis esus, & balneorum abstinentia, & unctio, & frictio ab unctione, & fouere non

ualde, neq; multo fomento, sed leni. Quibus fluxiones in oculis tenues ac diuturnæ, si maturæ in nares processerint, profunt. Quibus prægnatibus ex casu, aut cōuulsione, aut plaga, dolores leniter fiunt, his in tribus diebus manifestum fit, an foetum corrumpet. Cuidam quæ circa uigesimalis ætatis annum biberat ultro pharmacū ad foetum perdendum, accidit dolor. uomitus biliosorum, multorum, pallidorū, prasinorum, nigrorū. Quum bibisset, tertia die cōuulsio corripiebat. linguam cōmandebat. Ad quartā diem ad ipsam ingressus sum. lingua nigrā, magna, oculorū albæ partes, erant rubræ. uigilabat. quarta mortua est ad noctem. Pythodes ægrotatibus aquam, & lac multa aqua ammixta dabat, & renutriebat. Perniones pertundere oportet, & calefacere, ita ut q̄ maxime excalefacias igne & aqua. Oculis incōmoda sunt lentacula, fructus pomorum dulces, & olera. Doloribus circa lūbos, aut coxam, aut crura, ex laboribus obortis, aquæ marinæ acetiq; calidum fomentum confert, ita ut uela spergas, uel spongiam his imbutam adhibeas. Deligare uero laniis oportet. Origanum potum, oculis & dentibus malum est. Puella quæ de rupe cecidit, uoce destituta. iactatio ipsam tenebat. uomuit ad noctē sanguinem. Quum ad sinistram aurem impegisset, amplius inde fluebat. & aquam mulsam difficulter deglutiebat. stertor habebat. Spiritus densus uelut morientium. Venæ circa frontem intētæ. decubitus supinus. pedes tepidi. febris multa, aliquando acuta. maxime expauescebat: septima uocē rupit. calores tenuiores erant. superstes euasit. Nisantides humeri dolorem habebat, in æstate obortum ex abscessu. profuit ipsi corpus & humerum in aqua marina madefacere, ad multum tempus: & per tres dies uinū album aquosum bibere, simul ut in aqua marina decumberet, ita ut & in ipsa urinam eijceret. Fullo in Syro phreniticus. quū moueretur cruribus tremulis. corpus uelut à culicibus compunctum. oculus magnus, motus breuis. uox fracta, sed clara tamen. urina pura subsidētiā non habens. Num propter alui ex thapsia egestionem, decima octaua die morbus remisit, euanescens citra sudorem? Nicoxenus in Olyntho similiter septima die uidebatur à morbo liber esse cum sudore. Sorbitiones assumebat, uinum, botrū ex sole. Decima septima die ingressus sum ad ipsum. lingua ardebat, calor forinsecus non ualde fortis. exolutio corporis uehemens. uox fracta, ut operosum esset exaudire, clara tamen. tempora collapsa. oculi caui. pedes molles ac tepidi. iuxta splenem distentio. Infusum per clysterē non ualde suscipiebat, sed resiliebat, prodijt stercus compactū modicum, & aliquid sanguinis, arbitror ab infuso. Vrina clara, pura. decubitus supinus. crura diducta ac disparata, ob exolutionem, penitus uigil. Intra uiginti dies calor euauit. Potus erat aqua de farina crassa in ipsa macerata, Sed & de pomis simulq; mali punici succus. & lentis torrefactæ, & farinæ lotura cocta, frigida, tenuis sorbitio. Superstes euasit. Fullonum inguina extuberant dura & sine dolore. & circa pubem ac collum similia erant tubercula magna. febris ante diem decimum: Tussi uexabantur à ruptionibus. Tertio mense aut quarto uenter colliquiuit. Calores successerunt. lingua sicca. sitis. egestionem deorsum malignæ. mortui sunt. Cholericæ bilis sursum ac deorsum eruptiones, ex carnis esu, maxime suillæ crudioris, & ex cicere, & ebrietate uini odorati ueteris, & insolatione, & ex sepijs, & locustis, & gammaris; & ex olerum esu, maxime porri & ceparum.

Insuper

Insuper & à lactucis coctis, et brásica, & rumícibus crudioribus: & à placentis ac dulcarijs & mellitis libis, & à fructibus pomorum, & cucumere pepone, & uino lactei teporis, & eruo, & polenta recēti. Cholericæ affectiones magis in æstate fiunt, & febres intermittentes, & quibus horrores accedūt. Hæ quandoq; malignæ fiunt, & ad morbos acutos perueniunt. Verum cauere oportet. Iudicat autem tales morbos maxime quinta & septima & nona dies. Melius tamen est cauere usq; ad decimā quartam. Pherecydæ post solstitium hybernum, noctu lateris dextri dolor etiam prius fieri solitus cessauit. pransus est, & egressus horruit, febris ad noctem, doloris exors, tussicula quædam sicca. Urina non multa, subsidencia multa. Ab initio ramētoſa, glabra, diuulsa: post dies quatuor turbulenta, subsidebant, & urina non decolor, subsidentiā habens, & collectio nō apparebat in matula, ubi perfriguisset. Tertiā diē aluus sua sponte egeſſit. Quarta subdita glande, stercoracea & biliosa prodierunt, fluxus erat liquidus. Somnus ad noctem non ualde. Verum interdū aliquantū dormiebat. Sitis nō uehemens. Quarta ad noctem maxime cutis circa frontem, & reliquū corpus mollis, semper superexcedens, febris uincebatur ad manū, & sub ea humescebat, pulsus in fronte ualde obscurus, uenarum grauitas in cōuersionibus, & in omnibus egestionibus ad modicum tempus, semper doloris exors, ab initio anxius, & paulatim uomebat. Septimā à glande subdita, egeſſit ter biliosum ac stercoraceum, liquidum ualde ac pallidum, & iam aliquantū delyrabat, & humiditas modice quandoq; circa frontē, stragula in faciem ducebat, oculos frustra uelut si quis uideret contrahebat, & rursus nictabat, & stragula reiciebat. Nona diē sudor mane obortus ad pectus, perseuerabat donec moreretur, & febris, & delyratio augescebat. Circa frontem sudor plurimus graueolens, color ualde albus, cutis sub pilis interpuncta, præcordium dextrū eleuatum, demisit à seipso biliosa. Octaua apparebāt uelut culicum morsus, ante mortem tussiendo reiecit uelut ex mucro fungos, cōpacta quædam, alba pituita circūdata. Exſcrearat autem et antea parua, alba, lactea, post coenam in somno horruit, mane surrexit, capite grauatus horruit, uomuit, capite grauabatur, ad noctem remisit, usq; ad meridiem leniter horruit, rursus noctem grauiter tulit. Sequenti diē febris acuta, capitis torpor, uomitus multæ bilis, quæ plurima præsina erat, cessauerunt omnia, somnus ad noctē, mane perfrigerabatur, sudor & humiditas per plurimam corporis partē, iuxta splenem manu indicabat ad modicum tempus collectionem doloris exortem, statim euauit, ad noctē uigil, circa fori tempus exacerbabatur febris, anxietas, uertigo, tormē, capitis dolor, uomitus prasinus, leuis, uiscosus uelut pituita, circa solis occasum cessauerunt omnia, sudor capitis, colli, post uomitū egeſſit per aluum stercoracea, liquida, biliosa, neq; nigra, neq; inconuenientia. Noctem moderate habebat, itemq; sequentē diē, ad noctem rursus uigil. Vomitus mane similiter & sequenti diē, citra anxietatē, dolores capitis post sudorem cessarūt, ad uesperam omnia remisērūt. Nona nō amplius uomuit, magis calefactus est. Reliquis nō uidebatur febrile. Venæ in temporibus saliebant, doloris omnino exors, sitis semper erat. Nona quum ad selam surrexisset ualde animo linquebatur, à glande subdita egeſſit ramēta nigra & biliosa colore, quantū stercoracei destillabat, uox fracta, in cōuersionib, grauis, oculi caui, cutis frontis circumtensa, alioqui bene spirabat, moderatus erat.

ad parietem plerūq; conuersus. flexibilis in decubitu, incuruatus quiescens. lingua alba, leuis. Circa decimam & postea, urinæ rubræ in circuitu, in medio exiguum quid albū. Duodecima ad glandem subditā, similia destillabāt biliosa & ramentosa. post glandem animi deliquiū. postea os resiccabatur. Colluebat semper. & si nō ualde frigida esset aqua, calidā esse dicebat. niuem leniter gustabat. fitis non inerat. stragula semper de pectore repellebat. Clamydem calefieri non sinebat. ignis procul, isq; paruus, utriusq; maxillæ rubor. postea lingua inarticulata. recalescebat unum aut duos dies. cessauit.

Androphani uocis interceptio. ignorantia. delyrium. His sedatis supererat multis annis, & recidiuæ fiebant. lingua permanebat per totum tempus sicca, & si collutione non uteretur, loqui non poterat: & plerūq; erat ualde amara. Aliquando etiam dolor ad cor. Venæ sectio soluit hæc. aquę potus, aqua mulsæ. Veratrū quoq; bibit nigrum, biliosum nō prodibat, sed modicū. Tandē hyeme decubuit, & extra se positus mēte motus est. & linguę affectiones similes. calor tenuis. lingua decolor. Vox peripneumonica. de pectore stragula reſciebat, & se educi iubebat, uelut micturum, quū nihil clare loqui posset, neq; apud seipsum esset. educēbāt ipsum. ad noctē mortuus est. duobus aut tribus diebus decubuit.

Nicanoris affectio erat, quū ad conuiuiū progrediretur timor tibicinæ: quū sub initium uocis tibiæ, in cōuiuiō tibia canere audiuiſſet. præ timoribus turbationes, uix se suffere posse dixit, quū nox esset. Interdiu uero audiens nihil cōmoueabatur. & hæc multo tempore ipsum comitabantur.

Damodes qui cū illo erat, cæcutire, & corpore exoluto esse sibi uidebatur: & sanè præruptū locum non accessisset, neq; trans pontē, aut minimæ altitudinis scrobem, ausus fuisset transgredi, præ timore ne caderet, sed per ipsum scrobem ibat. hoc ad tempus quoddā ipsi aderat.

Phoenicis affectio erat. ex oculo dextro plerūq; uelut fulgur elucere putabat. Vbi uero nō diu ipsum clausisset, dolor ad tempus dextrū uehemens oriebatur. postea etiam ad totum caput, & collum. caput intumescēbat retro ad uerticula, & distentio ac duricia erat circum tendines. Si itaq; conaretur cōmouere caput, aut aperire dentes, non poterat, utpote ualde distentus. Vomitus si quando oborti essent, relatos dolores auertebant, ac mitiores faciebant. & uenæ sectio profuit. & ueratrū duxit omnigena, & nō minime prasina.

Parmenisco etiam prius incidebant tristitiæ, & desiderium excedendi ē uitæ. quandoq; uero rursus lætus erat. At in Olyntho aliquando autumnī tempore, uoce priuatus decumbebat, quietem agens, ita ut parū saltem loqui conaretur, ac inciperet. Immo etiā si quid loquutus esset, rursus uoce destituebatur. somni aderant. quandoq; uero uigiliæ: & iactatio cū silentio, & anxietas. & manus ad præcordia uelut dolenti. Aliquando auersus iacebat quietē agens. febris perpetua. & facile spirabat. Postea dixit se cognoscere ingressos. Bibere quādoq; tota die ac nocte, etiam si potus exhiberetur, nō uolebat: quandoq; uero urna derēpēte correpta, omnem aquā ebibeat. Vrina crassa uelut iumētī. Circa decimā quartam remisit.

Cononis seruus ex dolore capitis incipiente, extra se mēte mota erat. & clamor. & querelæ multæ. raro autē quies. Circa quadagesimū diem mortua est. Decem uero diebus ante mortem, uoce destituta & conuulsa fuit.

Timocharis seruus ex atrabiliaris esse quum putaretur à tot ac talibus uiris, mortuus est similiter circa eosdem dies.

Nicolai filius circa solstitiū hybernū

bernium ex potationibus horruit. ad noctē febres. postridie uomitus biliosus, merus, modicus. Tertia die quū concio adhuc fori plena esset, sudor totius corporis cessauit. & statim rursus calefactus est. uomitus similis. Quarta ab aqua mercurialis egeffit stercoracea & liquida. Vrīna cineris specie, qualis est aqua mercurialis, non dissimilis, subsidentia non erat, neq; urina multa, pauca quædam in medio uehebātur innatantia, dolores præcordij sinistri & lumborū. Putabat se ex uomitu insuper respirare, & insuper respirabat, quādoq; dupla respiratione. lingua alba, habens ex dextra parte concretionem adnatam instar lupini. Parum siticulosus erat. uigil. prudens. Sexta dexter oculus maior dum uideret. Septima mortuus est. Verum aliū ante mortē eleuata fuit. & mortuo posteriores partes rubefactæ sunt. Metoni circa pleiadum occasum febris. lateris sinistri dolor usq; ad clauiculā, atq; is adeo uehemens ut quiescere nō posset. & inflammatio tenebat. alui egestio multa, biliosa. In tribus ferē diebus cessauit dolor. Calor autē circa septimū aut nonum. Tussis inerat, excreationes neq; biliosæ, neq; multæ fiebant, uerū pituitosæ. tussis comitabatur. cibos gustabat. quādoq; uelut sanus exibat. Corripiebant aut aliquando calores tenues modico tēpore. sudores fiebant ad noctē. Spiritus in calore densior. maxillarū rubor. circa latus grauitas, & sub alas, & ad humerum, tussis tenebant. medicamentū per superna eduxit biliosa. Tertia à medicamēto erupit pus, uerū ab initio morbi quadragesimā. repurgabatur circa triginta quinq; alios dies, et sanus euasit. Vxori Theotimi in semitertiana anxietas, & uomitus, & simul horror incipientē febre. & sitis. progrediente tempore incipiēte febre calor ingens. Vbi aquam mulsam bibisset, & uomisset, et horror, & anxietas sedata sunt. & mali punici succū postea accepit. Diopithis sorori in semitertiana, cordis dolor grauis circa accessione, & comitabatur is totam diem. & huiusmodi cordis siue oris uētriculi dolor etiā alijs similiter aderat. Verūtamen sub pleiadis occasum uiris talia rariora fiebant. Vxori Apomoti in semitertiana circa arcturū, uehemēs cordis dolor circa accessione. & uomitus. & strangulationes ab utero simul instabant, & ad dorsum dolores iuxta spinā. Quum aut huc ipsi peruenerent, cordis dolores cessabāt. Terpidæ matri à Dorisco, quum abortus factus esset mense quinto gemellorū, ex casu, ab altero quidem statim, uelut in tunica quadā liberata est. ab altero uero prius aut posterius quadraginta diebus. Postea autē concepit in uentre. At anno nono dolores uehementes circa uentrem ad multū tempus, quandoq; incipiebāt ex collo ac spinā, cōsidebant autē ad imum uentrem & inguina: quandoq; ex genu dextro, cōsidebant autem ad eundem locū. Et quum quidem iuxta uētre dolores essent, aluius eleuabatur. quū uero sedarētur, cordis dolor coincidebat. Verū strangulationes non aderant. Sed frigiditas corporis, uelut in aqua iacētis. Tempore quo dolor fiebat, per totum corpus dolores spargebātur, mitiores his qui ab initio erant. allium, silphiū, acria omnia nō cōferebant, neq; dulcia, neq; acida: neq; uina albā. Verum nigra, & balnea rara. Ab initio quoq; uomitus uehemētes fiebant, & ciborum exclusiones. & circa dolores menses non apparebant. Cleomenis uxori circa fauonij flatus, ex nausea & lassitudine, lateris sinistri dolor, ex collo ac humero auspicatus. febris & horror, & sudor. Inccepit autē febris, & nō desit, sed augefcebat, & dolor uehemens, tussis, excreatio subcrūeta, pallida, multa,

lingua alba. alui egestionē moderatā, liquidā, urinā biliosā. Quarta ad noctē menses prodierunt multi. cessauit & tussis, & excreatio, & dolor. calor autem tenuis. Epicharmi uxori ante partū dysenteria. dolor. alui egestionē subcruētā, mucosā. Vbi peperisset, statim sana erat. Polemarchi uxori in morbo articulari coxæ dolor derepente, mensibus non prodeūtib. Vbi betæ succum bilisset, uox supprimebatur per noctem, & usq; ad meridiem. attramen audiebat, & sapiebat, & manu significabat, dolorem esse circa coxam. Cliniae forori seniori uomitus, quicquid accepisset per quatuordecim dies, citra febrem. cruentorū uomitionum reiectiones. & cōtracta strāgulatio ad cor procedebat. Castoriū, feseli, mali punici succus, sedauerūt omnia. abscēdit autē dolor moderatus ad lateris mollitudinē. bulbi succus. & uinū lactei teporis, austerū. & panes q̄ paucissimi cū oleo. Pausaniæ filiam ex fungi crudi esu, anxietas tenebat. strāgulatio. dolor uentris. Aquā mulsam calidā bibere ac uomere profuit, & balneum. In balneo fungum euomuit. & ubi illa cessatura essent, exsudauit.

Epicharmo circa pleiadum occasum, humeri dolor, & grauitas uehemens ad brachiū. anxietas. uomitus multi. aquæ potus. Euphranoris filio pustulæ uelut à culicum morſu. Post fauoniū siccitates fiebant, usq; ad æquinoctium autumnale. Sub canem, æstus uehementēs, & uenti calidi, & febres sudorificæ. & statim aliquantū recalescebant. Tubercula uero iuxta aurem multis fiebant. Aniculæ à tussi uexatę circa nonā diem. Adolescēti splenico ancillæ filio, aluo liquefacta, circa idem tempus. Ctesiphonti sub arcturū, ferē circa septimam. Adolescenti solū suppurata sunt. Eratylli filio euauerūt. Circa utraq; tempora, nullæ exudationes. lingua præ siccitate blæsi. Recti uenti spirauerūt multi ac frigidi. & niues ex clementi cœlo quādoq; fiebāt, & post æquinoctiū, austrina aquilonaribus permixta. aquæ multę. populariter grassatæ sunt tussēs multæ, magis autē in pueros. Circa aures multis talia, qualia Satyri habēt. Quādoq; uero antē hoc tempus hyems ualde hyberna erat, cū niue & pluuijs aquilonaribus. Timonactis filio fermē bimestri pustulæ in cruribus, & in coxis, & lumbis ac imo uentre. & tumores ualde rubicundi. His autē sedatis, conuulsionēs & comitiales fiebant, sine febribus, multis diebus. & mortuus est. Polemarchi filio contigit quidē ut priore tempore suppuratus esset, & excrearet, postea uero calores ipsi erant. & hydropicus erat, & splenicus, & anhelosus. ad locum accliuem si quando accederet, impotens. & siticulosus. quandoq; etiam cibum leniter auerſabatur. & siccæ tussiculæ ad multū tempus ita fiebant. titubans obambulabat. & si nō facile solubilis esset aluus deorsum, plena reddebatur. & anhelatio ac strāgulatio magis fiebant. Tandem autem defluxus & excreatio superuenit, ac tussis. Excreatio crassa, pallida, purulenta. & febris uehemens cessasse uidebatur. & tussis mitior. & excreatio pura. Rediit rursus febris acuta. spiritus densus. mortuus est. Verū antea riguerunt pedes, & postea perfrigeratus est. Spiritus magis interclusus est. Vrīna substitit. extremæ partes perfrigeratæ sunt. prudens mortuus est, tertia die à recidiua. Thyni filio in febre ardente inedia macerato, alui egestio multa. Verum cum bile, & animi deliquio, & sudore multo fiebat. perfrigeratus est ualde. & uoce destitutus erat totam diem ac noctem. Instillatum pīsanæ succum continuit, sapiebat. bene spirabat. Epicharmi filio accidit ex uia & potu cruditas. Postridie mane

anxietate oborta, ubi aquā, acetū, salem bibisset, euomuit pituitā. Postea rigor apprehendit, lauit febricitans. Pectus dolebat. Tertia mane statim sopor modico tempore tenebat, & delirabat, & febris acuta. grauius morbum tulit. Quarta uigil, mortuus est.

Aristoni ulcerato pedis digito, cum febre loquelae obscuritas. Carcinoma ascendit usque ad genu, periit. Erat autem nigrum, subaridum, graueolens.

Cui carcinoma in faucibus ustum est, sanus euasit a nobis. Polyphantus in Abderis caput dolebat in febre uehementi. Vrinae tenebrae, multae. Subsidentiae densae & conturbatae. Quum autem non cessaret dolor capitis, sternutatoria decima die adhibita sunt. Postea ad collum dolor uehemens. Vrina prodijt rubicunda conturbata uelut iumentum, mente motus est phrenitico modo. Mortuus est in uehementibus conuulsionibus.

Consimiliter etiam Eualcidae famula, quum multo tempore densae urinae prodijissent, & capitis dolores adessent, phrenitica facta mortua est, eodem modo ex uehementibus doloribus. Nam urinae densae ac conturbatae, certum signum sunt doloris capitis, & conuulsionis, ac mortis.

Halicarnassensis qui in domo Xanthippi diuersa fabatur, aurem hyeme dolebat, & caput non mediocriter. Erat autem annorum circiter quinquaginta. Vena secta est iuxta Mnesimachum. laesum est caput euacuatum, ac perfrigeratum. Non enim facta est suppuratio. Phreniticus factus est, & mortuus. Vrinae erant & huic densae.

In Cardia Metrodori filio ex dentium dolore corruptio maxillae, & gingiuarum uehemens carnis excrecentia, mediocriter suppuratio facta est, exciderunt dentes molares, & maxilla. Anaxenor in Abderis, erat quidem splenicus, & uiciati coloris. Contigit autem ipsi ut tumor circa femur sinistrum obortus, derepente euanesceret. Non multis uero postea diebus oborta est ipsi circa splenem uelut pustula nocturna ab initio, insuperque tumor ac rubor durus. Post diem quartum febris ardens oborta est, & liuefacta sunt omnia circumcirca, & putrida uidebantur. mortuus est. Venter prius subpurgatus est, & intelligentiam habebat. Clonigus in Abderis, erat quidem nephriticus, mingebat autem sanguinem paulatim plerumque diffusius. Vexabat etiam aluus dysenterica. Huic mane quidem dabatur lac caprinum, & aquae quinta pars, ita ut ex ambobus compositum totum essent heminae tres. Ad uesperam autem, panis ualde assatus, obsonia, beta aut cucumis, Vinum nigrum tenue. Dabatur etiam cucumis pepo. Hac uero uictus ratione quum ueteretur, & aluus substitit, & urinae purae prodibant. Bibit autem lac donec urinae restitutae sunt.

Mulieri in Abderis carcinoma factum est circa pectus, erat autem tale. per papillam sanies subcruenta fluebat, intercepta autem fluxione, mortua est.

Dini filio in Abderis umbilicum mediocriter fauciato, fistula parua relicta est, & quandoque etiam lumbricus per seipsum satis crassus penetravit. & quum febriret, uomebat biliosa. quandoque uero & haec ipsa per fistulam prodibant. Allapsum est & intestinum ipsi ad fistulam, & uelut fistula corrodebatur, & rursus refringebatur. & tussis permanere prohibebant.

Pythionis filio in Pella febris statim incepit multa. & in somnum collapsio. & cum uocis interceptione somni fiebant. & aluus dura per omne tempus. At glande ex felle subdita, multa egerebat, & statim remittebat. Verum breui aluus rursus eleuabatur. & febris exacerbabatur. & collapsio in somnum per eadem. Quum autem idem ductus esset, datum est medicamentum quoddam ex his

quæ cnico, & cucumere syluestri, & peplo constant. & biliosa egestio erupit, & statim sopor sedatus est. & febris mitigabatur. & omnia leuiora facta sunt. & iudicatus est die decimaquarta. Eudemus splenem uehementer dolebat. imperarunt ipsi medici ut multū ederet, & uinum biberet modicū, tenue, & multum deambulet. nō mutātū est quicquā. Vena secta est. cibos ac potus parce sumpsit. deambulationes fecit sensim augmēto facto. Vinū bibit nigrū, tenue. sanatus est. Philistidi Heraclidę uxori cœpit febris acuta. rubor faciē, ex nulla manifesta causa. paulo post in die rigorem habuit. quum nō recalesceret, conuulsio facta est in digitis manuum ac pedum. paulo post recalescē facta est. minxit urinas compactis quibusdam innatantibus, nubeculosas, diuulsas. noctem dormiuit. Secunda die rursus riguit. paulo magis calefacta est. & rubor minor. & conuulsiones fiebant moderatiores. Vrinę consimiles. noctem dormiuit. parum uigilauit, quum nulla molestia premeretur. Tertia die minxit coloratiora, modicam subsidentiam habentia. eadem hora rigor apprehendit. Febris acuta. sudor ad noctem per totum corpus. Verum uesperī color ad morbi regij modum permutatus est. noctu dormiuit ac per totum corpus sudauit. Quarta sanguis ex sinistra nare probe fluxit. & menses pauci comparuerūt ordinate. Rursus autem eadem hora febris exacerbata est. Vrinę compactis quibusdam innatantibus pauca. Alius natura quidem dura, uerum multo magis substitit, neq; quicquam prodibat, si non glandem subdidisset. noctem dormiuit. Quinta febris mitior. & ad uesperam per totum corpus sudabat. & menses prodierūt. & noctem dormiuit. Sexta minxit acruatam multam urinam, compactis quibusdam innatantibus, modicam subsidentiam habentem, cōcolorem. Circa meridiem uero parū rigore tenebatur. aliquantum incaluit. sudauit per totum. noctem dormiuit. Supina parum calefacta est. facile tulit. sudauit per totum. urinq; boni coloris. Iudicata sunt omnia. Tychon in obsidione circa Datum, ictus est catapulta in pectus. & paulo post risus erat circa ipsum tumultuosus. Videbatur autem mihi medicus eximens lignum, reliquisse ferrum in septo trāuerso. & quum ipsi ita uideretur, ad uesperā infusum per clysterē adhibuit, & pharumacum deorsum purgans dedit. Noctem primā transegit. Statim uero ubi dies illuxisset, & medico, & alijs, melius habere uidebatur. erat enim quietus. Prędictio facta est quod ubi conuulsio fieret, non tarde moriturus esset. Sequentem noctem moleste ferens. insomnis. plerumq; in uentrē decumbens. Tertia mane conuellebatur. Circa meridiem mortuus est. Eunuchus ex uenatione & discursu hydropicus factus est. Quidam circa Elealcis fontem, ad sex annos habuit ex equitatione, inguinum tumorem, uarices, & coxendicum dolores.

Qui lateris mollitudine tabuit, septima die mortuus est. Præpotent crudi falsa cum melle. Scortatio turpis, dysenterię medela est. Leonidæ filiæ natura concitata, auersa est: auersa, in iram excanduit: ubi ira excanduit, reconciliata est. Medicus nō intellexit. puella mortua est. Philotimi filius puer uenit ad me in lechina, caluariæ os habens medicina destitu-

tum: in quo uidebam occultas ratiocinationes non esse constantes.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE VICTVS RATIONE IN MORBIS

acutis, Iano Cornario Medico Physico
co interprete.

VI Cnidias appellatas sententias conscripserunt, recte quidem scripserunt ea quæ patiuntur ægroti in singulis morbis, & quomodo quædam ipsorum euenerunt: & hætenus quidem etiã qui medicus non sit, recte conscribere possit, si probe ex singulis ægrotis quæ patiuntur didicisset. Quæ uero medicum ante discere oportet, ægroti non referente, horum pleraque ommissa sunt, alia in alijs, & quædam ualde commoda ad coniecturam. Quum autem ad coniecturam dicatur, quo modo singula curare oporteat: in his multa aliter sentio, quàm uelut illi prodiderunt. Et non solum ob hoc non laudo. Verum quòd etiam paucis numero usi sunt medicamentis. Nam exceptis morbis acutis, plurima ab ipsis relata sunt pharmaca aluum deorsum purgantia exhibenda, & serum ac lac pro tempore. Si quidem igitur hæc bona essent, & morbis cõuenientia, in quibus exhibenda esse monuerunt: longe magis laudanda essent, eo quòd quum pauca sint sufficiunt. Nunc uero res non ita habet. Qui tamen postea eam tractationem repetiuerunt, magis sanè medico modo, de his quæ singulis exhibenda sunt transegerunt.

At neque ueteres quicquã memorabile de uictus ratione conscripserunt, & quanquam magna hæc res sit, eam omiserunt: attamen multos in singulis morbis modos, multiplice inque ipsorum diuisionem non ignorarunt aliqui.

Cæterum numeros singulorum morborum clare pronunciare uolentes, non recte scripserunt. Non enim facile sit enumerare, si ex eo quis ægrotantium morbum æstimet, quod alter ab altero aliqua re differt: & ideo non putet eundem morbum esse, si non idem nomen habeat: Mihi uero placet, ut in uersa arte mentem adhibeamus. Nam quæcunque opera bene ac recte tractat, ea singula bene ac recte facere oportet: & quæ cito, cito: & quæ pure, pure: & quæ citra dolorem tractare oportet, ita facere ut quàm minimus dolor sentiat: & alia omnia eiusmodi insigniter præ alijs ad meliorem modum transigere oportet. Maxime uero laudauerim medicum qui in acutis morbis, qui plurimos homines occidunt, præ alijs insigniter ad meliorem partem excellat. Sunt autem hi acuti, quos ueteres nominauerunt pleuritidem, peripneumoniã, phrenitidem, & febrem ardentem, & alij morbi qui ex his hærent, quorum febres omnino continuæ sunt, & occidunt. Quum enim non pestilentis morbi modus quis communis grassatus fuerit, sed sparsi fuerint morbi, & non similes, ab his morbis plures moriuntur, quàm ab alijs omnibus. Idiotæ igitur non ualde cognoscunt eos qui in his, alijs præstant: aliarumque curationum magis aut laudatores, aut uituperatores existunt. Et profecto magnum signum hoc est, quòd populares minime de his morbis intelligentiam habeant, uelut quos studio consequi oportet. Nam qui medici non sunt, medici esse uidentur, maxime propter hos morbos. Facile est enim nomi-

na edificere, quæ proferri solent apud ægros his morbis affectos. Si enim quis ptisanæ succum nominarit, & uinum tale, aut tale, aut etiam aquam mulsam, omnia hæc eadem plebeis hominibus, & meliores, & deteriores medici dicere uidentur. At res hæc non ita se habet, sed in his sanè uel maxime alij ab alijs differunt. Videntur autem mihi digna esse quæ scribatur maxime hæc, quæ ignorantur à medicis, maxime scitu cōmoda, & quæ magnas utilitates, aut magna detrimenta afferunt. Quæ itaq; ignoratur hæc sunt. Cur nam in acutis morbis, aliqui medici omne æuum terunt, ptisanas non colatas exhibentes, & recte se medicari putant. Aliqui uero plurimi faciūt, ut nullum ordeum æger deuoret. Magnum enim detrimentum asserere arbitrantur. Verum per linteum excolantes succum exhibent. Quidam uero ipsorum neq; ptisanam crassam dederint, neq; succum: atq; hi partim donec ad septimū diem æger perueniat, partim uero perpetuo, donec iudicatus fuerit morbus. Sanè huiusmodi quæstiones ne proponere quidem medici consueuerunt. fortassis autem neq; si proponatur, comperiantur. Proinde calumniam incurrit tota ars apud uulgus adeo magnā, ut neq; omnino medicinam esse putent. Nam in acutis morbis intantum inter se differunt artifices, ut quæ alter exhibet optima esse putans, ea alter iam mala esse existimet: & ferè ob id artem uaticinationi similem esse dixerint. Quia uates eandem auem, si sinistra appareat, bonam esse ducunt: si dextera, malam. Et in aruspicina talia sunt, alia in alijs. Verum aliqui uates cōtraria his dicunt. Asfero autem hanc speculationem pulcherrimam esse, & cognatā plurimis ac maxime commodis in arte. Nam ægrotantibus omnibus plurimum ad sanitatem confert, & sanis ad securitatem, & his qui se exercēt, ad bonum habitum, & ad quod quisq; uoluerit. Ptisana igitur recte omnibus frumentaceis edulij prælata esse uidetur, in morbis acutis, & laudo sanè eos qui ipsam prætulerūt. Nam uiscositas ipsius leuis est, & continua, & iucunda, & lubrica, & moderate humida, & sitim eximit, & facile eluitur. si forte & hoc opus sit: & neq; adstrictionem habet, neq; malam turbationem, neq; in uentre intumescit. Intumuit enim in coctura quam maxime tumesceri solet. Quicunq; igitur ptisana in his morbis utuntur, nulla die uasa uacua fieri permittant, ut ita dicam, sed utantur, & non intermittant, si non aut ob medicamenti, aut infusi per dysterem usum, intermittere oporteat. Et qui quidem bis in die cibum capere soliti sunt, eis bis danda est: qui uero semel edere consueuerunt, his semel primo die danda est. Verum sensim progressu facto, si fieri poterit, etiam his bis detur, si sanè opus habere uisum fuerit. At uero copia sufficit ab initio dare nō multa, neq; minus crassam: sed ut consuetudinis gratia quid ingeratur, & ut ne multa uasorum uacuatio fiat. Cæterum quod ad augmentū copię sorbitionis attinet, si quidē scior fuerit morbus, quam quis putarit, nō ita magna copia dare oportet, sed ante sorbitionem, aut aquam mulsam, aut uinum præbibendum exhibere, utrum ex his conuenientius fuerit. Vtrum uero conueniat, in singulis modis referetur. Si uero os humectetur, & à pulmone prodeūtia qualia oportet fuerint, sorbitionis copiam, ut in summa dicam, augere oportet. Quæ enim citius & magis humectantur, celeritatem iudicationis significant. Quæ uero tardius & minus, tardiores iudicationem significant. Et hæc quidem per se talia omnia non existunt. Verum multa quoque alia commoda omittuntur, ex quibus coniecturas

iecturas facere oportet, quæ postea referentur. & quanto copiosior purgatio fuerit, tanto plus dare oportet, usque ad iudicationem, maxime duobus à iudicatione diebus, quibus sanè quinta, aut septima, aut nona iudicare uidetur. ita ut etiam parium ac imparium dierum rationem habeas. Postea uero sorbitione quidem mane utendum est. Vespere uero ad cibos transeundum. Conueniunt autem talia ut plurimum his qui statim tota ptisana utuntur. Nam & dolores in pleuriticis statim sua sponte cessant, ubi memorabile quid spueri ac expurgari coeperint; & purgationes longe perfectiores sunt, & minus suppurati fiunt, quæ si quis aliter uictum suppeditet: & iudicationes simpliciores, & melius iudicantes, & minus reuertentes. Ptisanam porro ex optimo hordeo factam esse oportet, & quàm optimè coctam, & præsertim si non solo succo uti uelis. Nam una cum reliqua ptisanæ uirtute, lubricitas facit ut ordeum dum deglutitur non lædat. Nusquam enim adhæret, neque secundum thoracis rectitudinē moram trahit. Lubricissima autē est, & maxime sitim eximit, & facillime concoquitur, & debilissima est, quæ optimè cocta est, quibus omnibus opus est. Si quidem igitur non opem tulerit quis quantum opus est, ut sufficiens sit eiusmodi ptisanæ sorbitionis modus, multis modis lædetur. Etenim uerbi causa, quibus cibus intus conclusus est, si quis non facta deorsum euacuatione, sorbitionem dederit, dolorem si adest amplius exacerbauerit: & si non adest, statim induxerit. & spiritus densior fiet. Hoc uero malum est. Pulmonem enim resiccat, & præcordium, & pectinem, ac septum transversum dolore affligit. Quinetiam si lateris dolor assiduus est, & ad calefactoria non remittit, & sputum non prodit, sed citra putrefactionem ac concoctionem ualde uiscosum fit, si non soluerit quis dolorem, aut uentre mollito, aut uena secta, utrum tandem horum conducet: ptisana autem ita habetibus dederit, cita mors talium continget. Propter has igitur causas, & alias huiusmodi adhuc magis, qui tota ptisana utuntur, septima die & citius moriuntur, partim mente læsi, partim ab erectæ ceruicis spiratione, & stertore suffocati. Tales uero ueteres sydere ictos esse putauerunt, ob hoc quidem maxime, non minus autem quod et mortuis ipsis latus liuidum reperitur, ut simile quid plagæ appareat. Causa uero huius est, quod prius quàm dolor soluitur moriuntur. Cito enim anhelosi fiunt. Præ multo autē ac denso spiritu, uelut iam dictum est, ualde uiscosum circa concoctionem fit sputum, & egressum fieri prohibet. Immo stertorem inducit, chartilaginosi pulmonis arteriarum partibus bronchijs appellatis impactum. & ubi ad hoc deuenit, lethale iam plerumque existit. Nam & ipsum sputum impactum, prohibet quidem spiritum intro ferri, cogit autem cito extra ferri. Atque sic mutuam opem ad malum inter se conferunt, dum & sputum impactum, densum spiritum facit: & hic quum densus sit, sputum insuper uiscosum facit, & lubricum fieri, ac elabi impedit. Occupant autem hæc, non solum si ptisana intempestiue utantur: uerum multo magis, si quid aliud ederint, aut biberint, quod minus quàm ptisana idoneum sit. proinde plerumque consimilia sunt auxilia, & his qui tota ptisana utuntur, & his qui succo ipsius: his uero qui neutro horum, sed solo potu, quandoque etiam diuersimode auxiliari oportet. At uero hoc modo omnino facere oportet. Si cui à cibo recens accepto, & aluo nondum subeuacuata, febris incoepit, siue cum dolore, siue sine dolore, inhibenda est sorbitionis exhibitio, donec putarit

cibum ad infernam intestini partem secessisse. Utendum autem est potu acetū mulsi, si dolor affuerit, hyeme quidem calidi, æstate uero frigidi. Si uero multa fuerit sitis, etiā aqua mulsa, & aqua. Postea uero si dolor aliquis affuerit, aut periculosi aliquid apparuerit, danda est sorbitio neq; multa, neq; crassa, atq; hæc post septimū, aut nonum diem, si ualidus æger fuerit. Si uero nō subijt uetustior cibis ei qui recens cibum accepit, si quidem ualidus sit, & ætate uigeat, infusum per clysterem adhibendū est. Si uero debiliior fuerit, glande utendum est, si nō sua sponte probe prodierit. Tempus porro exhibendæ sorbitionis hoc maxime obseruare ab initio, & per omnem morbū oportet. Quum quidem pedes frigidi fuerint, inhibere oportet sorbitionis exhibitionē. Maxime uero & a potu abstinendum est. Vbi uero calor descenderit ad pedes, tunc exhibere conuenit, & putare in omnibus morbis, & nō minime in acutis, & maxime in his qui magis febriles ac periculosissimi sunt, tempus hoc magnam uim habere. Utendum est autem primū quidem maxime succo. Deinde uero ptisana, iuxta prædictas coniecturas diligenti facta consideratione. Cæterū pleuritis, hoc est dolor lateris siue ab initio fiat, siue postea, calefactorijs quidem primū non alienū est tentare dissoluere. Ex calefactorijs uero optima est aqua calida in utre, aut in uestica, aut in uase æneo, aut testaceo admotā. Verum molle quid antea ad latus supponere oportet, lenitatis ergō. Commode etiam spongia mollis, magna, ex aqua calida expressa apponitur. Cōtegere uero stragulis ipsum fomentū oportet. Nam & ampliore tempore sic sufficiet & durabit, & simul ut ne uapor ad egrotantis spiritum afferatur: nisi fortassis & hoc ad aliquid cōmodum esse uisum fuerit. Aliquando enim ad aliquid cōmodat. Insuper autem & ordeum, & eruum, in aceto diluto, ita ut paulo acidius sit q̃ ut quis bibere possit, dissoluta ac feruefacta, & in marsupia coniecta, apponere oportet: & furfur eodē modo. Siccum autem fomētum præbent sal & miliū torrefactum, in laneis sacculis conuenientissimū. Nam & leue, & lene est miliū. Soluit autem huiusmodi molitorium fomentū, etiam dolores ad clauiculam pertingentes. Sectio autem uenæ non similiter soluit dolorem, si non ad clauiculam pertingat dolor. Quod si ad calefactoria dolor non soluatur, nō multo tempore calefacere oportet. Resiccet enim hoc pulmonem, & suppurationē facit. At si quidem dolor ad clauiculam de se significationē præbeat, aut grauitas ad brachium, aut circa mammas aut supra septum transuersum: uenam secare prodest in cubiti flexura internā, & non cunctari copiosum sanguinē detrahare, donec multo rubicundior fluxerit, aut pro puro & rubicundo liuidus. Vtrūq; enim cōtingit. Si uero sub septo transuerso fuerit dolor, ad clauiculam autē de se significationē non præbeat, aluum mollire oportet, aut ueratro nigro, aut peplio, ita ut ueratro quidem dauicum, aut feseli, aut cuminū, aut anisum, aut aliud quid ex odoratis ammisceas, peplio uero silphij succum. Sed hæc inter se si misceantur, consimilis modi existunt. Ducit autem nigrum ueratrum melius, & ad iudicationē commodius q̃ peplium. Peplium uero flatus magis erumpere facit. Ambo autē hæc dolorem fedant. Sedant item alia multa aluum subducētia medicamēta. Verum hæc inter ea quæ ego noui optima sunt. Alioqui & ea quæ in sorbitionibus exhibentur aluum subducētia medicamēta opitulantur, quæcūq; non ualde iniucūda sunt, aut ob amaritudinē, at propter aliam quandam iniucunditatē, aut ob copiam

piam, aut colorem, aut aliquam suspicionem. Ptiſanā tamen ſtatim inſuper ſorbendam dare oportet, poſtq̃ medicamentum bibit, nō memorabili copia pauciorē, q̃ quanta ſumere adſuetus eſt. Nam & rationi cōſentaneum eſt, in media purgatione ſorbendā non dare. Quum aut̃ ceſſauerit purgatio, tunc minus ſorbeat de ea, q̃ adſuetus eſt. Poſtea uero reducat ſemper ad maiorē copiam, ſi & dolor ſedatus fuerit, & nihil aliud aduerſetur. Idem mihi ſermo eſt, ſi etiā ptiſanæ ſucco uti opus fuerit. Melius enim eſſe aſſero, ſtatim omnino incipere ſorbere, q̃ præuacuatis iam ualiſ ſorbere auſpicari, aut tertia, aut quarta, aut quinta, aut ſexta, aut ſeptima die, ſi ſanē nō iudicatus fuerit morbus ante hoc tēpus. Præparationes autē & hiſ conſimiles faciendæ ſunt, quales dictæ ſunt. De ſorbitionis igitur exhibitione ita ſentio. Sed & de potu, qualem cunq; tandē quiſ ex deſcribēdiſ ſumpturus eſt, eadem mihi penitus ſermonis ratio eſt. Noui aut̃ tem etiā medicos maxime cōtraria facere hiſ quæ fieri oportebat. Omneſ enim uolunt, ubi ſub morborū initia homineſ fame præmacerarunt, duobuſ aut tribuſ, aut etiā pluribuſ diebuſ, ſic ſorbitioneſ exhibere, itēq; potuſ : & fortaiſ ſiſ etiā par ipſiſ eſſe uidetur, ut magnā corpori mutatione ſiente, etiā magnū quid ualde contra obijciatur. Verum mutare quidē non parum, bene habet. Recte tamen mutatio transferenda eſt, & ex mutatione adhuc magiſ exhibitio eorū quæ per oſ ſumuntur. Maxime igitur lædi poterint, ſi non recte mutationem fecerint, hi qui tota ptiſana utuntur. Pōterint etiā lædi qui ſolo ſucco utuntur. lædi quoq; poſſunt qui ſolo potu utūtur. Minime uero hi. Oportet aut̃ tem & in ſanorum adhuc hominū uictu addiſcere quæ cōferunt. Si enim ſaniſ taleſ aut taleſ uictuſ multū differre uidētur, tum in aliſ quibuſdam, tum in mutationibuſ: quomodo nō etiā in morbiſ multū differāt, & maxime in acutiſ? Atqui facile eſt hoc addiſcere, quōd ſimplex uictuſ cibi ac potuſ, ipſe ſibi ipſi ſemper ſimiliſ, ſecurior omnino eſt ad ſanitatē, q̃ ſi quiſ derepente ad alium meliorē, magnam mutationē faciat. Nam & hiſ qui biſ in die cibum ſumunt, & hiſ qui ſemel, repētinaſ mutationeſ noxaſ ac ægritudineſ inducūt. & eoſ ſanē qui prædere nō adſueti ſunt, ſi praniſ fuerint, ſtatim inſirmoſ facit hoc, & toto corpore graueſ, & debileſ, & pigroſ. Si uero etiā inſuper cœnauerint, ac idum ructanteſ. Quibuſdam uero etiā alui liquida egeſtio oboritur, quū præter cōſuetudinē uentriculuſ grauetur, ſolituſ reſiccari, & nō biſ intumeſcere, neq; biſ cibos coquere. Auxiliatur igitur hiſ, mutationē ruruſ adæquare. dormire enim oportet uelut nocte reducta poſt cœnam, hyemē quidē, abſq; frigore, æſtate uero, abſq; calore. Si uero dormire non queat, ubi multam lentam deambulationē non ſtando oberrauit, nihil cœnet; aut pauca, eaq; innoxia. Inſuperq; minus bibat, & potū non aquoſum. Taliſ autē adhuc magiſ affligetur, ſi ter in die ad ſatietatē cibum acceperit, & adhuc magiſ ſi ſæpiuſ. Quanquam ſanē multi ſint, qui facile ferunt, ſi ter in die cibum copioſe accipiant, qui ita ſunt adſueti. Quin & hi qui biſ in die cibum capere ſoliti ſunt, ſi praniſ non fuerint, debileſ & inſirmi ſunt, & ad omne opuſ timidi, & uentriculi oſculum dolent. Viſcera enim pendere ipſiſ uidētur: & calidam ac cum uirore pallidam urinam mingunt, & alui egeſtio cōburitur. Quibuſdā etiā oſ amareſcit, & oculi caui ſunt, & tempora palpitant, & extremæ parteſ perfrigerantur. Et pleriq; ex hiſ qui praniſ nō ſunt, cœnam edere nō poſſunt. Si uero cœnā ſumpſerint, uentri-

culum grauāt, & multo magis ægre in lecto degunt, q̃ si etiam prān si fuissent. Quum igitur talia hæc sanis fiant, ob uictus dimidiæ diei mutationem præter consuetudinem: apparet neq; apponere, neq; detrachere cōmodum esse. Si igitur hic qui præter consuetudinem semel in die cibum accepit, ubi tota die uasa uacua fecit, quantū consueuit cœnauerit, uerisimile est ipsum, si tunc quum impransus esset doluit ac ægrotauit, & ubi cœnauit grauis fuit: multo magis grauari. Si uero etiam longiore tempore euacuatis uasis, postea derepente cœnauerit, adhuc magis grauabitur. Qui igitur præter cōsuetudinem uasa uacua fecit, ei hanc diem rursus adæquare sic conducit absq; frigore, & calore atq; labore. Hæc enim omnia grauiter tulerit. & cœna multo minor exhibenda est, q̃ consueuit, eaq; non sicca, sed modi humectioris. & postea bibat potum non aquosum, neq; pauciorē q̃ pro cibi ratione. Sed & postera die pauca prædeat, quo sensim progressu fiēte ad consuetudinē reuertatur. Qui tamen supernas partes amara bile infestantur, talia molestius ferunt. Pituitosi autem supernis partibus, cibi præter morem abstinentiā omnino facilius ferunt. Quare etiam semel in die cibum præter morem capere, facilius utiq; idem tulerint. Sufficiens igitur & hoc signū est, quod maximæ mutationes eorū quæ circa naturas nostras ac habitus contingunt, maxime morbos faciunt. Nō igitur licet intempestiue, neq; uehemētissimas uasorū uacuationes facere, neq; uigentibus morbis, & in inflammatione cōsistentibus, cibos exhibere, neq; licet derepente in tota re quicquam, aut huc aut illuc mutare. Multa uero his cognata, ex his qui uentri contingūt, itemq; alia referre quis possit, quod facile quidem ferunt cibos, quibus aduerti sunt, etiā si natura nō sint boni, Similiter etiam potus: ægre autē ferunt cibos, quibus aduerti nō sunt, etiam si nō sint mali, similiter etiam potus. & quæ quidem multus carnis esus præter cōsuetudinem assumptus facit, aut alliū, aut silphium, aut succus ipsius, aut caulis, aut alia huiusmodi, magnas quasdam peculiāres uires habentia, minus admiretur quis ubi talia dolores uentriculis magis q̃ alia inducunt. At iusta fuerit admiratio, si didiceris quantā maza turbationem, & molem, & flatum, & tormen uētriculo inducat, si præter morem ingesta fuerit, ab eo qui mazā edere nō est solitus: aut qualem sitim panis ipse calidus ingestus inducat, et repentinā repletionem, ob siccandi uim, & quod tarde transit: & q̃ diuerlas inter se affectiones faciant, & panes ualde puri, & qui ex toto sunt collati, præter cōsuetudinem in cibo accepti, itemq; maza sicca præter morem, aut liquida, aut uiscosa: & quale quid faciant polentæ recētes nō aduerti. & alia his qui recētib; uti aduerti sunt, itemq; uini & aquæ potus, præter morem derepente uicissim permutatus, & aquosum uinum, & meracū, præter cōsuetudinem derepente potatū. Illud enim humiditatē in superno uētre inducit, & flatum in inferno. Hoc uero uenarū palpitationem, & capitis grauitatem ac sitim. Quin & album uinū, & nigrū, si quis præter cōsuetudinem permutet, etiam si ambo uinosa fuerint, tamen multa in corpore alterarint, ut minus mirū esse quis dixerit, dulce & uinosum uinū non idem posse, si derepente permutata fuerint. Porro huiusmodi aliquā partem sermoni cōtrario patrocinarī oportet: quod mutatio uictus his facta est, corpore non mutato, neq; ad robur, ut cibos apponere opus sit, neq; ad debilitatē, ut detrachere oporteat. Insuper autē & robur coniectandum est, & morbi uniuscuiusq; modus, & hominis natura, & consuetudo.

consuetudo uictus ægri, non ciborum solum, sed etiam potuum. Multo autem minus ad additionem procedendū est. Nam detractionē omnino tollere sæpe conducit: ubi suffecturus est æger, donec morbi uigor mature scat. In quibus autem hoc faciendum sit, scribetur. Multa uero etiam alia relatis cognata scribere quis possit. Hoc tamē melius testimoniū est. Non enim cognatum est rei illi de qua plurimus à me sermo habitus est, sed ipsa res opportunissimū est documentum. Nam ab acutorū morborū initio, aliqui quādoq; eadem die qua morbus incepit, cibos comederunt: aliqui postridie: quidā etiam sorbuerunt quicquid oblatum esset, quidam etiam cyceonē. Omnia autē hæc deteriora quidem sunt, q̃ si quis alio modo uictū instituisset, multo tamen minus detrimentū afferunt in hoc tempore peccata, q̃ si quis primis duobus aut tribus diebus, penitus uasa uacua fecisset, et quarta aut quinta die, tali uictu usus esset. Deterius tamē est, si omnibus his diebus uasis euacuatīs, in posterioribus diebus hoc modo uictū instituat, prius q̃ cōcoctus ac maturus sit morbus. Etenim hoc modo mortem plurimis manifeste affert, si nō omnino facilis fuerit morbus. Quæ uero ab initio cōmittuntur peccata, non similiter, ut illa medelam omnē respuunt, sed multo facilius correctionē admittunt. Hoc igitur maximū documentum esse arbitror, quod primi dies sorbitione tali, uel tali, non sint priuandi, in his qui paulo postea talibus, aut talibus sorbitionibus usuri sunt. Funditus igitur ignorant, tum hi qui granosa ptisana utūtur, quod ab ipsa læduntur, quum sorbere inceperint, si duobus, aut tribus, aut pluribus diebus antea uasa euacuauerint: tum hi qui succo utūtur, quod sorbentes læduntur, ubi nō recte sorbitionē inceperint. Tunc tamen cauent, & magnam noxam afferre cognoscūt, si priusq̃ maturus factus fuerit morbus, granosam ptisanā sorbuerit æger, succo uti adfuetus. Omnia igitur hæc magna testimonia sunt, quod medici ægros nō recte ad uictum perducunt. Sed in quibus morbis uasa uacua facere nō oportet, his qui sorbitionibus uti debent uasa uacua faciūt. In quibus uero ex uasorū uacuatione, ad sorbitiones mutationē facere nō oportet, in his mutationē faciunt, & hoc plerūq; absolute. Aliquādo uero in his tēporibus mutationem ad sorbitiones faciūt ex uasorū uacuatione, in quibus sæpe ex sorbitionibus ad uasorū uacuationē accedere expediebat, si ita morbū exacerbari cōtingat. Aliquando autē & cruda attrahuntur de capite, & à thoracis regione, biliosa, & uigilia ipsi coīcidūt, ob quas nō coquitur morbus: & tristes ac amarulenti fiunt, & delyrāt, & splendores ipsis ob oculos obuersantur, & aures sonitu plenæ sunt, et extremæ partes perfrigeratæ, & urinæ incoctæ, & sputa tenuia, & falsa, & meraco colore tincta, ac pauca, & sudores circa collū, & anxietudines, & spiritus in latiorne sursum uersus offendens, densus, aut etiam ualde magnus, supercilia distenta ac grauata, deliquia animi praua, & stragulorū de pectore reiectiones, & manus tremulæ. Quādoq; uero labiū infernum concutitur. Hæc autē in principijs comparētia, uehementis delyrii significationē præbent, & plerūq; ægri moriuntur. Qui uero effugiunt, aut cū abscessu, aut cum sanguinis è naribus fluxione, aut ex crassi puris sputo effugiunt: aliās uero minime. Neq; enim taliū rerū peritos medicos esse uideo, quomodo debilitates in morbis dinoscere oporteat, & quæ ex uasorū uacuatione efficiūtur, & quæ propter aliam aliquam irritationem, & quæ propter dolorē, & præ acūmine morbi: itemq; quot affectiones, &

omnigenas species, natura nostra & habitus singulis pariat: & quidem quā talium cognitio, aut ignorantia, salutem aut mortē afferant. Maius enim malum est, si ob dolorem & morbi acumen debilitato, exhibet quis potū, aut sorbitionem copiosiorē, aut cibum, ob uasorū uacuationem debilem esse existimans. In decorum etiam est ob uasorū uacuationē debilitatum non cognoscere, & uictu premere. Afferit equidem periculum aliquod & hoc peccatū, uerum multo minus quā alterum. Multo autē magis risu dignū hoc peccatum est quā illud alterū. Si enim alius medicus, aut etiam idiota, ingressus cognouerit ea quæ contigerunt, & edenda ac bibenda dederit ea quæ alter prohibuit, palam auxiliū tulisse putabitur. Talia uero faciunt, ut artifices maxime ab hominibus uituperentur. Videtur enim ipsis ille qui ingressus est medicus aut idiota, uelut mortuū suscitasse. Scribentur autē de his quoque signa, ex quibus singula dinoscere oportet.

Consimilia tamen illis quæ circa uentrē contingunt, & hæc sunt. Nam si totum corpus præter cōsuetudinem multū quiescat, nō statim magis robustum fit. Si uero etiam ubi multo tempore quieuit, derepente ad labores prodierit, uictiosum quiddam palam operabitur. Ad eundem modū etiam singulæ corporis partes. Nam & pedes tale quiddam operabuntur, & alij articuli laborare non adfuerit, si interposito tempore derepente ad laborandū prodeat. Eadem etiam oculi & dentes perpetientur, & quæcunque tandem pars. Nam & lectus præter morem mollis dolorem inducit, itemque præter consuetudinem durus. Sed & si sub dio lectus præter morem sternatur, corpus indurat. Quin & talium omnium exempla scribere satius fuerit. Si quis enim accepto ulcere in tibia, neque ualde periculoso, neque adeo contemnendo, ita ut neque ipsi ita difficulter, aut adeo facile ulcera sanescant: statim prima ab initio die decubens curetur, & nequaquam crus eleuet, hic sanè hoc modo citra inflammationem fuerit, & sanus multo citius sic fiet, quā si obambulans curetur. Attamen si quinta aut sexta die, aut etiā prius surrexerit, & progredi uoluerit, magis utique affligetur ac dolebit, quā si statim ab initio obambulans curatus esset. Si uero etiam multum derepente se fatigauerit, multo magis dolebit, quā si illo modo curatus, in illis diebus ita se fatigasset. Perpetuo igitur hæc omnia inter se testimonium præbent, quod omnia quæ derepente multum supra modum huc & illuc mutantur, lædunt. Multiplex igitur in uentre læsio est, si ex multa uasorum uacuatione, plus moderato derepente ingeratur. Quin & in reliquo corpore, si ex multa quiete, ad ampliorem laborem derepente deueniat, multo magis lædatur, quā si ex multo cibo ad uasorum uacuationē transmutetur, & si ex multo labore derepente ad ocium ac segniciem exciderit. Oportet tamen & his corpus quiescere. Oportet item illis uentrē à ciborū copia quiescere. Sin minus, & dolorem in corpore inducet, & totius corporis grauitatē. Plurimus itaque sermo de mutatione huc atque illuc à me habitus est, eo quod hæc nosse ad omnia cōmodum sit, & ad hoc præsertim de quo nobis sermo erat, quod in acutis morbis ad sorbitiones mutationē faciunt ex uasorū uacuatione. Facienda enim est mutatio uelut ego iam iubeo. deinde nō est utendum sorbitionibus priusquam morbus maturus factus fuerit, aut aliud quoddam signū apparuerit, uel uacuatoriū, uel irritatoriū, circa intestinū, aut circa præcordia qualia scribentur signa. Vigilia fortis, potus & cibos crudos & inconcoctiores facit. Et rursus in cōtrariam partē mutatio

tatio, dissoluit corpus, & excoctionem ac capitis gravitatem inducit. Vinum porro dulce, & uinosum, & album, ac nigrū, & aquā mulsam, & aquam, & acetum mulsū, his notis distinguere oportet in morbis acutis. Vinum dulce minus caput grauat, q̄ uinosum, & minus mentē ferit, & magis q̄ alterum per aluum & intestinū subit. Viscera uero magnā facit, splenē & hepar. Quare neq̄ his qui amara bile abūdant cōmodum est. Nam & siticulosum in talibus est, & flatuosum in superno intestino: nō tamen inferno intestino inimicū pro flatu ratione, & quidem quū non ualde penetrēt flatu à uino dulci, sed circa præcordia moretur. Certē per urinam hoc minus exit omnino q̄ uinosum albū. Sputum uero magis educit dulce q̄ alterū. & quibus quidē siticulosum est dum bibitur, his minus q̄ alterum uinū educit. Quibus uero siticulosum nō est, his magis q̄ alterum educit. At uero album uinosum uinū, plurima ac maxīma ex parte iam & laudatum & uituperatū est, in dulcis uini enarrationē. Ad uescicam autem magis penetrat q̄ alterum: & quum urinam cieat, ac semper perrūpat, multum in his morbis profuerit. Nam & si ad alia incommodius sit altero, attamen quæ in uescica sit ab ipso purgatio, liberat, si quale oportet propellatur. Bonæ uero hæ notæ sunt de uini utilitate ac detrimento, quas seniores me non nouerūt. Fuluo uero uino, & nigro austero, in his morbis ad hæc uti poteris, si capitis grauitas nō affuerit, neq̄ mentis percussio, neq̄ sputū ab ascensu promouebatur, neq̄ urinā suppressa sit: alui autē egestionēs humectiores ac ramētiōres fuerint. In talibus sanē, uel maxīme cōueniēt ex albo transmutationē facere, & si qua his similia existūt. Hoc uero insuper intelligere oportet, quod faquosum fuerit uinū, supernas partes omnes, & eas quæ circa uescicā sunt minus lædet. Verum partibus circa intestinū magis proderit, si ineracius fuerit. Aqua uero mulsā si bibatur per totū morbum in acutis morbis, in totū quidem his qui amara bile abūdant, ac magnā uiscera habēt, minus cōmoda est q̄ his qui tales nō sunt. Siticulosa tamen minus est dulci uino. Pulmonē enim mollit, & sputū moderate educit, & tussim lenit. Habet enim uim quandam ex terforiā, quæ magis moderato sputū uiscosum facit. Vrinās etiā sufficiētē cieat aqua mulsā, si nō aliqua ex uisceribus affectio prohibeat. Sed & biliosa per aluū magis egerit, quandoq̄ bona, quandoq̄ magis q̄ conueniēt colore saturatā, ac spumosiōra: atq̄ hoc biliosis & magna uiscera habētibus magis cōtingit. Sputū igitur educationē, & pulmonis mollitionē, aquosior aqua mulsā magis facit. At spumosas alui egestionēs, & biliosa magis q̄ conueniēt coloratā, ac magis calidā, meraca aqua mulsā magis ducit q̄ aquosa. Talis autē egestio habet quidē & alia magnā nocumētā: Neq̄ enim ex præcordijs ardorē extinguit, sed concitat, & anxiam molestiam, ac membrorū iactationē facit. Verum & intestina & sedem exulcerat. Horum autē auxilia scribentur. Qui igitur aqua mulsā utitur, absq̄ sorbitionibus, pro alio potu, in his morbis, hic multū successum percipiet, & nō in multis successū destituetur. Quibus autē danda sit, & quibus non, & ob quas causas non danda, maxīma ex parte dictū est. Damnatā uero est aqua mulsā ab hominibus, uelut quæ bibētes ipsam extremē debilitet: & propterea mortē accelerare putata est. Verū hoc propter eos qui seipsos famē cōficere cōstituerunt dictū est. Aliqui enim aqua mulsā sola in potu utūtur, nimirum uelut talis existat. At hoc non omnino hoc modō se habet. Sed si sola bibatur, multo quidē fortior est, q̄ aqua, si non aluum exturbet. Sed & uino albo ac tenui, &

parum aquæ ferente, & inodoro, aliquatenus fortior est, aliquatenus debilior. Multū tamen differt & uini et mellis meracitas, ad utriusq; vires. Nam etiā si duplam mensurā uini meraci quis bibat, respectu mellis quod delingat, multo tamen fortior fuerit ex melle solo, si aluū nō turbarit. Nā & multo plus stercoris ipsi prodibit. Si tamē ptisanę sorbitione utatur, insuper aut aquā mulsam bibat ualde ipsum replebit ac flatus excitabit, & uisceribus circa præcordia incōmoda erit. At si ante sorbitionē aqua mulsā bibatur, nō ita lædit uelut si insuper bibatur, sed etiā aliquo modo proderit. Cæterū cocta aqua mulsā, aspectu quidē multo melior est q̄ cruda. Splendida enim & tenuis, albāq; ac pellucida fit: Sed quā ipsi uirtutē attribuam, qua crudā præcellat, nō habeo. Neq; enim iucūdius est q̄ cruda, si mel bonū esse cōtigerit, debilior tamē, & minus stercoris ducēs, quorū neutro ut castigetur aqua mulsā opus habet. Proxime uero utēdum tali cocta, si mel prauū fuerit, & impurū, & nigrū, & nō boni odoris. Coctura enim maiore partem turpitudinis prauitatis ipsius detrahare poterit. At uero acetū mulsū appellatū si bibatur, sepe quidē commodū esse in his morbis cōperies. Nam & sputū educit, & facilem spirationē facit. Tempora uero huiusmodi habet. Etenim quod ualde acre est, nihil moderati fecerit, ad sputa quæ nō facile prodeūt. Si enim educeret ea quæ stridulam asperitatē faciunt, et lubricitatē induceret, & guttur uelut dilataret, pulmonē utiq; leniret. Ipsum enim mollit. & si quidem hæc cōtingerent, magnā sanē utilitatē afferret. Aliquādo uero id quod ualde acre est, educationem sputi nō obtinet, sed insuper uiscosum id facit, & lædit. Maxime aut hoc perpetiūtur hi qui etiā aliās perniciose habēt, et qui neq; tussire, neq; excreare inherētia possunt. Ad hoc igitur vires agroti insuper cōiectare oportet, & si spem de ipso habeas, exhibere. Exhibere aut oportet si dederis, summe tepidū: atq; tale paulatim, & non large. Quod uero parū acre est, humectat quidē os & fauces, sputū item educit, & sitim sedat, & præcordio & uisceribus quę sunt hac parte lene est, et detrimēta ex melle hac parte prohibet. Quod enim biliosum est in melle castigat. Flatus etiā erūpere facit, & ad mictionē proritat. Intestini tamen infernā partem humectiore facit, & ramēta inducit. Quādoq; uero etiā malū hoc fit in acutis morbis, maxime quidē, q̄ flatum penetrare imò recurrere facit. Insuper aut et aliās debilitat, & extremas partes frigefacit. Atq; hanc solā læsionē ex aceto mulso cōtingere noui, quę sanē digna sit ut scribatur. Parū aut de huiusmodi potu, nocte & ieiuno ante sorbitionē præbendū dare cōmodum est. Sed & ubi multū tēporis post sorbitionē intercessit, bibere nihil prohibet. His uero qui solo potu degūt absq; sorbitionibus, propter ea nō est cōmodum semper et perpetuo hoc uti, maxime propter rasurā aut exasperationē intestini. Quū enim stercore uacuū sit, magis utiq; hæc induxerit: & quū uasorū uacuatio adsit, postea etiā aqua mulsā vires detraxerit. Si tamē opipulari apparuerit ad totum morbū multus huius potus usus, parū acetī affundere oportet, ut saltem cognosci possit. Ita enim & ea quæ lædere solet, minime læserit: et his quæ auxilio opus habēt, opē tulerit. Cæterū ut in summa dicatur, acredines siue aciditates ex aceto, amara bile abūdantibus magis cōferunt, q̄ atrabiliarijs. Amara enim dissoluūtur, & in pituitā transeūt, dū ab ipso attolluntur. Nigra uero fermentantur, & attolluntur ac multiplicātur. Acetū enim nigra sursum ducit. Mulieribus aut omnino magis aduersatur acetum, q̄ uiris. Dolo res enim uteri inducit. Aquæ porro potui in acutis morbis, nullū aliud opus habeo, quod attribuā. Neq; enim lenit tussim in peripneumonicis, neq; sputū educit

educit, sed minus quā alia, si quis semper aquæ potu utatur. Si tamē inter acetum mulsum & aquā mulsam, parū aquæ absorbeat, sputū educit, propter qualitatē potuū transmutationē. Inundationē enim quandā inducit. aliās autē nequē sitim sedat, sed exacerbat. Est enim naturæ biliosæ biliosa, et præcordio mala, imò pessima sit ac biliosissima, & vires maxime prosternit, ubi in uacuitatē ingressa fuerit. Sed & splenē auget & hepar, ubi inflāmatū fuerit, & fluctuat ac superinatat. Nā & tardi trāsitus est, eo quod frigida est & cruda ac incoctilis, & nequē per aluū secedit, nequē per urinas trāsit. Insuper autē & propterea læsionē inducit, quod à natura stercus nō subducit. Si uero etiā dum adhuc frigidi sunt pedes aliquādo bibita fuerit, hæc omnia multo plus lædit, ad quodcūque tādē ipsorū peruenierit. Vbi tamē in his morbis suspicatus fueris, aut capitis grauitatē uehemētē, aut mētis percussionē, penitus à uino abstinendū est, & aqua in tali utendū; aut uinū aquosum & albū penitus dandū, & penitus inodorū, & post ipsius potū aqua modica insuper bibēda. Ita enim robur uini caput & mentē minus percelleret. In quibus autē potu ipsius maxime utendū sit, & quādo ualde multa, & quādo moderata, & quādo frigida, & quādo calida, partim prius dictū est, partim pro tēporis occasiōe dicitur. Cæterū de reliquis potibus, qualis est ordeaceus, & qui ex herbis fiūt, & qui ex uua passā, & uuarū expressarū retrimētis, et ex tritico: & cnico, & myrti baccis, & malo punico, & de alijs, ubi alicuius ipsorū usus cōtigerit, scribetur circa ipsum morbū: quemadmodū etiā de alijs cōpositis medicamētis. Balneū uero in multis morbis opem tulerit eo utētibus, ad alios quos quidē assidue, ad aliquos nō itē. Quādoque uero minus eo utendū est, propterea quod homines ad hoc sint imparati. In paucis enim dōmib. præparata sunt necessaria instrumēta, & nec ministri uelut opus est parati habētur. Si uero nō omnino bene quis lauatur, nō modicā læsionē incurret. Nam & tugurio fumū nō habēte opus est, & aqua larga, & balneo multo, & nō ualde large affuso, si sanē nō ita opus fuerit. Et defricōne quidē potius utendū non est. Si uero defricetur, calido utendū est ipso defricōrio medicamēto, eoquē multiplici magis quā aliās receptū est, et insuper nō pauca aqua perfundendū, & cito perfundēdum. Breui quoque uia ad soliū opus est, et ut facilis sit insensus, et facilis itē exitus. oportet autē eū qui lauatur esse moderatū ac taciturnū, & nihil ipsum operari, sed alios & perfundere, & defricare. Debet etiā postea multa aquæ mixtura parata esse, & celeres perfusiones fieri, et spōgijs utendū est pro strigili, et nō ualde siccum inungendū est corpus. Caput tamē reficcatū esse oportet, quantū eius fieri potest maxime, ita ut spongia extergeatur. & nequē perfrigerari caput oportet, nequē extremas partes, nequē reliquū corpus. & nequē eū qui recens sorbitionē accepit, nequē eū qui recēs potū sumpsit, lauare oportet. & nequē sorbere, nequē bibere cito post balneū. Magnā tamen partē ægro tribuere conuenit, si sanus balnei ualde amās fuit, & lauari adfuetus. Tales enim magis appetunt, & loti utilitatē sentiunt, & nō loti lædūtur. Cōuenit autē in totum magis peripneumonijs, quā febribus ardentibus. Nam dolorem lateris & pectoris ac dorsi balneum lenit, & sputum maturū facit, ac educit: & facilem spirationē reddit, & lassitudinē eximit, articulos enim & cutis superficiē mollit. Sed & urinam ciet, & capitis grauitatem soluit, & nares humectat. tot igitur bona balneo adsunt, quibus omnibus opus est. Si uero apparatus penuria aliqua fuerit, in una re uel pluribus, periculum est ne magis lædat balneū quā prosit. Singula enim ex ipsis magnū detrimentū afferunt, si nō à ministris uelut cōuenit præparata fuerint. Minime uero

tempestiuū est eos lauare, quibus aluus in morbis liquidior iusto est. itēq; eos quibus plus iusto adstricta est, & nō prius subijt. Sed neq; debilitatos lauare oportet, neq; ex ciborū fastidio nauseantes, aut uomentes, neq; eos qui biliosum eructant, neq; eos quibus sanguis ex naribus erūpit, nisi minus q̄ pro occasione cōuenit, fluat. Occasionēs aut nosti. Si uero minus q̄ pro occasione fluat, lauari expedit, siue totū corpus ad reliqua inde opē sentiat, siue caput solū. Si igitur pręparationes cōmodę fuerint, & ager bene suscepturus est balneum, quotidie lauare cōuenit. Eos uero qui balneo delectātur, etiāsi bis in die laueris, nihil peccaueris. Cæterū balneis uti, multo magis licet his qui tota ptisana utūtur, q̄ his qui solo utūtur succo. Licet aut & his aliquādo. Minime uero his qui potu solo utūtur. Sunt tamē ex his quoq; quibus licet. Coniectare uero ex pręscriptis oportet, et quibus balneū in singulis uictus modis profuturū est, & quibus nō. Quibus enim aliquid horū deest cōmodorum, quę balneū facit, et quę balneo cōmodant, lauare nō oportet. Quibus uero nihil horū deest, & adsunt ipsis signa in quibus lauari cōducit, lauare oportet. Febris aut ardens sit quū resiccatę uenule, hora æstiuā acres ac biliosos serosos humores, in seipsas attraxerint: & febris multa detinet, & corpus uelut ex oīsū lassitudine detentū, de lassatur ac dolet. Fit aut plerūq; & ex lōgo itinere, & longa siti, quū resiccatę uenulę acres ac calidas fluxiones in seipsas attraxerint. Fit autē lingua aspera ac sicca, & ualde nigra, & dum circa uentrē mordetur, dolet: & alui egestionēs ualde liquidę ac pallidę sūt: & sitis uehemēs inest, itēq; uigilię. Aliquādo etiam mētis emotiones. Huic & aquā, & aquā mulsam aquosam coctam, quātum uoluerit, bibendā dato. & si amarū fuerit os, uomere cōducit, & uentrē per clysterem subluere. Si uero ad hęc non soluatur, lacte asinino cocto purgato. Salsum aut nihil, neq; acre exhibeto. Nō enim sufferet. Sorbitionē uero donec extriudicationes fuerit, ne dato. Et si sanguis ex narib. fluxerit, soluitur affectio, itēq; si sudores accedāt iudicatorij, genuini, cū urinis albis & crassis, ac subsidētis leuib. & si abscessus aliquis fiat. Si uero absq; his soluta fuerit, recidiua rursus ægitudinis cōtinget. Aut coxę, aut crurū dolor emerget, & crassa expuet, si lanius futurus est. Febris ardentis genus aliud. Aluus subit, siti plena est, lingua, aspera, sicca, salsuginosa. Vrinę interceptio. uigilia. extremitates frigefactę. Tali si nō sanguis ex naribus fluxerit, aut abscessus circa collū fiat, aut crurū dolor, & sputa crassa spuerit (hęc aut suppressa aluo sūt) aut coxę dolor, aut pendendi liuor, nō iudicatur. & testis intensus iudicatoriū signum est. Sorbitiones attractorias dato. Verum in acutis morbis uenam secabis, si uehemēs appareat morbus, & qui ipsum habeāt in uigoris ætate fuerint, & robur ipsis affuerit. Si quidē igitur angina fuerit, siue aliquis alius ex pleuriticis morbus, eclegmatis delinctu repurgato. Si uero debiliores appareāt, si plus de sanguine detraxeris, infuso alui per clysterē tertio quoq; die utere, donec in tuto fuerit ager, aut etiā fame opus habeat. Pręcordia inflammata nō ex flatuū interceptione: septi transuersi intensionēs, aut spirituum protensionēs: in rectę ceruicis spiratione sicca, quibus pus non subest. Verum ex flatuū interceptione, affectiones hęc ac cedunt. Maxime aut & hepatis dolores, & splenis grauitates, et alię inflammationes, & supra septum transuersum dolores, ac morborum collectiones, solui non possunt, si quis prius medicamentis purgare aggrediatur. Nam uenę sectio in talibus principalis est. Deinde infusa per clysteres, si non magnus & uehemens

uehemens fuerit morbus. Sin minus, etiam postea medicamēto purgante opus est. Sed & post uenæ sectionē, purgans medicamentū securitate ac moderatiōne opus habet. Quicūq; uero ea quæ inflammata sunt, statim in principio morborum medicamēto soluere aggrediūtur, hi de intento quidem ac inflammato nihil auferunt; non enim remittit affectio quæ adhuc cruda est: quæ uero morbo resistunt ac sana sunt, colliquefaciūt. Debili uero fiēte corpore, morbus inualefcit. Quū autem morbus corpori præualuerit, talē iam incurabiliter affectū est.

Vt aliquis derepente uoce priuatus fiat, uenarū interceptiones faciunt, si sano hoc cōtingat absq; manifesta, aut alia forti causa. Venam igitur secare oportet, in brachio dextro internā, & sanguinem detrahē, iuxta habitū ac ætatem rationem ineundo, an plus aut minus oporteat. Coincidūt autem plurimis ipsoꝝ hæc: rubores faciei, oculorum stabilitates, digitoꝝ in manibus distētiōnes, dentiū stridores, pulsationes, maxillarū contractiones, extremitatū perfrigeratio, spiritū per uenas interceptiones. Quum dolores accesserint, atꝛēbilis & atrium fluxionū affluxus fiunt. Dolent aut partes internæ dum mordentur. Cōuersæ uero, & ualde siccæ fiētes uenæ intendūtur, & inflāmata affluētia attrahūt. Vnde corrupto sanguine, & spiritibus nō potentibus naturales in ipso uias permeare, perfrigerationes fiūt ex statione, & uertigines, et uocis interceptio, & capitis grauitas, & cōuulsiones, si iam ad cor, aut hepar, aut ad uenam deuenerint. Hinc morbi comitiales fiunt, aut semifyderati, si in ambiētes locos fluxiones inciderint, & à spiritibus pertransire non potētibus reficcatę fuerint. Quare talibus, fomētis prius adhibitis, uenā secare oportet statim ab initio, dū adhuc eleuati sunt omnes affligentes spiritus, ac fluxiones. Facilius enim auxiliū admittūt. & resectis uiribus, & cōsideratis iudicationibus, medicamētum exhibere sursum purgās, si non alleuetur: ad infērā uero aluum, si non subeat, infusum per clysterē adhibere. Postea uero lac asininū coctum dato, & non minus q̃ duodecim heminas bibat. Si uero uiriū robur adsit, plures q̃ sedecim.

Angina fit quū fluxio ex capite multa ac glutinosa, tēpore hyberno aut uerno, ad uenas iugulares influxerit, et hæ fluxionē ampliorem, propter amplitudinē, attraxerint. Quū aut frigida & glutinosa sit, spiritus trāsitus obturabit, & sanguinis transitus obturās, propinquas sanguinis partes cōgelat, ipsumq; immobilem ac stabilem facit: quū natura frigida sit, & obturādi uim habeat. & propterea suffocantur, lingua liuescente, & rotūda fiēte ac reflexa, propter uenas quæ sunt sub lingua. Præcisa enim uua, quā aliqui columellam uocant, uena crassa ab utraq; parte est. Quū igitur hæ plenæ sint, & in linguā innitantur, quæ rara est ac spongiosa, propter siccitatē: contingit ut ipsa præ uiolentia humore ex uenis suscipiens, ex lata fiat rotunda: ex bene colorata, liuida; ex molli, dura; ex facile flexibili, inflexibilis: adeo ut æger cito suffocetur, si non quis cito auxiliū ferat, uenæ sectionem à brachijs faciē, & uenas sub lingua secans, & eclegmatū delinctu curans, & calidos gargarismos exhibens, & caput radens. Debet autem & ceratū collo ac capiti circūponere, & lanas obuoluere, & spongijs mollibus ex aqua calida expressis fouere. Bibat aut æger aquam, & aquam mullam, non frigida. Succum uero ptisanæ tunc sumet, quum iam ex iudicatione in tuto fuerit.

Quum uero æstiuo uel autumnali tempore, fluxio calida ac nitrosa, de capite defluerit, utpote ex tēpore acris ac calida facta: talis ubi est mordet

mordet, & ulcerat, & spiritu implet, & ceruicis spiratio accedit, & siccitas multa, & quæ uidentur gracilia apparēt. & tendines posteriores in collo distenduntur, & uelut in tetano distenti esse uidentur. & uox abrupta est, & spiritus paruus est, & retractio spiritus densa ac uiolenta accedit. Talibus arteria ulceratur, & pulmo ardet, quum non possint extrinsecum spiritum inducere. Et si his affectio non ultronea ad externas colli partes deferatur, grauior ac ineuitabilior est, & propter tempus, & quod à calidis & acerbis sit humoribus. Si febris corripiat, ueteri stercore non subeunte, aut à cibo recens accepto, siue cum dolore lateris, siue absq; eo, quietem agere oportet, donec cibi descēderint prius ad infernam aluum; potu uero uti aceto mulso. Quū autem ad lumbos grauitas deuenerit, infuso per clysterem eluere, aut medicamento purgare oportet. Vbi uero purgatus fuerit, uictum præscribere ex sorbitione primum, & aquæ mulsæ potu. Deinde ex cibis ac piscibus coctis, & uino aquoso, modico, ad noctem. Interdium autem, ex aqua mulla aquosa. Quū uero status graueolentes prodierint, glandula subdititia, aut infuso per clysterem utendū erit. Sin minus, in aceti mulla si potu cohibere oportet, donec ad infernam aluum descēderint cibi, deinde sic per infusum clysteris subducere. At si mollem ac uacuum uentrem habenti febris ardens accedat, si tibi cōmodum esse uisum fuerit medicamentis purgare, intra tres dies id ne feceris, sed quarto. Postquam uero medicamentum exhibueris, sorbitionibus utere, obseruans febriū exacerbationes, ut nūquam exhibeas quum sunt, aut futuræ expectantur, sed ubi desinunt, aut quieuerunt, & q̃ longissime à principio. Quum uero frigidi sunt pedes, neq; potum, neq; sorbitionem, neq; aliud quicquam eiusmodi dato: uerum maximū hoc esse ducito, ut expectes donec ualde fuerint calfacti. Deinde sic id quod conducit exhibe. Plerumq; enim futuræ exacerbationis febris signum est pedum frigiditas. Si uero in tali tempore exhibueris, maxime per omnia peccaueris. Morbum enim non parum augebis. Quum autem febris desinit, uice uersa pedes reliquo corpore calidiores fiunt. Augetur enim frigefaciens pedes, accēsa ex thorace, ad caput flammam remittens. Vniuerso autem calore aceruatim sursum concurrente, & ad caput exhalante, merito pedes frigidi fiunt, ut qui excarnes & nervos si natura existant. Insuper autem etiam quum longe à calidissimis locis absint, perfrigerantur, calore ad thoracem coaceruato. Et rursus iuxta proportionem, quū febris soluitur, & in tenues partes dirimitur, ad pedes calor descendit. Hoc igitur tempore & caput, & thorax ipsorum perfrigeratur, qua de causa sorbitione exhibenda est. Nam ubi pedes frigidi fuerint necesse est uentriculū calidum esse, & multo fastidio plenum, & præcordium intentum, & corporis iactationem, propter internam turbationem: & mentis abalienationem, & dolores, & æger distrahitur, ac uomere cupit, & si praua uomuerit, dolet. Postquam uero calor ad pedes descendit, & urina progressa est, etiam si non sudarit, omnia desinunt. Hoc igitur tempore sorbitionem dare oportet: alioqui perniciofa est.

Quibus uero perpetuo aluus in febribus liquida est, his præcipue pedes calefaciens, & ceratis integens, & fascijs obuoluens, animum aduerte ut ne sint reliquo corpore frigidiores. Si uero calidi sunt, calefactorium nullum adhibe, sed conserua ut ne perfrigerentur, potu autem utendum est quàm paucissimo, aqua frigida, aut aqua mulla.

Quibus autem in febribus aluus liquida est,

& mens perturbata, & multi ex talibus floccos auferunt, & nares scalpunt, & paulatim quidem respondent si interrogentur, ipsi uero à seipsis nihil aptum dicunt: talia atrabiliaria esse mihi uidentur. Talibus igitur ita se habētibus, si aluius liquida fuerit, ac colliquuerit, uidetur mihi sorbitiones frigidiores ac crassiores exhibere oportere, & potiones aluius sistentes, & uinosiores magis quam adstringentes. At quibus in febribus uertigines ab initio, & capitis pulsus fiunt, & urinae tenues, in his expectare oportet, ut ad iudicationes febris exacerbetur. Nec uero admirarer, si delirarent. Quibus in principio urinae nebulosae, aut etiam crassae sunt, tales depurgare oportet, si etiam alia cōtulerint. Quibus uero in principio urinae tenues, tales ne purgato, sed si uisum fuerit, infusum per clysterem adhibeto. Hos sic curare cōducit. Aeger corpore quietem agat, ungaturque ac aequaliter cōtegatur. Potu utatur aqua mulsa aquosa: & sorbitione succi pituitosae ad uesperam. Alium uero ab initio per clysteris infusum subducito. Medicamenta autem his ne exhibeto. Si enim quid circa uentrem cōmoueris, urina non cōcoquitur, sed absque sudore ac iudicatione, febris ad multum tempus durabit. Sorbitiones autem ubi prope iudicationē fuerit, ne dato, si turbetur: uerum quum remiserit turbatio, & ad melius procedet. Obseruare uero etiam omnium febrium iudicationes oportet, & in hoc tempore sorbitiones detrahere. Solent autem longae fieri hae febres, & impetuosos humorū de loco ad locū illapsus habere, si quidem infernae partes frigidae fuerint, circa aures & collum. Si uero non fuerint frigidae, alias mutationes habēt. Fluit autem sanguis ex naribus, & alui his exturbantur. Quibuscunque uero febres anxiosae sunt, & quae praecordia intendunt: & decumbentes in eodē loco decubitum non sustinent, & extremae partes perfrigerantur, hi plurima omnino diligentia ac custodia opus habent. Degant autem hi ut nihil ipsis exhibeas aliud, quam acetum mulsum aquosum. Sorbitionem uero ne exhibe, donec febris desierit, & urina concocta fuerit. Decumbere autem debet aeger in domo obscura, et in stratis quam molliissimis reclinatus esse, ita ut multo tempore decubitū in eodem loco toleat, & quam minimum se iacet. Hoc enim talibus maxime prodest. Super praecordium uero, lini semen linteum illitum imposito, obseruando ut ne horrescat aeger dum apponitur. Sit autem summe tepidum, aqua & oleo coctum. Coniectare uero ex urinis oportet id quod futurū est. Si enim crassiores ac pallidiores fuerint, meliores sunt. Si uero tenuiores ac nigriores, deteriores. Si autē mutationes habent, temporis diuturnitatem significāt: & necesse est ut morbus & ad deterius, & ad melius, inaequalitatem permutet. Ceterū inconstantes febres finire oportet, donec constiterint. Quum uero constiterint, & uictu, & curatione conuenienti occurrere, speculatione secundum naturam facta. Sunt autē aspectus aegrotorum multi. Quare animaduertendū est medico, ut ne aliqua manifestata causa ipsum lateat, neque ex his quae ratiocinatione cognoscuntur, neque ex his quae ad numerū parem aut imparem apparere oportet. Maxime igitur numerū imparem uereri oportet. Nam hi dies in alterutram partem aegrotos inclinare faciunt. Primū itaque diem obseruare oportet, quo aeger debilis esse coepit, cognito principio ex quo, & quādo. Praecipuū enim hoc est ut sciatur. Quū uero aegrum interrogaueris, etiam haec omnia considerabis. Primū quidē quomodo caput habet, an doloris exors sit, nec grauitatē in seipso habeat. Deinde praecordia

cordia & latera an doloris exortia sint. Si enim præcordium dolorosum fuerit, aut eleuatū, aut obliquitatē aliquam habuerit, aut satietatē; aut lateris dolor affuerit, & unā cum dolore, tussicula, aut tormen, aut uentris dolor. Quū horum quid affuerit in præcordio, aluum maxime infusus per clysterem soluere oportet. Bibet autem aquam mulsam calidam coctā. Considerandū uero est an dum exurgit, animi deliquiū incidat, an bona spiritus tolerātia ipsum habeat: & inspicienda alui egestio, num uehemēter nigro colore prodierit, aut pura, quales sani hominis sunt egestiones; & an febris ad tertiū diem exacerbetur. Vbi uero ualde probe tales consideraueris in his morbis tertia die, ad hæc iam etiam alia contemplare, & si quarta simile quid tertiæ habuerit ex iisdem illis, æger in periculo uersatur. Ex signis autē, nigra alui egestio, mortē significat. Quæ uero sani hominis egestioni similis est, si per omnes dies apparuerit, salutare signum est. At si glande subdita nō obedierit, & spiritus bona tolerātia affuerit, si ubi ad eundem exurrexit, aut isthic in lecto, animi deliquiū inciderit: Hæc ubi ægroto, aut ægrotae, ab initio affuerint, delyriū futurum expecta. Intentus aut sis quoque ad manus. Si enim tremulæ fuerint, tali sanguinis de naribus destillationē futurā expecta. Inspicere uero ipsas nares oportet, an spiritus æqualiter per utraq; feratur, & si multus feratur è naribus, cōuulsio fieri solet. Si uero conuulsio fiat, tali mors expectanda est: & bene habet si quis hoc prædicat. Si uero in febre hyberna, lingua aspera fiat, & animi deliquia adsint, tali remissio febris contingere solet: attamē fame talem macerare oportet, & aquæ, & aquæ mulsæ potu, ac ptisanæ succo conseruare, ita ut fidem ne habeas febrīū remissioni. Nam qui talia signa habent, de uita periclitantur. Vbi uero hæc cognoueris, ac probe cōtemplatus fueris, ita fore prædicere potes, si placuerit. Quum uero in febribus horrendū quid acciderit quinta die, aut aluus derepente liquida deiecerit, & animi deliquiū incidat: aut uocis priuatio contingat, aut conuulsio, aut singultus fiat: ex his anxiosus fieri æger solet, & sudores sub naso, & circa frontem ac ceruicem à posteriore capitis parte oboriri. Qui uero hæc patiūtur, spiritui facti nō longe postea moriuntur. Quibus autē in febribus crura fiunt tuberculosa, atq; hæc tubercula moram trahentia nō maturantur, febribus perfeuerantibus, & strangulatio acciderit in faucibus, ita ut partes circa fauces graues existant, & tubercula nō matura facta, sed extincta fuerint: talibus sanguis è naribus fluere solet. Et si quidem multus fluxerit, solutionē morbi significat. Sin minus, morbū longum. Quanto autē minus fluxerit, tanto deterius est, & longitudo maior. Si uero reliqua facilima fiant, tali dolores ad pedes expectare oportet. Si autē contigerint pedem, & dolorosus esse perseueret æger, & calore affligatur, ac nō soluatur: paulatim & ad ceruicem dolores peruenient, & ad dauiculam, & humerū, & pectus, & articulum. Nam & hunc tuberosum fieri oportebit. His autē extinctis, si manus cōtrahantur, aut tremulæ fiant, conuulsio talem corripit, & delyriū. Sed & pustulæ in supercilio oriūtur, & rubores habet, & palpebra altera ad alterā progerminat, & inflammatio dura detinet, & oculus uehemēter intumescit, & delyriū ualde augefcit. Noctes autē plus q̄ dies delyrii significationē præbent. Multa uero signa ad imparem numerum magis fiunt, q̄ ad parem. Vtro aut horum numerorū fiant, lethalia existunt. Tales uero si quidē ab initio medicamentis purgare uolueris, ante quintū diem id facito, si uenter

si ueter murmurarit. Sin minus, impurgatos finito. Si uero murmurarit, & alui egestionēs bilioſæ fuerint, ſcammonio dato moderate purgato. In reliquo uero uictu potus ac ſorbitiones parciffime exhibeto, quo melius æger habeat, ſi nō remiſſione facta decimūquartum diem tranſgreſſus fuerit. Quum febriciſ tanti decimaquarta die uocis interceptio acceſſerit, nō cita ſolutio cōtingere ſolet, neq; liberatio à morbo fieri, ſed temporis diuturnitatē tali ſignificat. Quum itaq; apparuerit in hac die, longius protrahetur morbus. Quum febrienti quarta die lingua cōturbata loquitur, & alius bilioſa liquida egerit, talis delyra re ſolet. Sed obſeruare ac aſſequi euentus oportet. Aeſtiuū ac autūnali tempore in morbis acutis, ſanguinis deſtillatio repentinā, firmitatē ac multam inflammationē circa uenas ſignificat, & in poſterū diem tenuium urinarū apparitiones. & ſi ætate uiguerit, & corpus in exercitio, aut bene carnoſum habuerit, aut atrabiliarius fuerit, aut ex potu manus tremulas habuerit, bene habet ut delirium, aut cōuulſionem prædicas. Et ſi quidem in diebus paribus accedat, melius eſt. In iudicatione uero pernicioſum, ſi nō multus aceruatiſ concitatus ſanguis, redundantia exitus faciat per nares aut per ſedem: aut abſceſſus, aut præcordiorū dolores, aut ad teſtes, aut ad crura dolores inducat. His autem cōcoctis, exitus fiunt ſputorū, craſſarum urinarū, leuium, albarū. Febri ſingultoſæ ſilphij ſuccū, acetū muſſum, daucū tritum, bibēda dato. & galbanum in melle. & cuminū in eclegmate delingendū. & ptiſanæ ſuccum poſt hæc ſorbendū. Talis autē effugere nō poteſt, ſi nō ſudores iudicatorij, & ſomni æquales acceſſerint: & urinæ craſſæ & acres decurrerint, aut ad abſceſſum morbus decubuerit. Nux pinea, & myrrha, in eclegmate dentur. Bibendum autem talibus acetū muſſum q̄ minimum dato. Si uero ualde ſiticuloſi fuerint, aquam ordeaceam. Peripneumonicas ac pleuríticas affectiones ſic cōſiderare oportet, an acuta ſit febris, & dolores lateris alterius, aut utriuſq;: et dum ſpiritus ſuſum fertur an doleat: & an tuſſes adſint, & ſputa prodeant fulua, aut liuida, aut etiā tenuia, & ſpumofa, & florida: & ſi quid aliud diuerſum habeat, ab his quæ illis fieri ſolent. Hunc ſic degere oportet. Si quidē dolor ſuſum tendat ad clauiculam, aut circa mammā, & brachiū, uenam in brachio ſecare oportet internā, utra tandem fuerit parte, in ea ipſa: detrahete uero ſanguinē, iuxta corporis habitum, & tempus, & ætatem, & colorē, plus & cōfidenter. & ſi acutus fuerit dolor, ducere uſq; ad animi deliquium. Poſtea uero inſuſum per clyſterem adhibere. Si uero ſub thorace fuerit dolor, & ualde diſtendat, pleuriticō medicamento aluum ſubpurgato, & interim dum purgatur nihil dato. Poſt purgationē uero acetum muſſum, Medicamentū aut purgās exhibeto quarta die. Verū per tres ab initio, inſuſum per clyſterē adhibeto: & ſi hinc nō alleuetur, ſic ſubpurgato. Cuſtodia aut fiat uſq; ad febris quietem ac ſeptimū diem. Deinde ſi in tuſſe eſſe uideatur, ſuccū modicū ac tenuem primū melle ammixto exhibeto. Si uero facile educat ſputū, & bene ſpiret, ac doloris exors ſit circa latera, etiā paulo craſſiorem ac ampliorē, & bis in die dabis. Si uero nō facile liberetur, potionē pauidiorem, & modicam ſorbitionē, ſuccum tenuem, eūq; ſemel, & in quo tempore melius degit, exhibeto. Cognosces autem hoc ex urinis. Sorbitionē enim exhibere in his morbis nō prius oportet, q̄ urinas concoctas, aut ſputa matura facta eſſe uideris. Si uero is qui medicamentū accepit, frequenter & multum pur

gatus fuerit, neceſſe eſt dare, uerū pauciorē ac tenuiorē. Nō enim poterit dormire, præ ualorū uacuatione; neq; ſimiliter coquere: neq; iudicationes ſuſtinere ac expectare. At ubi crudorū colliquationes factæ fuerint, & ea quæ renituntur abiecerit, nihil obſtabit. Matura uero ſunt ſputa quidem, quū ſimilia fuerint puri. Vrinæ autē ſubſidentias habentes ſubrubras, uelut eſt eruū. Nihil autē prohibet & ad alios laterū dolores tepefactoria apponere & cerata. Inūgere autem crura ac lūbos oleo calido, & pinguedinē illinere. præcordia uero ex lini ſemine integere uſq; ad mammas. At ubi in uigore eſt peripneumonia, auxiliū non admittit, ſi non expurgetur: & malū eſt ſi æger difficulter ſpirauerit: & urinæ tenues & acres, & ſudores circa collum ac caput fiant. Tales enim ſudores prauī ſunt, præ ſuffocatione, & impetu ac uiolentia, ſuperātibus morbis, ſi nō urinæ multæ ac craſſæ prodierint, & ſputa matura exierint. Vtrum autē horū ſua ſponte uenerit, morbū ſoluit. Ad peripneumoniā medicamentū quod delingitur. Nux pinea & galbanū, in melle Attico. Abrotonū in aceto mulſo. Piper, uerum nigrū ſeruefacito, & pleuritico in principijs dum dolor uexat, bibēda dato. Bonum eſt & panacem in aceto mulſo ſeruefacere, & excolare, ac bibēdum dare, tum hepaticis, tum in doloribus ſepti tranſuerſi. Et quæcūq; ad uentrem, aut ad miſtionē impellere oportet, hæc in uino & melle dabis, illa ad uentrem, cū aqua mulſa aquoſa copioſiore bibēda dato. Dyſenteria ſedata abſceſſum, aut tumorem aliquē faciet, ſi non ad febres, aut ſudores, & urinas craſſas, & albas, ac ualde perſpicuas, aut ad tertianas, aut ad uaricē, aut ad teſtem, aut ad crura, aut ad coxam dolor decubuerit. In febre bilioſa ante ſeptimū diem, cum rigore morbus regius accedens, ſoluit febrem. Verū ſine rigore ſi accedat, extra temporis occaſiones, pernicioſus eſt. Tetanus lumborū in anteriorem ac poſteriorē partem diſtentio: & in atrabiliarijs, ubi ſpirituum per uenas interceptiones fuerint: uenæ ſeſtione ſoluuntur. Quum autem à tendinibus uehementer in anteriore partem reuelluntur, & circa collū ac faciē ſudores ſiūt, dum præ dolore mordentur ac reſiccātur tendines uſq; ad ſacri oſis finem exporrecti, qui craſſiores ſpinā cōtinent, qua parte maxima ligamenta exorta, deorſum ad pedes uſq; deſinūt: Tali ſi nō febris & ſomnus acceſſerit, et ſequentes urinæ cōcoctionem habentes prodierint, & ſudores iudicatorij, uinum creticum uinoſum bibēdum dato, & farinam coctam edendā. Et cerato ungito ac illinito; & integito crura uſq; ad pedes, ubi calida aqua prius in ſcapa perfuſiſti: brachia quoq; ad digitos uſq; integito: & lumbos ac ſpinā à collo uſq; ad coxas, pinguedine incerata molli pelli illita circūdato, ita ut etiā anteriores partes cōplectantur: & interpoſito tēpore, per utriculos calida aqua inſuſa foueto, & circūtento linteo ipſum reclinato. Aluū uero ne ualde ſoluas, niſi glandula ſubdititia, ſi multū tempus fuerit, quo abſq; egeſtione permansiſt. & ſi quidē in melius res tibi proceſſerit, ſatis eſt. Sin minus, mei radicē in uino odorato tritam, & daucum bibenda dato, mane ubi ieiunus eſt ante calidæ perfuſionē. & poſt hæc breui farinam coctam, tepidā, plurimā edat. & uinū ubi uoluerit, bene temperatū inſuper bibat. & ſi quidē in melius res tibi proceſſerit, ſatis eſt. Sin minus, prædicere oportet. Morbi porro omnes ſoluūtur, aut per os, aut per aluū, aut per ueſicā, aut alium aliquē eiufmodi articulū. Verū ſudoris ſpecies omnibus cōmunis eſt. Veratrū dare his oportet, quibus à capite fluxio fer-

tur. Quicūq; uero ex abscessibus, aut uenæ ruptura, aut propter intemperantiā, aut ob aliam quandā fortem causā, suppurati fiunt, talibus ueratrum ne dato. Nihil enim profuerit, & si quid perpetietur æger, ueratrum in causa esse uidebitur. Si uero corpus dissoluatur, aut dolor in capite sit, aut aures obturatæ sint, aut nares, aut sputatio; aut genuum grauitas sit, aut corporis tumida moles præter consuetudinem, dato quicquid tandem horum contigerit, si nō ex potibus, neq; ex rebus ueneris, neq; ex tristitia, neq; ex curis, neq; uigilijs hæc fiant. & si quidem horū quid in causa fuerit, ad hoc ipsum curationē instituito. Dolores ex itinere, laterū, dorsi, lumborum, coxarū, & quicūq; respirantes dolent, causā manifestā habētes. Sæpe enim ex crapulis & cibis flatuosis, dolores procedere solent, & ad lumbos, & ad coxam. Quibus uero ipsorū talia fuerint, urinæ difficultas ipsis accedit. Horum autē causā iter est, & grauedinū ac rauedinum. Quacūq; ex uictus ratione cōtingunt, Pleraq; unusquisq; prout præter consuetudinē uictu usus fuerit, maxime annotat. Nam qui nō soliti sunt prandere, si pransi fuerint, multus uentris tumor ipsis accedit, & dormitatio, ac repletio. Si uero insuper coenauerint, aluus exturbatur. His ubi balneo usi sunt, dormire cōducit. Vbi uero dormiuerunt, deambulare lenta ac multā circuitione, & si quidē aluus euacuata fuerit, coenare, & bibere uinū paucū, meracius. Si uero euacuata nō fuerit, corpus oleo calido illinere, et si sitierit, uinum aquosum album aut dulcē bibere ac quiescere. Si uero nō obdormierit, ampliū quiescere. Reliquus uictus similiter ut his qui crapula grauatur constituatur. Quod uero ad potus attinet, qui quidē aquosi sunt, tardioris trāitus sunt, & intus ob uoluūtur, & circa præcordia redūdant, & ad mictionē non decurrūt. Tali uero potu repletus, nullū opus celeriter perficere poterit, ex his quæ intēto corpore per uolentiā aut celeritatē perfici solent. Quiescat autē q̄ maxime, donec unā cū cibis cōcoctus fuerit. Quicūq; uero potus meraciores sunt, aut austeriores, palpitationē in corpore, & pulsationē in capite inducūt. His cōmodum est ut insuper dormiant, & calidū quid sorbeant, ad quod maxime iucūde affecti sunt. At uero ieiuniū ad capitis dolorem ac crapulam malū est. Cæterum qui semel in die cibū capiunt, hi & impotētēs sunt, & calidā urinā mingunt, præter cōsuetudinem uasa uacua habētes. sit autē & os salsum ac amarū, & in omni opere tremunt, & tēpora ipsis distendūtur, & cōnā concoquere nō possunt, uelut si prāsi essent. Hos aut minus bibere oportet q̄ soliti fuerūt, & mazam liquidiorē pro panē sumere: et ex oleribus, rumicem, aut malūā, aut pīsanā, aut betas. Bibere uero uinū inter cibū, moderatū & aquosius; & à cōna modicē deambulare, donec urina descēderit, ac minxerint. Utātur autē & piscibus cōctis. Edulia porro maxime de se significationē præbent. Allium flatū, & colorem circa thoracē facit, & capitis grauitatē, & anxietatē. & si quis alius dolor antea fieri cōsueuit, eum exacerbauerit. Vrinam aut ciet, & hoc bonū habet. Optimum uero est ut quis ipsum edat, si aut ebrius est, aut ad potationē ire uolet. Cæseus flatū, & adstrictionē, & ciborū accensionē facit, quū crudū & incoctile sit eduliū, pessimū autē est repletos ipsum inter potū edere. Legumina omnia flatuosa sunt, & cruda, & cocta, & fricta, & macerata, & uiridia. His aut utendum nō est nisi cū cibis. Vnūquodq; uero ex ipsis sua peculiaria uitia habet. Cicer flatū, tum crudū, tum frictū, & dolorē inducit. Lens adstringit, & turbatio-

nem inducit, si cū cortice sumatur. Lupinus minime inter hæc mala habet. Silphij caulis & succus, quibusdā quidem maxime, in expertis aut non trāsit per uentrē. Verū uocatur hoc malū cholera sicca. Fit autē maxime ubi cū multo cafeo mixtus fuerit, aut cū carnis bubulæ esu. Nam & atrabiliaria affectiones à bubularū carniū esu exacerbātur. Est enim insuperabilis ipsarū natura, & nō cū iuis uētriculi est ipsas cōcoquere. Optime tamen ipsas cōcoxerint, ac summo uerint, qui percoctis & q̄ uetustissimis utantur. At caprinæ carnes quæcūq; in bubulis insunt mala, omnia habent, itēq; à cōcoctione alienitatē: et flatuosiores sunt ac ructus ampliores faciūt, & cholera generāt. Sunt autē odoratissimæ, solida ac iucundissimæ, optimę & percoctæ, & frigida. Verū iniucundissimæ et graueolētes ac duræ, pessimæ: imō etiā recētes. Optimæ uero sunt æstatis tēpore: pessimæ autūno. Porcinæ uero carnes prauæ sunt, quū fuerint crudiores aut ambustæ. Magis autē cholera generāt, & turbationē faciunt. Suillæ autē optimæ sunt omniū carniū. Sed præstant etiā ex his quæ nō uehementer pingues sunt, neq; tenues, neq; ueteris uictimæ ætatē habent. Edere uero ipsas oportet absq; pelle, & subfrigidas. In cholera sicca uēter inflatus est, et strepitus insunt, et dolor laterū ac lumborū. Secedit autē nihil deorsum, sed aluus adstricta est. Talem adseruato ut ne uomat, sed aluus subeat. Infusum itaq; calidū ac pinguisimū q̄ citissime per clysterē immittito: et oleo illitū in aquā plurimā calidā demittito, in soliū reclinans, & calidā paulatim affundēs. Et si calescēt ipsi aluus subierit, morbus solutus est. Dormire quoq; tali cōducit, & bibere uinū tenue, & uetus ac meracius, & oleum dato, ut & quiescat, & aluus subeat, & soluatur morbus. A cibis uero & alijs abstineat. Si uero nō remiserit dolor, asininū lac bibendum dato, donec purgatus fuerit. At si liquida fuerit aluus, et bilis subeat, et tormina sint, & uomitus, ac suffocationes: his optimū fuerit quiescere. Bibere uero aquā mulsam, & nō uomere. Hydropū duæ naturæ sunt: quorū alter sub carne si fieri aggreditur, inuitabilis est. Qui uero cū inflationibus sit, multa bona fortuna opus habet, maxime aut ærumnis, & fomētis, ac temperantia. Edat autē sicca & acria. Sic enim uel maxime urinā eiecerit, & plurimū uiribus polluerit. Si uero difficulter spirauerit, & tēpus uernum fuerit, & simul ætas uiguerit, & uirium robur adsit, de brachio sanguinē detrahare oportet. Deinde panes calidos ex uino nigro & oleo tinctos edat: & q̄ minimum bibens, q̄ plurimum laboret. & carnes suillas carnosas edat cū aceto coctas, ut aduersus accliuēs deambulationes reniti possit. Quicunq; inferiū uentrē calidum habent, & alui egestionēs acres & inæquales ipsis prodeūt præ colliquatione: his si quidē potētes fuerint, ueratro albo reuellere oportet. Sin minus, succus tritici horni crassus, frigidus dandus est, & lenticulæ fresæ decoctū, & panes subcineritiij, & pisces febrienti quidē cocti, nō uero febrienti, assati: & uinū nigrum nō febrienti: sin minus, aquā à mespilis, aut myrti baccis, aut malis, aut sorbis, aut palmulis, aut uitiū cenāthe. Si uero febris nō habeat, & tormina adsint, lac asininū calidum modicū primum, deinde sensim fiente progressū amplius, & lini semē, & triticeam polentā, & fabas Aegyptias, exēpto eo quod in ipsis amarū est, molita ac trita hæc inspergēs bibat: aut oua semiconcreta assata edat, & similaginē, & miliū, & alicam coctā in lacte: hæc cocta frigida edat, & quæ his similia existunt, tum pocula, tum edulia in cibo assumat. Maximi momēti circa uictus rationem

tionem, est obseruare ac cauere, tū in acutis, tum in lōgis morbis, & intēssiones febrīū, & remissiones, quo temporū occasiones scias, quādo cibos exhibere nō oportet, & quando tuto exhiberi possunt. Insuperq; quando plurimū ab intentione absunt. Nōsse porrō oportet eos quibus caput dolēt ab exercitationibus, aut cursibus, aut profectionibus, aut uenationibus, aut ex alio quopiā intēpestiuo labore, aut ex re uenerea: decolores item, raucosōs, splenicōs, exāgues, spirituosos, & siccā tulsim habētes, ac siticulosos, & flatuosos, & uenarum interceptiones: & eos qui intenta habēt prēcōrdia, & latera, & dorsum, & torpēfactos, & obscurē uidentēs, & quibus aurīū sonitus incidūt, et qui urinariā fistulam urinā non continentē habent, & morbo regiō laborātes, & quorū alui cruda eīciunt, & quibus ex naribus, aut per sedem sanguis uehēmēter erumpit, & qui tubercula habēt, & quibus uehēmēs dolor incurrit, & non superauerint: ex talibus nullū medicamento purgandū esse. Periculū enim habebis, et nihil opis afferes, & spōtaneas liberationēs ac iudicationēs tolles. At si sanguinē alicui detrāhere cōducit, solidam aluū facere oportēt, atq; sic detrāhere, & fame macerare, ac uinū auferre. Postea uictu cōueniente, & fomētis humidis, reliquam curationē perage. Si uero aluus densa ac adstricta esse uideatur, mollē infusum per dylsterem immitte. Si uero medicamentū dare uisum fuerit, per ueratrū tuto sursum purga. Deorsum uero nullum taliū. Optimū autem est ad mictionem, & ad sudores, & ad deambulationes perducere, & leni frictione uti, ut ne habitū densum efficias. Si uero in lecto decūbat, alij ipsum fricent. Et si quidem in thorace supra septum trāsuersum, affectio ipsum infestarit, plurimū resideat, & minime ipsum reclinent, quādiu uires tolerant: & sedentem multo tempore multo oleo calido defricent. Si uero in inferna aluo sub septo trāsuerso dolores habeat, decumbere cōducit, & nullo motu moueri tali corpori cōfert, extra defricionē. Qui uero ex inferna aluo soluuntur dolores, per urinas & sudores, si mōderate delabuntur, sua spōte soluuntur, qui parui sunt, uehēmētes aut prauī sunt. Tales enim aut pēreunt, aut absq; alijs morbis sani non fiunt. Verum qui huiusmodi sunt incumbūt ac firmantur. Potio hydropico. Cantharidas tres, detracto capite uniuscuiusq; & pedibus, & alis; corpora uidelicet ipsarū in tribus aquā cyāthis terito. Quum autē is qui bibit dōluerit, calida aqua pēfundatur. Bibat aut prius illitis, ieiunus: & edat panes calidos ex oleo. Medicamentū sanguinem sistens. Fici succum lana exceptū intus ad uenam appone. Aut coāgulo intorto nares obtūrato. Aut chalcitidem digito prius effor matam apprime, & cartilaginēs extrinsecus utrinq; cōprime: & aluum lacte asinino coctō solue, & caput rade, & pēfrigerātia adhibe, si calidum tempus fuerit. Sesamoides sursum purgat. potio eius est drachma dimidia in aceto multo trita. Commiscētur etiam ueratris tertia potionis pars, & minus suffocat.

Ad trichiasin, id est pilos pungentes in palpebris enāscētes. Immissum in acū foramen habentē filum, in summa supernā palpebrā margine deorsum uersus perpūctione facta trāsmitte, & aliud itidem sub hoc inferne trāijce: & extenta fila cōsue ac deliga, donec decidāt, & si quidē satis habuerit, bene est. Sin minus, & quid defecerit, rursus eadem facito. Sed & hēmorrhoidas eodem modo transmittes, filo lanæ succidāe crassissimo ac maximo in acū immisso, ac deligato. Securius enim sit curatio. Deinde cōpēssione facta medicamen

to erodēte utere, & ne prolue donec deciderint: & semper unā relinque. Postea uero reſectis uiribus ueratrū dato. deinde exerceatur & exudet, & ante exercitationē mane frictio multa fiat. Verū à cursu abſtineat, & ebrietate, & ab acribus, origano excepto. Vomat aut per interpositos dies septē, aut ter in mēse. Sic enim q̄ optime habuerit corpus. Vinū uero fuluū, austerū, aquosum ac modicū bibat. At uero ad suppuratos, scillā frustra rotūda ſecta in aqua coquito, & ubi ualde bene efferbuerit, diffundito, & alia affusa coquito, donec ad contactū percocta ac mollia apparuerint. Deinde leuiter tritis cuminū frictū ammiscē, & ſesama alba, & amygdalas recētes tritas, & hæc melle excepta delingenda præbe, & postea uinū dulce bibendū. Sorbitiones uero ſumat, peplū, appellatum meconiū album, tritū acetabuli parui mēſura, in aqua loturæ farinæ recētis dilutum ac coctū, melle affuso tepidū absorbens. Atq; sic degat per diē. Deinde ſupputans ea quæ eueniūt coenam dato. Fabarū item depuratarū quadrantē, & rubiæ ſarmēta duodecim, terito, miſceto, coquito, et pingui addito delingenda præbeto. Ad oculos. Spodiū lotum probe uelut farinæ maſſam ſubactū, non liquidū, uuæ immaturæ acerbæ ſucco humectatū leuiter terito, in ſole reſiccato, & ut ad illitionem cōmodum ſit humectato: quū uero ſiccum factū fuerit, leuiter trito ſicco oculos ſublinito, & angulos cōſpergito. Ad eoſdem. Ebeni drachmā, æris uſti obolos nouē, croci obolos tres. Hæc trita in coticula terito, & uini dulcis heminā Atticā affundito. deinde ad ſolē obuelata exponito, & ubi cocta exaruerint, ipſis utere. Ad dolores oculorū. Chalcitidis drachmā, uuæ expreſſæ ut duæ partes ſint reliquæ, myrrhā et crocū terito, & muſtū admiſceto, & ad ſolē coquito, ac illinito. Sint aut in uaſe æneo. Earū quæ ab utero ſtrāgulantur cognitio. Digitis duobus cōprimito, et ſi ſenſerit, uteri ſtrāgulatio eſt. Si nō, cōuulſio. Ad hydropicos. Pepli meconiꝝ appellati, acetabulū parui Atticū rotūdū, potio una, ſquamę eris ſpecilla lota tria. Hęc leuiter trita, et cū ſarina recēti agglutinata, ac in catapotia efformata, deglutieda dato. Purgāt aquā deorſum. Aliud, qđ ſtercora per aluū expellit. In caricas ſuccū tithymalli in ſulula, in ſingulas ſepties. deinde in nouū uas cōpoſitas recōde, ac exhibe ante cibū. Aliud. Peplū, quod & meconiū appellatur, aqua affuſa trito ac excolato, et ſarinā placētarū torrefactarū ammiſcēs, & mel coctū affundēs, hydropicis edendū dato: et uinū dulce aquosum, aut aquā muſſam aquoſam in ſuper bibendā. At meconiū, quod primū excrementū à pueris prodit, collectū recōdito, ac curato.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE IUDICATIONIBVS, IANO COR
nario Medico Phyſico interprete.



De iudicationibus quæ cito ad melius tendunt, plerunq; eadē ſigna ſunt, quæ etiam ſanitatis. Sudores enim optimi ſunt, & celerrime febrē ſedant, qui in iudicatorijs diebus ſiunt, & febrem perfectē ſummouēt. Boni quoq; ſunt qui per totū corpus ſientes, morbū facilius ferre faciunt. Qui uero nihil horū faciunt, incōmodi ſunt. Denſari uero oportet alui egeſtione, morbo ad iudicationē tendente. Sit aut ſubſulua, & nō ualde

ualde graueolens. Cōmodum est & lumbricos exire ad iudicationē. Vrina aut̃ optima est, quæ habet albissimā subsidentiā, & leuem ac æqualē, per totū tēpus donec iudicatus fuerit morbus. Significat enim securum ac breuē fore morbum. Si sudore oborto morbus deficiat, & urina fulua albā subsidentiā habēs cōspiciatur: his eadē die recidiua febris fiet, atq; hæc quinta die citra periculū iudicatur. His qui in breuissimō tēpore sani euadēt, omnia maxima signa fiūt. Nam magis sine dolore degūt, & extra periculū, & noctu dormiūt, & alia signa secura præ se ferūt. Quibus in febre nō lethali capitis dolor, et alia signa circūstant, in his bilis dominatur. Quibus inceperit dolor primis diebus, & quarta ac quinta magis premūtur, hi septima à febre liberātur. Febres iudicātur in ijsdem numero diebus, ex quibus & superstitēs euadūt homines, & ex quibus pereūt. Etenim placidissimæ febres, & signis securissimis fientes, quarto die desinūt, aut prius. Lethalissimæ uero & signis horredissimis fiētes, quarto die aut prius occidūt. Primus igitur ipsarū insultus sic desinit. Alter ad septimū deducit. Tertius ad undecimū. Quartus ad decimūquartū. Quintus ad decimūseptimū. Sextus ad uigesimalū. Atq; hæc in acutissimis morbis, per quatuor ad uiginti, appositiones fiūt. Nō potest aut̃ quicq; horū integris diebus exacte numerari. Neq; enim anni ac mēses totis diebus cōstant. In febribus ardētibus bona signa apparētia, qualia in sanis scripta sunt, si quidē minora fuerint, ad tertium diē remissionē indicāt. crassiora uero, in crastinū. crassa aut̃, eadē die. In febribus ardētibus si posterius septimo die morbus regius accedat, iudiciū est sudoris. Nā morbus nō solet exudare, neq; usq; alibi abscessum facere, sed sanus fit. Necesse autē est ubi calor febris discessit, & humorē in seipsum attraxit, febre cōtingere iudicationē, per urinas prodeūtes, aut etiā alui egestionēs, aut sanguinis ex naribus fluxū, aut mictionē multā, aut per multā humiditatē, sudorē, aut uomitū. Mulieri uero etiā per mensiū uiam. Maxime igitur hæc iudicationem faciūt, & quicquid his propinquū contingit. Facit aut̃ & alias iudicationes, sed minus q̃ has. Si uero septimo die morbus regius accedat, aut posterius, in febre ardēte, & difficilis multi spūti secessus, tum in ardētibus, tum in alijs febribus: si nullo taliū signorū fiēte dimiserit febris, necesse est tales iudicationes pro illis fieri, aut magnorū tuberculorū abscessum, aut dolores ex abscessu uehemētes, aut colligationes humorū ex calore. Iudicationes & remissiones eorū quæ febrē ardētem significant, longiorē morbū faciunt. Si uero fortia fuerint, mors plerūq; sequitur. Reliquæ uero ardētes securę desinūt septimo aut decimoquarto die. Solet aut̃ & ad lypuriā deuenire, & detinet maxime xl. dies, & in Epialum trāsit. & lypuria eadē quoq; die corripit ac dimittit. Fit aut̃ & capitis dolor. Si uero lypuria nō dimiserit in xl. diebus, sed producta fuerit, & dolor habuerit caput, et deslyret æger, ipsum purgato. Desinente uero febre ardente si accedat morbus regius, nō solet amplius exudare, neq; usquā alibi abscessum facere, sed sanus fit. Tertianā in septē circuitibus plerūq; iudicatur. Quibuscūq; in febribus intolerabilibus septima, aut nona, aut decimaquarta morbus regius accedit, bonum: si non dextrum præcordiū durū fiat. Sin minus, ambiguum. Acuti morbi in quatuordecim diebus plerūq; iudicātur. Sudores febricitātī si fiant tertia die, & v. & vii. & ix. & xi. & xiiij. & xxi. & xxxi. hi sudores morbos iudicant. Qui uero non sic fiunt, dolores significant. Concoctiones urinarum paula

tim maturefcētes, si in iudicatorijs diebus concoctæ fuerint, morbum solunt. Exemplū urinarū ulcera facere oportet. Nam ulcera si repurgantur pure albo, celerem curationē indicāt. Si uero in saniosos humores trāsmutentur, maligna sunt. Eodem modo & urinæ significāt. Si ex dolore tenues fiant, ex occasione ratiocinari oportet, ex qua morbus accessit, & hāc inspicere ubi sedatur. Nam hac deficiente, alijs signis qualia cōueniunt accedentibus, non putandū est morbo liberationē contingere. Si doluerit caput, & ex hoc febris accedat, et hinc nō sedetur: dolore non cessante febris nō iudicatur: & plurima talia iudicationis longæ sunt ad melius, etiam in his quæ ad sanitatē tendūt. In præcordijs tumores molles, & doloris exortes, & ad cōtactum cedentes, diuturniores qui dem iudicationes faciūt, minus autem horrendas tuberculis his cōtrarijs. Eodem modo habet & de tuberculis in reliquo uētre. Ex urinis si quidē id quod mictū est purum fuerit: subsidentiā uero albā ac leuem habuerit, diuturnior fit morbus, & minus q̄ optima secuta est hæc urina. Si uero & urina subrubra fuerit, & subsidentiā subrubra ac leuis: diuturniorē quidem hæc morbum q̄ prior significat, sed ualde salutarem. Quicūq; podagrici morbi fiunt, hi in quadraginta diebus ab inflāmatione liberi sedantur. Sed in his pleraq; longæ iudicationis ad melius sunt. Quæ ad mortē tendunt, in die ac nocte iudicātur, quæ uidelicet debilitationis signa sunt, uelut epoti medicamenti, exturbationis alui & sursum, & deorsum, anxietatis, & aliorū huiusmodi. Si igitur horū signa in die ac nocte submoueātur, bene est, sin minus, lethalia esse putāda sunt. Sudores pelsimi sunt frigidi, & circa ceruicē fientes. Hi enim mortes, & morborū longitudinē præsignant. Alui egestionēs uarię, diuturniores quidē sunt nigris & alijs lethalibus egestionibus, nihilo uero minus perniciosæ. Sunt autē tales, ramentosæ, biliosæ, cruētæ, prasinæ, nigræ: & aliquādo simul omnes prodeūt, aliquādo singulæ particulatim. Urina si quandoq; pura micta fuerit, quandoq; subsidentiā albam ac leuem habens, diuturnæ tales sunt, & minus securæ q̄ optima urina. Si uero fulua ac tenuis fuerit urina multo tēpore, periculū est ne sufficere homo possit, donec cōcocta fuerit urina, & si aliās superstitis futuri signa fuerint, his abscessum affore expecta ad locos infra septū tranfuerfum. In febribus si mutationes habeat urina, diuturnitatē temporis significat, & necesse est ægrotū mutari & ad deteriora, & ad alterā partē. Si urine ab initio nō si miles fuerint, sed ex tenuibus crassæ fiāt, & penitus tenues, tales ægre iudicant ac incōstantes sunt. Frigidi sudores cū acuta quidē febre, lethales sunt: cū mitiore uero, longitudinē morbi significāt. Et ubi in corpore caliditas aut frigiditas, hic morbus est, & ubi in toto corpore mutatiōes repētinæ fiūt, & si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio trāsmutetur, morbi lōgitudinē significat. Si febricitātī sudor accedat, febre nō deficiēte, malū, prologatur enim morbus, & humiditatē significat. Febricitātī frigidi sudores accedētes, longā febrem significāt. Sudor multus intēperate fiens sano, morbū significat, etatē minorē, hyeme maiorē. Alui egestionēs si in idē cōcedere accōsistere permiseris, uelut ramēta subsidēt: si pauca, modicus est morbus: si multa, multus: his infusum per clysterē adhibere cōducit. Quibus uero in egestionē in ferne bilis atra subsidet, si copiosior, maior est morbus. Si paucior, minor. Si uenæ pulsarint, & facies sana fuerit, et præcordia nō mollia, sed in tumore eleuata;

diutur

diuturnus est morbus, & absq; cōuulsione nō soluitur, aut multa sanguinis ex naribus fluxione, aut uehemēti dolore. Et palpitationes in manibus, diuturnæ febris signum sunt, aut breuis iudicationis in deterius: & in his pleraq; quæ ad mortem tendunt. His qui breuissimo tempore perituri sunt, maxima signa ab initio fiunt. Nam & difficulter spirant, & noctu nō dormiunt, & signa periculosa præ se ferunt. In febre cōtinua si quis quarta die & septima affligatur, & undecima non iudicatus fuerit, plerūq; perit. Quicūq; à distentione antrosum ac retrorsum corripuntur, in quatuor diebus pereūt. Si uero hos effugerint, sani fiunt. In febribus ardentibus si accedat morbus regius, & singultus quinto die, lethale est. Recidivæ fiunt in his, quibus desinētibus uigiliæ fortes accedunt, aut somni turbulenti, aut corporis robur, aut dolores uniuscuiusq; membri: & quibus febres sedantur, neq; signis solutorijs fientibus, neq; in iudicatorijs diebus: & si deficiēte febre, & sudore accedente, urinā fuluā minxerint, albam subsidentiam habentē, his febris recidiuā eadem die expectā. Hæc uero recidiuæ quinto die iudicantur extra periculum, & si ex iudicatione facta urinā rubicundā, rubram subsidentiam habentem minxerint, etiā his recidiua febris fit eadem die: & pauci ex hac seruantur. Quum recidit febris ardens, plerūq; etiam exudat. Et si reuertens tot diebus detineat quot prius, etiā tertio recidiuat, si non impari die dimiserit reuersa. Plerūq; si crudæ sint urinæ, & alia signa nō secundum rationē eueniant, morbus in die iudicatoria recidiuat. Quādoq; uero etiā reuertitur in die iudicatoria, his talibus relictis. Abscessus circa aurē quibus circa iudicationē fientes non suppurantur, his submotus recidiua fit, iuxta recidiuarū rationem, similis circuitui: in his spes est ad articulos abscessum fieri: aut urina crassa, qualis est alba in quartanis de lassatorijs, liberat ab abscessu. Quibusdā uero horū etiam sanguinis è naribus eruptiones fiunt. Hæc autē sanguinis eruptio quartanas nō soluit, neq; morbos qui per alui egestionē sanari solent. Atrabiliarijs cum phrenitide occupatis, si hæc morrhoides oboriātur, bonum est. Quicūq; insaniunt sua sponte liberati ex morbis, his insaniā soluit dolor ad pedes progressus, aut ad pectus: aut tussis uehemens oborta. Si uero horū nihil fiat, insania soluta oculi priuatio cōtingit. Qui lingua offendunt, & labiorū non sunt potentes, si hæc sedata fuerint, suppurati fiunt. Dolorem in locis infernis fortem soluit aut surditas, aut sanguis multus è naribus erūpens. Insania magni morbi ex more fientis solutio. Quibus in febribus ardentibus coxarum dolor, oculorū distortio, aut cæcitas, aut testium tumores, aut mammarū eleuatio, febrem ardentem soluit, aut etiam sanguinis ex naribus fluxus. In febre ardenti si insuper corripit rigor, exudare solet. A febre ardente occupato, rigore accedente, solutio fit. Quibus in febribus ardētibus tremores oboriuntur, mētis emotio soluit. Quibus in febribus aures obsurduerūt, his nō soluta febre, insanire necesse est. Soluit autē sanguis ex naribus erūpens, aut aluus biliosa egerēs, aut dysenteria accedens, aut coxarū, aut genuū dolor. Quibus febribus rigor accedit, febris soluitur. Quibus dolores fiunt derepēte, præcordiū eleuatū est superne, & si circa spuriā costā graues dolores fiunt, his solutio fit uenæ sectio, & purgatio deorsum. Non enim corripit febris uehemēs locis impotentib. In his qui ab hydrope detinētur, si aquositas per uentrē ad uesicā aut uentrē fluat, solutio

solutio fit. Si à pituita alba occupato, alui profluuium uehemens accedat, solutio fit. Qui ab alui profluuiio multo tempore detinentur unà cum tussis, non liberantur, si non dolores uehementes in pedibus inciderint. Si uero uult cōmutatio ac correctio naturæ fieri, postquam nō amplius aluus profluit, aut inanem omnem egestionē habuerit, status foras prodeūtes accidunt. Nullū itaq; humorē manifestum habent. Quare ei qui ita habet secure exhibere scies ea quæ cōueniunt, & si uoluulus accedat, uinū frigidum multum meracū paulatim bibendū dato, donec somnus, aut crurū dolor fiat. Soluit autē & febris, aut dysenteria. Caput circūcirca dolenti ac ægrotanti, si pus per aures, aut per nares fluxerit, soluit morbū. Quibuscunq; sanis derepēte dolores oboriuntur in capitibus, & statim uoce priuantur, ac stertūt, hi in septem diebus pereūnt, si nō febris corripuerit. Caput circūcirca dolenti, quicunq; ex supernis locus doluerit, cucurbitam affige. Soluit dolor ad coxas, & genua, & anhelatio, quicquid horum factū fuerit. Lippienti ab alui profluuiio corripī, bonum est.

A conuulsione aut distentione neruorum uexato, febris accedens soluit morbum. Si à febre detentum conuulsio corripuit, sedatur febris eadem die, aut postridie, aut tertia die.

HIPPOCRATIS COI-LIBER

DE DIEBUS IUDICATORIIS, IANO

Cornario Medico Physico interprete.



AGNAM artis partem esse arbitror, de his quæ recte scripta sunt posse cōsiderationem facere ac iudicāre. Qui enim hoc nouit, & his utitur, non uidetur mihi in arte multū falli posse. Oportet autem exacte perdiscere unāquamq; temporum constitutionem, & quēq; morbū, & qui morbus sit bonus, & qui periculosus, aut in constitutione, aut in morbo, & qui morbus longus sit & lethalis; & qui longus, & nō perniciosus ad uitam, & qui acutus ac lethalis; & qui acutus, & superesse sinens. Ex his enim ordinem dierum iudicatoriorum cōsiderandi ac prædicendi facultas datur, & ex his cognoscere datur, quibus, & quādo, & quomodo uictum præscribere oportet. Maximum itaq; signum in ægrotis qui uicturi sunt, si non præter naturam fuerit febris ardens, & alij morbi eodē modo. Nihil enim horrendum, neq; lethale fit in his quæ secundum naturam sunt. Secundum est, si non etiā ipsū tempus simul cum morbo impugnet. Plerunq; enim hominis natura, uniuersi potestatem non superat. Postea uero si partes circa faciem gracilescent: & uenæ in manibus, & in oculorum angulis, & supercilijs quietem habeant, quū prius non quieuisent. Huic si uox fuerit debilior, & sit leuior: & spiritus rarior ac tenuior, sequenti die remissio morbi contingit. Hæc igitur considerāre oportet ad iudicationes: & an bifida linguæ pars uelut salua alba obducitur, et an in summa lingua hoc idem factum sit, uerum minus. Si quidem igitur parua hæc fuerint, ad tertium diem remissio fit morbi. Si uero aliquanto crassior sit salua, in crastinum. Si uero adhuc crassior, eadem die. Quin & albas oculorum partes in principio morbi denigrari necesse

neceſſe eſt, ſi inualuerit morbus. Hæc igitur ſi puræ ſiant, perfectam ſanitatē indicant: leniter quidem, tardius: uehementer autem, citius. Cæterum acuti morbi ſiunt à bile, ubi in hepar influxerit, & ad caput conſtiterit. Hæc igitur patitur hepar. Intumeſcit & expanditur ad ſeptū tranſuerſum præ tumore. & ſtatim ad caput dolor irruit, maxime uero ad tempora: & æger auribus non acute audit. Sæpe etiam oculis non uidet. & horror, & febris corripit. Atq; hæc quidem ab initio morbi ipſi ſiunt ex interuallo, quādoq; uehementer, quādoq; minus. Quanto autē morbi tempus magis progreſſum fecerit, tanto maior fit dolor in corpore: & pupillæ oculorū ſparguntur, & obtuſe uident: & ſi digiti admoueris ad oculos, non ſentit, eo quod non uidet. Quod autē non uideat, inde cognoueris. Non enim niſtat dum digitus admouetur: et floccos aufert de ſtragulis, ſi quidem uiderit, pediculos eſſe putās. Et quum hepar magis expaſſum fuerit ad ſeptum tranſuerſum, delirat: et ob oculos ſibi obuerſari putat reptilia, & alia omnigena animantia fera, & milites armatos pugnantes, & ipſe aduerſus ipſos pugnare ſibi uidetur: & talia dicit uelut qui uideat, et egreditur, et miſatur ſi quis ipſum egredi non permittat. Et ubi ſurrexerit, crura eleuare nō poſteſt, ſed cadit. Pedes autem ſemper ſiunt frigidi. Et quum dormierit, exilit à ſomno, & inſomnia horrēda uidet. Hoc autem cognoscimus, quod ab inſomnijs exilit ac perterretur, poſtquā ad ſanam mentem rediit. Exponit enim inſomnia hæc, qualiaq; & corpore fecit, & lingua loquutus eſt. Atq; hæc quidem ſic patitur. Quandoq; uero etiam uoce priuatur, per totam diem ac noctem multum aceruatum ſpiritum respirans. Poſtquā uero delyrare ceſſauit, ſtatim ad ſanam mentem redit. Et ſi quis ipſum interroget, recte reſpondet, & intelligit omnia quæ dicuntur. Deinde rurfus paulo poſt in iſdem afflictionibus iacet. Hic morbus accidit maxime in peregrinatione, & ſi alicubi deſertam uiam iuerit, & timor ipſum ex ſpectro corripuerit. Corripit etiam alijs modis. Tetani tres.

Siquidem ex uulnere tetanus, ſiue diſtentio neruorum antroſum ac retroſum fiat, æger hæc patitur. Maxillæ cōgelantur ac rigent, uelut ligna: & os aperire non poſteſt, & oculi frequenter lachrymantur ac diſtrahuntur, & dorſum riget, & crura flectere non poſteſt, neq; manus, neq; ſpinam. Quum uero lethalis fuerit, potus & cibi quos prius accepit, per nares quandoq; redeunt. At oſtiſthotonos, retroſum ſiens diſtentio, reliquā quidem eadem ægro inducit ut plurimum, ſit autem quum in ceruice tendines retroſum ægrotarit. Aegrotat autem, ab angina, aut ab uua, aut locis circa tonſillas ſuppuratis. Aliquando etiam à capite febribus accedentibus conuulſio ſuccedit. Iam uero etiam à uulneribus. Hic trahitur in poſteriore partem, & præ dolore dorſum ac peſtora rigent, & eiulat. Hic conuellitur uehementer, ut uiu detineatur à præſentibus, ne è lecto excidat. Alius tetanus eſt minus lethalis prioribus. ſit autem ab iſdem, & totum corpus ſimiliter conuellitur. Febris ardens prædictis non ſimiliter ſit. Vrit enim ſemel ut neceſſe ſit febricitare. Sitis igitur multa hominem tenet, & febris uehemens. lingua uero rumpitur exaſperata, & ſicca ſit: & color ipſius primum quidem pallidus eſt, uelut ſolet, progreſſu uero temporis nigreſcit. Et ſi quidem in principijs nigreſcat, citiores iudicationes ſiunt. Si uero poſterius, diuturniores. Coxendicum morbus ex his maxime cauſis ſit in pleriq; ſi quis diutius in ſole uerſetur, & cōxendices fuerint calfacti,

& humor qui est in articulis, à calore fuerit resiccatus. Quòd autem id quòd resiccatur condensatur ac còpingitur, hoc magnū signum est. Aeger enim articulos uertere ac mouere nō potest, præ dolore articulorum, & eo quod uerticula sunt còpacta. Dolet autem magis lumbos & uerticula ea quæ sunt ex obliquo coxarū, & genua. Consistit autē dolor plurimo tempore in inguinibus simulq; coxendicibus, acutus ac æstuosus. & si quis ipsum erigat aut transmoueat, euolat præ dolore q̃ maxime potest. Quandoq; uero etiam cōuulsio accedit, & rigor ac febris. Fit autē à bile & pituita, fit etiā à sanguine: & dolores cōsimiles ab omnibus morbis: & rigor & febris aliquando corripit debilis. Morbus regius acutus est, & celeriter occidēs. Color totus malicorij speciē refert, & est uehementer cum uirore pallidus, quemadmodū lacerti cū uirore pallidiores. cōsimilis autem est cutis. Et in urina subsidet uelut eruum fuluum: & febris & horror debilis habet. Quandoq; etiā stragula habere non sustinet, sed mordetur ac raditur matutino tēpore, ubi nondū cibum accepit, internis partibus. Deinde uiscera plerunq; fugunt. Et si quis erigat ipsum aut alloquatur, nō sustinet. Hic ut plurimū moritur intra quatuordecim dies. Has autem ubi effugerit, sanus fit.

Peripneumonia talia facit. Febris uehemens tenet: & spiritum densum ac calidum respirat: & anxietas adest, & impotētia, & iactatio, & dolores circa scapulas, & clauiculas, & mammam: & grauitas in pectoribus, & delyriū. Quandoq; uero doloris exors æger est, donec tussire inceperit. Verum hic morbus diuturnior ac difficilior illo est. Saluam autē albam & spumofam primū spuit. Lingua flaua est, uerum progressu temporis nigrescit. Si quidem igitur in principio nigrescat, citius morbus finitur. Si uero posterius, tardius. Tandem uero etiam rumpitur lingua, & si digitum apponas inhæret. At liberationē à morbo significat lingua, similiter uelut in pleuritide. Hæc autem patitur æger minimū diebus quatuordecim. ad summū unā & uiginti: & tussit hoc tempore uehementer: & unā cū tussi purgatur, primū quidem salua multa ac spumosa. Septima uero & octaua die, ubi febris in uigore fuerit, & humida sit peripneumonia, crassior: sin minus, non. Nonā uero & decima, cū uirore pallida ac subcruenta. Duodecima autem usq; ad decimā quartam, multa & purulenta. Atq; hoc in his cōtingit, quorum naturæ & corporis affectiones humidæ sunt, & morbus fortis est. Quorum uero & natura, & morbi constitutio sicca est, in his minus.

Cæterum de iudicatorijs diebus, etiam iam ante à me dictum est. Iudicantur autem febres quarta die, septima, undecima, decimaquarta, decima septima, uigesima prima. Ex his autē acutis quædam etiam trigesima, Deinde quadragesima. postea sexagesima. Quum uero hos numeros exceßerint, diuturna iam febrium constitutio fit.

HIPPOCRATIS COILIBER

APHORISMORVM, IANO CORNARI

rio Medico Physico interprete.

SECTIO PRIMA.



VITA breuis, ars longa, tempus præceps, experimentum periculosum, iudicium difficile. Oportet autem non solum seipsum exhibere quæ decent facientem, sed etiam ægrotum, & præsentem, & quæ externa sunt. **II.** In perturbationibus alui, & uomitibus sponte fientibus, si quidē qualia purgari oportet purgetur, confert, & leuiter ferunt: Sin minus, uice uersa. Sic & uasorum uacuatio, si quidē talis fuit, qualis fieri debet, confert, et bene ferunt: Sin minus, uice uersa. Inspecere itaque oportet regionem, & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus conuenit, aut non.

III. In exercitiis boni habitus ad summum progressi periculosi sunt, si in extremo fuerint. Non enim manere possunt in eodem, neque quiescere. Quum uero non quiescant, non amplius in melius augescere possunt, reliquum est igitur ut in deterius. Ob has igitur causas bonam habitudinem non tarde soluere confert, quo corpus rursus renutritionis principiumumat. Neque uero collapsiones ad extremum ducere oportet, periculosum enim est: Sed qualis natura est eius qui perferre debet, ad hoc ducere conuenit. Similiter autem & euacuationes ad extremum ducentes, periculosæ sunt, & rursus renutritiones in extremo existentes, periculosæ sunt.

IIII. Tenuis & exactus uictus, & in longis semper affectionibus, & in acutis, ubi non expedit, periculosi sunt, & rursus uictus ad extremam tenuitatem progressi, difficiles sunt. Et repletiones ad extremum progressæ, difficiles sunt.

V. In tenui uictu delinquentes ægrotantes, magis læduntur. Omne enim delictum quod committi poterit, magis magnū committitur in tenui quam in paulo pleniore uictu. Quapropter etiam in sanis periculosus est ualde tenuis, & constitutus, ac exactus uictus, quoniam delicta grauius ferunt. Ob hoc igitur tenuis & exactus uictus periculosus est magis quam paulo plenior.

VI. Ad extremos morbos, exacte extremæ curationes, optime sunt.

VII. Vbi igitur peracutus est morbus, statim etiam extremos labores habet, & extreme tenuissimo uictu uti necesse est. Vbi non, sed pleniore uictu uti licet, intantum subdescendendum est, inquantum morbus extremis mollior fuerit.

VIII. Quum in uigore fuerit morbus, tunc tenuissimo uictu uti necesse est.

IX. Simul autem coniectare oportet, an æger ex uictu durare possit ad morbi uigorem: & utrum ille prius deficiet, & ex uictu durare non possit: aut morbus prius deficiet ac obtundetur.

X. Quibus igitur statim uigor est, his statim tenuis uictus exhibendus est. Quibus uero uigor posterius, his ad illud, & paulo ante illud tempus, subtrahendus est. Antea uero mitius æger uictu tractandus est, quo durare possit.

XI. In exacerbationibus subtrahere uictum oportet. Nam apponere noxa est. Ex quibus per circuitus exacerbationes fiunt, in exacerbationibus subtrahere oportet.

XII. Exacerbationes & constitutiones indicabunt morbi, & tempora anni, & circuituum inter se collata incrementa

mēta, siue quotidie, siue alternis diebus, siue per amplius temporis intervalum fiant. Sed & ex apparentibus indicia fiunt, uelut in pleuriticis, si sputum statim appareat incipiente morbo, ipsum abbreviat. Si uero posterius appareat, producit. & urinæ, & alui egestionis, & sudores apparentes indicant & ægre & facile iudicandos, & breues & longos morbos. xiiii. Senes facillime ieiunium ferunt. Deinde ætate consistentes. Minime adollescentes. omnium uero minime pueri, & inter hos ipsos qui ipsi seipsis alacriores fuerint.

xiiii. Qui crescunt, plurimum habent innatum calorem. plurimo igitur opus habent alimento. Sin minus, corpus consumitur. Senibus autem modicus est calor: quapropter paucis fomitibus opus habent, à multis enim extinguuntur. Ob hanc etiam causam febres senibus non similiter acutæ fiunt. Frigidum est enim ipsorum corpus. xv. Ventres hyeme & uere natura calidissimi sunt, & somni longissimi: Quapropter in his temporibus alimenta plura exhibenda sunt. Nam innatum calorem ampliore tunc habent, alimentum igitur ampliore opus habent. Signum sunt ætates, & athletæ.

xvi. Victus humidi omnibus febricitantibus cōferunt. Maxime uero pueris, & alijs ita ali adfuetis. xvii. Et quibus semel aut bis, & plus aut minus, & ex parte exhibere oportet, considerandum est. Dandum uero etiam aliquid est tempori, & regioni, & ætati, & consuetudini. xviii. Aestate & autumno cibos difficillime ferunt, hyeme facillime, deinde uere.

xix. His qui in circuitibus exacerbantur, nihil dare oportet, neque cogere: sed auferre de appositionibus ante iudicationes. xx. Quæ iudicantur, & iudicata sunt integre, neque mouere oportet, neque nouare, neque medicamentis, neque alijs irritamentis, sed sinere. xxi. Quæ ducere oportet, quò maxime repunt, eò ducere oportet, per conuenientes locos.

xxii. Concocta medicamentis aggredi oportet, & mouere non cruda, neque in principijs, si non turgant. Plurima uero non turgent.

xxiii. Quæ prodeunt nō multitudine æstimare oportet, sed quandiu prodeant qualia oportet, & facile æger ferat. Et ubi opus est, usque ad animi deliquium ducere oportet: & hoc facere, si sufficiat æger. xxiiii. In acutis affectionibus raro etiam in principijs medicamentis uti oportet: atque hoc facere diligēti prius æstimatione facta.

xxv. Si qualia oportet purgari, purgantur, confert & facile ferunt. Contraria uero difficulter.

SECTIO SECVNDA.

IN quo morbo somnus laborem facit, mortale: Si uero somnus proffit, non lethale. ii. Vbi somnus delirium sedat, bonum est. iii. Somnus, uigilia, utraque modum excedentia, malum. iiii. Non satietas, non fames, neque aliud quicquam bonum est, quod naturæ modum excedat.

v. Lassitudines spontaneæ denunciant morbos. vi. Quicumque aliqua corporis parte dolentes, plerumque dolores nō sentiunt, his mens ægrotat. vii. Quæ multo tempore attenuantur corpora, lente reficere oportet. Quæ uero breui, breui. viii. Si ex morbo cibum capiens quis non fiat ualidus, significat quòd corpus uberiore alimēto utitur, Si uero cibum non accipiente hoc contingat, nosse oportet quòd euacuatione opus habet.

ix. Corpora quocumque quis purgare uoluerit, fluida facere oportet.

x. Non pura corpora quāto plus nutries, tanto magis lædes. xi. Facilius est repleri potu, q̄ cibo. xii. Quæ relinquuntur in morbis post iudicationem, recidiuā faciunt. xiii. Quibuscunq; iudicatio fit, his nox grauis antē exacerbationem. Quæ uero sequitur plerunq; tolerabilior est.

xiiii. In alui fluxionibus, mutationes egestionum profunt, si non ad prauas mutantur. xv. Vbi fauces ægrotāt, aut tubercula in corpore nascuntur, excretionēs cōsiderare oportet. Si enim biliosæ fuerint, corpus simul ægrotat. Si uero similes sanis fiant, tutū est corpus nutrire. xvi. Vbi fames, non oportet laborare. xvii. Vbi cibus præter naturam copiosior ingressus fuerit, morbum facit. Ostendit autem sanatio. xviii. Eorū quæ aceruatiim & uelociter nutriūt, ueloces etiam egestionēs sūt. xix. Acutorum morborum non omnino tutæ sunt prædictiones, neq; mortis, neq; sanitatis. xx. Quibus dum iuuenes sunt, uētrēs humidi sunt, his senescentibus resiccantur. Quibus uero dum iuuenes sunt, uētrēs siccī sunt, his senescentibus humectātur. xxi. Famē uini potus soluit. xxii. Quicunq; morbi ex repletionē fiunt, euacuatio sanat. Et quicunq; ex euacuatione, repletio. Et aliorum contrarietas. xxiii. Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur. xxiiii. Septimæ quarta index est. Alterius hebdomadæ octaua principiū est. Consideranda uero est undecima. Hæc enim quarta est secundæ hebdomadæ. Considerāda rursus decima septima. Ipsa enim est quarta quidē à decima quarta, septima uero ab undecima. xxv. Aestiuæ quartanæ plerunq; sunt breues. Autumnales uero longæ, & maxime quæ ad hyemem pertingunt. xxvi. Febrem in conuulsione fieri melius est, q̄ conuulsionem in febre. xxvii. His quæ non secundum rationē leuant, non oportet credere, neq; ualde timere ea quæ praua fiunt præter rationē. Pleraq; enim ex talibus inconstantia sunt, & non ualde permanere, neq; morari solent. xxviii. Febricitantium non omnino leuiter, permanere, & nihil minui corpus, aut etiam magis q̄ pro ratione colliquari, malum est. Illud enim morbi longitudinē, hoc uero debilitatē significat. xxix. Incipientibus morbis si quid mouendum uidetur, moue: uigentibus uero, quietem agere melius est. xxx. Circa principia & fines, omnia debiliora sunt. Circa uigores uero, fortiora. xxxi. Ex ægritudine bene cibum accipienti, nihil augescere corpus, malum est. xxxii. Plerūq; omnes male habentes, ab initio cibum bene capientes, & nihil augescentes, ad finem rursus cibos fastidiūt. At ab initio quidē ualde cibum auersantes, postea uero bene cibum capientes, melius liberantur. xxxiii. In omni morbo ualere mente, & bene se habere ad ea quæ exhibentur, bonum. contrarium uero, malum.

xxxiiii. In morbis minus periclitantur, quorum naturæ, & ætati, & habitui, & tempori morbus magis affinis fuerit, q̄ hi quibus nō affinis in aliquo horum existit. xxxv. In omni morbo partes circa umbilicum & pectinem, crassitudinem habere melius est. At uehēmēs tenuitas & eliquatio, praua est. Periculosa uero talis est etiā ad infernas purgationes. xxxvi. Sana habentes corpora, dum medicamētis purgātur, cito exoluūtur. Itemq; qui prauo cibo utuntur. xxxvii. Qui bene habent corpore, eos operosum est medicamentis purgare. xxxviii. Paulo deterior & potus & cibus, ue-

rum iucundior, melioribus quidem, sed iniucundioribus præferendus est.

XXXIX. Senes iuuenibus plerūq; minus ægrotant. Quicūq; uero ipsis fiunt morbi diuturni, ut plurimum commoriuntur. XL. Raucedines & grauedines, in ualde senibus non concoquuntur. XLI. Qui exoluuntur sæpe & fortiter, absq; manifesta causa, derepente moriuntur. XLII. Syderationem fortem quidem soluere, impossibile est, debilem uero, non facile.

XLIII. Ex his qui strangulantur, & submerguntur, nondum autem mortui sunt, non reconvalescunt quibus spuma circa os fuerit. XLIII. Crassum si admodum secundum naturam, magis cito moriuntur, q̃p graciles. XLV.

Iuuenibus comitialibus liberationē faciunt mutationes, maxime ætatis, & regionum, & uiciūm. XLVI. Duobus doloribus simul fientibus, non secundum eundem locum, uehementior obscurat alterum. XLVII. Circa generationem puris, dolores & febres magis contingunt, q̃p facto iam ipso.

XLVIII. In corporis motu, quum inceperit dolere, quiescere statim lassitudinem eximit. XLIX. Adsueta consuetos labores ferre, etiam si fuerint debiles, aut senes, non adsuetis fortibus ac iuuenibus facilius ferūt. L. Ex multo tempore consueta, etiam si deteriora fuerint, inconsuetis minus molestare solent. Oportet igitur etiam ad inconsueta transmutationem facere. LI.

Multum & repēte euacuare, aut replere, aut calefacere, aut frigefacere, aut omnino quomodocūq; corpus mouere, periculosum est. Et omnis multitudo naturæ contraria est. Quod uero paulatim fit, tutum est, tum aliās, tum si ex altero ad alterum transitus fit. LII. Omnia secundum rationem facienti, si non secundum rationem fiant, non transire oportet ad aliud, manente eo quod uisum est ab initio. LIII.

Quicūq; uētres humidos habēt, dum quidem iuuenes sunt, melius degunt q̃p hi qui siccos habent. Verum ad senectutem deterius degunt. Resiccantur enim plerūq; senescentibus. LIIII. In corporis magnitudine iuuentutem quidem degere, liberale est & non indecorum. Senectutem uero degere, inutile, & deterius paruitate.

SECTIO TERTIA.

I **M**utationes temporum maxime pariunt morbos, & in temporibus magnæ mutationes frigoris, aut caloris, & reliqua iuxta rationem hoc modo. II.

Naturarum aliæ quidem ad æstatem, aliæ uero ad hyemem, bene aut male se habent. III. Morborum aliq; ad aliā tempora, bene aut male se habent: & ætates quædam ad tēpora, & regiones, & uictus. IIII.

In temporibus quum eadē die, modo calor, modo frigus fit, autūnales morbos expectare oportet. V.

Austri auditū grauantes, caliginosi, caput grauātes, torpidi, dissoluentes. Quum hic præualuerit, talia in morbis patiuntur. Si uero Aquilo fuerit, tussēs, fauces, alui duræ, urinæ difficultates, horrores, dolores costarum, pectoris. Quum hic dominatur, talia in morbis expectare oportet.

VI. Quū æstas sit ueri similis, sudores in febribus multos expectare oportet. VII.

In siccitatibus febres acutæ fiunt, & si quidem annus amplius talis fuerit, qualem constitutionem fecerit, plerūq; tales etiam morbos expectare oportet. VIII.

In constantibus temporibus, si tempestiue tempestiua reddantur, morbi constantes & iudicatu facilissimi fiunt. In inconstantibus autem, incōstantes, & qui difficulter iudicātur. IX.

In autumno morbi acutissimi

cilissimi, & omnino mortiferi, Ver autem saluberrimum & minime lethale.

x. Autumnus tabidis malus. xi. De temporibus si quidem hyems sicca & aquilonaris fuerit, Ver autem pluuiosum & australe, necesse est æstate febres acutas, & lippitudines, & dysenterias fieri, maxime mulieribus, & uiris natura humidioribus.

xii. Si uero hyems australis, & pluuiosa, ac clemens fiat, Ver autem siccum & aquilonare, mulieres quidem quibus partus ad uer instat, ex omni occasione abortiunt. Quæ uero pariunt, impotentes ac morbosos pueros pariunt, ita ut aut statim pereant, aut tenues ac morboosi uiuant. Alijs autem dysenteria, & lippitudines siccae fiunt. Senioribus uero defluxiones breui perimentes.

xiii. Si uero æstas sicca fiat & aquilonaris: Autumnus autem pluuiosus & australis, capitis dolores ad hyemem fiunt, & tussis, & raucedines ac grauedines: quibusdam etiam tabes.

xiiii. Si uero aquilonaris & aquarum exors autumnus fuerit, his quidem qui humidas naturas habent, & mulieribus commodus erit. Reliquis uero fient lippitudines siccae, & febres acutæ, & grauedines. Quibusdam uero etiam atræ bilis.

xv. Ex anni uero constitutionibus, in summa siccitates pluuiosis salubriores sunt, & minus lethales.

xvi. Morbi in pluuiosis quidem plerumque fiunt, febres longæ, & alui fluxiones, & putredines, & comitiales, & syderationes, & anginæ. In siccitatibus uero, tabes, lippitudines, arthritides, urinae stillicidia, & dysenteria.

xvii. Quotidianæ uero constitutiones, aquilonares quidem corpora compingunt, & robusta, & ad motum idonea, & bene colorata, & melius audientia faciunt, & uentres resiccant, & oculos mordeant, & si circa thoracem aliquis dolor prius est, magis affligunt. Australes autem corpora dissoluunt, & humectant, & grauem auditum, ac capitis grauitatem, & uertigines faciunt. In oculis autem & corporibus ægrum motum, & uentres humectant.

xviii. Secundum tempora uere quidem & prima æstate, pueri, & qui his ætate coherant, optime degunt, & maxime sani sunt. Æstate uero & autumnno aliquandiu, senes. Reliquo autumnno & hyeme, mediam ætatem habentes.

xix. Morbi omnes quidem in omnibus temporibus fiunt. Quidam tamen magis in quibusdam ipsorum & fiunt, & exacerbantur.

xx. Vere infantiæ, & atræ bilis, & comitiales, & sanguinis fluxiones, & anginæ, & grauedines, & raucedines, & tussis, & lepræ, & impetigines, & uirilgines, & pustulæ ulcrosæ plurimæ, & tubercula, & morbus articularis.

xxi. Æstate uero & quidam ex his, & febres continuæ, & ardentis, & tertianæ plurimæ, & quartanæ, & uomitus, & alui profluvia, & lippitudines, & aurium dolores, & oris exulcerationes, & pudendorum putredines, & papulæ sudorosa.

xxii. Autumnno autem & ex æstiuis multi, & febres quartanæ, & erroneæ, & splenes, & hydropes, & tabes, & urinae stillicidia, & intestinorum leuitates, & dysenteria, & coxendices, & anginæ, & anhelationes, & uoluuli, & comitiales, & infantiæ, & atræ bilis.

xxiii. Hyeme uero pleuritides, peripneumoniæ, grauedines, raucedines, tussis, dolores pectorum, laterum ac lumborum, capitis dolores, uertigines, syderationes.

xxiiii. In ætatibus autem talia contingunt, paruis ac recens natis pueris feruida oris ulcera, uomitus, tussis, uigilia, timores, umbilici inflammatio-

nes, aurium humiditates. xxv. Ad dentitionem uero accedentibus; gingiuarum pruritus, febres, conuulsiones, alui profluuia, & maxime ubi dentes caninos producunt, tum crassissimis pueris, tum his qui duros uentres habent. xxvi. Senioribus autem fientibus, tonsillæ, uerticuli in occipitio intro luxationes, anhelationes, calculorū generationes, lumbrici rotundi, ascarides, uerrucæ, tumores glandularum circa aures oblongi satyriasmī appellati, strumæ, & alia tubercula, maxime uero prædicta. xxvii. Adhuc uero senioribus, & ad pubertatem accedentibus, pleraque ex his, & febres diurnæ magis, & ex naribus sanguinis fluxiones. xxviii. Plurimæ uero affectiones pueris iudicantur, partim in quadraginta diebus, partim in septem mensibus, partim in septem annis, partim ad pubertatem accedentibus. Quæ uero permanserint pueris affectiones, & non exolutæ fuerint circa pubertatem, aut foemellis circa mensium eruptiones, diurnæ fieri solent. xxix. Iuuenibus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutæ, comitiales, & alij morbi, maxime uero prædicti. xxx. His uero qui hanc ætatem exceßerunt, anhelationes, pleuritides, peripneumonix, lethargi, phrenitides, febres ardentes, alui profluuia diurna, bilis fursum ac deorsum effusiones, dysenterix, intestinorum leuitates, hæmorrhoides. xxxi. Senibus autem spirandi difficultates, & defluxiones cum tussi, urinæ stillicidia, urinæ difficultates, articularum dolores, nephritides, uertigines, syderationes, mali habitus, pruritus totius corporis, uigiliæ, alui, oculorum, & narium humiditates, uisus hebetudines, glaucedines, auditus grauitates.

SECTIO QUARTA.

I **P**Rægnantes medicamentis purgare oportet, si turget humor, quarto mense, & usque ad septimum. Minus uero has, luniores autem & seniores foetus uereri oportet. ii. In medicamentorum usu, talia ex corpore ducere oportet, qualia etiam sponte prodeuntia commoda sunt. Contrario autem modo prodeuntia, sedare. iii. Si qualia oportet purgari, purgetur, cōfert & facile ferunt. Contraria uero difficulter. iiii. Medicamentis purgare oportet æstate quidē, superiores magis: hyeme uero inferiores. v. Sub canē, & ante canem, operosæ sunt medicamentorū purgationes. vi. Graciles, & facile uomētes, fursum purgare oportet, uitantes hyemem. vii. Difficulter uomentes, & moderate carnosos, deorsum, uitantes æstatem. viii.

Tabescentes autē, uitantes superiores. ix. Atrabiliarios uero plenius inferiores. Eadem ratione cōtraria apponens. x. Purgare oportet in ualde acutis, si humor turget, eadem die. Morari enim in talibus malum est. xi.

Quibus tormina, & circa umbilicū dolores, & lumborum dolor, qui neque a medicamento, neque aliàs soluitur, in hydropem siccū firmatur. xii. Quibus alui intestinorum leuitate affecti, eos hyeme fursum purgare malum est.

xiii. Ad ueratrum, his qui nō facile fursum purgantur, ante potionem corpora humectare oportet, ampliore cibo ac quiete. xiiii. Vbi biberit quis ueratrum, ad motus quidem corporū magis ducere oportet, ad somnos autem & quietē minus. Declarat autē nauigatio, quod motus corpora turbat. xv. Vbi uolueris magis ducere ueratrum, corpus moueto. Vbi uero sistere, somnum facito

facito, & ne moueto. xvi. Veratrū periculosum est sanas carnes habentibus. Conuulsionem enim inducit. xvii. Sine febre existenti cibi fastidium, & oris uentriculi morsus, et uertigo, & os amarescens, medicamento sursum purgante opus habere significat. xviii. Dolores supra septū transversum, qui purgatione opus habent, sursum uersus purgatione indigere significant: qui uero infra, deorsum. xix. Qui in medicamentorum potionibus, dum purgantur non sitiunt, non cessant prius q̄ sitierint. xx. Non febrientibus si fiat tormen, & genuum grauitas, & lumborum dolor, deorsum medicamento purgante opus habere significat. xxi. Egestionis alui nigrae, uelut sanguis niger, sua spōte p̄deuntes, & cum febre, & sine febre, pessimae sunt. & quanto plures fuerint peiores colores, tanto magis malū est. Cum medicamento uero melius, & quanto plures fuerint colores, non malum est.

xxii. Quibuscūq; morbis incipiētibus, si atra bilis, aut sursum aut deorsum prodierit, lethale est. xxiii. Quibuscūq; ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex uulneribus, aut aliās attenuatis, atra bilis, siue qualis sanguis niger subierit, postridie moriūtur. xxiiii. Dysenteria si ab atra bile inceperit, lethalis est. xxv. Sanguis sursum quidem qualiscūq; fuerit, malus est. deorsum uero bona sunt nigra subeūtia. xxvi. Si à dysenteria occupato, ueluti carnes subierint, lethale est. xxvii. Quibus in febribus sanguinis multitudo erumpit undecūq; his in refectionibus alui humectantur. xxviii. Quibus biliosae sunt egestionis, surditate fiēte cessant. Et quibus surditas, biliosis egestionibus fiētib; cessat. xxix. Quibus in febribus sexta die rigores fiūt, difficulter iudicant. xxx. Quibus exacerbationes fiunt, quacūq; tandem hora febris dimiserit, si postridie eadē qua antea hora corripuerit, difficulter iudicant. xxxi. Delassatis in febribus, ad articulos, & circa maxillas maxime, abscessus fiunt. xxxii.

Quibuscūq; resurgētibus ex morbis, si quid doluerit, isthic abscessus fiūt. xxxiii. Sed & si ante morbū quid doluerit, isthic morbus incumbit. xxxiiii. Si à febre occupato, tumore nō existēte in faucibus, suffocatio derepente cōtingat, lethale est. xxxv. Si à febre occupato collū repente obuersum fuerit, & uix deglutire poterit, tumore nō existente, lethale est.

xxxvi. Sudores febricitanti si inceperint, boni sunt tertia die, & quinta, & septima, & nona, & undecima, & decimaquarta, & decima septima, & uigesima prima, & uigesima septima, & trigesima prima, & trigesima quarta. Hi enim sudores morbos iudicāt. Qui uero non sic fiunt, dolorē significant, & longitudinē morbi, & recidiuas. xxxvii. Frigidi sudores cū acuta quidē febre fiētes, mortē significant: cū mitiore uero, morbi longitudinē. xxxviii.

Et ubi in corpore sudor est, illic morbū esse declarat. xxxix. Et ubi in corpore frigiditas aut caliditas, isthic morbus est. xl. Et ubi in toto corpore mutationes, & si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio fiat, longitudinem morbi significat. xli. Sudor multus ex somno, citra manifestā causam fiens, corpus multo alimēto uti significat. Si uero cibum nō capiēti hoc fiat, significat quod euacuatione opus habet. xlii. Sudor multus, frigidus aut calidus, semper fluens: frigidus maiore, calidus mino-

rem morbum significat. XLIII. Febres quæcunq; non intermittentes per tertiam fortiores fiunt, magis periculosa sunt. Quocunque uero modo intermiserint, quod sine periculo sint significant. XLIII. Quibus febres longæ, his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt. XLV. Quibus tubercula ad articulos, aut dolores, ex febribus longis fiunt, hi pluribus cibis utuntur. XLVI. Si rigor incidat febre non intermittente, agrote iam debili, lethale est. XLVII. Excreationes in febribus non intermittentibus, liuidæ, & cruentæ, & graueolentes, & biliosæ, omnes malæ sunt. At probe secedentes, bonæ, & per alui egestionem, & per urinas. Si uero non aliquid ex conducentibus excernatur per hos locos, malum est. XLVIII. In non intermittentibus febribus, si externæ quidem partes frigida fuerint, internæ uero ardeant, ac sitim habeant, lethale est. XLIX. In febre non intermittente, si labium, aut palpebra, aut superciliū, aut oculus, aut nasus distorqueatur: aut non uideat, aut non audiat, æger iam debilis existens, quicquid horum fiat, propinqua mors est. L. Vbi in febre non intermittente, difficultas spirandi, & delirium fit lethale est. LI. In febribus abscessus, qui non soluantur ad primas iudicationes, longitudinem morbi significant.

LII. Quicunq; in febribus, aut alijs ægritudinibus, ex uoluntate lachrymantur, nihil absurdi est. Qui uero non ex uoluntate, absurdum. LIII.

Quibus circa dentes in febribus uiscosa adherent, his fortiores febres fiunt.

LIIII. Quibus plerunq; tussis sicca, parum irritantes, in febribus ardentibus, hi non ita ualde siticulosi sunt. LV. Ex glandularum tumoribus febres omnes malæ sunt, exceptis diarijs. LVI. Febricitanti sudor oboriens febre non remittente, malum. Moram enim trahit morbus, & multam humiditatem significat. LVII. A conuulsione, aut distentione neruorum uexato, febris accedens morbum soluit. LVIII. A febre ardente occupato, rigore accedente, solutio fit. LIX. Tertianæ exacta in septem circuitibus ad summum iudicatur. LX. Quibus in febribus aures obscuruerunt, his sanguis e naribus effusus, aut alius exturbata, morbum soluit.

LXI. Febrilem si non in diebus imparibus febris dimiserit, reciduas re solet. LXII. Quibus in febribus morbus regius fit ante septimum diem, malum. LXIII. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres soluantur. LXIII. Quibus in febribus morbus regius septima, aut nona, aut decimaquarta accedit, bonum, si non præcordium dextrum durum fiat: sin minus, non bonum. LXV. In febribus circa uentrem æstus uehemens, & cordis siue oris uentriculi morsus, malum. LXVI. In febribus acutis conuulsiones, & circa uiscera dolores fortes, malum. LXVII. In febribus, ex somnis, timores aut conuulsiones, malum. LXVIII. In febribus spiritus offendens, malum. Conuulsionem enim significat. LXIX.

Quibus urinæ crassæ, grumosa, pauca, non sine febribus, ubi copia ex his successit, tenuis prodest. Tales autem maxime prodeunt his quibus ab initio, aut breui subsidentiam habent. LXX. Quibus in febribus urinæ conturbata, uelut iumentis, his capitis dolores, aut adsunt, aut aderunt. LXXI.

Quibus septima die morbi iudicatur, his nubeculam habet urina, quarta die rubram

rubram, & alia secundum rationem. LXXII. Quibus urinæ pellucidæ, albæ, malæ. Maxime autem in phreniticis comparēt. LXXIII. Quibus præcordia eleuata, permurmurantia, lumborum dolore accedente, his alui hæmectantur, si non flatu erumpant, aut urinæ copia prodeat. In febribus autem hæc. LXXIII. Quibus spes est abscessum fore ad articulos, eos liberat ab abscessu urina multa, & crassa, & alba prodiens, qualis in febribus laboriosis quarta die quibusdam fieri incipit. Si uero etiam ex naribus sanguis eruperit, breui admodum soluitur. LXXV. Si quis sanguinem aut pus mingat, rhenum aut uesicæ ulcerationē significat. LXXVI. Quibus in urina crassa existente, carunculæ paruæ, aut ueluti pili simul exeunt, his de rhenibus excernuntur. LXXVII. Quibus in urina crassa existente, fursuracea quædam simul minguntur, his uesica scabie affecta est. LXXVIII. Qui sua sponte sanguinem mingunt, his in rhenibus uenæ ruptionem significat.

LXXIX. Quibus in urina, arenosa subsidunt, his uesica calculo laborat.

LXXX. Si quis sanguinem mingat, & grumos, & urinæ stillicidium habeat, & dolor incidat in imum uentrem, & ani ac scorti intercapedinem, partes circa uesicam affectæ sunt. LXXXI. Si quis sanguinē & pus mingat, & squamas, & odor grauis sit: uesicæ exulcerationem significat. LXXXII.

Quibus in urinaria fistula tuberculum nascitur, his suppuratione facta & eruptione, solutio fit. LXXXIII. Mictio noctu multa fiens, medicam alui egestionem significat.

SECTIO QVINTA.

I. **C**onuulsio ex ueratro lethalis est. II. Ex uulnere cōuulsio lethalis est.

III. Sanguine multo effuso cōuulsio aut singultus accedēs, malū.

III. Ex superflua purgatione, conuulsio aut singultus accedens, malum.

V. Si quis ebrius derrepente uoce priuetur, conuulsus moritur, si nō febris corripuerit, aut ubi ad horam qua crapulæ soluuntur peruenit, loquatur.

VI. Quicunq; a distentione antrorsum ac retrorsum corripuntur, in quatuor diebus pereunt. Si uero has effugerint, sani fiunt. VII. Quibuscunq; morbi comitiales ante pubertatem fiunt, trāsmutationem habent. Quibuscūq; uero uiginti quinque annos natis fiunt, his plerunq; cōmoriuntur. VIII.

Quicunq; pleuritici fientes, in quatuordecim diebus non repurgantur, his ad suppurationem transitio fit. IX. Tabes maxime fit ætatibus, ab anno decimo octauo, usq; ad trigessimum quintum. X. Quicunq; anginam effugiunt, his ad pulmonē uertitur, & in septem diebus moriuntur. Si uero has effugerint, suppurati fiunt.

XI. Qui tabe infestātur, si sputum quodcūq; tussiendo reiecerint, graue olet, dum prunis iniicitur, & capilli de capite defluunt, lethale est. XII. Quibuscūq; tabe laborantibus capilli de capite defluerint, hi alui profluuiū accedente moriuntur. XIII. Quicunq; sanguinē spumofum spuunt, his ex pulmoneeductio fit. XIII. A tabe occupato, alui profluuiū accedens, lethale est. XV. Quicunque ex pleuritide suppurati fiunt, si in quadraginta diebus repurgati fuerint, ab ea die qua ruptio facta fuerit, liberantur. Si uero non, ad tabem transeunt. XVI. Calida frequenter ea utentibus, has noxas inducit, carniū effoecinationem, neruorum impotentiam, mentis torporem, sanguinis eruptiones, animi deliquia.

Hæc quibus mors. xvii. Frigida uero conuulsiones, antrorsum ac retrorsum distentiones, nigrores, rigores febriles. xviii. Frigida inimica ossibus, dentibus, neruis, cerebro, spinali medullæ. Calida uero grata.

xix. Quæcuncq; perfrigerata sunt, excalefacere oportet, præterquam à quibus sanguis erumpit, aut erupturus est. xx. Vlcerebus frigida mordax, cutem obdurat, dolorem non suppurantem facit, nigrefacit, rigores febiles inducit, conuulsiones, distentiones. xxi. Quandoq; uero in distentione sine ulcere, iuueni carnosio, ætate media, frigida multæ affusio, caloris reuocationem facit. Calor autē hæc soluit. xxii. Calida suppuratoria est, non in omni ulcere, maximum signum ad securitatem, cutem mollit, attenuat, dolores eximit, rigores, conuulsiones, distentiones mitigat, capitis grauitatem soluit. Plurimum autem cōfert ad ossium fracturas, maxime denudatas. Ex his autem maxime his qui in capite ulcera habent, & his quæ à frigiditate moriuntur, aut ulcerantur, & herpetibus exedētibus, sedi, pudendo, utero, uesicæ. His calida grata est & iudicans. Frigida uero inimica & occidens. xxiii.

In his frigida uti oportet unde sanguis erumpit, aut erupturus est: non super ipsas partes, sed circa ipsas unde fluit. Et quæcuncq; inflammationes, aut flammei ardores, ad ruborem & subcruentum colorem ex nouo sanguine tendunt, ad eas ipsas. nam ueteres nigrefacit. & ad sacrum ignem non exulceratum. nam exulceratum lædit. xxiiii. Frigida uelut nix, glacies, peccatori inimica sunt, tussis mouēt, & sanguinis eruptiones, ac defluxiones inducunt. xxv. Tumores in articulis, & dolores absq; ulcere, & podagricas affectiones, & conuulsiones: Horum plurima frigida multa affusa leuat, & attenuat, & dolorem soluit. Torpor enim dolorem soluit. xxvi. Aqua quæ cito calefit, & cito perfrigeratur, leuissima est. xxvii. Quibus bibendi appetentiæ noctu ualde sitientibus, si obdormierint bonum est.

xxviii. Menses ducit aromatum suffitus. Multis autem modis etiam ad alia commodus esset, si non capitis grauitatem induceret. xxix.

Prægnantes medicamentis purgare oportet, si turget humor, quarto mense, & usque ad septimum. Minus uero has. Iuniores uero & seniores foetus uereri oportet. xxx. Mulierem uterum gerentem ab aliquo acuto morbo corripi, lethale est. xxxi. Mulier uterum gerens secta uena abortit, & magis si maior fuerit foetus. xxxii. Mulieri sanguinem uomenti, mensibus erumpentibus solutio fit. xxxiii. Mulieri mensibus deficientibus, sanguinem ex naribus fluere, bonum est. xxxiiii. Mulieri uterum gestanti si aluus multum fluxerit, periculum est ut abortiat.

xxxv. Mulieri quæ ab uteri strangulationibus uexatur, aut difficulter parit, sternutatio accedens, bonum. xxxvi. Mulieri menses decolores, & non eodem tempore semper fientes, purgatione opus esse significant.

xxxvii. Mulieri uterum gestanti, si mammae repente graciles fiant, abortit. xxxviii. Mulieri uterum gestanti, si altera mamma gracilis fiat, gemellos gestans alterum abortit. Et si quidem dextera gracilis fiat, masculinum: si uero sinistra, foemellam. xxxix. Si mulier quæ neque prægnans est, neque peperit, lac habet: menses ipsius defecerunt. xl. Mulieribus quibuscuncq; ad mammas sanguis colligitur, insaniam significat.

XL I. Mulierem si uelis cognoscere, an pręgnans sit, ubi dormire uolet, æquam mulsam bibendam dato. Et si quidem tormen habuerit circa uentrę, pręgnans est. Si uero nō, pręgnans non est. **XL II.** Mulier pręgnans si quidem masculum gestat, bene colorata est. Si uero foemellam, male colorata.

XL III. Si mulieri pręgnanti ignis facer in utero fiat, lethale est.

XL IIII. Quęcunq; pręter naturam tenues existentes, uterum gestant, abortiunt priusquam crassescant. **XL V.** Quęcunq; uero moderate corpus habentes, abortiunt bimestres & trimestres, sine causā manifesta, his uteri acetabula muco plena sunt, & non possunt foetum continere prę grauitate, sed abruptitur.

XL VI. Quęcunq; pręter naturam crassę existentes, non concipiūt in utero, his omentum osculum uteri comprimit, & priusquam attenuentur, non concipiunt. **XL VII.** Si uterus in coxam incubens, suppuratus fuerit, necesse est curationem ex medicamentis, per linamenta ipsi adhibere.

XL VIII. Foetus masculi quidem in dextris, foeminę uero in sinistris magis. **XL IX.** Ut secundę excidant, sternutatorio indito, nares & os apprehendito. **L.** Mulieri menses si cohibere uoles, cucurbitam q̄ maximam ad mammas appone.

LI. Quęcunq; uterum gestant, his osculum uterorum clausum est. **L II.** Mulieri uterum gestanti si multum lac ex mammis fluat, debilem foetum significat. Si uero solidę fuerint marmę, saniorum foetum significant.

L III. Quę corrupturę sunt foetus, his marmę graciles fiunt. Si uero rursus durę fiant, dolor erit aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, & non corrumpunt. **L IIII.** Quibus os uterorum durū est, his necesse est osculū uterorum clausum esse.

L V. Quęcunq; in utero habentes, a febris corripuntur, & fortiter attenuantur sine manifesta occasione, difficulter pariunt & periculose; aut abortum facientes periclitantur. **L VI.** In fluxu muliebri, conuulsio & animi deliquium si accedat, malum est.

L VII. Mensibus pluribus prodeuntibus morbi fiunt, & non prodeuntibus, ab utero morbi contingunt. **L VIII.** Ex intestino recto, & utero inflammato, urinę stillicidium accedit, & ex rhenibus suppuratis urinę stillicidium accedit. Verum ex hepate inflammato, singultus accedit.

L IX. Si mulier in uentre non concipit, uelis autem scire an conceptura sit, uestimentis circumtectam ex infernis suffito. Et si quidem odor per corpus tibi procedere uideatur ad nares & ad os, scito quod ipsa non propter seipsam infœcunda est.

L X. Si mulieri uterum gestanti purgationes prodeunt, impossibile est foetum sanum esse. **L XI.** Si mulieri purgationes non prodeunt, neq; horrore, neque febre accedente: uerum cibi fastidia ipsi accidunt, hanc in uentre habere existimato.

L XII. Quęcunq; frigidos ac densos uteros habent, non concipiunt: & quęcunq; humidos habent uteros, nō concipiunt. Extinguitur enim in ipsis genitura. Et quęcunq; siccis magis & adustis, Prę inopia enim alimēti corrumpitur semen. Quęcunq; uero ex utrisq; temperamentum habent moderatū, tales fœcundę fiunt.

L XIII. Similiter autem in masculis. Aut enim propter corporis raritatem, spiritus extra fertur, ut semen non deducat; aut propter densitatem, humor non procedit foras; aut propter frigiditatem non cōcalescit, ut ad hunc locum cōgregetur; aut propter caliditatē, hoc idē cōtingit.

L XIII. Lac dare caput dolētib; malū. Malū etiam

etiam febricitantibus, & quibus præcordia eleuata permurmurantia, & siticulis. Malum & quibus bilioſæ alui egeſtiones in febris acutis ſunt, & quibus ſanguinis multi egeſtio facta eſt. Conuenit autem exhibere tabeſcentibus, non ualde multum febricitantibus, & in febris longis, debilibus, nullo ex prædictis ſignis præſente, ſed præter rationem conſumptis. LXV. Quibus tumores in ulceribus apparent, non ualde cõuelluntur, neque inſaniunt. His autem derepente diſſipatis, retroſum quidem cõuulſiones & diſtentiones ſiunt: antroſum uero, inſaniæ, lateris dolores acuti, aut ſuppuratio, aut dyſenteria, ſi rubicundi magis fuerint tumores. LXVI. Si in uulneribus fortibus ac prauis, tumor non appareat, magnum malum. LXVII. Tumores laxi boni, crudi mali. LXVIII. Dolenti poſteriorem capitis partem, uena recta in fronte ſecta prodeſt. LXIX. Rigores incipiunt, mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dorſum ad caput. Verum & uiris magis poſteriore corporis parte quàm anteriore, uelut ex cubitis ac femoribus. Sed et cutis rara eſt. Indicat autem pilus. LXX. Qui à quartanis corripuntur, non ita ualde à contuſionibus corripuntur. Si uero prius corripiantur, & quartana in ſuper accedat, ceſſant. LXXI. Quibus cutis circũtenditur arida ac dura, hi ſine ſudore moriuntur. Quibus uero laxa ac rara, cum ſudore moriuntur.

LXXII. Morbo regio laborantes, non ita ualde fluctuoſi ſunt.

SECTIO SEXTA.

I. IN diuturnis inteſtinorum leuitatibus, ructus acidus accedens, qui prius non erat, ſignum bonum. II. Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior, morboſius ſani ſunt: quibus uero uice uerſa, ſalubrius.

III. In longis inteſtinorum leuitatibus, cibi faſtidium malum, & cum febre peius. IIII. Ulcera circũglabra maligna ſunt. V. Dolores in lateribus, & in pectoribus, & in alijs partibus, an multum differunt, conſiderandum eſt.

VI. Rhenum affectiones, & quæ circa ueſicam conſiſtunt, operoſe ſanantur in ſenibus. VII. Dolores circa uentrem ſientes, ſublimes quidem leues ſunt, non autem ſublimes, fortiores. VIII. Hydropicis ſientia ulcera in corpore, non facile ſanantur. IX. Latæ puſtulæ non ualde pruriginosæ ſunt.

X. Caput dolenti & circũdolenti, pus, aut aqua, aut ſanguis fluens per nares, aut os, aut aures, ſoluit morbum. XI. Atrabiliarijs, & Phreniticis, hæmorrhoides accedentes, bonum. XII. Hemorrhoides ſananti diuturnas,

ſi non una ſeruata fuerit, periculum eſt hydropem aut tabem accedere.

XIII. A ſingultu detento, ſternutationes accedentes ſoluunt ſingultum.

XIIII. Ab hydropede detento, ubi aqua in uenis ad uentrem cõfluxit, ſolutio fit. XV. A profluuiio alui longo correpto, uomitus ſponte accedens, ſoluit alui profluuium. XVI. A pleuritide aut peripneumonia occupato, alui profluuium accedens, malum. XVII. Lippientem alui profluuium corripit, bonum. XVIII. Veſicam diſſectam habenti, aut cerebrum, aut cor,

aut ſeptum tranſuerſum, aut tenue aliquod inteſtinum, aut uentriculum, aut hepatis, lethale eſt. XIX. Vbi diſſectum fuerit os, aut cartilago, aut neruus,

aut genæ pars tenuis, aut præputium, neque augeſcit, neque coaleſcit.

XX. Si in uentrem ſanguis effuſus fuerit præter naturam, neceſſe eſt ſuppurari. XXI. In inſanientibus, uaricibus aut hæmorrhoidibus accedenti

bus

- bus, infaniæ solutio fit. **XXII.** Quicumq; dolores ex dorso ad cubitos descendunt, uenæ sectio soluit. **XXIII.** Si timor & tristitia multo tēpore perseueret, atrabiliariū hoc signum est. **XXIII.** Si ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit. **XXV.** Ignem sacrum ab externis intro cōuertere, non bonū; ab internis uero extra, bonū. **XXVI.** Quibus in febribus ardētib; tremores facti fuerint, mentis emotio soluit.
- XXVII.** Quicumq; suppurati aut hydropici, secantur aut uruntur, hi pure aut aqua acruata effluente, omnino moriuntur. **XXVIII.** Eunuchi nō laborant podagra, neq; calui fiunt. **XXIX.** Mulier non laborat podagra, si non menses ipsi defecerint. **XXX.** Puer non laborat podagra, ante ueneris usum. **XXXI.** Oculorū dolores meri potus, aut balnei, aut fomentum, aut uenæ sectio, aut medicamenti potio soluit. **XXXII.** Balbi ab alui profluuiio longo maxime corripuntur. **XXXIII.** Acidum ructū habentes, non ita ualde pleuritici fiunt. **XXXIII.** Quicumq; calui sunt, his uarices magnæ non fiunt. Quibuscūq; uero caluis uarices accedunt, hi rursus hirsuti fiunt. **XXXV.** Hydropicis tussis accedens, malum.
- XXXVI.** Vrinæ difficultatem soluit uenæ sectio. Secare uero oportet internas. **XXXVII.** Ab angina detento tumorem fieri foris in collo, bonum est. **XXXVIII.** Quibuscūq; occulti cancri fiunt, eos nō curare melius est. Si enim curantur, citius moriuntur. Si uero non curentur, multū tempus perdurant. **XXXIX.** Conuulsio fit aut à repletionē, aut euacuationē. Sic autem & singultus. **XL.** Quibuscūq; citra præcordiū dolores fiūt, absq; inflammationē, his febris accedens dolorem soluit. **XLI.** Quibuscūq; suppuratum quid in corpore existens, significationem de se nō præbet, his propter puris aut loci crassitudinē, sui significationē nō exhibet. **XLII.** Morbo regio laborantibus hepar durū fieri malum est. **XLIII.** Quicumq; splenicā dysenteria corripitur, his longa accedente dysenteria, aut hydrops accedit, aut intestinorum leuitas, & pereunt. **XLIII.** Quibuscūq; ex urinæ stillicidio uoluulus accedit, hi in septem diebus pereunt, si non febre accedente urina satis fluxerit. **XLV.** Ulcera quacūq; annua fiūt, aut diutiori tempore durant, necesse est os abscedere, & cicatrices cauas fieri. **XLVI.** Quicumq; gibbosi ex anhelatione, aut tussi fiunt, ante pubertatem pereunt.
- XLVII.** Quibuscūq; uenæ sectio, aut medicamentū conducit, his uere uenam secare, aut medicamentū purgans exhibere conuenit. **XLVIII.** Splenicis dysenteria accedens, bonum. **XLIX.** Quicumq; podagrici morbi fiunt, hi sedata inflammationē, in quadraginta diebus restituntur. **L.** Quibus cerebrum dissectum fuerit, his necesse est febrem, & bilis uomitū accedere.
- LI.** Quibuscūq; sanis derepente dolores fiūt in capite, & statim uoce intercepta iacent, ac stertunt, in septē diebus pereunt, si non febris apprehendat. **LII.** Considerare uero oportet etiam sub oculis apparitiones in somnis. Si enim albæ partis quid subapparuerit, non commissis palpebris, si id nō ex alui profluuiio, aut medicamenti potione fuerit, malum signum & ualde lethale est.
- LIII.** Desipientiæ cum risu quidem fientes, securiores sunt; cum studio uero serio, periculosiores. **LIIII.** In acutis affectionibus, quæ cū febre fiūt, luctuosæ respirationes, malū. **LV.** Podagricæ affectiones uere & autūno

ut plurimum mouentur. **LVI.** Atrabiliarijs morbis periculosi humorum à loco ad locum decubitus, aut syderationē corporis, aut cōuulsionem, aut infaniam, aut cæcitatem significant. **LVII.** Syderationes uero maxime sunt, ætate à quadragesimo anno usq; ad sexagesimum. **LVIII.** Si omentū exciderit, necesse est putreferi. **LIX.** Quibuscunq; à coxendicum morbo uexatis, coxa excidit, & rursus incidit, his mucī accedunt. **LX.** Quibuscūq; à coxendicum morbo diuturno uexatis, coxa excidit, his crus tabescit, & claudicant, si non uisti fuerint.

SECTIO SEPTIMA.

I **IN** acutis morbis frigiditas extremarum partium, malum. **II.** Ex osse lægotante, caro liuida, malum. **III.** Ex uomitu singultus, & oculi rubicundi, malum. **IIII.** Ex sudore horror, non bonum. **V.** Ex infania, dysenteria, aut hydrops, aut mentis emotio, bonum. **VI.** In morbo diuturno cibi fastidium, & meracæ alui egestionēs, malum. **VII.** Ex multo potu rigor, & delyrium, malum. **VIII.** Ex tuberculi intus ruptione, exolutio, uomitus, & animi deliquium fit. **IX.** Ex sanguinis fluxu delyrium, aut etiam conuulsio, malum. **X.** Ex uoluulo uomitus, aut singultus, aut conuulsio, aut delyrium, malum. **XI.** Ex pleuritide peripneumonia, malum. **XII.** Ex peripneumonia phrenitis, malum. **XIII.** Ex ardoribus uehementibus conuulsio, aut distentio, malum. **XIIII.** Ex plaga in caput, stupor, aut delyrium, malum. **XV.** Ex sanguinis sputo, puris sputum, malum. **XVI.** Ex puris sputo, tabes, & fluxus, malum. Postquam uero sputum suppressitur, moriuntur. **XVII.** Ex hepatis inflammatione singultus, malum. **XVIII.** Ex uigilia conuulsio, aut delyrium, malum. **XIX.** Ex ossis denudatione, ignis sacer. **XX.** Ex igne sacro, putrefactio, aut suppuratio. **XXI.** Ex forti pulsu in ulceribus, sanguinis eruptio. **XXII.** Ex dolore diuturno partium circa uentrem, suppuratio. **XXIII.** Ex meraca alui egestionē, dysenteria. **XXIIII.** Ex ossis dissectione delyrium, si ad uacuum usq; processerit. **XXV.** Ex medicamenti potione conuulsio, lethale. **XXVI.** Ex dolore forti partium circa uentrem, frigiditas extremarum partium, malum. **XXVII.** Mulieri uterum gerenti, tenesmus accedens abortire facit. **XXVIII.** Quodcunq; os prælectum fuerit, aut neruus in corpore, neq; augetur, neq; coalescit. **XXIX.** Si à pituita alba detento, uehemens alui profluuium accedat, soluit morbum. **XXX.** Quibuscunq; spumosa alui egestionēs sunt in alui profluuijs, his de capite pituita defluit. **XXXI.** Quibuscūq; febricitantibus, in urinis subsidentiæ crassiores polentæ partes referentes fiunt, longū morbum significant. **XXXII.** Quibus uero biliosæ subsidentiae, ab initio tenues, acutum morbum significant. **XXXIII.** Quibuscunq; disparatæ urinae sunt, his uehemens turbatio in corpore est. **XXXIIII.** Quibus in urinis bullæ superstant, rhenum affectiones significant, & morbum fore longum. **XXXV.** Quibus pingue est id quod superstat, & acruatum, his rhenum affectiones, easq; acutas significat. **XXXVI.** Quibus uero iam nephriticis ex rhenibus affectis prædicta signa accidunt, doloresq; circa musculos spinales fiunt, si quidem circa externos locos fiant, etiam abscessus extrinsecus futu-

ros expecta. Si uero dolores magis circa internos locos fiant, etiam abscessus magis intus fore expecta. XXXVII. Quicumque sanguinem uomunt, sine febre quidem, salutare est: uerum cum febre, malum. Perfrigerantibus autem & adstringentibus curare oportet. XXXVIII. Defluxiones in uentre suppurantur. XXXIX. Si quis sanguinem mingat, & grumos, & urinæ stillicidium habeat, & dolor incidat in ani ac scotti intercapedinem, & imum uentrem ac pectinem, partes circa uesicam ægrotare significat. XL. Si lingua derепente impotens fiat, aut aliqua corporis pars syderata, atrabiliarium tale existit. XLI. Si senioribus nimium purgatis singultus accedat, non bonum est. XLII. Si febris non à bile habeat, aqua multa calida in caput affusa, febris solutio fit. XLIII. Mulier ambidextra non est. XLIII. Quicumque suppurati uruntur, si quidem pus purum fluat & album, euadunt. Si uero subcruentum, & carnosum, ac grauolens, pereunt. XLV. Quicumque hepar suppuratum uruntur, si quidem pus purum fluat, & album, superstites euadunt. In tunica enim pus his inest. Si uero uelut amurca fluat, pereunt. XLVI. In doloribus oculorum, ubi merum bibendum disti, & multa calida lauisti, uenam secato. XLVII. Hydropicum si tussis uexet, desperatus est. XLVIII. Urinæ stillicidium, & urinæ difficultatem, uini potus & uenæ sectio soluit. Secare uero oportet internas. XLIX. Ab angina detento, tumor & rubor in pectore accedens, bonum. Foras enim uertitur morbus. L. Quibuscumque corruptum fuerit cerebrum, in tribus diebus pereunt. Si uero has effugerint, sani fiunt. LI. Sternutatio fit ex capite, percalescente cerebro, aut uacuo quod est in capite perhumescente. Aer enim qui intus est, foras erumpit, strepitum uero edit, quia transitus est ipsi per angustum. LII. Quibuscumque hepar circumcirca dolet, his febris accedens soluit dolorem. LIII. Quibuscumque sanguinem de uenis auferre conducit, his uere uenam secare conuenit. LIII. Quibus inter uentrem & septum transuersum pituita conclusa est, & dolorem exhibet, non habens exitum ad neutrum uentrem, his per uenas ad uesicam conuersa pituita, morbi solutio fit. LV. Quibus hepar aqua repletum, ad omnetum eruperit, his uenter aqua impletur, & moriuntur. LVI. Anxietatem, oscitationem, horrorem, uinum aequali mensura aquæ ammixta potum soluit. LVII. Quibus in urinaria fistula tubercula fiunt, his suppuratione facta & eruptione, soluitur dolor. LVIII. Quibus cerebrum concussum fuerit ex aliqua causa, eos statim uoce priuari necesse est. LIX. Corporibus humidas carnes habentibus, famem inducere oportet. fames enim corpora siccatur. LX. Vbi in toto corpore mutationes, & corpus perfrigeratur, & rursus calefcit, aut color alius ex alio mutatur, longitudinem morbi significat. LXI. Sudor multus, calidus aut frigidus, semper fluens, humorem abducere oportere significat, forti quidem superne, debili uero, inferne. LXII. Febres non intermittentes, si per tertiam fortiores fiant, periculosæ sunt. Quocumque uero modo intermiserint, sine periculo esse significat. LXIII. Quibus febres longæ sunt, his aut tubercula, aut ad articulos dolores fiunt. LXIII. Quibus tubercula diutina, aut ad articulos dolores, ex febribus fiunt, hi cibis pluribus utuntur. LXV. Si quis febricitanti cibum det, quem sano exhibet, sano quidem ros

bur, ægroto uero morbus est. LXVI. Quæ per uesicam prodeunt inspiciere oportet, an qualia sanis prodeunt. Quæ igitur minime similia his sunt, ea morbosiora sunt. Quæ uero similia sanis, ea minime morbosa. LXVII. Et quibus alui egestionibus, si stare permiseris, & non moueris, subsistunt ueluti ramenta: si pauca fuerint, modicus morbus est: si multæ, multus. His cõfert subpurgare aluum. Si uero non purgata aluo, sorbitiones dederis, lædes. & quanto plures dederis, magis lædes. LXVIII. Quibuscumq; cruda deorsum secedunt, ex atra bile sunt: si plura, copiosiore: si pauciora pauciore.

LXIX. Exscreationes in febribus non intermittentibus liuidæ, & cruentæ, & graueolentes, & biliosæ, omnes malæ sunt. At probe secedentes, bonæ, & per aluum, & per uesicam. & ubi sanè quid secedens constiterit non purgatum, malum. LXX. Corpora quocumq; quis purgare uoluerit, fluida facere oportet. Et si quidem sursum, sistere aluum. Si uero deorsum, humectare.

LXXI. Somnus, uigilia, utraq; modum excedentia, morbus.

LXXII. In non intermittentibus febribus, si externæ quidem partes frigida fuerint, internæ uero ardeant, & febris habeat, lethale est. LXXIII. In febre non intermittente, si labium, aut nasus, aut oculus, aut supercilium distorqueatur: aut non uideat, aut non audiat, æger iam debilis existens: quicquid horum fiat, propinqua mors est. LXXIII. Ex pituita alba, hydrops accedit. LXXV. Ab alui profluuiio, dysenteria. LXXVI. Ad dysenteriam, intestinorum leuitas accedit. LXXVII. Ex corruptione, abscessus ossis.

LXXVIII. Ex sanguinis uomitu, tabes, & puris purgatio sursum. Ex tabe, fluxus ex capite. Ex fluxu, alui profluuiū. ex alui profluuiio, suppressio purgationis sursum uersus. ex suppressione, mors. LXXIX. Qualia etiam sint in uesicæ ac alui egestionibus, inspicere oportet, et in his quæ per carnes excernuntur, & sicubi alibi à natura recedat corpus, si parum, paruus est morbus: si multum, multus: Si uero ualde multus sit recessus, lethale hoc est.

LXXX. Quicumq; supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non ita ualde sani fiunt. Minus enim periclitantur, quorum naturæ, & ætati, morbus affinis fuerit. LXXXI. Quibuscumq; in ægritudinibus oculi ex uoluntate lachrymantur, bonum. Quibus uero citra uoluntatem, malum.

LXXXII. Quibus in febribus quartanis sanguis ex naribus fluxerit, malum est. LXXXIII. Sudores in diebus iudicatorijs fientes, uehementes & ueloces periculosi sunt, qui expelluntur ex fronte uelut guttæ, & aquæ salientes, & frigidi ualde ac multi. Necesse est enim talem sudorem prodire cū uiolentia, & doloris excessu, ac expressione diuturna. LXXXIII. Ex morbo diuturno, etiam alui defluxus, malum. LXXXV. Quæcumq; non sanant

medicamenta, ea ferrum sanat. Quæ ferrum non sanat, ea ignis sanat. Quæ ignis non sanat, ea incurabilia putare oportet.

HIPPOCRATIS COILIBER

PRAENOTIONVM, IANO CORNAB

rio Medico Physico interprete.



MEDICVM prænotionem adhibere, optimum esse mihi uidetur. Prænoscens enim & prædicēs apud ægrotos, & præsentia, & præterita, & futura, & quæ ipsi ægroti relinquunt exponens, fidem utiq; fecerit, quod ægrotorum res magis cognoscat, quare audebunt homines seipsos medico committere. At uero curationem optime fecerit, ubi prænouerit futuras affectiones. Sanos equidem facere omnes ægrotos impossibile est, hoc enim præstâtius esset, quàm prænoscere in posterum euentura. Quandoquidem uero homines moriuntur, alij priusquàm medicum uocent, præ uiolentia morbi: alij uero accito etiã medico, derepente uita decedunt, quidam ubi unam uixerunt diem, quidam tempore paulo diutiore, anteaquàm medicus per artem aduersus singulos morbos repugnet: itaq; nosse oportet talium affectionum naturas, quantum corporum uires excedūt. Simul uero & si quid diuini in morbis inest, etiam huius prænotionem ediscere. Ita enim merito admirationi fuerit, & medicus bonus extiterit. Nã quos superstites manere possibile est, eos adhuc magis recte conseruare poterit, ex multo tempore antea consiliū adhibens ad singula. & tum morituros, tum seruandos, prænoscens ac prædicens, à culpa exors fuerit. Considerare porro hoc modo conuenit in morbis acutis, primū quidem faciem ægroti, an similis sit his quæ in sanis sunt, maxime uero an ipsa sibi ipsi. Ita enim optima fuerit. Si uero maxime contraria simili fuerit, horrendissima est. Talis autem fuerit, nasus acutus, oculi caui, tempora collapsa, aures frigida ac contractæ, & extremitates aurium auersæ, & cutis circa frontem dura & circumtenta ac arida, & color totius faciei pallidus, aut etiam niger, & liuidus, aut plumbeus. Siquidem igitur in principio morbi facies talis fuerit, & nondum ex alijs coniecturam facere licuerit, interrogare oportet, num uigilauerit homo, aut alui excrementa ualde liquida sint, aut fames aliqua ipsum teneat. Et si quidem horum aliquid confiteatur, minus graue esse putandum est. Iudicantur autem & cognoscuntur talia in die ac nocte, si ob has causas facies talis fuerit. Si uero nihil horū esse dicat, neq; in prædicto tempore considat, nosse conuenit mortis proximum esse. At si uetustiore existente morbo, aut triduo, aut quadriduo, talis fuerit facies, de his interrogare oportet, de quibus etiam prius iussi: itemq; alia signa considerare, & in uniuersa facie, & in corpore, & in oculis. Si enim lucem fugiant, aut inuoluntarie lacrymētur, aut distorqueantur, aut alter altero minor fiat, aut albas partes rubentes habeant, aut uenulas liuidas aut nigras in ipsis habeant, aut lemæ ac sordēs circa oculos appareant, aut etiam instabiles, aut eminentes, aut caui uehementer facti, aut squallentes & obscuri fuerint: aut color totius faciei alteratus fuerit. Hæc omnia mala & perniciofa esse putandum est. Considerare uero conuenit etiam oculorū subapparitiones in somnis. Si enim albæ quid partis subapparuerit, palpebris non commissis, si id non ex alui profluuio, aut medica-

menti potione fuerit, aut egrotus non ita dormire consueuerit, malum signum & ualde lethale est. Si uero retorta, aut contracta fiat, aut liuida, aut pallida palpebra, aut labium, aut nasus, cum aliquo ex alijs signis, morti proximū esse sciendum est. Lethale est etiam habere labia resoluta, & pendentia, & frigida, & albicantia facta. Decumbentem ægrotum à medico deprehendi conuenit in latus dextrum aut sinistrum, & manus, & collum, & crura modice inflexa habentem, & totum corpus flexibile situm. Ita enim plurimi ex sanis decumbunt. Optimi autem sunt decubitus qui sanorum decubitibus similes existunt. At uero supinū iacere, & manus, & collum, & crura extenta habere, minus bonum est. Si uero etiam pronus fiat, & de lecto ad pedes delabatur, magis horrendum est. Si uero nudos quoque pedes habere comperiat, nec admodum calidos: et manus, & collum, ac crura inæqualiter disiecta, ac nuda, malum est. Anxietatem enim significat. Lethale est & hiantem semper dormire: & crura supini iacentis ualde incuruata esse ac complicata. At in uentrem decumbere, si quis non sit adsuetus dum sanus fuit ita dormire, delirium significat, aut dolorem locorum circa uentrem. Ceterū erectum sedere uelle ægrum in morbi uigore, in omnibus morbis acutis malum est, pessimū aut in peripneumoniacis pulmone inflammato. Dentibus stridere in febribus, quibus nō familiare id est à pueris, furiosum ac lethale est. Verum prædicere oportet ab utrisque periculum futurū. Si uero etiam delirus hoc faciat, perniciosum ualde iam existit. Vlcus autem siue prius factum fuerit, siue in morbo accesserit, considerare oportet. Si enim periturus est homo, ante mortem liuidum ac siccum erit, aut etiam pallidum & siccum. At de manu latione ita sentio. Quæ in febribus acutis, aut peripneumonijs, aut in phrenitide, aut capitis dolore, ante faciem feruntur, et frustra uenantur, & festucas legunt, & floccos de uestibus euellunt, & de pariete paleas detrahunt, eas omnes malas & lethales esse. Spiritus densus dolorem significat, aut inflammationem, in locis supra septū transuersum. Qui uero magnus exspiratur, & per multum temporis interuallum, delirium indicat. Si uero frigidus è naso & ore exspiretur, ualde iam perniciosus est. Bonam autem spirationem ualde magnam uim habere ad salutē, in omnibus acutis morbis putare cōuenit, qui cum febribus sunt, & in quadraginta diebus iudicantur. Sudores optimi sunt in omnibus acutis morbis, qui in diebus iudicatorijs fiunt, & febrem perfecte submouent. Boni uero sunt, qui per totum corpus fientes, hominem facilius morbum ferre faciūt. Qui uero tale quid non effecerint, incommodi sunt. Pessimi autem sunt frigidi, & tantum circa caput & faciem fientes, & circa ceruicem. Hi enim cum acuta quidem febre, mortem præsignificant: cum mitiore uero, longitudinem morbi. Et qui per totum corpus fiunt, similiter significant his qui circa caput. At uero milioformes, & solum circa collum fientes, mali sunt. Qui uero cum guttis fiunt, & euaporant, boni sunt. Considerare porro conuenit sudores in summa, fiunt enim aliqui propter corporum exolutionem, aliqui propter inflammationis uigorem. Præcordium optimū est doloris exors, & molle, & æquale, tum in dextra, tum in sinistra parte. At inflammatum, aut dolorem exhibens, aut dextræ partes inæqualiter affectæ ad sinistras: hæc omnia obseruare oportet. Si uero etiam pulsus inerit in præcordio, turbationem significat aut delirium. Verum

oculos

oculos talium in superintueri oportet. Si enim oculi frequenter moueantur, furiosos hos fore timor est. Tumor in praecordio durus existens & dolorosus, pessimus quidem est si per totum fuerit praecordium. Si uero fuerit in altera parte, minus periculosus est in sinistra. Significat autem eiusmodi tumores, in principio quidem, mortem breui affuturam. Si uero uiginti dies transgrediat, tum febris detinens, tum tumor non confidens, ad suppurationem conuertitur. Cōtingit autē his in primo circuitu, etiā sanguinis eruptio ē naribus, & ualde prodest. Verū interrogare cōuenit, an caput doleant, aut hebetem uisum habeant. Si enim horū quid fuerit, ad eum locū repit. Magis tamen in iunioribus quinq; ac triginta annis, sanguinis eruptionē expectare conuenit. At uero molles tumores, & doloris exortes, et qui digito cedunt, diuturniores iudicationes faciunt, & minus illis sunt horrendi. Si uero trāsgrediat, sexaginta dies febris detinens, & tumor non confidat, suppuratū fore significat & hunc, & eum qui in reliquo uentre est eodem modo. Quicūq; igitur tumores dolorosi sunt, & duri, & magni, periculum mortis breui affore significant. Qui uero molles, & doloris exortes sunt, & digito compressi cedunt, diuturniores illis sunt. Ceterum tumores in uentre minus faciunt abscessus, quā hi qui sunt in praecordijs. Minime uero hi qui sub umbilico consistunt, ad suppurationem conuertuntur. Sanguinis uero eruptionem, ex supernis locis maxime expectare oportet. Omnium autem tumorū diuturnorum circa hos locos, suppurationes cōsiderare cōuenit. Sunt autē suppurationes hinc fientes hoc modo cōsiderandae. Quae cūq; extra uertuntur, optimae sunt, quae paruae sunt, & q̄ maxime foras eminentes, & in acutū fastigiatae. Quae uero magnae sunt, & latae, & minime in acutum fastigiatae, pessimae sunt. Quae cūq; uero intro rūpuntur, optimae sunt quae nihil cum externo loco cōmunicant, sed sunt cōtractae, & doloris exortes, & totus externus locus cōcolor apparet. At uero pus optimum est, si est album, & aequale, & leue, & q̄ minime graueolens. Quod uero huic contrariū est, pessimum est. Aquae porro inter cutem, ex acutis morbis obortae, omnes male sunt. Neq; enim à febre liberant, & ualde dolorosae sunt, ac lethales. Incipiūt autē plerūq; à laterū mollitudine, & à lumbis: aliqua uero etiā ab hepate. Quibus igitur à laterū mollitudine & lūbis, principia fiūt, his & pedes intumescūt, & alui profluvia diuturna ipsos tenent, quae neq; dolores ex laterū mollitudine à lumbis soluūt, neq; uentrem molliunt. Quibus cūq; uero ab hepate aquae in ter cutē oriuntur, his tusses tussiedicq; p̄optitudo accedit, & nihil memorabile expuūt, & pedes tumēt, & uenter nō egerit nisi dura, & coactus, & circa aluum fiūt tumores, aliqui in dextra, aliqui in sinistra parte, tum cōsistentes, tum confidentes. Caput autē & manus, & pedes, si frigida sunt, malum est, ubi & uenter, & latera calida sunt. Optimū uero est & totū corpus calidum esse, ac molle. Cōuertī autē cōuenit facile agrotū, & in attollēdo se leuē esse. Si uero grauis esse appareat, & reliquo corpore, & manibus, & pedibus, magis periculosum est. Si uero supra grauitatē, ungues & digiti liuidi fiāt, mors euestigio expectanda est. At si digiti ac pedes penitus nigrescūt, minus perniciosi sunt q̄ liuidi. Verū et alia signa cōsiderare oportet. Si enim facile ferre uideatur malū, et aliud quoddā ex salutarib; ad hęc signa subindicet, morbū ad abscessum uerti spes est, ita ut eger quidē superstes māsurus sit, corporis uero partes nigrefactae casurę.

Testes & pudenda reuulsa, dolores fortes significant, & periculum lethale. Quod uero ad somnos attinet, quemadmodum secundum naturam cōsuetum nobis est, interdium uigilare oportet, noctu dormire. Si uero hoc fuerit transmutatum, peius est. Minime uero lædi æger poterit, si dormiat mane ad tertiam partem diei. Qui uero ab hoc tempore fiunt somni, deteriores sunt. Pessimum autem est non dormire, neque noctu, neque interdium. Aut enim præ dolore ac afflictionibus uigiliæ adfunt; aut delirium aderit ab hoc signo. Egestio alui optima est, mollis & cohærens, & secundum horam, in qua etiam à sano egeretur. Iuxta copiam uero, pro ratione ciborum ingestorum. Tali enim contingente exitu, uenter infernus sanus fuerit. Si uero liquida fuerit egestio, conducit neque stridere, neque frequenter esse, & paulatim secedere. Delassatur enim homo ex frequenti defessu, & uigilias utique contraxerit. Si uero sæpe acruatim egerit, periculum est ne in animi deliquium incidat. Quin & iuxta copiam ingestorum egerere oportet, bis aut ter in die, & noctu semel. Plura uero mane, quemadmodum in consuetudine est homini. Inspissari autem oportet egestionem, morbo ad iudicationem tendente. Sit autem subfulua, & non ualde graueolens. Commodum est & lumbricos rotundos cum egestionem prodire, morbo ad iudicationem tendente. Oportet autem in omni morbo mollem esse uentrem, & iuxta mole præditum. At uero aquosum ualde, aut album, aut pallidum, aut uiride, aut uehementer rufum, aut spumosum stercus egerere: Hæc omnia mala sunt. Malum insuper est & quod exiguum est, & uiscosum ac album: & quod subpallidum aut subuiride ac leue. His uero magis lethalia fuerint stercorea nigra, aut pingua, aut liuida, aut æruginosa, & male olentia. Quæ uero uaria sunt, diuturniora quidem his sunt, nihilo minus autem pernicioſa. Sunt autem talia, ramentosa, & biliosa, & cruenta, & prasina, & nigra, aliquando simul inter se exeuntia, aliquando particulatim. Flatum porro sine strepitu ac crepitu prodire, optimum est. Melius autem est & cum strepitu exire, quàm isthic reuolui. & qui sic progressus est flatu, aut dolere quid hominem significat, aut delirare: nisi sua sponte homo ita flatum emittat. Cæterum præcordiorum dolores ac tumores, si fuerint recentes, & non cum inflammatione, soluit murmur in præcordio obortum, & maxime quidem si pertransierit cum stercore, & urina ac flatu. Sin minus, etiã ipsum per se si transierit prodest. Prodest item si subdescenderit ad infernos locos. Optima uero est urina, quum fuerit alba subsidientia, & leuis & æqualis, per totum tempus, donec iudicatus fuerit morbus. Significat enim & securitatem, & morbum fore breuem. Si intermiserit, & aliquando quidem pura mingatur, aliquando uero subsidet album ac leue, diuturnior fit morbus, & minus securus. Si uero fuerit & urina subrubra, & subsidientia ipsius similis, & leuis, diuturniorem quidem hæc morbum quàm prior significat, sed ualde salutarem. At subsidentiæ in urinis crassiores polentæ partes referentes, prauæ sunt. His autem peiores sunt, laminosæ. Albæ uero & tenues ualde malæ sunt. Verum his deteriores sunt furfuraceæ. Nubeculæ quæ feruntur in urinis, albæ quidem bonæ sunt: nigræ uero malæ. Quandiu uero fulua fuerit urina & tenuis, morbum inconcoctum esse significat. Si uero & diuturna fuerit talis existens, periculum est ne sufficere homo possit, donec urina fuerit concocta. Lethalis.

thaliore autem sunt urinae, & foetidae, & aquosae, & nigrae, & crassae. At tum in uiris, tum in mulieribus, nigrae urinae pessimae sunt. In pueris autem aquosae. Quicumque urinas tenues & crudas mingunt multo tempore, si alia ueluti superstitibus futuris signa fuerint, his abscessum expectare oportet ad locos infra septum transuersum. Sed & pinguetudines superne instantes, araneorum telis similes, damnare oportet. Sunt enim colliquationis signa. Considerare uero conuenit in urinis in quibus nubeculae sunt, an superne aut inferne sint: & quales habeant colores. Et quae quidem deorsum feruntur, cum coloribus relatis, eas bonas esse putare, ac laudare. Quae uero sursum feruntur, cum coloribus relatis, malas esse, & tales damnare. Nec uero decipiat te, si uesica morbum aliquem habens, eiusmodi urinas reddiderit. Non enim totius corporis signum est, sed ipsius per se uesicae. Vomitus commodissimus est, ex pituita ac bile quae maxime permixtus, & non crassus ualde, neque multus. Nam meraciores, deteriores sunt. Si uero id quod uomitu reiectum est prasinum fuerit coloris, aut liuidum; aut nigrum: quicumque horum fuerit colorum, malum esse putandum est. Si uero omnes colores idem homo uomit, ualde perniciosum hoc est. Celerrimam autem mortem significat liuidus uomitus, si graueolens fuerit. Omnes uero subputridi ac foetidi odores, in omnibus uomitibus mali sunt. Sputum uero in omnibus doloribus, qui circa pulmonem & costas fiunt, cito ac facile expui conuenit, & flauum sputo ualde permixtum apparere. Si enim longe postea, post principium doloris, expuerit quod flauum est, aut fuluum, aut quod multam tussim inducit, & non ualde permixtum est, deterius est. Nam & flauum meracum, periculosum est: & album ac uiscosum & rotundum, inutile est. Malum est & quod uiride est ualde, itemque pallidum, & quod spumosum. Si uero ita fuerit meracum, ut etiam nigrum appareat, hoc ipsum deterius est quam illa. Malum etiam est si nihil repurgetur, neque emitat pulmo, sed plenus ferueat in gutture. Grauedines & sternutationes in omnibus circa pulmonem morbis, & antecessisse, & succedere, malum est. At in alijs morbis lethalissimis sternutationes profunt. Sputum autem flauum, sanguine permixtum non multo, si in pulmonis inflammatione, in principio morbi reijciatur, salutare est, et ualde prodest. Si uero septimo die, aut posterius, minus securum est. Omnia sputa mala sunt, quae dolorem non sedant. Pessima uero sunt nigra, uelut descriptum est. Quae uero dolorem sedant, omnium optimae existunt. Quicumque dolores ex his locis non sedantur, neque ad sputorum purificationes, neque ad stercorum alui subductionem, neque ad uenae sectiones, & uictus rationem ac medicamentum, eos ad suppurationem uerti sciendum est. Ex suppurationibus, quaecumque dum sputum adhuc biliosum est suppuratur, perniciosae ualde sunt, siue biliosum illud in parte, siue simul cum pure expuatur: & hoc potissimum si morbo ad septimum diem progresso, suppuratio ab hoc sputo procedere incipiat. Timor autem est eum qui talia expuit moriturum esse decimaquarta die, si non aliquod bonum signum ipsi acciderit. Sunt autem bona haec: facile ferre morbum, bene spirare, a dolore liberatum esse, sputum facile tussiendo reijcere, corpus equaliter calidum ac molle apparere, sitim non habere, urinas & alui egestionem, & somnos, & sudores, uelut descriptum est: haec singula nosse conuenit accidere ut quae bona sint. Nam omnibus his sic contingentibus, homo non morietur. Si uero aliqua ex his accesserint, aliqua non, non ampliore tempore uita producta, decimaquar

ta die homo peribit.

Porro mala signa his contraria sunt: ægre ferre morbum, spiritum magnum & densum esse, dolorem non sedari, sputū uix tussiendo reijcere, ualde sitire, corpus inæqualiter à febris teneri, uentrem quidem ac costas fortiter calidas esse, frontem uero & manus ac pedes frigidos. Vrinæ autem & alui egestionem, & somnos, & sudores, uelut descriptum est: hæc singula nosse oportet mala esse. Si enim ita accesserit horum aliquid ad sputum, peribit utique homo priusquam ad decimūquartum diem peruenerit, aut nono die, aut undecimo. Sic igitur coniecturam facere oportet, quod hoc sputum lethale sit ualde, & non perducatur ad decimūquartum diem. Proinde & mala & bona signa expendentem ex his prædictiones facere oportet. Ita enim potissimum ueritatem consequi quis poterit.

At uero aliæ suppurationes rumpuntur, plurimæ quidem uigesimo die, aliæ uero trigesimo, aliæ quadragesimo, aliquæ uero ad sexaginta dies perueniunt.

Considerare uero futuræ suppurationis principium oportet, suppuratione facta ab ea die qua primum homo febricitauit, aut si forte ipsum primū rigor apprehendit: & si pro dolore grauitatem sibi factam esse dixerit, in eo loco in quo dolebat. Hæc enim in principijs suppurationum fiunt. Ex his igitur temporibus eruptionem suppurationum fore expectare oportet ad prædicta tempora. Si uero suppuratio fuerit in altero latere solum, uertere & considerare oportet in his, num aliquē habeat dolorem in altero latere, & an alterum altero sit calidius: & reclinato ægro in latus sanum, interrogare ipsum, an uideatur ipsi graue quid ex superno latere incumbere. Si enim hoc fuerit, in altero est suppuratio, in quo grauitas affuerit.

Cæterum omnes suppuratos ex his signis cognoscere oportet. Primum quidem si febris non dimittit, sed per diem quidē tenuis est, noctu uero amplior: et sudores multi oboriuntur, tussescque ac tussiendo promptitudo ipsis adest, & nihil memorabile expuunt: & oculi caui fiunt, et maxillæ ruborem contrahunt, & ungues quidem manuum curuantur, digiti uero calescunt, & potissimum summi: & in pedibus tumores fiunt, & cibos non appetunt, & pustulæ per corpus enascuntur.

Quæcunque igitur suppurationes diuturnæ sunt, hæc signa habent, & fidem ipsis ualde habere oportet. Quæ uero breues sunt, ex his signis cognoscere oportet, si quid apparuerit ex his, qualia in principijs fiunt. Simul autem & si aliquanto difficiliter spirauerit homo.

At uero quæ ex ipsis citius & tardius rumpuntur, his signis cognoscere oportet. Si quidem enim dolor in principijs fiat, & spirandi difficultas, & tussis, & sputatio perseverans, ad uigesimalū diem pertingat, eruptionem tunc expectare oportet, aut etiam prius. Si uero quietior fuerit dolor, & alia omnia pro huius ratione, eruptio posterius expectanda est. Necesse uero est accedere & dolorem, & spirandi difficultatem, et sputationē, ante puris eruptionē. Ex his autem maxime superstites manent hi quos febris eodem post eruptionē die dimiserit: & qui cibos cito appetuerint, & à siti liberati fuerint: & si uenter parua & cōpacta egerit, & pus album & leue & eiusdem coloris fuerit, & à pituita liberum, & citra dolorem ac tussim fortem repurgetur. Ac optime quidē sic ac celerrime liberantur. Sin minus, hi quibus proxima his contigerint. At uero intereunt hi quos febris non dimiserit, aut ubi ipsos dimisisse putata fuit, rursus recalcens apparuerit: & qui sitim quidem habuerint, cibos autem non appetuerint, & si uenter liquidus fuerit, & pus pallidum

sue uiride, & liuidum expuerint, aut pituitosum & spumosum. Si hæc omnia cōtigerint, pereunt. Quibus uero ex his quædam accesserint, quædam nō, horum aliqui intereunt, aliqui in multo tempore superstites euadunt. Verū ex omnibus signis quæ adsunt, tum in his, tum in alijs omnibus, cōiecturam facere oportet. Quibuscūq; ex inflāmati pulmonis morbis, abscessus circa aures fiunt, & suppurantur, aut ad infernas partes, ac fistulantur, hi superstites euadūt. Verum huiusmodi sic cōsiderare oportet. Si & febris detinuerit, & dolor non sedatus fuerit, & sputū pro ratione non prodierit, neq; biliosa, neq; soluta faciles, & meracæ alui egestionēs fuerint, neq; urina ualde multa, & multam subsidentiam habens; indicatur autem superstes futurus ab omnibus reliquis salutaribus signis: tunc abscessus huiusmodi fore sperandū est. Fiunt autē partim ad infernas partes, quibus uidelicet inflāmatio aliqua circa præcordia affuerit: partim in supernis, quibus præcordiū molle & doloris exors permāserit, et ubi spirandi difficultas, quæ per tēpus aliquod affuit, desierit citra aliam manifestā causam. Cæterū abscessus ad crura, in pulmonis inflāmationibus fortibus ac periculosis, omnes quidē utiles sunt, optimi uero sunt, qui dum sputū iam in mutatione est fiunt. Si enim tumor & dolor fiat, sputo pro flauo purulento fiente, & foras procedente: ita securissime homo superstes euaserit, & abscessus absq; dolore celerrime sedabitur. Si uero sputum nō bene processerit, neq; urina subsidentiam bonā habens apparuerit, periculum est claudum fore articulum, aut multum molestiarū exhibiturū. At si euanescent & recurrant abscessus, sputo non prodeunte, febreq; permanente, horrendū est. Periculū enim est ne deliret homo & moriatur. Ex suppuratis à pulmonis inflāmatione, seniores magis intereunt. Ex alijs autē suppurationibus, iuniores magis moriuntur. Dolores cum febre fientes, circa lūbos et infernas partes, si septum trāsuersum attingerint, infernas partes relinquentes, perniciosi ualde sunt. Proinde alijs quoq; signis animū aduertere oportet. Nam si quod etiā ex alijs signis malum apparuerit, desperatus est homo. Si uero assiliente ad septum trāsuersum morbo, alia signa non mala accesserint, hunc suppuratum fore multa spes est. Quicūq; uero suppurati uruntur, quibus quidem purū pus fuerit, & album, & non foetidum, hi seruantur: quibus autem subcruentū, & cœnosum, hi pereunt. Porro uesticæ duræ & dolentes, penitus quidē horrendæ ac perniciosæ sunt, perniciosissimæ uero quæ cū febre continua fiunt. Etenim dolores ab ipsis uesticis ad occidendū sufficiunt, & alui non egerunt hoc tempore, nisi durum quiddam, & hoc coactæ. Soluit autē urina purulenta micta, quæ albam ac leuē subsidentiam habet. Si uero neq; ab urina quicquam remiserit dolor, neq; uestica molliatur, & febris continua fuerit, in primis circuitibus morbi ægrum moriturum esse timor est. Atq; hic modus potissimū pueros corripit septennes, donec ad quintūdecimū annum peruenerint. Febres iudicantur in iisdem numero diebus, ex quibus & superstites euadunt homines, & ex quibus pereunt. Etenim placidissimæ febres, & signis securissimis nitentes, quarto die desinunt, aut prius. Malignissimæ uero, & signis horrendissimis fientes, quarto die aut prius occidūt. Primus igitur ipsarum insultus sic desinit. Secundus autē, ad septimū produci tur. Tertius ad undecimū. Quartus ad decimūquartū. Quintus ad decimūseptimū. Sextus ad uigesimalū. Hi igitur impetus ex acutissimis morbis, per quatuor

ad uiginti, ex additione desinunt. Nō potest autem quicquam horum integris diebus exacte numerari. Neq̃ enim annus, & menses, integris diebus numerari possunt. Postea uero eodem modo, iuxta eandem additionem, primus circuitus quatuor & triginta dierum est, secundus quadraginta dierum, tertius sexaginta dierum. At in horū principijs difficilimū est cognoscere eos qui in plurimo tempore iudicabuntur. Similima enim sunt ipsoꝝ principia. Verum à primo die animaduersionē facere oportet, & prout singuli quaternarij adduntur considerare, & nō latebit te quo uertetur morbus. Fit autē & quartanarū febrium constitutio ex huiusmodi ordine. Qui porrò morbi in breuissimo tempore iudicabūtur, faciliores cognitu sunt. Maxime enim differentia ab initio ipsis sunt. Qui enim superstites ab ipsis euasuri sunt, facile spirātes, & doloris exortētes sunt, & noctu dormiunt, aliāq̃ signa securissima habent. Qui uero morituri, ægre spirantes fiunt, delirantes, uigilantes, aliāq̃ signa pessima habentes. Vt igitur his ita contingentibus, coniectare oportet, & iuxta hoc tempus, & iuxta unamquāq̃ additionem, tendentibus ad iudicationē morbis. Iuxta eandem rationem mulieribus quoq̃ iudicationes fiunt ex partu. Capitis dolores fortes & cōtinui cum febre, si quidem lethaliū signorum quid accesserit, perniciosi ualde sunt. Si uero absq̃ talibus signis, dolor uiginti dies transimiserit, & febris tenuerit, sanguinis à naribus eruptionem, aut abscessum quendam ad infernas partes expectare oportet. Sed & q̃ diu dolor recens fuerit, similiter sanguinis è naribus eruptionē, aut puris eruptionem sperare cōuenit, cum aliās, tum si dolor circa tempora & frontem fuerit. Verum sanguinis eruptio magis expectanda est iunioribus triginta quinq̃ annis, senioribus uero puris eruptio. Auris dolor acutus cum febre cōtinua ac forti, horrendus est. Periculum est enim deliraturum esse hominē, ac periturū. Proinde quum hic modus minime tutus sit, cito mentē aduertere oportet etiam alijs signis, à primo statim die. Pereūt autem iuniores homines septimo die, & adhuc citius, ex hoc morbo. Senes uero longe tardius. Nam & febres & deliria minus ipsis accidunt, & hac de causa aures antea suppurantur. Verum his quidem ætatibus recidiūx morbi cōtingentes, plurimos occidūt. At uero iuniores priusq̃ suppuretur auris, pereūt. Nam si pus album effluerit ex aure, spes est iuuenem superstitem euasurum esse, si sane & aliud quoddam bonum signū ipsi accedat. Fauces exulceratæ cum febre, horrendæ sunt. Verum si quod aliud item signum accedat, ex his quæ antea mala esse iudicata sunt, in periculo hominē uersari prædicendū est. Anginæ horredissimæ sunt, & citissime accidūt, quæ neq̃ in faucibus quicquam conspicuum faciūt, neq̃ in ceruice: uerum plurimū dolorē exhibent, & erecta ceruice spirationē inducunt. Hæ enim eodem die suffocant, secūdo item ac tertio & quarto. Quæ uero alioqui similiter dolorē exhibent, attollūtur autem, & in faucibus rubores faciunt, perniciosæ quidem ualde sunt, uerū prioribus magis diuturnæ, si rubor fuerit magnus. Quibuscūq̃ uero fauces et ceruix simul rubuerint, hæ anginæ diuturniores sunt, & ex ipsis maxime euadūt, si & ceruix, & pectus ruborē habuerit, & erysipelas ignis sacri non intro recurrerit. Si uero neq̃ in diebus iudicatorijs dissipetur erysipelas, neq̃ tuberculū ad externā partem cōuertatur, neq̃ pus tussiendo reijciat, facileq̃ ac sine dolore degere uideatur, mortem significat, aut ruboris recidiuam. Securius est autē tumorem & ruborem

borem q̄ maxime foras uerti. Si uero ad pulmonem uertatur, & delirium inducit, & quidam ex ipsis suppurati plerūq̄ fiunt. Gurguliones periculosi sunt ut & rescentur, & scarificentur, q̄ diu rubicūdi fuerint & magni. Nam inflammationes ad hos succedunt, & sanguinis eruptiones. Quare tales alijs machinamentis attenuare conari oportet hoc tempore. Quū uero totum iam fuerit secretum, quod sanè uuam appellant, & fiat extrema gurgulionis pars maior & rotunda, superior autem tenuior, in hoc tempore tutum est rem aggredi. Præstat tamen & aluo subducta, chirurgia hac uti, si & tempus permittat, & homo non stranguetur.

Quibus febres cessant, neq̄ signis solutorijs apparentibus, neq̄ in diebus iudicatorijs, his reuersuras esse expectandū est. Quæcūq̄ febris longiorē moram traxerit, homine alioqui ad salutē disposito, ita ut neq̄ dolor teneat ob inflammationē, aut ob aliquā aliam manifestam causam: huic abscessum expectare oportet cum tumore ac dolore ad aliquem articulū, uel maxime infernum. Fiunt autem huiusmodi abscessus magis, & in breuiori tempore, his qui iuniores sunt triginta annis. Expectare uero statim oportet abscessum, si febris detinens uiginti dies transierit. Senioribus autem minus fiunt, diuturniore etiam existente febre. At uero huiusmodi abscessum expectare oportet febre cōtinua existente. Verum ad quartanā deducetur, si intermiserit, & erroneo modo apprehenderit, & si hæc faciens ad autumnū appropinquauerit. Quemadmodū autem iunioribus triginta annis abscessus fiunt: Ita quartanæ magis his qui triginta sunt annorum, et senioribus. Cæterū hæc nosse expedit, abscessus magis hyeme fieri, tardiusq̄ cessare, & minus recurrere. Quicūq̄ uero in febre nō lethali, dixerit sibi caput dolere, aut etiam præ oculis obscurum quiddam apparere, si et osculi uentris morsus huic accesserit, ei biliosus uomitus aderit. Si uero etiam rigor accesserit, & partes infra præcordium frigiditas habuerit, citius adhuc uomitus aderit. At si quid biberit aut ederit sub hoc tempus, ualde cito uomiet.

Porro quibus horum dolor fieri incœperit primo die, hi quarto magis q̄ quinto præmuntur: septimo uero liberantur. Pleriq̄ tamen ipso tertio die dolere incipiunt, uexantur autē maxime quinto, liberantur nono, aut undecimo. Qui uero incœperint quinto die dolere, aliaq̄ iuxta rationem priorū ipsis fiant, his ad decimū quartum morbus iudicatur. Fiunt autē hæc & uiris, & mulieribus, maxime in tertianis. Iunioribus uero fiunt quidem & in his, uerū magis in cōtinuis febribus, & in sinceris tertianis. Quibus cūq̄ uero in huiusmodi febre caput dolētibus, pro eo quod obscurum quiddam præ oculis appareat, uisus hebetudo contingit, aut splendorēs ob oculos obuersantur: & pro osculi uentris morsu, in præcordiorum dextra aut sinistra parte aliquid tenditur, neq̄ cum dolore, neq̄ cum inflammatione: sanguinē de naribus his, pro uomitu fluxurum esse expectandum est. Magis tamē & hic in iuuenibus sanguinis eruptionē expectare oportet, his autem qui triginta sunt annorum, & seniores adhuc, minus: uerum uomitus in his expectari debent.

At uero pueris conuulsiones fiunt, si febris fuerit acuta, & ueter non egerit, & uigilarint, & terreantur, & eiularint, & colorē mutarint, & uiridem siue pallidum, aut liuidū, aut rubrum contraxerint. Fiunt autē hæc prōptissime quidem pueris nuperrime editis, usq̄ ad septimū annum. Seniores autem pueri, & uiri, non amplius in febribus corripiuntur conuulsionibus, si non quid ex signis

fortissimis ac pessimis accesserit, qualia sanè in phrenitide fieri solènt. Perituros porro & superstites futuros, tum pueros, tum alios, ex omnibus signis cōiecta re oportet, pro ut singula de singulis perscripta sunt. Atq; hæc & de acutis morbis, & de his qui ex ipsis fiunt, dico. Qui uero recte prænoscere uolet, & superstites futuros, & morituros: & quibus per plures dies, & quibus ad pauciores morbus duraturus est: eū signa omnia ediscere, & iudicare posse conuenit, ita ut uires ipsorum inter se cōferendo expendat, quemadmodū perscriptū est, & de alijs, & de urinis, & de sputis, ubi simul & pus & bilem ægrotus tussiendo reiecerit. Quin & impetus morborum semper populariter grassantiū cito animaduertere oportet, & temporis constitutionem nō ignorare. Probe tamen id nosse expedit de coniecturis certis, & alijs signis, & nō ignorare, quod in omni anno, & omni tempore, mala malum, bona bonum significant. Nam & in Libya, & Delo, ac Scythia, præscripta signa uera comperiuntur. Proinde sciendum est, minime difficile esse, in ijsdem regionibus posse aliquē pleraq; ex ipsis assequi, si memoria tenens ipsa, iudicare ac recte expendere sciat. Cæterum nullius morbi nomen desiderare oportet, quod hic nō est adscriptum. Omnes enim qui in prædictis temporibus iudicantur, ex ijsdem signis cognosces.

HIPPOCRATIS COI PRÆ

DICTIONVM LIB. I. IANO COR

nario Medico Physico interprete.



SOPOROSI in principijs fientes, cum capitis, lumborum, præcordij, colli dolore, uigilantes, num phrenitici sunt. Nasus in his destillans perniciosus, tum aliàs, tum quarto ab initio die. Alui proluuium ualde rubicūdum, malū quidem est in omnibus morbis, nō minime uero in prædictis. Linguae asperæ & resiccatae, phreniticæ. In turbatis uigilantibus, urinæ decolores, nigrae, innatantes, in sudoribus, phreniticæ. Insomnia etiam in phreniticis manifesta sunt. Screatio frequens, si sanè & aliud quoddam signum affuerit, phrenitica sunt. Qui relinquuntur in præcordio ardores, febre perfrigerata, mali sunt, tum aliàs, tum in sudoribus. Prædebilitatorum desipientiæ pessimæ, uelut etiam Thrasynonti.

Phreniticæ uehementer affectiones, tremulæ desinunt. Vomitus in capitis doloribus æruginosi, cum surditate & uigilijs, cito insaniam affore denūciant. Loci circa fauces in acutis morbis dolorosi, graciles, parui, suffocatorii, quando hiarit æger ut os claudere & aperire non facile possit, mentis emotionem portendunt. Ex talibus phrenitici fiunt, & perniciose affecti. In phreniticis in principio mansuerudo. Verum frequēter transmutari, malum id est, & sputatio mala est. In phreniticis alba alui egestio, malum: quemadmodum & Archecrati. Num & in his torpor fit: Rigor in his pessimus. Quibus melancholico modo mente motis, tremores accedunt, malignum hoc est.

Mente moti acute, ubi insuper febrierint, cum sudore phrenitici fiunt.

Phrenitici paucibili, strepitum ualde percipientes, tremuli. Ex uomitu nauseabundo oborta, clangorosa uox, oculi puluillum incumbentem habent

tes, infaniam portendunt: quemadmodum etiam Hermozygæ uxor, infania acute correpta, uoce destituta mortua est. In febre ardenti sonitibus aurium accedentibus, cum uisus hebetudine, & grauitate in naribus accedente, melancholico modo mente mouentur. Mentis percussiones cum uoce clangorosa, linguæ conuulsiones tremulæ: & uoces tremulæ fientes, mortem alienant. duricies in his perniciofa est. Linguæ tremulæ signum sunt mentis non firmæ. In biliosis meracis alui egestionibus, spumosa florulentia mala, tum aliàs, tum si cui lumbi antea doluerint, & mente motus fuerit. Rari circa latus in his dolores, desipientiam significant. Vocis interceptiones cum singultu pessimæ. Vocis interceptiones cum exolutione pessimæ. In uocis interceptione, spiritus ueluti his qui strangulantur præ manibus expositus, malus est. Num & talis mentem emouet? Modice feroces mentis emotiones, ferinæ sunt. Molestè ferre morbum cum perfrigeratione, si non sine febre exsudent partes supernæ, phrenitum portendit: quemadmodum etiam Aristagoræ. Sed & perniciosum hoc est. Frequentes in phreniticis permutationes, conuulsoriae. Vrinæ quæ minguntur à non recordantibus, nec cōmonefactis, perniciosæ. Num his minguntur uelut si subsidentiam conturbasses?

Palpitantes per totum, num uoce destituti moriuntur? Sputations in phreniticis cū perfrigeratione, nigræ reuomuntur. Surditas, & urinæ non confidentes, ualde rubicundæ, innatantes, mentis emotionem portēdunt. His morbo regio corripit malum est. Mala est & ex morbo regio fatuitas. Hos uoce quidem destitui, uerum sentientes esse contingit. Arbitror autem & aluos his perumpere, uelut contigit Hermippo, & mortuus est. Surditas in morbis acutis & turbulentis cōsequens, mala. Mentis emotiones tremulæ, obscuræ, palporiæ, ualde phreniticæ sunt. Velut & Didymarcho in Co. Torpores ex rigore, non ualde apud seipsos sunt. Dolores circum umbilicum palpitantes, habent quidē aliquid quod mentem emouet. Verum circa iudicationem his spiritus aceruatus cum prompta tensione penetrat. Et dolores circa suram, in his mentis emotionem faciunt. Si innatarit quid in urina, dolore circa femur dissipato, mentis emotionē portendit. & qualia circa aurium sonitus contingunt, talia existunt. In aluo liquida, lassato, caput dolenti, siti cūloso, uigilanti, obscure loquēti, impotenti, quibus talia sunt, his timor est ut mente moueantur. Exudantes & maxime circa caput, in morbis acutis sub molestè ferentes, malum, tum aliàs, tum in urinis nigris. & turbidus spiritus in his malus. Impotentia præter uacuorum uasorum rationem contingentes, non existente uasorum uacuatione, malum. Alui interceptæ, sed parua, nigra, uelut caprarum stercora ad necessitatē coacte emittentes, nasus in his erumpens, malum. Quibus lumborum dolor diutinus, cum ardore fastidioso ac nauseabundo, hi si exudent malū est. Num his tremores fiunt? Sed & uox uelut in rigore conspicua? Extremitates si in utranq; partem cito transmutentur, malum est. Et sitis huiusmodi, mala est. Ex moderato ferox respōsio, malum. Vox acuta, his præcordia intro trahuntur. Oculi hebes, malus: & fixus ac caliginosus, malus. Vox acuta clangorosa, mala. Dentium stridor perniciosus est, quibus non & sanis familiaris est. Suffocatio in his ualde mala. Faciei bonus color, & uehemens toruitas, malum. Egestio-

nes alui desinentes in spumosas meracas, exacerbatoriæ sunt. Urinatum in morbis acutis ex perfrigeratione interceptiones, pessimæ. Perniciosa si citra signa, leuia facta fuerint, mortem significant. In morbis acutis biliosis ualde albæ, spumosæ, circûbiliofæ egestiones, malæ. Malæ item & urinæ eiufmodi. Num his hepar dolorosum est? Vocis interceptiones in febribus cōuulsorio modo fientes, ad mentis emotionem cum silentio deueniunt, perniciosum. Vocis ex dolore interceptiones, dolorosam mortē inducunt. Febres ex præcordiorū doloribus malignæ. Sitis præter rationem soluta in acutis morbis, mala est. Sudor multus cū febribus acutis fiens, malus est. Et urinæ dolorosæ, malæ sunt. Et rubicundæ ex his florulentia detentæ, itēq; æruginosæ, malæ sunt; & paruas apparere ueluti stillas. Et uomitus cū uarietate, mali sunt, tum aliàs, tum si propius inter se prodeant. Quæcunq; in diebus iudicatorijs, cum anxietudine, absq; sudore perfrigerantur, malum est: Et quæ ex his insuper riguerint, mala sunt. Vomitus meraci, anxiosi, mali.

Sopor num ubiq; malus est? Ignorantia cū rigore, malum. Malum item obliuio. Perfrigerationes ex rigore nō recalescētes, malæ sunt. Sudantes ex perfrigeratione recalescētes, malum. In his ardor dolorosus in lateribus, & insuper rigere, malū est. Aestuarii rigores aliquatenus perniciosi; & flammæ facies cum sudore in his mala est: In his posteriorū partium frigiditas, conuulsionem accersit. Exudantes uigiles recalescētes, malum. Ex lumborum recurso, oculi distortio malū. Dolor in pectus firmatus cum torpore, malus. Hi si insuper febriāt, acute ardentes, moriūtur. Qui nigra reuomūt, cibos auersantur, deliri sunt, iuxta pubem parum dolorosi, oculum ferocem aut clausum habent, eos medicamentis purgare nō oportet. Perniciosum enim est: Neq; intumescētes, uertiginosos, in leuiter uagando deficientes, cibos auersantes, decolores: Neq; in febre fractos, si soporosi fuerint. Perniciosum enim est. Oris uentriculi dolor, cū præcordio distento, & capitis dolor, malignū, & quidpiam anhelosum. Num hi repente moriuntur? uelut in Dyfode. Huic etiam urinæ uehementer fermentatæ, erant ualde rubicundæ. Colli dolor malum quidem in omni febre, pessimum autem his quibus timor est ut insaniant.

Febres soporosæ, lassatoriæ, caliginosæ, uigilias inducentes, exudantes, malignæ. Horrores frequentes ex dorso, celeriter translabentes, molesti, urinæ interceptionem dolorosam significant. Qui anxie se iactantes, citra uomitum exacerbantur, male habent. Perfrigeratio cum duricia signum malum. A uentre tenuia nō sentienti prodire, ei qui est apud seipsum, perniciosum: uelut Hepatico. Vomitiones exiguæ biliosæ malæ, tum aliàs, tum si insuper uigila uerint ægri. Nasus in his destillans, perniciosum est. Quibus ex partu alba detinentur cum febre, surditasq; adest, & in latere dolor acutus, hæc perniciose mente mouētur. In febribus ardentibus subperfrigeratibus, egestionibusq; alui biliosis aquosis frequētibus, oculorū distortio signum malū est, tum aliàs, tum si stupore prehensi detineantur. Siderationes repentinæ ei qui exolute ac diutine insuper febriūt, perniciosæ sunt: quale quiddam passus est Numenij filius. Ex lumborum dolore ad os uentriculi recursiones, febriculosæ, horridæ, reuomentes aquosa tenuia multa, mente motæ, uoce destitutæ, nigrorum uomitu facto moriuntur. Oculi cōfractio in morbo acuto, mala. Num

anxie se iactantibus citra uomitum, lumbos dolentibus, si ferociter mente moti fuerint, spes est ut nigra per aluum prodeant. Fauces dolorosae, graues, cum ægre tolerabili molestia, stragulatoriae, perniciosae acutè. Quibus spiritus retrahitur, uox autem stragulatoria est, & uerterbra intro consistet, his in fine uelut contrahente quodam spiritus fit. Caput dolentes, & stupore detenti delirantes, aluo intercepta, oculum ferocem præ se ferentes, florescentes, opisthotono posteriorum partium conuulsoria distentione corripuntur. In oculorum distortionem, febriculoso, lassato, rigor perniciosus. Et soporosi in his, malum. In febribus ad præcordium dolores, sine uoce, si sudore non soluantur, maligni sunt. His dolores ad coxas, unà cum febre ardente, & si aluus acruatim eruperit, perniciosum. Quibus uoces cum febribus deficientes post iudicationem, hi tremantes ac soporosi moriuntur. Quibus affectiones ardentes, fatuitatem inducentes, stuporis distentionem inferentes, præcordia uariata, & uentris tumor, cibis interceptis, in sudoribus: Num his turbidus spiritus, & geniturae simile quid superueniens, singultum indicat? Sed & aluus spumosa, biliosa, insuper egerit? Splendidum in his mictum prodest. Venter autem his insuper turbatur. Quibus sopor fit spumosis prodeuntibus, his febris exacerbatur acuta. Ex capitis dolore uocis interceptiones si sint, cum sudoribus febriculosi laxantur in seipsos, sunt que morbi reuertentes diutius durantes. His insuper rigescere, non malum est. Manus tremulae, caput dolentes, collum dolentes, subsurdi, mingentes nigra densata: quibus hæc sunt, his nigra uentura esse expectare oportet, perniciosum. Vocis interceptiones cum exolutione, stupore detinente, perniciosae. Lateris dolor, ex sputis biliosis, citra rationem si euauerit, mente mouentur. Ex colli dolore, soporoso, sudanti, aluus inflata, si sanè ad necessitatem liquida demiserit, infuso immisso sublata: ex his ea quæ biliosa non sunt supprimuntur. Talia uero si seruentur reseruenta, longius agrotat. Num itaque proluuia quæ biliosa non sunt, meliora sunt? & flatuoso tumori profuerint? Alui circumtensio, ad necessitatem liquida demittens, cito intumescens, habet quid conuulsorium, uelut etiam Aspasij filio. Superrigere his perniciosum. Ex his conuulsus factus ac inflatus, ubi diutius ægrotasset, ori putrefactio uiridis superuenit. Quibus circa lumbos tenues diurni dolores, ad præcordium se reuoluentes, & ciborum fastidium inducentes unà cum febre: his ad caput dolor intentus progressus, repente conuulsorio modo occidit. Affectiones insuper rigentes, & quæ ad noctem aliquanto magis exacerbantur, cum uigilijs, & delirio in somnis, aliquando urinas inuoluntarie emittentes, in conuulsiones soporosas desinunt. A principio exudantes urinis concoctis, ardentes qui citra iudicationem perfrigerantur, breui circum circa ardentes: Torpidi item, soporosi, conuulsi, perniciose affecti sunt. Vterum gerentibus capitis dolores, soporosi, cum grauitate fientes, mali sunt. Fortassis autem his etiam conuulsorium quid pati contingit. In faucibus gracilibus dolores stragulatorij, habent quid conuulsorium, tum alias, tum à capite oborti, Velut etiam Thrasyontis consobrinae. Tremores conuulsorij fientes in sudoribus

doribus, reuerti solent. Iudicatio his fit ubi superriguerint. Superrigent hi ardore circa uentrem prouocati. Lumborum dolor, & capitis dolor, & oris uentriculi dolor, cum excreatione uiolenta, conuulsorium quid habet.

A uentre subliuida, turbulenta: & lotia tenuia ac aquosa, suspecta.

Fauces exasperatae parum, & ueter murmurans inanibus ad egerendum surrectionibus, & frontis dolores, & palpantes, delassati, in stragulis ac uestimentis dolorosi. Quae ex his augentur, difficilia sunt. Somnus multus in his conuulsorius, & dolores in frontem graues, & mictio difficilis.

Vrinae suppressio quibus rigores, & in conuulsorijs affectionibus: uelut & ipsa ubi inhorruit, sudauit. Meracae desinentes purgationes, omnibus quidem exacerbatoriae sunt, His uero etiam ualde. Ex talibus etiam circa aurem abscessus exurgunt. Turbulentae ferocissimae est somno excitationes, conuulsoriae sunt tum alias, tum cum sudore.

Et colli, & dorso perfrigerationes apparentes, sed & per totum corpus: In his etiam spumosa mictiones, una cum animi deliquio, & oculorum obscuratio, conuulsionem prope adesse significant. Cubiti ac colli dolores conuulsorijs. A facie autem hi. In faucibus sonitus frequentes, cum salivae sputatione. In his in somnis sudores, boni. Num & sudore leuari, plurimis non malum est.

Dolores ad infernas partes, his toleratu faciles. In febribus exundantes caput dolentes, alio intercepta, conuulsi fiunt. Subfriabiles li-

quidam alui egestionem, perfrigerantes non sine febre, malae sunt. Rigores ex his uescam & uentrem occupantes, dolorosi. Proinde soporem his habere aliquid conuulsorijs, non sane mirum apud me fuerit. Quae

in acutis uomitorio modo trahuntur, mala sunt. Et albae alui egestionem, difficles. Non uiscosa ex his progressa, cum multo ardore ad mentis emotionem perueniunt. Num ex his soporosi torpidi fiunt? Morbi ex talibus diutius durant. Num circa iudicationem hi arescentes difficulter spirantes?

Quae ex lumbis ad collum ac caput progressa sunt, & leuis syderationis modo resoluerunt, conuulsoria fiunt & mentem emouentia. Num & soluuntur talia conuulsione? Ex talibus uarie aegrotant, & per eadem progressi.

Conuulsiones in his quae ab utero strangulantur sine febre, faciles sunt, uelut etiam Dorcadi.

Vesica intercepta tum alias, tum cum capitis dolore, habet quid conuulsorium. Quae in his cum torpore exoluuntur, difficilia sunt, non tamen perniciofa. Num id quod tale est, etiam mentem emouet?

Num & ossium circa tempora dissectiones, conuulsionem accersunt? aut si quis ebrius uerberetur, aut sanguis multus effluat in principijs, num hoc facit conuulsionem? In sudore sputa defluentia febricitanti, leuia sunt. Num ad dies aliquot alui humectantur? arbitror. Num his ad articulos abscessus fiet?

Quae modice ferociter mentem emouent, atrabiliaria sunt. Si uero a muliebrium purgationum retentione fuerint, ferina. Haec uero sa-

pius

pius accidunt. Num & cōuulsæ fiunt hæc? Num & uocis interceptiones cum sopore, conuulsoriæ sunt? uelut coriarij filix, quæ muliebribus purgationibus præsentibus affici coepit.

Quibus conuulsis oculi intente re-

cent, neque apud seipsos sunt, & diutius ægrotant. Sanguinis eruptiones ex contrario, malæ sunt; uelut in splene magno si ex dextra narè fluat. Et circa præcordia eodem modo res se habet. Verum cum sudore hoc peius est.

Ex naribus erumpente sanguine, cum exiguis sudoribus, perfrigescentia maligna ac praua.

Post sanguinis eruptionem, nigrorum per aluum transitus, malus.

Praua sunt etiam ualde rubra. Num uero quarto die hæc sanguinis eruptio contingit?

Soporosi ex his conuulsione moriuntur. Num nigris præegressis, & uentre tumefacto?

Vulnera sanguinem fundentia, exudantia, maligna. Sic affecti loquentes latenter moriuntur.

Post modicam sanguinis eruptionem, & nigrorum egestionem, in acutis surditas malum.

Sanguinis egestio in his pernicio-

sa. Verum surditatem soluit.

Lumbis dolentibus oris uentriculi dolores accedentes, signa hæmorrhoidum fluxionis futuræ sunt.

Arbitror autem & hos prægressæ hæmorrhoidum eruptionis signum esse.

Sanguinis eruptiones statis temporibus fientes, siticulosæ, difficiles ac exoluentes, si sanguinem non effuderint, in comitalem morbum finiunt.

Morbi qui statim turbulenti sunt, insomnes, sanguinem de naribus stil-

lantes, sexta die alleuati, noctu afflixerunt, postridie exudarunt, in somnum

que delati mentem emouerunt, hi large sanguinem fundent. Num & aquo-

sa urina tale quid significat?

Quibus sanguinis eruptiones plures, his temporis progressu alui male afficiuntur, si non urinæ concoctæ fuerint.

In iudicatorijs perfrigerationibus, sanguinis eruptiones fortes pessimæ sunt.

Capite grauati, iuxta sinciput dolentes, insomnes, sangui-

nem profundunt, tum alias, tum si quid ad collum contendat.

Vigilijs infestati, derepente cum iniqua iactatione, sanguinem fundunt, tum al-

ias, tum si quid antea perfluxerit. Num ubi inhorruerunt?

Colli dolores, oculi ualde rubicundi, sanguinis eruptionem significant.

Quibus aluo suppressa sanguinis eruptio fit, & insuper rigent, Num aluus inte-

stinorum leuitate corripitur, & obdura fit, aut ascarides insunt, aut utrunq;

Quibus ex lumbis recursus fit ad caput, & manus, hi stupidi, os uentri-

culi dolentes, saniosis ac serosis humoribus pleni, large sanguinem profunda-

dunt. Sed & aluus his turbulentis erumpit.

Quibus ex sanguinis eru-

ptione larga ac frequenti, nigrorum multorum fit egestio, hi suppressa aluo

dolorosi sanguinem profundunt. Cum quadam uero fluxione, facile ferunt.

Num hi multos frigidos sudores excludunt?

Conturbata in his urina non mala, neq; id quod genituræ simile in ipsa residet. Verum frequenter hi

aquosa mingunt.

Quibus in surditate & torpore parua est à naribus destil-

latio, ea habet quid difficultatis. Vomitus his confert, & alui perturbatio.

Quibus ex rigore febres cum lassitudine, his menses muliebres decurrunt. At collum in his dolorosum, sanguinis eruptionis è naribus signum est.

Et per nares sanguinè effundere spes est, ea quæ caput concutiant. Et quæ aurium sonitum faciunt, sanguinem profundunt, aut menses deducunt, tum aliàs, tum si iuxta spinam ardor consequetur. Fortassis autem & dysenteriam facient. Et circa uentrem palpitationes cum præcordij intensione sublonga ac tumente, sanguinis eruptionem significant. Inhorrescunt autem hi.

Quæ larga, uiolenta, multa ex naribus fluxerint, aliquando ad conuulsiones adducunt. Venæ sectio soluit. Frequentes & paulatim fiennes ad egerendum surrectiones, sufflauræ, uiscosæ, modica stercoracea habentes, cum præcordij ac lateris dolore, morbo regio participant. Num autem his suppressis hi exoluuntur? arbitror sanè: & sanguinem profundunt. His tensio lumborum, & dolores in his, sanguinis eruptionem significant.

Præcordij tensio, cum capitis grauitate ac surditate, & quæ ad hæc cōsequenter diuexant, sanguinis eruptionem indicant. Vndecimo die sanguinis stillicidia difficilia, tum aliàs, tum si superstillauerint. Qui in horribus simul iudicatorie exudarunt, postridie uero postquam inhorruerunt præter rationem uigilant, eos sanguinem effusuros esse arbitror. Qui

bus ab initio largæ sanguinis eruptiones, rigor fluxionem sistit. Ex sanguinis eruptione, rigores longi. Quibus capitis dolores, ac colli dolores, & totius corporis impotentia quædam, sanguinis eruptiones soluunt. Sed è tempore sic soluuntur.

Vrinæ quæ in his qui iuxta aures abscessus habent, cito & modice concoquuntur, malæ sunt. Et perfrigerari hoc modo malum est. Subfoporati, morbo regio affecti, non ualde sentientes, quibus singultus, his aluus erumpit, fortassis & suppressa est. Hi exoluuntur. Num his etiam abscessus iuxta aures fiunt? Suppressæ cum rigore urinae malæ, tum aliàs, tum si antea sopor apprehenderit. Num iuxta aures abscessus parotides dictos, in his fore spes est? Ex torminoso subsidentia limosa subliuida, mala est. Num ex præcordijs dolet puto dexterum? & exoluitur? Num abscessus iuxta aures talibus parum dolorosi? Aluus erumpens his in omnibus perniciofa est.

In anxiosis quibusdam uigilijs abscessus circa aures maxime. Ex uoluulis graueolentibus, in febre acuta, præcordijs sublimibus diutius permanētibus, abscessus circa aures oborti occidunt. Ex surditate leniter abscessus circa aures fiunt, tum aliàs, tum si anxiosum quippiam succedat, & soporosis inter hos adhuc magis. Abscessus iuxta aures leuiter syderatis mali sunt. Quæ conuulsorio modo exacerbantur, cum stuporis detentione, abscessus iuxta aures producant.

Conuulsio, tremor, anxietas, cum stuporis detentione, paruos circa aures abscessus exacerbant. Num quibus abscessus sunt iuxta aures, capitis dolore affecti sunt? Num & supernis partibus exudant, num insuper riget quoque aliquo modo? Deinde & aluus erumpit, & soporosum quippiam habent? Num & aquosæ urinae alba innatantia habentes, & quæ uarie exalbidae sunt, ac foetidae, abscessus iuxta aures faciunt? Num quibus tales urinae, frequentes sanguinis è

naribus

naribus stillæ profluunt: num & lingua his leuis est? Quibus magnum & frequentem spiritum habentibus, morbus regius, & febres acutæ cum præcordijs duris perfrigeratæ sunt, num his abscessus magni ad aures consistunt?

Soporosa, anxiosa, præcordia dolentia, uomitoria parua symptomata. In his abscessus iuxta aures oboriuntur. Antea uero & ea quæ circa faciem fiunt.

Aluo nigra stercoracea egerente, sopor insuper apparens, abscessum iuxta aures producit. Tussiculæ quæ sunt cum sputatione, abscessum circa aurem submouent.

In capitis dolore sopor & surditas, circa aurem abscessum aliquem eructat.

Præcordij distentio cum sopore anxioso, ac capitis dolore, abscessus circa aurem attollit. Dolorosi aurium abscessus, citra iudicationem dissipati, mali sunt.

HIPPOCRATIS COI PRÆ

DICTIONVM LIB. II. IANO COR

nario Medico Physico interprete.



EDICORVM prædictiones narratur multæ, & uariæ, & admirandæ, quales ego quidem neq; ipse prædixi, neq; alium aliquem prædicere audiui. Sunt autem aliquæ ex ipsis huiusmodi. Hominem perniciose affectum esse, & medico ipsum curanti, & alijs uideri. Verum medicum alterum superuuisse ac dixisse, Non peribit hic homo, uerum cæcus euadet.

Item ad aliū qui omnino male habere uidebatur, ingressum prædixisse, hominem quidem euasurum esse, uerum manum claudam habiturum. & ad alium quendam qui similiter superstes fore non putabatur, dixisse, ipsum quidem sanum fore, uerum pedum digitos nigrefactos putrefactione corrumpendos esse. Et aliæ huiusmodi prædictiones in tali prædictionis specie dicuntur.

Alius autem prædictionis modus est, ementibus ac negotiationes tractantibus prædicere, alijs mortem, alijs insaniam, alijs alios morbos: & ad hæc omnia, etiam ea quæ prioribus temporibus facta sunt prædicere, ac omnia uera narrare. Alia porro adhuc forma prædictionum est, athletas & eos qui morborum causa exercentur ac se fatigant cognoscere, si quid aut circa cibum deliquerint, aut alteratum quippiam ederint, aut potu uberiore usi fuerint, aut deambulationem intermiserint, aut res uenereas quasdam exercuerint. Horum omnium nihil illos latet, adeo ut etiam minima quæq; in quibus non paruerit homo, exacte cognoscant. Hi omnes prædictionum modi esse feruntur. Ego uero talia quidem non uaticinabor, Verum signa scribam, ex quibus & sanos futuros homines, & morituros coniectare oportet: & tum breui tempore, tum longiore, sanos futuros, aut perituros. Scriptum est autem à me & de abscessibus, quomodo singulos considerare conueniat. Arbitror autem & eos qui de claudicationibus prædixerunt, alijs que eiusmodi, confirmato iam morbo prædixisse, & quum iam manifestum esset, quod abscessus non esset recursurus, si modo intelligentiam habuerunt: multo sanè magis quam priusquam abscessus fieri inciperet.

Spero item & alia prædixisse, magis humano more quam refertur, quæ uidelicet ementibus & negotiationes tractantibus

stantibus prædixisse dicuntur, mortes, & morbos, & insanias. Atq; hæc mihi uidentur talia facta esse, & nulla mihi uidetur esse difficultas prædicendi, si quis circa talia studium ac curam adhibere uelit. Primum etenim aqua inter cutem laborantes, & tabidos, quis non cognouerit? Deinde deliraturi non diu latere possunt, si quis nouerit quibus his morbus cognatus est, aut prius aliquando in saniuerunt. Si enim hi homines ebriosi fuerint, aut carnes uorauerint, aut uigilauerint, aut in frigore aut calore inconsiderate uersati fuerint, multus timor est ex tali uictus ratione, ipsos deliraturos esse. Et eos qui hæmorrhoidas habent, si quis hyeme multo potu uti uiderit, & bono colore præditos, de his prædicere licet, quod ad uer multa spes sit sanguinis eruptionis, ut & decolores & aquatici sub æstatem fiant. Verū omnia hæc addiscere ac prædicere oportet, si quis in talibus studijs palinā ferre expetat. Licet enim ex scriptis prædicere, & mortem, & insaniam, & bonam habitudinem. Possem autem referre & alia multa huiusmodi, sed quæ facilima cognitu sunt uisum est mihi scribere. Confusio autem ut quàm prudentissime agant, tum in reliqua arte, tum in huiusmodi prædictionibus, illius probe memores, quod si cui successerit prædictio, is apud ægrotum intelligētia præditum in admiratione fuerit. Si uero quis aberrarit, supra hoc quod odio habetur, fortasse etiā insanire uidebitur. Quapropter iubeo, ut tum alias omnes, tum has prædictiones prudenter faciant: quāquam sanè & audiam, & uideam, neq; iudicare recte homines ea quæ dicuntur ac fiunt in arte, neq; narrare. Cæterū de his qui exercētur ac laboribus se fatigāt, eas asseuerationes quas afferūt hi qui ipsas asserūt, neq; esse puto, neq; si quis putat prohibeo. A nullo enim signo, neq; bono, neq; malo, læduntur suspiciones, cui signo fide habita quis sciat, an recte pronunciatum sit, aut secus: alioqui per me licet ut si quis uelit credat. Nō enim ego impedimēto sum. Arbitror autē si quid ueri ab ipsis dicitur, aut his qui de his qui exercētur asseuerāt, aut illis qui prius scripti sunt: primū quidem hunc qui cognouit, ex signis coniectasse. Deinde uero ambigue & humano more prædixisse. & simul eos qui id narrant monstris quàm factum fuit recensere. Nam neq; in morbis facile est peccata cognoscere, etiam si decumbant homines, & uictu parū nutriente utantur, ut nō adeo multa intueri opus sit eum qui hæc considerandi curam suscepit. Alij enim bibunt solum. Alij ad hoc quod bibūt, aut sorbitionem, aut cibū paucissimum assumūt. Necessesse igitur est eos qui uberiore potu usi sunt, magis difficulter spirare, & plus urinæ ejicere. Eos uero qui sorbitionem aut cibum auxerunt, magis & sitire, & febrire. Si uero quis utrisq; & potu & cibo, immodice usus fuerit, ad hoc quod febrit, & difficulter spirat, etiam uentrem circumtentum & maiorem habebit. Licet porrò & hæc, & alia omnia experimentis optime explorare, quæ & habemus, & omnibus recte utimur. Primum equidem & intelligētia, & oculis cognoscere facile est, hominem in eodem loco decumbentem, & exacta uictus ratione utentem, si non paruerit, aut obambulando, aut multa edendo. Deinde qui manibus contrectauit uentrem ac uenas, minus falli potest, quàm qui non contrectauit. Et nares in febrientibus quidem, & multa & bene significant. Odores enim multum inter se differunt. At uero in sanis & recto uictu utentibus, haud scio quare uel in hoc experimento faciendo uti possim. Postea audiendo, uocem & spiritum auribus cognoscere datur, quæ in sanis

non similiter sunt manifesta, sed qualiter etiam antea, Quod si etiam mores morborum ac ægrotorum didicerit medicus, non tamen quicquam prædicere oportet. Non enim difficilior spirabit homo, morbo adhuc errante, & febriet acutiore febre, & uenter intentus fuerit. Quare propter hæc nō tutum est prædicere priusquam statum accipiat morbus. Verum post hoc tempus, quicquid præter rationē acciderit, dicere oportet. Manifesta uero sunt mala, quæ propter ægri inobedientiam fiunt. Nam & spirandi difficultates, & alia huiusmodi postmodum sedabuntur, si ob peccatum fiant. Si igitur quis hanc iudicationem considerans dixerit, non delinquet. Atque ego quidem hunc considerandi modum nunc consulo, tum de his qui domi manent, tum de his qui exercentur, itemque de alijs omnibus, qualia peccata committant. At exactam illam narrantes rationem & audio, & derideo. Quum enim parum inobedientes fuerint homines, haud scio quomodo id deprehendere possim. Si uero maiora fuerint peccata, quem in modum considerare oporteat scribam. Oportet autem primum hominem, in quo quis per inobedientiam admissa cognoscere uolet, per totum diem intueri, & in eodem loco, & eadem hora, sole præsertim recens orato, hoc enim tempore subeuacuatus fuerit, & adhuc ieiunus est, & nullo labore fatigatus est, præterquam matutinis deambulationibus, in quibus minime inobediens est, si sanè ubi de somno surrexit homo, ad deambulandum prodierit. Quare necesse est eum qui iusta uictus ratione utitur, hac hora maxime æqualiter habere, & coloris, & totius corporis constitutionem. Quapropter & is qui huius considerationis curam gerit, acutissimus fuerit & mente, & oculis, eo tempore. Contemplari præterea oportet hominis mentem, & mores, & corporis uires. Alij enim alia facilius aut difficilior imperata faciunt. Primum igitur is cui inedia imperata est, si plura comederit & biberit, per hæc manifestus fiet, et tumidius corpus ipsius apparebit, et plenius ac coloratius erit, si non excrementa alui male ipsi processerint. Erit item animosior ad ferendum laborem. Considerandum etiam an ructum edat, aut à flatibus urgeatur. Hæc enim fieri solent his qui ita affecti sunt, propter hoc peccatum. Si uero dum edere multa cogitur, & fortiter laborare, aut cibum imperatum non ederit, aut ebrius factus fuerit, aut à cœna larga non obambulauerit, hoc modo explorare oportet. Si quidem cœnam non ederit, solito autem more deambulauerit, iucundiorē aspectū præ se feret, & uegetior ac operosior in exercitijs erit. Verum alui egestio modica et cōpacta maxime in hoc fuerit. Si uero cœna sumpta non deambulauerit, ructum utique edet, & flatuosus fuerit, & plenitudo nō minor apparebit, & inter laborandum magis quam antea sudabit, & difficulter spirabit, ac grauis erit, & transitus alui maiores, ac minus uiscosi his fuerint. Quod si neque cibum consumpserit, neque deambulauerit, pigrior utique fuerit ac tumidior. Si uero ebrius factus fuerit, sudabit magis quam antea, & difficulter spirabit, & ipse seipso grauior erit ac humidior. Sed & lætior erit, si nō caput ipsi affligatur. Quod si uxore semel usus fuerit, uegetior utique erit, & magis solutus. Si uero sapius rem peregerit, durior euadet, & squalorē quandā habebit, & decoloratior ac magis lassatus erit. Porro egestionis alui procedere oportet his qui laboribus exercetur, quādiu parū ederint, ac parum potauerint, modicas & duras, atque hoc quotidie. Si uero tertio quoque die, aut quarto, aut ex longiore interuallo

uallo prodierint, periculum est aut febris, aut alui profluuium corripiendos esse. Quaecumque uero egestionis liquidiores sunt, quam ut in transitu conformentur, haec sane omnes peiores sunt. At uero his qui multum edunt, & multum laborant, egestionis transitum mollem, oportet esse siccum, & copiam ciborum ingestorum pro ratione laboris. Procedunt autem ab aequali ciborum copia, his quidem qui minimum laborant, plurimae egestionis. his uero qui plurimum laborant, modicae, si sani fuerint, & iuxta uictus ratione utantur. Nam ad haec coniecturam facere oportet. Liquidiores autem egestionis, & sine febribus fientes, & quae septima die, aut citius iudicatur, comoda sunt si semel una uice omnes fiant, & non reuertantur. Si uero insuper febrerint homines, aut alui profluuium redierint, si longa fuerint, penitus mala sunt, siue biliosa fuerint, siue pituitosa, siue cruda: & uictus ratione propria, singula opus habent, itemque medicamentis alia alijs. Ceterum urinam iuxta potionis copiam mingere oportet, & semper aequalem, & quam maxime aceruatim, et momento paulo crassiore, quam id quod in potu acceptum fuit. Si uero fuerit aquosa, & copiosior quam pro eo quod bibi imperatum est, significat hominem non obedire, sed copiosiore potu uti: Aut non posse renutrir, quam diu talia urinam faciunt. Si uero paulatim stridat urina, aut medicamentis hominem opus habere significat, aut morbum aliquem circa uesicam habere. At sanguinem mingere, raro quidem & sine febre ac dolore, nihil mali significat, sed lassitudinum solutio fit. Si uero saepius mingat, & aliquid ex his accesserit, malum est. Verum praedicere oportet, siue cum dolore mingatur, siue cum febre, fore ut insuper pus mingat, atque ita dolores ac afflictiones quiescant. Crassa uero urina albam subsidentiam habens, aut circa articulos dolorem aliquem, aut tumorem significat. Aliae uero omnes subsidentiae in urinis eorum qui exercentur, a morbis circa uesicam fiunt, id quod ipsi manifestum facient. Cum doloribus enim erunt, & tales ut difficulter quis ab ipsis liberari possit. Atque haec quidem de his scribo, & huiusmodi alia dico. Ceterum ex his qui exactam ac certam praedictionum rationem praedicant, cum aliquibus ipse conuersatus sum, cum aliquorum uero filijs ac discipulis rem contuli, quorundam uero scripta accepi. Quare quum probe sciam qualiter quisque ipsorum sentiat, & exactas certitudines nusquam conpererim, haec scribere aggressus sum. At uero de aqua inter cutem, & tabidis, & podagris, & his qui a morbo sacro appellato corripuntur haec dico, ex aliqua quidem parte de omnibus idem. Nam qui hos morbos congenitos habet, is aegre ab ipsis liberari potest. Reliqua uero singulatim scribam de singulis. Eum qui ab hydrope, siue aqua inter cutem correptus est, & superstes esse uolet, bonis uisceribus praedictum esse oportet, ita ut natura se exerat, simulque facile concoquat, & bene spiret, sitque sine dolore, & totum corpus aequaliter tepidum habeat, & non circa extremas partes colliquatum. Melius est autem ut tumores potius habeat in extremis partibus. Optimum uero est neutrum horum habere. Nam molles ac graciles esse conuenit extremas partes, itemque uentre ad contactum mollem. Tussim uero adesse non oportet, neque sitim, neque linguam resiccare, tum reliquo tempore, tum post somnos, quando haec ualde fieri solent. At cibos libenter accipere oportet, & ubi multum satis comedit, non affligi. Aluum uero ad medicamentum quidem celerem habere, reliquo autem tempore egerere recrementum molle efformatum.

Vrinam

Vitam autem apparere cōuenit, pro studiōrū ratione, & uinorum mutatione transeuntē, Laborem uero ferre oportet facile, & lassitudinis exortem esse. Ac optimum quidem est hominē ita per omnia dispositū esse, & sic securissimē sanus fieri poterit. Sin minus, plurima ex his habeat. Nam spes erit ut superstes euadat. Qui uero nihil horum habuerit, sed contraria, eum desperatū esse scito. Qui autem pauca horū habuerit, quā bona esse dixi, si hydropē laboranti ad sint; huic exiguā spes restant. Cui uero multum sanguinis sursum ac deorsum eruperit, & febris insuper accesserit, eum multa aqua repletum iri timor est, atq; hic hydrops breuissimī temporis est, & ex quo paucissimi euadunt. Verum de hoc alteri prius significare oportet. At quibus magni tumores facti emarcescūt ac rursus attolluntur, hi magis cōualescunt q̄ illi qui ex sanguinis eruptione implentur. Verum fallunt hi hydropes ipsos aegrotos, faciuntq; ut ipsi à medicis discedant ac pereant. De tabescentibus quod ad sputum ac tussim attinet, eadem dico quā de pectore suppuratis scripsi. Oportet enim eum qui probe liberari uolet, facile sputū per tussim reijcere, & id esse album, & æquale, & eiusdem coloris, & ab inflammatione alienū. Quod uero à capite defluit, ad nares conuerti. febrem aut non inuadere, ut ne à coenis prohibeatur, neq; sitiat. Venter autem egerat quotidie, & id quod egerit sit durum, copia pro ratione ciborum ingestorū. Hominem uero q̄ minime tenuem esse oportet. Pectus autem laudare conuenit quadrangulum & hirsutum. & os ipsius paruum sit, & robuste carnosum. Quicūq; enim hæc omnia habuerit, maxime superstes erit. Qui uero nihil horū habet, interitui proximus. Quicūq; uero pectore suppurati facti fuerint, dum iuuenes sunt, ex humorū illapsu, aut fistula, aut alio quopiā huiusmodi, aut ex abscessus recurſu, hi nō euadunt, nisi ualde multa bona signa ipsis accesserint. Pereunt aut homines hi ad autumnū. Sed & ex alijs morbis longis pleriq; ad hoc tempus maxime moriūtur. Cæterum ex alijs minime superstitēs manent & uirgines, & mulieres, quibus ex suppressis mēſibus tabes oborta est. Si uero aliqua uirgo, aut mulier euasura est, & aliorū signorum bonorū multa accedere oportet, & mēſes splendide ac pure apparere, aut nulla spes est. Qui uero ex sanguinis eruptione, pectore suppurati fiunt, & uiri, & mulieres, & uirgines, non minus euadunt. Verum signis omnibus tum suppuratorum, tum tabescētium collectis, & superstitem futurum, & periturū prædicere oportet. Maxime uero euadunt ex sanguinis eruptione, hi quibus dolores sunt atrabiliarij, & in dorso, & in pectore; & qui post eruptionem minus dolent. Nam & tusses non ualde insuper accedunt, & febres pleræq; perseverant, sitim facile ferentes. At reuersiones eruptionis sanguinis maxime fiūt his, si non abscessus succedant. Optimi uero sunt abscessus sanguinolentissimi. Quibus autē in pectoribus dolores insunt, & per tempus attenuātur, & tussiant, ac difficulter spirant, neq; febribus insuper corripientibus, neq; suppurationibus succedentibus, eos interrogare oportet, quū tussiant & difficulter spirent, an & compactum quiddam & modicū odorem habens tussiendo reijciant. De podagricis hæc dico. Quicūq; aut senes sunt, aut circa articulos callos tofaceos concretos habent, aut ærumnose uiuūt, ac siccam aluum habent; hi omnes sani fieri non possunt humana arte, quātum ego noui. Sanant quidē hos optime, dyſenteria si successerint. Sed & alię eliquationes ualde prosunt, quæ ad infernos

locos repunt. Qui uero iuuenis est, & circa articulos nondum tofaceos callos concretos habet, & accurate uiuit, & laboris amans est, & aluum bonā habet ad obediendū pro studiōrū ratione, hic sanē medicum intelligentiā habentem nactus, sanus fieri poterit. Ex his porro qui à sacro morbo corripiuntur, difficillime quidem liberantur hi quibus à puero contigit morbus, & simul ad uirilem ætatem peruenit. Deinde hi quibus corpore in uigore ætatis cōstituto factus est, & fuerit à uiginti quinque annis, usque ad annum quadragesimū quintū.

Post hos autē, quibus factus fuerit morbus, nullam significationē præbēs ex qua corporis parte initiumumat. At quibus ex capite initium capere uidetur, aut à latere, aut à manu, aut pede, facilius curatur. Verū differunt etiā hæc morbi genera. Qui enim à capite initium sumunt, ex his grauissimi sunt. Deinde qui à latere. Qui uero à manibus ac pedibus, maxime sanari possunt. Cæterū horū curam aggredi oportet medicū, qui medendi modum nouit, si homines fuerint iuuenes, & laboris amātes, nisi mens mali aliquid habuerit, aut quis stupore attonito sideratus fuerit. Nam hæc atrabiliaria mētis emotiones, nō sunt conducibiles. Alij uero qui ad infernas partes cōuertuntur abscessus, boni sunt. Longe uero optimi & hic sunt, qui sunt sanguinolentissimi. Quicūque uero senes apprehēdi incipiūt, maxime moriuntur. Et si nō pereant, statim celerrimēque per se liberantur, à medicis aut minime opem ferunt. At quibus pueris oculi repēte distorti fuerūt, aut maius quoddam malū perpessi sunt, aut tubercula sub ceruicē oborta sunt, aut uocem graciliore adepti sunt, aut tusses siccae diuturnæ adhærerent, aut maioribus factis dolor procedit ad uentrem, & non exturbatur, aut in lateribus distortiones habēt, aut uenas crassas circa uentrē uaricosas, aut omentum descendit, aut testis magnus factus est, aut manus tenuis & impotens, aut pes aut tibia tota clauda facta est, citra aliam causam: his omnibus morbum ante factum fuisse, scire oportet, præ his uniuersis. Et plurimi qui pueros educāt, si interrogētur confitebuntur: quosdā uero etiā res latet, negātque se scire quicquam tale factum esse.

Qui porro de ulceribus cognoscere uolet, quomodo singula finient, eum primum hominum species perscrutari oportet, tum eas quæ meliores sunt ad ulcera, tum quæ deteriores. Deinde ætates nosse, in quibus singula ulcera curatu difficilia existunt. Locos item in corporibus perspectos habere, quantum alij ab alijs differūt: Sed & alia qualia in singulis accedunt tum bona, tum mala, nosse oportet. Si quis enim omnia hæc nouerit, is sanē sciet etiā quomodo singulorū euentus continget. Qui uero non nouerit hæc, nō nosse poterit quales fines ulcerum erūt. Species equidē bonæ sunt hæc. Leues, & cōmodatæ, & bonis uisceribus præditæ, & neque ualde carnosæ, neque duræ. Iuxta colorem uero sit species alba, aut nigra, aut rubēs. Hæ enim omnes bonæ sunt, si puræ sunt. Si uero pallidus color ammixtus fuerit, aut color ipse pallidus aut liuidus fuerit, peius est. Species uero quæ præscriptis cōtrariæ sunt, eas deteriores esse scito. At uero quod ad ætates attinet, tubercula quidē suppurata fiunt, & strumosa hæc plurimos pueros occupāt, & facillime ex ipsis liberantur. Senioribus uero pueris & adolescētibus, minus quidem oriuntur, uerum difficilius ab ipsis liberantur. Viris autē talia quidem tubercula nō ualde fiunt, uerū cæcra græcis dicta, ad modum faui concreta, horrenda: & cancri occulti submersi, & ex pustulis nocturnis herpetes, donec sexaginta annos transmiserint. Senis

bus aut nihil talium tuberculorū accedit, uerū cancri & occulti, & summas partes occupantes, & cōmoriuntur. Cæterū ex locis subalares difficiliores curatu sunt, & laterū mollitudines, ac femora. Nam & moræ in ipsis fiunt, & recidivæ. Ex articulis periculo maxime obnoxij sunt magni digiti, & præsertim pedum. Quibus aut in obliqua linguæ parte ulcus sit diuturnū, in his dentes cōsiderare oportet, an quis iuxta illam ulceris partē acutior sit. Vulnura magis lethalia sunt, quæ in uenas crassas in collo ac inguinib. infliguntur. Deinde quæ in cerebrū, & in hepar. Postea quæ in intestinū & uesicam. Sunt aut hæc omnia pernicioſa ualde, nō tamē ita ut nemo ex his euadat, uelut putatur. Nam & loci qui hæc nomina habēt, multum inter se differūt, & ijdem modi. Multum etiam differt corporis ipsius hominis structura. Aliquādo enim neq; febricitat, neq; inflāmur sauciatus. Aliquando etiā citra causam febricitat, et aliqua corporis pars omnino inflāmur. At quando is qui ulcus habet delirat, & facile fert uulnus, tūc uulnus aggredi oportet, uelut iuxta medicinæ & accedentiū rationem, euentum habiturum. Moriūtur enim homines ab omnis generis uulneribus. Multæ enim uenæ sunt & tenues, & crassæ, quæ sanguinē fundentes occidūt, si gliscere ac eo ferri ipsas contigerit, quas alia tēporis occasione si quis pertundat, corporibus prodesse sentiat. Multa uero uulnera in locis uilibus ac nō malis esse, & nulla re grauiā uidentur, & tamē sic dolore affligit plaga, ut respirare non possit. Alij uero præ uulneris dolore, quod sanē graue nulla re erat, spiritū quidem duxerūt, uerū delirarunt, & febrientes mortui sunt. Quicūq; enim aut corpus febricitans habēt, aut mentē turbatam, talia patiūtur. Sed neq; hæc admirari oportet, neq; formidare, illud expēdendo, quod & animæ & corpora hominum plurimū differunt, & uim maximā habēt. Quæcūq; igitur uulnera tempus nanciscuntur, aut corpus & mentē huiusmodi, aut ita gliscentē sanguinem, aut magnitudine tanta fuerint, ut homo ad curationem adduci ab eius cōtemptu non possit, ab his quidem discedere oportet, qualiācūq; tandem fuerint, diarijs animi deliquijs exceptis: alia uero omnia aggredi, quæ recēs sunt incussa, quo & febres effugiāt homines, & sanguinis eruptiones, & nomas ulcerum proserpētes, hi qui euadēt. Exactissime uero et ad plurimū tempus, eorū quæ grauissima sunt custodiā facere oportet. Nam ita facere iustū est. At uero nomæ lethalissimæ sunt, quarū putredines profundissimæ & nigerrimæ ac siccissimæ existūt. Præuæ etiā sunt ac periculossæ, quæ nigrā saniem remittūt. Albæ uero ac mucosæ putredines, minus quidē occidunt, magis autē reuertūtur, & diuturniores sunt. Herpetes aut minime omniū ulcerū quæ depascēdo proserpunt, periculosi sunt, uerū maxime difficulter submoueri possunt, quemadmodum cancri occulti. In omnibus aut talibus febrem superuenire una die cōfert, & pus t̄p̄ albiſsimū ac crassissimū. Commodat & corruptio nerui, aut etiā ossis, aut etiā amborū, tum in profundis, tum in nigris putredinibus. Nam in corruptionibus pus multū fluit, & putredines soluit. Porro ex capitis uulneribus lethalissima sunt quæ ad cerebrū pertingunt, uelut etiā antea scriptum est. Grauiā sunt et huiusmodi omnia. os nudū magnum, os infarctum, os diffractum. Si uero etiā osculū ulceris paruū fuerit, fissura uero ossis aliquādiu permāferit, periculosius est. Hæc autē omnia grauiora sūt, si & iuxta futurā sunt, & ex locis semper periculosiores summi in capite existūt. Cæterum in omnibus me-

morabilibus uulneribus interrogare oportet, si adhuc recentes fuerint plagæ, aut etiam iactus fuerint, an cōciderit homo, aut an in soporem altiorē collapsus sit. Si enim horū quippiam factū fuerit, ampliore custodia opus habet, nimirū quum cerebrum uulnus tunc perceperit. Si uero non recens sauciatus fuerit, ad alia signa respicere oportet, ac cōsiliū capere. Optimū quidem igitur est, neq; febre eum qui ulcus in capite habet, neq; sanguinē in super ipsi erupisse, neq; inflammationē, neq; simul ullum aliquem dolorem accessisse. Si uero quid horum apparuerit, securissimum est ut in principio fiat, & modico tempore pereat. Conducit autem in doloribus, etiam inflammationes ex ulceribus accedere. In sanguinis autem eruptionibus, pus in uenis apparere. Quæ uero in acutis morbis conferre febribus scripsi, ea etiam in his fieri conducit, & eadem hic quoq; bona esse assero, contraria uero mala. At incipere febrem in capitis uulnere quarta die aut septima, aut undecima, ualde lethale est. Iudicatur autem plerisq; si quidem quarta uulneris die febris inceperit, ad undecimam. Si uero septima die febris inchoarit, ad decimam quartam, aut decimam septimam. Si uero undecimo febre inceperit, ad uigesimalam: quemadmodum in febribus descriptum est, quæ absq; manifestis causis fiunt. Carterum in principijs febrū, siue delirium accesserit, siue alicuius membri sideratio, periturū hominem sciendum est, si non omnino aut ex optimis signis aliquod accedat, aut corporis uires adsint, Verum cōsiderabis modum. Nam homini adhuc spes salutis, sed claudū fieri articulum in quē incubuit necesse est, etiam si superstes maneat homo. Porro uulnera in articulis, quæ quidem magna sunt, & nervos cōiungentes penitus præsecant, clarū est quod claudos efficient. Si uero ambiguum fuerit de neruis, quomodo se habeāt, si quidem fuerit acutū telum quod rectū uulnus fecit, melius est obliquo. Si uero graue & obtusum fuerit id quod uulnerauit, nihil refert. Sed plagæ profunditatem & alia signa considerare licebit. Sunt autē hæc. Pus si in super accedat ad articulū, duriorē fieri necesse est. Si uero etiam tumores simul permāserint, hunc locū ad multū tempus durum esse necesse est, & quū sanum iam est ulcus, tumorem permanere necessariū est, simulq; flecti ac extendi, quæcūq; dum articulus incuruus est, curantur. Quibus uero etiā neruus elapsurus esse uidetur, securius de claudicatione prædicere licet, tum aliàs, tum si inferiorum neruorū aliquis fuerit exolutus. Ex his autem cognosces neruum qui excidet. Pus album & crassum, multo tempore defluit, doloresq; ac inflammationes circa articulū in principijs fiunt. Eadē fiunt etiam si os elabatur. At uero dissectiones in cubiti gibbis, præsertim quæ sunt cū inflammatione, ad suppurationē perueniunt, sectionesq; ac unctiones. Medulla uero spinæ si ægrotarit, siue ex lapsu, siue ex alia aliqua causa, siue sua sponte, homo & cruribus impotens fit, ut neq; si tangatur percipiat, & uentre ac uesica, ut circa prima tempora, neq; stercus, neq; urinam egerat, nisi ad necessitatem. Quum autē uetustior factus fuerit morbus, nō urgente homine, & stercus prodit, & urina. Moritur autem postea, nō multo interposito tempore. Quod si uero cuiuspiam fauces implentur sanguine sæpe singulis diebus ac noctibus, cui neq; caput antea doluit, & qui neq; tussim habuit, neq; uomuit, neq; febre correptus fuit, neq; dolorē habuit, nec pectoris, nec dorsi, huius cōsiderandæ sunt nares, & fauces, an ulcus aliquod habere compareat in hoc loco.

co, aut hirudinem. Oculi porro lippientes optime permutantur, si & lachryma, & sordes, et tumor, simul fieri inceperint. Si uero lachryma sordi fuerit permixta, & non ualde calida: Sordes autem alba fuerit & mollis, & tumor leuis solutus: Si ita hæc se habuerint, oculus cōglutinabitur ad noctes, ut doloris exors fit, atq; hoc modo res minime periculosa fuerit, ac minime diuturna. Si uero lachryma procedit multa & calida, cum paucissima sorde, ac paruo tumore, atq; hoc ex altero oculo tantum, tunc diuturnū ualde fit malum, uerū non periculosum, et doloris exors est hic modus. Et iudicationē in his maxime expectare oportet, primam quidem ad uigesimam diem. Si uero hoc tempus trāsmittat, ad quadragesimam expectāda est. Si uero neq; in his diebus sedetur, in sexaginta iudicatur. Per totum autem tempus hoc, sordem considerare oportet, an in digito misceatur, & alba ac mollis fiat, maxime sub iudicationis tempus. Si enim desinet, hæc faciet. At si utriq; oculi hæc perpetiantur, in maiori periculo sunt, ne ulcerentur. Verum iudicatio breuioris temporis erit. Sordes autem sicce ualde dolorosæ sunt, sed cito iudicantur, si non uulnus acceperit oculus. Si uero tumor magnus fuerit, dolorisq; exors & siccus, periculo uacat. Si uero cū dolore fuerit, malus est si siccus sit, & periculum est ne ulceretur oculus ac concreascet. Sed et grauis est tumor, si lachrymā coniunctam habeat, itemq; dolorē. Si enim lachryma procedit calida ac falsa, periculū est & pupillam exulcerari, & palpebras. Si uero tumor confederit, sed lachryma multa multo tempore effundatur, & sordes fuerint, uiris quidem palpebrarū euerisionem prædicere oportet: mulieribus autem & pueris exulcerationem ac euerisionem palpebrarum. At si sordes pallidæ aut liuidæ fuerint, & lachryma multa ac calida, & in capite ardor fuerit, & de tempore dolores in oculum decubuerint, & uigiliæ his accesserint, necesse est ulcus in oculo factum esse, & timor est quoq; ut talis rumpatur. Prodest autem febris accedens, aut dolor ad lumbos innixus. Prædicere uero his futura oportet, ita ut respectus & ad tempus habeatur, & ad ea quæ ex oculo fluunt, & ad dolores itemq; uigilias. Postquam uero & oculum contueri datum fuerit, si quidem compertus fuerit ruptus, & per fissuram prominuerit oculus, malum est & difficile ut sedetur. Si uero & putredo tali suberit, penitus inutilis oculus redditur. At uero alios ulcerū modos prædicere oportet, locos considerando, & putredines, & profunditates. Necessariū enim est iuxta ulcerum uehementiam cicatrices fieri. Quibus igitur rūpuntur oculi, & postea prominent, ut extra locū oculus sit, his & tempore, & arte, opē ferre nō datur, ad hoc ut uideant. Paruæ uero oculorum transmotiones sedari possunt, si nihil mali accesserit, et homo iuuenis fuerit. At ulcerum cicatrices, quibus nihil aliud mali affuerit, omnes & à temporibus, & ab arte, opem ferre posse putandū est, maxime recētissimas, & in iuuenū corporibus. Cæterum ex locis maxime oculi lædūtur, si exulcerantur. deinde pars quæ est supra supercilia, postea quicquid uicinissimum his locis fuerit. Pupillæ uero flauescences, aut argenti speciem referentes, aut ceruleæ, nō bonæ sunt. His autem paulo meliores sunt, quæ aut minores apparent, aut ampliores, aut angulos habentes, siue ex causis tales factæ fuerint, siue sua spōtæ. Caligines & nubeculæ, & cicatrices subalbicantes, leuigātur ac delentur, si nō uulnus aliquod in eo loco accesserit, aut prius cicatricem habuerit in hoc loco, aut unguem pterygion dictū. Si uero

splendicās cicatrix in nigra oculorū parte fiat, partem aliquam nigredinis dealbat, adeo ut si multo tempore permaneat, & aspera & crassa, etiam memoriam sui relinquat. Porro iudicationes quemadmodū in febribus scripsi, ita & hic se habent. Verum signa edoctū, iuxta differētiās lippitudinū prēdictionem facere oportet, quū pessima signa accesserint, diuturnarū lippitudinū, uelut de singulis perscriptū est: quū uero apparuerint optima signa, breuiū. Tunc enim septima die desituras esse prēdicendū est, aut prope hoc tēpus, & alioqui securas esse putandum est. Recidivas autē expectare oportet his, quibus melius habere contingit, neq; in diebus iudicatorijs, neq; signis bonis cōspectis. Omnium uero maxime urinæ statū in oculorū affectionibus cōsiderare oportet. Nā temporū occasiones repentinæ sunt. Dysenteria si quidē cum febre inuaserint, aut uarijs alui egestionibus, aut cum hepatis inflammatione, aut præcordij, aut uētris: aut quæ dolorosæ fuerint, aut cibos intercipiūt, sitimq; inducūt: hæ omnes malæ sunt. Et qui sanè plurima horū malorū habuerit, citissime peribit. Cui uero paucissima talium affuerint, huic plurimę spes sunt. Moriūtur autem ex hoc morbo maxime pueri quinquennes, & seniores adhuc, decēnes. Reliquæ uero ætates minus. At quæ dysenteria cōmodæ sunt, hæ mala hæc non inducūt. Verū sanguine & ramētis egestis, desiuērūt septima die, aut decimaquarta, aut uigesima, aut quadagesima, aut intra hæc tēpora. Huiusmodi enim egestionēs, etiā eos qui prius sunt in corporibus, morbos sanāt, antiquiores quidē diutius tēpore, recentiores aut in paucis diebus submouere possunt. Nam & quæ ueterum gestant, etiā ipsæ euadunt superstites magis ad partū, & ex partu, & foetus cōseruant, sanguine & ramētis egestis, etiā per multos mēses: nisi dolor ipse affuerit, aut aliud quoddā malum signū ex his quę in dysenterijs fieri scripsi, accesserit. Si uero aliquod illorū apparuerit, & foetui perniciē significat, & prægnavanti periculū, si nō post foetus effugiū, & secūda exolutionē, ipsa dysenteria eadem die, aut post modicū tempus desinat. Leuitates porro intestinorum, lienteria græcis appellata, quæ quidē sunt cōtinuæ & diuturnæ, & per omnē horam, & cū strepitibus, & sine strepitibus exturbātur, & similiter noctu ac in tertiu incumbentes, & egestionē subeunte aut ualde cruda, aut nigra & leui ac grauēolente: hæ omnes malæ sunt. Nam & sitim inducunt, & potum nō ad uericam promouēt, ut per urinam ejiciatur, & os exulcerāt, & ruborem eleuatū in facie efficiūt, & maculas solares uarios colores habētes. Simul aut & uentres emollitos, & sordidos ac rugosos reddunt. Ex talibus aut homines importētes fiunt, ad cibū capiendum, ad deambulandū, ad faciendū alia quæ facere debēt. Estq; morbus hic grauissimus senioribus. Vehemens est etiam uiris. Reliquis aut ætatibus multo minor. Quisquis aut neq; in ætatibus his est, quas male tractari ab hoc morbo dixi, & paucissima ex signis habet, quę mala esse scripsi, hic securissime dispositus est. Indiget autem curatione hic morbus, donec & urina pro ratione eius quod in potu acceptū est, procedat, & corpus ab ingestis cibis augmentū capiat, & à malis coloribus liberatū fuerit. At uero alia profluvia alui, quæ sine febre sunt, & breui tēpore durant, & mitia existunt. Aut enim eluta sedabūtur, aut sua spōte. Prædicere aut oportet excretionē subitus erumpentē desitura esse, quum tangēti uentrem manu nullus motus occurrerit, & in fine egestionis flatus penetrarit. Sedes autē euertuntur ac procidunt,

uiris quidē, quos ubi hemorrhoidas habent,alui profluuiū corripit: pueris autē calculo laborantibus, & in dysenterijs longis ac meracis: Senibus uero quibus mucī agglutinati insunt. Porro ex mulieribus, quæ magis aut minus in utero cōcipere solent, ita considerationē facere cōuenit. primū quidem specierū, Paruæ enim ad cōceptionem præstantiores sunt maioribus, tenues crassīs, albæ rubicūdis, nigræ liuidis. Quæ item uenas conspicuas habent, meliores sunt quā quibus nō apparent. Carnē autem uberiorē habere, aniculæ malū est, mammae autē tumidas ac magnas, bonū. Atq; hæc quidē ad uisum exposita sunt. Verum interrogare oportet etiam de menstruis purgationibus, an omnibus mēsi- bus cōpareant, & an copia satis magna, & an boni coloris sint, & æquales in singulis temporibus, & in iisdem mensiū diebus. Sic enim has fieri optimū est. Locum uero in quo cōceptio fit, quem sanē uterū nominamus, sanū esse oportet, & siccū, ac mollem. Sit item neq; retractus, neq; pronuus, neq; os ipsius sit auersum, neq; cōclusum, neq; euersum. Fieri enim nō potest ut cōceptio fiat, quod cūq; tandem taliū impedimentorū affuerit. Quæcūq; igitur mulieres in utero cōcipere nō possunt, uerū pallidæ apparēt, neq; febre, neq; uisceribus in causa existētibus, hæc capite se dolere dicēt, & mēses sibi male ac meracos prodire. Si uero autē breui, siue longo tēpore, ipsis sic affectis mēses non cōparuerint, uteri in his purgatione opus habēt. Quæcūq; uero bene coloratæ sunt, & carnē multā ac pingūē habent, & uenulas occultatas, & dolore carēt, & mēses his aut omnino nō apparent, aut modici & meraci prodeunt: Hic modus difficilissimus est ad cogendū ut concipiant. Si uero mensibus cōparentibus inculpate, & mulier sic corpore disposita fuerit, & non cōceperit, locus in quo est uterus in causa est, ut foecūda foetu fieri nō possit. Aut enim reuulsus est, aut euersus. Nā & alia quæ isthīc fiūt, cū doloribus decolorationēq; ac colliquatione fiūt. Quibus porro ulcus factū fuerit in utero, siue ex partu, siue ex tuberculo, siue ex alia quadam causa, his febres & inguinū tumores succedere necesse est, et dolores in his locis. Si uero & puerperij purgamēta simul fuerint intercepta, hæc mala si fuerint, omnino meraciora sunt & diuturniora. Et ad hæc præcordiorū ac capitis dolores. Ulcere autem facto & sanato, locum hunc leuiorē ac duriorē fieri necesse est, & minus concipere posse. Si uero solum in sinistra parte fiat ulcus, & mulier in utero concipiat, siue dum adhuc habet ulcus, siue ubi iam sana est, masculū magis enixurā esse spes est. Si uero in dextra parte ulcus fiat, & mulier cōcipiat, foemineū magis fore foetum expectandū est. At si febres corripiant cōcipere non potentē, & attenuata sit muliercula, interrogare oportet, an uteri ulcus aliquod habeant, aut aliud quippiā ex malis de quibus scripsi. Si enim in hoc loco nihil malī subesse apparuerit, quod causa sit attenuationis, & quod cōcipere nō possit, sanguinē uomiturā esse mulierē expectandū est, mēses autem tali necessariō euauerunt. Si uero febris soluta fuerit à sanguinis eruptione, & mēses compa- ruerint, in utero cōcipiet. Si uero priusquā sanguis erūpat, alui excremēta liquida facta fuerint prauo modo, periculū est periturā esse mulierē antea quā sanguinem uomat. Quæcūq; in utero se cōcepisse putāt, & non cōceperunt, & per multos mēses falluntur, menstruis purgationibus nō apparētibus, & uētres augeri ac moueri uident: hæc & caput dolēt, & collū, & præcordia, & in māmīs lac ipsis nō est, nisi modicū quiddā, atq; id aquosum. Postq; uero uētris tumiditas

exoluta fuerit, ac molles factæ fuerint, in utero cōcipient, si nō aliud quoddam impedimentum ipsis fiat. Nam hæc affectio bona est ad mutationem in utero faciendam, ut post hoc tempus in utero concipiant. At his quæ cōceperunt, dolores hi non fiunt, nisi familiares his fuerint capitis dolores, & lac in māmīs gignitur. At uero eas quæ à diuturnis fluxionibus uexātur, interrogare oportet an caput doleant, & lumbos, & infernā uentris partem. Interrogandæ sunt etiam de dentium stupore, & uisus hebetudine, & aurium sonitu. Quæcūq; autem dum ieiunæ sunt, subbiliosa uomunt per multos dies, quū neq; uterum gestent, neq; febricitent, eas interrogare oportet an lumbricos rotundos simul uomāt. Si enim hoc nō confitētur, prædicendū est ipsis futurū esse. Fit autē hic morbus maxime quidē mulieribus. deinde uero etiā uirginib. alijs autē hominibus minus. Quibuscūq; uero sine febris dolores fiūt, mortē quidē non inducūt, uerum pleriq; diuturni sunt, & multas mutationes ac recidiuas habent. Modi autē hi sunt. Primum quidem ex capitis doloribus aliqui sunt leues, aliqui multo grauiores. Vtrosq; uero hoc modo cōsiderare oportet. Quicūq; hebetem uisum habent, & rubor quidam ipsis fit in oculis, & pruritus frontem uexat, his sanguis sua sponte manans opitulatur. Atq; hic modus necessario simplex est.

Quibus uero dolores circa caput & frontem, ex magnis uentis fiunt, & ex frigore quum uehementer calfacti fuerint, eos grauedines quidem maxime perfecte liberant. profunt autē & sternutationes, & muci in naribus fientes, magis quidem sua sponte, sin minus, coacte. Grauedines autē fiunt perfecte, adeo ut & tusses succedant. & sternutationes succedentes si dolores non sedauerint, necesse est tubercula & decolorationes his succedere. Quibus autē dolores sine manifestis causis fiūt, & diuturni, & in toto capite, suntq; ipsi & graciles, & debiles, his prædicendū est morbū longe grauiorē priore esse. Si uero etiā ad colulum, & ad dorsum dolor descendat, caput relinquens, & rursus ad caput recurrat, adhuc grauior fit. Verū omnium horū grauiissimus est, si ex capite ad collū ac dorsum tendat. Utilitates autem his ex abscessibus fore expectandū est, aut ubi pus per tussim reiecerint, aut hæmorrhoidas habent, aut pustulas in corporibus enatas, Confert etiā caput furfures habens. Torpores & puncturæ pruriginosæ uelut ab urtica, quibus per caput discurrunt, aliquādo per totum, aliquando per aliquam partē: Sæpe uero & frigiditas aliqua ab ipsis sentiri putatur, uelut per caput discurrere, hos interrogare oportet, an etiam ad summam linguā punctura illa procedat. Si enim hoc fecerit, perfectus morbus fit, & qui difficilīus submoueri possit. Verum absq; hoc facilis est. Modi uero utilitatū consequendarū ex abscessibus cōtingent, ueluti antea scriptū est. Sed tamē abscessus minus in his succedūt, quā in illis. Quoscūq; uero unā cum doloribus uertigines corripiunt, malum egre exolubile ac furiosum existit. Senibus autem maxime hic modus fit. At alijs morbi circa caput, & uiris, & mulieribus, cum securitate uehemētissimi sunt, & diuturniores. fiunt autem & adolescentibus, & uirginibus in ea pubertatis ætate, & maxime circa mensium progressum. Mulieribus uero in capitis doloribus, alia quidem omnia fiunt, quæ & uiris. Verum puncturæ illæ pruriginosæ & affectiones atrabiliaræ, his minus quā uiris, si non menses penitus aboliti fuerint. Quibus colores dum iuuenes sunt, prauī sunt ad multum tempus, & continenter, non tamen morbi

regij modo: hi siue uiri sint, siue foeminae, caput dolent, & lapides ac terram comedunt, & hæmorrhoidas habent. Pallidi uero cum uirore colores qui diuturni sunt, & morbus regius uehemens non est, alia quidē eadem facere solent, uerum pro lapidum ac terræ esu, præcordia hos magis affligunt quam alteros.

Quicunq; uero multo tēpore pallidi apparent, & facies in tumore eleuatas habent, eos caput dolere sciendum est, aut circa uiscera dolorem habere, aut in sede malum aliquod in seipsis. Ex his autē apparentibus, plerisq; non unum aliud quod horum malorum apparet, sed plerunq; multa, aut etiam omnia.

Qui nocte uident, quos sanē nyctalopas uocamus, hi morbo corripuntur iuuenes, aut pueri, aut etiam adolefcētes, & liberantur sua sponte, aliqui in quadraginta diebus, aliqui septimo mense, quibusdam uero & per totū annum permanfit. Quapropter de tēpore coniectare oportet, ita ut & ad morbi robur, & ad ægritatem respicias. Abscessus autē his profunt insuper apparētes, & ad infernas partes fluentes. Verū non ualde accedunt, propter iuuentutē. At mulieres nō corripuntur ab hoc morbo, neq; uirgines quibus mēses comparent. Quibus autem lachrymarū fluxiones diuturnæ fuerint, & hi nyctalopes sūt, eos interrogare oportet an caput doluerint antea q̄p hæc reuelarunt.

Quicūq; dum neq; febricitant, neq; decolores sunt, sæpe & uerticem & tēpora dolent, si non alium manifestum habuerint abscessum in facie, aut grauitē loquātur, aut dentes doleant, his sanguinem per nares erupturū esse expectandū est. Quibus uero ex naribus sanguis fluit, hi alioqui sani esse uidentur, hos autem uel splenem in tumore eleuatum habere cōperies, uel caput dolere, & splendicans quiddam ipsis ob oculos obuersatur. Plerisq; uero horū simul & caput & splen, hoc modo se habere apparent.

Gingiuæ uitiatæ, & ora graueolentia his sunt quibus splenes magni. Quicunq; uero habent splenes magnos, & neq; sanguinis eruptiones ipsis cōtingunt, neq; oris graueolentia, horū tibiæ ulcera praua habent, & cicatrices nigras.

Quibus partes sub oculis uehementer attolluntur, eos magnos habere lienes comperies. Si uero etiam in pedibus tumores accesserint, aquā etiam habere uidebūtur. Verū & uentrem, & lumbos inspicere oportet. At uero distortionem in facie, si nulli alij corporis parti cōmunicent, cito sedantur, aut sua spōte, aut ad necessitatē coactæ: reliqui uero syderati sūt.

Quibus unā cum hoc quod mouere nō possunt, morbosa corporis pars attenuatur, hi in sanitatem restitui nō possunt. Quibus aut colliquationes nō accesserint, hi sani euadēt. Cæterū de tempore quando sani erunt prædicendum est, respectu habito ad uim morbi, & ad tempus, & ad ætatem hominis, & ad anni tempus, ita ut eius rei memor sis, quod uetustissimi morbi, & pessimi, & qui reuoluuntur, grauisime obediunt: itemq; hi qui sunt in uetustissimis corporibus. Sed & autumnus & hyems, ad tales morbos submouēdos minorem commoditatem exhibēt quam uer & æstas.

Dolores porro in humeris fiētes, qui quidem ad manus descendunt, torporesq; ac dolores inducunt, his abscessus non succedunt, uerum nigram bilem uomentes sanantur. Qui uero isthic in humeris manent, aut etiam ad dorsum progrediūtur, eos puris, aut atræ bilis uomitu effugiunt. Verum de his ita considerationem facere oportet. Si quidem enim facile spirauerint, ac graciles fuerint, atram bilem ipsos uomituros esse spes est. Si uero difficilius spirauerint, & in faciem ipsis color incur-

rit, qui prius non erat, siue rubicundus siue niger, eos magis pus sputuros esse sperandum est. Ad hæc uero considerandum est etiam, an in pedibus tumores sint. Nam & hoc signū in his cōsentit. Atq; hic morbus uiris uehemētissimus esse solet, à quadagesimo anno usq; ad sexagesimum. Qua ætate etiam coxendicum morbus maxime affligit. Porro de coxendicū morbo sic considerationē facere oportet. Quibuscūq; lenioribus & torpores uehemētissimi sunt, & perfrigerationes tum lumborū, tum crurum: & qui pudendū arrigere nō possunt: & quibus aluus nō egerit, nisi ad necessitatē coacta, & prodit ipsis multus stercoreaceus mucus: his maxime diuturnus morbus erit, prædicendūq; est annum ut minimū duraturum esse morbū, ab eo tempore quo incepit, & opem ad uer & ætatem expectādam esse. At uero iuuenibus nō quidem minus doloris inducit coxendicū morbus, uerū breuior est. Nam quadagesimo die liberantur. Sed neq; torpores uehementes accedunt, neq; perfrigerationes crurū ac lumborum. Quibus autem hic morbus est quidē in lumbis ac cruribus, non autem affligit adeo ut decumbant, cōsiderare oportet an alicubi sint collectiones in coxa, & interrogare an ad inguen dolor progrediatur. Si enim ambo hæc habet, diuturnus fit morbus. Interrogandū insuper est, an in femore torpores in sint, & ad poplitem progrediantur, & si hoc cōfiteatur, rursus interrogandum, an & per tibiā ad summū pedem procedant. Quicūq; enim pleraq; horū confelsi fuerint, his dicendū est, quod crura ipsis aliquādo calida, aliquando frigida fiant. Quod si morbus hic lumbos relinquens, aliquibus ad infernas partes uertatur, eos cōfidentes esse iube. Quibuscūq; uero coxas & lūbos non relinques, ad supernas partes cōuertitur, malum id esse prædicēdum est. At quibus circa articulos dolores fiunt, & tumores, & sedantur, nō podagrico modo: in his cōperies uiscera magna, & in urina subsidentiā albam. Et talis si tempora eleuarit, dicet se sæpe dolere, dicet etiam sudores sibi nocturnos oboriri. Si uero neq; in urina subsidet talis subsidentiā, neq; sudores fiunt, periculū est ne aut claudifiant articuli, aut affectio abscessus humore melli similis, quem melicerida uocāt, sub ipsis nascatur. Fit autem hic morbus his quibus in puericia & iuuentute sanguis ex naribus fluere solitus desiit. Proinde interrogandū est de sanguinis eruptione, an in iuuentute facta fuerit: & an pruriginosa uelut ab urtica pūcturæ, & in pectore, et in dorso insint: et quibus alui dolores fortes inducant, citra exturbationes: & quibus hæmorrhoides fiant. Hoc enim horum morborum principium est. Si uero etiam malo colore præditi sint hi homines, interrogandum est an caput doleant. Hoc enim fatebuntur. Quibus uero ex his alui dolores in dextris fuerint, dolores his uehemētiores fiunt, & præsertim quū ad præcordium iuxta hepar, reliquæ doloris fuerint. His autē doloribus prodest strepitus statim in aluo obortus. Postquam autē dolor quiueuerit, urinā crassam ac cum uirore pallidam mingūt. Atq; hic modus nequaquā lethalis est, uerū ualde diuturnus. Quū autem iam uetustus fuerit morbus, homines ab ipso cæcutiunt. At de sanguine interrogare oportet, an in iuuentute fluxerit, & de uisus hebetudine, & de urine euacuationis pallore, itemq; de strepitibus an insint, & succedentes prosint. Hæc enim omnia fatebuntur. Impetigines & lepræ, & uiriliginis albæ, leucæ appellatæ, quibus quidem iuuenibus aut pueris aliquid horum factum est, aut paulatim conspectum in multo tempore augetur:

his non putare oportet abscessum esse, eam papularum eruptionē, sed morbum. Quibus uero horū aliquid factū est multum & derepēte, hoc sanē fuerit abscessus. Fiunt autem leucae quidem ex lethalissimis morbis, qualis est & morbus tabidus appellatus. Leprae uero & impetigines, ex morbis ab atra bile factis. Ex his autē facilius sanantur ea quae in maxime iuuenibus fiunt, & quae recētissima sunt, & in mollissimis ac carnosissimis corporis partibus producuntur.

HIPPOCRATIS COI COA

CAE PRAENOTIONES, IANO COR-
nario Medico Physico interprete.



VI ex rigore perfrigerantur, caput ac collum dolentes, uoce destituti, insuper exudantes, postquam se recollegerint moriuntur. Molestē ferre morbum cū perfrigeratione, pessimum est. Perfrigeratio cū duricia perniciosa est. Ex perfrigeratione, timor, & tristitia prae ter rationē, in conuulsionem finit. Ex perfrigeratione urinas intercipi pessimum est. Ignorantia cū rigore, malum. Malū item obli-

uio. Soporosi rigores aliqua tenus perniciosi, & flammeus in facie color, cū sudore, in his malignus est. In his frigiditas posteriorū partium conuulsionem accersit. Et in summa, posteriorū partium frigiditas, cōuulsoria est. Ex dorso horrores frequentes, & cito transeūtes, aegre tolerari possunt. Vrinae enim interceptionē dolorosam significant. Insuper exudare, his pessimum est. Rigor cōtinenter uexans, corpore iam debili existente, lethalis est. Qui frequēter exudant, ac insuper rigent, perniciosum hoc est, & in finē suppurationē habere comperiuntur, uentresq; perturbatos. Rigores ex dorso molestiores sunt. Qui uero decima septima die rigore habuit, & quarta ac uicesima insuper riguerit, malignum hoc est. Horrore affecti, caput dolentes, exudantes, malignū id est. Horrore affecti, multū insuper exudantes, difficili malo implicātur.

Rigores multi torpidi, maligni sunt. Quibus sexta die rigores fiunt, hi aegre iudicātur. Quibus sanis horrores frequētes sunt, hi ex sanguinis fluxione suppurantur. Horror & spirandi difficultas in doloribus, signa tabis sunt. Ex pulmonis suppuratione, & circa uentrē aliquando ac clauiculae dolores, & anxie stertere, sputi copiam in pulmone significat. Horrore affecti, anxij, delassati, lumbos dolentes, aluos humectas habent. Affectiones insuper rigentes, & quae ad noctem aliquanto magis exacerbantur, cum uigilijs ac delirio in somnis, aliquādo urinas inuoluntarie emittentes, in conuulsionem desinunt. Continui rigores in acutis, prauī sunt. Ex rigore, cum capitis dolore exolutiones, perniciosae. Cruentae in his urinae prauae. Rigor cū distentione neruorū in posteriora occidit. Qui in horruerūt & exudarūt iudicatorio modo, & postridie prae ter rationem horruerunt, si quis nō uigilijs infestetur, neq; concoxerit, ei sanguinē erupturū esse puto. Vrinae cū rigore suppressae, male et cōuulsorige, tū aliās, tū si quis antea graui sopore pressus fuit. Spes autē in his est abscessus retrō aures fore. Rigores uelut in febre tertiana, si in media inordinata febre exacerbētur, ualde maligni sunt. Si uero contrario conuel-

conuellentibus modo exacerbentur, cum rigore & febre, perniciosum est. Vocis interceptiones ex rigore, soluuntur tremore. Et insuper rigentes tremores succedentes iudicant. Qui ex rigore cum capitis dolore exoluuntur, in periculo uersantur. Cruenta urina his mala est. Quibus rigor, his urinæ suppresio. Conuulsio in febre, manuum ac pedum dolores, maligni sunt. Malignus est & doloris ex femore progressus. Neque genuum dolor bonus est. Sed & surarum dolores maligni sunt, mentemque emouent, tum alias, tum si urinæ subsidentia in medio innatet. Febres ex præcordiorum dolore malignæ sunt, sopor in his pessimus est. Qui frequenter exudare cum præcordij intensione non cessant, plerumque maligne habent, & dolores in summum humerum ac clauiculam incumbentes, in his prauis sunt. Febres tertianæ naturam referentes, cum anxietudine, malignæ sunt. Vocis interceptiones in febre malæ sunt. Lassati, caligantes, uigilantes, soporosi, exudantes, recalescentes, male habent. Lassati cum horrore si exudarunt iudicatorio modo, recalacti in morbo acuto, male habent, tum alias, tum si circa hæc sanguis de naribus stillarit. E regio morbo abunde colorati, moriuntur, alba uero alui egestio in his præcedit. Febres tertianæ naturam referentes erroneæ, in pares dies translapse, difficiles sunt. Anxietudines in diebus iudicatorijs, si in his sine sudore perfrigerentur, & omnes qui sine sudore perfrigerantur citra iudicationem, male habent. Et qui insuper riguerunt ex his, ubi uomuerunt meraca, anxij, tremuli in febre, malum. Qui ex rigoribus, paruis sudoribus perfrigerantur, malum. Exudantes, uigilantes, recalescentes, malum. Qui insuper exudant in febre, maligne habent. Quibus biliosa est alui egestio, his circa pectus morsus & amaritudo, malum est. In febribus inflata aluo, flatulentus non erumpere malum. Lassati, singultientes, stupore detenti, mali.

Præter consuetudinem quid facere, uelut est, proponere sibi aliquid, & expectare aliquid, prius non consuetum, aut contrarium, malum est, & mentis emotioni proximum. Qui morbi in malis signis leuantur, & qui in bonis non remittunt, difficiles sunt. Qui exudant, & maxime capite, in morbis acutis submolestie ferentes, malum, tum alias, tum si urinæ sunt nigrae & turbidus spiritus in his malus. Extremæ partes si in utraque partem cito transmutentur, malum est. Sed & sitis huiusmodi mala est. Ex moderato ferox responsio, malum. Vox acuta, malum. Præcordia his intro trahuntur. Qui ex perfrigeratione sudorosa cito recalescunt, malum. Qui in acutis exudant submolestie ferentes, malum. Qui præter rationem nulla existente uasorum euacuatione, impotentes fiunt, malum. In febre tractus uelut à uomitu, in secreationem desinens, malum. Torpor in utraque partem cito translabens, malum.

Sanguinis stillæ pusillæ, malæ. In acuto morbo sitis præter rationem soluta, malum. Qui ad manum exiliunt, male habent. Quibus cum febre ardente, tumores somnolenti, torpidi fiunt, his dolor in latus superueniens leuis siderationis ac resolutionis modo occidit. Suffocatio in acutis, ægris attenuatis, perniciosa. In perniciosis iam parui tremores, & uomitus ærgi nosus. Qui in potibus substrepunt, & submurmurant in siccis: & qui difficulter deglutiunt spiritu tussiente, perniciose habent in acutis perfrigeratis. Rubores in manibus ac pedibus, perniciosi. Efflantes & refracti, in somnis leuiter

leuiter suspicientes, morbo regio abunde colorati moriuntur, alba alui egestio in his praecedit. In febribus mētis emotiones taciturnae, in eo qui uoce priuatus non est, perniciose sunt. Liuires fientes in febre, breui mortem affore significant. Quibus in febre dolore lateris fiiente, aluus multa aquosa ac biliosa egerit, hi alleuantur. Quibus uero inediae cōsequenter accedūt, ac sudores, cum bono faciei colore, & aluo liquida, ita ut adsit etiam aliquis cordis, seu potius oris uentris dolor, hi ubi longius ægrotarunt, peripneumonicoꝝ modo moriuntur. Febrienti si atra bilis in principio, sursum aut deorsum prodierit, lethale est. Qui cum perfrigerationibus, nō sine febre, superne exudant, moleste ferentes & phrenitici, in acuto morbo perniciose habēt. Dolores modice acuti, ad clauiculam ac sursum transeuntes, perniciosi. In longis perniciosus morbis, sedis dolor lethalis est. Si debiliter iam affecti, nō uideant, aut non audiant, aut labium, aut oculus, aut nasus ipsis distorqueatur, lethale est. In febribus inguinis dolor, morbum diuturnum significat. In febribus iudicationes impeditae ac sublatae, temporis quidem diuturnitatē inducunt, non autē perniciosae sunt. Febres ex doloribus uehementibus diuturnae. Mētis emotiones tremulae, palporiae, phreniticae sunt, & dolores circa suram, in his mentem emouent. Quicūq; in febre cōtinua, uoce destituti iacentes, oculis cōniuentes nictant, hi si postquā sanguis ipsis ex naribus fluxit, & ubi uomuerūt loquantur, & ad seipsos redeant, seruātur. Si uero haec nō fiant, difficulter spirantes facti breui moriuntur. Qui melius habuerunt, si postridie exacerbentur, malum est. Si tertia die cohibiti, quarta exacerbentur, malū est. Num & tales exacerbationes phreniticae sunt? Quibuscūq; desinunt febres, nō in diebus iudicatorijs, his recidiuā fiunt. Qui in principio tenues, cum capitis pulsu, & urina tenui, ad iudicationē acerbantur, his nihil miri est si & mentis emotio insuperq; uigiliae accedant. In morbis acutis, motus, iactatio, somnus turbulentus, quibusdam cōuulsionem significat. Turbulentae cum ferocia excitationes mentē emouentes, malae sunt, itemq; conuulsoriae, tum aliās, tum cū sudoribus. Conuulsoriae etiam uidentur colli ac dorsi perfrigerationes, immo etiā totius corporis. In his mictiones sunt pelliculosae. Deliria cum sopore, cōuulsoria. Mētis emotiones modice feroces, ferinae sunt, sed & cōuulsionem significāt. In morbis lōgis, uentris praeter rationem tumores, cōuulsorij. Affectiones statim turbulentae, uigilias inducentes, sanguinē de naribus stillantes, sexta die alleuantes per noctem, uerum postridie rursus affligentes, exudantes in somnū delatae, mentē emouentes, large sanguinē fundunt, & morbos soluunt. Aquosa urina talia significat. Qui cū relatis, ab atra bile mēte moti, tremuli fiunt, maligne habent. Delirium in spiritu & sudore, lethale est. Lethale est & in spiritu ac singultu. Insomnia in phrenitide euidētia bona sunt. In phrenitide egestiones alui albae, & torpor, malum. Rigor his pessimus est. In phreniticis in principijs affectiones mansuetae, ac frequenter trāsmutationem habentes, male sunt. Quibus ab atra bile mēte motis, tremores fiunt, malum est. Qui ab atra bile mente moti, tremuli fiunt, ac saluam fundunt, num sanē phrenitici sunt? Mente moti, acute insuper febrientes, phrenitici fiunt. Phrenitici parubibentes, strepitū ualde percipiētes, tremuli, aut cōuulsi. In uehementē phre

niticis, tremores lethales sunt. Deliria circa necessaria, pessima. Quæ ex his exacerbantur lethalia sunt. Mentis percussiones, uoce clangorosæ, linguæ conuulsiones tremulæ, & uoces tremulæ fientes, mentē alienāt. Duricies in his perniciofa est. Prædebilitatorū deliria pessima. Affectiones in phreniticis frequenter transmutationē habentes, cōuulsoria, prauæ. Phrenitici cum perfrigeratione saluam fundentes, uomitum nigrū indicant. Qui uarie ægrotant, & frequenter soporosi mente mouentur, his nigrū uomitum expectandum esse dicito. Quæ conuulsorio modo exacerbantur, stupefactoria sunt. Tumores iuxta aurē, in morbis lōgis parui sunt: Sanguinis fluxiones ac uertigines insuper apparētes, perniciosæ. Febres uertiginosæ, & cū uoluulis, & sine uoluulis, perniciosæ. Anhelosis febris postea acuta. Cū præcordiū intēto perfrigeratis, magnus circa aurem tumor. Quibus in febre dolores circa lumbos & infernas partes fientes, septū transuersum contingunt, infernas partes relinquētes, perniciosi sunt, tum aliàs, tum si aliud quoddam signum prauum accedat. Si uero alia signa nō fuerint praua, suppuratum fore timor est. Pueris febris acuta, & alius suppressa, cum uigilijs, & calcitrare, et colorem mutare, & ruborem habere, cōuulsorium est. Affectiones statim turbulentæ, uigilias inducentes, & nigra compacta egerētes, partim sanguinem fundunt. Affectiones cum uigilijs & anxietudine repentina, sanguinem fundunt, tum aliàs, tum si quid etiā antea profluxerit. Num & qui modice perfrigerati postea horruerunt: At qui circa exacerbationes tussiūt, & parum exudant, maligne habent. Ad latus dolore ac suffocatione accedente, hi suppurantur. Quibus in febribus continuis pustulæ per totum corpus erumpunt, lethale, si non purulentus abscessus fiat, maxime autem circa aurem his fieri solet. In morbo acuto externas partes perfrigerari, internas autem ardere, & sitire, malum est. Febres cōtinuæ per tertiam diem augescētes, periculosæ. Quibus febris aliquando intermittit, periculo uacat. In febribus longis, aut tubercula, aut dolores, in articulis fiunt: & si facti fuerint, non sunt inutiles. Capitis dolor in morbo acuto, præcordiū reuulsum, non profusente ex naribus sanguine, ad phrenitidem deuenit. Febres lypiricæ, bilis sursum ac deorsum effusione non accedente, non soluuntur. Morbus regius ante septimum diem accedens, malum. Septimo uero ac nono, & undecimo ac decimoquarto, iudicatorius est, si non præcordia induret: sin minus, ambigua res est. Frequētes per eadem recidiuæ, circa iudicationē sanguinolentæ, nigrorum uomitum faciunt, fiunt autē & tremulæ. Dolores qui in tertianis febribus exacerbantur, tertianarū generis morbum faciunt, & grumosum sanguinem egerunt. In febribus secundū uenam quæ est in collo, pulsus ac dolor, in dysenteriam desinit. Color qui sæpe in calore trāsmutatur, utilis est. In biliosis spiritus magnus, & febris acuta, cū præcordij intensione, iuxta aurem abscessum facit. Qui ex morbis lōgis se refocillātes bene cibū accipiūt, & nihil proficiūt, hi maligne recidiuā incidunt. Quibus in febribus uenæ in tēporibus pulsant, et facies sana est, et præcordiū nō molle, diuturnū morbum significat, & nō desinentē citra multi sanguinis ex naribus fluxū, aut singultum, aut cōuulsionē, aut coxendicū dolorem. In febre ardente si alius eruperit, mortale est. Ex alui dolore laborioso, febris ardens, perniciofa. In febribus

febris ardentibus, si aurium sonitus accedant, cum uisus hebetudine, & grauitate secundum nares, melancholico modo ab atra bile mente mouentur, sanguine ipsis non erumpente. Tremores in febribus ardentibus, mentis percussio soluit. In febre ardente fluxio sanguinis ex naribus, quarta die, mala est, si non aliud quid boni coinciderit. Verum quinta minus periculosa est. Qui ex febribus ardentibus aliquantulum perfrigeratibus, cum egestionibus alui aquosis ac biliosis laborant, oculis malum est, tum alias, tum si stupidi fiant. Febris ardens rigore superaccedente soluitur. Febres ardentes recidiuare solent, & ubi per dies quatuor significationem de se praebuerunt, postea exudant. Sin minus, septima die. Febres ardentes quatuordecim dies diiudicant, aut alleuant, aut perimentes. Ex febre ardente, abscessu purulento circa aurem non fiente, non ualde seruantur. Lethargici, tremuli ex manibus, somnolenti, discolors, tumidi, pulsibus tardi sunt, & partes sub oculis eleuatas habent, et sudores insuper accedunt, & aluos biliosas, & intemperatas subtumidas habent. Si uero ob aridas habuerint, urinae & egestionis alui latenter ipsis progrediuntur, urina uelut iumentorum est, potum non expetunt, neque aliud quicquam. Postquam uero resipuerint, collum dolorosum se habere dicunt, & sonitus per aures transire. Qui uero ex lethargicis seruantur, plerumque pectore suppurati fiunt. Quibuscumque in febribus tremores circa iudicationem cessant, his temporis progressu abscessus dolorosus suppuratus in articulos fit, & uesica dolorosa. Febrientibus quibus rubores sunt in facie, & dolor capitis fortis, et uenarum pulsus, his sanguinis fluxio plerumque contingit. Quibus autem cibi fastidia sunt, & oris uentriculi morsus, & multum saliuae, his uomitus fit. Quibus uero ructus adsunt, & flatus, strepitus ac eleuationes uentris, his fit alui exturbatio. Qui diutius secure ex febre continua laborant, citra dolorem aut inflammationem, aut aliam causam, his abscessus expectandus est cum dolore ac tumore, & magis in infernis partibus. Expectare autem oportet abscessus, his magis qui trigessimum annum egressi sunt, & tunc expectare abscessus oportet, ubi uiginti dies febris transmiserit. Senioribus autem minus fiunt, & ubi multo tempore febres durant. At intermittentes & erroneo modo inuadentes, autumno maxime in quartana leniter transeunt, & hoc magis his qui triginta annos exceßerint. Abscessus autem hyeme magis fiunt, & tardius desinunt, & minus recurrunt. Quibus uero saepe recidua contingit, his si semestris tempus transmiserint, tabes coxendicum leniter accedit. Quaecumque signa febris se opponunt, & non abscessus significationem habent, maligna sunt. Febres quae neque in diebus iudicatorijs, neque post solutorium signum decesserunt, recidiuant. Acuti morbi in diebus quatuordecim iudicantur. Tertianae exquisita in quinque aut septem circuitibus, aut ad summum in nouem iudicatur. Quibus febre incipientibus, sanguis de naribus sternutatione fiente destillat, & urina subsidetiam albam in quarta die habet, his in septima die solutionem significat. Morbi acuti iudicantur, sanguine de naribus fluente, in die iudicatorio: & sudore multo fiente, & urina purulenta ac uitri formam referente, prodeunte, & bonam subsidetiam habente, & acruatim exeunte: Abscessum item memorabili fiente, & aluo mucosa & cruenta de repente egerente: & uomitibus non prauis fientibus circa iudicationem. Somni profundi, non turbulenti, firmam iudicationem significant. Turbulenti uero cum dolore corporis, inconstantes sunt. Septima die,

aut nona, aut decimaquarta, fluxiones sanguinis à naribus fientes, plerunq; febres soluunt: Similiter & alui fluxio biliosa, & qualis in dysenteria fieri solet: & genuum ac coxendicū dolor: & urina concocta ad iudicationē. In muliere uero etiam menstruæ purgationis fluxus. Quibus in febribus sanguis abunde undecunq; profluxit, his in refectionibus à morbo alui humectantur. Qui in febribus exudant, caput dolentes, aluo suppressa, cōuulsi fiunt. Mentis emotiones modice feroces, & ferinum, & cōuulsionem significant. Cōuulsio in febre fiens, & eadem die desinens, bona est. Conuulsio in febre fiens, sedat febrem eadē die, aut postera, aut tertia. Si uero tēpus in quo incepit transgrediatur, & nō desinat, malum est. Febres intermittētes, uerū inæqualiter calescētes, aluo inflata, pauca egerente, in his post iudicationē lumborum dolore sequuto, alui erūpunt. At amburētes ad manū, torpidæ, siticulosæ, anxiosæ, in his aluo suppressa grauati exoluuntur. Quādoq; uero & rubicundæ in pedibus ambustiones, eadem significant. Hybernæ febres quartanæ, leniter in acutos morbos transeunt. Capitis dolor pertinax cū febre acuta, & alio signo maligno, lethale est. Cæterum sine signo malo, transgrediens uigessimū diem, sanguinis aut puris fluxum è naribus, aut abscessus ad infernas partes significat: fluxiones quidē iunioribus trigintaquinq; annis, senioribus uero, abscessus. Si uero circa frontem ac tempora fuerit dolor ille pertinax, fluxiones.

Quibus capitis sunt dolores, & sonitus auriū, citra febrem, & uertigo, & uocis tarditas, & manūū torpor, eos aut syderatos, aut comitiales, aut obliuiosos fore expecta. Qui caput dolent, stupore correpti, delyrantes, aluo suppressa, oculo ferociēte, florulenti, hi in posteriore partem cōuelluntur. Capitis succussions, oculi rubicūdi, mente manifeste emouētes, perniciosæ sunt. Non cōmoriuntur hæc, sed circa aurem tumore faciunt. Capitis dolor, cū sedis & pudendorū dolore, & torporem, & impotentia inducit, & uocem resoluit.

Hæc horrenda nō sunt, uerū somnolenti ac singultientes fiunt nono mense, ex quibus soluta uoce, in idem restituntur. Qui in capitis dolore ascardas habent, his surditas & sopor cōsequens, abscessus circa aurem exsuscitat.

Qui caput dolent, stupore detenti, dolorosi, oculum rubicundū habentes, sanguinē effundunt. Capitis cōcussions, & auriū sonitus, sanguinem effundunt: aut mulieri menses deducunt, tum aliàs, tum si iuxta spinam ardor cōsequatur: fortassis autem dysentericis fluxiones. Capite grauati, iuxta sinaput dolētes, uigilijs infestati, sanguinē effundūt, tum aliàs, tum si quid ad cololum se extendat. Vomitus in capitis doloribus æruginosi, cum surditate, uigilantibus, cito insaniam excitant. Quibus capitis ac colli dolor est, sed & totius corporis tremula quædam impotētia, sanguinis eruptio soluit. Quin & tempore hæc soluuntur. Verum uesicæ in hoc supprimuntur. In acutis capitis doloribus, & in torpidis cū grauitate, conuulsionem fieri solent. Capitis dolore soluit pus per nares, aut sputa crassa, & nō olentia. Soluit item ulcerum eruptio. Quandoq; & somnus, & alui fluxus. Capitis dolor moderatus, cū siti cibū capiente, aut cū sudore nō soluente febrē, abscessus in gingiuis, aut circa aurem significat, aluo nō exturbata. Capitis dolor soporosus cū grauitate, conuulsoriū quid facit. Caput dolentes, siticulosi, aliquatenus uigilantes, obscuri cognitu, impotētes, ex aluo liquida delassati, num mente mouētur.

Caput

Caput dolentes, furdastri, manibus tremuli, collū dolentes, mingētes nigra condensata, uomētes nigra, perniciose habent. Caput dolentes, exudātes, aluum suppressam habentes, cōuulsioni obnoxij sunt. Sopor ubiq; malus est. Soporosi in principijs fientes, cū capitis, lumborū, colli præcordij dolore, uigilantes, num phrenitici sunt? Nasus in his destillans perniciosus, tum aliās, tum quarto ab initio die. Malum est etiā alui proluuiū ualde rubicundum.

Soporosi ab initio exudantes, urinīs cōcoctis ardentes, uerū citra iudicationem perfrigescētes, & breui rursus ardentes, torpidi, soporosi, conuulsi, perniciose habent. Somni soporosi, & perfrigerationes, perniciosi sunt.

Soporosis delassatis, surdis factis, aluo erumpente si rubicunda egesta fuerint circa iudicationē profunt. Soporosi, anxiosi, præcordiū dolentes, parū uomentes, abscessus iuxta aurē habent. Antea uero circa faciem tumores cū sopore. Morbi derepente mentē percellentes cū anxietudine, sanguinē profundunt. Soporosa, anxiosa, dolorosa præcordia, frequēter parum spuentia, Tumores circa aurē habent. Soporosi, num aliquid cōuulsorij habēt?

Affectiōes soporosa, fatuitatē inducētes, stuporis detentionē inferētes, præcordia uariantia, & uentrē tumidum habentes, cibum fastidientes, aluo suppressa exudantes, num his turbidus spiritus, & genituræ simile quid pertransiens, singultū significat? Num & aluius biliosa insuper egerit? Splendidū in his mictum prodest. Ventres quoq; his insuper turbātur. Cerebro corrupto alij in tribus diebus, alij in septem moriuntur. Has uero si effugerint seruantur.

Quibus autē ex his resectis, os disparatū repertū fuerit, hi pereunt. Caput dolentibus ex posteriore parte ossa rupta habētibus, fluxio ē nare larga crassa, mala est: Hi ubi oculū antea doluerint, rigent. Num & iuxta tēpora olisium disruptiones conuulsoriae sunt?

Auris dolor pertinax, cum febre acuta, & alio quodam signo aliquantū maligno, iuuenes quidē septima die occidit, & citius delirio correptos, si non multum pus effluerit ex aurē, aut sanguis ē naribus; neq; aliud quoddā bonum signū compareat: Seniores autē tardius, & minus tollit. Nam & aures suppuratione præueniunt, & minus delirant. Verum multi ex his recidiuant, atq; sic pereunt.

Surditas in acutis ac turbulentis consequens, malum. Malū etiam in longis. In his autē dolores etiam ad coxas deducit. In febribus surditas, aluū sistit. Aures frigidæ, & pellucidæ, & contractæ, perniciosæ.

Tinnitus in acutis, & sonitus in auribus, lethale. Sonitus aurium, cum uisus hebetudine, & narium grauedine, mentē emouet, & sanguinē profundit.

Quibus surditas cū capitis grauitate, & præcordij intensiōe, & ad splendore turbatio, sanguinē profundit. In febre acuta aures obsurdescere, furiosum est. Valde surdi, in accipiēdo tremuli, linguam resoluti, torpidi, malum.

Accedente ægritudine surditas, & urina subrubicūda subfidentia nō habens, sed id quod in medio innatat, mentē emouet. Morbo regio corripī, in his malū est. Mala est & ex morbo regio fatuitas. Hos uocē priuari, sentiētes tamen esse cōtingit. Fortassis autē et alius malē his afficitur. Quæ circa aurē dolorose excitātur, perniciose sunt.

Rubores circa aurē ex prægresso dolore, in febribus fientes, signū quidem sunt erysipelatis in facie futuri, Sed & cōuulsiones ex talibus fiunt, cū uocis interceptione ac exolutione. Tumores circa aurē ex plurimis graueolentibus cum febre acuta, et præcordio in-

tento, tardius excitati, occidunt. Tumores circa aurē leuiter syderatis, mali. Tumores circa aurē in longis morbis nō suppurantes, lethales. Alui uero his deorsum feruntur. Num quibus abscessus sunt iuxta aures, caput dolent: Num & supernis partibus exudant: Num & in super rigent: Num & alui erumpunt, & quid soporosum habēt: Num & aquosa est urina, alba innatātia habens, & aliquantū uaria, exalbida, graueolētia. Abscessus iuxta aurē submouent tussiculæ cū sputationibus fientes. Vrinæ in abscessibus retro aures cito & modice maturescētes, malæ sunt, & sic perfrigerari, malū est. Abscessus circa aurē in morbis diuturnis suppurati, nō ualde albo & inodoro pure, occidūt, & maxime mulieres. Abscessus iuxta aurē, ex acutis morbis maxime in febribus ardētibus fiunt. & si nō iudicationem fecerint, & maturescāt, aut ex naribus sanguis fluxerit, aut urinae subsidentia crassam habuerint, ægri pereunt. Pleriq; uero taliū tumorum antea propulsantur. Verū considerare oportet in super etiā ipsas febres, siue augescant, siue remittant, atq; sic pronūciare. Ex surditate ac torpore, de naribus aliquid destillare, difficultatis aliquid habet. Vomitus his cōueniet, & alui turbatio. Ex surditate leniter abscessus iuxta aures fiunt, tum aliās, tum si quid nauſeę accedat. Sed & soporosis ex his, etiā magis abscessus ad aurē fiunt. Surditatē ex febribus, sanguinis ē naribus fluxio soluit: itemq; alui turbatio. Facies quæ ex tumida humiliatur, & uox leuior ac debilior fiens, & spiritus rarior ac leuior, remissionē in sequētem diem significat. Faciei corruptio, lethalis. Verum minus, si propter uigilias, aut famē, aut alui exturbationē fiat: Et si id quod propter hæc corruptū est, sedetur per diem ac noctē. Talis autē fuerit, oculi caui, nasus acutus, tempora collapsa, aures frigidae ac cōtractæ, cutis dura, color pallidus aut niger. Liuescēs uero ex his palpebra, aut labiū, aut nasus, breui lethale est. Faciei bonus color, & toruitas, in morbo acuto, malū est. Frōtis ex his cōtractio, phrenitidis signū est. Circa faciē color bonus, & sudores nō febriētibus, stercora uetusta subesse significat, aut uictus rationē inordinatā. Rubores circa nasum, alui humescentis signa sunt. Dolores circa præcordia aut pulmonē si suppurētur, malū est. Oculorū puritas, et albas ipsorū partes, ex nigris aut liuidis puras fieri, iudicatoriū est. Si igitur cito purgentur, celerē iudicationē significat, Si tarde, tardiorē. Caligo oculorū, aut si alba ipsorū pars rubescat, aut liuescat, aut uenulis nigris impleatur, bonū non est. Malū est etiam lucis splendore fugere, aut lachrymari, aut distorqueri. Et alterū minorē fieri, malū est. & oculos frequenter agitare, ac iactare, aut paruas lemas ac sordes circa ipsos, aut concretionē tenuem albicantē habere: aut albā partem maiorē fieri, nigrā uero minorē: aut nigram sub palpebrā supernā occultari. Mala est etiā oculorū cauitas, & expressio ualde foras, & splendoris extritio, ut pupilla extēdi nō possit. Et extremitatū palpebrarū curuitas, & oculi fixi, & assidue nictare, et colores permutare, et palpebras inter dormiendū non committere, perniciosum est. Malus est et oculus peruersus. Oculorū rubor in febre fiens, alui diuturnā malignā affectionē significat. Circa oculos pustularū eruptiones in uiriū refectionibus, aluiū proripere faciūt. In oculorū distortionē, febriēti, lassato, rigor perniciosus, et soporosi in his, male habēt. Viro lippietī, febre superueniēte, solutio. Sin minus, periculū est ne cæcus fiat, aut pereat, aut utrūq;. Quibus lippietibus ca-

pitis dolor accedit, & ad multū tempus cōcomitatur, periculū est ne cæci fiant. Lippienti alui profluuiū sua spōte prodiens, utile est. Oculorū obscuratio, & oculus fixus caliginosus, malū. Oculorū obscuratio, cū animi deliquio, breui cōuulsionem inducit. Oculorū rectitudo in morbo acuto, & motus uelox, & somnus turbulentus, & uigilia, & quādoq; sanguinis ē naribus stillationes, nihil boni. Qui febres ad tactū non adurentes habēt, phrenitici sūt: & magis si sanguis fluxerit. Lingua quæ in principio quidē inhorruit, in colore uero permanet: progressu autē tēporis exasperatur, & liuescit, & rūpitur, lethalis est. Si uero ualde nigrescat, in quartadecima die iudicationē fore significat. Periculosissima autē est nigra, & cū uisore pallida. Lingua circa bifidam sui partē, uelut salua alba obduci, febris remissionis signū est, si quidē id quod superinductū est crassum fuerit, eadē die. Si uero tenuius, postridie. Si uero adhuc tenuius, tertia die. Eadē significāt etiam huiusmodi, si circa summā linguā fiant, uerū minus. Lingua tremula cū rubore iuxta nasum, & aluo liquida, si reliqua sine signis sint circa pulmonē, malū est, & celeres purgationes, perniciosas significat. Lingua citra rationē tenera fiens, & cū cibi fastidio nauseabūda, cū frigido sudore, ex aluo liquida, nigrorū uomituum signū est: lassitudo in his mala est. Linguae tremulae quibuldā etiā aluum liquidā quādoq; faciūt. De nigratae uero in his, celerē mortem significāt. Num lingua tremula mentē nō firmā significat? Linguae asperæ & resiccate, phreniticae sunt. Dentes collidere aut stridere, quibus nō familiare id est à pueris, furiosum ac lethale est: iam uero delyrās si hoc faciat, penitus lethale est. Perniciosum autē est et resiccati dentes. Dētis corruptio, abscessum circa gingiuā factū soluit. Ex dentis corruptione, uehemēs febris superaccedēs, et delyriū, lethale est. Si uero seruētur, ulcera suppurabūt, & ossa discedēt. Quibus circa palatū humoris collectio fit, plerūq; suppuratur. Dolores uehemētes circa maxillas, periculū est ne ad ossis educationē deueniāt. Labiū contractū, alui biliosae eruptionē significat. Sanguis de gingiuis, ex aluo liquida, perniciosus. Sputi excreationes in febre, liuidae, nigrae, biliosae, si quidē supprimātur male sunt, secedētes uero pro ratione, utiles. Quibus saluginosa sputa, ac tussis supprimūtur, his corpus uelut à putulis rubescit. Verū ante obitū exasperatur. Sreatio frequēs, si salē & aliud quoddā signū affuerit, phrenitidē indicat. Vocis interceptiones cū exolutione, pessimae. Modice feroces mētis emotionēs, malae & ferinae sunt. Quibus uox cū febre deficit, et cū iudicatione intercepta, tremuli moriūtur. Vocis interceptiones in febre cōuulsorio modo fiētes, ad mētis emotionē cū silentio deueniūt, perniciosum. Vocis ex dolore interceptiones, dolorosam mortē inducūt. Vocis interceptiōes cū exolutione stupefactorio modo, perniciosae sunt. Voces cōfractę post medicamēti sumptionē, nū prauę sunt: Pleriq; horū exudant, & uētres humectos habēt. In uocis interceptione spiritus, uelut his qui strāgulantur, prae manib. expositus, malus est. Num & mentē emouet? Ex capitis dolore uocis interceptiōes si sint, febricitātes cū sudore laxātur in seipsos, sūtq; morbi reuertētes diutius durātes. his insuper rigere, malū nō est. Mētis emotiones cū uocis interceptione, perniciosę. Vocis interceptiones insuper rigētibus, lethales. Tales autē leniter caput dolēt. Vocis interceptiones cū exolutione, in febre acuta, sine sudore, sunt quidē lethales, minus uero q̄ cū sudore.

Verum diuturnitatē temporis significant, fortassis autē & qui ex recidiua tale quid patiuntur, tutissimi sunt. Perniciosissime autē ex talibus habēt quibus sanguis ex naribus fluit, & quibus alui humectantur. Vox acuta, planctū referens, & oculorū obscuratio, cōuulsorium est. Dolores his ad infernas partes, toleratu faciles sunt. Cum uoce tremula, solutio alui præter rationem, in his moram trahētibz diuturnis, perniciēs est. Frequentes subfoporate uocis interceptiones cōsistentes, tabem præsignāt. Spiritus qui densus quidem & paruus est, inflammationē & dolorem in locis principalibus significat. Magnus autē & per multum tempus, deliriū aut conuulsionem. Et frigidus quidem lethalis est, lethalis autē est & febriculosus & fuliginosus. Verū minus q̄ frigidus. & qui magnus foras exspiratur, paruus uero intro: & paruus foras, magnus uero intro, pelsimus sanē est, et morti propinquus. Itemq; extendens, & urgēs, & obscurus, & dupla intro reuocatio, ueluti superinspirantibus. Bona autē spiratio, in omnibus morbis qui cū febre acuta sunt, & in quadraginta diebus iudicatur, magnum momentū ad salutem habet. Collum durum & dolorosum, & maxillarū colligatio, & uenarū iugulariū palpitatio fortis, & tendinum distentio, perniciosum. Dolores in faucibus gracilibz strangulatori, à capitis dolore originē trahentes, cōuulsorii sunt. Frigiditates colli ac dorsi apparētes, Sed & totius corporis cōuulsoria, in his mictiones fiunt crassiores farinā referentes. Quibus circa fauces irritamenta sunt, his tumores circa aurem leniter erūpunt. Fauces dolorosæ, graciles, cū ægre tolerabili molestia, perniciosæ acute sunt. Quibus spiritus retrahitur, & uox strangulatoria est, & uertebra intro cōsidet, his in fine uelut contrahente quodā spiritus fit. Fauces modice exasperatæ, & alui uanis conatibus nitens, frontis dolores, ægri palpano contrēctantes, dolorosi: quæ ex his augescūt, difficilia sunt. Dolores fortes circa fauces, tumores circa aurem, & conuulsiones efficiunt. Colli item ac dorsi dolores. Cum febre acuta cōuulsiones perniciosæ. Colli & cubitorū dolores, cōuulsorii. A facie autē hi, & secundum fauces. Pallidi, graciles, saliuā sputātes, In his in somnis sudores boni sunt. Num & sudore leuari, plurimis nō malum est? Dolores ad infernas partes his toleratu faciles sunt. In dorsi ac pectoris dolore, mictio cruenta suppressa, perniciosa est dolorose. Colli dolor malum quidē in omni febre, pelsimū autē his quibus timor est ut etiam insaniant. In pectoris dolore febriculoso, alui turbata, torpida, nigrarum egestionū signa sunt. Dolores parui in acutis iuxta fauces graciles, in gracili ubi hiarit, nō facile os cōtrahente, mentē emouēt. Ex his phrenitici perniciosē habent. Fauces exulceratæ in febre, cum aliō signo ex his quæ difficilia sunt, periculosæ sunt. In febribz desperate suffocari, & deglutire non posse, citra tumore, malum est. Collū conuertere nō posse, neq; deglutire, ut plurimū lethale est. Præcordiū molle esse cōuenit, & doloris exors, & æquale. At inflamatū, aut inæqualiter se habēs, aut dolens, signū est ægritudinis nō leuis. Tumor uero in præcordiis durus et dolorosus, pelsimus quidē est si iuxta omnes partes fuerit. Ex his autē qui ab una parte sunt, minus periculosus est qui à sinistris est. Significat autē in principio quidē tales, mortē citā. Si uero uiginti dies transmittant, febre manēte, suppurationē. Cōtingit autē his in primō circuitu, etiā sanguinis eruptio ex naribz, et ualde prodest.

prodest. Plerūq; enim hi caput dolent, & uisus obscuratur, & magis in his sanguinis eruptionē affore expecta. In ætatibus aut̃ annorū trigintaquinq;. Senioribus uero minus. At uero molles & doloris exortes tumores, diuturniores indicationes faciūt, & minus periculosi sunt. Sed & hi sexaginta dies trāsgredientes, febre manēte, suppurantur. Cōsimilia uero significāt & tumores circa uentrem, his qui sunt in præcordijs. Verū minus suppurātur hi q̃ illi. Minime uero qui sub umbilico cōsistunt, & fiunt etiam hi quidē in tunica, illi uero sursum diffusi. Lethales aut̃ sunt ex ipsis, quicūq; intro rupti fuerint. ex reliquis autem suppurationibus, quæ quidē foras rumpūtur, optimū est ut in breuissimam & acutissimam molem colligātur: quæ uero intro, ut neq; mole, neq; dolore, neq; colore, foris se manifestas faciāt. Contrariū autē pessimū est. Quædam uero ex his propter puris crassitudinē, nullam de se significationem præbent. Porro recentes in præcordijs tumores, si nō cum inflammatione fuerint, & dolores ab ipsis, soluit murmur in præcordio obortū, & maxime quidē si pertransierit per urinas, & alui egestionem. Sin minus, si etiā ipsum pertrāsierit. Prodest aut̃ & si subdescēderit ad infernos locos. Pulsus in præcordio cū tumultu, mentis emotorius est, & magis si oculi frequēter moueantur. Oris uentriculi dolor, & pulsus præcordiorū, febre perfrigerata, malū, tum aliās, tū si insuper exudarint. Dolores ad præcordiū irruentes, tum aliās mali sunt, tum si aluos humectent. Peiores aut̃ sunt, si breui fiant. & tumores circa aurē ex his emergētes, maligni sunt, & aliæ suppurationes. Oris uentriculi dolores cū torminē, uētris animalcula erūpere faciunt. Oris uētriculi dolor seniorē frequenter impetens, mortē repentinā significat. Quibus præcordia eleuātur, aluo superpressa, malū est, maxime aut̃ in morbis tabidis lōgis. & quibus alui humectantur, in præcordio inflāmatiō suppuratoria est, quibus antē mortē nigra per aluam subeunt. Præcordiorū distentio cū sopore anxioso, in caput dolente, abscessus circa aurē attollit. Post præcordiorū tumore, biliosis spiritus magnus & febris acuta, abscessus circa aurē attollit. In dolore præcordiorum submurmurātī, lumborū dolor superaccedēs in febribus, uētres ut plurimū humectat, si nō flatus eruperit, aut urinae copia prodierit. Ex præcordio diutiusne afflicto, & aluo graueolenti, abscessus circa aurē, occidit. Quibus a præcordiorū doloribus, aluus paulatim subuiscosa egerēs, pauca stercoracea effundit, num etiam sanguinē effundit. Quibus derepente dum sine febre sunt, præcordij & oris uentriculi dolor, & circa crura, ac infernas partes, & aluus in tumore eleuata est: soluit uenæ sectio, & alui fluxio. His febre nociuū est. Longa enim & uehemētes febres fiunt, & tusses, & spiritus & singultus fiunt. His autē ad solutionē tendētibus, dolor fortis coxarū, aut crurū, aut puris sputum, aut oculorū priuatio succedit. Quibus dolores præcordiorū, oris uētriculi, hepatis, partiū circa umbilicū, hi sanguine per aluū egesto, seruātur: non autē egesto, moriūtur. Quibus præcordia nō mollia, facies sana, nō liberantur citra multi sanguinis ex naribus fluxū, aut conuulsionē, aut coxendicū dolore. Dolores ad præcordia in febre, uoce intercepta, sine sudore soluti, malum est. His ad coxendices dolores fiunt. Iuxta uentrem in febre palpitationes, mentis emotiones inducunt. Sanguinis autē fluxio horrorē efficit. Dolores in febre ad præcordia exilientes, sine sudore soluti, maligni sunt. His ad coxendia

xendices dolores fiunt, et ipsis unà cum febre ardente, aluus deorsum erūpens, perniciosum est. Dolores circa umbilicū palpitatorij, habent quidē & alii quid mētis emotorium, uerum circa iudicationē pituita his acruatim copiosa cum dolore penetrat. Post aluum suppressam, præcordia subleuata in tuorem, mala sunt, maxime tabescētibus iam diu, & quibus alui humectantur.

Anxietatem in præcordio sentientibus, tumores circa aurem oborti, ipsos occidunt. Duricies circa uentrem cū dolore, in febrientibus cum horrore, cibum auersantibus, si aluo insuper parū humectata, purgationem non faciant, ad suppurationē peruenient. Dolor supra umbilicum, & lumborū dolor, si medicamentis nō soluantur, in hydropem siccū desinunt. Dolores ex lumbis diuturniores, qui febre tertianæ generis modo exacerbantur, grumosum sanguinem egerere faciunt. Dolores in lumbis, sanguinis fluxionē inducunt.

Ex lumborū dolore sanguinis fluxiones largæ fiunt. Quibus ex lumborum dolore, recursus ad caput, & manus torpidæ, & oris uentriculi dolores, & aurium sonitus, his sanguis large profluet. Sed & alui his deorsum erūpunt, & mens turbata est ut plurimū. Ex dorsi dolore agritudinis principia difficilia sunt. In lumborū dolore pertinaci, & ampliore alui subductione, à ueratro uomere spumosa multa prodest. Spinæ distortionē ac spirandi difficultatem, sanguinis fluxio soluit. In lumbis dolētibus oris uentriculi dolores insuper accedentes, signa sanguinis fluxionis sunt, etiā prægressæ. Affectiones ex lumbis ad collū & caput transeūtes, leuis siderationis modo resoluentes, conuulsoriæ, mētis emotoriæ sunt. Num tales etiā soluūtur cōuulsionibus? Aut talium alui ægrotant per eadem prodeuntia? Ex lumborū doloris recurso, oculorum distortio, malum. Dolor in pectus firmatus torpore, malus in febre est. Hi repente pereunt. Ex lumborū dolore recursiones ad os uentriculi febriculosæ, horrore inducentes: Sic affecti reuomentes tenuiæ aquosa, mente moti, uoce destituti, nigrorū uomitu facto moriuntur. Diuturni circa lumbos, & tenue intestinū dolores, & ad præcordia dolores, si ægricibos auersentur unà cum febre, his dolor intentus ad caput progressus, repente ipsos occidit conuulsorio modo.

Quibus lumborum dolor est, hi male habent. Num his tremores fiunt, & circuli rubicundi in tibijs in rigore? Num lumbos dolentibus, cibos fastidientibus, nō uomētibus, modice ferociter mente motis, spes est nigra proditura esse? Lumborū dolor in uentriculi os dolente, cum excreatione uiolenta, habet quid conuulsorium. Rigor unà cum iudicatione aliquatenus horrendus est. Lumborū dolor sine causa manifesta sepe impetens, maligni morbi signum est. Lumborū dolor cum sopore anxioso, malus est. Lumborū distentio ex muliebriū mensium multitudinis, ad suppurationē tendit, & uarie prodeuntes uiscosi, graueolentes, strangulatorij menses ex prædictis, ad suppurationem tendunt. Arbitror aut tales etiam aliquantū delirare. Quibus lumborū dolor, et lateris, sine causa manifesta, hi regiū morbum incurrūt. Perfrigerationes ex sanguinis eruptionibus in diebus iudicatorijs uehemētes, pessimæ sunt.

Vice uersa sanguinē erumpere, malū est, uelut in splene magno ex dextris, & circa præcordia eodē modo se res habet. Vulnura sanguinē fundentia, insuper rigētia, maligna. Sic affecti loquētes latenter moriuntur. Affectiones quæ quinta die sanguinē large fundunt

fundunt, sexta in super riguerunt, septima perfrigeratae fuerunt, & repente recalescunt, in his alui male afficiuntur. Post sanguinis eruptionem, nigrorum per aluum egestio, mala. Mala autem sunt & rubicunda ualde & æruginosa. Quarta die tales fiunt sanguinis eruptiones. Soporosi ex talibus conuulsi moriuntur, nigris prægressis, & uentre tumefacto. Post sanguinis eruptiones, & nigrorum egestionem, in acuto surditas, malum. Sanguinis egestio his perniciofa. Surditas autem soluit. Quibus sanguinis eruptiones plures, huius temporis progressu alui male afficiuntur, si non urina concocta prodierit. Num & aquosa urina tale quid significat? Quibus ex sanguinis eruptione larga frequenti, multa fit alui cum nigris egestio, ea autem suppressa, sanguinis fluxiones: hi alui dolent, una uero cum quibusdam flatibus, facile tolerant. Num tales multis frigidis sudoribus exudant? Conturbata in his urina, mala non est: neque id quod generaturae simile in ipsa residet, uerum plerumque hi aquosa mingunt. Quibus de naribus in surditate ac torpore pauca destillant, habent quid difficultatis. Vomitus his conducit, et alui perturbatio. Magnæ in principijs sanguinis eruptiones, circa refectioem aluos humectant. Fluxiones ex naribus largæ per uim suppressæ, quandoque conuulsionem prouocant. Venæ sectio soluit. Unde decima die fientes sanguinis stillationes, difficiles sunt, tum alias, tum si his super stillauerint, & rursus stillauerint. In sanguinis fluxione multa, aut singultus, aut conuulsio, mala est. In his qui decolores usque ad septem annos uires recolligunt, & spiritus in uis acruatus, & terræ concupiscentia, sanguinis corruptionem ac exolutionem significat. In morbis longis parua comparentes sanguinis fluxiones, perniciofae sunt. Vertigines ab initio sanguinis narium fluxio soluit. Ex naribus erumpente sanguine, cum exiguis sudoribus perfrigescentia, maligna sunt. Sanguinis detractio in perfrigeratione torpida, mala est. Qui aluo suppressa sanguinem effundunt, & una cum sanguinis effusione in super rigent, his aluum uelut ex intestinorum leuore lubricam hæc faciunt, itemque durat, & ascaridas, aut ambo. Sanguinis fluxiones statim temporibus fientes, siticulosæ, si sanguinem non effuderint, comitialis morbi morem inducunt. Ex hæmorrhoidæ parum apparente, uertigines obortæ, parua ac modicam siderationem significant, soluit uenæ sectio. & quicquid hoc modo apparuerit, mali aliquid significat. Palpitanter per totum, num etiam uoce intercepta moriuntur? Tremores conuulsorij fientes in sudoribus, reuertifolent. Iudicatio his fit, ubi super riguerint. Superrigent autem hi ardore circa uentrem prouocati. Somnus multus in his conuulsorius, & ad frontem grauitates, & mictio difficilis. Conuulsionem antea non cognitam in strangulatis ab utero, faciles sunt. Conuulsoria sine sudore sputa defluentia in febrientem, leuia sunt. His in super alui aliquantum humectatur. fortassis autem & ad articulos aliquid abscedet. Quibus conuulsis oculi intente relucet, neque apud seipsos sunt, & diutius ægrotant. Quæ conuulsorio modo exacerbantur, cum stuporis detentione, abscessus iuxta aurem excitant. Tremulis, anxiosis, parui iuxta aurem tumores conuulsionem significant, aluo male affecta. Conuulsionem & tetanicas distentiones febris accedens soluit. Conuulsio ex uulnere lethalis est. Conuulsio in febre fiens, perniciofa est. Minime uero pueris. Seniores septem annis in febre non corripiuntur conuulsione. Sin minus, pernicio-

niciosum est. Convulsionē soluit febris superueniēs acuta, quæ prius non fuit. Si uero fuit prius, iam exacerbata. Prodest & urinæ transitus utriusque speciei referēs, copiosus, & alui fluxus, & somni. At repētinas cōuulsiones soluit febris, alui fluxus. In cōuulsionibus uocis interceptio diu durans, mala est: parua autem, aut linguæ siderationem, aut brachij, aut dextrarum partium significat. Soluitur autem urinis multis aceruatis derrepente prodeuntibus. Sudores autē paulatim fientes profunt, Aceruati uero, itemque sanguinis detractiones aceruatae lædunt. In distentionibus & ante & retro fientibus, & in tergū solū contingentibus, si maxillæ soluantur lethale est. Lethale est etiam sudare in distentione in dorsum fiente, & corpus dissolui, & in eadem affectione reuomere per nares, aut clamare, aut nugari, si ab initio uox intercepta fuit. In postera enim diem mortem significat. Febriles in dorsum distentiones, urinæ generaturæ similes solunt. Anginæ quæ neque in collo, neque in faucibus, quicquā conspicuum faciunt, uerum suffocationē uehementem ac spirandi difficultatem inducunt, eadem die & tertia occidūt. Quæ uero tumores & ruborem in collo accipiunt, in cæteris quidem consimiles sunt, uerū diuturniores. Quibuscumque uero & fauces, & ceruix, & pectus, simul rubuerint, diuturniores sunt, & ex ipsis maxime seruantur, si non recurrerint rubores. Si uero dissipentur, neque tuberculo foras conuerso ac collecto, neque pure leniter ac sine dolore excreato, neque in diebus iudicatorijs, perniciosæ sunt. Num etiam suppurati fiunt? Securissimum autē est ruborem & abscessus quæ maxime foras uerti. Erysipelas uero foris quidem accedere, cōmodum est, intro autem conuerti, lethale. Cōuertitur autem intro, quū disparente rubore pectus grauatur, & difficilem spirationem habet. Quibus uero anginæ ad pulmonē uertuntur, partim in septē diebus pereunt, partim euadentes suppurati fiunt, si nōeductio pituitosa sursum ipsis fiat. Quibus per pulsationis uenarum uehementiā, sterqus derrepente per aluū secedit, lethale est. In anginis sputa gracilium subarida, malum. Anginosi in linguis tumores, citra signa disparentes, perniciosi: & dolores disparentes citra manifestam causam, perniciosi sunt. In anginis qui nō breui cōcocta exspuunt, perniciose habent. In angina dolores ad caput, citra notas, cū febre, perniciosi. In angina dolores ad crura, citra notas, cum febre, perniciosi. Ex anginis citra iudicationē præcordij dolor, cum impotentia ac torpore fiens, occidit occulte, etiam si ualde mansuete se habere putent. Ex anginosis citra notas attenuatis, dolor ad pectus & ad aluum progressus concitatus, pus egerere facit, aliās autē eius qui exoluitur tale est. In anginis omnia perniciofa sunt, quæ non manifestū dolorē faciunt. Sed & ad crura dolores diuturni procedunt, & difficulter suppurantur. Ex angina sputa uiscosa, crassa, ualde alba, quæ uiolenter educuntur, mala sunt. Et omnis eiusmodi maturatio, mala. Purgatio multa deorsum, tales leuis siderationis modo perimit. Ex angina, subarida frequentia sputa, cū tussi, lateris dolorem inducētia, perniciofa: itemque ea quæ inter potandum per tussim subemergūt: & deglutitio uiolenta, mala. Pleuritici quibus in principio sputationes penitus purulentæ sunt, tertia die moriuntur, aut quinta. Si uero has effugerint, nō multo melius habentes, septima, aut nona, aut undecima suppurari incipiunt. Quibus supra autem rubor, & similiter ueluti pleuritici calefcunt, & aluus biliosis ac graueolentibus

tibus exturbatur, hi uigesima ac quadragesima die periclitantur. Vbi uero has effugerint, seruantur. Pleuritides siccae ac sine sputo difficilimae sunt. Horrendae quoque haec in quibus dolores superne sunt. Pleuritides sine conuulsionibus, grauiores sunt his quae cum conuulsionibus fiunt. Quibus pleuriticis in principio lingua biliosa fit, hi septima die iudicantur. Quibus autem tertia aut quarta die, circa nona. Bulla subliuida fiens in lingua, in principio, qualis est ferri tincti in oleum, difficilior solutio contingit: & iudicatio quidem ad decimum quartum diem peruenit, sanguinem autem plerumque spuunt. Sputum in pleuriticis tertia die maturari ac exspui incipiens, citiores solutiones facit, uerum posterius, tardiores. In doloribus pleuriticorum commodum est aluum moliri, sputa colorari, strepitus in pectore non fieri, urinam bene procedere. His autem contraria, difficilia sunt: itemque sputum dulce fieri. Biliosae simul & sanguineae pleuritides, plerumque nona aut undecima die iudicantur, & maxime sanantur. Quibus autem pleuriticis in principio quidem dolores molles sunt, quinta uero aut sexta die exacerbantur, hi magis ad duodecimam perueniunt, & non ualde seruantur, periclitantur autem maxime septima die ac duodecima. Vbi uero bis septem dies effugerint, seruantur. Quibus pleuriticis strepitus sputi multus in pectore est, & facies tristis, & oculus morbi regni colore infectus, ac caliginosus, hi pereunt. Qui ex pleuritide suppurati fiunt, in quadraginta a ruptione diebus expuunt. Sputum in omnibus pleuriticis ac peripneumoniacis facile ac cito expui conuenit, & flauum sputo ammixtum esse. Quod uero longe post dolorem educitur flauum, aut non mixtum, & multam tussim inducens, malum est. Prauum autem penitus est flauum meracum, & uiscosum, & album, & rotundum, & cum uirore pallidum ualde, & spumofum, & liuidum, & aeruginosum. Peius autem aliquanto est id quod ita meracum est, ut nigrum appareat. At sanguine non multo permixtum flauum, in principio quidem salutare est, septima uero die, aut posterius, minus tutum. Sanguineum uero ualde, aut liuidum, statim in principio periculosum est. Prava sunt etiam sputa spumosa, & flaua, & nigra, & aeruginosa ac uiscosa, & quaecumque cito colorantur. At mucosa ac fuliginosa, & cito colorantur, & securiora sunt. Quae uero intra quintum diem ad coctionem colorantur, meliora sunt. Omne porro sputum non soluens dolorem, malum est: soluens autem, bonum. Quicumque uero cum bilioso purulentum educunt, aut seorsim, aut permixtum, plerumque decima quarta die moriuntur, si non mali aut boni quippiam ex praescriptis superueniat. Sin minus, pro ratione, maxime autem his quibus eiusmodi pus septima die incipit. Bonum uero est & in his & in omnibus circa pulmonem morbis, facile ferre morbum, a dolore liberatum esse, sputum facile educere, bene spirare, & sine siti esse, & totum corpus aequaliter calefcere, ac molle esse. Et ad haec somnos, sudores, urinas, alui egestionem, bonas esse. Mala autem sunt his contraria. Si quidem igitur omnia bona ad hoc sputum accesserint, seruari homo poterit. Si uero partim affuerint, partim non, non ultra decimum quartum uita producta peribit. Quod si contraria signa accedant, citius etiam. Quicumque uero dolores in his locis non sedantur, neque ad exspuitiones, neque ad uenarum sectiones, ac uictus rationes, suppurantur. Quibuscumque autem ex peripneumonia abscessus circa aurem, aut ad infernas partes fiunt, & suppurantur ac fistulantur, hi supersites euadunt. Fiunt autem his quibus & febris, &

dolor affuerit, et sputum pro ratione nō prodierit, neq; biliosæ alui egestionēs, solutūq; faciles ac meracæ fiunt, neq; urina crassā ualde, & multam subsidentiā habens: & alia salutaria habuerint. Fiunt autē ad infernas quidē partes, his quibus circa præcordia inflāmatiō fit: ad supernas uero, quibus præcordiū molle & doloris exors fuerit, & ubi per tēpus aliquod difficulter spirauerint, ac citra manifestam causam cessauerint. At abscessus ad crura in periculosis inflāmatōibus pulmonis, omnes quidem commodi sunt, optimi autem, sputo purū lento pro flauo fiēte. Non procedente uero sputo secundū rationem, neq; urina bonā subsidentiā habente, periculum est claudum fore hominē, aut multum molestiarū exhibitura res est. Si uero recurrerint abscessus, febre consequente, & sputo nō procedente, periculum est ne moriatur ac deliret. Quicūq; uero peripneumonici nō purgati sunt iudicatorijs diebus, sed mente moti quatuordecim dies effugerūt, eos periculū est suppuratos fieri. Peripneumoniæ ex pleuritide trāsmutata, securiores sunt his quæ ab initio fiūt. Corpora exercitata ac densa citius à pleuriticis ac peripneumonicis morbis pereūt q̃ in exercitata. Grauedines & sternutationes in morbis circa pulmonē, & antecessisse, & succedere, malū est. Reliquis autē sternutatio non incommoda est. Peripneumonicis quibus lingua tota alba ac aspera fit, ambæ pulmonis partes inflāmatae sunt. Quibus uero dimidiū, una iuxta quā apparet. Et quibus ad unam clauiculā dolor fit, his superna pulmonis ala una ægrotat. Quibus autē ad ambas clauiculas dolor fit, ambæ supernæ pulmonis alæ ægrotāt. Quibus iuxta mediā costam, media. Quibus ad discriminationē, inferna. At totam unam partem dolentibus, omnia iuxta hanc partē dolent. Siquidem igitur aortæ appellatae, utrinq; appēdentes pulmonis partes, ualde inflāmatae sunt, ut ad latus alsideant, hac corporis parte resoluūtur, et liuores foris circa costam habēt. Hos autē ueteres iētos, siue syderatos uocabāt. Si uero nō ualde inflāmatae sunt, ut nō alsideant: dolor quidē fit, per totum, non tamen resoluūtur, neq; liuores habent. Quibus uero totus pulmo inflāmatu fuerit, unā cum corde, ut ad latus allabatur, hi toti resoluuntur, & iacet æger frigidus, sensus exors. Moriturq; secūda aut tertia die. Si uero etiam sine corde cōtigerit, minus diu uiuunt. Quidam autē etiam seruantur. Qui suppurati fiūt, maxime ex pleuritide ac peripneumonia, eos calores comitantur, interdiu tenues, noctu uehementiores, & nihil memoratu dignū spuunt, & circa collū ac clauiculam sudant, et oculi caui fiūt, maxillæ uero rubēt, digiti summi deterius calescūt ac asperātur. Ungues curuātur, ac perfrigerātur, & circa pedes tumores habēt, & circa corpus pustulas, & abstinent à cibis. Diuturnæ igitur suppurationes, signa hæc habēt. Quæ uero breui rūpuntur, ex notis ad eas cōsequentibus cognoscere oportet, & ex doloribus in principio. Simul autē & si aliquāto difficiliter spirauerit homo. Rūpuntur autē plurimæ suppurationes, partim uigesima die, partim quadragesima, partim sexagesima. Quibus igitur dolor in principio incumbit intētus, & spirandi difficultas, & tussis cū sputatione, ad uigesimū diem aut citius, eruptionem expecta. Quibus autem leuiora hæc sunt, iuxta rationē. Supputare autem oportet tempus, à quo primū doluit, aut grauatus fuit, aut febriit, aut si quando rigor corripuit. Necesse est autē præcedere & dolorē, & spirandi difficultatē, & sputationē, ante ruptionē. Quibus igitur & febris statim post ruptionem de-

dit, & cibū appetunt, & pus facile educitur album, inodorū, leue, eiusdem coloris, & à pituita liberum, & aluus parua compacta egerit, plerunq; breui seruantur. Quos uero & febres sequuntur, & sitis, & cibi fastidium, & pus liuidum, aut cū uirore pallidum, aut pituitosum, aut spumofum, & aluus insuper liquida fit, moriuntur. At quibus aliqua ex prædictis accefferint, aliqua non, horum aliqui pereunt, aliqui multo tēpore seruantur.

Qui suppurati futuri sunt, primum sanguinosum spuunt, deinde dulcius. Quibus in pulmone tubercula fiunt, pus educunt ad dies quadraginta post ruptionē. Has uero transgredientes plerunq; tabidi fiunt. In lateris dolore, stillatio sanguinis de naribus, mala est.

Quos suppuratos mitius habentes, sputorū graueolentiæ sequuntur, eos recidua occidit. Qui ex pleuriticis exspuunt purulenta, subbiliosa, rotūda; aut purulenta subcrūeta progressu tēpore, perniciose habent. Perniciose itē qui nigra fuliginosa spuunt: aut quibus uelut à uino nigro sputa fiunt.

Quicūq; sanguinē spumofum spuunt, dextrū præcordium dolentes, de hepate spuunt, & multi pereunt.

Quibus dum cōcutiuntur pus coenosum & graueolens prodit, plerunq; pereunt. Quibus à pure specillū coloratur, uelut ab igne, plerunq; pereunt.

Cum lateris dolore, non tamen pleuritico, & turbulentis tenuibus lenibus, hi phrenitici euadunt. In morbis pulmonis ualde rubicundæ sanguinis stillæ, malæ sunt.

Cum rauedine, sputa uiscosa, sanguinosa, mala. Si uero etiam quid attollatur iuxta pectus, in his malum est. Dolores ad collum his attenuatis perniciosi.

Rauedo cū tussi, & aluo liquida, pus educit. Quibus in peripneumonia urinæ crassæ in principio, deinde ante quartū diem attenuatur, lethale est.

Qui in peripneumonijs siccis pauca concocta educūt, horrēda res est. Rubores in pectoribus sublatis, talibus perniciosi sunt.

Lateris dolor in sputo bilioso, præter rationē euanescentis, mentem emouet. Febres intermittentes ob suppurationē, pleræq; sudorificæ sunt.

Suppuratis surditas oborta, cruentā egestionem significat. His ad finem nigra prodeunt. Lateris dolor cū febre diuturna, puris educationē fore significat.

Horrore affecti frequenter ad suppurationē deueniunt. Sed & febris tales ad suppurationē perducit. Quos ex lateris dolore cibi fastidia sequuntur, oris uentriculi dolore ac sudore aliquantulū uexantur.

Facie flores habente, & aluo liquidiore, suppurationes circa pulmonē habent. Erectionæ ceruicis spirationes facit hydrops siccus.

Cōuulsionēs omnes quidem molestæ sunt, & dolores in principio intētos inducūt. & postea quoq; aliquos cōmonefaciunt. Verum difficilimæ sunt circa thoracē, & maxime periculosa.

Quibus est uomitus sanguinis, febris multa, & dolor circa mammā, thoracem, & dorsum: quibus hæc omnia fiunt, breui moriuntur.

Quibus autem non omnia, neq; ualde, tardius. Inflammati autē sunt diebus quatuordecim ad summum.

Sanguinem spuentibus confert, ut sint sine febre, & tussiant, ac dolent leuiter, & ut sputum tenue fiat ad dies bis septē. Febrile uero & tussire, ac dolere pertinaciter, & sanguinē recentē semper spuerē, incōmodum est.

Quibus latus subleuatū in tumorē ac calidius est, & inclinatis in alterū, grauitas aliqua impedere uidetur, his pus ex una parte est.

Suppuratis pulmonem per aluū pus secedere, lethale est. Quicūq; uulnerati in thoracē, externa uulneris parte sanati sunt, interna nō, periclitantur ne suppurati fiant. Quibus autē

debilis inducta est intus cicatrix, facile refringitur. Ex peripneumonicis sup-
purationibus seniores magis pereunt, ex reliquis iuniores. Quibus suppu-
ratis dum concutiuntur, multus strepitus de humeris fit, minus puris habent hi,
quibus paucis, si difficilius spiraret & meliorem colorem habeant. Quibus autem
strepitus quidem nullus fit, uerum difficultas spirandi fortis, & ungues liuidi, hi ple-
ni sunt pure, & perniciose habent. Qui spumofum sanguinem uomunt, dolo-
re infra septum transversum non existente, de pulmone uomunt. Et quibus quidem
magna in ipso uena rupitur, multum uomunt, & in periculo uersantur. Quibus
uero minor, minus educunt, & securiores sunt. Quibus tabidis sputum in igne
grauem nidorem olet, & capilli de capite fluunt, pereunt. Quibus tabidis in
mare expuentibus, pus ad fundum sedit, breui pereunt. Sit autem mare in aeneo
uase. Quibus tabidis capilli ex capite defluunt, a profluuiio alui moriuntur.
Et quibus tabidis alui profluuium accedunt, moriuntur. In tabescentibus spu-
ta suppressa, mentem ad nugas garriendas emouent. His spes est haemorrhoidem
apparere posse. Tabes periculosissimae sunt, a ruptione uenarum crassarum,
& a defluxu de capite. Aetates periculosissimae sunt ad tabem, ab anno des-
cimo octauo, usque ad trigessimum quintum. Pruriginosa corpora post aluum
suppressam, in tabidis mala sunt. In habitibus tabescentibus cum febre, flux-
iones ad gingiuas & dentes coparentes, malae sunt. In omnibus in tumor-
em eleuata praecordia, mala sunt, in tabidis autem pessima. Ex his qui diutina ta-
be perniciose consumpti sunt, aliqui ante finem rigore apprehenduntur. Pu-
stularum eruptiones uelut ferro lancinatae, habitus tabem significant. Difficul-
ter spirantes ex putredine, multa cruda educentes in tabe, perniciose habent.

Quibus hepaticis multum est sputum cruentum, siue subputridum, siue bilio-
sum meracum, statim perniciosum est. In hepatico colliquatio cum raucedine,
malum, tum aliam, tum si aliquantum tussiat, Hepar dolentes, os uentricu-
li dolentes, soporosi, rigorem habentes, & aluum turbatum, tenues, cibum auersantes,
multum exsudantes, purulenta per aluum egerunt. Hepar derepente circūcir-
ca dolentibus, febris accedens dolorem soluit. Qui sanguinem spumofum
spuunt, praecordium dextrum dolentes, de hepate spuunt, & moriuntur. Quibus
hepar uisus, uelut amurca prodit, lethale est. Hydropes ex morbis acutis do-
lorosi fiunt, ac perniciosi. Incipiunt autem plerique a laterum mollitudine, aliqui etiam
ab hepate. His igitur quibus a laterum mollitudine initium sumunt, pedes tument,
& alui profluuium diuturna sequuntur, aluum non molliunt, neque dolores ex lum-
bis & laterum mollitudine soluentia. Quibus uero ab hepate, tussis adhuc prom-
pte oboritur, & pedes tumet, & aluus dura egerit, eaque ad necessitatem coacta, &
tumores circa ipsam fiunt, partim in dextera, partim in sinistra, & rursus sedan-
tur. In hydropicis siccis, urinae stillicidia mala. Mala etiam urinae paruas sub-
sidentias habentes. Hydropicis comitialis morbi affectiones accedentes, per-
niciosae sunt, & inter se signa praua sunt, & aluos humectant. In biliosis al-
uius turbata, egeres parua geniturae similia, mucosa, & dolorem circa pubem indu-
centia, & urinae non facile solubiles prodeuntes, ex talibus in hydropem desinunt.
Hydropico febrienti, urina parua, & turbata, perniciose est. In aqua in-
ter cutem incipiente, alui profluuium aquosum fiens, citra cruditatem, morbum soluit.
In hydropico sicco sui significationem praemittente, tormina circa intestinum te-

nue incidētia, mala sunt. Ex hydropicis comitiales perniciosi. Hydrops qui ad curationē remisit recurrens, desperatus est. Hydropicis circa uenas aqua, in aluū prolapsa, solutio fit. Dysenteria intēpestiue suppressa, abscessum in costis, aut uisceribus, aut in articulis facit. Num igitur biliosus abscessus in articulis, sanguineus in costis aut uisceribus fit? Dysentericis uomitus biliosus in principio, malus est. Quibus ex dysenteria acuta, humor ad purulentiam deuenit, his id quod superstat, ualde albū ac multū erit. Dysentericæ, subrubræ, limosæ, largæ egestionis alui, in flāmeis ualde rubicundis coloribus solutæ, infantiæ timorē inducunt. Dysenteria nō longa splenicis cōmoda est, longa uero mala. desinente enim si hydropes, aut intestinorū leuitates fiunt, lethale est. In intestinorū leuitatibus, cū animalculis, dolores tormine soluti, partes circa articulos tumefaciūt, ex talibus squamulæ rubicundę pustulosæ: hi ubi exudarūt uelut flagris cæsi rubescūt. Qui in longis intestinorū leuitatibus, unā cū animalculis, tormina patiūtur, & doloribus afficiuntur, his solutis intumescūt. Insuper rigere his malū est. Intestinorū leuitates cū spirādi difficultate, & lateris pūctura, in tabē desinunt. Voluulosis uomitus, & surditas, malū. Vesicæ duræ & dolētes, omnino quidē malæ sunt, pessimæ uero cū febre cōtinua. Nā dolores ab ipsis uescicis, ad occidendū sufficiunt, et alui his nō ualde egerūt. Soluit autē hos urina purulenta prodiēs, albam ac leuem subsidētiā habens. His uero non solutis, neq; uesica mollēscēte, in primis circuitibus, ægrū moriturum esse timor est. Fit autē hoc maximē à septē annis, usq; ad decimū quintum. Calculosi ita figurati, ut lapis ad urinariū meatū non illabatur, facile mingūt. Quibus tuberculū est circa uescicā, quod mingēdi difficultatē inducit, ad omnis generis figuras uexātur, huius autē solutio fit, pure erūpente. Quibus urina clandestinē allabitur ad pudendū, exoluūtur desperati. In urinæ stillicidio uoluulus accedēs, septima die perimit, si nō febre accedente urina aceruatim prodeat. Torpores, & sensus stupiditates, præter morē fientes, futuræ syderationis signū sunt. Qui ex uulnere impotētes fiunt corpore, febre quidē accedente citra rigorē sanantur: nō autē accedente, syderati fiunt dextra aut sinistra parte. Syderatis si hæmorrhoides accedant, utile est: Si uero frigiditates & torpores, malū. In syderatis ex spiritus ægra latio ne, sudor accedens, lethale. Rursus autē in his ipsis si febris accedat, solutio fit. Syderationes derepēte exolutorio modo fientes, febre insuper tēporis progressu accedēte, perniciosæ sunt. Quibus ex aliqua ægritudine, ad aquam inter cutē res deuenit, his alui siccae excrementa caprini stercoreis pilulis similia egerunt, cū eliquationē mucosa, & urina nō bona, & distentiones circa præcordia, & dolores ac tumores circa uentrē, & dolores circa laterū mollitudinē, et iuxta spinæ musculos accidūt: febres itē, & sitis, & tussis siccae sequuntur, & circa motus spirādi difficultas, & crurū grauitas, & à cibis abstinent, & paucis ingestis explentur. Hydropas leucophlegmatias appellatos, alui profluiū sedat. At tristitiæ cum silentio, & hominū auersationes, leniter eo modo affectos occidūt. Qui ex timore cū perfrigeratione mente mouentur, febres cū sudoribus, & somni uocem aliquantū intercipientes, hæc soluūt. Ex infania, ad raucedinem cū tussi, fit discessus. In furiosis cōuulsio accedens, dissipatio nem facit. Mentis emotiones taciturnæ, nō quiescentes, oculis circūspici-

entes, spiritū extra efferentes, pernicioſæ ſunt. Faciūt autē & leues ſyderationes diuturnas. Sed & ita affecti ad inſaniam deueniūt. Qui uero in uentris turbatione ita exacerbantur, his nigra circa iudicationem prodeunt. Quibus ſanis hyeme circa lumbos frigiditas, & grauitas ex leui cauſa, & aluus ſuppreſſa, ſuperno uentriculo probe officiū ſuum præſtante, his coxëdicum morbus, aut rhenum dolor, aut urinæ ſtillicidiū fortaiſis contigerit. Quibus infernæ partes aſſiguntur, pruritiſus antea fortibus obortis, his arenola urina fit, & ſupprimitur. Qui uero ex his pernicioſe habent, his mens obtorpeſcit. Qui circa articulos rubicundas in ſuperficie puſtulas habent, in ſuperq̃ rigorem, hi circa uentrē & inguina rubefiūt, uelut ex plagis doloroſis, & moriūtur. Morbo regio affecti, nō ita ſubtili ſenſu præditi, quibus ſingultus ſunt, his alui erūpunt. Fortaiſis autē & ſuppreſſio fit, hi uiridanti pallore inſciuntur. Dolores iuxta latus, in febribus tenuiter cōſiſtentes, citra notas, uenæ ſectio læſerit, ſiue cibum auerſetur æger, ſiue præcordiū ſublime habuerit: & in perfrigeratione, nō ſine febre torpidos, ſanguinis detractio lædit: & putantes ſe melius habere, hi moriuntur. Caput & pedes, & manus, perfrigerari, aluo & lateribus calidis, malum eſt. Optimū autem eſt, totum corpus ſimiliter calidū ac molle eſſe. Cōuerſi autem conuenit facile ægroū, & in attollendo ſe leuem eſſe. At grauitas totius corporis, & manuū ac pedum, mala eſt. Si uero etiam ad grauitatem liuidi ſiant digiti ac unguēs, mors propinqua eſt. Si uero penitus nigreſcant, minus pernicioſi ſunt liuidis. Verū etiam alia cōſiderare oportet. Si enim facile fert morbum, & aliud quoddā ex bonis ſignis ſubindicat, morbus ad abſceſſum uertitur, & partes corporis nigrefactæ decidūt. Teſtes & pudenda reuulſa, malū ſignificant. Flatus ſine ſtrepitu ac crepitu prodire, optimū eſt. Melius autē eſt & cum ſtrepitu exire, q̃ iſthic reuolui, etiam ſi tali modo progreſſus, dolorē & deſipientiā ſignificet: ſi non uolens homo ultro flatus ita emittat. Vlcus liuidū & ſiccum, aut cum uirore pallidū, lethale eſt. Decubitus optimus eſt, uelut quis ſanus ſolitus fuit. At ſupinū iacere, cruribus extenſis, bonū non eſt. Si uero etiam delabatur pronus ad pedes, deterius eſt. Lethale autē eſt & hiare, & dormire ſemper, & crura ſupine iacentis ualde incuruata eſſe ac cōplicata. In uentrē autem decumbere, ſi quis non ſit adſuetus, delyrium ſignificat, & dolores circa uentrē. At pedes nudos habere & manus, ſi quis nō uehementer calidus ſit, et crura diſiecta, malū eſt. Anxietatē enim ſignificat. Cæterū erectum ſedere uelle, malū eſt in acutis, peſſimū autem peripneumoniacis ac pleuriticis. Dormire uero oportet noctu, interdium uiſitare, Contrariū autem malum eſt. Minime uero lædi æger poterit, ſi dormiat mane ad tertiam diei partem, Verū poſtea ſomni mali ſunt. Peſſimū autem eſt nō dormire, neq̃ die, neq̃ nocte: aut enim præ dolore & afflictione uiſilarit, aut ab hoc ſigno delyrabit. Quibus tēpora ſecantur, cōuulſio ex cōtrarijs ſectioni partibus obortitur. Quibus cerebrū concuſſum fuerit & doluerit, percuſſis, aut aliàs lapſis, hi ſtatim uoce priuantur, & neq̃ uident, neq̃ audiunt, & plerūq̃ moriuntur. Quibus cerebrū uulneratur, febris plerūq̃ ac bilis uomitus accedit, & corporis ſyderatio, atq̃ tales pernicioſe habēt. Ex ruptis capitis oſſibus, diſſicilima cognitu ſunt ea, quæ circa ſuturas rūpuntur. Rumpūtur autem maxime a grauibꝰ ac rotūdis telis, & ex his quæ ex ſubcōtrario afferūtur, & nō ex pla-

no loco. At uero de quibus ambigū est, rupta ne sint an nō, iudicare oportet, exhibito ad manducandū in utranq; maxillam asphodeli caule, aut ferula, ita ut animaduertere iubeas, an os aliquod ipsi strepere uideatur. Nam fracta strepere uidentur. Progressu uero tēporis, fracta partim septima, partim decimaquarta, partim etiā aliter significationē de se præbent. Nam & carnis ab osse discessus fit, & os liuidū, & dolores sanie effluente. Hæc autē ægre iam auxiliū admittunt. Quibus omentū excidit, necesse est putrefieri. Si intestinū quoddam ex gracilibus dissectū fuerit, nō coalescit. Nerus dissectus, aut genæ tenuis pars, aut præputiū, non coalescit. Quodcūq; os in corpore resectū fuerit, aut cartilago, nō augefcit. Ex uulnere conuulsio accedens, mala est.

Ex uulnere bilis uomitus accedens malū, & maxime in capitis uulneribus. Nerui crassi si uulnerantur, plerunq; claudi fiunt, & si obliqui uulnerantur præsertim, & si musculorū capita, maxime in femoribus. Moriuntur maxime ex uulneribus, si quis cerebrū sauciatus fuerit, aut spinālē medullam, aut hepatis, aut septū transuersum, aut cor, aut uesicam, aut uenā crassā. Moritur autē etiam, si in arteriam & pulmonē ualde magnæ plagæ fiant, ita ut pulmone percusso, paucior spiritus per os procedat, q̄ is est qui ex uulnere elabitur. Moriuntur autē qui in intestina uulnerati sunt, siue ex tenuibus aliquod, siue ex crassis uulneratū fuerit, si per transuersum fiat plaga, & magna. Si uero parua & recta, quidam euadūt. Minime uero moriuntur uulnerati in partibus corporis ubi hæc nō sunt, aut ab his q̄ lōgissime absunt. At uero uisus obscuratur in uulneribus fientibus in supercilium, & paulo altius. Prout aut uulnus recētius est, maxime uident, cicatrice uero diutius tardante ac senescēte, magis obscurari contingit.

Fistulæ difficilimæ sunt, quæ in cartilaginosis & excarnibus locis sunt, & caruæ sunt, & procedunt ac sanie manant semper, & carūcula in osculo ipsis inest. Curatu aut faciliores sunt, quæ in mollibus & carnosissimis et nō neruosis existunt.

Morbi hi ante pubertatē non fiunt, peripneumonia, pleuritis, podagra, nephritis, uarix circa tibiā, fluxus sanguineus, cancer nō cōgenitus, uiriligo leucodicta nō à natura insita, defluxus medullæ spinalis, hæmorrhoides, uoluulus chordeæ, uelut appellatus non cognatus. Horū morborū nullū ante pubertatē fore expectandū est. Verū ab anno decimoquarto, usq; ad quadragesimū secundum, natura corporis morborū omnis generis ferax fit. Rursus ab hac ætate, usq; ad annos sexagintatres, nō fiūt strumæ, neq; lapis in uesica, nisi prius existat, neq; defluxus medullæ spinalis, neq; nephritis, nisi ex alia ætate comitentur, neq; hæmorrhoides, neq; fluxus sanguineus, nisi prius fuerit. Hi usq; ad senectutē absunt morbi.

In mensibus muliebribus qui aquosi ante partus prodeūt, mali sunt. Ora feruido aphthæ ulcere affecta, uterum gestantibus, non sunt bona. Num & alui humectantur. Dolores ex laterum mollitudine, ad intestinum tenue transeuntes, in morbis longis, ex corruptione foetus non ualde purgata, perniciosi sunt. Quæ ex partu ac foetus corruptione multa repente concitata, supprimūtur, difficilia sunt. Rigor his infestus est, & alui turbatio, tum aliās, tum si præcordium doleant. Vterum gestantibus dolores capitis soporosi, cum grauitate fientes ac conuulsione, plerunq; mali sunt.

Quibus dolores pertinaces ex mēsis, circa supernam partē, & intestinū tenue, aluos humectant, aliquantū cibos auersantur. His circa iudicationē, delatæ

tiones in somnū fiunt, & impotētes ex capitis dolore exsulant, ac perfrigerantur. Tales recidiuæ plerisq; fientes post remissionē, citō occidunt. Spiritus qui cū suspīrijs extra feruntur, & colliquatio præter rationē, in uterum gestantibus abortū facit. Dolor uentris post partū, in his purulēta purgat. Torpidæ, & præsertim in motibus, cū impotentia fractæ, circa iudicationē uexatæ, anxiosæ, inultū exsulant. Alui his humectæ, malū. Menses nō supprimi cōmodum est, ex talibus comitiales morbi sūt, ut arbitror, quibusdā uero uentris subductiones diurnæ, quibusdā hæmorrhoides. Prægnātibus præcordij dolor, malū, & alui his subeūtes, malū, et insuper rigere his malū. Dolor uētris in talibus, minus malū, si limosa purgētur. Quæ ex talibus facile pariūt, post partū uehementē molestantur. Prægnātibus tabescentibus quibus rubor in facie sit, stillationes de naribus siētes hūc auertunt. Quibus ex partu prodeūt alba, his uero suppressis cū febre surditas, & dolor acutus ad latus sit, mente mouentur, & perniciosē habent. In gestantibus uterū falsuginosa, significant post partū molestias ex albis mordacibus. Tales purgationes indurāt, singultus in his, malū. Ad pedes & ad lūbos distētionēs ex mēsis, suppurationē inducūt, itēq; ea quæ de aluo uiscosa graueolētia cū dolore prodeūt. Stragulationes quoq; ex præscriptis suppurationē faciūt. Vterinæ in uentriculis duricies dolorosæ acute, perniciosum. Vterū iam gestātibus ex feruido ulcere fluxiones dolorosæ, malū. Hæmorrhoids his pessimū. Quibus aluo tumefacta, ad pudendū rubor deuenit, mēsis, albis humidis derepēte progressis, in longis febribus moriūtur. Cōuulsionis, si mēses in principio apparuerint, febre nō accedente, solutio fit. Vrinæ tenues cū aliquātula nubecula in medio cōsistente, rigore significant. Si à quarta die sanguinis fluxus fiat, diuturnitatē significat, & aluus erūpit, & crurū tumores. Vterū gerentibus capitis dolores, soporosi, cum grauitate fientes, mali sunt, fortassis aut his etiā conuulsoriū quid pati contingit. Quæ ante partū, iuxta modū bilis sursum ac deorsum erūpentis, doluerunt, facile quidē pariunt, uerū si febricitent, maligne habēt: tum aliās, tum si circa fauces quid uexet, aut aliquod signū in febre malignum appareat. Aquosa ante partus erūpentia, mala. Vterū gestātibus falsuginosæ iuxta fauces fluxiones, malū. Ante partū rigore habere, & partus circa dolore, periculosi. Vterū gerētibus ex feruido ulcere fluxiones, malum; cōuulsæ, exolutæ, & postea perfrigeratæ excalescūt acute. Sed & difficiles sūt prægnātibus tumores circa tenue intestinū, quales circa eminentias osculi uteri sūt, erectæ ceruicis spirationē inducentes. Num tales tumores gemellorū partum significant? Num & cōuulsionem tales tumores faciūt? Quæ suspiciosum efferunt spiritū in febribus, abortiunt. Horrorē habentibus, lassitudine affectis, capite grauatis, menses erūpunt. Ad manum torpidæ, obaridæ, sitis exortes, menses multos emittentes, suppuratæ fiunt. Alba derepente ex abortu decurrentia, si aliquantum riguerit, & ad femur impetus, in his tremor difficilis est. Ora feruido, aphtha appellato, ulcere affecta, uterū gestantibus aluos humectant. Prægnātes præagrotātes ante partus insuper rigēt. Torpefactoriæ exolutiones difficiles quidē ex partibus contingūt, & mentē emouētes, nō tamen perniciosæ. Sed & mensiū copiā præsignificant. Quæ in partu os uentriculi prædolere, paulo post eiiciunt. Horrores, lassitudines

lines, capitis grauitates, colli dolores, mēses extrudunt. Circa iudicationē tale fiens cum tulsicula rigorē insuper inducit. Quibus puellis erectae ceruicis spiratio cōtingit uterum gestantibus, his mammarū suppuratur, & menses apparere in principio, malū est. Infantiae febres acutas turbulentas nō bilioso os uētriculi dolenti soluunt. In sterilibus, & nō pariētibus sanguinis uomitus ad cōceptionē prodest. Caligines mētribus multis comparētibus soluuntur.

Quibus mulieribus ex febribus dolor mammarū fit, sputatio cruenta non feculenta oborta, soluit dolores. Cōuulsiones ex utero affecto sine febre faciles sunt, uelut etiā Dorcadi. Quibus ex rigore febris lassatoria, mēses decurrunt, collum in his dolorosum sanguinis eruptionē inducit. Vomitus minime molestus est ex pituita ac bile permixtus, uerū ne ualde multus uomatur. At meraciores uomitiones deteriores sunt. Praefinus aut uomitus, et niger, & liuidus, malus est. Si uero etiā omnes colores idē uomuerit, perniciosum est. Celerrimā autem mortē significat liuidus, & male olens. Est etiā lethalis ruber uomitus, & maxime si cū necessitate dolorosa uomatur. Qui anxie se iactantes, citra uomitū exacerbantur, male habēt, itemq; qui lancinantur citra uomitū. Parui uomitus biliosi sunt, tum aliās, tum si uigilauerint. In nigris uomitibus surditas non nocet. Pauci fientes, celeres, biliosi, meraci uomitus, mali sunt in alui subductione uberiore, & pertinaci lumborū dolore. Ex uomitibus anxietates, clangores, oculi concretione lanuginosam habentes, furiosa. Acute infantia correpti, uoce intercepta, ita affecti moriuntur. In uomitu si quis siticulosus sit, & sitis exors fiat, malū est anxiosis uigilantibus. Abscessus iuxta aurē maxime fiunt anxiosis. Aluo turbata suppressa, breui uelut culicum puncturae erumpunt, & ad oculos lachrymosus abscessus deuenit.

In meracis uomitibus singultus, malus, mala etiā cōuulsio. Similiter etiam in nimis purgationibus ex medicamentis. Qui uomituri sunt, antea sputationes faciunt. Ex ueratro cōuulsio, perniciosa. In omni purgatione redundante, frigiditas cū sudore, perniciosa est: & qui insuper uomūt siticulosi in his, malum. Anxiosi, lumbos dolentes, aluo humectantur. Purgationes ualde rubicundorum, nigrorū, à ueratro, malae sunt: & cū talibus exolutio, mala.

A ueratro uomere rubicūda, spumosa, pauca prodest, facit tamen duricias, & suppuraciones magnas abducit. Sunt autē hi qui talia uomunt aliās & pectus dolorosi, & in rigoribus exudantes, & testes intumescunt, quod si cōtigerit insuper rigent & gracilescunt. Frequentes per eadem recidiuae uomitoriae, circa iudicationem nigrorum uomitum faciunt, fiūt item tremulae. Sudor optimus quidē est, qui febrē in die iudicatorio soluit. cōmodus autē est & qui leuat, frigidus uero, & circa caput solum ac collū fiens, malus est. Nam & tēporis diuturnitatē, & periculū significat. At frigidus in febre quidē acuta, lethalis est. In mitiore uero, diuturnitatē significat. Sudor unā cum febre fiens in acuto morbo malus est. Vrina in febre albam habens & leuē subsidentia firmatā, celerē dimissionē significat. Celerē etiā ea quae ex indiscreta, pinguedinē quādam habens, exauescit. At subrubra, & subsidentia subrubra habēs & leuē, si quidē ante septimū diem prodeat, septima die liberat. Post septimū uero, tardius, aut omnino post tēpus aliquod diuturnius, & quae in quarto die nubecula subrubra habet, septimo liberat, si reliqua iuxta rationē habeāt. Ceterū tenuis et biliosa

biliosa, & uix tenuem ac exiguā subsidentiam habens, & quæ ad melius, ac deterius mutatur, diuturna est. Hæc aut diutius cōsequens, aut temporis diuturnitate circa iudicationē fiēte, periculo nō uacat. Aquosa uero & alba perpetuo, in diuturnis morbis difficulter iudicat, & secūra non est. Nubeculæ in urinis albæ quidem & inferne, cōmodæ sunt: rubicundæ uero, & nigrae, ac liuidæ, difficiles sunt. Periculosa urina est biliosa, non subrubra, in acutis: & quæ crassiores farinæ partes refert, albas habens subsidentias: & quæ uaria est colore ac subsidentia, & maxime in fluxionibus de capite. Periculosa est & quæ ex nigra in tenuem biliosam trāsmutatur: & quæ ex subsidentia diuellitur: & quæ ex cōpactis quibuscūq; innatātibus, subsidentia habet subliuidā, limosam. Num ex talibus præcordiū dolent: dextrū arbitror, aut etiā cum uirore pallidi fiunt: & abscessus circa aurē dolentes: His paululū erumpens aluus, perniciosa est.

Vrina quæ derepente citra rationē paulatim cōcoquantur, malæ sunt: & in summa, quæ citra rationē matura est, in morbo acuto, mala est. Mala est etiā ualde rubicunda ex his, florulentiam æruginosam cōtinens. Alba uero & diffusa pellucida urina, mala est, maxime si in phreniticis comparet. Mala est quoq; quæ post potū cito mingitur, & præsertim pleuriticis ac peripneumonicis. Mala est & quæ ante rigore oleosa mingitur. Malæ sunt & in acutis uiridātis pallores, nō existentes in colore. Perniciosa est urina nigrā subsidentia habens, & nigra. In pueris uero tenuis, magis q̃ crassa. Verū in tenuibus uice uersa q̃ in crassis. Et grandinosa genituræ similis diffusa, eadēq; dolorosa. Perniciosa etiam est omnis quæ latēter mingitur. At peripneumonicis perniciosa est quæ in principio quidē cocta est, post quartū uero diē attenuatur. Pleuriticis urina cruēta, caliginosa, cū subsidētia uaria, indiscreta, lethalis est plerūq; in quatuordecim dieb. Lethalis est itē in pleuriticis breui prasina, nigrā subsidentia habens, aut fursuracea. Verū in febre ardētī stupefactorio modo detētis, pessima est urina ualde alba. Vrina cruda multo tēpore manēs, alijs signis salutaribus, abscessum & dolore significat, & magis in partibus sub septo trāsuerso. Si uero dolores in lumbis oberrarint, ad coxā, & in febre, & sine febre. At quæ emittitur urina pinguedinē habens in subsidētia, febrē significat. Cruēta uero in principio micta, diuturnā, turbata, cū sudore, recidiuā. Alba uelut iumentorū, capitis dolore, pelliculosa, conuulsionē. Quæ sputo similes subsidētias, aut limosas habet, rigore indicat: Quæ aranei telis similes, colliuationē. At in febribus errōneis nigra nubeculæ, quartanā indicāt. Decolores autē, nigra innatātia in medio habentes, cū uigilijs & turbatione, phrenitidē, puluerulentę cū spirandi difficultate, aquā inter cutē. Vrina aquosa aut turbata friabili asperitate, aluū liquidam fore significat. Verū tenuis ualde urina si densa fiat, num sudorem futurum indicat: iam uero factum, spumosa in seipsam confidens. In tertijs cū hōrrore uelut nubeculæ nigrae, horrores inconstantis indicia sunt. Et pelliculosa urinae, & cum hōrrore subsidentes, cōuulsoriæ sunt. Vrina bonam habens subsidentiam, derepente non habens, dolore & mutationem significat. At subsidentiam habens turbata desinens, rigorem circa iudicationē. Fortassis autē & in tertianā aut quartanā transitionē. In pleuriticis urina subrubrā habens leuē subsidentiam, securam iudicationem significat. Cum leui uirore ac pallore florulenta, albam subsidentia habens, etiam celerem. At rubi-

cunda

cunda ualde & florulenta, subsidentiam cū uirore pallidam, leuem, sinceram habens, diuturnū ualde turbulentū morbum qui in alium trāsmutatur, nō tamen perniciosum. Alba uero aquosa, subsidentia crassas polentæ partes referētem, fuluam habens, dolorē & periculum significat: & quæ cū uirore pallida est, fuluam, crassas polentæ partes referentē subsidentia habēs, tempus & periculum significat.

Vrinæ quæ in his qui iuxta aures abscessus habent, cito & modice cōcoquantur, malæ sunt, & perfrigerari hoc modo, malum est. Vesica intercepta tum aliàs, tum cū capitis dolore, habet quid cōuulsoriū. Quæ in his cū torpore exoluuntur, difficilia sunt, nō tamen perniciofa. Num & aliquantū mente mouentur? Rhenum dolor repentinus, cū urinæ suppressione, calculorum aut urinarū crassarum mictionē significat. Tremores senioribus in febre fiunt, atq; sic cōparentes, fortassis calculos per urinam ægris eijciunt.

Vrinæ suppressio, & grauitas in imo uentre, plerūq; stillicidium urinæ significat futurū. Sin minus, aliū morbum ex quo ægrotare solet. In biliosis urinæ interceptio, breui occidit. Vrina in febre densitatē habens diuulsam, recidiuam aut sudorē significat. In febribus longis, tenuibus, erroneis, urinarum tenuium mictiones, splenicæ sunt. In febre aliàs aliarū urinarū mictiones, morbum producant.

Vrinæ quæ mingūtur à non recordantibus nec cōmonefactis perniciosæ sunt. Num his minguntur uelut si subsidentiam cōturbasses? Quibus urinæ pauca, grumosa, non sine febre, copia ex his progressa tenuis prodest. Prodit autē talibus ab initio, aut breui subsidentia habet. Quibus urinæ cito subsidentia habent, hi cito iudicantur. Comitiali morbo laborantibus urinæ tenues et crudæ, præter morem, sine repletionem, morbi inuasionē significant, tum aliàs, tum si quis dolor, aut cōuulsio, in summū humerum, aut collum, aut dorsum incidat, aut torpor corporis fiat, aut turbulentum insomniū uiderit.

Parua cōparere, uelut sanguinis stillas, & urinā, & uomitū, & alui egestionem, penitus quidem malum est. Pessimū uero si propinque inter se prodeant. Alui egestio optima est mollis, coharens ac compacta, subfulua, nō ualde graueolens, prodiens hora cōsuetā, copia pro ratione ciborum ingestorū. Spissum autē fiat ad iudicationē. Cōmodum est & lumbricos rotundos exire simul ubi ad iudicationē tendit. In acutis spumosa, circūbiliosa alui egestio, mala est. Mala item ualde alba. Adhuc uero peior est quæ fariæ ac sterquilini speciem refert. Sopor in his malus est, & cruēta egestio, & uacuum uacuatio præter rationē.

Alui interceptio, parua nigra, uelut caprarum stercora, ad necessitatē coacta emittens, natus his erumpens, malū. Viscosa meraca, aut alba alui egestio, mala est. Mala est & abūde multū fermentata, subpituitosa. Praua item ex cōpactis quibusdā innatātibus, subsidentia subliuida, purulenta, cū biliosa. Sanguinē splendidum egerere, malū est, tū aliàs, tum si quis dolor affuerit. Spumosa, circūbiliosa alui egestio, mala est. Sed & morbi regiū ex talibus incurrūt. In biliosis alui egestionibus spumosa florulentia, mala est, maxime ei cui lūbi doluerint, & mēte motus fuerit. Num autē his dolores? Tenuis spumosa alui egestio, aquosam cū uirore pallidā habens subsidentia, mala est. Mala etiā purulēta, & nigra cruēta mala, cū febre, & aliàs.

eruaria, abūde bile colorata egestio, mala est, tātoq; deterior quantū colore magis horrēda est, præterq; in medicamentorū usu. In hoc enim periculo uacat, si non

non copia excedat. & tenuis, mollis egestio, in febre mala est. Mala quoque sicca, friabilis, decolor, tum alia, tum si aluum humectet. Nigris uero antea egressis occidit. Liquida alui egestio, & acruatim, & paulatim fiens, mala est, altera enim uigilias, altera exolutionem facere poterit. Liquida subtenuis alui egestio perfrigescent, non sine febre, mala est. Rigores in his uesica & uentrem corripunt. Aquosa uero ualde non desinens in acutis, mala: & magis si etiam sitim non habuerit. Valde rubicunda egestio in alui profluuiio, mala est. Mala quoque ualde cum uirore pallida, aut alba, aut spumosa, aut aquosa. & parua, & uiscosa, & leuis, & cum uirore subpallida, mala est. Et soporosis torpescit liquida egestio, pessima est. Lethale autem & aluum sanguine manare, multa grumosa egestionem, itemque alba ac liquida, cum uentre in tumore eleuato. Egestio alui nigra uelut sanguis, & cum febre, & sine febre, mala est. Mala item omnes uariae abunde ex bile colorate. Egestionem desinentes in spumosas meracas, omnes quidem exacerbant, conuulsos autem etiam ualde. Ex talibus abscessus iuxta aurem emergunt. At quae ualde liquidae fiunt, & rursus compactae, meracae, stercoraceae egestionem, longitudinem morbi significat. Valde rubicunda in febre delirium. Alba stercoracea morbo regio difficilis est, itemque liquida quae seposita ruborem capit. In sanguinis eruptionibus uiscosa egestio nigris uariiegata, maligna est, maxime autem ualde albidis. Valde alba egestio in febre, non bene iudicat. Aluus turbulenta paruis frequentibus ad egerendum progressibus, maxillas intendit. Soluit etiam rubores in facie fientes. Stercoracea cum contentione egestio, alui afflictionem significat. Pituitosa uero acutae cum oris uentriculi dolore, dysenteriam: fortassis autem & lumborum dolorem. Talibus alui circumtentio ad necessitatem liquida demittens, citius restitans, habet quid conuulsorium. Insuper rigere his perniciosum est. Quibus nigra per aluum prodeunt, frigidum sudorem excludunt. Quibus aluus ab initio turbatur, urinae uero paucae sunt, & progressu temporis aluus quidem siccatur, urina uero tenuis redudat, his abscessus ad articulos fiunt. Progressus ad egerendum paulatim fientes, horrorem ac rigorem inducunt, & quibus larga sit egestio difficilimum est quartanis incipientibus. Frequentes ad egerendum progressus paulatim fientes, pauca stercoracea subuiscosa habentes, cum praecordij & lateris dolore, morbum regium denotant. Num his suppressis hi cum uirore pallidi fiunt. Arbitror autem & hoc sanguinem effundere. At dolores in lumbis, in his sanguinem fundentibus, sanguinem egerunt splendidum. Cum sopore, & capitis dolore, calefcere in super, perniciosum est. Viscosae, biliosae, magis abscessus iuxta aurem faciunt. Quicunque tumores aluo humecta eleuantur, cum doloribus, malum. Aluo uero suppressa, & nulla alia re nouata, cito rumpitur, & malignus est. Vomitiones in his malae & ferinae. Quibus & flammeis & ualde rubicundis solutis, graeolens, larga, subrubra sit, hi ne infaniant timor est. Corpus squallidum aluum male affectam significat, in his ualde rubicundae, instar purulentae carunculae, egestionem maxime prodeunt. Ad aluum biliosam mollem stercoracea egerent, ardores comparentes, tumorem iuxta aurem faciunt. Biliosas egestionem surditas sedat, & surditatem sedat biliosa alui egestio. Pustulae serpiginosae supra inguina, ad laterum mollitudinem ac pubem fientes, aluum male affectam significant. Exoluto

lutio dolorem soluens, aluū maxime humectat. Iuxta sedem dolorosā sup-
purationes aluum turbant. Lethales egestionēs sunt, pinguis, nigra, liuida
cum graueolentia, & biliosa habens in se simile quiddam ciceri aut fabis fressis,
aut ueluti floridos sanguinis grumos, & quæ odore similis est egestionī infan-
tium, & uaria eademq; diuturna, Talis autē fuerit cruenta, ramētoſa, biliosa, ni-
gra, prafina, & simul, & permutatis uicibus. Lethalis quoq; omnis est quæ sen-
ſum ægri fugiens exit.

Qui potum difficulter deglutiunt ſpiritu tuſſiente,
eructatio ſubtracta intro reuoluta dolorem uentris ſignificat. Malæ ſunt
etiam egestionēs ualde rubræ æruginosæ in quartanis. Et tales ſanguinis fluxio-
nes ſoporosæ ſunt, ex his cōuulſione moriuntur, nigris antea egreſſis. Exo-
lutiones alui repentinæ præter rationē, in diuturnitate temporis conſumptis,
unā cum uocis tremula interceptione, pernicioſe habent.

Tenues nigrorū
egestionēs horrificæ, meliores talibus ſunt. Tales proſunt maxime in ætate an-
te uigorem.

Pruriginosæ affectiones omnibus nigrorū egestionem ſignifi-
cant, & uomitū grumofum. Et tremulæ affectiones cum morſu ac capitis do-
lore, nigras egestionēs ſignificant. Ante tales, uomitus prodiit, & ubi uomies
runt, multæ tales inſuper detrahuntur.

Quibus in alui turbationē exacer-
batur morbus, circa iudicationem nigra inferne prodeunt. Ex aluo diutine
affecta, uomentibus, bilioſis, cibum ſaſtidientibus, ſudor multus cum impoten-
tia repentina, occidit.

In medicamentorū uſu, in deſluxione, tenuis abun-
de ſanguis eliqueſcens, malum eſt. Duricies circa uentrem cū dolore, in fe-
bribus cum horrore cibos auerſantibus, aluo parum ad purgationē humecta-
ta, non ſuppurantur.

Vnā cum febre aluus turbata ſaſuginoso modo, ſo-
poroſos, torpidos, non ualde comitatur. Ex aluo liquida laſſatos, caput do-
lentes, ſiticuloſos, uigilantes, ualde rubicūda egeſtione ſolutos, timor eſt ad in-
ſaniam deuenturos eſſe, ſi difficulter ſpirauerint.

Ad hoc ubi quis cum ui-
rore palleſcit, bene ſpirare noxium non eſt aluo inſuper probe egerēte. Adu-
ſtæ egestionēs cōtentionem habentes, aluum male affectam ſignificant. Bi-
lioſis aluus turbata, parua, frequenter egerens, diſtendentia cum paucis muco-
ſis, dolorem circa tenue inteſtinum hæc faciunt, & urinam non facile prodeun-
tem, ex talibus ad hydropem deſinunt.

Linguæ tremulæ quibuſdam alui
eruptionis futuræ ſignum ſunt. Quibus ardor fit, & ad egreſſas egestionēs
alui, inſuper exſudant, his febris exacerbatur.

Ex aluis liquidis perfrigera-
tio cum ſudore, mala.

Ex aluis liquidis, ſanguis de gingiuis
defluens, lethalis eſt. Alui egeſtio pura ſuperueni-
ens, ſoluit febrem acutam cum ſudore.



VLLVM capitis vulnus leuiter contemni debet. Sæpe enim cutis sola cõtusa ferro, aut alia aliqua re, si nõ diligenter, & cū quadam cautione curetur: ueluti si sanguis cõcretus non expurgetur, aut aliud quiddã negligatur: ulcus incrudescẽs nõ parum molestiæ exhibet, & aliquãdo etiam febrẽ inducit: & medico quidẽ negotia, ægrõto uero periculum nõ minus affert. Verum hoc multo magis cõtingit, si caluaria, & cerebri mēbranæ rūpuntur. Quare si non singula hæc diligenter medicus curauerit, sæpe mortis causa existit. Et de his quidẽ omnibus etiã alibi diximus, sed & nunc dicendũ est. Primũ igitur capite uulnerato interrogare oportet: per quid uulneratũ sit. Deinde quid homo fecerit, quũ uulneratus fuit. Postea qua parte uulnus inflictum sit. Nam hominum capita nihil inter se similiter habent, neq; futuræ capitis in omnibus eodẽ loco consistunt. Verũ quisquis ex priore capitis parte prominentiã habet: est aut̃ promineñtia, rotũda ossis pars eminẽs præ alia: huius futuræ cõsistunt in capite; uelut litera græca tau T pingitur. Breuiorem enim lineã ad prominentiã transuersam cõstitutam habet. alterã uero lineã per mediũ caput, sed secundũ longitudinẽ ad collũ semper habet. Qui uero ex posteriore capitis parte prominentiam habet, huius futuræ etiã cõtario priori modo cõsistunt. Breuior enim linea ad prominentiã transuersa cõsistit, longior aut̃ per mediũ caput, secundũ longitudinẽ ad frontẽ semper cõstitutura est. Quisquis aut̃ ex utraq; capitis parte, & anteriore, & posteriore, prominentiã habet: huius futuræ sunt similiter cõstitutæ, uelut litera græca H scribitur. Consistunt aut̃ longæ quidem lineæ ad utrãq; prominentiã transuersæ. Breuis aut̃ per mediũ caput, secundũ longitudinẽ ad utrãq; longã lineam desinẽs. At qui neutra parte ullam prominentiam habet, hic futuras habet uelut litera græca X pingitur. Consistunt autẽ hæ lineæ, altera quidẽ transuersa ad tẽpora pertingens, altera uero secundũ longitudinẽ, per mediũ caput. Duplex aut̃ est os iuxta mediũ caput. durissima uero ac densissima suprema ipsius pars existit, & infima quæ est ad mēbranam. Cõsimilis est color ossis sub carne, cõsimilis est color ossis in fernẽ. Secedit autẽ à supremo ac infimo ossẽ, à durissimis ac densissimis, ad mollius, ac minus densum, & cõmunius, ad duplicatã laminam. Est aut̃ duplicata lamina cauiissima, ac mollissima, & maxime antrofa. Est aut̃ & totum os capitis, excepta ualde modica suprema ac infima parte, spõgiæ simile. & habet os in se ipso carũculas similes multas humidas, & si quis ipsas digitis cõterat, sanguis utiq; ex ipsis prodierit. Sunt etiã in ossẽ uenulæ tenuiores ac cauiiores, sanguine plene. Quod igitur ad duriciã, & molliciem, & cavitatẽ attinet, sic habet. Quod uero ad crassitudinẽ ac tenuitatem, hoc modo. Vniuersi capitis os tenuissimũ est ac debilissimũ, quod est circa sinciput: & carnem paucissimã ac tenuissimã hac parte os in se ipso habet: et cerebrũ hac capitis parte plurimũ subest. Et quia hæc ita se habent, ut & uulnera, & tela æqualia sint magnitudine, & minora; & similiter uulneratus quis sit, & minus: os hac capitis parte & magis contundi-

tur, & rumpitur, & magis intro contusum cedit, & lethaliora, ac ad curandum, & effugiendā mortem, difficiliora sunt uulnera hac parte, q̄ alibi in capite, & ut sint æqualia uulnera, & similiter uulneratus quis sit, & minus: homo ubi etiā aliās ex uulnere moriturus est, breuiore tempore moritur, qui hac parte capitis uulnus habet, q̄ qui alia. Cerebrum enim & citissime & maxime iuxta sinciput sentit mala, quæ & in carne, & in osse fiunt. Sub tenuissimo enim osse, ac modica carne, cerebrum est hac parte: & plurimū cerebrum sub sincipite iacet. Cæterum ex reliquis ossibus id quod circa tempora est debilissimū est. Commissura enim est infernæ maxillæ ad caluariā, & motus in tēporibus sursum ac deorsum, uelut articuli: & auditus prope ipsum est: & uena per tempora extensa est, cauā ac fortis. Omni uero capitis osse robustius est os uerticis: et quod est retro aures, robustius est q̄ totum quod in anteriore parte est: & carnē ampliorē ac profundiorē in seipso hoc os habet. Et sanē his ita se habētibus, si quis & uulneribus, & telis, omnibus æqualibus ac similibus, & maioribus ac minoribus, similiter sit uulneratus, & magis: hac capitis parte os minus rumpitur, & cōtunditur. & si homo aliās moriturus est ex uulnere, si in posteriore capitis parte uulnus habet, diutiorē durans tēpore morietur. In lōgiore enim tempore os suppuratur, & deorsum ad cerebrū transpuratur, propter ossis crassitudinē: & paucius etiam cerebrū hac parte subest: & plures mortē effugiunt plerūq̄ ex his qui posteriore capitis parte uulnerati sunt, q̄ qui anteriore. Sed & in hyeme diutiorē tēpore uiuit homo q̄ in æstate, quisquis etiā aliās moriturus est ex uulnere, quacūq̄ capitis parte uulnus habeat. At uero sedes telorum acutorum ac leuiorū, ipsæ in seipsis fientes in osse, & cū fissura, & cōtusione, ac intro celsione: fiunt aut hæ similiter, & in anteriore & in posteriore capitis parte: ex his mors nō contingit secundū iustitiā, etiam si contingat. Sutura uero in ulcere si cōpareat, osse denudato, quacūq̄ capitis parte ulcerē fiēte, debilissimus æger est ad resistendū uulneri ac telo: si in ipsam futurā telum incubuerit: & maxime omnium si telum in sincipite, iuxta debilissimā capitis partem incussum fuerit, & futuræ circa ulcus, si ita cōtingat, fuerint, & telum ipsas futuras cōtigerit. Vulneratur porro os in capite tot modis. Singulorū aut modorum plures species fracturæ in uulnere fiunt. Os uulneratū rumpitur, & ossi fissurā continenti ac ambientī necesse est contusionē accedere, si ruptū fuerit. Nam telum quod os rumpit, idem hoc etiā os, aut magis, aut minus cōtundit, id ipsum uidelicet os, in quo fissurā rumpit. Atq̄ hic unus modus est. Species aut fissurarum omnigenæ fiunt. Nam & tenuiores, & ualde tenues conspicuæ fiunt. Quædā uero neq̄ statim post uulnerationē, neq̄ in diebus, in quibus dolorum utilitas mors homini contingere potest. Rursus aut aliquæ fissuræ crassiores ac ampliores fiunt, quædam uero etiā ualde amplæ. Et aliæ quidē in longiorē modum rūpuntur, aliæ uero in breuiorē. & aliæ rectiores sunt, aliæ etiā ualde rectæ. aliæ uero curuiores & curuæ ac profundiores. aliæ aut ad infernā partem, & per totū os. Poterit aut & os in sua ipsius natura cōtundi, ita ut nulla fissura ad contusionē ossi accedat. Atq̄ hic secundus modus est. Species aut contusionis plures sunt. Nam & magis, & minus cōtunditur, & altius ac per totū os, & minus in altum ac per totū os, & in ampliorē & minorē, tū longitudinē, tum latitudinē. Verū harū specierū nullam oculis intuēti cognoscere datur, qualis nam specie existat, & quāta magnitudine. Neq̄ enim etiam si sint contusa, & malum factum sit, an

contusa sint, oculis uidere conspicuū fit, statim post uulnerationē: quemadmodum neq; aliquæ fissuræ uideri possunt, quæ rupto osse procul absunt. Intrò etiam cedit os ex natura sua, unà cum fissuris: aliàs enim non intrò cesserit. Nam quod intrò cedit, abrūpiturq; ac frāgitur, intrò cedit ab alio osse, quod in sua ipsius natura manet. & sic sanè fissura adest intrò celsioni. Atq; hic tertius modus est. Intrò aut cedit os per multas species. Nam & maior ossis pars, & minor intrò cedit: & magis ac profundius deorsum, & minus ac magis in superficie. Quin & sede teli in osse contingente, fissura utiq; ad sedem accesserit, & ad fissuram etiam cōtusionem magis aut minus accedere, necesse est, si quidē & fissura accedat ea parte qua & sedes facta est: & fissura fit in osse contingente & sedem, & cōtusionem. Atq; hic quartus modus est, in quo sedes teli fit in osse. Sedes aut uocatur, quū manēte osse in sua ipsius natura, telū quod in os incubuit, manifestū fecerit ubi incubuit. Verū in singulis modis plures species fiunt. Et de cōtusione quidē ac fissura, si ambo hæc ad sedem accedant, & si contusio sola fiat, iam dictū est, quod multæ species & contusionis, & fissuræ fiunt.

Hæc aut sedes ipsa in seipsa, longior ac breuior fit, & curuior ac rectior, & orbiculatio: & multæ aliæ species talis modi sunt, prout etiā figura teli fuerit. & eadem etiam profundiores deorsum, & magis & minus, & angustiores, & ampliores. & ualde amplæ, si dissectione intercisā fuerit. Quanta aut dissectio in lōgitudinem ac latitudinē fiat, in osse sedes est, si alia ossa dissectionem ambientia in sua ipsorū natura manserint, & nō unā cum dissectione intrò cesserint ex sua natura. Nam si ita contingat, intrò celsio fuerit, & nō amplius ossis sedes. Si uero alia capitis parte uulneratur, & ulcus habet homo, et os carne denudatum est, quintus hic modus est: & hanc calamitatē ubi facta est, nulla re iuuare queas. Nam si passus est hoc malū, nō est quod ex ipso exquirere possis, an passus sit hoc malum, neq; qua capitis parte: & ex his fracturæ modis ad perforationē deuenit, tum si contusio ad uisum incōspicua est, tum si aliquo modo manifesta fuerit: & fissura si inconspicua uisui fuerit, & ad uisum manifesta. Sed & si sede teli in osse fiēte, fissura ac contusio ad sedem accedat: & si cōtusio sola accedat ad sedem, absq; fissura: hæc quoq; ad perforationē deuenit. At uero os quod ex sua natura intrò celsit, parū perforatione opus habet: et quæ maxime intrò cesserunt, & maxime fracta sunt, & perforatione minime opus habēt. Neq; sedes ipsa in seipsa fiens, absq; fissura ac cōtusione, perforatione indiget. Neq; dissectionio ipsa, si magnā ac ampla fuerit. Dissectio enim & sedes idem sunt.

Cæterū primū spectare oportet in uulnerato, qua capitis parte, et num in debilioribus, uulnus habeat: et capillos cōsiderare circa ulcus, an dissecti sint à telo, & an intus sint in uulnere: quod si est, periculum est os carne nudū esse. Itaq; dicere oportet, os aliquā læsionem à telo habere. Atq; hæc longe prius cōsiderasse ac dixisse oportet, antequam hominem contingas. Vbi uero iam contigeris, dare nosse conari, an nudum carne os sit, aut non. & si quidem oculis cōspicuum fuerit os nudum, bene habet: Sin minus, specillo cōsiderato. & si quidem inuenieris os carne nudum esse, & non sanum à uulnere, eius quod in osse est ditionem primum facere oportet, inspiciēdo & quantū sit malum, & quo opere opus habeat. Oportet etiam uulneratū interrogare ut passus sit, & quo modo. Si uero nō conspicuū fuerit os, multo adhuc magis interrogationē facere oportet, an habeat quid mali, aut nō habeat: & si nudū est os, ut factum sit, & iuxta quem

quē modum. Nam cōtusiones & fissuras in osse nō apparentes, & tamen præsentes; ex uulnerati responsione cognoscere primū conari oportet, an tale quid passum sit os, aut nō passum. deinde ratione et opere exquirere, citra specilli ad motionem. Specilli enim admotio nō indicat, an tale quid mali os passum sit, & an habeat quid in seipso, aut non passum sit. Sed sedem teli indicat specillum, & an intro cesserit os ex natura sua, & an uehementer fractum sit os: quæ etiā oculis conspicua uidenti cognoscere datur. Rūpitur autē os & obscuris fissuris, & manifestis: et cōtunditur obscuris cōtusionibus: et intro ex sua natura maxime cedit, quū alter ab altero sauciatur, de industria sauciare uolens: aut quum ex altiore loco sit iactus, aut plagæ ictus, uter tandē fuerit, magis q̄ ex plano loco: & si contineat manu telum, siue iaciat, siue percutiat: & si fortior debiliorem uulnerat. Ex his uero qui cadentes uulnerantur ad os, aut in ipsum os, is qui ex altissimo loco cadit, & in durissimū ac obtusissimū: huic periculum est ut os & rumpatur, & contundatur; & intro cedat ex sua natura. Ei uero qui ex plano magis loco cadit, & in molliorē, os minus hæc patitur, aut etiam nō patitur. Quæcūq; uero illabentia in caput tela, ad os uulnerant, ex his id quod ex altissimo loco illapsum est, & minime ex plano, & quod durissimum ac obtusissimū, & grauissimum ac minime leue est, & quod minime acutum ac molle: hoc & ruperit os, et cōtuderit. & maxime sanē periculum est ut os hæc patiatur, quum & hæc fiant, & è directo aduersus telum, os sauciari cōtingat, siue ex manu percussatur, siue iactū suscipiat, siue quid ipsi incidat, siue ipse collapsus saucietur, ita ut quomodocūq; sauciat, osse aduersus telū occurrat. Quæ uero tela ex obliquo os sauciant, minus & os rūpunt, & intro ad caput contundunt, etiam si carne fuerit os denudatū. Nam quædam uulnera ita inflicta, neq; denudant os carne. Profecto ex telis maxime os rūpunt, & manifestis, & obscuris fissuris, & cōtundunt, et ex natura sua os intro cedere faciūt, quæ sunt rotūda, & orbiculata, & undiquaq; plana, & obtusa, & grauia, & dura: & carnem hæc contundūt, & maturā faciunt, ac cōcidunt: & ulcera fiūt à talibus telis in obliquū, Sed & in circulū, subcaua, & suppurata magis fiunt, ac humida sunt, & diutiorē tēpore purgātur. Necessē est enim carnes cōtusas ac cōcisas: pus fieri ac cōsumi. At tela oblōga, multū tenuia, & acuta, & leuia, carnē magis dissecant q̄ contundunt, & os eodē modo. Et sedem quidē inducit id ipsum quod etiā dissecauit. Dissectio enim & sedes idem sunt. Verū nō ualde os cōtundunt talia tela, neq; rumpūt, neq; ex natura sua intro cedere faciūt. Caterū oportet supra cōspectum tuum, quicquid tandē apparuerit in osse, etiā de omnibus his interrogationē facere. Nam magis & minus sauciati signa hæc sunt, si uulneratus soporē altiorē incidit, & caligo offusa fuerit, & uertigo, & si ceciderit. Quū autem os carne denudatū à telo fuerit, & circa ipsas futuras ulcus fieri cōtigerit, difficilē est sedē teli deprehendere, quæ in alio osse manifesta est, an insit in osse, aut nō insit, & an sedes facta sit in ipsis futuris. Occultat enim ipsa futura, asperior existens reliquo osse, & nō satis clarū est ubi in ipso futura est, & ubi ossis sedes, si nō ualde magna sedes fiat. Accedit etiā ruptio ad sedē, plerūq; & ipsa in futuris fiens, & fit etiā hæc ruptio rupto osse deprehensu difficilior, eo quod circa ipsam futuram ruptio sit, si rumpitur, ut plurimū. Procliuē enim est hac parte os rūpi ac dissolui, propter ossis hac parte debilitatē ac raritatē, & propterea quod parata

fit futura ut rūpatur ac dissoluatur. Nam reliqua ossa futurā ambiētia ruptionis exortia manere possunt, eo quod robustiora sunt q̄p futura. Verum ruptio circa futurā fiens, etiā dissolutio futuræ est, & nō facile est deprehēdere, neq; si à te li sede fiat in futura, ubi rupta fuerit ac dissoluta. Verū difficilior est deprehēdere fissuram ex cōtusione. Fallunt enim & mentē, & uisum medici hę futuræ, fissuræ speciē referentes, & reliquo osse asperiores existētes, nisi uehemēter dissectæ fuerint ac dissolutæ. Dissectio autē & sedes idē sunt. Proinde si circa futuras uulnus factū fuerit, & ad os telū incubuerit, animaduersionē habere oportet, ac inuenire quod os passum sit. Nam ab æqualibus magnitudine telis, & similib, ac multo minoribus, & similiter & multo minus uulneratus, longe magis malū accipit, qui in osse in futuras telū recepit, q̄p qui nō in futuras id recepit. Et pleracq; horū perforare oportet. Verū ipsas futuras perforare nō oportet, sed secedendo in propinquo osse perforationē facere, si perfores. Porro de curatione uulnerū in capite, & quo modo deprehēdere oportet affectiones in capite si entes nō manifestas, ita mihi uidetur. Vlcus in capite nullo humore humectare cōuenit, ac ne uiuō quidē: neq; cataplasmate integere, neq; linamēto curationem facere. Neq; uero cōprimere oportet ulcus in capite, si nō in fronte fuerit, aut in locō pilis nudato, aut circa supercilium & oculū. Hic enim fientia ulcera, cataplasmatibus ac deligatione magis opus habēt, q̄p in alijs capitis partibus. Cōtinet ac ambit reliquū caput totam frontē. partes autem ulcus ambiētes, in quacūq; tādē parte ulcera fuerint, inflāmantur ac intumescūt, propter sanguinis influxionē. Oportet autē neq; ea quæ in fronte sunt ulcera, per omne tempus cataplasmatibus integere ac deligare, sed postq̄p inflāmatio sedata est, & tumor sedatus, à cataplasmatibus ac deligatione cessare. At in reliquo capite ulcus, neq; linamentis, neq; cataplasmatibus, neq; deligatione curare oportet, si nō & sectione opus habeat. Secare autē oportet ulceribus in capite ac frōte fientibus, quæ parte os carne nudū fuerit, & læsionē aliquā ex telo habere uisum fuerit. Vlcera uero quæ nō habent sufficientē magnitudinē longitudinis ac latitudinis, ad ossis inspectionē, an quid mali passum sit à telo, & quale id passum sit, & quantū caro cōtusa est, & quantā os læsionē habet: & rursus an illæsum sit os à telo, & nihil mali passum sit: & ad curationē, qualī nam opus habet ulcus, & caro, et ossis affectio: talia sanē ulcera sectione opus habēt. Si uero etiā os quidē carne fuerit denudatū, subcaua uero fuerint ulcera in obliquū, cavitatē q̄p plurimū resecare oportet, ubi nō facile est medicamēto quocūq; peruenire. Sed & orbiculatiora ulcera, ac plurimū subcaua, etiā ipsa resecare oportet, circulo diuissim inciso secundum longitudinē pro hominis natura, ut lōgius fiat ulcus. At uero in capitis sectione, reliquæ quidē capitis partes securitatē habent dū secantur. Verum tēpora, & adhuc supra tēpora uenā, quæ per tempora fertur, secare nō oportet. Cōuulsio enim corripit sectū. Et si quidē sinistra tēpora secta fuerint, dextera cōuulsio corripit. Si uero dextra secta fuerint, sinistra cōuulsio apprehēdit. Quū igitur ulcus in capite secas, ossium gratia carne denudatorū, scire cupiēs an habeat os quid mali à telo, aut nō habeat, secare oportet uulnus tanta magnitudine, quāta sursum opus habere uisum fuerit. Secantē uero carnē ab ossē diducere oportet, quæ ad mēbranam, & ad os existit. Deinde linamētum per totū ulcus adhibere oportet; quod ulcus q̄p amplissimū in posterū diem faciat, cū mini

mo dolore. ubi uero linamentū adhibuisti, cataplasmate utere, quāto tempore etiam linamēto, ita ut mazam ex tenui polenta in aceto subigas, aut coquas, & q̄ maxime uiscosam facias. Postridie uero ubi linamentum exemeris, inspecto osse quod passum est, si non conspicua tibi sit uulneratio, qualis nam sit in osse: neq̄ cognoscas an os aliquid mali in se habeat, aut nō habeat: telum autē ad os peruenisse ac læsisse uideatur: radere oportet specillo rasorio, secundū longitudinem ac profunditatē pro hominis natura. & rursus si etiā transuersum sit os, ruptionū gratia ad uisum inconspiciuārū, & cōtusionis obscuræ gratia, quæ nō intro celsit ex natura alterius ossis capitis. Indicat enim ipsa ratio magis, si non etiā aliās cōspiciuæ fuerint hæ affectiones, ex telo in osse existētes. Et si sedē teli in osse uideris, tum ipsam teli sedem radere oportet, tum ambientia ipsam ossa, ne sæpe ad sedē ruptio accedat, & cōtusio, aut sola cōtusio, & deinde lateāt, quū non cōspiciua existant. Postq̄ aut os scalpro raseris, si quidē ad perforationem tendere ossis fauciatio uideatur, perforare oportet, & citra perforationē tridui non excedere, sed in hoc perforare, tū aliās, tum tēpore calido, si ab initio curationē susceperis. Si uero suspiceris os ruptū, aut cōtusum esse, aut ambo hæc: coniectura facta q̄ uehemēter fauciatus sit, ex uulnerati uerbis: & quod à fortis id cōtigit qui fauciavit, si alius ab alio uulneratus fuerit: & quod telum quo uulneratus est, ex maleficorū telorum ordine fuit: deinde quod uertigo & caligo ipsum corripuerit, & quod in soporem profundiorē inciderit, & q̄ ceciderit: His ita fientibus, si nō cognoscas an os ruptū sit, aut contusum, aut ambo hæc, neq̄ aliās uideas: super os aliquid maxime nigri coloris, nigro medicamēto liquato subactū, imponere oportet: & subextēto linteo oleo imbuto super ulcus, & deinde mazæ cataplasmate appposito deligare: postridie uero exoluto ac expurgato ulcere deradere. Et si sanū nō fuerit, sed ruptū ac contusum, reliquū quidē os rasum albū erit, fissura uero & cōtusio, quæ nigrū medicamentū eliquatū in se ipsam suscepit, in reliquo osse albo nigra erit. Cæterū hanc fissurā conspectā rursus secundū profunditatē radere oportet. Et si quidē radens fissurā hanc cōspectā nigrā exemeris, & deleueris è cōspectu sublata, contusio quidē ossis, aut magis aut minus facta fuit, quæ sanē etiā fissuram à scalpro rasorio deletā rupit. Verū minus horrēda hæc est, et minus negotij exhibuerit, fissura deleta. Si uero in profundo sit, & dū raditur deleri nolit, ad perforationē deuenit hæc calamitas. Sed perforare oportet, ac de cætero ulcus curare. Cauere autē cōuenit ut ne aliquid mali os cōtrahat ex carne, si male curetur. Nā & perforato ossi, et aliās de nudato, sed sano: & si læsionē aliquā ex telo habeat, & tamen sanū esse putetur, periculū magis imminet ut suppuratū fiat, etiā si aliās futurū non esset, si & caro os ambiēs male curetur, & inflāmetur ac cōstringatur. Ignescit enim, & multa flāma impletur. Et sanē os ex ambiētib. carnibus in seipsum calorē & flāmam, & quæcūq̄ mala in seipsa habet caro, trahit, & ex his ita suppuratū fit. Malum est etiā humidam esse carnē in ulcere, & putrescentē, et ad multū tempus purgari. Quare suppuratū quidem q̄ celerrime ulcus facere oportet. Sic enim ambiētes ulcus partes q̄ minimū inflammabūtur, & ulcus citissime purū erit. Necesse est enim carnes cōcisas ac cōtusas à telo suppuratas fieri ac cōsumi. Postq̄ autem purgatū fuerit, siccius fieri ulcus oportet. Sic enim citissime sanū fiet, sicca carne germinātē, & non humida. Et sic quoq̄ ulceri caro nō superincrescet. Eadem ratio mēbranæ circum cerebrū est. Statim enim osse perforato & exse-

cto, ac de mēbrana detractō, ipsam denudatā membranā purā q̄ citissime ac siccam facere oportet, ut ne ubi ad multū tempus humida sit, cōputrescat ac in tumore attollatur. His enim ita fientibus, periculū est ipsam putrefieri. At uero os quod discedere à quouis alio osse oportet, ulcere in capite fiēte, & sede teli in osse existente, aut aliās osse plurimū denudato: discedit ubi plurimū exanguē factū est. Resiccatur enim sanguis ex osse, & à tēpore, & à plurimis medicamentis. Citissime enim discesserit, si quis ulcus q̄ citissime purgarit, & de cetero & ulcus, & os, tum maius, tū minus resiccauerit. Quod enim citissime resiccatur ac testaceū factū fuerit, ex hoc facto maxime dimittitur ab alio osse, quod sanguinolentū ac uiuū existit, & quū exanguē ac siccū fiat, à sanguinolento ac uiuū ualde discedit. Quacūq; uero ossa intro cōtusa cedunt ex sua ipsorū natura, rupta aut etiā diffecta, ualde ampla, talia minus periculosa sunt, ubi mēbrana sana fuerit. & quæ pluribus fissuris & amplioribus intro rupta sunt, adhuc minus periculosa sunt, & ad detractiōē faciliora sūt. & nullū ex talibus perforare oportet, neq; periclitari ossa auferre conando, priusq; spōte sua emergant, priore forma exoluta. Emergūt aut carne subnascēte. Subnascitur aut ex duplicata ossis lamina, & ex sano osse, si superna ossis pars sola fuerit corrupta. Sic uero quā citissime & caro subnasci ac germinare poterit, & ossa emerferint, si quis ulcus q̄ citissime suppuratū redditū, purum faciat. Et si per totū os ambæ partes intro cōtusæ cesserint ad mēbranā, & superna ossis pars, & inferna, si quis similiter medeatur, ulcus celerrime sanū erit, & ossa quæ intro cesserūt celerrime emergūt ac reuertūtur. At uero puerorū ossa, & tenuiora & molliora sunt, ea de causa, q̄ sanguinolentiora sunt, & caua, & neq; antrofa, neq; densa, neq; solida: & à telis æqualibus ac debilioribus, si similiter ac minus fuerint uulnerati, iunioris pueri uulnus, & magis & citius suppuratur, & in breuiori tēpore q̄ senioris: & si aliās ex uulnere moriturus est, iunior seniore citius perit.

Ceterū si os denudatū carne fuerit, animaduersione habita cognoscere conari oportet, si oculis uidere ac noscere nō datur, an ruptū sit os, et an cōtusum, aut solū contusum: & an sede teli facta, adsit cōtusio, aut fissura, aut ambo hæc. Et si quid horū os passum fuerit, detractō sanguine, paruo terebello. modice & cū cautione, os terebrare oportet. Tenuius est enim os, & minus profundū iuuenibus, q̄ senioribus. Quicūq; uero ex uulneribus in capite moriturus est, & fieri non potest ut sanus fiat ac seruetur, ex his signis dinotionē morituri facere oportet, & quod futurū est prædicere. Patitur enim hæc. Quū quis os fractū, aut ruptū, aut cōtusum, aut quocūq; modo fractū intelligens, per errorem deliquerit, & neq; raserit, neq; perforauerit, uelut os nō opus habeat, & uelut os sanū existat: ante decimū quartum diem febris corripiet ut plurimum in hyeme. In æstate uero post septimū diem febris corripit. & postquam hoc factum fuerit, ulcus colorem omittit, & ex ipso sanies pauca fluit, & quod inflammatum est ex ipso emoritur, & uiscosum fit, & apparet uelut salsamentū, colore fuluum, subliuidum, & os tunc corrumpi incipit, & fit ualde nigrum postremum pallidum aut ualde album euadens. Quum uero iam suppuratum fuerit, in lingua pustulæ oboriuntur, & desipiens æger moritur, & conuulsio pleurosq; corripit in altera corporis parte: si quidē in sinistra parte capitis ulcus habeat, in dextra corporis parte cōuulsio corripit. Si uero in dextra capitis parte

ulcus habeat, in sinistra corporis parte cōuulsio corripit. Sunt autē & qui syderati fiunt, atq; sic pereūt ante septimum diem in æstate, aut decimumquartū in hyeme. Similiter autē significant hæc signa, & in iuniore, si uulnus existat. Quapropter ubi intellexeris febrē inuadere hominē, & ex alijs signis aliquod ipsi accedere, nō cunctari oportet, sed os usq; ad membranā perforare, aut scalpro rasorio deradere. Est enim & ad perforationē, & ad rasionē, facile ac expeditū. Deinde reliqua sic curare, prout cōducere uisum fuerit, respectu ad id quod sit habito. Quum uero in uulnere in capite, homine terebello perforato, aut nō perforato, osse autē denudato, tumor rubicūdus, ignis sacri speciē referens, accesserit in facie, & in oculis utrisq; aut altero: & si quis tumore contingat, doleat: & febris corripiat ac rigor: & ulcus ipsum tum quod ad carnē attinet, tum quod ad os, bene habeat ad aspectum: & ambiētes ulcus partes bene habeant, excepto tumore qui in facie existit: & aliud peccatū nullū tumor habeat, quod ad reliquā uictus rationē attinet: Huius infernā aluum deorsum purgare oportet medicamēto, quod bilem ducit. & ubi sic purgatus fuerit, & febris dimittit, & tumor sedatur, & sanus euadit. Medicamentū uero dare oportet, ad uires hominis respiciēdo, prout robore ualidus fuerit. Cæterū de perforationis ac terebrationis usu, ubi ea necessitas ingruat, ut necesse sit hominē perforare, sic statuendum est. Si ab initio assumptam curationē administras, non oportet statim os ad membranā perforare ac excindere. Nō enim cōducit membranā osse denudatā esse, ad multū tempus male afflicta: sed postremū ubi madore corrumpi ac putrescere ipsam periculū est. Est & aliud periculum, si statim osse ad membranā perforato, ipsum auferas, ne in ipso opere membranā per terebellū uulneres. Verum terebrantē oportet, ubi iam ualde parū abest ut os sit perforatum, & os iam mouetur, à terebratione desistere, & sinere ut os sua sponte discedat. Nam in osse perforato, & à perforatione relicto, nihil mali accedere poterit. Tenuē enim iam id quod restat sit. Reliqua uero curare oportet, prout ulceri cōducere uisum fuerit. Terebrantē autem frequēter eximere terebellum oportet, caliditatis ossis gratia, & in frigidam aquā immergere. Calescēs enim ex circumductione terebellum, etiā os excalfaciēs ac resiccans adurit, & maius os perforationē ambiens discedere facit, q̃ aliās discessurū fuisset. Si uero etiam statim uolueris usq; ad membranā perforare, & postea os auferre, eodem modo frequēter eximere terebellum oportet, & in frigidam aquam demergere. At si nō ab initio curationem assumpseris, sed ex alio traditam susceperis, ita ut posterior tarde ad curationem deuenias: terebello exsculpto statim os ad membranā perforare ac excindere oportet, & exempto sepe terebello speculari: tum aliās, tū per admotū specillum, circūcirca ipsius terebelli uia. Nam multo citius perforatur os, si suppuratū iam ac transpuratū perforaueris. & sæpe cōtingit ut nō profundū os sit, tum aliās, tū si ea capitis parte fuerit uulnus, qua tenuius magis q̃ crassum os ipsum existit. Quare cauere oportet, ut in terebelli admotione ne fallaris, uerum qua parte crassissimū os esse uisum fuerit, in eam semper terebellum admotū adigito, ita ut frequēter cōsideres, ac cōmoueas os, et ejicere coneris. Postq̃ autē abstuleris, reliqua ue ut ulceri conferre uisum fuerit curato.



vt similia, aut dissimilia, à principio, à maximis, à facilimis, ab his quæ undiquaq; penitus cognoscuntur: quæ & uidere, & tãgere, & audire licet: quæ & uisu, et tactu, & auditu, et naribus, & lingua, & intelligẽtia sentire licet: quæ & quibus cognoscuntur, omnibus cognoscere licet. Quæ uero ad chirurgiæ officinã, Aegrotãs, agẽs, ministri, instrumẽta, lumẽ, ubi, quomodo, quot, quomodo, quãdo, corpus, uasa commoda, Tempus, modus, locus. Agẽs aut sedens, aut stans, moderate ad seipsum, ad id quod tractatur, ad splendorẽ lucis. Lucis igitur species duæ sunt, altera cõmunis, altera artificialis. Cõmunis, in nobis nõ est. Artificialis, etiã in nobis est. Vtriusq; uero duplices usus sunt, aut ad lucẽ, aut sub lucẽ. Sub lucẽ, & modicus usus est, & moderatio manifesta. Ad lucẽ uero, ex præsentibus, ex cõferentibus luminibus, ad splendorẽ cõuertere oportet id quod tractatur, exceptis his quæ aut latere oportet, aut uidere turpe est: ita ut id quod tractatur ex aduerso sit luci, qui uero tractat ex aduerso eius quod tractatur, uerũtamen ut ne tenebras inducat. Sic enim & qui agit uidere poterit, & quod tractatur nõ uidetur. Ad seipsum uero, si quidẽ sedeat, pedes secũdũ rectitudinẽ sursum uersus è directo ad genua sint, distãtia aut parua in cõsistẽdo intercedat. Genua aut superiora sint inguinib; modice distãtia, pro cõmoda cubiti positione ac appositione. Vestitus expedite, distincte, æqualiter, similiter, cubitis, humeris. Ad id uero quod tractatur, ultra & prope, & sursum ac deorsum, et hac aut illac, aut in medio. Ultra quidẽ & prope termini sunt cubitorũ gibbi, ita ut in anteriore partẽ nõ excedãt genua, in posteriore costas. Sursum uero, ut nõ supra mammãs, summas manus habeat. Deorsum, ut nõ inferius q̃ ut ubi pectus ad genua habet, summas manus angulãres ad brachia figuret, et in medio quidẽ hoc modo se habet. Hac uero aut illac, ut nõ extra sedẽ: sed pro ratiõe cõuersionis & corpus, & operantẽ corporis partẽ producat. Si uero stet, utriusq; pedibus ex equo insistere satis est. Agere utro oportet ita ut altero pede inscẽdat, nõ eo qui est ad manũ agẽtem, genu ad inguẽ sublato, uelut in sede, sed & alij termini ijdẽ sunt. At qui tractatur, reliqua corporis parte tractãti inserviat, aut stãs, aut sedẽs, aut decubẽs, quo q̃ facillime ita uelut figurã habẽs perseueret, seruãs subfluxionẽ, subsidẽtiã, euerсионẽ, decliuitatẽ. Sic quæ debet seruiatur & figura, & forma eius qui tractatur, in exhibitione, in tractatione, in habitu postea sequẽte. Vngues neq; præminere oportet, neq; deficere. Digitorũ uertices ad usum exercere, digitis quĩdem summis pleraq; indice ad magnũ admoto. Tota uero manu prona, ambabus aut aduersis. Digitiũ extẽdere cogit magnũ quiddã in medio digitorũ positũ, & oppositũ facere magnũ digitũ indici. Morbum aut esse manifestũ est, per quẽ etiam lædũtur hi quibus ex natiuitate, & educatione, asueuit magnus digitus ab alijs cõtineri. Opera omnia exercere oportet utrisq; seorsim agẽdo, & ambabus simul. Similes enim sunt: ambabus cõiectando bene, pulchre, cito, non laboriose, concinne, expedite. Instrumẽta quĩdem, & quãdo, & qualiter dicitur. Vbi oportet, ut ne quid impediatur opus, neq; impedimẽto sit inter accipiendũ circa operantẽ corporis partẽ, Si uero alius det, paulo prius paratus sit, & faciat

ciat ubi iusseris. Qui uero circa ægrotantē sunt, id quod tractatur exhibeant prout uisum fuerit. Reliquū autem corpus detineant, ut totum quiescat, tacentes, & præfecto obediētes. Deligationis species duæ sunt, quæ facta est, & quæ adhuc fit. Quæ adhuc fit, cito, nō laboriose, expedite, cōcinna. Cito quidem, perficiendo opera. Non laboriose, facile agēdo. Expeditio uero ad omnia parata est. Concinnitas aut iucunda aspectu est. Ex quibus uero exercitationibus hæc contingant, dictum est. Quæ facta est, bene, pulchre. Pulchre quidem, simpliciter, distincte: aut similia ac æqualia, æqualiter ac similiter: aut inæqualia ac dissimilia, inæqualiter ac dissimiliter. Species uero hæ sunt, simplex, rotunda in orbē, ascia, sima, oculus, rhombus, & semisecta: ita ut species cōgrua sit speciei & affectioni eius quod deligatur. Eius uero quod bene deligatur, duæ sunt species, roboris quidem, aut compressione, aut copia linteolorum, & partim quidem ipsa deligatio sanat, partim curantibus inseruit. Ad hæc igitur lex hæc est. In his autē maxima deligationis uis est. Compressio quidem, ut incūbentia non abscedant, neq; penitus innitantur: sed sint quidē firmata, non autē coacta: & minus quidē extrema, minime uero media. Nexus & filum procedant non deorsum, sed sursum, in exhibitione, & præparatione, & deligatione, & habitu postea sequente. Initia non super ulcus iniungere oportet, sed hinc aut illinc facere nexum. Nexum uero neq; in semita, neq; in opere, neq; illic ubi inane est, ut ne in uanum iaceat. Nexum aut & filum, mollia nō magna. Hoc tamen probe nosse cōuenit, qd omnis deligatio ad decliua et acuminata fugit, uelut in capite, ad partē supernam: in tibia, ad infernā. Deligare oportet dexterās partes, in sinistras: & sinistras, in dexterās: excepto capite. Hoc uero secundū rectitudinē. Verū cōtraria ex duobus initijs. Si uero ex uno, ad id quod simile est, ad subtilitatē: uelut est media pars capitis, & si quid aliud huiusmodi. Quæ uero mouētur, uelut articuli, qua quidē parte inflectuntur, q̄ minimis ac expeditissimis linteis obuoluere oportet, uelut poplitē: qua uero circūtenduntur, expansis ac latis, uelut est patella. Circūdare quoq; insuper oportet, comprehensionis quidē gratia eorū quæ circa hæc sunt, appēssionis uero uniuersi deligamētī, in quiescētibus & depressiorib. corporis partibus, qualis est et supra, et infra genu. Cōuenit aut in humero quidē, circūductio circū alteram alam: In inguine uero, circū alterā lateris mollitudinē: in tibia, supra suram. & quibuscūq; sursum cōtingit fuga, his inferne appēssio cōuenit: quibus aut deorsum, uice uersa. Quibus uero nō est, uelut in capite, his in equalissima parte cōprehensiones facere oportet, & minime obliquo deligamēto uti. Nam stabilissimū postremū circumdatū, uel maxime uagabūda continet. Quibuscūq; autem neq; comprehensio, neq; appēssio linteorum, cōmode se habet: his per fila appēssiones facere cōuenit, ex iniiectione, aut cōsutione. Deligamēta sint pura, leuia, mollia, tenuia. Obuoluere uero oportet ambabus simul, aut utrisq; seorsim exercere. Conueniente autem deligatione uti, cōiectura ad latitudinē ac crassitudinem partium facta. Obuolutionis capita dura, æqualia, distincta sint. In quibus autem futurum est ut decidant, ea peiora sunt, q̄ si cito decidant. Quædam uero sunt eiusmodi, ut neq; cōprimere, neq; decidere oporteat. Quæ uero spectat deligatio, aut subligatio, aut ambo, hæc sunt. Subligatio quidem in caula est, ut aut disparata attrahantur, aut expansa contrahantur, aut contracta di-

ducantur, aut distorta dirigantur, aut uice uersa. Preparare autem oportet lintea leuia, tenuia, mollia, pura, lata, non consuta, neque extuberantia habentia, & sana, ut extensionem ferant, & paulo praestantiora, non sicca, sed succo imbuta singulis affectionibus familiaria: ad ea quidem quae disparata abscesserunt, ita ut sublimia sedem quidem contingant, non tamen comprimant. Initium autem sumere oportet ex sana parte, & ad ulcus desinere, quo id quidem quod subest excoletur, aliud autem non amplius colligatur. Deligare autem oportet recta quidem, in rectum: obliqua uero, oblique: in figura doloris exorte, in qua neque restrictio, neque discessio contingat: ex qua ubi translatio fit ad appensionem, aut positionem, non transmutent, sed similia habeant haec, musculos, uenas, nervos, ossa, & bene posita, & bene detenta. Appensa uero aut posita esse conuenit, in figura doloris exorte, quae est secundum naturam. In quibus uero discesserint, uice uersa. At quibus expassa sunt, contrahere oportet, quod ad alia quidem attinet eodem modo: ex multo uero temporis spatio interposito contractionem facere oportet, & sensim progressu facto compressionem, primum minime, deinde magis, ita ut terminus quod maxime facta sit, mutuus contactus fiat. Quibus uero contracta sunt, diducere: cum inflammatione quidem uice uersa: sine hac autem, preparatione quidem eiusmodi, deligatione uero contraria. Distorta uero dirigere oportet, quod ad alia quidem attinet, eodem modo, Verum quae quidem abierunt, ea reducere oportet, subligatione, agglutinatione, appensione. Contraria uero contrario modo.

Spleniorum longitudes, latitudes, crassitudes, multitudines. Longitudo, quanta est deligatio. Latitudo, quatuor aut trium digitorum, crassitudo, ut triplices aut quadruplices sint. Multitudo, ut dum circumdantur non excedant, neque deficiant. Quibus uero ad directionem, in longitudinem circumdando, latitudinem ac crassitudinem defectu coniectare oportet, ita ut non aceruatim expleamus. At uero linteorum subligationes duae sunt, prima ex loco laeso ad supernas partes desinit: altera ex loco laeso, ad infernas. Iuxta locum affectum maxime comprimere oportet: Minime extremas partes: Reliqua uero pro ratione. Deligatio autem multam sani loci partem occupet. Deligamentorum multitudo, longitudo, latitudo. Multitudo quidem, ut ne superetur a loco laeso, neque per ferulas illisio fiat, neque podus, neque circūcirca inclinatio, neque effeminatio deligamenti contingat. Longitudo uero & latitudo, triū aut quatuor, aut quinque aut sex, cubitorum quidem longitudo, digitorum autem latitudo. Et affulcimenti circumductiones tot sint, ut ne comprimant. Mollia uero & non crassa sint haec omnia, pro longitudine, et latitudine, ac crassitudine partis affectae. Ferulae porro sint leues, aequales, iuxta extremitates simae, hinc atque illinc paulo minores deligatione, crassissimae autem ea parte qua extat fractura. Quaecumque uero partes incuruae sunt & excarnes, in his quae praeminet cauendae sunt, uelut circa digitos & malleolos, aut positione, aut breuitate. Affulcimenti autem fulcire ac firmare oportet, non comprimere primum. Ceratum molle, & leue, & purum sit. In aqua spectatur caliditas, multitudo. Caliditas, ut supra suam ipsius manū medicus affundat. Multitudo, ad laxandum quidem & attenuandum, plurima optima est. Verum ad incarnandum ac molliendum, moderata. Moderatio autem in perfusione ea est, quod dum adhuc attollitur pars, priusquam concidat desistere oportet. Primum enim attollitur, Postea uero

uero attenuatur. Positio sit mollis, æqualis, sursum uergens, in eminentibus corporis partibus, uelut calcaneo, & coxa, ut neq̃ refrangatur, neq̃ euertatur. Canalem toti potius cruri q̃ dimidio adhibere oportet. Ad affectionem tamen respicere oportet: & reliqua quæ lædere solēt manifesta sunt. Exhibitio uero, & distentio, & restitutio, & reliqua secundū naturā fiant. Natura in operibus est. operis actione quid illa uelit coniectandū est. Ad hæc autē ex quiescente, ex cōmuni, ex cōsuetudine. Ex quiescētē quidem ac remisso, rectitudines cōsiderare oportet, uelut in manus figurā. Ex cōmuni uero, extēsiōnē & inflexiōnē, ueluti figura cubiti ad brachiū, quæ prope ad angularē accedit. Ex cōsuetudinē, quod non alias figuras magis ferre possunt, uelut crura extēsiōnē. In hac enim figura plurimum tēpus facillimē durarint, nulla facta immutationē. In immutatione uero ex distēsiōne, similia hæc habēt, ad habitū aut positionē, musculos, uenas, nervos, ossa, & bene posita, & bene detenta.

Distentio sit maxime circa maxima, & crassissima, ac æqualia, & ubi ambō ossa læsa sunt. Secūdo loco ubi subiectū, minime ubi supernū. Si uero magis moderato fiat, detrimentū affert: pueris exceptis. Oportet autē ipsa paululū accliuia habere. Directionis exemplum, æquiucū, coniugatum, simile, sanum. Defricatio potest soluere, ligare, incarnare, minuere. Dura, ligare. Mollis, soluere. Multa, minuere. Moderata, crassefacere.

Deligare uero oportet, primū ut is qui deligatur dicat, maxime se cōpressum esse circa læsam partē, minime circa extremas: & firmatum se esse, non cōpressum, copia linteorū, non robore: & hac die ac nocte paulo magis, postridie minus, tertia laxē. Reperiatur autē postridie in extremis partibus tumor mollis. Tertia uero die deligatū solutū gracilius sit, atq̃ hoc per omnes deligationes. Secunda uero deligationē an iuste deligatū apparuerit discere oportet. Hinc autē magis & pluribus cōprimatur. Tertia adhuc magis, itemq̃ pluribus. Septima uero à prima deligationē soluta, inueniāntur gracilia ossa ac depressa. At uero in ferulas deligata, si gracilia & pruritus exortia, & sine ulcere fuerint, sinere oportet usq̃ ad dies uiginti à læsione. Si uero quid suspectum sit, soluere in medio tēpore, & ferulas tertio quoq̃ diē firmare. Appensio, positio, deligatio, ut in eodē statu sint custodire oportet.

Figurarū summa hæc est, cōsuetudines, naturæ singulorū membrorum, species ex currendo, ambulando, stando, decubendo, ex opere, ex remittēdo. Nam usus corroborat, ocīū autem colliquat. Aut cōpressiōne, aut copia linteorū. Quæcūq̃ uero effuso sanguine fugillationēs, aut cōtusiōnēs, aut uulsiōnes, aut tumiores inflamationis exortes, ex uulnere oboriūtur, ad supernam partē plurimū, ad infernam etiam parum deligare oportet, ita ut manū aut crus nō habeat in decliue, & initū supra uulnus ponat, ac maxime firmet, minime extremas partes, medio modo medias, ultimā partem ad supernas corporis partes distribuendo, deligatione, compressiōne. Sed & hæc, copia magis q̃ robore. Maxime autē his lintea tenuia, leuia, mollia, pura, lata, sana debētur, utpote sine ferulis: & uberiore perfusiōne uti oportet.

At uero elapsiones aut luxationēs, aut tortiones, aut distantiæ disparatæ, aut auulsiōnes, aut abruptiones, aut distorcionēs, ueluti mutilationes ad alterā partē uergentes, undē quidē excesserunt, remittendo deligare oportet: quō uero excesserūt, intēdēdo deligamentū, ut ad cōtraria uergant deligata, etiā priusquā fuerint deligata, paulo magis q̃ ut ex æquo sint, & deli-

gamētis, & splenijs, & appēſionibus, & figuris, extēſione, defricōne, directio-
ne: & hic etiā uberiore perfuſione. Cæterū imminutiones multā ſanā partē oc-
cupando deligare oportet, ut ex influxione, qua colliquata plus q̄ ſua ſpōte im-
minuta ſunt, alia deligatione permutata, ad augmentū declinēt, & carniū effor-
mationē faciāt. Melius autē eſt ut & ſuperna pars ſimul deligetur, uelut tibiæ &
femorū, & alterū crus cum ſano crure, quo ſimilius ſit, & ſimiliter quieſcat, &
ſimiliter alimentū excludant, & ſuſcipiant. Linteorū uero copia, non com-
preſſione utendū eſt, remittendo primū id quod maxime opus habet, & utene-
do defricōne incarnante, & perfuſione abſq̄ ferulis. Fulcimenta porrō ac
ſtabilimenta adhibere oportet, ueluti pectori, coſtis, capiti, & alijs quæ eiufmo-
di ſunt: partim pulſuum gratia, ut ne cōcutiantur: partim etiā diſtantiarū diſpa-
ratarū gratia, circa iuncturas in oſſibus capitis, quo firmētur. Et in tuſſibus, aut
ſternutationibus, aut alio motu, qualia fiūt circa thoracē & caput ſtabilimenta.
Horū omnium eadē ſunt deligationis cōmoderationes. Qua enim parte læ-
ſiones ſunt, maxime cōprimendū eſt. Supponere igitur oportet lanam mol-
lem, affectioni cōuenientem: deligare uero nō amplius cōprimendo, ut ne pul-
ſus cōcutiantur: neq̄ amplius q̄ ut diſtātiū iuncturarū extremitates mutuo
ſe cōtingant. Neq̄ ut tuſſes & ſternutationes ſiant, ſed ut prohibeantur, ſtabili-
mentum adhibeatur, quo neq̄ cogatur quid, neq̄ concutiat.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE FRACTVRIS, IANO CORNARIO

Medico Phyſico interprete.



PORTET medicum & luxationū, & fracturarū extēſiones
q̄ directiſſimas facere. Hæc enim iuſtiſſima natura eſt. Si ue-
ro quid uel hac, uel illac inclinari, ad pronā partem uergere
cōuenit. Minus enim hoc peccatū eſt q̄ ad ſupinā. Qui igitur
nihil præmeditati ſunt, plerunq̄ nihil peccant. Ipſe enim
qui deligatur manum porrigit, ut qui ita à iuſta natura cogatur.
Qui uero ſapientes ſibi uidētur medici, hi ſunt nimirum
qui peccāt. Studiū igitur nō multi eſt manū fractam tractare, & quilibet ut ita di-
cam, medicus hoc poteſt. Verū cogor plura de hoc ſcribere, q̄ ſciam medicos
eſſe, qui ſibi ſapiētes eſſe uidētur ex figuris manus in deligatione, ex quibus ip-
ſos indoctos eſſe putare oportebat. Sed enim multa in hac arte hoc modo iudi-
cantur. Quod enim peregrinū eſt, quū nondū intellexerint an bonū ſit, magis
laudant q̄ familiare, quod iam bonū eſſe ſciūt: & alienū magis laudant q̄ pro-
be notū. Dicendū igitur, quænam medicorū peccata de natura manus, tū de
docere, tum docere uelim. Nam & aliorū corporis oſſiū doctrinā hic ſermo aſe-
fert. Manū itaq̄, de qua nobis ſermo eſt, quidā pronam deligandā dedit, ille ue-
ro cogeſcit ſic tenere uelut ſagittātes, quū humerum injiciunt, atq̄ ita habēt
deligabat: hoc ipſum illi ſecundū naturā eſſe exiſtimās. & in testimoniū adduce-
bat, tū omnia cubiti oſſa, quod directionē inter ſe haberēt: tum coloris concor-
diam, quod ipſa per ſeipſam rectitudinē haberet, idq̄ hoc modo & externa &
interna parte. Hoc modo etiā dicebat & carnes, & neruos, à naturā productos
eſſe

esse, & artē sagittandi in testimoniū citabat. & hæc dicēs ac faciens, sapiens esse sibi uidebatur. Verū aliarum artium oblitus erat, & eorū quæ robore, et eorū quæ artificijs operatur ac efficiunt; nō animaduertens aliam in alio figurā secundum naturā esse, & in eodē opere alias dextræ manus figuras secundū naturā esse, alias sinistræ, si ita cōtingat. Alia enim figura in iaculatione secundū naturā est, alia in fundæ iactu, alia in lapidis iactu, alia in pugilatu, alia in quiescēdo. Quot uero artes inuenire quis possit, in quibus non eadē figurā manū naturalis est: & in unaquaq; arte, aliter ad instrumentū quod quisq; habet, & ad opus quod perficere uult, manus figuratur. Ei uero qui sagittādī artem exercet, hanc figurā alterius manus optimā esse, cōsentaneū est. Cardiniformis enim brachij pars, in cubiti sede in hac figura innitēs, osibus cubiti & brachij rectitudinē facit, ueluti totū unū esset. & refractio articuli fracta est in hac figura. Verisimile est igitur hoc modo minime flexibilem & rigidissimū esse hunc locū, & nō superari, neq; remittere, dum à dextra manu neruus trahitur. & sic neruū quidem q̄ plurimū trahet, à firmissimo uero ac cōfertissimo emitteret. Ex talibus enim sagittarū emissionibus, celeres & uehēmētiae, et lōginitates fiunt. Deligationi uero cū arte sagittādī nihil cōmune est. Nam & ubi deligauit, si manū ita habiturus esset, multos utiq; dolores maiores uulnere adderet: & si flectere iuberet, neq; ossa, neq; neruū, neq; carnes in eodē permanerent, sed superata deligatione aliō transferrētur. Et quæ tandē est figurę sagittarij utilitas? Et in hac parte fortasse nō peccaret is qui sibi sapiēs esse uidetur, si ipsum uulneratū sibi manū exhibere permitteret. Alius porro medicus supinā manum præbēs ita extendere iubebat, atq; hoc modo habentē deligabat, hanc figurā naturalem esse putans, cōiectura ex colore facta: & ossa hoc modo secundum naturā esse existimans, eo q̄ os eminens circa manus iuncturā, ubi paruus digitus est, è directo esse apparet eius ossis, ex quo ulnā homines metiūtur. & hæc testimonia adducebat, quod secundum naturā hoc modo figura se haberet. & recte dicere putabatur. At uero si quidē manū supinā extēdatur, uehēmēter utiq; doluerit. Cognoscere autē poterit hoc quisq; sua manu ita extēta, q̄ dolorosa est hæc figura. Nam & debilior uir, fortiorē ita manibus suis comprehensum, ut cubiti flexura supina frāgitur, quocūq; uoluerit duxerit. Neq; enim si gladiū in hac manu habeat, eo uti poterit, adeo uiolēta hæc figura est. Deindē si ubi deligauit quis, in hac figura sinat, maior quidē dolor ubi obambularit, magnus autē etiā ubi decubuerit, sentietur. Quin & flectere manū si opus fuerit, omnino necesse est & musculos & ossa aliam figurā habere. Sed & citra reliquā perniciem, in hac figura hæc ignorabat. Os enim circa iuncturā manus eminēs, iuxta paruū digitū, hoc quidem cubiti est. Quod uero in flexura est, à quo ulnā homines metiūtur, id brachij caput est. Ille uero idē os esse, & hoc & illud putabat: itēq; multi alij. Est autē idem cū illo, is qui cubitus siue cubiti gibbus uocatur, in quē innitimur. Si quis igitur ita supinam manum habeat, tunc & os distortū apparet, & nerui à manus iunctura tendentes, ex internā parte & de digitis, distorti fiunt. Tendūt enim hi nerui ad os brachij, unde ulna mēsuratur. Tanta sanē ac talia sunt peccata, & ignoratiæ naturæ manus. Si uero uelut ego iubeo, manū fractam quis extendat, os quidem quod est circa paruū digitum, ad cubiti flexurā tendens, in directum cōuerteret, rectitudinem uero habebūt nerui à manus iunctura ad brachij summas partes

tendentes; & manus dum appensa excipitur, in cōsimili figura erit, in quali etiā erat dum deligaretur, ita ut neq; ambulanti, neq; decūbenti, ullus dolor aut fatigatio accedat. Desidere uero hominē ita oportet, ut ossis pars ad clarissimā pręsentē lucem cōstituatur, ne is qui extensionē tractat, circa sufficientē directionē fallatur. Nam periti artificis manū admotam, ne os quidē eminens in contactu latere poterit. Porro ex cubiti ossibus ubi nō ambo fracta sunt, facilius curatio est, si supernū os sauciātū est, etiamsi crassius id existat: partim quod sanū subtentū fundamenti loco ipsi est, partim quod facilius occultari potest, nisi iuxta manus iuncturā sauciari cōtigerit. Crassa enim est caro quę superne innascitur. Infernū uero os excarne est, & nō facile occultari potest, & uehemētiore extēsiōne opus habet. Si uero hoc contritū nō fuerit, sed alterū illud, uilius extēsiō sufficit. At si ambo fracta fuerint, fortissima extēsiōne opus habēt. In puero etenim uidi extēta magis q̄ oportebat, Verū pleriq; minus q̄ oportet extēduntur. Cōuenit autē facta extēsiōne, uolis admotis dirigere: deinde cerato illito nō ita multo, ut ne deligamēta circūfluitent, ita deligare, ut summā manum nō inferius cubiti flexura habeat, sed etiā paulo superius, ne ad summā partē sanguis influat, sed intercipiatur. Postea linteo deligare, initio eius supra fracturā iniecto, ita ut firmet quidem, nō tamen admodū premat. Postq; autē circūdedit eodē loco bis aut ter, ad supernā partem deligans distribuatur, quo sanguinis influxiones intercipiātur, & illic desinat. Cōuenit autē prima lintea nō esse longa. Secundorū uero linteorū initium supra fracturā injicere, ita ut semel circūdet eodem loco, deinde deorsum distribuatur, & minus premens, & magis traducēs, quo linteū ipsi sufficiens sit, ad recurrendū eo ubi alterū desinit. Hic igitur lintea ad sinistram, aut dextrā deligētur, aut ad utram partē contulerit ad fracturā figurā, et in utrā declinare expedierit. Postea uero splenia extēdere oportet modico cerato illita. Nam sic & mitius & stabilius se habent. Deinde sic linteis deligare alternatim, modo in dextrā, modo in sinistrā: & plerunq; inferne initio facto, sursum ducere: aliquādo etiā superne deorsum. Extremitates autē subaridas, & in acutū abeūtes, splenij obuolutis curare oportet, ita ut copia opertiorū non totū acruatim, sed particulatim corrigat. Insuper autē circa manus iuncturā siue articulū laxē circūdare splenia oportet aliās atq; aliās. Copia uero linteorum sufficiens primum, duę partes sunt. Signa autē bene curati, & terminus recte deligati, hæc sunt: si interrogaueris ipsum an cōpressus sit, & si cōpressum quidē se esse dixerit, sed leniter, & maxime circa ipsam fracturā. Huiusmodi ita facta esse perpetuo dicere oportet eū qui recte deligatur. Signa uero mediocritatis hæc sunt. Ea die ac nocte qua deligatus est, ipse sibi ipsi uideatur non minus, sed magis cōpressus esse. Postridie uero tumorē paruum, mollē, ad summā manum obortū esse. Mediocritatis enim factæ à te cōpressionis signū hoc est. Desinēte autē die minus cōpressus esse sibi uideatur. Tertia uero die deligamēta laxa esse ipsi uideantur. Et si quid horū iam relatorū defecerit, noscere oportet deligationē moderata laxiore esse. Si uero quid ex relatis abūdauerit, nosse oportet ultra modū cōpressum esse. Et ex his cōiectura facta, postea deligās aut laxabis, aut compri-mes magis. Resoluere autē oportet tertia die, ubi extēderis. Et si primū moderate deligasti, hanc deligationē paulo magis q̄ illam cōprimere oportet, & initia supra fracturā injicere, quemadmodū etiam antea, Si quidem enim hanc prius deliga

deligaueris, sanies ex hac ad extremitates hinc atq; illinc exhauritur. Si uero aliā quā aliam partem prius cōprefferis, in illam ex cōpressa exhauritur. Intelligētia aut ad multa utilis existit. Sic igitur semper incipere oportet & deligationē, & cōpreSSIONē ex hoc loco. Reliqua uero iuxta rationē, ita ut quāto lōgius à fractura digressus fueris, minus cōprimas, nunquā quidem laxa omnino circūdando, sed adhaerentia. Postea uero pluribus linteis deligare oportet in singulis deligationibus. Et si interrogetur, dicat se paulo magis cōpressum esse q̃ prius, & praesertim circa fracturā. Sed & alia, & circa tumorem, & circa dolorē, et circa allevationē, pro prioris deligationis ratione fiant. Postq̃ uero tertius iam aderit dies, laxiora esse ipsi uideātur deligamenta. Deinde resolvere oportet, & rursus paulo magis cōprimendo deligare, & hoc cū omnibus linteis quibus deligandus erat. Et postea omnia ea ipsum apprehendant, quae etiam in primis deligationū circuitibus contigerant. Vbi uero tertius aderit dies, & septimus à prima deligatione, si quidē recte deligatus fuerit, tumor in summa manu, atq; hic non ualde magnus erit: locus aut qui deligatur, in omnibus deligationibus tenuior ac gracilior cōperietur: Verum in septimo etiam ualde tenuis, & ossa fracta magis mouentur, & facilius ad correctionē ducuntur. Et si haec huiusmodi fuerint, facta coaptatione uelut ad ferulas adhibēdas deligare oportet, paulo magis cōprimendo q̃ antea, si non dolor aliquis maior fuerit ex tumore qui est in summa manu. Postquā autem linteis deligaueris, ferulas circumponere oportet, & uinculis q̃ laxissimis circūdare, quietis saltem gratia, ut ferularū appositio ad cōpreSSIONē manus nihil faciat. Postea uero & dolor, & alleuatio, eodem modo fiant, uelut in primis deligationū circuitibus. At uero ubi tertio die laxas esse dixerit, tunc postea ferulas firmare oportet, maxime quidem circa fracturam, sed & alia iuxta rationem, si quidem et deligatio magis laxa fuerit, q̃ cōprimat. Crassissimam autem ferulam esse oportet, qua parte extat fractura, non tamen multū. Et ad hoc studium uel maxime adhibēdum est, ut ferula è directo magni digiti non ponatur, sed hac uel illac: immo neq; à directo parui digiti, qua parte os supereminet in manus articulo, sed hac uel illac. Quod si ad fracturam conferat, hac parte aliquas ferulas poni, breuiores ipsas alijs esse oportet, ut ne perueniant ad ossa praëminentia, iuxta manus articulū. Periculum est enim ulcerationis, & denudationis neruorū. Oportet aut tertio quoq; die ferulis ualde leniter firmare, hoc cogitātes, q̃ ferulae deligationis cōseruandae gratia apponuntur, nō autem cōpreSSIONis gratia alligantur. Si quidē igitur probe noueris, quod in prioribus deligationibus ossa sufficiēter sunt directa, & neq; pruritus infestēt, neq; ulla aliqua ulceratio suspecta sit: ita cū ferulis deligatum finire oportet, donec uiginti dies transgressus fuerit. In triginta enim diebus uniuersis maxime ex toto cubiti ossa corroborantur. Certum tamē nihil est. Nam & natura à natura, & aetas ab aetate ualde differt. Postquam autē solueris, aquam calidā affundere oportet, & postea deligare, paulo minus cōprimendo q̃ antea, & paucioribus linteis q̃ prius. Et postea tertio quoq; die soluere, ac rursus deligare, ita ut minus cōprimas, & paucioribus linteis utaris. At uero si ubi ferulis deligatus est, ossa nō recte posita esse suspiceris, aut aliud quid uulneratum uexet, in dimidio tēporis spatio, aut paulo prius soluere, & rursus deligare oportet. Victus porro his quibus ab initio ulcera non facta fuerint, neq; ossa extra eminent, sufficit

aliquāto simplicior. Verū parciore uictu utendū est ipsis, usq; ad diē decimū, ut qui iam etiā quiescant: & obsonijs tenellis utendū, quæ trāsitus mediocritatem exhibent. A uino uero & carnis esu abstinendū. Postea tamē sensim progressu factō reficiēdi sunt. Hic sermo uelut lex iusta posita est de fracturārū curatione, & quomodo tractare oporteat, & quomodo euētus sequi, ex iusta tractatione. Quicquid uero nō ita euentū habuerit, scire oportet, q̄ in tractatione quid defectuose, aut redūdāter factum est. Quin & hæc insuper in hoc simplici modo cōsiderare oportet, quæ nō ita ualde curare solent medici, et quidē quū omnem curationē, & totam deligationē corrūpere possint, si nō recte fiant. Si enim ambo ossa fracta fuerint, aut infernū solū: is uero qui deligatus est, in fasciā quadā manū exceptā ac appensam habeat, & plurima fasciæ pars circa fracturā existit, ita ut manus hinc atq; hinc pendeat: hūc necesse est reperiri os ad supernā partem distortū habentē. Si uero sic fractis ossibus, & summā manum in fasciā habet, & partē iuxta cubiti flexuram: reliqua uero cubiti pars nō sit eleuata: hic ad infernā partē os distortū habere cōperietur. Proinde in fasciā molli latitudinē habente maximā cubiti partē, & manus articulū, æqualiter suspēdere ac eleuata gestare oportet. At uero si brachiū fractū fuerit, si quidē quis extētā manū in hac figura extēdat, musculus brachij extensus deligabitur. Postq̄ autē deligatus cubiti flexurā inflexerit, musculus brachij aliā figuram habebit. Iustissima igitur brachij extensio hæc est. Lignū cubitale aut paulo breuius, qualia sunt ligna quæ in foramina lignonū immittuntur, suspēdere oportet, hinc atq; illinc catena deligatū. Hominem uero in alta quāpiam sede collocatū, ita manu superin cubere oportet, ut lignū id sub ala sit moderate habēs, ut homo uix sedere possit, & ferē subleuatus sit, supposito postea alio quopiā fulcimēto, et coriaceo puluino uno aut pluribus subiectis, quo moderatā altitudinē habeat cubitus, ad rectū angulū obliquatus. optimū quidē est coriū latū ac molle, aut fasciā latā circū dare, & magnū aliquod pōdus appendere, quod moderate intēdere possit. Siminus, uir aliquis robustus in hac figura cubiti, circa cubiti flexurā deorsum cogat. At uero medicus erectus stans, & alterū pedem in altiore quopiā habēs, agressionē faciat, ita ut uolis os dirigat ac cōponat: facile autē dirigetur. Nā hæc extensio bona est, si quis ipsam recte præparet. Deinde deliget fasciarū principijs supra fracturā iniectis: & reliqua omnia, quemadmodū prius monuimus, tractet: & easdē interrogationes faciat: & iisdem signis utatur, an moderate habeat, aut secus. Et per tertiū diem deliget, & magis cōprimat. Et septima aut nona die cū ferulis deliget. Et si suspicionē habeat, os nō bene positū esse, intermedio tēpore soluat, & ubi probe collocauit, rursus deliget. Corroboratur autē maxime os brachij in xl. diebus. Postq̄ uero hos excesserit, soluere oportet, & minus cōprimere, & paucioribus quoq; linteis deligare. Ceterū uictū quendā exquisitiore q̄ prius cōstituere oportet, & ad lōgius tēpus. Eius uero cōiecturam facere oportet, ad tumoris qui in summa manu est robur respiciēdo. Insuper autē & ad hæc animū aduertere oportet: q̄ brachiū à natura ad externā partē incuruatū est, & distorti solet, si nō bene curetur. Sed & alia omnia ossa, quæ à natura ad hanc partē distorta sunt, etiā dum curātur ubi fracta sunt, distorti solet. Vbi igitur tale quippiā in suspicionē uenerit, lata insuper fasciā brachiū circū circa cōplecti oportet, & circū pectus deligare: et ubi quiescere uolet, inter cubiti

biti flexurā et costas, spleniū quoddā multiplex cōuolutū ac cōplicatum supponere: aut aliud quid quod huic simile existat. Hoc enim modo incuruatio ossis recta euadet. Cauere tamē oportet, ut ne minus ad internā partē uergat. Pes uero hominis ex multis ac paruis ossib. cōpositus est, quemadmodū etiā summa manus. Frāgūtur quidē nō ita ualde hæc ossa, si nō unā cū corpore, ab acuto aliquo aut graui uulnerato. Vulnerata igitur quomodo curare oporteat, in ulcerationū parte refertur. Si uero quid ē loco suo motū fuerit, aut digitorū articulus, aut aliud quoddā ex ossibus summi pedis, unūquodq; in suū locū cogere oportet, quēadmodū & ea quę in manu sunt. Curare uero oportet cerato, et splenijs, & linteis uelut etiā fracturas, exceptis ferulis, eodē modo cōprimēdo, & per tertium diē deligando. Interrogetur itē is qui deligatur similiter, uelut in fracturis, et de cōpressionē facta, & an laxa sit deligatio. At uero sana fiūt in xx. diebus perfecte omnia, exceptis his quę cū tibiæ ossibus cōmunionem habēt, & cū ipsa ē directo. Cōducit autē hoc tēpore decūbere. At nō tolerant contēnentes morbū. Verū priusq; sani fiāt obambulant: & propterea plurimi nō perfecte sanantur, sed dolor ipsos sæpe merito cōmonefacit. Totū enim corporis pōdus pedes uel hunt. Quū igitur nondū sani iter faciūt, articuli moti male curātur, ideoq; aliās atq; aliās hi qui ad tibiā sunt dolent. Quæ uero cū tibiæ ossibus cōmunionē habēt, & maiora alijs sunt, et ubi hæc mota sunt, diuturniorē medelā requirūt. Curatio tamē eadē est. Verū linteis & splenijs pluribus uti oportet: Et in totum hinc atq; illinc deligare, cōprimere itē uelut alia omnia, ea maxime parte qua ea mota sunt, & primas quoq; linteorū obuolutiones eodē modo facere. In unaquaq; uero resolutionē, multa calida aqua uti oportet. In omnibus enim circa articulos læsionibus, multa aqua calida affundēda est. Cæterū cōpressiones & laxationes in ijsdem tēporibus eadē signa ostendūt, quæ in superioribus: & relaxationes eodē fiant. Sani uero perfecte hi fiūt in xl. maxime diebus, si decūbere sustinuerint. Sin minus, eadem patiūtur quæ prius relata sunt, & adhuc amplius. Porro quicūq; saltu de alto quopiā loco factō, in calcaneum uehementē se fulciuerūt, his ossa quidem disparātur, uenulæ uero sanguinē effundunt, carne circa os cōtusa, tumor autē accedit, & dolor multus. Os enim hoc paruū nō est, & supereminet quidē sub tibiæ rectitudinē, cōmunionē uero habet cū uenis ac nervis principalib. Tēdo autē posterior huic ossi annectitur. Hos curare oportet cerato, & splenijs, & linteis, & aqua plurima calida, & linteis pluribus. Et ab his opus est etiā alijs q̃ optimis ac lenissimis. et si quidē mollis fuerit à natura cutis circū calcaneū, sic sinere oportet. Si uero crassa et dura ueluti quidā habēt, incidere oportet, æqualiter, & attenuare, ita tamē ut ne uulneretur. At uero talia bene deligare nō cuiusuis est. Si em̃ deliget quis, quomodo alia circa malleolos deligātur, ita ut aliquādo circū pedē, aliquādo circū tendinē, fascię circūdentur: hæc cōstrictiones calcaneū separāt: qua parte cōtusio facta est. Atq; ita periculū est, ne calcanei os corrūpatur: & sanē si corruptū fuerit per omne æuū morbus durare potest. Nā & alia quæ nō ex tali modo sunt, ipsum corrūpunt, sed in decubitu denigrato calcaneo, ex figuræ neglectu: aut in tibia uulnere fiēte periculoso, ac diuturno, & cōmunionem cū calcaneo habēte: aut in femore: aut ubi ex alio morbo diuturnus decubitus cōtingit. Attamē & talibus diuturnæ ac molestæ affectiones fiūt, & quæ sæpe refringātur, si nō bona diligētia, & multa quie

tē curentur. Quare etiā ea quæ ex tali modo corrumpuntur, supra aliquā læsionem, magna corpori pericula inducunt. Febres enim peracutæ oboriuntur, continuæ, tremulæ, singultuosæ, mētem contingentes, paucis diebus durantes ac occidentes. Fieri etiā possunt uenarū sanguifluarū liuores, uenarū nausæ, & cancerationes ex cōpressionē. Fieri autem possunt hæc absq; alia corruptione. Atq; hæc quidem relata sunt, ubi uehementissimæ contusiones fiunt. Plurima tamen leniter circūcirca contunduntur, neq; ullum magnū curationis studium exigunt, sed recte tamē tractare oportet. Quū uero uehēmens in fulciendo illisio facta esse uisa fuerit, tunc sanē relata facere cōuenit, & deligationē plurimam facere circū calcaneum obuolutam, ita ut aliquādo ad summas pedis partes, aliis quando ad medias, aliquando ad tibiæ partes, ex opposito lintea obuoluantur. Deligare insuper oportet & uicina omnia, hinc atq; illinc, uelut etiā prius dictum est, & uehementē cōpressionē non facere, sed cū multis linteis. Præstat autē & ueratrum bibendū dare eadem die, aut postridie: & tertiā diē resolvere ac rursus deligare. Signa porro an recrudescant, aut non, hæc sunt. Quum sanguis ē uenis effusus, & denigrationes, & his uicina, fiunt subrubra & subdura, periculum est ne recrudescāt. At si quidē febre careat, sursum purgans medicamentū dandum est, uelut dictū est: itemq; si nō continua febre laboret. Si uero cōtinua fuerit febris, medicamentū dandum nō est. Verum & à cibis, & à foribitionibus abstinendū. Potu uero utendū aqua, non uino, sed fauorum cremore decocto, aut aceto mulso dulci. Si uero nō recrudescēt, sanguis ē uenis effusus, & denigrationes, & uicinæ partes, cū uirore subpallidæ fient, & nō duræ. & bonum est hoc testimoniū in omnibus sugillatis, sanguine ē uenis subter cutē effuso, quod nō recrudescant. Quæcūq; uero cum duricia liuescūt, ea ut denigrescant periculum est. Caterū hoc studio habere oportet, ut pes plerūq; paulo altius reliquo corpore habeatur. Sanus autē fieri poterit in sexaginta diebus, si quieuerit. At uero tibia duo ossa sunt, quorum alterum altero hac parte multo tenuius est, illa uero partē nō multo tenuius. Cohærent autē inter se iuxta pedem, & appendicem cōmunem habent. Verū in rectitudine tibiæ non cohærent, iuxta femur autē cohærent, & appendicē habent, & appendix discriminationem. Lōgius uero paulo alterū os est, quod secundū paruum digitum est. Et talis quidē est natura ossiū in tibia. Luxantur autē aliquando iuxta pedē ambo ossa, quandoq; cū appendice, quādoq; uero appendix tantū emouetur, quandoq; alterū tantum os. Hæc autē minus molesta sunt, q̃ ea quæ in articulo manus existunt, si quiescere homines sustineant. Curatio uero consimilis est uelut illorū. Nā et repositionē ex extēsiōne, uelut in illis facere oportet. Verū uehementiore extēsiōne opus habēt, quāto fortius est ea parte corpus. Plerūq; tamē sufficiūt uiri duo, alter hīnc alter illīnc extēdentes. Si uero nō satis robusti fuerint, facile est uehementiorē extensionē facere. Aut em̃ rotæ modiolū, aut aliud quid huic simile defodere oportet, & molle quiddā pedi circū dare, et postea latis bubulis loris pede deligato, principia lororū aut ad pistillū, aut ad aliud lignū alligare, atq; ita ligno in summū modiolū indito refringere, ita ut alij cōtra extēdāt humeris et poplite apprehēsis. potest etiā superna corporis pars necessitate hac extensionis urgeri, partim quidē si ita uoles, ligno rotūdo leuigato alte defosso, partem quandā ipsius supereminētem intra crura iuxta ani & scorti intercapedinem

dinem applicato, quo corpus sequi prohibeat ad eos qui à pedibus extendunt. Deinde ad crus quod extēditur declinare nō oportet, sed aliquē à latere asidere, qui nates retrudat, ne corpus circūtrahatur: partim uero si etiā circa alashinc atq; illinc ligna affigantur, manus autē extentæ seruentur, apprehendat autē quis circa genu, atq; ita contrā extendat: partim itē si quis uelit, alijs loris circa genu aut circa femur deligatis, & alio rotæ modiolō supra caput defosso, & loris ex ligno quopiā alligatis, & ligno ita in rotæ modiolū defixo, ad cōtrariam partem hijs qui à pedibus extēdunt, adtrahere potest. Quin & si uoles, pro rotarum modiolis trabem mediocrē sub lectum extēdes, deinde ad trabis hinc atq; illinc caput ligna fulciens ac refringens, lora ipsis alligata intēdes. Si uero & hoc uelis, asellis hinc atq; illinc cōstitutis, in ipsis extensionē facies. Sunt autē & alij multi extensionū modi. Optimū autē fuerit, si quis in magna ciuitate medicū agit, ut lignū habeat præparatum, in quo omnes necessitates insint, tum ad omnes fracturas, tum ad omnes articulorū repositiones, ex extēctione, ac uectium usu. Satis autē est si lignū fuerit & longitudine, & latitudine, & crassitudine tale, quales colūnæ quernæ quadragulæ fiunt. Postq̃ autē sufficienter extēderis, facile iam est articulū reponere. Eleuatur enim in directū supra pristinam sedem. Dirigere itaq; manū uolis oportet, ita ut his partim in id quod eluxatum eminet innitaris, partim ab altera parte infra malleolū renitaris. Vbi uero reposueris, si quidē fieri poterit, extēntū ita deligabis. Si uero præ loris impediaris, his exolutis distentionē facias, donec deligaueris. Deligare autē eodē modo oportet, & fasciarum initijs similiter in id quod luxatū eminet iniectis, & primis obuolutiōibus plurimis supra id factis, imō etiā splenjs plurimis supra id impositis, et cōpressionē maxime isthic fiēte. Sed & hinc atq; illinc multū insuper deligare oportet. Magis autē hic articulus cōpressionē opus habet, in prima deligatione, q̃ is qui in manu est. Postq̃ autē deligaueris, sublimius reliquo corpore deligatā partem habeat. Positum autē ipsius ita facere oportet, quo q̃ minime pes depēdeat. At uero attenuationē corporis ita facere oportet, prout talem uel talem uim ipsa luxatio habet. Aliqua enim parū, aliqua multū luxantur. In totū uero magis & lōgiore tempore, in uulneribus circa crura, q̃ his quæ circa manus fiunt, attenuare oportet. Nam & maiora & crassiora hæc quam illa sunt: & sanè etiam necessarium est quiescere corpus ac decūbere. Verū postea deligare articulum tertia die, neq; prohibet quicquam, neq; urget. & alia omnia similiter uelut superius relata curare oportet. Et si quidē quiete decumbet, sufficient quadraginta dies, si solum in suum locum ossa rursus desederint. Si uero quiescere nolet, non facile quidem crure uti poterit, & deligatione ad multum tempus uti cogetur. Quæcunq; uero ossa nō perfecte desident in suum locū, sed aliquid deficit, progressu temporis attenuatur coxa, & femur, & tibia. Et si quidem intro luxata fuerint, externa pars attenuatur. Si uero extra, interna. Plurima autem ad internam partem luxantur. Postquam uero ambo tibiæ ossa fracta fuerint, citra exulcerationem, extensione uehementiore opus habent. Extendere autem oportet quibusdam modis ex prædictis, si magnæ emotiones fuerint. Sufficiunt etiam à uiris fientes extensiones. Plerunq; enim suffecerint duo uiri robusti, alter hinc, alter illinc distēdentes. Intendere autē oportet in directum, secundum naturam, & secundū rectitudinem tibiæ ac femoris, siue tibiæ fractæ, siue

siue femoris ossa extēderis. Sed & deligare sic oportet utrisq; extentis, utrū tandem horū deligaueris. Nō enim eadem cruri & manui cōferunt. Nam ubi cubiti & brachij ossa fracta fuerint deligata, manus appēsa excipitur. At si extēta deligaueris, figuræ carniū alterantur inter flectendū in cubiti flexura. Fieri enim nō potest, ut cubiti flexura ad multū tempus maneat extēta. Non enim sæpe in hac figura, sed in flexione esse cōsueuit. Quin & quū homines obābulare possint, ubi circa manum sauciati fuerint, opus habēt flexione in cubiti flexura. At crus quū & in ambulādo, & in stando cōsueuerit, aliquādo quidē extētū esse, aliquādo uero ferē extētū esse, ad infērā partem secūdam naturā: & sanē etiā ad hoc ut reliquū corpus uehat: propterea facile est ipsi extētum esse, ubi eius necessitatē habuerit. Quin & in cubilibus sæpe in hac figura est, ut uidelicet sit extētū. Postquam aut uulneratū fuerit, necessitas animi propositū in seruitutem adigit. Impotētes enim sūt ad se attollendū, adeo ut ne meminerint quidē, ut inflectant ac exurgāt: sed quiescūt in hac figura decūbentes. Propter has igitur causas, neq; extēnsionis, neq; deligationis figura eadem, manui & cruri cōducit. Si quidē igitur suffecerit extētio quæ per uiros sit, nihil aliud laboris frustra insumere oportet. Imperitiā enim arguit, machinas adhibere ubi ipsis nō est opus. Si uero nō sufficiens fuerit extētio per uiros, etiā ex alijs necessarijs quædā adhibere oportet, si quæ cōmoda fuerint. Quū aut satis iam extēta fuerint, facile est dirigere ossa, & ad naturā reducere, manuum uolis ac palmis corrigēdo ac coaptādo. Vbi uero direxeris, linteis deligare extēta, siue ad dextrā partē, siue ad sinistrā, circūducere prima lintea conducatur. Initia aut ipsorū supra fracturam iniiciātur, & circū hanc primæ quoq; obuolutiones circūducantur, deinde deligando sursum ad tibiam distribuātur, uelut in fracturis dictū est. Ceterū lintea latiora esse oportet, & lōgiora, eaq; multo plura circa crus q̃ in manu. Vbi uero deligaueris, super planū quoddam & molle deponere cōuenit, ut neq; hac, neq; illac distorqueatur: neq; repandum, neq; gibbum fiat. Maxime aut cōfert puluinar, aut lineū, aut laneum, nō durum, laxū, per medium secūdū longitudinem subiectū, aut aliud quid quod huic simile existit. Nam de canalibus qui sub crura fracta subiiciuntur, quid cōsulam ambigo, an supponere ipsos cōueniat, aut nō. profunt enim, nō tamen quantū putant hi qui ipsos supponūt. Nō enim quiescere cogūt canales, uelut illi putāt. Nam neq; dum reliquū corpus aut hac, aut illac uertitur, cogit canalis ut crus ne sequatur, si nō ipse homo huius rei curam habeat. Neq; rursus absq; corpore crus moueri canalis prohibet, uel in hanc, uel in illam partem. Quin & crudelius est lignum subiicere, si non simul molle quiddam in ipsum indatur. At utilissimū est in strato permittendo, & in progressibus ad aluū exonerādā. Licet igitur & cum canali, & sine canali, & bene, & male rem moliri. Verū uulgo persuasum est, etiam medicū minus delinquere, si canalis subiiciatur, etiā si minus hoc artē referat. Oportet enim super plano quopiā ac molli cubare crus ipsum, penitus in directum: alioquin necesse est deligationem superari à distortionē, quæ in positu cōtingit, quocunq; & quantuncūq; tandem inclinarit. Respondeat autem deligatus eadem quæ etiam prius dicta sunt. Nam & deligationem talem esse oportet, & tumorem ita attolli ad extremas partes, & laxationes ita, & relaxationes per tertium diem: & quod deligatur gracilius inueniri, & deligationes magis facere, &

pluris

pluribus linteis, & circū dare pedem laxē, si non uulnus ualde propinquū genu fuerit. Extēdere autē moderate, & dirigere ossa, in unaquaq; deligatione oportet. Si enim recte curetur, & tumor secundū rationem procedat: tum locus qui deligatur tenuior ac gracilior erit, tū ossa adductu faciliora, & extēsiōni magis obedientia. Postq̃ aut septimus aut undecimus aderit dies, ferulas apponere oportet, quemadmodū & in alijs fracturis dictū est. Ceterū ferularum locatōnes uītare oportet, & secundū malleorū rectitudinē, et supra tendinē, qui est in tibia pedis. At tibiæ ossa corroborantur in quadraginta diebus, si recte curētur. Si uero suspiciōnē habeas, os aliquod directione opus habere: aut de ulcere ratione aliqua timeas, intermedio tēpore soluere, & probe coaptata religare oportet. Porro si alterū tibię os fractum fuerit, extēsiōne quidem debiliore opus habet, nō tamen deficere, neq; segniter agere, in extēdendo cōuenit. & maxime quidē omnes fracturas in prima deligatione, quantū eius fieri debet, extendere oportet: Sin minus, q̃ citissime. Quodcūq; enim os nō recto modo coaptatū deligans quis cōpresserit, locus maiori dolore uexabitur. Reliqua uero curatio eadē est. At uero ex ossibus his internū, tibia & prima tibia appellatū, molestiā maiore in curādo exhibet, & extēsiōne magis opus habet: & si nō recte coaptata ossa fuerint, occultari nō possunt. Est enim totū conspicuū et carnis exors, & hoc fracto, lōge tardius progredi eo crure poterint. Si uero externū os fractum fuerit, & multo facilius ferūt, & multo melius occultare possunt, etiā si nō bene fuerit coaptatū. Est enim carnosum, & cito in pedes cōsistunt. Plurimum enim oneris internū tibiæ os uehit. Nam simul & unā cū ipso crure, & oneris secundum crus rectitudine, maiore laboris partē internū os suffert. Femoris enim caput supernā corporis partē sustinet. Hoc aut intra crus est, & nō extra, sed secūdum tibiæ rectitudinē: & simul reliqua dimidia corporis pars huic rectitudinī magis appropinquat, & nō externæ: & simul crassius est internū q̃ externū; quēadmodū etiā id quod in cubito est, secundū parui digiti rectitudinē, tenuius est & lōgius. In articulo tamē inferno nō similis est ossis lōgioris cōstitutio. Inq̃ qualiter enim cubiti gibbus siue flexura, & poples flectūtur. Propter has igitur causas, externo quidē osse fracto, celeres progressus sūt, interno uero fracto, tardī. At uero si femoris os fractū fuerit, extensionē prae omnibus facere oportet, ita ut ne defectuosius fiat. Amplior enim facta nihil læserit. Neq; em si quis distātiā ex uehemētia extēsiōnis ossa deligauerit, fieri poterit ut deligatio ipsa teneat, ut ita distent: sed coeūt inter se ossa q̃ citissime, ubi intēdentes ipsa remiserūt. Crassissimæ enim ac fortissimæ quū sint hac parte carnes deligationē superabunt, nō ab ipsa superabūtur. Magnū enim dedecus est ac detrimentū, femur breuius efficere. Nam si quidē manus breuior fiat, & occultari poterit, & nō magnus est error. At crus si breuius fiat, claudū hominē efficiet. Sanum enim crus lōgius est, & id redarguit. Quare utilius fuerit, ut si quis male curādu sit, ambo potius crura fracta habeat, q̃ alterū tantū. Equilibris enim ipse sibi p̃p̃si fuerit hoc modo. Postquā uero sufficiēter extēderis, directione ac coaptatiōe per manū uolas facta, eodē modo deligare oportet, uelut etiā prius scriptū est, iniectis etiā fasciarū initijs uelut dictū est, et deligatiōis distributione sursum uersus fiēte. & deligatus eadē respōdeat, uelut etiā prius: & doleat eodē modo, & melius habeat, & similiter rursus deligetur. & ferularū appositio eadē sit. Corroboratur autē femur

femur in quinquaginta diebus. Insuper uero & hoc cōsiderare oportet, q̄ femur gibbosum magis est ad externā partem, q̄ ad internā, & magis ad anteriorem, q̄ posteriōrē. In has itaq̄ partes etiā distorquetur, si non probe curetur. & sanē iisdem partibus etiā ipse seipso magis excarnis est, ut neq̄ occultari possit in distortionē. Si igitur huiusmodi quippiā suspectum habueris, machinari ea oportet, quæ in brachio distorto cōsulimus. Pauca insuper lintea circa coxam, & locū inter coxas & lumbos, circūdare oportet, quo & inguina, & articulus circa intermediā crurum ac inguinum partem plechada appellatam, insuper deligetur. Nam & aliās confert, & ut ne extremæ ferularum partes lædant, si ad nō deligata adhibeantur. Deficere aut̄ oportet semper ferulas, à nuda parte, & hinc atq̄ illinc multū: & positionē ferularum semper ita providere cōuenit, ut neq̄ super os aliquod circa articulos natura prominens, neq̄ super nervum circa articulū fiat. Tumores uero iuxta poplitem, aut circa pedem, aut iuxta aliā quampiā partem, ex cōpressionē eleuatos, multis lanis succidis probe carminatis, uino ac oleo respersis, cerato sublito, deligare oportet, & ubi presse rint ferule, citius laxare. Graciles aut̄ fieri poterint, si supra ferulas gracilibus linteis tumores deligaris, ab infima parte initio facto, ad supernā procedendo. Sic enim q̄ citissime tumor gracilis fieri poterit, & transcēderit supra priores deligationes. Verum hoc deligationis modo uti nō oportet, si nō periculum fuerit in tumore, pustularū, aut denigrationis. Tale uero nihil fit, si nō quis ualde premat fracturā, aut suspensam habeat, aut manu scalpat, aut aliud quid quod irriter corpori allabatur. At uero canalē si quis sub ipsum femur supponat, qui poplitē non excedat, læserit magis q̄ profuerit. Neq̄ enim prohibuerit, quo minus & corpus, et tibia, sine femore moueatur. Noxius enim erit ad poplitē pertingens, & quod minime oportet, id facere impulerit. Minime uero oportet genu flectere. Omnē enim turbationē deligationibus inducit, & femore, & tibia deligata, quisquis genu flexerit. Necesse enim erit propter hoc, mūsculos alias atq̄ alias aliam figurā haberet. Necesse est iēt ossa fracta moueri. Præ omnibus itaq̄ faciendū, ut poples sit extentus. Videtur igitur canalis similiter prodesse, qui à coxa ad pedē usq̄ subiectus cōtineat, & alias circa poplitē, fasciam cum canali laxē circūdare oportet: quemadmodū infantes in cunis fascijs obuoluūt. Deinde si femur ad supernā partem distorqueatur, aut ad latus, melius ita contineri poterit unā cū canali. Cæterū calcanei summi ualde magnā curam habere cōuenit, ut & in tibiæ, & in femoris fracturis, apte se habeat. Si enim depēdeat pes, reliqua tibia firmata, necesse est iuxta anteriōrē tibiæ partē, ossa incurua esse. Si uero calcaneum quidē moderato altius fuerit firmatū, reliqua uero tibia aliquantulū eleuata, necesse est huic ossi, ut circa anteriōrē tibiæ partē, moderato cauius appareat: atq̄ hoc adhuc magis, si calcaneum hominis natura fuerit magnum. Sed & omnia ossa tardius corroborantur, si non secundum naturā posita fuerint, itemq̄ ea quæ nō in eadem figura quiescūt: & calli quoq̄ debiliores ipsis obducūtur. Atq̄ hæc quidem de his quibus ossa quidē fracta sunt, nō autem extra eminent, neq̄ alias ulcus factū est. Quibus uero ossa fracta sunt simplici modo, & nō multifido, ita ut eadē die reposita sint, aut posttridie in sedem suā recepta, & nullus timor sit fissorū ossiū discessionis: aut etiā quibus ulcus quidem factū est, ossa uero fracta nō extra eminent, neq̄ modus fracturæ talis est,

ut sint segmēta à fissis ossibus separata: tales spes est simplici modo curari posse. Et quidem sanè neq; magni quippiam boni, neq; mali facientes, ulcera quidem curant aliquo purgatorio, aut picatū ceratū, ut emplastrū cruentis uulneribus idoneū, aut aliud quid ex his quę facere solēt, imponētes. Ego uero eos laudo qui spleniā uino imbuta, aut lanas succidas, aut aliud quid huiusmodi deligant: Vbi uero ulcera pura facta fuerint, & iam coalescūt, tunc multis linteis deligare, & ferulis dirigere conātur. Hęc quidem curatio boni aliquid facit, nihil autē magni mali: Ossa tamē non similiter in suam sedē firmari possunt. Verum corpora aliquāto tumidiora ea parte fiunt, q̄ sit oportunū, fiunt autē et breuiora his quibus utraq; ossa, aut cubiti, aut tibię fracta sunt. Alij uero rursus sunt, qui talia statim linteis curant, & hinc atq; illinc linteis deligāt, ulcus uero ipsum relinquunt, & perfrigerari sinunt. Deīdē super ulcus purgatoriū aliquod imponunt, & splenijs uino imbutis, & lanis succidis curant. Hęc curatio mala est, & uerisimile est eos qui ita curāt, tum in alijs fracturis, tum in huiusmodi maxime imprudēter se gerere. Maximū enim est cognoscere quomodo initii linteī inijcere oportet, & quā partē maxime cōprimere: & quā utilitas contingat, si quis initii linteī recte inijciat, & quā maxime oportet parte premat: & quā detrimēta inducātur, si quis nō recte inijciat, neq; quā maxime oportet premat, sed hinc atq; illinc id faciat. & dictū quidem est etiā in superioribus, quā ex utrisq; eueniāt. Testatur autē & ipsa hęc medicīnā. Necesse est enim ei qui ita deligatur, tum morē ad ipsum ulcus eleuari. Etenim si sanum corpus hinc atq; illinc fuerit deligatū, in medio uero relicū, iuxta relicū utiq; spātiū maxime intumuerit ac decoloratū reddetur, quo modo ulcus hęc nō perpetietur: Necesse igitur est, ut ulcus quidē decoloratū sit, et labijs euersum ac protuberās, uerū lachrymosum & nō suppurans: ossa uero etiā quā discessura nō erant, discedant: sed & pulsans, & febriēs ulcus fuerit. Coguntur autē propter tumore cataplasmata insuper imponere, quod & ipsum incōmodū est his qui hinc atq; illinc deligātur. Pondus enim inutile ad reliquū pulsū accedit. Postremū uero deligamenta resoluunt, ubi iam malum ipsis recrudescit, & de cætero citra deligationē curant. Neq; uero minus, etiā si aliud quoddā eiusmodi uulnus acceperint, eodē modo curāt. Non enim deligationē hinc atq; illinc factā, & ulceris perfrigationē, in causā esse putant, sed aliud quoddā infortunium. Attamen de hoc tam multa nō scripsissem, si non certo scirem incommodam esse hanc deligationē, & multos esse qui ita curent, & magni momēti esse hanc rem dediscere, & testimonio hęc esse, quod recte scripta sint ea quā prius scripta sunt, siue maxime premēdæ sint, siue minimē ipsæ fracturæ. Oportet autē ut in summā dicam, his quibus nō est futuri discessus ossis expectatio, eandem curationē adhibere, ueluti his quibus os fractū fuerit, ulcus autē non habent. Nam & extētiōnes, & directiones ac coaptationes ossiū eodem modo facere oportet, & cōsimilem deligationē. Super ipsum enim ulcus spleniū tenuē duplex, picato cerato illitū deligandū est, & circumsitæ partēs cerato albo illinēdæ. Verum lintea, & reliquā latiora, aliquantū fissa sint magis, q̄ si nō ulcus haberēt: & id quo primū deligamūs, multo latius sit ipso ulcere. Quā enim angustiora sunt q̄ ulcus, cinctū ulcus tenēt, id quod fieri nō cōuenit, sed primā circūductio totum ulcus cōprehendat, et linteū hinc atq; illinc præmineat. Itaq; secundū ulceris rectitudinē, linteū inijcere oportet,

& premere paulo minus, q̄ si ulcus nō haberent. Distribuenta uero est deligatio, uelut etiā prius dictū est. Lintea autē semper quidē mollis modi sint, magis tamen in talibus, q̄ si ulcus nō esset. Copia uero linteorū nō minor sit prius relatis, sed etiā aliquāto amplior. Si uero deligatus fuerit, uideatur is sibi lintea firmata quidē esse, nō autē compressa: dicatq̄ super ulcus maxime firmata esse, Eadem autē tēpora esse oportet, ad hoc ut magis firmata esse uideātur, & ad hoc ut magis laxa uideantur, quemadmodū etiam in superioribus dictū est. Deligatio etiā postea facienda per tertiū diem, ita ut omnia postea faciamus cōsimili modo, uelut prius dictū est, prāterq̄ quod in totū, minus aliquāto hāc q̄ illa cōprimenda sunt. Quod si secūdum rationē, quā fieri par est, facta fuerint, gracilior quidē semper cōperietur ulceris pars, graciliores autē & reliquae omnes, quā à deligatione cōtinentur: & suppurationes citiores erunt, q̄ in ulceribus aliter curatis: & quācūq̄ carūculā in uulnere denigratae sunt & mortificatae, citius abrumpūtur ac excidūt in hac curatione, q̄ in alijs: & ad cicatricē citius peruenit ulcus, si hoc modo q̄ si alio curetur. At omnīū horū causa est, q̄ et locus circa ulcus gracilis sit, & quā circūfita sunt gracilia omnia fiunt. In reliquis igitur omnibus cōsimiliter curare oportet, uelut ossa sine ulcerationibus fracta, Verū ferulas apponere non oportet. Et propterea lintea his plura esse debēt q̄ alijs, & quod minus cōprimantur, & quod ferulae tardius apponantur. Si tamē ferulas apposueris, non secūdū rectitudinē ulceris appones, sed ita ut laxae adhibeantur, prouidendo ut nulla magna ab ipsis cōstrictio fiat. Dictū autē hoc quoq̄ est in his quae prius scripta sunt. Victus autē rationē exquisitiore, & longiori tēpore cōstituere oportet, his quibus ab initio ulcera fiūt, & quibus ossa extra emittēt. & ut in summa dicatur, in uehemētissimis uulnerib. exquisitiore, eoq̄ diuturniore, uictu uti cōuenit. Eadē etiā curatio ulcerū est in his quibus ossa quidē fracta sunt, sed ulcus ab initio nō fuit, Verū inter medendū factū est, aut ulcere linteis magis cōpresso, aut à ferularū infessu, aut ab alia quapiam causa. Cognoscūtur autē tales fracturae, an ulcus subsit, & dolore, & pulsibus. & tumor qui in extremis partibus est, talibus durus efficitur, & si digitū admoueris, attollitur: sed & cito rursus subterfugit. Si igitur tale quid suspicatus fueris, soluere oportet: & si quidē pruritus circa subligationes fuerit, aut alia quapiā parte deligata, cerato picato pro altero uti. Si uero horū nihil fuerit, uerū ipsum ulcus irritatū, reperitur nigrū ualde aut impurū: & futurū est ut & carnes suppurētur, et nerui insuper excidant, hos omnino perfrigerare nō oportet, neq̄ quicq̄ has suppurationes uereri, sed curare in reliquis omnibus cōsimili modo, uelut eos quibus ab initio ulcus factū est. Linteis uero deligare incipere oportet ualde laxis, à tumore qui in extremis partibus consistit, atq̄ ita deligationē distribuere semper sursum uersus, nusquā quidē cōprimendo, sed maxime super ulcus firmādo, super alia uero minus. & prima quidē lintea hāc mūda sint, & nō angusta. Copia uero linteorū tanta sit, quāta est si cū ferulis deligatio fiat, aut paulo minor. Super ipsum autē ulcus sufficiens est spleniū cerato albo illitū. Siue em̄ caro, siue neruus denigratus fuerit, excidet. Talia enim acribus curare nō oportet, sed mollibus, uelut ambusta. Deligare uero postea per tertiū diem conuenit, ferulas autē nō apponere. Quiescere uero magis q̄ prius, & modico cibo uti. Scire uero expedit, siue caro, siue neruus sit, id quod excidet, q̄ hoc modo multo minus ultra depasci

depascitur, & multo citius excidet, & multo graciliores circūsitæ partes erūt, q̄ si quis exolutis linteis, aliquid medicamētorū purgatoriorū super ulcus imponat. Quin et si exciderit id quod suppurasset, et citius carne repletur, et citius ad cicatricē peruenit, q̄ si illo aut alio modo curetur. Omnia sanē in hoc sita sunt, ut quis hæc recte & moderate deligare sciāt. Cōferūt in super & figuræ quales esse oportet, & reliqua uictus ratio, & linteorū aptitudo. Si uero in recēs uulneratis decipiāris, ossiū discessum nō fore putans, quū tamen expectatio sit illa emersura esse, modū curationis timere nō oportet. Nihil enim magni mali contigerit, si modo bonas ac innoxias deligationes manu facere noueris. Signum autē hoc est, si ossiū discessus in hoc curationis modo futurus est. Pus enim multū fluit ex ulcere, & gliscere ac turgere affecta pars uidetur. Frequentius igitur deligare oportet, ob nimīā humiditatē, et quod aliās etiā febres fiūt. Et si quidē ualde præmanetur à deligatione, & ulcus, & circūsitæ partes graciles fiunt. Quicūq; itaq; ualde tenuiū ossium discessus fiunt, hi nulla magna mutatione opus habēt, nisi ut laxius deligatio fiat, ut ne pus intercipiatur, sed facile effluere possit. Sed & frequentius deligare oportet, donec os discefferit, & ferulas nō apponere. Quibus uero maioris ossis discessus expectatur, siue hoc à principio prænoueris, siue etiā postea cognoueris, nō amplius eadē curatione opus habet. Sed extētiōnes & directiones ita facere oportet, uelut dictū est: splenia uero duplicata, latitudine quidē dimidio palmo nō minora: quale tamen fuerit uulnus, iuxta hoc cōiectura facienda est: lōgitudine uero paulo quidē breuiora, q̄ ut bis circū sciātū corpus circūduci possint, multo uero lōgiora q̄ ut semel. Copia uero tot sint, quot facere cōducit. Hæc in uino nigro austero madefacta, ex medio initio facto circūuoluere oportet, quemadmodū fasciā ex duobus initijs deligatur: & deinde ascia tim alternatione ipsorū facta, initia dimittere. Hæc & super ipsum ulcus adhibēda sunt, & ab utraq; ulceris partē, & ne cōprimantur, sed saltē fulciendi ulceris gratia incumbant. Supra ipsum uero ulcus, ceratū picatum imponere oportet, aut aliquod ex emplastris cruētis uulneribus destinatis, aut aliud quoddā medicamentū, quod familiare ac idoneū sit humectationi adhibendæ. & si quidē æstatis tēpus fuerit, uino madefacere splenia frequēter oportet. Si uero hyems, lanas succidas multas uino & oleo imbutas adhibeto. Oportet autē capræ pellē substernere, & defluxiones obseruare, ut facile effluere possint, ita ut meminērimus q̄ hi loci in iisdē figuris multo tēpore permanētes, intertrigines curatu difficiles faciūt. Qui uero deligatione sanari per aliquē ex relatis, aut referēdis modis nō possunt, eos magnā huc curā adhibere cōuenit, ut fractam corporis partē commode positā habeant secundū rectitudinem, animaduersione ad hoc habita, ut sursum magis q̄ deorsum uergat. Si uero quis bene ac facile opus perficere uelit, op̄æ precīū est etiā machinamēta facere, quo iustam & nō uolentā extensionē, pars corporis fracta habeat. Maxime uero in tibia machinamēta adhibere expedit. Sunt igitur aliqui qui in omnibus tibiæ fracturis, & quæ deligātur, & quæ nō deligantur, pedē summum ad lectū alligant, aut ad aliud quoddā lignū iuxta lectū defossum. Hi itaq; omnia mala faciunt, nihil autem boni. Neq; enim ullā opem affert extensioni, hæc pedis alligatio. Nihilominus minus ad pedē concedet reliquum corpus, atq; sic nō amplius extenditur: neq; rursus ad rectitudinē quicquā prodest, sed etiā obest. Dum enim uertitur

reliquū corpus aut hac, aut illac, nihil prohibebit uinculum illud, quo minus & pes, & ossa pedi annexa, reliquū corpus sequatur. Imò si pes alligatus non fuisset, minus distorqueretur. Si uero quis pilas duas ex corio Aegyptio cōsuat, tales quales gestant hi qui multo tēpore in magnis cōpedibus uincti sunt: habeāt autē pilæ hinc atq; illinc tunicas, ad uulneris quidē partes, profundiores: ad articulorū uero partes, breuiores: Sint item tumidæ ac molles, & congruentes ad hoc, ut altera supra malleolos, altera infra genu coaptetur. Habeat insuper utraq; duas utrinq; appēdices à latere, aut ex simplici, aut ex duplici loro, breuiorē uelut ansas, ita ut alteræ sint ab utraq; malleoli, alteræ ab utraq; genu parte: & superna pila alteras tales habeat secundū eandem rectitudinē. Postea uirgis corneis acceptis, æqualē inter se magnitudinē habētibus, crassitudine quidem digitali, longitudine uero ut flexæ appēdicibus cōgruant, huc diligentia adhibeas, ut extremæ uirgarū partes nō ad corpus, sed ad summas pilarū eminētias innitātur. Oportet aut tria esse uirgarū paria, aut etiā plura, & alias alijs aliquanto longiores, & aliquāto breuiorē ac minores, ut si uelis magis distendere possis. Locētur aut uirgæ utraq; hinc atq; illinc à malleorū utraq; parte. Hæc itaq; si bene machinatus fueris, & extensionē iustam exhibuerint, & secundū rectitudinē æqualem, & uulneri nullus dolor accesserit. Nam quæ expressa fuerint, si quid tamen exprimeretur, partim ad pedē abducētur, partim ad femur: & uirgæ hinc atq; illinc à malleolis accōmodatiores erūt, ut tibię positio nō impediatur, & uulnus probe impingat ac sustētetur. Neq; enim impedimēto est, si quis uelit duas uirgas superiores, ipsas inter se cōiūgere, & si quis leuiter quid superimponere uelit, ut id quod superimponitur à uulnere eleuatū sit. Si quidē igitur & pilæ lenes, & molles, & bonæ, & recēter cōsutæ fuerint: & uirgarū intentio probe intēta fuerit, uelut iam dictū est, cōmodum erit machinamentū. Si uero quid horū non recte habuerit, læserit magis q̃ profuerit. Cōuenit aut & alias machinās, aut bene machinari, aut non machinari. Turpe enim est et minime artificiosum, in machinis struēdis à machinis aberrare. Pleriq; porrò medici fracturas, & cū ulceribus, & sine ulceribus, primis diebus lanis succidis curāt, & nihil ab arte alienū ipsis hoc esse uidetur. & qui quidem à recens uulneratis cogūtur, ex linteorum inopia lanis uti, his plurimus ueniæ locus patet. Nō enim habuerit quis in linteorū penuria, aliud quid multo melius ad tales deligādās q̃ est lana. Verū omnino multæ lanæ esse debent, & ualde bene carminatæ, & nō asperæ. Nam paucarū & malarū uires etiā modicæ sunt. Qui uero ad unū aut duos dies, lanis deligare iustū esse cēsent, tertiā uero ac quartā linteis deligātes premūt, ac extendūt tunc uel maxime, hi in re multi adeo ac magni in medicina momēti, se imprudēter gerunt. Minime enim tertiā ac quartā die omnia uulnera mouere oportet, & ut in summa dicam, etiā omnes specillorum admotiones uitare cōuenit in his diebus, & alia quoq; quibus uulnera irritātur. In totū enim tertiā ac quartā dies in plerisq; uulneribus recrudescētias pariūt, & quæ ad inflammationē ac immunditiā procedūt, & quæ ad febres deueniūt. Et hæc res multi momēti est ut discatur, ut si qua alia. Cū qua enim ex utilissimis in medicina rebus, nō solum circa uulnera, uerum etiam circa alios multos morbos, cōmunionem nō habet: nisi quis etiā alios morbos ulcera esse dixerit. Habet enim & hic sermo aliquā uerisimilitudinē. Multis enim modis alijs alijs cognati sunt. Quia

cunq;

cunq̃ tamen iustū esse putant lanis uti, donec septem præterierint dies, deinde uerò extēdere ac dirigere & linteis deligare, hi non similiter imprudētes uideri poterint. Nam & maximū inflammationis periculū præterijt, et ossa laxa ac apta post hos dies sunt. Longe tamē & hæc cūratio superatur, ab ea deligationē quæ ab initio linteis fit. Ille enim modus præparat ac efficit ut septima die ferulis perfecte deligari possint. Hic autē modus multo tardior est. Sed & alia quædā detrimenta habet. Verū longum esset omnia scribere. Quibus uerò ossa fracta & extra eminētia in suam sedē collocari non possunt, his hæc restitutio debetur. Ferramēta facere oportet ad eum modū quē uetēs habent illi quibus lapicidæ utūtur, alia latiora, alia angustiora. Esse uerò conuenit tria, aut plura etiam, quo quis maxime cōgruis utatur. Postea cū his unā cū extensione motionē aggredi oportet, ita ut ad inferiorē ossis partē subijcias, ad superiorē uero partē ossis, superiorē ferramenti partem innitēdo firmes. In summa, quemadmodū si quis lapidem aut lignū uehementer uectē cōmoueat. Sint autē ualida ferramēta quantum eius fieri potest, ut ne flectantur. Hoc magnū auxiliū est, si & ferramēta idonea fuerint, & si quis uelut conuenit cōmotionem faciat. Nam ex omnibus instrumentis quæ homines machinati sunt, fortissima hæc tria existunt, a selli circumductio, per uetēs cōmotio, & cuneorū usus. At sine horū unō aliquo, aut sine omnibus, nullum uehementissimū opus homines perficiūt. Nō igitur spernēda est hæc per ferreos illos uetēs cōmotio. aut enim hoc modo, aut nullo alio, in sedem suā collabentur. Si uerò superna ossis pars immutata fuerit ac cōfracta, ut uecti adhibendo locus nō sit cōmodus, sed acutū quid prominet, tūc osse scalpendo derafo, securam uecti sedem facere oportet. Hanc autē per uetēs cōmotionem et extensionē, eadem die aut secūda facere oportet. Nō autē tertiā. Minime uero quarta aut quinta. Nam etiā si nō reponas, sed aliās molestiā exhibeas in his diebus, inflammationē induxeris: quāto magis si reponas. Coniunctionē tamē multo magis induxeris si reponas, q̃ si reponere omittas. Atq̃ hæc probe nosse cōuenit. Si enim reponēti cōuulsio accesserit, nō multa salutis spes est. Cōmodum autē est rursus eijcere os à sua sede, si hoc fieri citra molestiā possit. Non in laxioribus q̃ oportunū est, cōuulsiones ac distentiones accedūt, sed in his quæ magis extēta sunt. Cæterū de qua re nunc nobis sermo est, in prædictis illis diebus molestiā exhibere non oportet, & curā adhibere ut ulcus minime inflāmetur, & maxime suppuretur. Postquā uero septē præterierint dies, aut paulo plures, si sine febre fuerit, & ulcus nō inflammatū sit, tūc minus uetat ut reponere tentes, si speres obtenturum te esse: Sin minus, nō oportet frustra molestiā suscipere & inferre. Si igitur ossa reposueris in suam sedem, iam scripti sunt modi quomodo curare oportet, siue ossa discessura esse, siue non, expectatio sit, & si quidem ossiū discessus expectatio sit, eo quē dixi modo cū linteis, in omnibus talibus deligationē facere oportet, ex medio linteo initio factō ut plurimū, uelut ex duobus initijs fascia deligatur. Coniecturā autē facere oportet iuxta ulceris formā, quo sit q̃ minimum hians ac labijs protuberās & expassum. Alijs enim ad dextrā deligare cōmodum est, alijs ad sinistrā, alijs ex duobus initijs. Quæcūq̃ uero ossa repositionē effugerūt, ea discessura esse nosse oportet: itemq̃ ea quæ carnibus penitus nudata sunt. Nudatur autē quorundā superna pars, quorūdam uero carnes circūcirca mortificantur. Et quibusdā quidem ex ueteri uulnere aliqua ossa emarcuerūt: quibusdā uero non. & aliquibus magis,

aliquibus minus, et partim parua, partim magna. Propter hæc igitur relata, uno uerbo dici nō potest, quādo ossa sint discessura. Aliqua em̄ ob paruitatē, aliqua ex eo quod in summa parte existūt, citius discedūt: aliqua eo quod nō discedūt, resiccata & marcida sientia desquamātur. Præterea differt curatio à curatione. In totū igitur ossa citissime his discedūt, quibus citissimæ sūt suppurationes, & citissimæ ac optimæ carnis productiōes. Subnascētes enim iuxta læsam partem carnes, plerūq; ossa ipsa eleuāt. Totus tamē ossis circulus, si in quadraginta diebus discesserit, bene discedet. Quādā enim ad sexaginta dies perueniūt. Nā & rariora ossa citius discedūt, solidiora uero tardius. Alia aut̄ minora: multo minore tēporis spaciō, alia aliter. Cæterū os extra eminēs his de causis præsecare oportet, si reponi non possit, & parū absit ut reponi posse uideatur, & fieri poterit ut auferatur, & si noxiū fuerit, & de carnibus quid rūpat, & sensus molestiam exhibeat. Sed & si nudū fuerit, tale auferre oportet. Reliqua siue præseces, siue nō præseces, nō multū refert. Hoc enim certo scire expedit, q̄ ossa quæ carnibus perfecte priuātur, ac exarescūt, omnia penitus discedent. A quibus uero squamæ discessuræ sunt, ea præsecare nō oportet. Coniecturā uero eorū quæ discedēt, ex cōstitutis signis facere oportet. Curare aut̄ tales splenijs & uinosa curatione, uelut etiā prius de discessuris ossib. scriptū est. Sed cauere decet ne primo tēpore frigidis madesiant. Rigorū enim febriliū periculū est. Periculū item cōuulsionū. Frigida enim semper conuulsionē prouocant. quādoq; uero etiā ulcera. Nosse quoq; id cōuenit, necesse esse ibi corpora breuiora fieri, ubi ossa fracta ac immutata curātur, & quibus totus ossis circulus discessit. At uero quibus femoris aut brachij os extra eminet, hi nō ualde superstites euadūt. Nā & ossa magna sunt, & multum medullæ habēt: & quæ simul uulnerātur, multa sunt & magni momēti, & nerui, & musculi & uenæ. Et si quidē reposueris, conuulsionones accedere solēt. Si uero nō reposita fuerint, febres acutæ, & biliosæ, & singultuosæ oboriūtur. et denigrātur. Nō minus aut̄ superstites euadūt hi, quibus reposita nō sunt, neq; tentatū est ut reponerentur. Adhuc uero magis euadūt, quibus inferna ossis pars eminet extra, q̄ quibus superna. Euadūt etiā quibus reposita fuerint, attramē raro. Nā & curationes à curationibus multū differunt, & naturæ corporū à naturis, ad facile tolerandū. Multū etiam differt an in interna brachij ac femoris parte ossa extra promineant. Multæ enim & periculosæ uenarū extēsiōes in interna parte sunt, quarū aliqua si uulnerētur, lethales sunt. Sūt aut̄ & in externa parte, uerū minus. In talibus igitur uulnerib. quælia pericula immineāt, ignorare nō oportet, & ad temporū occasiones prædicere. Si uero repōnere hæc ossa cogaris, & repōnēdi aliqua tibi spes sit, & nō multa ossis immutatio fuerit, & musculi non cōcurrerint: solēt enim cōcurrere: uetis molitio etiā his cū extensione, opē bene ferre poterit. Vbi uero reponis, ueratrū molle bibendū dare oportet eadem die, si eadē die reposita fuerint. Sin minus, ne aggredi quidē oportet. Verū ulcus curare oportet uelut in capitis ossibus fractis, & frigidi nihil adhibere, & cibos penitus auferre. & si quidē amara bile præditus natura fuerit, fauorū cremorē odoratum coctū, aut acetū mulsū dulce, in aquā instillato, eoq; pro uictu utatur. Si uero amara bile præditus non sit, aquæ portione utatur. Et si quidē continua febre laborarit, ad quatuordecim dies ut minimū hoc uictu degat. Si uero sine febre sit, septē dieb. Postea sensim progressu siēte secundū rationē ad uulgarē uictū adducatur. Et quibus ossa nō reposita fuerint, eandē itidē medicamētū purgationē facere oportet, et ulcerū cu-

rationē, eundē itē exhibere uictū: & dependentē de corpore partē nō extēdere, sed magis adducere, quo laxior sit pars circa ulcus. At ossium discessus diuturnus est, uelut etiā prius dictū est. maxime uero talia fugere oportet, si modo quis honestā fugā habeat. Nā & spes paucae sunt, & pericula multa, & si quis nō reponat, artis expers esse uideri poterit: & si reponat, propinquius ad mortē q̄ ad salutē perduxerit. Ceterū luxationes & emotiones ossiū circa genua, multo mitiores sunt emotionib. ac luxationibus circa cubiti flexurā. Nā femoris articulus pro magnitudine expeditior est q̄ brachij, et iustā naturā solū habet, eāq̄ rotundā. Brachij uero articulus & magnus est, & sinus plures habet. Ad hanc uero, tibiae ossa lōgitudine inter se similia sunt, & externū os paululū, ne memorabili quidē modo excedit, nullū magnū impedimentū afferēs, à quo externus tēdo circa poplitē enascitur. At cubiti ossa inaequalia sunt, & quod breuius est, multo crassius est: quod uero tenuius est, multū superat & excedit articulū. De pēdet tamē & hoc ex neruis, iuxta cōmunē ossiū cōnexionē. Maiorē aut partē cōnexionis neruorū in brachio os tenue habet, q̄ crassum. Horū itaq̄ articulo rū & ossiū flexurā cubiti natura huiusmodi est. & propter naturā modū, ossa circa genu sepe quidē luxātur, facile aut rursus incidūt ac reponūtur. Inflammatio uero nō magna accedit, neq̄ uinculū articuli. Luxātur aut plerūq̄ in internam partē, aliquādo etiā ad extremā, quādoq̄ etiā ad poplitē. Horū omniū repositiones nō sunt difficiles. Verū si quidē foras aut intro luxētur, hominē in humili aliquo sedili sedere oportet, ita ut crus altius, nō tamē multo habeat. Extēsis aut plerūq̄ moderata sufficit, ita ut ab altera parte tibia, ab altera femur in diuersum extēdatur. At ossa circa cubiti flexurā molestiora sunt, q̄ quē circa genu sunt, et difficilius reponi possunt, etiā ob inflammationē, si quis nō statim reponat. Luxātur quidē minus q̄ illa, uerū difficilius reponūtur ac coaptātur. in superq̄ in flāmantur, ac collū acquirūt. Sūt aut & horū plerūq̄ paruā inclinationēs, aliquādo ad partē ad costas, aliquādo ad externā, nō ut totus articulus sit emotus, sed manet quid iuxta ossis brachij cavitatē, qua parte cubiti os excedēs habet. Talia igitur siue hanc, siue illā luxētur, facile est reponere: & sufficit extēsis in directū siens, secundū brachij rectitudinē, ita ut alter iuxta manus inuicturā extēdat, alter locū sub alis amplectatur: Medicus uero altera manu ad emotū articulū admodum, uolis impellat, altera prope ad articulū iniecta retrudat. Obediūt aut tales luxationēs, et nō tarde reponūtur, si quis antea q̄ inflāmētur reponat. Luxātur aut plerūq̄ magis ad internā partē. luxātur etiā ad externā. Innotescit id ex figura: & talia saepe etiā absq̄ uehemēti tēsiōne rursus incidūt. Oportet aut in his quae intro luxātur, articulū quidē ad naturā suā repellere, cubitū uero magis in proximam partē uergentē circūducere. Et plerūq̄ sanē cubiti luxationes huiusmodi sunt. Si uero transgressus fuerit articulus, aut hanc, aut illā, supra cubiti os, quod ad brachij cavitatē excedit: sit quidē raro hoc, si uero fiat, non amplius similiter extēsis in directū siēs, talibus luxationibus idonea est. In tali enim extēsiōne, os à cubito excedēs, brachij transgressionē prohibet. Oportet itaq̄ sic emotis extensionem tali facere, qualis prius descripta est, ubi quis ossa brachij fracta deligat, ut ab alia quidē in supernā partē tēsis fiat, ab ipsa uero cubiti flexura, ad infernam cogatur. Sic enim brachiū supra suū sinū maxime eleuabitur. Si uero eleuatū fuerit, facilis est restitutio cum uolis manū, ita ut emotam quidē brachij partem apprehēdentes impellamus, os uero cubiti iuxta articulū retrudamus, utraq̄ eodē modo, minus tamē. Atq̄ talis extēsis huiusmodi luxatiōis iustissimā

ma est. Poterit etiā reponi per extensionē in directū, uerū minus q̄ hoc modo. At si in anteriore partem brachiū luxetur, rarissime aut hoc cōtingit. Sed quid repētina eluctatio non eiecerit? Multa enim etiā præter naturā suam excidunt, etiā magnū quid sit quod prohibeat. Huic aut eluctationi magnū quoddā obstaculū est, & os crassius quod superexcedit, & multa neruorū extensio: attamē quidam sanē eluctantur. Signū aut his qui ita eluctati sunt, Nihil enim de cubito flectere possunt. Manifestus est etiā articulus ad contactū. Si quidē igitur nō statim repositus fuerit, uehemētes ac uiolentæ inflammationes, itemq; febriles fiunt. Si uero statim quis occurrat, facile reponi potest. Oportet aut linteū durū conuolutū (suffecerit nō magnū) imponere obliquū in cubiti flexuram, & derepente cubitū inflectere, & manū q̄ maxime ad humerū adducere. Sufficiēs igitur fuerit hæc repositio his qui ita eluctati sunt. Sed & extēsiō in directū, hunc repositionis modū coaptare potest: uolis tamē manus in eminentē brachij partem iniectis, iuxta flexurā retro impellere oportet, ita ut aliquis inferne ipsē in cubiti gibbū iniectis, ad cubiti rectitudinē retrudat. Efficax est etiā in hoc luxationis modo illa extēsiō quæ prius scripta est, quomodo ossa brachij fracta extēdere oportet, ubi sunt deligēda. Postq̄ uero extēta fuerint, sic cū manuū uolis iniectis coaptationes facere, uelut etiā prius scriptū est. Cæterū si in posteriore partem brachiū exciderit, raro autē hoc cōtingit, hæc luxatio omnīū maxime dolorosa existit, & febres cōtinuas meracæ bilis paucorū dierū ac maxime lethales inducit. & tales extendere brachium nō possunt. Si igitur statim affueris, extēto cubiti gibbo cogere oportet, & spōte incidit. Si uero febris præuenerit, nō amplius reponere oportet. dolor enim in cogendo augetur. Ut aut in summa dicā, neq; aliū articulum febrētī reponere oportet, minime uero cubiti gibbū. Sunt aut & aliæ læsiones ac molestiæ circa cubiti gibbū. Hoc enim os crassius, si quando ab altero emotum est, neq; flecti, neq; extēdi similiter potest. Manifestū aut sit ex cōtactu, iuxta cubiti flexurā, circa uenæ discissionē supra musculū tendentē. Quibus aut tale accidit, his non amplius facile est ad suā naturā reducere. Neq; enim aliā ullam cōmunem duorū ossiū cōnexionē emotam, ad pristinā naturā collocare facile est: sed necesse est tumore habere ipsam disparationē. Quomodo uero deligare oportet in articulo, dictum est in deligatione circa malleolū. Quibusdā aut os cubiti brachio subiectū frangitur, quandoq; quidē cartilaginosa ipsius pars, ex qua tendo retro brachiū enascitur, & ubi hæc emota fuerit, febrile est ac malignū. Articulus tamen manet in suo loco. equaliter enim basis ipsius hac parte excedit. Quū autem abductus fuerit ea parte qua caput brachij excidit, uagabūndus magis sit articulus, q̄ si penitus sit abruptus. Nā ut in summa dicam, omnia ossa quæ fragūtur, minus noxia sūt, q̄ si ossa quidē non frāgantur, uenæ aut & nerui alicuius momenti in his locis cōtundantur. Vicinius enim ad mortē accedūt hæc q̄ illa, si febris cōtinua accesserit. Pauca tamen tales fracturæ fiunt: quandoq; uero hoc brachij caput iuxta appendicem frangitur, atq; hoc quum uideatur multo magis noxium esse, longe mitius noxis circa cubiti gibbum cōtingentibus existit. Quomodo igitur singulas luxationes reponere, & præsertim curare oportet, scriptum est: & quod statim reponere articulū maxime confert, propter celeritatem inflammationis neruorū. Nam etiam si elapsa statim reposita fuerint, similiter tamen nerui distentionē facere solent, & ad tempus aliquod tum extensionem, quam

facere solent, tum influxionē impedire. Cōfert aut̃ omnia hæc similiter curare, & quæ frangūtur, & quæ disparātur, & quæ luxantur. Omnia enim multis linteis, & splenijs, & cerato curare oportet, uelut etiā alias fracturas. At figurā cubiti gibbi in his etiā omnino talem facere oportet, qualē in his quibus brachiū fractum, & cubitus deligabatur. Cōmunissīma enim omnibus luxationibus, & emotionibus, & fracturis, hæc figura est. Cōmunissīma itē ad distentionē postea faciendā, & ad singula extendenda, ac inflectēda. Hinc enim uie sunt ad utraq; partes cōsimiles. Cōmodissīma est etiā hæc figurā ipsi ægroto, ut ipsum & gestet, & appēsū excipiat. His adde si a callo apprehēsus fuerit, si quidē extēta manus apprehēdatur, melius fuerit si non adsit. multis enim impedimēto erit, paucis adiumēto. Si uero inflexa, magis quidē cōmoda fuerit. Verū longe cōmodior, si mediam figurā obtinens callo apprehēdatur. & hæc quidē de figurā. Deligare uero oportet, primū linteī initio super ipsam læsam partē iniecto, siue fracta fuerit, siue emota, siue disparata. primas etiā obuolutiones super ipsam facere, ita ut maxime hac parte innitātur, minus uero hinc atq; illinc. Deligatio nem autem cōmunem facere oportet, & cubiti, & brachij, utriusq; multo plus q̃ pleriq; faciunt, quo q̃ remotissimē læsa parte tumor hinc atq; illinc exprimatur. Circūdetur insuper etiā acuta cubiti pars, siue læsio in hac fuerit, siue nō, ut ne tumor ibi circa ipsam colligatur. Fugiendū uero est in deligatione, quantum eius fieri potest, ut ne circa flexurā multa lintea coaceruata sint. Cōpressio autē q̃ maxime circa læsam partē faciendā est. Sed & reliqua cōpressio ac laxatio eadem adhibeatur, & iisdem temporibus singula, quemadmodū in ossium fractorū curatione antea scriptū est. Et religationes postea per diem tertiū fiant. Videatur aut̃ laxa esse deligatio tertia die uelut etiā tunc. Et ferulæ cōueniente tempore adhibeantur. Neq; enim aliēnū hoc est, & in his quibus ossa fracta, & quibus nō fracta sunt, si non febrant. Sint autē q̃ laxissimæ partim à brachio extēta, partim ad cubitū positæ: & non sint crassæ. Necesse est etiā inæquales ipsas esse inter se, ut uicissim permutētur qua parte cōducit, cōiectura iuxta inflexionē fiēte. Quin & spleniorū appositionē eiūsmodi facere oportet, uelut de ferulis dictū est, ita tamē ut paulo tumidiora super læsam partē apponātur. Tēpora uero ab inflāmatione, & ab his quæ prius scripta sunt cōiectare oportet.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE ARTICVLIS, IANO CORNARI

rio Medico Phisico interprete.



VMERI uero articulū uno modo luxari noui, ad locū sub alis. Sursum aut̃ nunq̃, neq; ad extēnā partē. Non tamē affirmāuerim an luxetur, aut nō, etiā si habeā quod dicā de ipso. Sed neq; in anteriore partē unquā uidi, neq; uidetur mihi unquā excidisse. Medicis tamē uidetur ualde in anteriore partē luxari, et maxime decipiūtur in his, quorū carnes tabes circa articulū & brachiū occupauit. Apparet em̃ in talib. caput brachij omnino in anteriore partē emīnēs. Atq; ego tale aliquādo nō excidisse asserēs, ob hāc rē apud medicos et uulgus male audiui. Solus em̃ ipsis ignorare uidebar;

alij uero omnes cognoscere. Nec potui ipsis persuadere, nisi admodum difficul-
ter, rē ita se habere. Si quis in brachio supernā humeri partē carnibus denuda-
rit, denudarit autē qua parte musculus sursum tendit. Nudarit item tendinē, qui
sub alis, & iuxta clauiculam ad pectus est: apparuerit utiq; caput brachij in an-
teriorē partem uehementē eminens, etiā si non sit elapsum. A natura enim pro-
num est brachij caput in anteriorē partem, reliquum autē brachij os, ad externā
partē incuruū. Conuersatur autē brachium cū scapulæ cavitatē obliquū, quum
iuxta costas fuerit porrectū. Quum uero ad anteriorē partem extēta fuerit tota
manus, tunc brachij caput ē directo est in scapulæ cavitatē, & nō amplius in an-
teriorē partem eminere conspicitur. Verū de quo nunc est sermo, nunquā uidi
in anteriorē partem elapsum: nō tamen affirmarim ne de hoc quidē, an ita exci-
dat, nec ne. Quū igitur exciderit brachiū ad locū sub alis, multi reponere noue-
runt, utpote q̄ multis elabatur. Eruditi autē est omnes modos nosse, quibus me-
dici id reponunt, & quo modo quis his modis q̄ optime utatur. Optimo uero
horū modorum uti oportet, si fortissimā necessitatem uideris. Optimus autē est
qui postremus describetur. Quibuscūq; igitur frequenter humerus excidit, hi
plerūq; ipsi sibi ipsis ad reponendū sufficientes sunt. Immissis enim alterius ma-
nus digitis ac nodis in locū subalarem, articulū sursum cogunt, cubiti uero gib-
bum ad pectus adducūt. Eodem etiā modo medicus reponet, si ipse quidē sub
alam, articulo magis intro elapso, subtentis digitis à costis diducat, ita ut capite
suo in summū humerū iniecto, renitēdi gratia, genibus uero iuxta cubiti gibbū
ad brachiū admotis, ad costas retrudat. Cōducit autē eum qui reponit fortes ma-
nus habere: aut ipse quidem manibus et capite ita faciat, alius uero quidā cubiti
gibbū ad pectus adducat. Est autē & humeri repositio, ut cubitus retrorsum ad
spinā subducatur, deinde altera manu in summā gibbi cubiti partem iniecta re-
tortio fiat, altera uero iuxta articulum retro innitatur. Hæc repositio, & ea quæ
prius dicta est, quū non sint secundū naturam, tamen articulū circumagitantes
incidere cogūt. Qui uero calcaneo reponere conātur, propinquū quid ei quod
est secundum naturam cogūt. Oportet autem hominē humi supinū reclina-
re, eum uero qui reponit humi sedere qua parte articulus excidit. Deinde appre-
hensam manū læsam, cū suis manibus extēdere, calcaneo uero in subalarem lo-
cū iniecto, dextro in dextrū, sinistro in sinistrū, retrudere. Oportet autē in cavi-
tatē sub ala rotundū quid cōgruens indere. cōmodissimæ uero fuerint pilæ ual-
de paruæ ac duræ, quales multæ ex corijs cōsuuntur. Si enim nō eiusmodi quid
inditū fuerit, calcaneū ad brachij caput peruenire nō potest. Dum enim manus
extēditur, locus sub ala cauatur. Tendines enim qui hinc atq; illinc locū sub ala
cōstringunt, cōtrarij sunt. Oportet autē aliquē ab altera parte eius qui extēditur
confidentē, sanum humerū continere, ut ne corpus circūtrahatur, dum læsa ma-
nus in alterā partem extēditur. Postea ubi pila sub alā subdita fuerit, molle lorū
sufficiētī latitudine præditū, circū pilam circūdare oportet, ita ut quidē eo loro
ex utrisq; initijs apprehēso sursum retrahat, à capite eius qui extenditur confi-
dēs, & pede ad summi humeri os innitēs. Pila uero q̄ penitissime & maxime in-
tus ad costas sita sit, et nō ad brachij caput. Est et alia repositio, quū humerū al-
ter subdit. Maiorē tamē esse oportet eū qui humerū supponit, ita ut apprehēsa
manu, humerū suū acuminatū sub illius luxati alā supponat, & deinde aliquantū

tum uerset, ut uelut sedi insideat, ea coniectura facta, ut homo ille circa humerū suum ex ala pendeat, ipse uero seipsum in hunc humerū altiorē faciat q̄ in alterum, brachiū autē pendens ad pectus suū q̄ citissime cogendo adducat. In hac uero figura in super cōcutiat ubi hominē sustulerit, quo reliquū corpus in aduersam partē brachio quod continetur uergat. Si uero ualde leuis fuerit homo, puer aliquis leuis in super ex ipso retrorsum dependeat. Atq; hæc omnes repositiones in palestra usitate sunt, eo quod nō opus habet aliorū instrumentorū importatione. Poterit tamen quis etiā alibi his uti. Sed & qui circū pistillum cogunt, propemodū secundū naturam reponunt. Oportet autē pistillum molli quadā fascia esse inuolutū; minus enim ita labarit: & inter costas ac brachij caput subter intrusum. & si quidē breue fuerit pistillum, collocare hominē in sedi li aliquo oportet, quo uix brachiū circū pistillū circū dare possit. Sit autē potius longū pistillum, quo homo stans fermē circū pistillum depēdeat. Postea brachiū quidē et cubitus circa pistillū porrigātur, ab altera uero corporis parte, quis manibus circa ceruicē ad clauiculā circumiectis deorsum cogat. Hæc repositio moderate secundū naturam est, & repositionē facere potest, si probe ipsam tractent. Quin & per scalam alia quædā huiusmodi repositio fieri potest, & adhuc melior, eo quod corpus hinc atq; illinc eleuatū, securius librādo adæquari potest. Nam circū pistillum etiam si humerus fixus maneat, periculū tamen est ne corpus hac aut illac circū agatur. Oportet tamen & super scalam superne rotundum quid deligatū esse, quod ad loci sub ala cavitatē congruum sit, & quod brachij caput ad naturā redire in super cogat. Optima uero ex omnibus repositionibus talis est. Lignū esse oportet latitudine quidē quinq; aut quatuor in totū digitorū, crassitudine uero duorū digitorum, aut etiam tenuius, lōgitudine autē bicubitali, aut paulo breuius. Sit autē altera parte summa rotundū, & angustissimū ac tenuissimū hac parte, habeatq; crepidinē paululum supereminētem, in extrema rotunditatis parte, sed nō ea quæ ad costas, uerū ea quæ ad brachij caput existit, quo sub alam cōgrua sit, iuxta costas sub brachij caput subdita. Lintheo autē uel fascia molli, lignū summa parte obuoluatur, quo leuius reddatur. Deinde subdito ligni capite q̄ penitissime sub alā, inter costas ac brachij caput, totam manū ad lignum porrectā alligare oportet, iuxta brachiū, iuxta cubitū, & iuxta manus iuncturā, quo q̄ maxime sit quieta. præ omnibus autē curandum est, ut summa ligni pars, q̄ penitissime intra subalarē locum recipiatur, brachij caput transgressa. Postea inter duas columnas trabem trāsuerfam probe alligare oportet, & deinde manū cum ligno supra trabem trāsmittere, quo manus ab altera parte sit, corpus ab altera, trabs uero sub ala. & postea ad alteram partem manum deorsum cogere unā cum ligno, circum trabem: ad alteram uero reliquum corpus. Trabs autē ea altitudine alligetur, ut reliquum corpus eleuatū summis pedum digitis innitatur. Hic modus repositionis humeri longe optimus est, iustissime enim commotionem facit, si solum penitus intus ad brachij caput lignum fuerit, iustissimæ item sunt in utraq; partem adæquationem facientes librationes, & ad hæc ossi brachij securæ. Recentes itaq; luxationes citius incidunt, q̄ quis putare possit, & priusquā extentæ esse uideantur. Sed & ueteres sola hæc repositio reponere potest, si non iam ob uetustatem, caro quidem in acetabulū deuenit, caput autē brachij in loco ad quē declinauit, semitam

sibi ipsi iam fecit. Verū tamen etiam ita inueteratū brachij elapsū, mihi posse reponere uidetur. Quid enim iusta molitio non nouerit, manere tamen in loco posse, nō ita mihi uidetur, sed prout cōsueuit rursus luxabitur. Idē facit etiam si circū scalam, eodē modo uelut dixi pręparatā, cōactio trāsmissi brachij fiat. Abundē itē sufficit circū magnam sedem Thessalicā cōactionē facere, si recēs fuerit luxatio. Pręparatū autē esse oportet lignum, uelut dictū est, hominē uero locare oportet in sede obliquū, deinde brachiū unā cū ligno, supra sedis reclinatorium transmittere, & ad alterā partem corpus deorsum cogere, ad alterā brachium cum ligno. Idem quoq; facit cōactio supra biforem ianuam. His autem quę forte pręsentia fuerint utendū est. Nosse igitur expedit, quod naturę a naturis multū differūt, ad hoc ut elabētia facile rursus incidāt: differt etiā acetabulum ab acetabulo, quū aliud facile transcēdi possit, aliud minus. Plurimum item differt neruorū ligamentū, quū in quibūdā remissum sit, in quibusdā intentū. Nam humiditas hominibus sit ex articulis, propter neruorū cōnexionem, si laxa fuerit, & intēSIONES facile ferat. Multos enim uideas qui adeo humidi sunt, ut quādo uelint, articuli ipsis citra dolorē excidant, & absq; dolore restituantur. Differt etiā habitus quidā corporis. Nā his quibus bene se habet mēbrum, & carnosus, & minus excidit, & difficilius incidit. Vbi uero ipsi seipsis tenuiores & magis excarnēs fuerunt, tunc & magis excidit, & facilius incidit. Argumentū autē quod hęc ita se habeant, hoc est. Bobus enim tunc magis femora excidūt ex acetabulo, quū tenuissimi existunt. Fiunt autē tenuissimi boues ad finem hyemis. Tunc igitur etiā maxime luxantur: si tamen & huiusmodi quidā in medicina scribere conuenit. Verū conuenit utiq;. Bene enim Homerus didicit, q; ex omnibus pecudibus boues q; maxime laborēt hoc tempore, & ex bobus potissimū aratores, eo quod hyeme operētur. His itaq; maxime excidūt articuli. Hi enim maxime attenuātur. Nam reliqua quidē pecora breuē herbam depasci possunt, Bos autē non ita ualde priusquā alta fiat. Reliquis enim tenuis est labri prominētia, tenuis item superna maxilla. Boui uero crassā est labij prominentia, crassā item & obtusa superna maxilla. Quapropter in breues herbas subijcere nō potest. Rursus solipeda animalia utpote utrinq; dentata, & dentes inter se cōmittere possunt, & sub breuē herbam dentes subijcere queunt, delectanturq; tali herba magis q; alta. Breuis enim herba in totū melior ac solidior est q; alta, adde quod alta etiam prius fructum effert. Ob hoc igitur ita cecinit,

Haud secus ac bobus nigris gratissima ueris

Tempora proueniunt.

quia gratissima apparet ipsis alta herba. Sed & aliās bos laxum habet hūc articulum, magis q; alia animalia, & ob id etiam magis q; alia pedē trahit, & maxime quū macilentus est, et iam senex. Propter omnia hęc etiam maxime boui excidit. Plura autē de ipso a me scripta sunt, eo quod omniū antea relatorū testimonia hęc sunt. Verū de quo nunc sermo est, excarnibus magis excidit, sicut etiā citius incidit, q; probe carnosus: & humidis ac excarnibus minus inflāmat, q; siccis ac carnosus: & in posterū tempus quoq; minus uincitur: sed & musculus amplior moderato subest, si non adsit inflāmatio, & sic sanē lubricus fuerit. Mucosiores enim omnino sunt articuli excarnibus q; carnosus. Nā & ipsę carnes eorū qui non rectē ex arte famē macerati sunt, in macilentis mucosiores sunt

sunt, q̄ in crasis. Quibus tamen cū inflammatione mucus subest, his inflāmatiō uinculo factō articulū continet; & ob id hi qui submucosi sunt articuli non ualde excidunt, & exciderent utiq; si nō plus aut minus inflāmatiōis accessisset. Quibus igitur quū articulus excidit, circumsitæ partes non inflāmantur, & statim citra dolorē humero uti possunt, hi putāt quidem nihil opus esse ut suijs p̄sorum curā gerant, medici tamē est ut contra tales uaticinetur: talibus excidit rursus magis q̄ his quibus nerui sunt inflāmati. Atq; hæc res in omnibus in homine ita habet, & maxime circa humerū & genu. Maxime igitur etiā hæc excidunt. Quibus autē nerui inflāmati sunt, hi humero uti nō possunt. Prohibet enim dolor & inflāmatiōis distētiō. Tales igitur curare oportet cerato, & splenis, & linteis multis deligando. Sub alam uero lanā mollem purā conuolutam subijcere oportet, ad cauitatē explendam, quo fulcimentū quidem sit deligatiō ni, articulū uero sustentet. At brachiū plerunq; sursum uergēs tenere oportet. Sic enim procul fuerit humeri caput à loco, in quē excidit. Oportet aut postq̄ humerum deligaueris, brachiū ad costas adalligare, fascia quadam in orbē circum corpus obducta. Fricare quoq; humerū oportet placide & accurate. Multarum aut rerum peritum medicū esse expedit, & nō minus frictiōis. Ex eodē enim nomine, nō idē euētus subsequitur. Nam et uincire potest frictiō articulū iusto laxiorē, & soluere articulū iusto duriorē. Verū de frictiōe in alio opere à nobis tractabitur. Talē igitur humerū mollibus manibus fricare cōuenit, cōfert enim, & aliàs leniter. Articulum aut cōmouere non uiolenter, sed intantū ut citra dolorē commoueatur. Restituūtur uero omnes articuli partim lōgiore, partim breuiore tēpore. An aut brachium exciderit, his signis cognoscere oportet. Nam ubi iustū corpus habent homines, manus item ac crura, sano in exemplū uti oportet, ad nō sanum: & nō sano ad sanū, nō alienos articulos inspiciēdo, (alij enim alijs magis extātibus sunt articulis) sed ipsos eius qui affectus est, an dissimilis sit sanus aegroto, & hoc recte quidē dictum est, multam tamē erroream intelligentiā talia habēt: & non satis est solū sermonis doctrina artē hanc nosse, sed conuersatione etiā uersare oportet. Multa enim præ dolore, aut ex alia causa, quū non exciderint ipsis articuli, tamen nō possunt in similes figuras restitui, in quales sanū corpus figuratur. Proinde & talem figurā insuper intelligere ac cōsiderare oportet. Sed & in loco sub ala, caput brachij multo magis incumbere uidetur, in luxato q̄ in sano. Quin & superne iuxta supernā humeri partem, cauus apparet locus: & summi humeri os extās conspicitur, utpote articulo ad infernū locū digresso, & est etiā aliqua erronea in hoc intelligētia, sed postea de ipso scribetur. Est enim dignū de quo scribatur. Preterea in luxato cubiti gibbus magis à costis distare uidetur, q̄ in altero. Si tamen quis uim afferens cogat, adducitur quidē, sed cū dolore. Sed & sursum ad aurē manū attollere cubiti gibbo extēto, non ualde potest, uelut sanam: neq; hæc & illac similiter diducere. Hæc igitur signa sunt humeri luxati, repositiones itē præscriptæ et curationes hæc sunt. Operæ precii uero est discere, quomodo frequēter excidētes humeros curare oporteat. Multi enim à certaminibus iam prohibiti sunt, ob hanc calamitatē, quū aliàs penitus fuerint inculpabiles. Multi etiā ad res bellicas inutiles fuerūt, & ob hanc calamitatē perierunt. Sed & propterea res digna est quæ discatur, q̄ nullū nouerim qui recte medeatur, sed alios ne aggredi quis

dem sciam, alios contra quæ conducit & sentire, & facere. Multi enim medici humeros luxatos uulnerunt, & iuxta supernam humeri partem, & iuxta anteriorem, qua parte caput brachij extuberat, & iuxta posteriorem paululum retro supernam partem. Hæ igitur uulnera, si quidem sursum brachium excidisset, aut in anteriorem aut posteriorem partem, recte iniusta essent. Nunc uero quum deorsum excidit, efficiunt magis hæ uulnera quæ impediunt. A superna enim spatij amplitudine caput brachij excludunt. Verum hæc ita urere oportet. Cutem sub ala digitis apprehensam attrahere oportet, secundum ipsam maxime rectitudinem, secundum quam brachij caput excidit. Deinde ita attractam cutem in ulteriorem partem perurere. Ferramentis autem talia urere oportet non crassis, neque ualde caluis, sed oblongis. Citius enim penetrant, & manu firmata transigi possunt, pellucidis item his urere oportet, quo quæ celerrime pro uiribus penetrant. Nam crassa tarde penetrantia, latiores crustarum elapsiones faciunt, & periculum est ne cicatrices rumpantur, & nihilo quidem deterius hoc esset, uerum turpius & ab arte alienius. Postquam autem in ulteriorem partem perusseris, in plurimis satis est ut infernæ parti soli has crustas inuras. Quod si periculum esse non uideatur ne cicatrices rumpantur, sed multum spatij interpositum sit, tenue quoddam specillum per iniusta foramina trahere oportet, cute adhuc attracta. Neque enim alias trahere possis. Vbi uero traieceris, cutem dimittere. Postea inter crustas aliam crustam tenui ferramento infligere ac inurere, donec specillum contingas. Quantum uero de cute sub ala apprehendere oportet, hinc cōiectare licet. Glandulæ sub ala sunt, sicut etiam in alijs corporis partibus. Verum in alio libro de tota glandularum natura scribetur, quod sint, & qualia in qualibus significat ac possunt: glandulas igitur simul apprehendere non oportet, neque ea quæ glandulis sunt interiora. Magnū enim afferunt periculum. Sunt enim nervis maximi momenti uicina. Quantum uero extra glandulas est, eius quæ plurimam partem apprehendere oportet. Nihil enim periculi est. Nosse tamen hoc expedit, quod si fortiter brachium extenderis, nihil cutis sub ala apprehendere poteris, quod sane attractu memorabile sit. Distrahitur enim in extensione. Nec uero nervos ulla machina uulnerare oportet. Hi enim propè expositi sunt ac extēti in hac figura. Si uero parum brachium eleuaris, multum quidem cutis apprehendes: Nervus uero quorum curam gerere oportet, intus ultra apprehensionem consistant. Nonne igitur in omni arte præ omnibus curandum est, ut in singulis figuræ iustæ inueniantur. Atque hæc quidem de loco sub ala. & sufficiunt hæc apprehensiones, si crustæ recte fuerint iniustæ. Extra uero alia duo solum loci sunt, ubi quis crustas inurere queat huic affectioni auxiliares. Vnam in anteriore parte, inter brachij caput, & tendinē iuxta alam. Et hac quidem parte cutem penitus perurere oportet, sed non altius. Vena enim crassa propinqua est, et nervi, quorum neutra igne calfacienda sunt. Retrorsum autem alteram crustam inurere licet, multum supra tendinē, qui est iuxta alam, et paululum infra brachij caput. Et cutem quidem penitus perurere oportet, Verum neque hic ualde altam crustam facere. Inimicus enim est ignis nervis. Curare igitur ulcera per omnem curationem oportet, ita ut brachium nunquam uehementer extendas, sed moderate, ulcerum saltem curandorum gratia. Minus enim ita perfrigerantur. Conducit enim omnes uulnera tegere, ut etiam leniter curetur, & minus disparentur, minusque sanguinis erumpat, & minus conuulsio accedat. Vbi uero pura facta fuerint ulcera, & ad cicatrices deuenierint

nerint, tūc sanè penitus brachium semper diè ac nocte costis alligatū esse oportet. Sed & quū sana facta fuerint ulcera, similiter ad multum tempus, brachium ad costas alligandū est. Sic enim maxime cicatrix induci poterit, & spatij amplitudo intercipiatur, in quā maxime luxatur brachiū. Quibuscunq; uero humerus repositione fuerit destitutus, si quidem homines adhuc crescant, os brachij non similiter ut sanum coaugescit, sed atugescit quidem, uerū altero breuius aliā quanto efficitur. Et qui mustellæ cubito præditi sunt, paruumq; ac macilentum brachiū ex natiuitate habent, galeancones uocati, ob duplices has calamitates fiūt tales, tum si talis aliqua luxatio ipsos dum in utero sunt corripuerit, tum ob aliam calamitatē, de qua postea aliquādo scribetur. Quin & hi quibus dum adhuc infantes sunt, profundæ ac submersæ suppurationes circa brachij caput fiunt, omnes galeancones efficiuntur. & siue secti fuerint, siue uisti, siue sua sponte ipsis eruperint, hæc ita se habere nosse oportet. Qui tamen ex natiuitate galeancones sunt, etiamsi manu potentissime uti possint, tamen neq; ipsi extento cubiti gibbo, brachiū ad aurem extendere ac eleuare possunt. Sed multo minus hanc q̃ sanam manum. Quibus uero iam uiris exciderit humerus, & repositus non fuerit, his superna humeri pars magis excarnis efficitur, et habitus hac parte tenuis fit. Quū tamē dolor cessauerit, nō omnia ea similiter operari possunt, quæ eleuato cubiti gibbo à costis in obliquū operari oportet. Quæ uero transmoto brachio iuxta costas, aut in anteriorem, aut in posteriorem partem operari oportet, ea operari possunt. Nam & scobinam, & serram trahere poterint, securi item findere, & fodere, si non ualde sursum cubiti gibbū attollant, sed & alia iuxta tales figuras operantur. At uero quibus summus humerus fuerit auulsus, his os auulsum extra eminens apparet. Est autē hoc uelut uinculū clauiculæ & scapulæ. Alia enim est hominis natura hac parte q̃ aliorū animalium. Medici igitur in hoc uulnere maxime falluntur. Nam quū os auulsum emineat, superna humeri pars humilis & caua apparet, ut etiam uelut humeri elapsi curam adhibeant. Multos igitur noui medicos aliās nō malos, qui grauius affligerūt, tales humeros reponere conātes, ita excidisse rati, & nō prius desistunt ipsi extimare se humerū reponere, q̃ uel desperarint, uel frustrati fuerint. His curatio quidē eadem quæ etiā alijs huiusmodi, ceratū, splenia, & lintea, & deligatio eiusmodi, deorsum tamen cogere os supereminēs oportet, & splenia super hoc ponere plurima, & hac parte maxime premere: & brachium ad costas adalligatum ad supernā partem tenere. Sic enim os auulsum maxime appropinquaret. Hæc tamen probe nosse expedit, & uelut certa prædicere, si alioqui uoles, quod nullum detrimentū, neq; parū, neq; magnū, humero contingit ex hoc uulnere. Sed locus turpior euadit. Neq; enim hoc os in pristinā sedem similiter firmari poterit, uelut natura exigit, sed necesse est plus aut minus tumidū esse ad supernam partem. Neq; enim aliud ullum os in eundē locū restituitur, quod cum alio osse cōmunionem habet, & adhærēs à ueteri naturali sede auulsum fuerit. Paucis autē diebus summus humerus doloris exors fit, si probe deligetur. Clauicula porro fracta, si quidē penitus caulatim hoc contigerit, curatu facilius est. Si uero oblonge, difficilius sanatur: & contraria in his contingūt, aliter q̃ quis putauerit. Nam quæ penitus caulatim fracta est, cogi magis poterit ut ad naturam redeat. Et si diligens cura adhibeatur, partem quæ superior est, inferiorem

fecerit figuris idoneis, & deligatione conueniente. Si uero perfecte non firmata fuerit, attamen supereminens ossis pars non ualde acuta fit. At quorum os in longitudinem fractum fuerit, his similis ossibus auulsis calamitas contingit, de quibus antea scriptum est. Neq; enim ipsum ad seipsum ualde firmari solet, & summa ossis eminētis, ualde acuta fit. In uniuersum igiturnosse expedit, quod nullum detrimentū neq; humero, neq; reliquo corpori, ob clauiculæ fracturam accedit, si non insuper corruptio aliqua cōtingat. Raro autem hoc fit. Deformitas tamen circa clauiculæ fracturam accedit, primū turpissīma, deinde uero minor fit. Coalescit autem clauicula cito, itemq; alia ossa laxa. Celerem enim calli obductionem talia faciunt. Quum igitur recens fracta fuerit, uulnerati ad curationem festinant, maius malum esse putantes q̄ est, & medici quoq; prompti sunt ad recte curādum. Progressū uero temporis & uulnerati, utpote qui neq; dolent, neq; iter facere, neq; cibum capere prohibentur, negligunt: & medici, utpote qui suis sedibus restituere nō possunt, aufugiunt, neq; uulneratorū negligentia ægre ferunt. In hoc autē calli obductio acceleratur. Deligationis uero modus plerisq; cōsimilis est, ut cerato & splenijs, & mollibus linteis curatio fiat. Insuper autem & hæc curatio, & hæc animaduersio habenda est, & præsertim in hac aggressione: quod plurima splenia iuxta eminentem partem imponere oportet, & plurimis deligationibus maxime circa hanc partem premere. Sunt autē aliqui quibus cōplacuit plumbum graue insuper adalligare, ut super eminentē partem deorsum cogat. Fortassis autē neq; intelligunt qui simpliciter deligant. Sed neq; hic modus ad clauiculā fractam pertinet. Neq; enim fieri potest ut id quod eminet memorabili modo deprimatur. Alij uero quidam sunt, qui quū cognouerint q̄ hæc deligationes erroneæ sunt, & nō secundū naturam supereminētia deorsum cogunt: deligant quidē ipsos splenijs & linteis utētes, uelut etiam alij. Verum cincto homine fascia quadam qua parte maxime cingi solet, postq̄ splenia supra eminētes fracturas imposuerunt, ita ut isthic magna mole extuberēt, tunc initiū linteī ad cincturam ex anteriore parte alligant, atq; ita deligant in directū clauiculæ extendentes ac retrorsum ducētes, & isthic cincturæ circumdatum in anteriorem partem reducunt, & rursus in posteriorem. Aliqui uero nō cincturæ linteū circumdant, sed circum interfoemineū iuxta sedem, & per spinam linteū circumdantes, hoc modo fracturā comprimūt. Hæc itaq; si quis inexpertus audit, prope secundū naturam esse uidētur, uerū si quis utatur inutilia existunt. Neq; enim stabilia sunt, etiāsi decūbat quis, quāuis ita uel maxime stabilitas cōtingat: attamē si decūbens aut crus inflexerit, aut ipse se inclinet, omnia deligamenta mouebūtur. & alioqui noxia est hæc deligatio. Nam & sedes intercluditur, & lintea in hac angustia aceruata fiunt. & quæ rursus cingulo circūdantur, nō ita ualida facta cinctura circūdari possunt, ut non cingulū sursum ascendere cogant, neq; ita necesse est omnia deligamenta laxari. Quàm proxime uero quis rem cōficere uideri possit, etiam si nō magna faciat, si quibusdā linteis cingulū circūdet, plurimis autē linteis priorē deligationem perficiat. Sic enim maxime stabiles fuerint deligationes, & mutuam inter se opem tulerint. Plurima igitur ex his quæ cōtingunt his quibus clauicula fracta est relata sunt. Insuper autē & hoc ad intelligere oportet, q̄ clauicula plerūq; frangitur ita ut os quod à pectore est, ad supernā partem emineat: quod uero à sum-

mo humero est, in infernam partē subsidat. Causæ uero horū hæc sunt, q̃ pectus neq̃ multo inferius neq̃ superius procedere potest. Nā articuli in pectore motus paruus est. Ipsum enim sibi ipsi, & spine, ex cōtinuitate cōmissum est. Proxime quidē clauicula ad humeri articulū fluctuat. Cogitur enim frequentē motū habere, propter summi humeri connexionē. & alioqui ubi uulnerata est, ad supernā partem defugit ea pars quæ pectori adhæret, & nō ualde ad infernā partem cogi potest. Nam & à natura leuis est, & loci amplitudo ipsi superne maior est q̃ inferne. At humerus & brachiū, & quæ his annexa sunt, à costis ac pectore facile exolui possunt: & propterea multo superius ac inferius abduci queūt. Quum igitur fracta fuerit clauicula, os quod ad humerū est magis deorsum respicit. Huc enim ipsum unā cū humero & brachio defluere procliuus est q̃ sursum ferri. Quum igitur hæc ita se habeant, imprudenter se gerunt qui supereminentē ossis partē deorsum cogere oportere putāt. Nam infernā ad supernā adducendā esse manifestū est. Hæc enim motū habet. Hæc est quæ à natura discessit. Clarū itaq̃ est aliter nullo modo ipsam cogi posse. deligationes enim nihilo magis appellant q̃ repellūt. Si uero quis brachiū q̃ maxime ad costas admotū sursum cogat, ut q̃ acutissimus esse humerus uideatur, perspicuū est q̃ sic adaptari poterit ad os quod à pectore est, unde est diuulsa. Si quis igitur legitima deligatione utatur, celeris curationis gratia: & reliqua omnia frustra fieri putet, præter figurā relatam, is & recte intellexerit, & celerrime ac optime curauerit. Decubere tamen hominē multū refert, & sufficiūt dies xiiij. si quieuerit, aut ad summū uiginti. Si tamen cōtrario modo clauicula fracta fuerit, quod nō ualde cōtingit, ut os quod à pectore est subsidat, quod uero à uero à summo humero est superemineat, alteriq̃ superftet: nulla magna curatiōe in his opus fuerit. Ipse enim humerus & brachiū si demittatur, ossa inter se committere ac firmare potest. & uilis quæpiā deligatio suffecerit, & pauci dies satis erūt ad callum obducendū. Quod si hoc modo fracta nō fuerit, sed in obliquum hæc uel illac luxata, ad naturā reducere oportebit, humero cū brachio sursum adducto, uelut etiā ante dictū est. Quū aut ad pristinam naturā resederit, reliqua curatio uelox erit. Pleraq̃ igitur immutationes ac luxationes, brachiū si sursum cogatur corrigit. Quæcūq̃ uero luxationes ex supernis oblique ad latus fiūt, aut deorsum, his correctio præparatur, si homo supinus decubuerit, iuxta medias aut scapulas aliquid altius suppositū fuerit, quo pectus maxime in utranq̃ partē inflexū sit: & brachiū adducat quis ad costas porrectū. Medicus aut altera manus uolam in brachij caput iniecta retrudat, altera ossa fracta cōponat. Sic enim q̃ maxime ad naturā reduxerit. Verū quod iam dictū est, supernū os facile ad partē subside solet. Plerisq̃ igitur ubi deligati fuerint, figura ipsa opitulatur, ita ut ad ipsas costas cubiti gibbū habentes, hoc modo humerū ad supernā partem cogāt. Quibusdā uero humerū quidem sursum uelut dictū est, cogere oportet: cubiti aut gibbū ad pectus adducere: summā uero manū ad summū sanū humerū adhibere. Siquidē igitur decubere sustinet, fulcimentū aliquod quod obfirmet apponere oportet, quo humerus q̃ maxime superne maneat. Si uero obambulare uolet, fundā ex fasciā factā, & acutæ gibbi cubiti parti circūdatā, de collo appensam gestare oportet. Cubiti porro gibbi articulus ubi emotus aut luxatus est, ad costas, aut foras, acuta ipsius parte in brachij cauitate manēte, extensione

in directū facta, id quod eminet retrorsum & in obliquū repellere oportet. Vbi uero perfecte excidit, aut hanc, aut illam, extensio in qua brachiū fractum deligatur requiritur. Ita enim incurua gibbi pars nō impedit. Excidit autē maxime ad partē uersus costas. Correctiones uero facere oportet q̄ plurimū abducendo, & ut ne brachij caput cornicem contingat, sublimē circūducere ac inflectere, & nō in directū cogere, simul autē cōtraria in utrāq; partē detrudere, & in sedē cōpellere. Cōtulerit etiā in his gibbi cubiti inuersio, modo in supinam, modo in pronam partē. Curatio uero ex figura est, ut summā manum paulo altiorē cubiti gibbo habeāt, brachium uero ad costas. Sic etiā appensi exceptio, & positio, & gestandi facilitas, & natura, & usus, in cōmuni sunt, si modo non male callus obducatur. Obducitur autē cito. Curatio fit linteis iuxta legē articularem, ita ut acuta eius pars insuper deligetur. Recrudescit autē maxime cubiti gibbus febribus, doloribus, nausea & uomitu meracē bilis, præsertim si retrorsum luxatus fuerit, ob torporē: deinde, si in anteriorē partem. Verū curatio eadē est. Repositio uero retrorsum luxati, ut extētum distēdamus: Signū autē est, q̄ extēdere ipsum nō possunt, sicut in anteriorē partē luxati, q̄ inflectere nequeūt. Verū tūc durū quiddā inuolutū indere oportet, & circū hoc ab extēsiōe derepente inflectere. Disparationis autē oīsū signū est manifestū ex cōtactu, iuxta uenā quā in brachio finditur. At uero callus cito his obducitur. Ex natiuitate autē breuiora sunt ossa infra noxā, plurimū quā proxima sunt, cubiti, deinde manus, postea digitorū. Verū brachiū & humerus robustiora sūt, propter inuersionē. At altera manus propter opera adhuc fortior est. Imminutio uero carniū fit, si foras excidit, intrinsecus: Sin minus, in contrariū prout excidit. Cubiti uero gibbus si intrō, aut extra exciderit, extēsiō fit in cōmuni figura cubiti ad brachiū. fascia em sub alam data, ipsam exceptā suspendere oportet: ad summū uero cubiti gibbū iuxta articulū pōdus appēdere, aut manibus deorsum cogere. Vbi uero articulus ultra eleuatus est, coaptationes manuū uolis sūt, uelut etiā in manib. Deligatio quoq; in hac figura, & exceptio appēsi, & positio. At si in posteriorē excidit partē, statim extētū palmis dirigere ac coaptare oportet. Simul autē in directione etiā alijs opus est. Si in anteriorē, circū lintē conuolutū iustē molis inflectēdo simul directionē facere oportet. Si uero in alterā partē inclinari, in directione simul utraq; facere oportet. Verū curatiōi cōmunis est figura & deligatio. Possunt autē et ex distēsiōne omnia in cōmuni cōtingere. At uero repositiones aliæ ex supereleuatione reponūtur, aliæ ex extēsiōne, aliæ ex circūuolutione. Hæ uero ex figurarū excessibus, aut hanc aut illam celeriter sūt. Manus articulus aut intrō, aut extra luxatur, plerūq; uero intrō. Signa autē facilia cognitu sunt. Si em intrō luxatus est, digitos inflectere nō possunt. Si extra, extēdere nequeūt. Repositio fit, digitis supra mēsam positīs, ut ab alijs atq; alijs in diuersum extēsiō fiat, et id quod eminet aut uola, aut calcaneo retrudatur, et in anteriorē partē deorsum protrudatur. Inferne uero iuxta alterū os moles aliqua cōuoluta mollis supponatur, si supra eminet, manu prona locata: si infra, supina. Curatio uero linteis fit. Tota porrō manus, aut intrō, aut extra, aut hanc aut illam luxatur. Maxime uero intrō. Quādoq; autē & appēdix emota est. Quādoq; uero alterum os disparatū distat. His extēsiō fortis faciēda est, et quod quidē eminet retrudatur, alterū uero contrā trudatur, duabus speciebus simul cōtingentibus, & retrorsum

sum, & in obliquū, aut manibus supra mēsam, aut calcaneo. Quæ uero recrudescunt ac deformia sunt, tēpore ad usum corroborantur. Curatio fit linteis cū manu & cubito. & ferulæ usq; ad digitos ponuntur. At ferulis hæc deligata frequentius q̃ fracturas soluere oportet, & perfusionē ampliōrē adhibere. Ex natiuitate aut manus breuior sit, & carnes imminuuntur maxime in contraria parte ei in qua luxatio facta est. At adulto iam ossa manent. Digiti uero articulus luxatus facilis cognitu est. Repositio fit extendens in directū, ita ut quod eminet os protrudatur, contrariū uero cōtra trudatur. Curatio fit fascijs ac linteis. Si uero nō reponantur, forinsecus callo obducitur. At si ex natiuitate, aut dum adhuc crescit homo, luxata fuerint ossa, breuiora fiunt infra luxationē, & carnes imminuuntur cōtraria maxime parte ei in qua luxatio facta est. In adulto uero ossa manent. Maxilla uero paucis iam perfecte luxata est. Os enim quod à superiore maxilla prodit, cum eo osse subiugatū est, quod sub aurem annexū est, quodq; capita infernæ maxillæ cōcludit, ac dirimit, quū altero capite superius sit, altero inferius: & extremæ infernæ genæ partes ita se habēt, ut altera ob longitudinē non facile accessum admittat: altera uero cornix est, & supra iugale os excedit. Simul aut & ambarū harum extremitatū neruosi tendines existunt, ex quibus muscoli dependent, qui temporales ac manducatori appellantur. Propterea autē appellantur, & propterea mouentur, eo quod hinc dependent. Nam in edendo, & in loquēdo: & in reliquo oris usu, superna quidē maxilla quiescit. Est enim capiti cōnexa, & non coarticulata. Inferna aut maxilla mouetur. Coarticulata enim est à superna maxilla, & à capite. Cur igitur in cōuulsionibus ac distentionibus hic articulus distentus primus de se significationē præbeat: & cur plagæ tēporales periculosæ sint, ac soporē inducant, alio libro referetur. Quod uero nō ualde luxetur, causæ hæc sunt. Sed & hæc quoq; causa est, quod nō ualde tales ciborū necessitates hominē apprehēdunt, ut magis q̃ potest hiet. Exciderit aut à nulla alia figura, q̃ si quis ualde hians maxillā in alterā partem diducat. Cōfert tamē ad hoc ut excidat, hoc ipsum. Quicūq; enim nerui, & quicūq; muscoli circa articulos sunt, aut ab articulis, ex quibus colligantur, horum quicūq; in usu sæpe mouentur, hi etiā maxime ad extēSIONES remittunt, quemadmodum etiam pelles mollissimæ multum remittunt. De quo igitur sermo est, luxatur quidē & excedit maxilla raro: laxatur tamē sæpe in hiatibus, uelut etiam aliæ musculorum ac neruorū immutationes hoc faciunt. Manifestum uero ex his maxime fit, ubi excidit. Prominet enim inferna maxilla in anteriōrē partem, & in cōtrariam luxationi partem abducitur: & ossis cornix circa supernā maxillam tumidior fit: & infernas maxillas difficulter cōmittunt. Quæ uero repositio his cōueniat, manifestū est. Oportet enim aliquē uulnerati caput detinere, & alterū infernā maxillam intrinsecus ac extrinsecus ad mentū digitis apprehēdere, et primū maxillam aliquādiu hac atq; illac manu abducere, et ipsum hominē iubere, ut maxillam laxā habeat, & simul adducat, ac q̃ maxime remittat. Deinde repēte tribus figuris simul laxare oportet, diligenti in hoc animaduersione habita. Nam & ex distortionē ad naturā deducere oportet, & infernā maxillā retrorsum protrudere, ita ut eger hæc sequatur, & maxillas cōmittat, ac non hiet. Atq; hæc quidē repositio est, & neq; alijs figuris fieri poterit. Curatio uero breuis sufficit. Spleniū em̄ inceraū apponitur, ac laxo deligamēto deliga-

tur. Securius autē hęc aggressio perficitur, homine supino reclinato, et coriaceo puluinarī plenissime factō capiti supposito, ut in ipsum innitens quē minimum cedat. Insuper autē & caput uulnerati aliquis detinere debet. Si uero ambæ maxillæ luxatæ fuerint, curatio quidē eadem est, uerū hi os minus cōmittere possunt. Nam his genæ prominentiores sunt, sed indistortæ. Quod uero distortæ nō sint, maxime cognoueris ex dentiū tum supernorū, tum inferiorū terminis ē directo inter se correspondētibz. His cōfert ut quē citissime reponātur. Repositionis autē modus prius dictus est. Si uero nō reponātur, animæ periculū imminet, præ febris cōtinuis, et torpido sopore. Soporiferi em̄ hi muscoli sunt, & dum alterātur, & dum intendūtur præter naturā. Solēt etiā alius his biliofa, meraca, pauca egerere. Et si uomuerint, meraca uomūt. Hi igitur etiā moriuntur decima maxime die. At si fracta fuerit inferna maxilla, si quidē non omnino caulatim hoc cōtigerit, sed cohaeret adhuc os, confractum tamē fuerit, dirigere quidē os oportet digitis circa linguā obliquam subiectis, forinsecus uero cōtrāniti, prout cōtulerit. Et si distorti fuerint dētes iuxta uulnus cōmoti, postquē os directū fuerit, dētes inter se cōiugare oportet, nō duos solū, sed etiā plures, atque hoc maxime auro, sin minus, lineo filo, donec os corroboretur. Postea cerato, et splenis paucis, & linteis modicis deligare, nō nimīū firmis, sed laxis. Nam hoc probe nosse expedit, quod deligatio per lintea, maxillæ fractæ parū quidē contulerit, si recte fiat: magnopere uero leserit, si prauē deligetur. Frequēter autē circa linguā explorare oportet, & multo tēpore reniti ac digitis dirigere os cōfractum, optimūque esset si hoc semper fieri posset, sed fieri nequit. Si uero os penitus caulatim diffractū fuerit, raro autē hoc cōtingit: dirigere quidē os oportet uelut directū est. Vbi uero direxeris, dentes cōiugare, quemadmodū antea dictū est. Magnopere enim cōtulerit ad quietē, & adhuc magis si quis recte coniungat, & uelut oportet futuras cōsuat. At enim nō facile est omnē chirurgiā scripto exquirere proderet, sed ex his quæ scripta sunt, formā & imaginem concipere oportet. Postea corio opus est Carthaginēsi, et si quidē iunior fuerit uulneratus, satis est squama inde detracta uti. Si uero adultior, ipso corio: ita ut defecta inde particula trium digitorū latitudine, aut prout cōgrua fuerit, sublita prius ē gūmi maxilla, ita enim mitius fuerit, glutine agglutinetur summa sui parte, ad diffractā maxillæ partē, digiti aut paulo ampliore distātia à uulnere. Et hæc quidē particula ad infernā partē agglutināda est, & habeat fissuram ē directo mēti, quo acutam eius partē circūcirca cōplectatur. Alterum autē eiusmodi lorū, aut paulo latius, ad supernā maxillæ partē agglutinare oportet, tāta à uulnere distātia, quāta illa altera lori particula abfuit. Sit autē & hoc fissum, ut circūcirca aurē ambiat. Sint autē hæc lora acuta, qua parte cōmittuntur, & ubi ipsorū extremitates cōnectere ac colligare oportet. In agglutinatione uero, caro corij ad cutē uergat, Sic em̄ magis agglutinātū adhærescit. Postea extēto hoc lora, magis autē eo quod circumtū est quē maxime, ne maxilla exacuatur, lora ipsa circa uerticē cōnectere oportet, & deinde linteo frontē deligare. & superiniectū quid esse oportet, uelut moris est, quo uincula quieta sint ac firma. Decubitū autē faciat in sanā maxillā, nō maxillæ, sed capiti innitens. Attenuandū uero est corpus usque ad dies decē, deinde renutriēdum nō tarde. Si em̄ primis diebus inflāmatio nō accesserit, in uiginti diebus maxilla corroboratur. perfecte enim callo obducitur, quemadmodum

modum etiam alia ossa rara, si non corruptio infestaret. Verum de corruptionibus omnium ossium alia longa tractatio restat. Hæc extensio per agglutinamenta fiens, mitis est, & propria ad moderationem faciendam, & ad multas ac multis locis faciendas directiones accommodata. At medici non intelligentia æque ac manibus prompti, tum in alijs uulneribus, tum in maxillarum fracturis tales existunt. Varijs enim modis, & bene & male, maxillam fractam deligant. Omnis enim deligatio maxillæ sic fractæ, ossa ad fracturam magis uergentia inclinat, quam ad naturam ducit. Si uero inferna maxilla circa connectionem ad mentum diuulsa fuerit. Sola autem hæc connectio in inferna maxilla est, Verum in superna multæ. Sed non uolo sermone longius aberrare. In alijs enim morborum speciebus de his dicendum est. Si igitur connectio ad mentum disparata fuerit, ipsam coaptare cuiuslibet uiri est. Os enim quod eminet, ad internam partem digitis admotis detrudere oportet. Quod uero intro uergit, ad externam partem digitis immisis reducere. Hæc tamen extensione distendendo facere oportet. Facilius enim sic ad naturam redibunt, quam si quis ossa inter se complicans cogere conetur. Vbi uero coaptata fuerint, coniugare oportet dentes inter se hinc atque illinc, uelut prius dictum est. Curare uero cerato, & splenis paucis ac linteis. Deligationem autem breuem potius quam uariam hic locus maxime admittit. Nam ut æquilibris non est, prope tamen ad æquilibrum accedit. At linteæ obuolutionem facere oportet, si quidem dextra maxilla eminet, in dexteram. In dextram enim fieri putatur, si dextra manus deligationi præsit. Si uero altera maxilla eminuerit, aliter deligationem ducere oportet. et si quidem recte quis coaptationem adeptus fuerit, & uelut cõuenit quieuerit, cito curatio continget, & dentes illæsi manent. Sin minus, diuturnior fiet curatio, & distortionem habebit. dentes autem læsi & inutiles fiunt. Porro si nasus fractus fuerit, fracture modus non unus est. Verum qui pulchris deligationibus gaudent citra intelligentiam, tum in alijs multis damnum incurrunt, tum in fracturis circa nasum uel maxime. Ex deligationibus enim hæc maxime uaria est, & quæ plurimas ascias habeat, & interruptiones ac interceptiones cutis maxime uarias rhombiformes. Sicut igitur dictum est, qui nulla intelligentia præditi aggressione studio tenentur, ultro se offerunt ad nasum fractum deligandum. Vna itaque alteraque die lætatur medicus, gaudet quoque is qui deligatur. Deinde cito quidem is qui deligatur satiatur. Noxia enim & molesta est gestatio: satis autem est medico ostendisse, quod nasum uarie deligare non uult. facit autem talis deligatio omnia contra quam cõuenit. Partim enim qui propter fracturam simi fiunt, si superne quis magis premat, simiores nimirum fiunt. partim uero quibus nasus hæc aut illac distorquetur, aut circa cartilaginem, aut superius, palam est quod neque ipsis superne deligatio proderit, sed etiam magis lædet. Non enim ita congruit splenis altera nasi pars, quanquam neque hoc faciunt deligantes. Proximè uero deligatio resistere mihi uidetur, si iuxta medium nasum circa acutam partem, contusa caro ad os fuerit, aut etiam os parum, & non multum contusum sit. Talibus enim nasus callo obducitur, & aliquanto asperior euadit. Sed tamen neque his deligatio multo negotio opus habet, si modo etiam deligare oportet. Sufficit autem super contusionem splenium incratum extendere. Postea uelut ex duobus initijs deligatio fit, ita semel linteum circumdandum est. Optima tamen curatio est, per farinam triticeam hornam, lotam, uiscolam, subactam, modicam, ita ut talia ex illa uelut cataplasmate integantur. Si igitur triticea farina

bona

bona fuerit, & tractu facilis, ea ad omnia huiusmodi uti oportet. Si uero non facilis tractu sit, modicam mannam leuissime tritam, & aqua dilutam, cum farina subigere oportet, aut gummi parum, similiter ammiscere. Quibuscumque igitur nasus fractus est, ut deorsum & in sinu uergat, si quidem ex anteriore parte iuxta cartilaginem subsidat, fieri potest ut aliquid quod ipsum dirigat in nares indatur. Sin minus, omnia talia digitis in nares iniectis dirigere oportet, si id fieri datur. Sin minus, crassum specillum non in anteriorem narium partem digitis indere oportet, sed qua parte nasus subsidit: extrinsecus autem ab utraque parte nasum apprehendere, simulque cogere ac sursum ducere. Et si quidem ualde in anteriore parte fuerit fractura, fieri poterit ut aliquid intra nares indatur, uelut iam dictum est, nimirum lintei rasura, aut aliud quid huiusmodi, linteo inuolutum, aut potius in corio Carthaginensi consutum, ea figura quae congruat loco cui incubet. Si uero ulterius facta fuerit fractura, fieri non potest ut aliquid indatur. Si enim in anteriore parte molesta est gestatio, quomodo non sit in interiore? Primum igitur & intrinsecus conformando, & forinsecus non parcendo, ad pristina naturam reducere ac dirigere oportet. Valde enim conformatur nasus fractus, maxime quidem eadem die: sin minus, paulo postea. Verum segniter agunt medici, & leuius quam conuenit primum contingunt. Inijcere enim manus hinc atque illinc iuxta naturam nasi quam infime oportet, ex infernis sursum cogendo, et sic quam maxime erigere, una cum interna directione etiam extrinsecus dirigendo. Postea ad haec nullus talis medicus est, si studium adhibere ac tolerare uult, uelut ipsius digiti indices. Hi enim maxime secundum naturam sunt. Vtrumque enim digitorum inijcere, eoque totum nasum firmare oportet, atque ita in quiete habere, si quidem fieri posset, semper donec corroboretur: sin minus, plurimo tempore uelut dictum est. Quod si fieri nequeat, aut puer aut aliqua mulier hoc faciat, Molles enim manus esse oportet. Sic enim quam optime nasus curari poterit, ubi non in obliquum, sed ad infernam partem aequaliter subsidat. Ego igitur nullum unquam nasum uidi, qui sic fractus dirigi non potuisset, si statim ita cogeretur priusquam callus obduceretur, si modo quis recte curare uelit. Verum homines ut ne deformes fiant, multo quidem precio coemerint, studium autem adhibere non sciunt, simulque non tolerant, si non dolore uexentur, aut mortem timeant: quamquam breui tempore nasus callo obducatur. decem enim diebus corroboratur, si non corruptio insuper accedat. Quibuscumque uero os in obliquum fragitur, curatio quidem eadem est. Verum directionem non equaliter utrinque facere oportet, sed quod inclinatum est, extrinsecus cogendo ad naturam compellere, & in nares facta correctione, ea quae intro repunt impigre dirigere, donec correctae fuerint: ita ut eius probe memineris, quod si non statim corrigatur, fieri non possit ut nasus non distortus fiat. Postquam autem ad naturam reduxeris, digitos plures aut unum digitorum ad locum ad mouere oportet, qua parte eminebat, atque ita aut ipsum, aut alium quandam sustentare, donec uulnus corroboratum fuerit. Sed & in narē paruū digitorum immittere oportet, & alias atque alias impellendo ea quae inclinata sunt dirigere. At si quid inflammationis his accedat, farina subacta uti oportet: & tamen incubente etiam farina digitos similiter ad mouere opus est. Si uero iuxta cartilaginem in obliquum fractus sit, necesse est summum nasum distorti. Talibus igitur in summam narē aliquid quod dirigat ex relatis, aut quod his simile sit, indere oportet. Poterit autem quis multa idonea inuenire, quae neque odorem habeant, neque alias lenia sint. Ego uero quandoque pulmo

pulmonis ouilli frustum defectū indidi. Hoc enim forte obtingebat. Nam spō-
 giæ inditæ humiditates suscipiūt. Postea Carthaginēsis corij squamam magni
 digiti latitudine, aut prout contulerit resectam, extrinsecus ad nasum inclinātū
 agglutinare oportet, & deinde hoc corij lorū prout contulerit extēdere. Paulo
 tamen amplius extendere conuenit, quo erectus & absolute directus sit nasus.
 Lōgum aut sit hoc lorū, ut postea infra aurē abductū circum caput obducatur,
 & licet quidem lori extremitatē ad frontem agglutinare, licet etiā longius duce-
 re, & deinde capiti obductum deligare. Hic modus simul iustam directionē ha-
 bet, & simul ad moderationē faciendam promptus est, ut si quis magis aut mi-
 nus nasi inclinationē ad contrariū facere uelit. Nam quibus in obliquum nasus
 frangitur, eos in reliquis uelut relatū est curare oportet. Plurimis tamē insuper
 opus est, ut inclinationis in contrariū gratia, lorum ad summū nasum aggluti-
 netur. Quibuscūq; uero cū fractura etiam ulcera ad sunt, eos ea propter turbari
 nō oportet. Verum super ulcera ceratū picatum imponere, aut ex emplastris a-
 liquod cruentis uulneribus idoneū. Facilia enim curatu talia sunt. Similiter eti-
 am, si ossa discessura sunt. Primā directionē impigre facere oportet nihil omit-
 tendo, & directionē per digitos etiā postero tempore, ita ut laxius quidē admo-
 ueas, admoueas tamē. Ex omnibus enim corporis partibus nasus facillime con-
 formari potest. Cæterū lororū agglutinatione ac in cōtrarium inclinatione uti
 omnino nihil prohibet, siue ulcera affuerint, siue inflāmatio. Nullam enim mo-
 lestiam exhibent. At uero si auris fracta fuerit, deligationes omnes inimicę
 sunt. Neq; eīm ita laxā quis circūdare poterit. Si uero magis premat, maius ma-
 lum operabitur. Nam & sana auris deligatione pressa, dolore, & pulsatione, &
 febre afficitur. Sed & cataplasmata pessima quidem omnino sunt quæ grauissi-
 ma sunt. Verū & alia pleraq; omnia mala sunt, & abscessus inducūt, & mucum
 ampliorē suggerunt, & deinde suppurationes noxias. His aut fracta auris mini-
 me opus habet. Proximū tamen locū habet, si quid imponi debet, farina uiscos-
 sa, quā neq; ipsam grauem esse oportet. Cōtingere uero q̄ minime cōducit. Bo-
 num enim aliquādo medicamentū est, etiā nullū adhibere medicamētum, & ad
 aures, et ad multa alia. Vellicationē insuper ac scalpturā uitare oportet. Corpus
 aut attenuare, et magis in quo periculū est ne auris suppuretur, melius est quoq;
 aluū mollire. Si uero quis facile uomat, ex moderata aliqua purgatiōe uomitū fa-
 ciat. At si ad suppurationē deueniat, cito quidē aperire nō oportet. multa eīm ex
 his quę suppurari uidētur, quādoq; resorbētur, etiā si nondū quis ullū cataplas-
 ma imposuit. Si uero quis aperire cogatur, celerrime quidē sana fit, si in ulteriores
 partem perurat. Illud tamē certo scire expedit, q̄ mutila fiet auris, & minor alte-
 ra, si perusta fuerit. Si uero nō in ulteriores partē peruratur, tumidā partē nō ual-
 de parua sectione incidere oportet. Sub crassiore eīm cute pus reperitur q̄ quis
 putauerit. Verū ut in summa dicā, alia quoq; omnia mucosa, & mucos faciētia,
 utpote quæ sunt uiscosa, ad contactū sub digitis hac atq; illac cito dilabūtur: &
 propterea sub crassiore cute medici talia inueniūt, q̄ putarint. Nā et aliquas ner-
 uorū cōtortiones, ganglia appellatas, quæ sanē laxę ac fluidæ sunt, mucosamq;
 carnē habēt, multi aperiūt, humorē in talib. se inuētuos esse putātes. Medicus
 quidē igitur sentētia sua fallitur, uerū rei huiusmodi nullū ex apertione accedit
 detrimentū. Qui uero aquosi loci sint, aut muco pleni: et in qualib. locis singula
 si ape

si aperiantur mortē afferant, aut etiā alia detrimenta inducāt, de his in alio opere scribetur. Quum igitur inciderit quis aurem, ab omnibus quidē cataplasmatibus, et ab omni linamentorū usu abstinere oportet. Curare autē uel emplastro aliquo cruentis uulneribus idoneo, uel aliquo alio, quod neq; grauitatem, neq; dolorē inducat. Si enim cartilago denudari inceperit, & subsidentia purulenta aut mucosa habuerit, molestum est. Fit autē & hoc propter illas curationes. Cæterum omnium eorū quæ recruduerūt, perustio in ulteriores partem sufficientissima medela est. Verticula uero spinæ quibuscūq; in gibbū trahuntur ex morbis, pleraq; ut soluantur fieri nō potest. Insuperq; & quæ supra septi transuersi iuncturam ac connexionē gibba fiunt. Quæ uero infra, eorū aliqua soluunt uarices in cruribus fientes. Magis autē hæ uarices quæ in uena iuxta poplitē fiunt, quibuscūq; gibbositas cōtigerit, eam soluunt. Fiunt autē & in uena circa inguina. Iam uero quibusdam etiā dysenteria diuturna soluit. Et quibus quidē gibba fit spina dum pueri sunt, priusquam corpus ad augmentū plenum perfectū fuerit, his corpus iuxta spinā coaugeri nō solet. Sed crura quidē ac manus perficiuntur, illæ uero partes defectuosiores fiunt, & quibus supra septū transuersum gibbositas est, his & costæ in amplitudinē augeri non solent, sed in anteriorem partē: & pectus acutū fit, sed nō latum: ipsiq; & difficulter spirant, & stridulam faucium asperitatē habent. Nam uentriculi qui spiritū suscipiūt ac emittūt, minorem amplitudinē habent. Sed & iuxta magnū uerticulū ceruicem repādā habere coguntur, ut ne caput ipsis pronū sit. Multā igitur angustiam faucibus exhibet etiā hoc os intro uergens. Nā & his qui natura recti sunt, spirādi difficultatem hoc os inducit, si intro uergat, donec repressum fuerit. Ob talem igitur figurā eiusmodi homines eminētis gutturis, magis q̄ sani apparēt: & tuberculis circa pulmonem duris ac crudis plerūq; tales affecti sunt. Nam & gibbositatis occasio, & distentio plerisq; propter tales collectiones fit, cū quibus uicini nerui cōmunionem habent. Quibus uero infra septū transuersum gibbositas est, horū quibusdam morbi rhenū ac uesicæ accedunt. Sed & abscessus ad suppurationem, & circa laterum mollitudines, & inguina diuturni ac ægre curabiles, & neutri horū gibbositates soluūt. Coxæ uero his magis excarnes fiūt, q̄ his quibus superne gibbositas cōtigit. Vniuersa tamē spina his longior est q̄ superne gibbosis. Pubes uero & barba tardior ac imperfectior. Sed & infecundiores hi sunt q̄ superne gibbosi. At uero quibus iam aucto corpore gibbositas facta fuerit, his palam præsentis tūc morbi iudicationē gibbositas facit. per tēpus tamē, aliquid ex iisdem significationē de se plus aut minus præbet, quemadmodū etiā in pueris. Minus aut maligne in totū talia se habēt, & multi sanē iam facile ac sano modo gibbositatē sustinuerūt, usq; ad senectutē: et maxime hi quibus ad carnositatē ac pinguitudinē promotū fuerit corpus. pauci tamē talium sexaginta annos trāsgressi sunt, pleriq; uero breuioris uitæ sunt. Quibusdā etiā in latus, aut hanc aut illā, uerticula obliqua fiunt. Et omnia aut pleraq; talia, propter collectiones intra spinā fiunt. Quibusdam unā cū morbo etiam figuræ insuper cōferunt, ad quas reclinari cōsueuerunt. Verū de his in diuturnis pulmonis morbis dicitur. Illic enim de his quæ futura sunt, pulcherrimæ prænotiones habentur. Porro quibus ex casu spina gibba fit, horū sanē pauca superātur, ita ut dirigi possint. Nam quæ in scāla fiunt extensiones, nihil direxerunt quod ego sciam

sciam. Vtuntur enim ipsa maxime hi medici, qui multitudinis famam aucupantur. Apud tales enim hæc in admiratione sunt, si aut pendentem, aut proijci aliqueum aut quæ his similia sunt uideant, & hæc celebrant semper; neque ipsis curæ est quale quid eueniat ex hac aggreſsione, siue bonum id sit, siue malum. Medici tamen qui talia studio habent, quos sanè ego noui, imperiti sunt. Inuentum equidem uetus est, & laudo sanè uehementer eum qui primus excogitauit & hoc machinamentum, & quoduis aliud secundum naturam inuentum. Nihil enim despero, si quis rectè constructum concutiat, fieri posse ut quædam dirigantur. Ipse tamè omnia huiusmodi hoc modo curare erubui, propterea quod impostorum magis tales sunt modi. Quibus igitur prope ceruicem gibbositas fuerit, his uerisimile est has in caput exteſiones minus prodesse, paruim enim pondus habet caput, & summi humeri deorsum uergentes. Verum tales uerisimile est magis dirigi posse, si in pedes concutiantur. Ita enim maior propensio ad huiusmodi fieret. Quibus autè magis inferius gibbositas est, hos par est ut magis in caput concutiantur. Si quis igitur concutere uolet, rectè sanè hoc modo præparare poterit. Scalam coriaceis, aut laneis puluinaribus insternere oportet probe alligatis, paulo amplius & in longitudinè, & in utranque partem, quàm quantum corpus hominis occu-parit. Deinde hominem supinum supra scalam reclinare, et postea pedes quidem alligare iuxta malleolos ad scalam non disparatos, uinculo quidem satis ualido, uerum molli, alligare uero etià oportet infra & supra utrumque genu, itemque circa coxas. Circa laterum autè mollitudinè, & circa pectus, laxas fascias circumdare, ita ut ne impediunt concussione. Manus uero ad costas extētas, ad corpus applicare, & non ad scalam. Vbi uero hæc præparaueris, scalam ita ad turrim aliquam altam, aut ad domus lacunar attrahere oportet. Locus autè in quo concussione facis, renitens sit. Eos uero qui extendunt probe doctos esse cōuenit, quo æqualiter, & probe, & ex æquilibrio, ac derepente demittant, ut neque scala in alteram partem repens ad terram deueniat, neque ipsi proni sint. Quod si tamen à turri, aut malo defixo carchesium habēte, quis demittat, adhuc melius præparabit, ita ut ex trochlea aut asello laxatis instrumentis ac funibus demissio fiat. Verum iniucundum est de his longius uerba facere: attamen ex his structuris maxime quis concuti poterit. Si uero ualde superne fuerit gibbositas, & concutere sit opus, omnino in pedes id faciendum est, uelut dictum est. Ita enim maior propensio ad hæc contingit. Et firmare quidem oportet iuxta pectus ad scalam fortiter deligendo, iuxta ceruicem uero fascia quàm laxissima, directionis saltē gratia. Sed & ipsum caput iuxta frontē ad scalam alligare oportet, manus autè porrectas ad corpus alligare, non ad scalam. Reliquum uero corpus indeligatum esse oportet, nisi quantum satis est directionis gratia, alia atque alia laxa fascia circumdatum esse. Verum considerandum est ne concussione impediunt hæc uincula. Crura uero ad scalam quidem ne deligentur, sed inter se, ita ut secundum spinam in directum uergant. Atque hæc quidem hoc modo facienda sunt, si omnino opus fuerit in scala concussione fieri. Turpe tamen est & in omni arte, & non minime in medicina, multam turbam, & multam ostentationem, & multum rorem cōcitare, & deinde nullam utilitatem asferre. Oportet autè primum spinæ naturam qualis est cognoscere. ad multos enim morbos ea opus fuerit. Nam qua parte ad uentrem uergit, uerticula intus inter se paria sunt, & inter se ligata uinculo mucoso ac neruoso de cartilaginibus.

exorto usq; ad medullā. Alij uero nerui neruosi perpetui annexi, hinc atq; illinc iuxta ipsa porriguntur. Verū uenarum & arteriarū cōmunitates, in alio sermone declarabūtur, quot & quales sint, & unde proficiſcātur, & in qualibus qualia possint. Itemq; quibus inuolucris ipsa medulla intecta sit, & unde profectis, & ubi definētibus, & quibus cū communionē habentibus, & qualia potentib. At in ulteriore parte in articulis uerticula inter se cardinis in modum cōserta sunt. Nerui uero cōmunes iuxta omnia, & in externis, & in internis partibus porrigūtur. Et processus ofsis ad externā partem, ab omnibus uerticulis unus de unoquoq; tum à maioribus, tū à minoribus. In his aut processibus cartilaginū appēdices, et ex illis neruorū progerminatio, cognata ac cōsimilis extremis neruis. Costæ uero annexæ sunt, ad internā partem magis q̃ ad externā capitibus uergentes: ad unūquodq; aut uerticulū adarticulatæ sunt. Curuissimæ aut sunt hominis costæ obtorto modo. Intermediā uero partē costarum & ofsiū de uerticulis procedentiū, explent utrinq; muscoli, à ceruice initio sumpto, usq; ad septi trāsuersi annexionē. Ipsa aut spina secundū longitudinem rectobliqua est, à sacro quidē osse usq; ad magnū uerticulū, iuxta quod crurū annexio depēdet, gibbosa est. Nam & uesica, & genituræ, & intestini recti laxa pars, in hac parte cōstituta sunt. Inde uero usq; ad septi annexionē, in directū repanda est, & musculos ad nates habet solus hic locus, ex internis partibus, quos lūbarios uocāt. Ab hac aut parte usq; ad magnū uerticulū, quod supra supernas humeri partes est, è directo gibbosa est, imò magis esse uidetur q̃ est. Nam spina media sui parte, altissimas ofsium propagines habet, hinc autem atq; illinc, minores. Ipse uero ceruicis articulus repādus est. Quibuscūq; igitur gibbositates iuxta uerticula fiunt, his expulsio magna à cōnexionē abrupta, unius aut pluriū uerticulorū, non ita multis, sed paucis cōtingit. Neq; enim talia uulnera fieri facile est, neq; ad externam partem expelli facile est, si nō ex anteriore parte, forti aliqua re per uentrē quis uulneratus fuerit: Sic aut utiq; perierit: aut nisi quis ex alto loco de lapsus, coxis aut humeris impegerit. Sed & hic utiq; morietur, etiā si statim nō intereat. At ex posteriore parte ad internam, huiusmodi expulsionē fieri nō est procliue, si nō in immēsum graue aliquod onus irruat. Nam ex ofsibus quæ foras enata sunt, unūquodq; eiusmodi est, ut prius ipsum frangatur, q̃ magnam intro inclinationē faciat, ita ut & ligamēta, & articulos inter se alternatos ac articulatos uiolet. Præterea & spinalis medulla affligeretur, si ex modico loco inflexionē haberet, ubi uerticulū tali expulsioe exiluisset: & uerticulū quod exiluisset, spinalem medullā utiq; premeret, si non etiam abrūperet: At ea pressa ac intercepta, multarū & magnarū & nobiliū partiū torporē induceret. Quare neq; curæ foret medico, quomodo uerticulū dirigat ac coaptet, quū multa & uiolenta alia mala adsint. Itaq; si tale cōtingat, palām est q̃ neq; concutiendo, neq; aliquodā modo, reponi possit, nisi quis dissecto homine, & manu in uentrē incerta inquisitionē faciat, & ex interna parte ad externā manu retrudat. atq; hæc in mortuo quidē fieri possent, in uiuo aut nō ita. Cur igitur hæc scribo? Quia sunt quidā qui putāt se curasse homines, quibus intro exciderint uerticula articulos penitus trāsgressa: & sanè facilimā hāc distortionē esse, ut quis inde cōualescat, aliqui cēsent, eāq; nulla repositione opus habere, sed sua sponte talia sanescere. Ignari aut multi sunt, & lucro hoc habēt quod ignorāt. Persuadent enim alios.

Verum

Verum falluntur hi hac de causa. Spinā quæ in spina ipsa eminet, uerticula ipsa esse putant, quia unūquodq; ex his ossibus ad contactū rotundū apparet, ignorantes, quod hæc ossa sunt ea quæ à uerticulis enata sunt, de quibus paulo ante dixi. At uerticula lōge magis in anteriore partē absunt. Angustissimū enim uērem ex omnibus animalibus homo habet, quantū ad magnitudinē attinet, à posteriore ad anteriore partē, insuperq; etiā iuxta pectus. Quū igitur horū supereminentiū ossium aliquod uehemēter fractū fuerit, siue unū, siue plurā, ea parte humilior locus redditur, q̃ hinc atq; illinc; et propterea decipiūtur putantes uerticula intro abiisse. Decipiunt autē insuper ipsos etiā figuræ uulneratorū. Si enim inclinare se conātur, dolent; quū ea parte qua uulnerati sunt, cutis sit circūtentā; & simul ossa fracta ita magis corpus affligūt. Si uero in repandū recuruantur, melius habent. Nā & cutis iuxta uulnus laxior sit, et ossa minus affligūt. Sed & si quis ipsos contingat, ea parte repādi cedūt, & locus uacuus ac mollis hac parte ad cōtactum apparet. Hæc omnia relata insuper medicos decipiūt. Verum tales cito sani & illæsi sua sponte fiunt. Cito enim omnia eiusmodi ossa quæ laxa sunt, callo obducūtur. Obliquatur igitur spina etiam sanis iuxta multos modos. Nam & in natura, & in usu ita se habet. Sed & præ senectute, ac dolorib. Nam hæc colligādī uim habēt. At gibbositates ex casibus cōtingentes plerūq; fiūt, si aut in costas innitatur ac impingat, aut in humeros cadat. Necessē est em̃ foris apparere in gibbositate unū aliquod altissimū uerticulum, minus uero ea quæ sunt hinc atq; illinc. Non igitur profilit multū ab alijs, sed parū, quū singula acruatim cōcedant. Propter hoc igitur etiā spinalis medulla eiusmodi distortionē facile fert, eo quod circularis ipsi distortio cōtingit, nō angularis. Oportet autem fabricā instrumēti coactorij huiusmodi cōstruere. Licet equidē lignū robustū & latum, incisurā oblōgam habēs, defodere. Licet etiā pro ligno, in pariete incisuram oblōgam facere, quæ aut cubiti altitudine, aut prout cōgruum fuerit, à pauimento extet. Postea colūnam querneā, quadrangulārē, obliquā ad parietē adijcere oportet, tāto spacio in medio relicto, ut aliquis pertransire possit, si forte opus sit. Et super colūnam quidem, aut tunicas, aut aliud quid molle, quod tamē non multū cedat, insternere oportet, homini uero fomētum adhibere. Si uero admittat, ipsum etiā lauare. Deinde pronū extentum reclinare, & manus ipsius secūdum naturā extētas ad corpus alligare. Postea uero loro molli satis lato ac longo, ex duobus perpetuis inter se aduersarijs loris constante, ex media ipsius parte, iuxta mediū pectus q̃ proxime sub alas, bis circūdare oportet; & quod superest de loris utrisq; iuxta alā circū humeros obuoluatur, & initia ipsorū ad lignum quoddā pistilloforme alligētur, ita ut cōgruant secūdum lōgitudinē subiectæ colūnæ, ad quā lignū illud pistilloforme apponere, & renitēdo extensionē facere oportet. Tali uero quodā alio uinculo & supra genua, & supra calcanea alligato, initia itē ad eiusmodi lignū alligare oportet. Postea autē alio loro lato ac molli & robusto fasciæ formā habente, longitudinēq; ac latitudinem sufficientē, partem inter coxas & lūbos, q̃ proxime ad coxas, circūcirca fortiter deligare, atq; ita tum huius lori, tum aliorū duorū capita, ad lignū à pedibus extās alligare. & postea in hac figura hinc atq; illinc, æqua simul inclinatione, simulq; in directū extensionē facere. Nullū enim magnū malum talis extensio induxerit, si cōmode præparata fuerit, nisi quis de industria se extēden-

dum exhibeat. At medicus, siue alius quisquā fortis & nō imperitus, imposita manus uola supra gibbū, & altera manu insuper alteri superimposita, deorsum cogat, animaduersione habita an in directum deorsum cogere oporteat, siue ad caput, siue ad coxas. Atq; hæc coactio maxime innoxia est. Sed & si quis insideat super gibbū, & attollendo se dum ille distenditur incutiat, innoxium est. Neq; quicquā prohibet pede inscendere ac gestari supra gibbū, atq; ita sensim incutere. Ad hoc autē moderate faciendū idoneus quis fuerit ex his qui in palestra adfuerunt. Efficacissima tamē coactio est, si aut paries incisurā habeat, aut lignū defossū infra spinæ altitudinē incisum sit, quantū moderate habere uideatur, ita ut tabula tiliacea, aut cuiusdam alterius ligni, nō tenuis, incisuræ indatur, & postea linteū quoddā multiplex, aut paruū quoddam coriaceū puluinar, super gibbū imponatur. Quam paucissima tamē imposita esse cōducit, cauendi saltē gratia, ut ne tabula præ duricie dolorē aliquem importune inducat. Sit autē gibbositas ē directio maxime incisuræ in pariete, quo qua parte maxime extat, ea q̄ maxime tabula imposita premat. Vbi uero imposita fuerit, aliquis extremā tabulæ partē deprimat, aut duo hoc faciant, si unus nō suffecerit. alij uero corpus secundū longitudinē uelut dictum est extēdant, partim hinc, partim illinc cōstituti. Potest etiam a sellis extensio fieri, aut iuxta lignū defossis, aut in ipso ligno a sellorū postibus cōstructis, siue erectos uelis utrinq; paululū supereminentes, siue hinc atq; illinc iuxta ligni uerticē. Hæ coactiones moderationē admittunt, ut & uehemētissime, & moderate fieri possint. Talem autē uim habēt, ut si quis etiam ad perniciem tales necessitates adhibere uelit, & nō ad curationem, tunc quoq; multū possint. Nam si quis secundū longitudinē hinc atq; illinc saltē sic extendat, & nullā aliam necessitatē addat, tamen sic etiā extensionem facere poterit. Sed & si nō extendat, & tabula solum ita quis utatur, etiam sic sufficienter deorsum cogere poterit. Bonæ autē sunt huiusmodi uiolentiæ, quibus & uehemētioribus & debilioribus utilicet, usu ipsorū prout quisq; uult moderato. Et sanē etiam secundū naturam coactionē faciunt. Nam ea quæ extant, ad locum suū redire cogit depressio. Quæ uero præter naturā coiuerunt, ea extendūt extensiones secundum naturā. Proinde neq; meliores his necessitates ego habeo, neq; iustiores. Rectitudo enim extēisionis iuxta ipsam spinam, inferne & iuxta os sacrū appellatum, nullā ansam habet: superne uero iuxta ceruicē & caput, habet quidē ansam, sed in speciē indecora est: & si hac parte extēisio fiat redūdans, etiā alias læsiones inducere poterit. Experimentū autē aliquando feci, ut homine supino extēto, utrem nō inflatum sub gibbū subderem, & postea folle ex officina fabri in subiectū utrem immisso inflarem. Verū res mihi nō successit. Quū enim bene extēderem hominē, uincebatur uter, & non poterat flatus aliqua coactionē facere. Sed & aliās hæc res prōpta erat ad dilapsionē, nimirū quū in idem & hominis gibbositas, & utris pleni incurua turgiditas cogātur. Quū autē rursus nō ualde extēderem hominē, uter quidem præ flatu incuruus turgēbat, homo uero omnino magis q̄ conducebat repandus fiebat. Scripsi autē hoc de industria. Pulchrū enim est etiā ea discere quæ in experimentū assumpta successu caruerūt, & cur successum nō habuerūt. Quibuscunq; porro uerticula intro obliquātur, aut ex casu, aut graui aliqua re illapsa, his nullū quidem uerticulū extat plerūq; ita multū ab alijs. Si uero extiterit multū, aut unū aut plura,

mortem

mortē inducūt, uelut etiā antea dictū est. Circularis etiā hæc, & nō angularis e-
 motio existit. Vrinæ igitur talibus magis supprimūtur, itēq; alui egestio, q̃ his
 qui extra gibbosi sūt; & pedes ac tota crura magis perfrigerātur, et lethalia sunt
 hæc magis q̃ illa quæ dixi. Sed & si superstites euadūt hi, magis profluam uris
 nam habent, & cruribus impotētiore ac torpidiores fiunt. Si uero etiā in su-
 perna parte magis repandi siant, totius corporis impotētia ac torpor accedit.
 Atq; ego sanè nullam machinā habeo, per quam talia in idem restitui possint, si
 nō alicui concussio per scalam opē tulerit, aut etiā alia quædam eiusmodi cura-
 tio aut extēsisio, qualis est ea quæ paulo antea relata est. At coactionem unā cum
 extēsiōne nullā habeo, quæ sanè fieri ita posset, uelut in gibbo tabula coactionē
 faciebat. Quomodo enim quis ab anteriore parte per uētre coactionē facere
 possit? Neq; enim fieri hoc potest. Sed neq; tusses, neq; sternutationes ullā uim
 habent, ut extēsiōni auxiliari possint. Nec uero flatus immisio in uentrē quic-
 quā efficere poterit. Quin & si magnæ cucurbitę affigātur, attractionis nimirū
 gratia uerticulorū intro repentiū, magno hoc mētis errore cōtingit. Propellūt
 enim magis q̃ attrahūt, & neq; hoc animaduertūt hi qui ipsas affigūt. Quanto
 enim magis ipsas quis adigit, tātō magis repandi sūt hi quibus affigūtur, cūte
 simul sursum coacta. Possem aut & alios cōcussionum modos, q̃ hi sunt quos
 antea retuli, exponere, quos sanè affectioni magis cōuenire quis putare possit,
 uerū non ualdē ipsis fidem habeo, & propterea nō scribo. In summa igitur de
 his quæ relata sunt, ita acruatim cōstituere oportet, q̃ ea quidem quæ in repa-
 dum emota sunt, lethalia sunt ac noxia: quæ uero in gibbū, innoxia in totum,
 quantū ad mortē, & urinæ suppressiōnē ac torporē attinet. Nō enim riuos qui
 sunt in uētre gibbositas ad externā partem intēdit, neq; fluidos esse prohibet.
 Repanditas uero ambo hæc facit, et ad alia multa hæc accedūt. Nam multo plu-
 res & cruribus & manibus impotētes fiunt, & corpore torpescūt, & urinæ his
 supprimūtur, quibus gibbositas quidē neq; extra neq; intro extiterit, uerū in re-
 ctitudinem spinæ uehemēter cōculsi fuerint. Quibus uero gibbositas extat, hi
 minus talia perpetiūtur. Multa uero etiā alia in medicina quis uidere poterit, ex
 quibus ea quidē quæ fortia sunt, innoxia sunt per se totā morbi iudicationē in-
 ducētia: quæ uero debiliora, noxia, ita ut & diuturnos morbos progenerēt, &
 cum reliquo corpore ampliorem cōmunionem habeant. Nam et costarū fractu-
 ra eiusmodi quid perpetiūtur. Quibus em fracta fuerit costa una, aut plures, ue-
 lūt plurimis fragitur, ita ut ossa ad internā partem non uergant, neq; denudata
 sint, ex his pauci iam febricitarūt. Sed neq; sanguinē multi iam expuerūt, neq;
 suppurati multi fiunt, neq; curatione medicamentorū ex illitis linamētis opus
 habent, neq; ossiū corruptiones accedūt, & uictus uulgaris sufficit. Si enim fe-
 bris cōtinua ipsos nō corripuerit, etiam uasa per inediā his uacua fieri deterius
 est, q̃ si nō uacua siant. Maiorē item dolorē ac febrem & tussim inducit. Mode-
 rata enim uentris repletio, costarū sit directio. Verū uacuatio pendentes costas
 facit, & hæc dependentia dolorē inducit. Extrinsecus aut uulgaris deligatio ta-
 libus sufficit, ita ut cerato, et splenijs, et linteis, plana deligatio placide firmetur,
 aut etiam laneū quiddā in super imponatur. Corroboratur aut costa diebus uis-
 ginti. Celeriter enim his ossibus calli obducūtur. At cōtusa circa costas carnē,
 aut ex plaga, aut ex casu, aut renisu, aut alio quopīā eiusmodi, multi iam multū

sanguinem spuerunt. Riui enim in molli ad unamquāq; costam extenta parte, & nerui, à principalissimis in corpore partibus progressus habent. Multi itaq; iam tussiculosi, & tuberculosi, ac suppurati facti sunt, & linamētis opus habuerunt, & costa ipsis corruptionem sensit. Sed & quibus nihil tale accessit, carne circa costas contusa: tardius tamē dolor in ipsis sedatur, quā in his quibus costa fracta fuerit: & in talibus uulneribus locus dolorum recidiuas magis habet. Proinde aliqui tales noxas magis contemnunt, si costa ipsis fracta fuerit. Quin & curatione exactiore tales indigent, si modo sapiant. Victum enim contrāctum esse cōducit, & corpore quā maxime quiescere, et à uenere abstinere, edulijscq; pinguibus, & fauces exasperātibus, ac fortibus omnibus: Venamq; in cubiti flexura secare, & quā maxime silere. Deligare uero locum contusum conducit splenis nō multiplicibus, sed multis & multo latioribus tota contusione, & cerato sublinere, & linteis latis cum fascijs latis ac mollibus deligare, & moderate firmare, ut deligatus nō ualde se compressum esse dicat, neq; rursus laxum. Initium autem sumere debet qui deligat in ipsa contusione, atque isthic maxime firmare. faciēda uero est deligatio uelut à duobus initijs, deligandumq; ut ne circumflua sit cutis circa costas, sed æquilibris. Deligādum autem aut singulis aut alternis diebus. Præstat autem & aluum mollire leui aliquo medicamento, cibi saltem euacuandi gratia: & ad decem quidem dies attenuare. Postea uero corpus renutrire ac tenerum facere. Quandiu uero attenuas, deligatione magis firmata utendū est. Quum autem ad teneritudinem deducis, laxiore. Et si quidem sanguinem ab initio expuerit, quadraginta dierum curationem ac deligationē facere oportet. Si uero sanguinem non spuat, sufficit uiginti diebus ut plurimum curatio. Verum ex robore uulneris tempora coniectare oportet. Qui porro tales contusiones neglexerint, etiam si aliud nihil maioris mali ipsis contingat, tamen locus contusus mucosiores carnem habet, quā antea habebat. Vbi uero tale quippiam relinquitur, & curatione non probe exprimitur, deterius quidem est si iuxta ipsum os mucositas relicta fuerit. Neq; enim caro amplius similiter os contingit, & os ipsum morbosius redditur, & corruptiones ossis diuturnæ, multis iam ex huiusmodi occasiōibus factæ sunt. Sed & si iuxta os non fuerit, uerum ipsa caro mucosa sit: attamen etiam sic recidiuæ, ac dolores, aliæ atq; aliæ fiunt, si quis forte corpore ægrotauerit. Quapropter deligatione uti oportet bona, simulq; multum conueniente, quo ad ea humoris effusio, quæ in cōtusione facta est, resiccetur ac resorbeatur, locus autem carne sana augeatur, & ossis quoq; caro augeat. At quibus ex neglectu uetustatem contraxerit, ita ut locus sit dolorosus, & caro submucosa, his uisio medela optima est. Et si quidem ipsa caro mucosa fuerit, usq; ad os urere oportet, non tamē ut os percalescat. Si uero inter costas mucositas fuerit, ne sic quidem in superficie urere oportet, cauere tamē ne in ulteriorem partem peruratur. Si uero ad os ipsum contusio esse uideatur, & sit adhuc recens, & nondum os corruptionem sentiat: si quidem parua admodū fuerit, sic urere oportet ueluti dictum est. Si uero oblonga fuerit iuxta os contusionis eleuatio, plures crustas incutere oportet. Cæterum de corruptione costæ, unā cum eorum qui linamentis opus habent curatione, dicitur. Si uero femoris articulus ex coxa exciderit. Excidit autem iuxta quatuor modos, intrò quidem sæpe, for-

ras autem præ alijs sæpe. Verum in posteriorem ac anteriorem partem excidit quidem, sed raro. Quibus igitur intro excesserit, his longius apparet crus, si ad alterum comparatur, atque hoc merito, propter duas causas. Nam os quod à coxa procedit, & sursum ad pectinem fertur, fundamentū sit capitis femoris, & articuli cervix in acetabulo uehitur: & nates forinsecus cauæ apparent, ut potest quum intro cesserit femoris caput. Et rursum summa femoris pars iuxta genu, extra repere cogitur, Tibia item, & pes, eodem modo. Quum igitur foras repat pes, medici ob imperitiā, sanum pedem ad hunc adhibent, & non hunc ad sanum: & propterea multo longius læsum crus apparet quàm sanum. Multis autem etiam alijs locis talia sinistram intelligentiam habent. Nec uero flectere iuxta inguen similiter ut sanum possunt. Sed & si femoris caput in interfœmineo contingatur, palam extuberare cōperitur. Signa igitur hæc sunt, in his quibus femur intro excidit. Quibus igitur articulus elapsus non fuerit repositus, sed aut frustra tētatus est, aut neglectus, his & ambulatio per cruris circumuolutionem, uelut in bobus fit, & plurima uexatio ipsis in sano crure contingit: & coguntur iuxta lateris mollitudinem, aut iuxta elapsū articulum, mutili ac obliqui esse. Iuxta sanum uero crus, nates ad externam partem rotundæ esse coguntur. Si quis enim sani cruris pede extra ambularet, protruderet utique reliquum corpus, ut ad læsum crus ueheretur. Læsum autem uehere hoc non poterit. quomodo enim posset? Cogitur igitur sic sani cruris pede intro ambulare, & non extra. Ita enim maxime uehit sanum crus, & suam ipsius, & læsi cruris, partem corporis utrisque incumbentem. Quum autem iuxta lateris mollitudinem, ac iuxta articulum cauentur, parui apparent, & baculo inniti coguntur à latere iuxta sanum crus. Hac enim parte fulcimento opus habent. Ad hanc enim & nates repunt, & in hac corporis pondus uehitur. Coguntur item se inclinare. Manum enim quæ est à parte cruris læsi, ad obliquum femur firmare coguntur. Non enim potest læsum crus uehere corpus, in crurum permutatione, si non detineatur dum ad terram premitur. In his igitur figuris esse coguntur hi quibus intro elapsus, non fuerit repositus articulus, homine non præmeditante ut quàm facillime sit figuratus. Sed ipsa hæc calamitas ex præsentibus ea quæ facillima sunt eligere docet. Nam & qui ulcus habent in pede aut tibia, non omnes crure ualde ingredi possunt. & infantes sic iter faciunt, extra enim ingrediuntur læso crure. Et duplex lucrum consequuntur. Duplici enim opus habent. Nam & corpus non similiter uehitur in eo crure quod extra ingreditur, sicut in eo quod intro. Non enim secundum rectitudinem ipsi incumbit pondus, sed multo magis ei quod subingreditur. Ipsi enim è directo incumbit pondus, tum in ipsa ambulatione, tum in crurum permutatione. In hac enim figura sanum crus celerrime supponere poterit, si eo quod læsum est, exterius: sano interius ingrediatur. Verum de quo nunc sermo est, Bonum est ut corpus ipsum sibi ipsi facilimas figuras inueniat. Quibus igitur nondum perfectis ad augmentū, elapsus articulus non fuerit repositus, his femur decurtatur, & tibia, & pes. Neque enim ossa similiter in longitudinem augescunt, sed breuiora fiunt. Maxime autem femoris. Excarne item & emusculatum, ac effœminatum & tenuius totum fit crus, simul quidem propter priuationem loci articuli, simul autem quod eo uti non possunt, eo quod secundum

naturā situs nō est. Vfus enim aliquis liberat ab effceminatione, liberat etiā alia quantū ab intercepto in longitudinē augmento. Maxime igitur lædūtur hi quibus dū in uētre sunt, hic articulus fuerit luxatus. Secundo loco hi quibus ualde infantibus idem cōtingit. Minime uero hi qui perfecti sunt. Qualis igitur ambulatione perfectis cōtingat, dictum est. Quibus uero dum infantes sunt calamitas hæc incidit, pleriq; ad corporis directionē tardi sunt, immo male ad sanū crus deuoluūtur, manu quæ est ad sanū crus, ad terrā se fulciētes. Sed & ex perfectæ ætatis hominibus quidā, quibus hæc calamitas cōtingit, ad ambulationē rectam cūctantur. Quicūq; uero infantes hac calamitate pressi, recte educati fuerint, sano quidē crure in rectū utuntur, uerū sub alam secundū sanum crus scipionem ferūt, aliqui etiā sub utrāq; alam. Crus autē læsum eleuatū habent, & tanto melius habent, quanto breuius ipsius læsum crus fuerit. Sanum autē crus nihilo minus ipsis robustum est, q̃ si ambo sana essent. Effceminantur tamē omnibus talibus carnes cruris, & plerūq; hoc magis perpetiūtur hæc quæ sunt ab externa parte, quā quæ ab interna. Cæterū quidā fabulantur Amazonides masculam suā sobolem statim dum infantes sunt luxare, alias circa genua, alias circa coxas, quo nimirū claudi fiāt, & masculū genus fœmineo insidias nō struat. Utuntur itaq; his pro opificibus, ad coriaria, aut fabrilia, aut alia sedetaria opera. An equidē uera hæc sint, ego nō noui: quod autē tales fiant, scio, si quis ipsos statim dum infantes sunt luxet. Iuxta coxas igitur magna differentia est, an extra, aut intro fiat luxatio. Iuxta genua uero, differētia quidem aliqua est, sed minor. Modus autē utriusq; claudicationis proprius est. Decurtantur enim magis hi quibus extra luxatio facta est. Recti autē minus stant, quibus intro luxatio cōtingit. Eodem modo etiā si iuxta malleolū luxatio fiat, si quidem ad externā partem id cōtingat, mutili quidē fiunt, uerum stare possunt. Si uero ad internā, ualgi quidem fiunt, minus autē stare possunt. At uero coactio ossium talis fit. Quibus quidē circa malleolum tibiæ os excelsit, his pedis quidē ossa minime coaugescūt. hæc enim proxime ad uulnus sunt. Verū tibiæ ossa augentur quidem non multo defectuosius, carnes tamen minuūtur. Quibus uero iuxta malleolum māsērit articulus secundū naturam, iuxta genu autē excesserit, his tibiæ os similiter coaugescere nō solet, sed breuius fit. Hoc enim proxime ad uulnus est. Pedis autē ossa minuuntur quidem, sed nō similiter, uelut paulo ante dictum est, quia articulus circa pedē saluus est. Si uero ipso etiā uti possent, uelut mutilo, minus adhuc pedis ossa his minuerentur. At quibus circa coxā luxatio contingit, his femoris os nō similiter coaugescere solet: Hoc enim proxime ad uulnus est: sed breuius sano fit. Tibiæ tamē ossa nō similiter his augmēto destituuntur, neq; ossa pedis. atq; hoc ea de causa, q̃ femoris articulus qui ad tibiā est, & tibiæ articulus qui ad pedē est, in suā natura manet. Carnes tamē minuūtur his totius cruris. Si uero uti crure possent, adhuc magis ossa augerētur, uelut etiam prius dictū est, excepto femore, & minus excarnes essent. Multo tamen minus carnosī q̃ hi qui sunt essent. Argumēto autē q̃ talia ita se habēt, hoc est. Quicūq; enim brachio elapso, mustellæ cubito præditi sunt, paruūq; ac macilentū brachiū habent, aut ex natiuitate, aut etiā dū augescūt, priusq̃ perfecti euadāt, galeancones appellati, hi os quidem brachij breue habent, cubitū autē & summam manū paulo defectuosiorē q̃ sani, propter relatas causas, eo quod brachiū uul-

nerato articulo proximū est, ut ideo breuius factū sit. Rursus aut cubitus propterea nō similiter calamitatē percipit, quia brachij articulus qui est ad cubitū, in ueteri natura manet. Et rursus manus adhuc longius abest à calamitate q̃ cubitus. Propter has igitur causas cōtingit, ut & ossa quæ nō coaugētur, nō coaugescāt, & quæ coaugentur, coaugescāt. Cæterū ad carnositatē & manū & brachio multū profuerit, si quis manu laborādo se fatiget. Quæcūq; enim manū opera sunt, plurima ex ipsis Galeancones hac manu operari conātur, uelut altera possunt, & nihilo defectuosius q̃ cū illæsa efficiunt. Nō enim supra manus, uelut supra pedes, corpus uehi necesse est. Verū leuiā sunt ipsis opera. Propter usum aut non minuitur carnes galeanconibus, neq; circa manū, neq; circa cubitum. Sed & brachiū propterea aliquā opem sentit ad carnositatē. Quū autem coxa eluxata fuerit ad internā partē à natiuitate, aut adhuc infanti, carnes ideo magis minuitur q̃ in manu, q̃ crure uti nō possint. Quod aut hæc hoc modo se habeant, testimoniū unum quoddā in paulo posterius referendis habebitur. At quibus in exteriorē partem femoris caput excesserit, his crus breuius apparet, si ad alterū extendatur, atq; id merito. Nō enim super os fundamentū fit capitis femoris, sicut quum intro excidebat, sed iuxta os quod inclinātā naturam habet, in carne humida ac cedente firmatur. & propterea quidem breuius apparet. Intrinsecus aut iuxta plechada, intermediā crurū ac inguinū partem, femur magis mutilū & excarne fit. Nates aut extrinsecus incuruiores, utpote quū extra femoris caput elapsū sit. Sed & superius apparēt nates, utpote quum caro quæ isthic est, femoris capiti cesserit. Sūma uero femoris pars circa genu, intro reperi uidetur, Tibia itē & pes. Sed neq; inflectere uelut sanū crus possunt. Et signa quidē femoris extra elapsi hæc sunt. Quibus igitur perfectis iam elapsus articulus nō fuerit repositus, his totū crus breuius apparet. In ambulatione aut calcaneo terrā pertingere nō possunt. Verū pectore pedis in terra cōsistunt ac progrediuntur, parū aut ad internam partem summis digitis uergunt. At crus læsum in his multo magis corpus uehere potest, q̃ quibus ad internā partē excidit, partim quod caput femoris, & ceruix articuli, quū natura obliqua sit, sub multam coxæ partē subsistit; partim q̃ summus pes nō ad externā partem inclinatū esse cogitur, sed prope est ad rectitudinē corporis, & tendit etiā interius. Quū igitur semitam ac callem acceperit articulus, in carne ad quā elapsus est, & caro uiscositatē contraxerit, doloris exors progressu tēporis fit. Quū aut doloris exors factus fuerit, possunt quidē absq; baculo iter facere, si aliās uoluerint. possunt aut & uehere corpus supra crus læsum. Itaq; propter usum, carnes talibus minus effoeminātur, q̃ illis de quibus paulo ante dictū est. Effoeminantur aut aut plus, aut minus. Magisq; adhuc effoeminātur plerūq; iuxta internā partem q̃ iuxta externā. Pleriq; tamē ex his calceamentū sibi inducere nō possunt, propter cruris inflexibilitatē. Quidā uero etiā hoc possunt. At quibus dum adhuc in uētre sunt, hic articulus fuerit luxatus, aut dū adhuc augescūt, ui elapsus, nō fuerit repositus, aut etiā præ morbo hic articulus excesserit ac luxatus fuerit: multa enim huiusmodi sūt: taliū quibusdā si corruptionē senserit femur, supputationes diuturnæ & linamētis indigētes fiunt, & aliquibus ossiū denudationes. Similiter aut & quibus corruptionē femoris os sentit, & quibus nō sentit, multo breuius fit, & uelut sanū coaugescere nō solet. Tibiæ tamē ossa breuiora quidem

quidē sūt q̄ alterius tibiā, sed paululū, ob causas antea relatas. Ambulare uero tales possunt, & quidā ex ipsis eo modo quo perfecti, quibus elapsus articulus repositus non est. aliqui uero etiā toto pede cōsistentes progrediūtur, declināt tamen inter ambulandū propter cruris breuitatē coacti. Hęc autē hoc modo sūt, si diligēter educati fuerint in figuris, & recte in quibus oportet, priusq̄ ad iter faciendū corroborati fuerint. diligēter item & recte, postq̄ corroborati fuerint. Plurima autē diligētia opus habēt hi, quibus dū maxime infantes sunt, hęc calamitas cōtigerit. Si enim neglecti fuerint dū infantes sunt, inutile penitus, & omni augmento priuatū, totū crus euadit, & carnes totius cruris magis minuitur q̄ sani. Multo tamē minus his minuitur q̄ illis quibus intro excidit, propter usum & laborē, ita ut statim crure uti possint, uelut etiā paulo ante in galea noncibus dictū est. Sunt autē aliqui, quibus partim statim à natiuitate, partim præ morbo, amboꝝ crurum articuli exciderūt ad externam partem. His igitur ossa quidē easdem affectiones habēt ac perpetiūtur. Carnes tamē minime effeominantur. Sed & satis carnosæ crura sūt, præterq̄ si quid sanē circa internā partem paululū deficiat. Propterea uero satis carnosæ sūt, quia utrisq̄ cruribus similiter utiūtur. Similiter enim fluctuant hęc atq̄ illæ inter ambulandū: & uehementer eminentibus natibus hi uidentur, propter articularū excessum. Si uero ossa ipsis corruptionē non senserint, neq̄ gibbosi supra coxas fiant: nonnullos enim etiā talia corripīūt: Si igitur tale quid nō contigerit, satis sani de cetero durant. Totū tamen corpus hi minus augescēs habent, capite excepto. At uero quibus in posteriorē partem femoris caput exciderit: paucis autē excidit: hi crus extēdere non possunt, neq̄ iuxta articulū elapsū, neq̄ ita ualde circa poplitē, & multo minus q̄ hi quibus iam dudū id cōtigit. Hi em̄ magis & circa inguen, & circa poplitē, articulum extēdunt. Illud tamē insuper intelligere oportet: Est enim cōmodum, & magni faciendū, & plerisq̄ ignotū: Quod neq̄ sani articulum circa poplitē extendere possunt, si nō simul extēdant etiā articulū circa inguen, præterq̄ si pedē ualde sursum attollant. Sic enim poterint. Hi itaq̄ neq̄ inflectere articulū circa poplitē similiter possunt, sed multo difficilius, si nō etiā articulum circa inguen inflexerint. Multa uero etiā alia circa corpus, huiusmodi fraternitates ac cognationes habēt, & circa neruorū distēctiones, et circa musculorū figuras, plurima, & pluris faciēda ut cognoscātur, q̄ quispiam putauerit. Item circa intestini naturā, & totius uētris. & circa uterorū errores ac distēctiones. Verū de his alibi nobis sermo erit cognatus his quę nūc dicūtur. Sed de quo nūc sermo est, neq̄ extēdere possunt, uelut iā dictū est, et breuius crus apparet, atq̄ hoc ob duas causas, et quod nō extēditur, & q̄ ad natiū carnē elapsū est. Natura enim ossis coxæ ea parte est, qua & caput & ceruix femoris existit. Vbi uero luxatū fuerit, pronū ad externā partē natiū defertur. Inflectere tamē possunt, si dolor nō prohibeat, & tibia & pes moderate recta apparent, & neq̄ hęc, neq̄ illæ multū inclinata. Iuxta inguen uero caro insuper aliquāto mollior esse uidetur, præsertim ad cōtactū, utpote articulo ad alterā partem elapso. Ad ipsas autē nates si attrectetur femoris caput, aliquāto etiā magis extuberare uidetur. atq̄ hęc quidē signa sunt, si cui in posteriorē partē femur excidit. Cui igitur iā perfectō elapsū, nō fuerit repositū, hic ambulare quidē potest, ubi tēpus intercesserit, & dolor sedatus fuerit, & articulus in carnē uersari ad sueuerit. Cogi-

tur tamē uehēmēter se inflectere circa inguina, dum iter facit, atq; hoc ob duas causas: tum q̄ multo breuius crus fit, ob ea quæ antea dicta sunt: tum q̄ multū ualde abest ab eo ut calcaneo terrā contingat. Si enim conaretur uel paululū pede illo uehi, ita ut nihil aliud habeat quo se firmet, retro sane corruerit. Magna enim fuerit momenti inclinatio, & coxis multū in posteriōrē partem supereminētibus super pedis gressum, & spina in super ad coxas uergēte. Vix autē pectore pedis terrā attingit, et ne sic quidē, nisi ipse se ipsum circa inguina inflectat, & altero crure circa poplitē in super se inflectat. Ob hæc autē cogitur, ut manū quæ est secūdum læsum crus, ad supernā femoris partē in singulis gressibus firmet. Cogit igitur aliquantū hoc ipsum, ut circa inguina inflectatur. Nam in permutatione crurū in ambulando, corpus supra lēsum crus uehi nō potest, si non in super firmetur crus per manum ad terram, nimirū quum nō sub corpore articulus subsistat, sed ad posteriōrē partē iuxta coxā extet. Absq; tamen baculo tales iter facere possunt, si aliās adfueuerint, eo q̄ gressus pedis in utri rectitudine manet, & nō ad extremam partē inclinatus est. Quapropter nihil opus habent baculi fulcimēto. Quicūq; tamen pro femoris per manū apprehensione, supposito sub alam, quæ ad sinistrū crus est, scipione inniti uolunt, hi siquidē longiorē scipionē supposuerint, erectiores quidē iter facient, pede autē ad terrā non innitūtur. Si uero pedē inniti uolent, breuior ipsis baculus faciendus est, & ad inguina ut se inflectant necesse fuerit. Cæterū carniū imminutiones etiam his secūdū rationem sūt, uelut antea dictū est. Qui enim eleuatū habent crus; & nihil laborāt, his etiam maxime minuūtur. Si uero plurimo utūtur ingressu, his minime minuūtur. Sanum tamen crus nihil inde utilitatis consequitur, sed etiam deformius fit, si læso crure ad terrā innitentes utātur. Illi enim simul inferuiens, & extra prominēte coxa esse cogitur, & circa poplitē se inflectere. Si uero quis læso crure non ad terrā utatur, sed eleuatū habeat, & scipioni innitatur, sic sanū crus robustū fiet. Nam & in naturali statu degit, & exercitatiōes ipsum corroborāt. Possit aliquis dicere, extra medicinā talia esse. Quid enim opus est de his quæ incurabilia iam facta sunt, amplius tractare? At hoc facere multū refert. Eiusdem enim professionis est & hæc cognoscere. Nō enim fieri potest, ut inter se dirimātur. Oportet enim curabilia ita tractare, ut ne incurabilia fiant, ea intelligentia ut quā maxime prohibeamus, ne ad hoc deueniant ut incurabilia reddantur. Oportet autē & incurabilia cognoscere, ut ne maxime lædant. Prædictiōes autē splendidæ sunt ac gloriosæ ex cognitione, quò, & qualiter, & quando, singula desinent, siue eò uertantur ut incurabilia fiant, siue curatiōnis spem exhibeant. Quibuscūq; uero ex natiuitate, aut dum adhuc aliās augescūt, ita elapsus fuerit articulus, & non repositus, siue ex uolentia elapsus sit, siue præ morbo: Multæ enim huiusmodi luxationes fiunt in morbis: Qui uero sint hi morbi, in quibus articuli elabuntur, postea scribetur: Si itaq; elapsus non fuerit repositus, femoris quidem os breue fit, affligitur autē totum crus, & augmēto destituitur, & multo magis ex carne fit, eo quòd ipso non utantur. Nam & articulus circa poplitē his affligitur. Nerui enim ob ea quæ antea dicta sunt intenduntur. Quare articulū circa poplitē extendere nō possunt hi quibus hoc modo coxa excidit. Vt enim in summa dicam, Omnia quæ in corpore ad usum facta sunt, si quis moderate ipsis utatur, & in his laboribus exerceat

ceat, ad quos singula sunt adsueta, sic quidē sana sunt, & augeſcūt, & probe conſeſcunt. Si uero quis non utatur, ſed quieſcat, morboſiora fiunt, & nō augeſcunt, & cito cōſeſcunt. Inter hæc autē non minime perpetiūtur hoc & articuli, & nerui, ſi quis non iſiſ utatur. Propter has igitur cauſas, magis in hoc luxationis modo q̄ in alijs affliguntur. Totū enim crus & in oſſium, & in carniū natura, augmento deſtituitur. Tales igitur ubi iam in uiros eualeſerūt, eleuatū ac inclinatum crus hoc habent, altero uero uehūtur baculo ininitentes, aliqui uero nō, aliqui duobus. Quibus porro in anteriorem partem femoris caput elapſum fuerit: paucis autem hoc contingit: hi extēdere quidē crus perfecte poſſunt, inflectere autē ſe minime hi poſſunt circa inguen. Affligūtur autem etiam, ſi circa poplitē ſe inflectere cogūtur. Longitudo uero cruris cōſimilis apparet, & circa calcaneū quidē ualde. Verū ſummus pes aliquantō minus in anteriorem partem prominere ſolet. Totū autem crus rectitudinē habet ſecundū naturam, & neq; hæc, neq; illac uergit. Cæterū hi ſtatim dolore corripīūtur maxime, & ūrina imprimis ſupprimitur, aliquāto magis q̄ in alijs luxationibus. Caput enim femoris proxime his incumbit ad præcipuos neruos, & circa inguen quidē extuberantes uidentur, & locus extentus apparet, Verū circa nates rugoſior, & maxime excarnis. Atq; hæc quidē quæ relata ſunt, ſigna ſunt eorū quibus ita femur excidit. Quibuſcūq; igitur uiriſ iam factis, hic articulus elapſus, nō fuerit reſoſitus, hi ubi dolor iſiſ ſedatus fuerit, & articulus in eo loco in quem excidit, uerſari adſueuerit, ſtatim ſerē recti ambulare poſſunt, abſq; baculo, & ualde quidē recti, utpote quū ad læſum crus, neq; circa inguen, neq; circa poplitem, facile ſe flectere poſſint. Propter inguinis itaq; inflexibilitatē, rectiore toto crure in ambulando utuntur, q̄ quum ſani eſſent. Sed & aliquando ad terrā pedem trahunt, utpote quū ſupernos articulos nō facile inflectant, & toto pede ingrediantur. Nihilo enim minus hi calcaneo ingrediūtur, q̄ anteriore pedis parte. Si uero magnis greſſibus progredi poſſent, etiam ualde calcaneo inſiſtentes progredērētur. Nam & ſani quanto minoribus greſſibus iter faciunt, tanto magis calcaneo ingrediūtur, alterum pedem deponentes, contrarium eleuantes. Quibuſcūq; itaq; hoc modo excidit, adhuc etiā magis calcaneo terram cōtingunt, q̄ anteriore pedis parte. Anterior enim pedis pars, ubi reliquum crus extentū fuerit, non ſimiliter in anteriore partem inflecti poteſt, ſicut ubi crus fuerit inflexum: Neq; ruruſ ſinuari pes poteſt crure inflexo, ſicut ubi crus fuerit extentū. Sana igitur natura hoc modo eſt, ueluti dictū eſt. Quum uero elapſus articulus reſoſitus non fuerit, ſic iter faciūt, uelut dictū eſt, ob prædictas has cauſas. Magis tamē excarne crus ſit q̄ alterū, & iuxta nates, & circa furam, et iuxta poſteriorem rectitudinem. At uero quibus dum adhuc infantes ſunt, articulus ſic elapſus, nō fuerit reſoſitus, aut etiā à natiuitate ita habuerint, & hiſ femoris oſ aliquāto magis minuitur, q̄ tibiæ aut pedis oſſa. Et minimum quidē in hoc luxationis modo femur minuitur. Carnes tamē undiq; minuiūtur, maxime circa poſteriore rectitudinem, quemadmodū etiam prius dictū eſt. Quicūq; igitur recte educati fuerint, hi ubi augeſcunt, crure uti poſſunt, breuiore aliquantū exiſtente q̄ altero, ita tamē ut baculo innitantur ea parte quā læſum crus eſt. Nō enim abſq; calcaneo, pedis pectore admodū uti poſſunt, ut in id innitantur, quemadmodū in alijs claudicationibus aliqui poſſunt. Cauſa

uero cur non possint, ea est quæ paulo ante relata est. Ob id igitur baculo insuper opus habent. Qui uero neglecti fuerint, & crure ad terram non utuntur, sed eleuatum id habent, his minuantur quidē ossa, ubi augescunt, magis quæ his qui eo utuntur. Minuuntur autem & carnes magis multo quæ his qui utuntur. Verum circa articulos in directum mutilatur his crus aliquanto magis, quæ quibus alio modo luxatio facta est. Quo igitur in summa dicatur, Articuli excidētes ac qui luxantur, inæqualiter inter seipso excidunt ac luxantur, aliquando multo plus, aliquando multo minus. Et quibus quidē multo plus luxati aut elapsi fuerint, his omnino difficilius reponuntur. Et si repositi non fuerint, maiores & manifestiores mutilationes ac afflictiones tales habent, & ossium, & carniū, & figurarū. Vbi uero minus exciderint & luxati fuerint, tales facilius quæ alij reponi possunt. Si uero frustra tēti, aut neglecti fuerint, minores ac minus noxiæ mutilationes his fiunt, quæ illis de quibus paulo ante dictum est. Reliqui igitur articuli etiā ualde multum differunt ad hoc ut aliquando minor, aliquando maior luxatio fiat. Verum femoris & brachij capita, quæ similime inter se utraq; excidunt. Nam capita prout rotunda sunt, simplicem & caluā rotunditatem habent. Orbiculatiores autem sinus sunt, qui capita excipiunt, capitibus tamen ipsis congruentes. Quapropter fieri non potest ut dimidiū articuli ex ipsis elabatur. Nam ob rotunditatis circumferentiam, aut ad externā, aut ad internā partem luxari poterit. Sed de quo nunc sermo est, perfecte excidunt, nam alioqui non excidunt. Attamen & hi aliquando plus, aliquando minus, à naturali statu profluunt, & femur aliquanto magis quam brachiū patitur. Nam aliquæ etiam ex his luxationibus quæ à natiuitate sunt, si parum elapsæ fuerint, ad naturalem statum reduci possunt, & maxime articuli circa pedem. Quicūq; à natiuitate mutili fiunt, plerique ex his curabiles sunt, si non ualde magna emotio facta fuerit, aut etiam præuictis iam pueris contigerit. Optimum igitur est ut talia quam celerrime curentur, priusquam ualde magnus ossium defectus fiat, & priusquam admodum magnus carniū defectus circa tibiā contingat. Modus itaque mutilationis non unus est, sed plures. Plurima quidē eluxata non sunt penitus, sed per figuræ consuetudinē, in quadā pedis interceptione mutilata. Animaduertendum autem in horum curatione est, ut tibiæ circa malleolū os, quod extrinsecus est, ad internā partem detrudatur ac dirigatur, & calcanei os quod è directo illi subiacet, ad externā partem retrudatur, quo ossa quæ eminent sibi ipsis occurrant iuxta mediū ac obliquum pedem. Digni uero aceruati unā cum magno digito ad internā partem inclinētur, atque ita circūcirca cogantur. Probe autem deligare oportet cerato resinato, & splenijs, & linteis mollibus non paucis, neque nimis compressis, atque ita deligationis circūductiones facere, uelut etiā manibus directio pedis fiebat, quo pes paulo magis ad ualguū uergere uideatur. Soleam etiā quandā facere oportet, aut ex pelle non nimis dura, aut è plūbo, eamque insuper alligare non ad corpus positā, sed ubi iam postremis linteis deligare uoles. Quum uero iam deligatus fuerit, unius alicuius lintei ex his quibus deligatur, initiū, ad deligamēta quæ infra pedē sunt assuere oportet, è directo parui digiti, & postea sursum extendere, ita ut moderate habere uideatur, atque sic supra suram circūdare, quo sic extensum ac collocatum stabile maneat. In summa, quasi quis ceram singat, ad naturā iustam adducere oportet, ita ut & inclinata, & distenta præter naturā, & manibus sic dirigamus, & similiter deligatione: adduca

camus aut non uiolenter, sed leniter. Assuere uero ita oportet lintea, ut cōducant ad reparationes ac appēssiones faciendas. Aliæ enim claudicationes alia reparatione ac appensione opus habēt. Calceum insuper plumbeū facere oportet, extra deligationē adalligatum, qualem modulū crepidæ chiæ habebūt. Verum nihil ipso opus est, si quis & manibus recte direxerit, & linteis recte deligauerit, & appensiones ac reparationes per assuta lintea recte fecerit. Atq; hæc quidem est curatio, & neq; sectione, neq; uisione, neq; alia uarietate quicq; opus habet. Citius enim talia medicinæ obtemperant, q̃ quis putarit. Deuincere tamē tempore oportet, donec in iustis figuris corpus auctū fuerit. Vbi uero calcei ratio habenda est, Arbylæ lutigradæ, calceamētū ita appellati species, accommodatissimæ existūt. Hoc enim calceamentū minime à pede superatur, sed potius ipsum superat. Idoneus est etiā creticus calceamentorū modus. At uero quibus tibiḡ ossibus luxatis, ac ulcere inducto, articuli circa pedē penitus eminet, siue intrō uergant, siue extra, tales reponere nō oportet, sed permittere ut quicuncq; uelit medicus reponat. Illud enim clare scire oportet quod homo morietur, si repositi permāserint. Sed & uita paucorū dierū his cōtinget. Pauci enim ex ipsis septimum diē transgrediūtur. Cōuulsio enim est quæ ipsos occidit. Sed & cancerari cōtingit tibiam ac pedē. Hæc ita futura esse certo scire oportet. Et neq; ueratū mihi uidetur profuturū esse, & eadem die datū, & rursus epotū. proxime autē si quicquā huiusmodi facit, non tamē mihi hoc uidetur. Si uero repositi non fuerint, & ne tentati quidē ab initio, pleriq; ipsorū superstites euadunt. Sic autē & tibiam & pedē coaptari oportet, prout ipse uolet, modo non sint dependentia, aut commota. Curatio uero facienda est cerato picato, & splenijs uino imbutis paucis non ualde frigidis. Frigiditas enim in talibus cōuulsionem accersit. Idonea etiā sunt folia betarū, aut tussilaginis, bechij appellatæ, aut alicuius alterius huiusmodi, in uino nigro austero semicocta ac imposita. Et facienda est curatio super ulcus, et super partes adiacētes. Et cerato tepido ipsum ulcus illinendū. Si uero hyemis tēpus fuerit, etiā lanæ succidæ uino ac oleo tepidis imbutæ superne ipsum madefaciāt. Deligatio uero nulla, neq; ullū cataplasma adhibēdū est. Probe enim nosse cōuenit, q̃ cōpressio ac omnis oneris gestatio, talibus omne malū affert. Accōmodata aut sunt ad talia, & ex emplastris aliqua quæ cruentis uulneribus destinata sunt, quibus uidelicet ex ipsis cōfert, ut lanæ superimpositæ uino madefiāt, & multo tēpore sinātur. Quæ uero ex illis cruētis emplastris, paucissimis diebus incūbere debēt, & quæ resina cōprehendūtur forinsecus adiecta, nō similiter ut illa idonea sunt. diuturna enim fit horum ulcerū purgatio, quum multo tēpore madore abundant. Quosdam tamen ex his deligare, bonū est. Verū illud clare nosse oportet, q̃ necesse est hominē turpiter claudum fieri. Nam pes in talibus in supernā partem retractus est: et ossa luxata, extra eminētia apparent. Neq; enim ullum ex talibus ossibus plerūq; denudatur, nisi leuiter aliquantū: neq; abscedit, sed tenuibus ac debilibus cicatricibus circumducitur: atq; hoc si multo tēpore quieuerint: Sin minus, periculū est ne ulcusculum immedicabile relinquatur. Verū de quo sermo est, qui sic curātur, seruantur. Si uero repositus fuerit articulus ac permāserit, moriuntur. Eadē ratio est, si etiam cubiti ossa circa manus articulum ulcere facto emineant, siue ad internā manus partē, siue ad externā. Clare enim nosse id oportet, q̃ is morietur intra paucos dies

dies tali morte, qualis antea dicta est, cui reposita ossa permanferint. Quibus uero reposita non fuerint, neque repositio tentata est, hi multo plures superstites manent. Curatio autem eiusmodi etiam talibus commoda est, qualis iam dicta est. Figuram uero claudicationis turpem esse necesse est, & digitos manus debiles ac inutiles. Si enim ad internam partem ossa luxata fuerint, digitos inflectere non potest. Si uero ad externam, extendere nequit. Quibus uero tibie os facto ulcere, circa genu eminuierit foras, siue ad externam partem siue ad internam, his si quis reponat, adhuc promptior mors adest quam alijs, etiam si etiam illis prompta aderat. Si uero omissa repositione medearis, spes quidem salutis hoc solo modo existit. Verum periculosa haec ossa sunt, quanto superiora ac robustiora sunt, & a fortioribus elapsa. At si os femoris quod ad genu est, ulcere facto elapsum fuerit & repositum permanserit, mortem adhuc uiolentiorum citius induxerit quam prius relata. Si uero repositum non fuerit, longe magis periculosum est quam priora. Sola tamen haec salutis spes est. Eadem uero ratio est, & de articulis circa gibbum cubiti, & de cubito ac brachio. Quaecumque enim ex his luxata, ulcere facto eminuierint, ea omnia si reposita fuerint mortem inducunt: non reposita, spem salutis: claudicationem uero superstitibus. Lethaliores autem sunt superiores articuli, si reponantur. Sed & si non reponantur, periculosiores idem sunt. Si uero alicui superiores articuli luxati, facto ulcere emineant, hi & si reponantur celerrimam mortem inducunt: & si non reponantur, periculosiores sunt. Curatio uero iam relata est, quae mihi accommodatissima esse uidetur. At uero quibus articuli digitorum aut pedis, aut manus luxati, facto ulcere eminuierint, osse non fracto, sed circa ipsam conexiorem auulso, his si repositi permanserint, adest quidem periculum couulsionis, si non bene curati fuerint: at tamen operae precium est ut repositio fiat, cum praedictione quod multa custodia ac cura opus habet. Reponere uero facillimum est, efficacissimumque ac artificiosissimum per uecticulum, uelut etiam antea dictum est in fractis ac eminentibus ossibus. Postea quiescere quam maxime conuenit, & decubere, ac paucis cibis uti. Melius est & pharmaco sursum purgare leui aliquo uti. Vlcus uero curare oportet, aut eruentis emplastris quae madefiunt, aut polyophthalmi siue buphthalmi folijs impositis, aut quibus ossa in capite fracta curantur. Nihil autem ualde frigidum adhibere. Minime igitur primi articuli periculosi sunt. Superiores autem periculosiores. Reponere uero oportet eadem die aut postridie: Tertio ac quarto minime. Quarto enim die maxime recrudescere solent. Quibus autem non statim repositi fuerint, in his dictos dies transgredi oportet. Quicquid enim intra decem dies repositum fuerit, omne id continetur. Si uero reposito osse couulsio accedat, articulum statim eijcere oportet, & calida quam sapientissime humectare, & totum corpus, et praesertim circa articulos, calide & leniter ac molliter tractare. Verum inclinatum magis quam extentum totum corpus esse oportet. Expectandum tamen est articulos circa digitos qui reponuntur abscessuros esse. Plerumque enim ita contingit, si uel quacumque inflammatio subsit. Quare si non propter uulgi imperitiam, medico uerenda esset accusatio, nullum penitus reponere oportebat. Atque ad hunc modum periculosa sunt ossa, circa articulos eminentia foras, si reponantur, quemadmodum dictum est. Quaecumque uero circa articulos digitorum penitus resecantur, ea plerumque innoxia sunt, si non quis in ipsa uulnere ex animi deliquio laedatur. Et curatio uulgaris talibus ulceribus sufficit. Sed & quae non circa articulos, sed iuxta

aliam quandam ossium rectitudinem refecantur, & hæc innoxia sunt, & adhuc alijs curatu faciliora, Et quæ iuxta digitos ossa fracta extra eminent, non ad articulum, & hæc si reponantur innoxia sunt. At resectiones ossium perfectæ circa articulos, & in pede, & in manu, & in tibia ad malleolos, & in cubito ad iuncturam manus, plerisque quibus refecantur innoxia sunt, si non statim animi deliquium euertat, aut quarta die febris continua accedat. Corruptiones tamē carniū cōtingunt, & in uulneribus sanguifluis fientibus, & uehementibus cōstrictionibus, & in ossiū fracturis magis quā oportet compressis: & alijs uinculis uiolentis intercepta plerisque decidunt. Et plerique ex talibus superstites euadunt, & quibus femoris pars aliqua & carniū & ossis decedit, & quibus brachij pars (Mirus autē si cubiti aut tibiæ pars deciderit) & amplius facile ferentes superstites euadunt. Quibus igitur fractis ossibus corruptiones statim fiunt, & denigrationes, his abruptiones corporis celeres circūcirca fiunt, & decidētia cito decidunt, ut quum ossa iam antea remiserint emollita. Quibus uero dum ossa sana sunt, denigrationes fiunt, carnes quidē etiam his cito moriuntur, ossa uero tarde abscedunt, qua parte termini sunt denigrationis, & ossis nudatio extat. Oportet autem partes corporis quæcūque infra terminos denigrationis sunt, quum iam penitus mortuæ fuerint & doloris exortes, iuxta articulū auferre, prouidendo ut ne uulneres. Si enim is cui resectio fit dolore affectus fuerit, et corpus nondū mortuum fuerit ea parte qua refecatur, magnū periculum est ne præ dolore animi deliquium incidat. Talia uero animi deliquia multos iam euestigio peremerunt. Femoris itaque os tali modo denudatū octogesimo die abscedere uidi. Tibia tamē huic homini circa genu uigesima die ablata fuerat, aut ut mihi uidebatur etiam citius. Non enim simul, sed ad maiore prouidentiam facere quid mihi uisum fuit. At tibiæ ossa ex eiusmodi denigratione circa mediam tibiā, sexagesimo die mihi deciderūt, quæcūque ex ipsis fuerunt denudata. Differt equidē & curatio à curatione, ad hoc ut ossa denudata citius aut tardius decident. Differt etiā compressio à cōpressionē, prout uehementior aut debiliior sit, ad hoc ut citius aut tardius nerui denigrati emoriantur, carnes item & arteriæ ac uenæ. Nam quæcūque non uehementer intercepta moriuntur, ex talibus quædā ad ossium denudationes non perueniunt, sed magis in superficie decidunt. Propter has igitur causas, non unum numeri nomen tempori poni potest, in quanto singula ex his iudicantur. Assumere uero ualde oportet tales curationes. Sūt enim magis horrendi aspectus quā curationis, & curatio lenis omnibus talibus sufficit. Ipsa enim seipsa solū iudicant: & circa uictum diligentiam adhibere oportet ut pro uiribus febris exors sit: & in iustis figuris corpus collocare. Iustæ autē hæc sunt, ut neque sublimius eleuatū sit, neque deorsum repat. Sed magis præterea sursum uergat, donec perfecte fuerit circūcirca abruptū. Nam in hoc tempore sanguinis eruptionū periculum imminet. Ob id igitur uulnera deorsum repentia facere non oportet, sed uice uersa. Alioqui ubi tempus amplius accefferit, & ulcera pura facta fuerint, non amplius hæc figuræ cōmodæ sunt, sed positio recta, & aliquando deorsum repentes. Tēporis enim progressu quibusdā horum ossis discelsiones fiunt, & subligaminibus opus habent. Expectare tamē oportet, ut tales per tēpus à dysenteria corripiantur. Nam in plerisque denigrescentibus dysenteria accedit, & in sanguinis eruptionibus ex ulceribus. Accedit autem

tem iudicatis iam denigrationibus ac sanguinis eruptione. & procedit quidem large ac uehementi impetu, sed non ad multos dies durat, neq; lethalis est. Neq; enim ualde cibū auersantur tales, neq; aliàs uasā uacua facere conducit. Femoris porrò luxationē circa coxā hoc modo reponere oportet, si ad internā partem elapsū fuerit. Bona quidē ac iusta & secundū naturā hęc repositio est, & sanē etiā aliquid ostētationis habēs, si quis taliū rerū iactatione superbire uelit. Ex pedibus hominē ad trāsuersam mediæ domus trabem suspendere oportet, uinculo forti, sed molli ac lato, ita ut pedes quatuor digitorū spatio, aut minus, inter se distantes habeat. Sed & supra genua latū ac molle lorū circūdatum esse oportet, quod itē ad trabem illam extēdat. Crus autē læsum duobus digitis amplius q̄ alterū extēntū esse oportet. A terra uero absit caput ad duorū cubitorū spatium, aut paulo plus, aut minus. Manus autē iuxta latera extētā, aliquo molli sint alligatæ. Omnia uero hęc supino iacētī ipsi præparentur, ut q̄ breuissimo tēpore pendeat. Post q̄ uero suspēsus fuerit, uirū peritū & nō debilem immisso inter femora cubito ita agere oportet, ut cubitū inter caput femoris elapsū, & interfemineū locūq; inter anū ac pudendū ponat, & postea alterā manū ad illam interpositā cōiuncta, rectus astans ad suspēsi corpus, derepēte se appēdens sublimis q̄ æquabilissimē depēdeat. Hęc repositio omnia quibus secundū naturā opus est exhibet, Nam & ipsum corpus suspēsum sua ipsius grauitate extensionē facit; & is qui appēdet, unā cum extensione, femoris caput super acetabulū eleuari cogit, simulq; cū cubiti ossē, uelut cum uectē molitur ac cogit, ut ad pristinā naturam relabatur. Oportet autē uincula omnino bene constructa esse, & curare ut fortissimus sit is qui se appēdit. Quemadmodū igitur etiā antea dictum est, Magna est differentia naturarū in hominibus, ad hoc ut uel facile, uel difficulter repositio fiat. Et cur magna sit differētia dictū est antea, ubi de humero egimus. Quibusdam enim femur rursus incidit nullo adhibito apparatu, sed ex modica extēsiōne, quantū manibus directio fieri pōtēst, & ex leui cōmotiōne. Multis autē qui crus iuxta articulū inflexērūt, iam facta circūagitatione rursus incidit. At multo plura uulgari cuilibet apparatui nō obtemperāt. Quapropter scire quidē oportet de singulis optima in omni arte, uti uero his quæ singulis uicibus idonea uisa fuerint. Relati igitur sunt extensionū modi etiā in superioribus, ut quis uti possit ex his qui forte affuerint. Oportet enim in cōtrarias partes fieri extensionē uehementer, in alterā, cruris: in alterā, corporis. Si enim probe extensio facta fuerit, femoris caput supra pristinā sedem eleuābitur. Et si quidē ita super eleuatū fuerit, ne prohibere quidē facile sit, quo minūs ipsum in suā sedem insideat. Quare omnis iam uectis molitio ac directio sufficit. Sed enim in extensione deficiūt, & ob id maiorē turbationē exhibet repositio. Oportet igitur nō solū iuxta pedē uincula alligata esse, sed etiā supra genu, quō nō magis circa articulū sit deligatio in extensione, q̄ circa coxæ articulū. Sic igitur extensionē ad pedis partē præparatā facere oportet. Sed et in alterā partē extensionē, non solū ex deligatione circa pectus & alas, in cōtrariū extēdere oportet, sed etiā loro longo, duplicato, robusto, leni, circa interfemineū inserto, & à posteriore parte ad spinā porrecto, ab anteriore uero ad clauiculā tendēte, ibiq; ad alterū initium alligato, ita coactionē facere oportet, ut alij hīnc, alij illinc extensionē faciant, ita tamen ut lorū circa interfemineū, nō super femoris caput

porrectū sit, sed inter caput & interfemineū. Verum inter extendendū pugno ad femoris caput quis innixus, id ad exteriorē partem propellat. Si uero is qui trahitur eleuetur, iniecta manu, et cum altera manu cōiuncta, simul deorsum trahat, simulq; ad externam partem cogat. Alius uero quispiam partē femoris ad genu, placide ad internam partem dirigat. Dictū autem est etiam antea, operæ precium esse ut si quis in urbe populosa medicinam exerceat, lignum possideat quadrangulare sex cubitorū, aut paulo minus: latitudine bicubitali: crassitudo aut sufficit dodratalis. Id secundū longitudinē hinc atq; illinc sectionē incisam habere oportet, ut ne altior q̄ oportet machinatio fiat. deinde postes aselli breues, robustos, utrinq; inaptatos habere. Postea sufficit quidem in dimidia ligni parte, nihil tamē uetat etiā per totū, uelut fossas lōgas quinq; uel sex, quatuor digitorū spacio inter se distantes, incisas esse: & satis est ut sint hæ & latitudine & profunditate triū digitorū. Habere etiā in medio hoc lignū debet excauationē profundiorē quadrangulam triū digitorum, quo in hāc excauationē, ubi opus esse uisum fuerit, lignū cavitati congruū infigatur, quod superne sit rotundū. Infigendū aut hoc est, si quādo cōducere uisum fuerit, inter caput femoris & locū inter anum ac pudendū. Hoc lignū erectum stans prohibet ne cōcedat corpus, dum à pedibus extēditur. Quādoq; enim hoc ipsum lignū sufficit pro extensionē in contrarium superne facienda. Aliquādo etiā dum hinc atq; illinc crus extēditur, hoc ipsum lignū hāc uel illāc laxum incūbens, cōmodum ad hoc fuerit, ut instar uectis, caput femoris ad externam partē extrudat. Ob hoc enim etiam fossæ incisæ sunt, quo in quibuscūq; ex ipsis congruū id facere fuerit, uectes ligneus immissus molitionē faciat, aut circa articularū capita, aut ad ipsa penitus capita infixus; unā cū extēsiōne, siue ad externā partē, siue ad internā, molitionē facere expedierit: siue etiā rotundū uectem esse cōducat, siue latū. alius enim aliq articulo conducit. Cōmoda aut est in omniū articularū cruris repositione, hæc per uectes molitio unā cū cōcussione. Verū de quo nūc sermo est, tereṛe ac rotū dum uectē esse cōuenit. Ex his machinis ac coactionibus, nō uidetur mihi fieri posse ut ullius articuli repositio frustra tentetur. Inuenire tamē quis possit etiā alios modos repositionis huius articuli. Si enim lignum hoc magnū, habeat in medio à lateribus duos postes pedales, eius altitudinis, quæ cōferre uidetur, alterum hinc, alterum illinc. Deinde lignū transuersum, uelut scalæ gradus, postibus impositū sit: atq; ita sano crure inter postes trāsmisso, læsum crus supra gradum adaptatū habeat. Verū ad altitudinem, & ad articulū qua parte excidit facile quiddā adaptare oportet. Gradū enim moderato altiorē facere oportet, & stragulū multiplex prout cōgruum fuerit, sub corpus subextendere. Deinde lignum moderatā latitudinē ac longitudinē habens, sub crus ad malleolum usq; extētū esse oportet, quod ultra femoris caput, quantū eius fieri potest porrigatur, & ad crus alligetur quotiescūq; opus fuerit, ut moderate habeat. Postea dū extēditur crus, siue ligno pistilloformi, siue aliqua alia ex his extēsiōnibus, crus simul circū gradū unā cū alligato ligno, deorsum cogere oportet, ita ut aliquis supra articulū iuxta coxam hominē detineat. Hoc enī modo simul & extēsiō femoris caput super acetabulū attollet, simulq; molitio femoris caput in pristinā naturā detrudet. Hæ omnes relatæ necessitates ac coactiones fortes sunt, & omnes calamitate superiores, si quis recte ac bene præparet. Quemadmodū autē

etiam

etiam antea dictū est, à lōge debilioribus extēſionibus, & uiliore apparatu plerisq; rursus incidit. At uero si ad externā partem femoris caput luxatū fuerit, extēſiones quidē hinc atq; illinc facere oportet, eodē modo uelut dictū est. Verum molitionē cum ueſte lato, unā cū extēſione facere cōuenit, ab externa parte ad internā cogendo, ita ut ad ipsas nates, & paulo superius ueſtem adhibeas. Ad sanā uero coxā iuxta nates aliquis manibus renitatur, ut ne cedat corpus: aut alio quopīa huiusmodi ueſte ſubmiſſo, & ex fossā cōueniente fulcito cōtra obnitatur. Partē autē femoris luxati quæ ad genu est, ab interna parte foras placide abducat. Cæterū suspensio in hoc modo luxationis articuli non conuenit. Cubitus enim eius qui se appēdit, caput femoris ab acetabulo propellit. Molitionē tamen cū ligno ſubieſto, ita quis adaptare poſſit, ut huic luxatiōis modo cōueniat, ſi forinſecus adhibeat. Sed quid opus est plura dicere? Si em̄ recte extenſio fiat, & recte per ueſtes molitio cōtingat, qui articulus hoc modo elapſus nō reponi poſſit: At ſi in poſteriorē partē femur exciderit, extēſiones & diuerſum tēſiones ita facere oportet, uelut dictū est, ita tamē ut ſuper lignū multiplex ſtragulū inſternatur, quo molliſſimū ſit, et homo pronus reclinetur ac ſic extendatur. Verū unā cū extenſione, etiā tabula deorſum cogere oportet eodē modo ueluti gibboſitates, è directo natiū tabula collocata, aut magis ad infernam q̄ ad ſupernā coxarum partē, & incifura in pariete ad tabulā excipiendā nō recta ſit, ſed paululū decliuſ ad pedū partem. Hęc repositio maxime ſecundū naturā est huic luxationis modo, et ſimul fortiſſima. Suffecerit autē fortaiſis pro tabula, ut aliquis inſideat, aut manibus innitatur, aut inſcēdat derepēte, ſimulq; cū extenſione incūbat. Nulla uero alia ex relatis repositionibus ſecundū naturā est huic luxationis modo. Si uero in anteriorē partem elapſum fuerit, idem quidem modus extenſionū faciendus est. Verū uirū & manibus ualidiſſimū, et aliās peritiſſimū, uola manus alterius circa inguina firmata, & altera manu inſuper inieſta, ſimul luxationē deorſum propellere, ſimulq; femoris partē quæ ad genu est ad anteriorē partem cōpellere oportet. Hic em̄ modus repositionis, huic luxationi maxime ſecundū naturā est. Sed & ſuſpēſio finitimū quid ſecundū naturā habet. Oportet tamē eum qui ſe appēdit peritū eſſe, ut ne cubito articulū excutiat, ſed circa mediū inter anū ac pudēdum locū, & iuxta os ſacrū ſe appēdat. Laudatur etiā is qui per utrē hunc articulū reponere conatus est. Et iam ſanē aliquos uidi, qui præ imperitiā, etiā extra & retro luxatos, per utrē reponere conabātur, nō animaduertētes q̄ magis ipſum eiſcerēt q̄ reponerēt articulū. Nā qui primus excogitauit, haud dubie ad intrō elapſos articulos, per utrē repositionē tentauit. Noſſe igitur oportet q̄ alia multa utre ſunt potiora. Oportet autē utrē nō in flatū intra femora ponere, quantū fieri poteſt ſupreme ad locū inter anū ac pudēdū adductū: et factō à patellis genu initio, femora per faſciā uſq; ad mediā femorū partē deligare, deinde in partē utris ſolutā ſolle ex officina fabri immiſſo inſlare, & utrē cogere ut diſtēdatur. Hominē uero in latus decūbere oportet, & læſum crus ſuperne habere. Atq; hic quidē est apparatus: ſed pleriq; peius præparant q̄ ego nūc dixi. Nō enim deligāt femora ad multā partē ſed ſolū genua, & nō inſuper extēdūt. eſt autē inſuper extēſio quoq; faciēda. Attamē aliqui iā re-poſuerāt, facile rē aſſequuti. Nō autē ita facile eſt coactionē hoc modo perficere. Nā & uter dū inſlatur, tumidiſſimas partes ſuas ad articuli caput nō habet, qđ

maxime emoliri oportet: sed inferius ipso, medius ipse locatus est circa media femora, aut adhuc inferius: & rursus femora ipsa natura sunt curua. Superne enim carnosae sunt, & inter se sociata. Inferne uero siccae, ut etiā natura femorū utrem ab opportunissimo loco repellat. Si uero quis paruū utrem imponat, fieri nō potest ut paruū robur articulum cogat. Si itaq; utre uti uelis, femora inter se ad multā partem colliganda sunt: & unā cū corporis extensione uter inflandus est. Crura uero ambo deliganda sunt usq; ad finē in hoc repositionis modo. At uero in uniuersa arte hoc plurimi facere prae omnibus oportet, ut id quod egrotat sanū facias. Si uero multis modis fieri possit sanatio, ut eū qui minime molestus est eligas. Nam & uirū bonum, & artis peritū, hoc declarat, qui populo imponere non studeat. Verū de quo nunc sermo est. Tales quaedā sunt familiares extensiones corporis, ut ex his quae adsunt expedita ac facili reperiri possit. Nā si uincula ex lorīs mollia ac lenia nō affuerint, sed aut ferrea, aut funes nautici aut domestici, fascijs aut pāniculis laneis ea maxime parte amplius obuoluere oportet, qua uincula detentionē factura sunt, atq; ita uinculis deligare. Deinde in lecto robustissimo & ex praesentibus maximo, hominē bene extendere oportet, hoc modo. Lecti pedes qui ad caput sunt, aut à pedibus, ad limen ianuae, intus aut foris prout cōmodum fuerit firmētur. Ad alteros autē lecti pedes lignū quadrangulare transuersum obijciatur, ita ut à pede ad pedē pertingat. Et si quidē tenuerit lignū, ad pedes lecti deligetur. Si uero crassum, nō est opus. Deinde initia uinculorū, & eorū quae à capite sunt, & eorum quae à pedibus, utraq; alligētur ad pistillū, aut ad aliud huiusmodi lignū: ita ut ē directo corporis sint, aut paulo superius. Moderatē uero extendātur ad pistilla erecta cōsistentia, quorū alterū ad limen, alterū ad lignū obiectū firmetur, atq; sic refractis pistillis extensio fiat. Sufficit autē scala quae robustos gradus habet, sub lectū extenta, pro limine ac ligno obiecto, quo pistillis ad conuenientes gradus hinc atq; illinc firmatis, ita uinculorū extensio fiat. Porro reponitur femoris articulus etiam hoc modo, si ad internā, & ad anteriore partem luxatus fuerit. Supra scalam in terrā defixam hominē collocare oportet. deinde sanū crus placide extensū deligare, ubi cōmodum fuerit: ex sinistro uero uas testaceū aqua plenū, aut sportulam lapidibus refertā appēdere. Alius repositionis modus, si ad internā partem luxatus fuerit. Inter duas colūnas trabē moderata altitudine deligare oportet. Praemineat autē una pars trabis pro magnitudine natū. & ubi stragula circū pectus hominis deligaueris, ipsum hominē supra praeminentē trabis partē collocato, & deinde pectus ad columnā lato aliquo uinculo alligato. Postea sanū quidem crus detineat aliquis, ut ne circūagatur. Ex laeso uero appēdatur pondus quantum cōgruit, uelut etiā prius dictū est. Primū igitur scire expedit, quod omnium ossium cōmissurae plerumq; sunt caput & acetabulum. In quibusdam uero & locus acetabuli formam refert, & oblōgus est. Quidam uero loci leuiter sinuosi sunt. Semper autē reponere oportet omnes articulos elapsos, maxime quidē statim dum adhuc calidi sunt. Sin minus, q̄ celerrime. Nā & ei qui reponit, facilius ac citius reponere cōtingit, & agrotō multo minus doloris affert repositio priusq; intumuerit. Omnes etiā articulos ubi reponere uoles, prēmollire ac cōmouere oportet. Sic em̄ facilius reponi solēt. Circa omnes autē articularū repositiones hominē attenuare oportet, maxime circa maximos articulos et repositū difficilimos

facilimos: minimū circa minimos & faciles. At uero si digitorū articulus, siue primus, siue secundus, siue tertius in manu exciderit, idem ac æqualis repositio- nis modus est. difficilius tamen semper maximi articuli reponūtur. Excidūt au- tem quatuor modis, aut sursum, aut deorsum, aut in obliquū utrinq̃: maxime quidem superne, minime autē in obliquū, in uehemēti motu. Vtrinq̃ aut in ea parte in quā exciderunt, uelut crepido est. Si quidē igitur ad supernam aut infer- nam partem exciderit articulus, eo quod leuior est hic locus q̃ a lateribus, & si- mul parua facta est transgressio, facile est reponere. Modus aut repositionis sic habet. Digitū summum aut deligamēto aliquo, aut alia quapiam huiusmodi re- obuoluito, ut ne ubi summū digitum apprehēsum extendis elabatur. Quū au- tem obuolueris, alter quispiam manū supra iuncturā apprehēdat, alter digitum obuolutū, atq̃ ita uterq̃ ad seipsum probe extēdat, simulq̃ elapsum articulū ad sedem suam detrudat. Si uero in obliquū excidit, extēnsionis quidē idem modus est. Vbi uero iam uisus fuerit tibi articulus lineam trāsgressus esse, simul cū ex- tensione statim ad locū suū detrudere oportet, ita ut alius quidam ex altera digi- ti parte obseruet ac repellat, ut ne rursus illic elabatur. Moderate quoq̃ repositi- onem faciunt uimineæ texturæ, sauræ id est lacertæ appellatæ, ex palmis con- textæ: ita ut dum digitum hinc atq̃ illinc distendis, altera manu lacertam, altera manus iuncturam apprehendas. Postquam aut reposueris, deligare oportet lin- teis quā citissime tenuissimis inceratis, cera neq̃ ualde molli, neq̃ ualde dura. Dura enim de digito abscedit. Mollis aut & liquefcens eliquatur, & digito cale- fiente deperit. Soluendus autem est digiti articulus tertia aut quarta die. In sum- ma, si inflāmatuſ fuerit, frequētius soluēdus est: sin minus, rarius. De omnibus articulis hæc dico. Restituitur digiti articulus decima quarta die. Idem uero est curationis modus digitorū manus ac pedis. Circa omnes aut articulorū repositi- ones attenuare oportet ac fame macerare usq̃ ad septimū diem: & si inflāma- ti sint, frequētius soluere: sin minus, rarius. Quietē uero semper habere oportet afflictuſ articulū, & q̃ optime figuratum positū esse. Genu porro propter expeditā ac facilem naturam, miſius est q̃ cubiti gibbus. Quare etiā facile exci- dit. Excidit autem sæpe intrō. Sed & extra, & in posteriōrē partem. Repositio- nes aut fiunt ex repentina cōflexione aut ex calcitatione: aut conuolutā fasciæ molem in poplitem ponito, & circū illam corpus ita ad flectendū genua in ter- ram dimittit. Potest etiam ubi in posteriōrē partem excidit, moderata extēnsio- ne reponi, ueluti cubiti gibbus. Si uero hac aut illac excessit, ex cōflexione aut ex calcitatione reponitur. Cæterum directio ex moderata extēnsione omnibus cōmunis est. Si uero nō inciderit, hi quibus in posteriōrē partem excidit, flecte- re nō possunt: Sed neq̃ alij ita ualde: minuitur autem femoris & tibiæ anterior pars. Si uero intrō, ualgiores fiūt. Minuūtur autē externæ partes. Si uero extra, magis uari ac detorti, minus claudi fiunt. crassiore aut osse uehūt, & internæ partes minuuntur. At si ex natiuitate, aut in augmēto hæc fiant, iuxta priorē ra- tionem res se habet. Cæterū articuli circa malleolos luxati extēnsione uehementi opus habēt, aut manibus, aut alijs huiusmodi: & simul directionē utrunq̃ præ- stante. Commune autē hoc est omnibus. At uero luxationes articulorum in pede, uelut eas quæ in manu fiunt sanabis. Qui uero cū tibia cōmunionem ha- bent, & ex natiuitate elapsi sunt, aut etiā in augmento luxati, eandē cum manu

repositi

repositionē expetunt. Quicūq; uero facto saltu ex supernis, calcaneo inniteres se firmarunt, sic ut ossa disparata sint, & uenæ humores effuderint, & nerui cōtusi sint: si grauius hæc acciderint, periculū est ne corruptione accedente per omnē uitam affligātur. obtorta enim sūt ossa, nerui autē inter se cōmunionē habent. Quin & quibus fractis, aut ex uulnere, uel in tibia, uel in femore: aut neruis exolutis qui his cōmunicant: aut ex negligenti decubitu, calcaneū fuerit denigratū, etiā his maximæ recrudescētiæ ex talibus sūt. Quādoq; etiā ad corruptionē accedūt febres acutæ, singultuosæ, mentē percellētes, citā mortē inducentes, & insuper uenarū sanguifluarū liuores. Signa recrudescētū sunt, si effuso sanguine sugillata, & denigrata, & uicina his, subdura ac subrubra fuerint. Si enim cū duricia liuescāt, periculū est ne denigrescāt. Si uero subliuida sint, aut etiam liuida mollia et diffusa: aut cū uirore subpallida ac mollia: hæc in omnibus talibus bona sunt. Curatio si febris absit, ueratro in potu dato fit: si minus, nō. sed potu si opus sit, fauorū cremor decoctus, aut acetū mulsum dulce detur. Deligatio cōuenit qualis in articulis. Ad cōtusiones autē magis q̄ ad omnia, linteis pluribus ac mollioribus utendū est, & minus cōprimendū, & plurima insuper calcaneo obuoluēda. Figura sit uelut deligatio postulat, ut ne ad calcaneū expriamur. Ferulis utendū non est. Quibus uero aut ipse pes solus excesserit, aut cū appēdice, excidit quidē magis ad internā partē: his si nō rursus incidat, attenuatur progressu tēporis & coxa, & femur, & tibię pars luxatiōi opposita. Repositio est uelut iūcturæ ad manū. Extēsiō autē uehemens. Curatio pro lege articularum. Recrudescit, sed minus q̄ manus articulus siue iūctura, si quieuerint. Victus parciōr quiescentibus expedit. Quæ uero ex natiuitate, aut in augmento fiunt, iuxta priorem rationem.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE VLCERIBVS, IANO CORNARI

rio Medico Physico interprete.



ULCERA uniuersa, nisi uiuo, humectare nō oportet, si non in articulo fuerit ulcus. Nam siccū sano propius est, & humidū non sano. Est enim ulcus, humidū: quod uero sanū est, siccū. Præstat autē absq; deligatione sinere, præterq̄ q̄ cataplasma imponitur: quanq̄ aliqua ulcera neq; cataplasma ferre possint, magis aut recētia q̄ uetustiora, & quæ sunt in articulis. Modicus cibus, & aqua, q̄ maxime omnibus ulceribus conducunt, & magis recētiōribus q̄ uetustioribus, & si quod aliud ulcus inflammationem est, aut inflammationē minatur, & si periculū est corruptiōis: & ulceribus ac inflammationibus in articulis: & ubi conuulsionē fieri periculū est: & uulneribus in uētre. Maxime uero omniū, fracturis in capite ac femore, & si cui aliq; parti fractura cōtigerit. Stare autē ulceri minime cōducit, præsertim si quis in crure ulcus habeat: imō neq; sedere, neq; ambulare. Verū ociū & quies maxime cōferunt. At uero recētia ulcera omnia, tum ipsa, tum circūsitæ partes, minime inflammationem incurrent, si quis q̄ citissime suppuret, & pus ab osculo ulceris nō interceptum supprimatur: aut si quis auertat, ut omnino non suppurentur, præterq̄

præterquam necessario, eoq̃ paucissimo pure, & sicca sint q̃ maxime ex medicamento nō molesto. Ignē enim feruorē hoc inducit, ubi horror & pulsatio accesserit. Inflāmantur enim ulcera tunc quū ad suppurationē tendūt. Suppurantur aut̃ alterato sanguine ac calefacto, donec putrefactus taliū ulcerum pus fiat. Quum uero cataplasmate opus esse uisum fuerit, nō ipsum ulcus cataplasmate integere oportet, sed circumsitās partes, quo pus decedat, & quæ indurata sunt mollescant. Cæterū ex ulceribus si quod acuto specillo incisum aut dissectū fuerit, cruentis uulneribus aptū medicamentū suscipit, & resiccatoriū quoddā, quod prohibet suppurationē. Si qua caro ex telo cōtusa & dissecta est, eam curare oportet, quo q̃ celerrime suppuretur. Nam & minus inflāmur, & necesse est carnes cōtusas ac dissectas, putrescere ac pus fieri, & eliquari ac confusari: & postea nouas carnes nasci. Omni recenti ulceri, præterquā in uentre, conducit frequenter sanguinē defluere facere, prout oportunū esse uisum fuerit, & ab ipsis partibus ulcus cōplectentibus, tum aliās, tum si in tibia ulcus fuerit, aut in digito pedis aut manus, magis q̃ si alicubi in alia corporis parte. Sanguine enim defluente gracilescētia, sicciora fiunt ac minora. Prohibet enim hoc maxime talia ulcera humectari. Deinde uero in omnibus, putredo sanguinis ex sanguinis transmutatione fit. Cōfert aut̃ post sanguinis defluxionē in talibus ulceribus, etiam spongiam deligare densam, mollem, cōcisam, sicciorē q̃ humidiorē: aut super spōgiam superne folia multa ponere. At oleū, & quæcūq̃ molliā, aut oleosa sunt medicamēta, talibus ulceribus nō conducūt, si nō ualde iam ad sanitatē tendant. Neq̃ ulceribus ex recēti uulnere oleum cōducit, neq̃ molliētia, neq̃ adiposa medicamenta, tum aliās, tum quod ulcus ampliore purgatione opus habet. Ut aut̃ in summa dicam, oleo illitio faciēda est, & in æstate, & hyeme, in his ad quæ talibus medicamētis opus habemus. Depurgatio uentris deorsum plurimis ulceribus cōfert, & in uulneribus quæ sunt in capite, & in uentre, & in articulis, & in quibus corruptionis periculū est, et in his quæ cōfuta sunt, & in exedētibus ac serpētibus, & aliās inueteratis ulceribus. At ubi deligare uoles, pharmaca nō prius imponere oportet, q̃ ubi ualde siccū feceris ulcus. Tunc uero apponere oportet, ulcus aut̃ sæpe spōgia detergere: & rursus linteū siccum ac purum sæpe adhibere, atq̃ sic imposito medicamēto quod conferre uidetur, deligare, aut nō deligare. Plerisq̃ ulceribus tēpus calidius cōmodius est hyeme, exceptis his quæ in capite sunt ac uētre: magis uero æquinoctij tempus. Vlcerā quæcūq̃ probe & prout oportet purgata sunt, semper ad sicciorē modū germinationē faciunt. Hæc aut̃ plerūq̃ carne nō superexcresecūt. Si undecūq̃ tandē os discesserit, aut ustum, aut sectū, aut alio modo, horū ulcerū cicatrices cauiore sunt. Vlcerā nō purgata, nō committi solent etiāsi adducantur, neq̃ sua sponte coeunt. Vbi circumsitæ ulceris partes inflāmatæ sunt, quandiu durat inflāmatio, ulcera coire non solent. Sed & ubi circumsitæ partes denigratæ fuerint, & sanguinis putredine, aut etiam uarice, influxionē sanguinis exhibente, neq̃ hæc coire solent, si non circumsitās ulceris partes sanas feceris. Ex ulceribus rotunda si subcaua fuerint, excidere oportet undiquaq̃ in orbē ea quæ discesserunt, aut omnia, aut ex dimidio circuli, secundum longitudinē naturæ hominis. In omni ulcere igne sacro accedente, corpus purgationem facere oportet, in utram partem ulceri contulerit, siue

siue sursum, siue deorsum. Cui tumor obortus fuerit circa ulcus, ulcere non inflammato, huic postea temporis progressu tumor puris subsidentiam habet.

Quodcūq; ulcus ex inflammatione tumidū non sedatur, dum alia quæ simul inflammari ac tumescere coeperunt sedantur, etiā hoc non coalescere periculum est. Quæcūq; uero ex casu, aut alio quopiam modo diffecantur, & contunduntur, & intumescunt, ita ut uicinæ circūcirca partes suppuratæ, pus de tumoribus per ulcus egerāt: in talibus quicquid cataplasmate opus habere uisum fuerit, nō super ipsum ulcus cataplasma ponere oportet, sed super circūscitās partes, quo pus decedat, & indurata molliantur. Postquā autē mollita fuerint, & inflammatio sedata, spōgijs super ea quæ abscesserunt deligatis compescito, initio à sana parte factō, atq; ita procedēdo. Superne uero super spōgiam folia sint multa. Quum uero cōpesci nō poterit caro, quæ humida existit, in causa est ut hanc eijcias. Si sub profunda carne ulcus fuerit, ex utrisq; & ex deligatione, & ex eo quod insuper cōpresit, hoc sanè incuruum subattollitur, & si quis id secet specillo, si fieri poterit, ad fluxionem accommodatū ab ore ulcus refecare oportet, ubi cōmodum tēpus esse uisum fuerit, atq; ita curationē adhibere, quæ licūq; tandē indigere uidebitur. Plerūq; uero in omni ulcere quod uentrē habet, in directum ad uisum cōspicua sunt omnia, tumore nō præsente. Et si quidem in ipso fuerit putredo, aut caro suberit humida ac putrida, hoc ulcus & cōplectentes ulcus partes, aspectu nigra subliuida erunt. Et in excedentibus ulceribus, qua parte phagedæna affuerit, uehementissimēq; depascitur ac edit, ea parte circūscita ulceris pars colorē habebit nigrū, subliuidum. Cataplasmata tumorum & inflammationis in circūscitis partibus sunt, uerbascum coctū, & trifolij folia cruda, & ligustri folia cocta, & poliū. Si uero etiā purgari opus habuerit ulcus, omnia quidē etiam hæc purgant: Sed & fici & oleæ folia, & marrubium. Coquere autē oportet hæc omnia, & maxime uiticem, & fici ac oleæ folia, & malī punicæ folia similiter coquere oportet. Crudis uero his utendum est. Maluæ folia terito cū uino, & rutæ folia, & origani uiridis. Omnibus his lini semen torrefactum ac tusum q̄ leuissime, ammiscere oportet. Vbi uero periculum est ignem sacrum in ulceribus oboriturū esse, isatidis folia trita cruda cū lini semine imposito, aut lini semen solani aut isatidis succo subactū imposito. Quū autem ulcus purum quidem fuerit, uerū inflammatū est & ulcus, & circūscitæ itidem inflāmatæ partes, lentem uino coctam, ac leuiter tritam, oleo modico subactam imposito, ac deligato, & rubi canini folia in aqua cocta, leuiter trita imposito, linteo tenui subextento, puro, uinoq; ac oleo madefacto. Et ubi cōmittere ac coalescere ulcus uoles, rubi canini folia uelut lentē præparato. Nasturtiū item sauridion à lacerti similitudine appellatū, uinum, & lini semen tenuiter tritum cōmiscuntur. Et hæc, lini semen, & uitex crudus, & alumen meliū: hæc accito subacta. Vuam albam immaturā per colum in uas aeris rubri expressam, per dies ad solem exponito, noctu autē tollito, ut ne irroretur. Per dies uero indefinenter terito, ut æqualiter siccetur, & de æneo uase q̄ plurimum assumat. Tanto autem tempore ad solem exponere oportet, donec ad mellis crassitudinē de uenerit. Postea & hunc succū, & mel q̄ optimum, & uinum dulce, in æneam ollam infundito, ita tamen ut prius resinam terebinthinā in uino coquās, donec dura fiat instar mellis cocti, & postea resinam eximas, & uinū affundas. Sit autē plurimus

plurimū uuæ immaturæ succus. Secūdo loco uinū. Tertiō mel. Myrrhā etiā intacten q̄ optimam leuiter tritam, eodē uino paulatim affuso diluito; & postea ipsam per seipsam cū uino sæpe agitando coquito, & ubi ad bonā crassitudinē deuenisse uidebitur, ad uuæ immaturæ succū affundito. & nitrū optimum torrefactū sensim ad pharmacum ammisceto, & floris æris minus q̄ nitrī. Hæc postquā miscueris, coquito nō minus tribus diebus, lignis ficulneis nō multis succensis, aut prunis, ut ne torreatur, & ubi hoc pharmacū illinitur, omnia quæ imponūtur sicca sint, & ulcera non humectentur. Utendū autē est hoc pharmaco ad ulcerata inueterata ac recētia. & ad pudendi, & capitis ac aurium ulcera.

Aliud ad eadem ulcera. Fel bubulum siccū, mel q̄ optimū, uinum albū in quo cocta sint loti ramēta, thus, myrrhæ æqualis, crocus æqualis, flos æris simi liter. Ex liquidis autē uinū sit plurimū, deinde mel, paucissimū uero fel. Aliud.

Vinū, mel, oleum cedrinū: Sicca uero sint, flos æris, myrrhæ, malicoriū siccū. Aliud. Flos æris tostus dimidia parte, myrrhæ duæ partes dimidig, croci partes tres, mel modicū, cum uino hæc torrentur. Aliud. Thuris pars, gallæ pars, croci tres. Hæc singula sicca q̄ leuissimē terito, deinde mixta ad solem calidissimū, affuso uuæ immaturæ succo, donec uiscosa fiant, per tres dies terito. postea uino, austero, nigro odorato, paulatim affuso diluito. Aliud. In uino dulci albo ilicis radices coquito, & ubi probe habere uisum fuerit, de uino defuso duas partes sumito, & amurcæ olei q̄ siccissimæ partē unam. Postea agitando coquito, ut ne torrefiant, lento igne donec ad bonā crassitudinem deueniāt.

Aliud. Reliqua quidē eadem sint. Verū pro uino, acetum sit album acerrium, in quo tinctæ sint succidæ lanæ. Postea ammixta amurca coquito, & succum caprifici affundito, & alumen meliū, & nitrum ac æris florem, utraq; tosta ammisceto. Hoc magis priore ulcera purgat. Verum prius non minus resiccat.

Aliud. Lanæ succidas paucissima aqua tingito, deinde uini tertiā partem ad aquā misceto, ac coquito donec bona prouenerit crassitudo. Ex his recentia uulnera q̄ citissime suppurari possunt. Aliud. Aron siccum inspergito ac adaptato. Aliud. Fici dum succulenta est corticem uiridē, in uino tritū immitto: & sine uino, ipsum etiam cum melle. Aliud. Ad acetū in quo cocta sunt loti ramenta: sit autē acetum album: amurcam oliuarū, & picis serū crudum ammisceto, & illinito, & instillato, & deligato sicca. Hoc recētia uulnera auertit ne suppurētur: aut aceto abluito, & uino imbuta spōgia extergito. Aliud.

Plumbū tritum cū spodio cyprio leuigatū inspergito. Et loti ramenta inspergito. & squamā æris, & chalcitidem cū ære, & solam per se, & cum loti ramentis. Et aliās ubi siccis opus fuerit, talibus utendū est, & spodio Illyrico trito cum ramentis, & ipsis solis ramētis, & flore argēi solo quā leuissimē trito. & aristolochiam rasam ac tritā leuiter, inspergito. Aliud ad cruenta uulnera. Myrrhæ, thus, galla, ærugo, flos æris tostus, alumen Aegyptiū tostum, cenanthe, lanarum sordes, plūbago, Horū singulorū æquale pondus diluitur cū uino uelut superius, & reliquā præparatio fit eodē modo. Aliud. Acetū q̄ acerrimum album, mel, alumen Aegyptium, nitrum optimū leuiter tostū, fellis parum, simul coquito. Hoc carnē superexcrecentem consumit, & cauat, & non mordet.

Aliud. Herba est paruis folijs prædita, cui nomē est Parthenium microphyllum. Hæc uerrucas de pudendo aufert: & chalcitis ex insula Melo cruda,

& elaterium tenue siccū adstringit. & malicoriū tenue siccū eodem modo. Maxime autē replet caua, pura, herba Lagopyrus nomine: est autē tritico similis ubi arefcit, folio paruo uelut olea, sed longiore: & marrubij folium cum oleæ folijs.

Aliud. Caricæ siccissimæ internā partem pinguem, mellis speciē referentē duabus portionibus, cū seminis lini tosti nō admodū, ac triti q̄ tenuissimè parte una. Aliud. Caricę partem internā, & florē aris tenuem modicum, & fici succum. Aliud. Caricę partē internam, chamæleonē nigrū, bubulū fel siccū.

Aliud. Reliqua quidē eadem sint. Verū sicca, nasturtiū tenue crudū, irio, utrūq̄ pari pōdere: caricæ uero partes duæ sint, & seminis lini partes duæ, cum fici succo. Quū autē aliquo horū pharmacorū uteris, splenia aceto imbuta super ne imposito, & spongia super splenia imposita deligato, & paulo magis apprimito. Si uero circūsitæ partes inflāmatae fuerint, quicquid cōferre uisum fuerit circūponito: Si liquido uti uoles, etiā caricum pharmacū illinito, & uelut supra scriptum est deligato eodē modo. Est autē ex his pharmacū factum, ueratro nigro, sandaracha, squama aris, plumbo usto, cū multo sulphure, auripigmento, cantharide. Ex his prout uisum fuerit cōponito, ac utitor. Diluuntur oleo cedri no. Postquā uero satis fuerit illitū, pharmacū eijcito, & aron coctum, tritū imposito: aut siccū, tritū, oleo subactum. Et si sicco Carico uti uoles, liquida remouere oportet, & pharmacū inspergere. Facit autē siccum ex ueratro solo cōstans ac sandaracha. Aliud liquidū. Herba est cuius foliū simile est aro natura, uerū album, lanuginosum, ad hederæ folij magnitudinē. Hæc herba cū uino imponitur. Aut ilicis partem eam quæ est circum truncum, cū uino tritam imposito.

Aliud. Vuæ immaturæ succus, acetum acerrimū, flos aris, nitrū, succus caprifici. Ad uuæ immaturæ succū alumen inijcito tenuissimè tritū, & in uas aris rubri immisum ad solem exponito acagitato, & ubi ad bonam spissitudinem deuenerit tollito. Sicca ad cruenta uulnera hæc faciunt. Veratrū nigrū tenuissimè tritū inspergitur, quādiu aliquid humoris inerit ac depascētis. Deligatio uero eadē est quæ in emplastris. Aliud. Salis grana siccissima in æneam ollam, aut fictilem nouā immittito, magnitudine maxime æqualia, non magna: & mel optimū dupla salis mensura, pro cōiectura facta, ad salē affundito, deinde ollam prunis imposito, & dum totū combustū fuerit finito. Postea exterso ac expurgato per spōgiam ulcere inspergito, & uelut prius deligato, & paulo magis cōprimito. Postridie uero qua parte nō adhæserit pharmacū inspergito, cōprimito ac deligato. Vbi uero pharmacū discedere uoles, acetū calidū affundito, donec discedat, & rursus eadē facito, si opus fuerit extersione per spongiā facta. Aliud siccū mordax. Misy q̄ leuissimè tritū inspergito in ea quæ humida sunt ac putrida: & florē aris tenuem nō penitus leuiter tritū. Aliud siccū similiter mordax. Vbi spōgia extersisti, lanās q̄ maxime succidas in testa exurito, face admota donec totas cōbufferis, hoc pharmacū leuiter tritū inspergito, & eandem deligationē adhibeto. Aliud siccū ad eadē ulcera. Chamæleo niger, alumē fici succo subactū, subigito autē tostum, & anchusam misceto.

Aliud. Anagallis & alumē Aegyptium tostū. Aliud. Puluillū inspersilem Orchomeniū inspergito. Cæterū ad nomas proserpēdo depascētes, alumē Aegyptiū tostum, itēq̄ Meliū facit. Verū nitro tosto insperfo prius præparare ac spōgia extergere oportet. Facit & chalcitis tosta. Torrere autē oportet, donec
flammæ

flammæ speciem induat. Ad uetera ulcera in tibijs fientia, fiunt aut sanguis nolenta et nigra, meliloti florem tritum, melle subactū, cataplasmatīs modo utere. At uero supra neruos dissectos, myrti syluestris radices contusas ac cribratas, & oleo subactas deligato. Et herbam quinquēfoliū: est aut alba & lanuginosa, & altior à terra, q̄ nigrū quinquēfolium: in oleo tritū deligato, & tertia die exoluito. His autē medicamētis in hyeme potius q̄ æstate utendum est.

Medicamenta molliētia, quæ etiam cicatrices pulchras faciunt. Scillæ internā partem mucosam terito, & resinam de picea, cum recentī adipe suillo, & oleo modico, resināq̄ ac cerula modica. Et adipem anserinū, ac suillum recentem purum, & oleū modicum, & scillam, & ceram albissimā. Aut scillam, oleum album, resinæ parū, ceram, adipem suillum ueterem ac recentem. Facit & oleū, & ærugo, & scilla, & resina. Sint aut duæ partes ueteris adipis ad recentem. De reliquis autē quantū oportūnum esse uisum fuerit. Adipem recentem liquefactū in aliam ollam defundito, & plūbaginem leuissimē tritam ac cribratam cōmisceto ac coquito, & primū agitato. Coquito autē donec destillatū in terram cōgeletur. deinde tollito, ac reliquū diffundito, præter lapidem subfidentem: & resinam inijcito ac agitato, & modicū oleum cedrinū, & quod prius diffusum ac ablatū fuit ammisceto. Porro in omnibus mollibus in quibus resinam ammiscēs, ubi pharmacū ab igne abstuleris, in calidum adhuc resinam immitto ac agitato. Aliud. Adeps suillus uetus & nouus, & cera, & oleum: Sicca uero, loti ramenta, thus, plumbago: thuris uidelicet pars una, plumbaginis una, & ramentorū loti una. Sint autē adipis ueteris partes duæ, ceræ una, & noui adipis una. Aut adipē solum ueterem suillū, & cum ipso adipem caprinum recentē, q̄ minime cum mēbrana, sed purgatū, parum terito aut cōtundito, & oleum affundito, & plumbū cum spodio inspergito, & ramentorū loti dimidium. Aliud. Adeps caprinus, spodium, chalcitis cærulea, oleum.

De Ambustis. Illicis radices coquere oportet teneras. Quarum si cortex crassissimus est ac uiridissimus, cōsectum in tenues partes, uino albo affuso, lento igne coquito, donec ad bonam crassitudinē deueniat, ut illini possit. Potest & in aqua coqui eodē modo. Aliud non mordax. Suillum adipem solum ueterē liquefactum illinito. Superne uero scillæ radicem dissectam imposito ac deligato. Post die uero foueto ac perfundito, & adipem suillum ueterē liquato, & ceram ac oleum ammisceto, thus item, & loti ramenta, ac miniū, hoc ubi illeueris, ari folia in uino ac oleo cocta apponito ac deligato. Aliud. Post quā suillo adipe illeueris uetusto, hastulæ regiæ radices in uino coctas ac tritas superillinito. Aliud. Adipem suillum ueterē liquato, & resinā ac bitumeni ammisceto, & hæc linteo illita, ad ignē calefacta, imposito ac deligato. Quum in dorso ex plagis, aut aliās ulcus factum fuerit, scilla cocta, trita, ac linteo illita deligato. Postea uero adipē caprinum, & recentem suillum, & spodiū, & oleum, & thus illinito. Tumores in pedibus fientes, & sponte, & non sua sponte, in quibus nec tumores, nec inflāmatio, à cataplasmatīs sedatur: & si quis spōgias deliget, aut lanas, aut aliud quid super sanam partem, postea intumescunt sua sponte, ac inflammātur: influxio sanguinis per uenas in causa est, si cui non cōfusio causa est. Et si alicubi alia in corporis parte tale quid fiat eadem ratio est. Verum sanguinē detrahēre oportet, de uenis præsertim influentibus, si cōspici-

cuæ fuerint. Sin minus, pertūdere tumores oportet, profundioribus ac frequentioribus uulnusculis impactis: Sed & in alijs omnibus quæ pertūdis, sic facere oportet, atq; hoc acutissimis ac tenuissimis ferramētis. Quū uero sanguinē detrahis, specillo ne ualde premas, ut ne contusio accedat. Aceto autē perluīto, & grumū sanguinis in hiatibus ne relinquito: & illito cruētis uulneribus destinato medicamēto, lanas succidas, carminatas, molles deligato, uino & oleo resperfas. Et pertusam partē æger ita habeat, ut refluxus sit sanguinis, nō defluxus: & omnino nō humectet: et parū cibi capiat, & aquā bibat. Si uero ubi solueris, fissuras reperiēris inflāmatas, cataplasma ex uitice ac lini semine imposito. Si uero ulcerata fuerint fissuræ ac eruperint, ad rem respiciēs, & quod opus fuerit adhibens, de cætero curato. At ubi uarix inest in tibia, aut conspicuus, aut in carne, & tibia est nigra, & uidetur opus habere sanguine ab ipsa defluēte: talia nequaquā pertundere oportet. Plerūq; enim magna ulcera ex fissuris fiūt, propter uaricis influxū. Verū uaricē ipsum aliās atq; aliās cōpungere oportet, ubi oportunum esse uisum fuerit. Cæterū quum uenā secueris, postq; sanguinem dimiseris, & fasciam solueris, & nō sistatur, in contrariū, partem habeat, quō refluxus sanguinis fiat, siue manus fuerit, siue crus, utpote sanguine retro fluēte, atq; ita tēpus longius aut breuius decūbens expectet. Postea ipsum sic habentē deligato, nullo grumo existēte in fissura. Deinde spleniū duplum uino imbutū apponito, & super ipsum lanā puram oleo imbutā. Nam etiam si influxus sanguinis fuerit uiolentus, suppressio sit influentis. Et si grumo in fissura manente sic inflāmetur, suppuratur. Pransum autē & potū plus aut minus uenā secare sinere oportet, & aliquantū calefactū: & die calidiore q̄ frigidiorē. Si uero influat sanguis cucurbitā affigere oportet, & si ablata cucurbita, multū sanguinis, aut serosus sanguis fluat, cito priusquā repleatur rursus affigere, & quod restat extrahere. Sin minus, grumi in fissuris inhærēt, & deinde ex ipsis inflāmata ulcera fiūt. Aceto autē omnia talia perluere oportet, et postea nō humectare, neq; in fissuras decūbere. Verum aliquo medicamēto cruētis uulneribus destinato fissuras illinere. Et quū infra genu, aut ad genu affigere cucurbitas oportuerit, stanti erecto, si stare potuerit, affigantur.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE FISTVLIS, IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.



FISTVLAE fiunt quidem ex cōtusionibus et tuberculis, fiunt autē & ex remigatione ac equitatione, quū in natibus cōgregatus fuerit sanguis prope sedem. Putrescens enim distribuitur ad molles partes, nimirū quum & intestinū rectum sit humidum, & caro mollis, in quā distribuitur, donec tuberculū eruperit, & deorsum ad rectum intestinū cōputruerit. Postq; autem hoc factū fuerit, in fistulam abit, ac sanie manat, & stercus per ipsam fluit, & flatus, & abominatio multa. Ex cōtusionibus itaq; fit fistula, ubi aliquis circa rectū intestinum locus cōtusos fuerit ex plaga, aut ex casu, aut uulnere, aut equitatione, aut remigatione, aut quæcūq; talia sunt. Cōgregatur

gatur enim sanguis. Putrescens aut suppuratur, à suppurato uero ea quæ de tuberculis dicta sunt patitur. Primū igitur quū tale quoddam tuberculum nascēs senferit, crudū q̃ citissime secare oportet, priusquā suppuretur ad rectū intestinū. Si uero iam ægrōtantē ex fistula assumpseris, aliī caulē recētem accipe, & homine supino reclinato, diductis cruribus altero huc, altero illuc, caulē immitte donec offendas ac impingas, & fistulæ profunditatē per caulē metirē. & seselis radicē tenuissime tritam, aqua affusa ad diēs quatuor macerato, eamq̃ aquam trium cyathorū mensura, melle ammixto æger bibat ieiunus. Cum hac etiā ascaridas purgato. Quicūq̃ uero relictī fuerint nō curati, moriūtur. Postea linteam byssinū tithymalli magni succo imbutū, flore gris tosto trito in sperso, in penicilli figurā intorque longitudine fistulæ æqualem, filo per summū penicillum trāsmisso, & rursus per summū caulē: & homine supino reclinato, adhibito catoptere instrumēto sedem expandente, corrosam recti intestini partē inspicio, & sic caulē immittito: & ubi in intestinū inciderit, apprehesum retrahito, donec penicillus fuerit intrusus, & superiori ac inferiori parti adæquatus. Postquā uero fuerit intrusus, glandem corneā in intestinū indito, & podicē ex terra cimolia oblito finito. Vbi uero uentrē exonerat, eximito, ac rursus indito, donec ad quintū peruenerit diē. Sexta aut eximito, extrahens penicillum ex carne, & alumen terito, eoq̃ glandem expleto, & in intestinū indito ac finito, donec alumen liquidū fiat. Podicem uero myrrha illinito, donec coaluisse uisus fuerit. Alia curatio. Crudum linum tenuissimum accipito, & ad palmi longitudinē quincuplicato, & pilum equinū circumdato. Deinde factō specillo stāneo in summa parte perforato, & initio lini cōplicati in specillum immisso, specillum in fistulam demittito, & simul sinistræ manus digitū indicem in sedem indito: ubi uero specillum cōtigerit digitū, inflexa summa specilli parte, initium lini quod est in specillo per digitū adducito: & specillum quidem rursus extrahito, lini uero initia bis aut ter cōnectito, & reliquam lini partem intortam ad nexum deligato. Postea uero dimissum negocia sua obire iubeto. Cæterum quantum putrescente fistula de lino laxatur, tantū augere oportet, ac intorquere semper singulis diebus. Si uero linū crudum cōputrescat, priusquā fistula corrodat, aliud linum ad pilum innecte, immitte ac cōnecte. Pilus enim ea de causa ad crudum linum additur, q̃ non putrescit. Postquā uero fistula cōputruerit, spongiā mollem in tenuissima frusta cōcisam apponere oportet. dein de in fistulam quidē, florem æris tostum multū per specillū immittere. Spongiā uero melle illinere, & subiecto digito indice sinistræ manus, ultra protrudere: & appositā alteram spōgiā deligare, eodem modo uelut in hæmorrhoidibus. Postridie uero exoluere, & aqua calida abluere, & cū spongia per sinistræ manus digitū fistulā purgare conari: & rursus gris florē immittere, ac spōgiā deligare. Atq̃ hæc facere oportet per diēs septenos. In his enim maximē tunica fistulæ cōputrescit. de cætero uero donec sanata fuerit spōgiā deligare. Nam dum per hunc modum fistula à spongia cogitur ac explicatur, neq̃ rursus cōcidere poterit, neq̃ alia ipsius pars sanabitur, alia uero rursus complebitur, sed in seipsa tota sana erit. Verū in hac curationē multa aqua calida proluere oportet, & fame macerare. Si uero non corrosa fuerit fistula, specillo immisso secato

donec diduxeris, & æris florem inspergito, & ad dies quinque finito. Deinde aquam calidam affundito, et polentam aqua subactâ superimponito, et betarum folia deligato. Vbi uero exciderit æris flos, & fistulæ ulcus purum fuerit, uelut priorem curato. Si uero in loco sit ubi fieri id non possit, & profunda etiâ sit fistula, flore æris, & myrrha, & nitro in urina dilutis colluito: & in fistulæ osculum plumbeam glandem indito, ut ne coalescat. Collutio uero faciêda est, pennæ fistula ad uesicam alligata, & fistula intro immissa, atque sic collutione infusa. Verum sanus non fit, si non secetur. Si intestinû rectum inflammatû fuerit, & dolor habeat & febris, & frequenter ad exonerandû aluum desideat, & nihil egerat, & præ inflammatione sedes exiisse uideatur, & aliquando urinæ stillicidium corripiat: hic morbus fit, quum pituita ex corpore ad intestinum rectum decubuerit. Cõferunt autem calida. Quum enim hæc adhibentur, pituitam attenuare ac consumere possunt, & simul acrimonia sua salsam pituitam aquosam reddere, ut non sit ardor, neque morsus aliquis in intestino. Curare itaque oportet hoc modo. Aegrum in calidam aquam collocato, & trita grani cnidij grana sexaginta, in uini hemina, & olei hemina dimidia diluito, tepefacito, & infundito. Hæc & pituitam educunt & stercus. Si uero in aqua non sedet, oua cocta in uino nigro odorato, ad sedem apponito, calido quoque inferne substrato, aut uesica aqua calida plena. Aut lini semen tostum, molitum, tritû, pari farina, in uino nigro odorato, & oleo ammixta, cataplasmatibus modo calidissime imponito. Aut ordeum & alumen Aegyptium tritum misceto, & glandem oblongam efformato, & ad ignem tepefaciens digitis effingito, deinde summe tepidam effectam in sedem indito. Forinsecus autem cerato oblinito, & allium in uino nigro diluto coctum pro cataplasmate imponito. Postquam uero exemeris, in aquam calidam collocato: & solani succum, & anserinû ac suillum adipem, & chrysocolam, & resinam, & ceram albam cõmisceto, simulque liquefacito, & cum his illinito. & quâdiu inflammatio durauerit, allium coctum cataplasma adhibeto. Et si quidem ad hæc dolore liberetur, satis fit. Sin minus, bibat peplum, meconium album appellatum, aut aliud quoddam quod pituitam purgat. Et quam diu durat inflammatio, edulij leuibus nutriatur. Urinæ stillicidium ex his incidit. Vesica ex intestino recto calefscens, caliditate pituitam adducit: à pituita uero urinæ stillicidium fit. Si quidem igitur unâ cû morbo sedetur, solet enim plerumque ita fieri, satis est. Sin minus, medicamenta ad urinæ stillicidium destinata exhibeto. Si uero sedes elabatur, fomento per mollem spongiam adhibito, & cochleæ muco illito, è manibus deligatû suspedito ad modicû tempus, & redibit. Si uero amplius excidat, & non maneat intus, laterum mollitudines præcingito, & retrorsum fasciam ex cingulo submittito, & ubi sedem intro protrusisti, spongiam mollem aqua calida, in qua loti ramenta cocta sunt, imbutam imponito. Sed & de aqua ipsa ad sedem affundito, spongiam uero exprimito. deinde fasciam per mediâ crura subextentam, circa umbilicum deligato. Vbi uero aluum exonerare uolet, inter tabulas angustissimas insidens id faciat. Si uero puer fuerit, intra mulieris pedes ad genua acclinatus. Dum autem uentrê exonerat, crura extendat. Sic enim minime sedes exciderit. At si intestinum rectum humidû fiat, & sanies defluat, fece uini uista & aqua ex myrti decocto abluo

luito, et adiantū siccū, tufum, cribratū inſpergito. Si uero ſanguis profluat, ablutione ex iſſdē facta chalcitidē, & cupreſſi, aut cedri, aut pini, aut terebinti ramēta, inſpergito, pari mēſura de his ad chalcitidē ammixta. Forinſecus autem ceratum craſſum oblinito. Quū ſedes ſiue rectum inteſtinū exciderit, & in loco ſuo manere noluerit, ſilphium optimum ac denſiſſimū deraſum tenue inſpergito: & ſternutatoriū medicamentū ad nares apponito, & hominem ad iram exacerbato. Aut ubi aqua calida abluifti, malicorium, & alumē, in uino albo trita, ad ſedem affundito. deinde panniculos apponito, & femora per dies tres colligato, & ieiunet. Vinū autē bibat dulce. Si uero neq; ſic retro cedat, miniū mixtū cum melle illinat. Inteſtinū rectum ſi procidat, & ſanguis profluat, de ari radice detractum corticem in aqua coquito, deinde tritū farina ammixta calidum imponito. Aliud. Vitis ſylueſtris, quā aliqui piſiothrion uocant, radices tenerrimas deraſas in uino nigro meraco aſtero coquito, deinde tritas tepide imponito. Sed & farinā ammiſceto, & in uino albo ac oleo ſubigito, & tepide imponito. Aliud. Cicutæ ſemē uino albo odorato inſtillato terito, deinde tepide imponito. Si uero inſſammatū fuerit, hederæ radicē in aqua coctā, leuiter tritā, ammixta farina optima, in uino albo ſubactā imponito, & oleū ad hęc ammiſceto. Aliud. Mandragoræ radicē maxime uiridē, ſin minus, ſiccā: uiridem itaq; lotā ac cōciſam, in uino diluto coquito, ac imponito: ſiccā uero tritā ſimiliter imponito. Aliud. Cucumeris peponis internam partem leuiter tritam imponito. Si uero dolor fiat, & inſſammatū nō ſit, nitrū rubrum aſſato, ac leuiter terito, & alumē ac ſalem torreto ac leuiter terito, et pari mēſura ſingula miſceto. deinde ad picem optimam ammiſceto, & linteo illita apponito ac deligato. Aliud. Capparis folia uiridia trita, in marſupii cōiecta adalligato: & ubi urere uideberis aufero, ac ruruſus apponito. Si uero folia non affuerint, corticē radicis capparis cōtuſum, uino nigro ſubactū, eodē modo alligato. Hoc etiam ad ſplenis dolorē bonum eſt. Ex his cataplaſmatis quæ quidē frigeſaciūtur, fluere prohibent: quæ uero molliunt ac caleſaciūtur, diſſundunt: quæ in ſeſe trahunt, ſiccant & attenuant. Porro hic morbuſ fit, quū bilis & pituita ad hoſ locos decubuerit. At recto inteſtino inſſamato medicamēto in quod reſina, & oleū, & cera, & plūbago, & adeps calidiſſimus cōmiſcentur, illinere oportet.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE HAEMORRHOIDIBVS, IANOCOR
nario Medico Phyſico interprete.



HAEMORRHOIDVM morbuſ hoc modo ſit. Quū bilis aut pituita ad uenas recti inteſtini decubuerit, ſanguinē qui in uenis eſt calefacit. Caleſcētē autē uenę ex uicinis uenulis ſanguinē attrahunt: et ubi replētur, interna ſedis pars intumēſcit, & capita uenarū ſupereminēt: & partim dū à ſtercore exēte cōprimūtur, partim dū à coaceruato ſanguine cogūtur, ſanguinē ei aculātur: atq; hoc maxime quidē unā cū ſtercore, aliquādo uero etiam ſine ſtercore. Curare autē oportet hoc modo. Primū equidē noſſe

oportet in quo loco sint hæmorrhoides. Rectum enim intestinum & secans, & resecans, & consuens, & urens, & putrefaciens, etiam si grauissima hæc esse uideantur, nihil læseris. lubeo autē præparari ferramenta septē aut octo, magnitudine palmi, crassitudine specilli crassi, ex summa parte reflexa ac lata, uelut in obolo paruo. Et ubi priore die purgatorio medicamēto purgasti, ea qua rem aggrederis urito, & homine supino reclinato, & puluinari sub lumbos subiecto, sedem quæ maxime per digitos foras extrahito: ferramenta quæ candentia facito, ac urito, donec resiccaueris, & hoc ita ut ne contingas. Vrere enim oportet, & nullam hæmorrhoidem sine uisione sinere, sed omnes exurere. Cognoscēs autē hæmorrhoidas nō difficulter. Supereminet enim in internā recti intestini partē, uelut uuæ acini, liuidæ, & simul ut sedes extrahitur, sanguinē eiaculantur. Detineant autē aliqui ipsius caput & manus, dum uritur, ut ne moueatur: & dum uritur uociferetur, sedes enim magis inde eminet. Postquam uero ufferis, lentes ac eruum coquito, & ex aqua trita imposito, ad quinque aut sex dies. Septima uero die spongiam mollem in tenuissima frusta cōcidito. Sit autem latitudo spongiæ undiquaque sex digitorū. deinde super spōgiam lintheū tenue, ac leue, spōgiæ æquale, melle illitū imposito, & postea subiecto digito indice sinistræ manus, mediā spongiam in sedem quæ penitissime protrudito. deinde supra spongiā laminam apponito, quo in sede quieta permaneat. Et laterū mollitudines præcingito, & retrorsum fasciā ex cingulo submittito, quā per media crura receptam, ad cingulum circa umbilicū deligato. At pharmacū de quo dixi, ad densam acrobustam carnē faciendam ac producendā deligatur, & nō minus quæ uiginti diebus hæc deligare oportet. Sorbenda autē est semel in die farina, aut miliū, aut furfurum decoctū: & aqua bibēda. Si uero ad aluū exonerandā desideat, aqua calida proluo. & tertio quoque die lauet. Alia curatio. Extractā quæ maxime sedem, aqua calida perfundito. deinde summas hæmorrhoidū partes præsecato. Pharmacū autem ad sectionē præparatum sit hoc. In cretū uas mingito, & in urinā, aris florē tostum, tritū, leuem inspergito, deinde diluito, ac uas agitato, & in sole siccato. Vbi uero siccātū fuerit, eradito, terito, & lenigatū ad anū apponito, & splenia oleo imbuta addito, ac spōgiam supra deligato. Alius modus.

Adnascitur ad uenā sanguifluam extuberantē, uelut mori fructus. & si quis dem ualde extra fuerit extuberantiā, carnis tectoriū circum ipsam nascitur. Hos minem igitur flexis genibus in duo mortaria siue excisos lapides locato, ac uiseto. Cōperies enim inflatas partes inter nates circa sedem, sanguinē uero intrinsecus procedere. Si itaque mollis sit, & sub tectorio cedat extuberantia, digito ipsam auferre oportet. Nihilo enim plus difficultatis hæc res habet, quā si quis dū ouicula excoriatur, digitū inter cutem ac carnem adigat. Atque hæc interrim dum loqueris, ægro non animaduertēte facito. Postquā autem extuberantiam abstuleris, necesse est sanguinis cursus ex tota detractioe promanare. Itaque uino austero in quo gallæ maceratæ sunt, cito abluere oportet: & uenā sanguifluā unā cum extuberantia peribit, & tectorium sedabitur, & quanto uetustior affectio fuerit, tanto facilius sanatio erit. Si uero penitius intus delituerit extuberantia, per catoptherem inspicito, & ne à catopthere decipiaris uideto. Dum enim aperitur, extuberantiā explanat: dum uero rursus cōtrahitur, recte ostendit

ostendit. Auferre autē oportet, ueratro nigro in anum sublito. deinde tertia die auferre, ac uino austero infuso colluere. Cæterum quod sanguis non fluit, quum abstuleris extuberantiā, mirari nō oportet. Neq; enim si in articulis disseces manus aut crura, sanguis profluat. Si uero supra aut infra articulos secueris, cauas ac sanguifluas uenas comperies: & difficile fuerit ut expedite sistas. Sic etiam hæmorrhoidem in sede, si supra aut infra extuberantiā detractionem seces, sanguis profluat. Si uero ipsam extuberantiā in connexu abstuleris, nō profluat. Si quidem igitur ita sedatur, bene habet: Sin minus, urito, cauendo ut ne contingas ferro, sed prope admotis ferramentis resiccato, & florem æris ex urina apponito. Alius modus curationis hæmorrhoidum. Clysterem facere oportet, uelut arundinem sepiariā, phragmitem appellatam, & in ipsum feramentum probe congruū adaptare. Deinde indita in sedem clysteris fistula, feramentum candens immittere, ac frequenter eximere, quo magis calefieri sustineat, & neq; ulcus ex calore habeat, & uenæ resiccatae sanæ fiant. At uero si neq; urere, neq; refecare uoles, ubi multa calida aqua proluiisti, & sedē euersam extraxisti, myrrham tritam, leuigatam, & gallam, & alumē Aegyptium ustum, una & dimidia ad reliqua parte, & melanteriæ tantundem accipe, atq; siccis his utere. Hæmorrhoids enim ab his medicamentis decedet, uelut corium combustum. Hæc facito donec omnes exstirpaueris. Et dimidia chalcitidis ustæ pars idem efficit. Si uero glandulis sanare uoles, sepiæ testam, plumbaginis tertiā partem, bitumen, alumen, florē eris modicum, gallam, æruginē modicam, commisceto & mel coctū affundito, & formatam ex his glandē oblongiorem apponito, donec exstirpaueris. Muliebrē hæmorrhoidē hoc modo curato. Multa calida aqua proluito. In aqua uero odorata, uelut est myrica trita coquito. Deinde spumam argenti tostam, & gallam misceto, & uinum album, & oleū, & anseris adipem affundito, omniaq; simul trita, post factam prolutionem illinenda dato. Proluere uero oportet sedē quā maxime extracta.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE VISV, IANO CORNARIO MEDICO
Phyfico interprete.



CVI corrupti sponte quidem cærulei fientes, derēpentales fiunt. & ubi facta fuerint, nō est talium sanatio. Qui uero maris speciem referunt, paulatim per multum tempus procedendo corrūpuntur. & sæpe alter oculus in multo tempore postea corruptus est. Huius caput purgare oportet, & uenas urere. Et si quis ab initio curatus fuerit hoc modo, malū sedatur, & in deterius nō procedit. At qui colorē inter caruleum ac marinum mediū referunt, si quidē puero tales fiant, ubi senior sit, sedantur. Si uero seniori septimum annum egresso fiant, melius uidet magna ualde & splendida: & uidet quidem procul, sed nō clare: & si quid ualde ad oculū admouerit, etiam hoc uidet, aliud autem nihil. Confert autem huic capitis purgatio, & capitis ustio. Sanguinem uero his detrahare nō conducit, neq; cæruleo, neq; maris specię referētī. Et uisum oculorū, oculo sano existente, in iunioribus hominibus

hominibus, tum foemellis, tum masculis, quicquā faciendo nihil iuueris, quam diu adhuc augetur corpus. Quū autē non amplius augetur, ipsius oculi palpebras intuitus radendo attenuato, & si opus esse uisum fuerit, etiam ferramentis nō admodum candentibus intrinsecus inurito. Quū uero palpebras oculi raseris, lana milesia, crispa, pura, circū fustum obuoluta, radito, ipsam oculi coronam uitando, ut ne ad chartilaginem usque peruras. Signum autē sufficientis rasuræ est, si non amplius splendidus sanguis exit, sed sanies cruenta aut aquosa. Tunc uero liquido aliquo medicamēto, in quo flos æris est, defricare oportet. Postea autem ubi & rasionis, & uestionis crustæ exciderint, & ulcera purgata fuerint ac germinauerint, fissuram per sinciput secare oportet, & quū sanguis defluerit, medicamēto cruentis uulneribus idoneo illinere. Deinde uero & huius, & omnium caput purgare operæ precium est. Palpebræ si crassiores quæ pro natura fuerint, ex inferna parte carne quantum potes quæ expeditissime resecta, postea palpebram inurito, non candentibus ferramentis, uitando naturam pilorum: aut flore æris tosto tenui adstringito. Quum autē crusta exciderit, uelut reliqua curato. Quum palpebræ scabie laborant, & pruritus habet, floris æris glebulam ad eodem terito, & ex ipso palpebrā defricato. Et tunc squamam æris quæ tenuissime terito, deinde uuæ immaturæ succū excolatum affundito, ac leuiter simul terito, & postea reliquū succum in uase æris rubri affundens, paulatim terito, donec crassitudo fiat uelut allij intritum, & ubi resiccātū fuerit medicamentum, leuiter trito utere. Nyctalops medicamentū bibat deorsum purgans, & caput purgetur, & ceruicem eius quæ maxime scarificato, & fame ad multum tempus premito. Vbi uero remiserit, unū aut duo frusta, prout maxima deuorare potest, de hepate bubulo crudo in melle tincto exhibeto. Si cui oculi dum sani sunt uisum corrumpant, huic sectione & insuper excoriatione, in sinciput facta, os excindere, & aquam auferre oportet, sicque curare: & ita sani fiunt. Ad lippitudinem annuam ac popularem conducit purgatio capitis, & uentris inferni. Et si corpus habeat, sanguinis detractio ad quosdam eiusmodi dolores confert. Conferunt & cucurbitæ circa uenas affixæ. Cibus modicus panis, & aquæ potus. Decumbat autē æger in tenebris, procul à fumo, & igne, & alijs splendidis, atque hoc in obliquū, modo in dextrā, modo in sinistram partem. Caput uero ne humectet, neque enim conducit. Cataplasma si dolor nō adest, uerum uelut ad fluxionem cohibendam, non confert, quum tumores sint doloris exortes. Verum post acria medicamenta, quæ ad dolorem illinuntur, postquam dolor sedatus fuerit ac separatus, post medicamenti illitionem, tunc cataplasmata imponere conducit, si quod commodum fore uisum fuerit. Nec uero ad multum tempus contente intueri confert. Lachryma enim prouocatur, quum nō possit oculus ad splendida officio suo fungi. Sed neque ad multū tempus claudere oculos conducit, maxime si fluxionem calidam habeat. Lachryma enim superpressa, calefacit. Si uero fluxio non sit, cum puluillo sicco subliationem facere conducit.

HIPPOCRATIS COI EPI

STOLAE, IANO CORNARIO MEDICO
Phyfico interprete.

Rex regum magnus Artaxerxes, Pæto gaudium.



ORBVS pestilens appellatus, inuasit exercitus nostros: & quum nos sæpe multa fecerimus, nihil adhuc remisit. Quare magnopere, & per omnia tibi à me data dona, te rogo, ut aut aliquid ex natura tua excogitatum, aut aliquam ex arte actionem, aut aliquod alterius uiri mederi potentis consiliū, celerime ad nos mittas. Propulsa oro hoc malū. Multa enim anxietas populum corripuit, quæ spiritū magnum ac densum habet. Non belligerantes debellamur: quū hostem habeamus bestiā illam ouis lia deuastantem. Sauciauit multos: ægre curabiles fecit: amara spicula immittit. Consilij inops sum. Nō amplius habeo quod cū uiris natura prudentibus consulem. Solue hæc omnia, neq; nos bono tuo consilio destituas. Vale.

Pæto, Regi regum magno Artaxerxæ gaudium.

NATURALIA auxilia pestilentis morbi popularem grassationem nō soluunt. Qui enim ex natura fiunt morbi: eos ipsa natura iudicās sanat. Qui uero ex populari grassatione: eos ars curat, artificiose iudicans corporū mutationē. Hippocrates autem medicus curat hoc malum. Et genere quidem est Dorien- sis: ex ciuitate uero Co, patre Heraclida, qui filius fuit Hippocratis, qui Gnosidici, qui Nebri, qui Sostrati, qui Theodori, qui Cleomittadæ, qui Chrisamidis. Hic diuina natura præditus est, & ex paruis ac uulgaribus, ad magna ac artificiosa, medicinā euexit. Est igitur diuinus Hippocrates nonus quidem à Crisamide rege: decimus aut et octauus ab Aesculapio: uigessimus uero à Ioue: ex matre uero Praxithea Phænaretis filia, ex familia Heraclidarum. Quare ex utroq; femine à dijs ortū habet diuinus Hippocrates: ut qui à patre quidem Asclepiades est, à matre uero Heraclides. Didicit aut artem, tum à patre Heraclida, tum ab auo Hippocrate. Verū ab his quidem primum, uelut uerisimile est, in re medica initiatus est, quantū sanè credibile est hos nouisse. Vniuersam uero artem ipse seipsum docuit, diuina natura usus, & in tantū animi industria progenitores transgressus, quantū etiam artis præstantia eosdē superauit. Tollit autē non bestiarum genus, sed ferorum ac agrestium morborum, per magnā terræ ac maris partem Aesculapij auxilia, quemadmodū Triptolemus Cereris semina dispergens. Proinde iustissime in multis terræ locis diuinos honores etiā ipse consequutus est, & ipsdē donarijs cū Hercule & Aesculapio ab Atheniēsis dignus factus est. Hūc ipsum accersere, & auri atq; argenti quantū uoluerit, ipsi dare iube. Hic enim non unū modū curationis huius morbi nouit. Hic est sanitatis pater: hic seruator: hic dolorū curator. In summa, hic diuinę sciētię princeps est. Vale.

Rex regum magnus Artaxerxes, Hystanidi Hellepontis præfecto.

HIPPOCRATIS medici Coi ab Aesculapio originem ducētis, gloria artis etiam ad me peruenit. Dato igitur ipsi auri quantum uoluerit, & reliqua abūde, quibus

quibus opus habet, & ipsum ad nos mittito. Nam optimatibus Persarum æqualis erit. Et si quis alius bonus uir est in Europa, eum domus regiæ amicum facito, nihil diuitijs parcens. Viros enim inuenire, qui consilio præstent, non est facile. Vale.

Hystanis Hellepontipræfectus, Hippocrati ex Asclepiadis prognato gaudium.

Magnus rex Artaxerxes te opus habet, & misit ad nos præfectos, iubens tibi argentum & aurum, & reliqua quibus opus habes, & quæcunq; uoles, dare, & breui ad se mittere. Fore enim te optimatibus Persarum æqualem. Tu itaq; cito adsis. Vale.

Hippocrates medicus, Hystanidi Hellepontipræfecto gaudium.

Ad epistolam quam misisti, à Rege uenisse adserens, remitte Regi quæ dico, q̃ celerrimè scribens: Quòd & uictu, & uestitu, & domo, & omni ad uitam sufficienti opulentia fruimur. Persarum aut diuitijs uti, fas mihi non est: neq; barbaros homines à morbis liberare, qui hostes sunt Græcorum. Vale.

Hippocrates Demetrio sanitatem.

Persarum rex nos accersiuit, ignarus quòd apud me maior est sapientiæ ratio, quàm auri. Vale.

Regi regum meo magno domino Artaxerxæ, Hystanis Hellepontipræfectus gaudium.

Quam misisti epistolam, iubens demittere ad Hippocratē Coum ab Aesculapio originem ducentem, demisi. Sed & ab ipso responsum tuli, quod scriptum tradidit, & ad domū tuam transmittere iussit. Itaq; eius latorem ac nuncium Gymnasben Dieutychen ad te misi. Vale.

Rex regum magnus Artaxerxes Cois hæc dicit.

Date meis nuncijs Hippocratem Medicum malignis moribus præditum, & in me, & in Persas petulanter se gerentem. Sin minus, cognoscetis, etiam primi peccati poenam uos duros esse. Urbē enim uestram deuastatam, & infulam distractam, in pelagus conuertam, ut in posterum tempus nemo sciat, an in hoc loco fuerit insula, aut urbs Cos.

Coorum responsum.

Vlsum est populo, respondere nuncijs ab Artaxerxe missis. Coi nihil indignum facient, neq; Merope, neq; Hercule, neq; Aesculapio. Quapropter omnes ciues non dabunt Hippocratem, etiam si pessima morte sint interituri. Nam quum Darius & Xerxes epistolas scripserint, & terram ac aquam à patribus nostris petiuerint, populus non dedit: quum eos ipsos se impetentes, similiter uelut alios homines, mortales esse uideret. Et nunc idem responsum dat. A Cois discedite: quoniam Hippocratem in manus uestras non dant. Renunciate igitur ipsi uos nuncijs, quòd neq; Dei ipsi, nostri negligentes erunt.

Senatus populusq; Abderitarum Hippocrati gaudium.

Nunc maxime urbi nostrae in periculo uersatur uir noster, o Hippocrates, qui & presenti tempore & futuro semper gloria urbi sperabatur. Neque nunc, o uos Dei omnes, nobis inuideatur. hic praemulta quae detinet ipsum sapientia aegrotat, ut timor non uulgaris sit, si Democritus in mente motus fuerit, reuera urbem nostram Abderitarum pestem ituram esse. Etenim oblitus omnium, & primum sui ipsius, uigilans & noctu & interdiu, & singula parua ac magna deridens, & totam uitam nihil esse putans, uitam transigit. Ducit aliquis uxorem, alius mercaturam exercet, alius concionatur, alius imperat, alius legatum agit, eligitur, abrogatur, aegrotat, uulneratur, moritur. At hic ridet omnia, dum alios moestos ac tristes, alios gaudentes uidet. Quin et de his, quae apud inferos sunt, hic uir perscrutatur, & haec scribit. Et idolis aerem plenum esse dicit. Et uolucrum uoces intentis auribus explorat. Et saepe noctu exurgens, solus cantilenas sensim canenti similis est. Et se aliquando in rerum immensitate proficisci dicit, & Democritos esse similes sibi ipsi innumerabiles. Et corpus una cum mente corrumpens uiuit. haec timemus o Hippocrates, ob haec perturbati sumus. Quapropter nos seruam, & patriam nostram consulturus cito adsis: neque nos contemperis. Nam neque ita uiles sumus: & in nobis testimonium situm est. Ob ipsum enim conseruatum, & gloriam, & pecunias, & doctrinae famam consequeris: quanquam doctrinae ratio multo potior apud te est, quam fortuna. Attamen & huius bona multa ac luculenta tibi a nobis obuenient. Etenim animae Democriti gratia, etiam si urbs aurum esset, non nostrae uoluntati responderet, aut quacumque tandem re illi cendum esset. Leges nostras putamus aegrotare o Hippocrates, leges praeuariuari. Adsis optime uir, curaturus uirum insignem. Non medicus, sed conditor, sacratione tota Ionia murum nobis circumdabis. Ciuitatem, non uirum curabis: & Senatum aegrotantem, & ne claudatur periclitantem, aperies. Ipse legislator, ipse iudex, ipse princeps, ipse seruator, & horum artifex aduenies. Ob haec te exspectamus o Hippocrates, atque haec etiam fiet ubi ueneris. Una ciuitas non ignobilis, imo tota Graecia rogat te, serua corpus sapientiae. Quin potius ipsam apud te legationem agere puta doctrinam, ab hac praeuariicatione liberari supplicantem. Cognata equidem res est omnibus, uelut apparet, sapientia. Verum his qui propius ipsam complexi sunt, uelut nobis, etiam longe amplius. Et, sicut probe nosti, gratificaberis etiam futuro saeculo, si non destitueris Democritum propter ueritatem, cuius primas se latum esse sperat. Tu enim & genere, & arte coniunctus es Aesculapio. Hic uero Hercules est ex fratre nepos. A quo est & Abderus, quemadmodum omnino audiuisti, cuius cognomen urbs nostra refert. Quare etiam illi grata fuerit Democriti sanatio. Quum igitur uideas o Hippocrates, & populum, & uirum insignem, ad stupiditatem diffluentem: festina, rogamus, ad nos. Heu ut etiam bona redundantia morbi existunt. Quantum enim Democritus ad summam sapientiam generose peruenit, tantum nunc pariter periclitatur, ne mentis stupore & stoliditate affligatur. At reliquum uulgus Abderitarum, quod mansit absque eruditione, communem sane sensum habet. Immo nunc prudentiores sunt ad sapientis morbum iudicandum, qui prius desipuere. Adsis igitur cum Aesculapio patre. Adsis cum Hercules filia Epione. Adsis cum Aesculapii filijs, qui ad Ilium militarunt. Adsis nunc Paonia adferens morbi

medelas. Nūc terra radicibus, & herbis, & auxiliaribus floribus, infanācūq; medicamentis fecunda est. Firmē igitur nunquā fertilius producent, neq; terra, neq; montium cacumina, quā nunc proferunt ea, quæ pertinent ad Democriti sanitatem. Vale.

Hippocrates Senatui populoq; Abderitarum gaudium.

Cluis uester Amelessagoras uenit in Co, & erat tunc in illa die Virgæ asumptio, & annua festiuitas, ac publicus, uelut nostis, conuentus, & pompa sumptuosa fiebat, quam mos est eos, qui deo dicati sunt, ad Cyparissum deducere. Quandoquidem autem & ex uerbis, & ex aspectu, Amelessagoras festinare uidebatur, credēs, uelut erat, rem ipsam urgere: epistolam uestram legi, & admiratus sum quod ob unum hominem, uelut si unus homo esset ipsa ciuitas, turbati estis. Et beati profecto sunt populi, qui sciunt bonos uiros sua esse munimenta, & non turres, neq; muros, sed sapientium uirorum sapientia consilia. Ego uero, qui credo artes quidem esse Deorum dona, homines autem naturæ opera: (& ne agere feratis uiri Abderitæ) non uos puto, sed ipsam naturam me uocare, ad cōseruandum ipsius opus, quod periclitatur, ne præ morbo collabatur. Quare præ uobis ego nunc, naturæ ac Dijs obediens, festino ægro tantem Democritum sanare: si quidem sanē & hoc morbus est, & non potius error uobis tenebras offundit: id quod opto, atq; utinā sit hoc uberius uestræ beneuolentiæ signum, quod etiam ad suspicionem turbamini: Argentū autem mihi uenienti, neq; natura, neq; Deus promittere poterit. Quare neq; uos uiri Abderitæ cogatis: sed liberæ artis etiam opera libera esse sinatis. Qui uero mercedem capiunt, hi scientias seruire cogūt, uelut captiuas facientes ipsas ex prior libertate. Deinde, uelut uerisimile est, mētiri etiam poterint, uelut de magno morbo: & negarint, uelut de paruo: & polliciti nō uenerint, & rursus uenerint non uocati. Misera est profecto humana uita: quoniam per totam ipsam intolabilis auaricia, uelut hybernus uentus, distributa est ac penetrauit. Ad quā utinam potius omnes medici conuenissent, quō grauiorem infania morbum curarent: quoniam quum morbus sit, & affligat, etiam laudatur. Ego uero arbitror etiam animæ morbos omnes uehementes esse infanias, quæ opiniones quasdam ac imaginationes rationi inducūt. A quibus qui per uirtutem depurgatus est, sanus euadit. Quod si ego omnino ditescere uoluissē, uiri Abderitæ, non utiq; decem talentorū gratia ad uos proficiscerer: sed ad Magnum accessissē Persarum regem, ubi totæ ciuitates humanis opibus refertæ mihi obligissent. sanassē autem illic ipsorū pestem. Verum denegaui, inimicam Græciæ regionem à malo morbo me uelle liberare. Et ego, quantum in me fuisset, Barbaros expugnassē. Habuissē autem ignominiam ipsas à rege diuitias, & opulentiam patriæ inimicam. Hæc uero mihi adfuissent, uelut ei qui urbium Græciæ deuastator esset. Non sunt diuitiæ, undiquaq; lucrari. Magna enim sunt sacra uirtutis, quæ à iusticia non occultantur, sed manifesta exsistunt. Aut non æquale peccatū esse putatis, hostes seruare, & amicos mercede sanare? At nō hoc modo seres nostræ habent, o Abderitæ. Non capio fructum ex morbis, neq; libenter audiui Democritum mente motū esse. Qui siue sanus est, amicus est: siue ægrotat, curatus magis amicus erit. Audio autem ipsum grauib; ac solidis moribus præditum esse, & urbis uestræ ornamentum. Valetē.

Hippocrates Philopœmeni gaudium.

Legati, qui urbis epistolam mihi reddiderunt, etiam tuā tradiderunt, Et ualde gāuisus sum, & hospitium, & reliquum uictum te promittēte. Veniemus autē bona fortuna, & meliore spē, uelut arbitramur, accedemus, prout in literis est declarātū: quum non insaniam, sed quandā excellentem mentis sanitatē uir ille declarat, dum neq; liberorum, neq; uxoris, neq; cognatorū, neq; rei familiaris, neq; omnino alicuius curā gerit: sed & diu & noctu apud seipsum consistit, & priuatim uitam degit, plerūq; in antris & solitudinibus, aut sub arborū umbris, aut in mollibus herbis, aut apud frequentia aquarū fluentia. Cōtingunt igitur talia plerūq; atra bile percitis. Taciturni enim aliquādo sunt, & solitarij, ac deserti amantes, & rerū familiarium cōspectum auersantur, alienum putantes. Nec uero dissimile uero est, etiam his qui circa disciplinas uersantur, ab una erga sapientiā adfectione, alias curas exclusas esse. Quemadmodū enim famuli ac ancillae in domibus tumultuantes, & seditionē agentes, ubi derepēte ipsi hera cōparuit, consternati cōquiescunt: sic etiam reliquae in anima cupiditates malorum sunt hominibus ministræ. Postquā autem sapientiæ cōspectus seipsum ingesserit, reliquae affectiones uelut famulae discedūt. Non autem omnino insani antra & quietem expetunt: sed etiā hi qui humana negocia contemnunt, ob tranquillitatis cupiditatē. Cum enim mens ab externis curis uexata, corpus reficere uoluerit, tunc cito ipsum quieti tradit. Deinde recta exurgens, circūcirca ueritatis regionē collustrat, in qua nō est pater, non mater, nō uxor, non liberi, non frater, non cognati, non famuli, non fortuna, non omnino quicquā ex his, quae tumultū inducunt. Omnia autē perturbantia, exclusa stant prae timore: & neq; appropinquare audent prae reuerentiā eorum, quae isthic habitant. Habitant autem illam regionē, & artes, & uirtutes omnis generis, & Dei, & dæmones, & senatus, & consilia. Et magnus polus in illa regione, stellis multū mobilibus coronatus est: in quam fortassis etiam Democritus prae sapientiā trāsmisgauit. Deinde quū nō uideat amplius eos, qui sunt in urbe, utpote procul profectus: insanīæ morbo laborare putatur, propter solitudinis amorē. Student autem Abderitae argenti amorē & studium detegere, & in se manifestū facere, eo quod Democritum non intelligunt. At tu hospitium nobis ò amice Philopœmen praepara. Non enim uolo perturbatae urbi molestiam exhibere, quum ueterem te proprium hospitem, uelut nosti, habeam. Vale.

Hippocrates Dionysio gaudium.

Aut in Halicarnasso me expecta, aut ipse ad me uenire ò amice festina. Per summam enim necessitatem abeūdum est mihi in Abderam, Democriti causa, ad quem ægrotantē urbs me accersuit. Cæterum admiranda est hominum, ò Dionysi, per consensum adfectio: uelut una anima cū ciue coægrotant. Quare mihi uidentur etiā ipsi curatione opus habere. Ego uero neq; morbum ipsum esse puto, sed immodicam doctrinā: quae reuera nō est immodica, sed ab idiotis putatur. Nam nunquā nociua est uirtus immodica. Excellētia uero, morbi opinionē de se praebet, propter iudicantiū imperitiā. Vnusquisq; enim ex his, quae ipse nō habet, iudicat id, quod in alio abundat, superfluum esse. Sic sanē

etiam timidus fortitudinē immodestiā putat, & avarus magnanimitatē. Et omnis defectus, uirtutis moderationē excedere putatur. Illū igitur ubi uiderimus, cū prænotione hinc cōtingente, & ubi sermones eius audiuerimus; melius cōgnosceremus. Tu uero, ò Dionysi, studio habe ut ipse accedas. Volo enim te in patria mea cōmorari donec rediero: quo & rerū nostrarum, & imprimis urbis nostræ curam geras. Nam haud scio quomodo ex casu cōtingit, ut saluber sit annus, & pristinam naturā habeat. Quare neq; multi infestabunt morbi: attamen uenito. Inhabitabis autē meam domum nimis q̄; opportunam, nimirū quum & uxor apud parentes maneat propter meam protectionē. Attamen & illius res inspecta, quo pudice degat, & nō ob uiri absentia, alios uiros approbet. Honestā equidem ab initio fuit, & parentes bonos habuit. Patrem autē mirifice uirilē, & malos ualde odio habentē, egregie senem. Attamen semper opus habet mulier moderatore. Habet enim à natura in se lasciuia: quæ, nisi quotidie refecetur, uelut arbores in materiæ multæ effusionem, exuberat. Ego uero amicū parentibus diligentiorē puto ad uxorē custodiendam. Non enim, uelut illis, etiam huic cohabitat beneuolentiæ adfectio, per quā sæpe umbra admonitioni obtenditur. In omnibus autem rebus prudentior est alienitas ab adfectione, ut quæ minime à beneuolentia infringatur. Vale.

Hippocrates Damageto gaudium.

CUm apud te Rhodi essem Damagete, uidi nauē illam, cui Solis inscriptio erat, penitus pulchrā, et in puppi probe instructam, et sufficientē carinam habentē. Habebat & transtra multa. Et tu laudabas etiā in ipsa nauigandi præstantiam, quod uelox esset, & tuta, & ad inseruiendū artificiosa. Et insuper prædicabas probū in ipsa nauigationis cursum. Hæc mitte nobis: uerum, si fieri potest, nō remis, sed alis ad remigium instructam. Vrget enim res ipsa, ò amice, ut ualde cito in Abderam nauigem. Volo enim ægrotantē curare urbem, propter unū ægrotantē Democritū, si unquā uiri fama ad aures tuas peruenit. De hoc patria dicit, q̄ insania adflictus sit. Ego autē cupio, immo magis opto, nō reuera ipsum insanire, sed illos ita putare. Ridet, inquiunt, semper, & ridere non cessat in omnib; negocijs. Et hoc ipsis insania signū esse uidetur. Quare tuis in Rhodo amicis dicito, ut semper moderate se gerant, & nō multū rideant, neq; multum tristes sint: sed inter ambo hæc modū teneant: ut alijs comis esse uidearis, alijs sollicitus, de uirtute cogitans. Est profecto malū quiddam, dum ad singula ille ridet. Si enim immodestia malū est: ea sanè perpetua longe peior est. Et dicā sanè ad ipsum: Democrite, & si quis ægrotat, & occiditur, & mortuus est, & obfidetur, & quoduis malū ingruit: singula quæ fiūt, materiam risus tibi præbent. Non autē repugnas deo, si, quū duo sint in mūdo, Gaudiū & Tristitia, tu alterū ipsorū eiecisti? Beatus profecto fueris, (uerū impossibile est) si neq; mater tibi ægrotat, neq; pater, neq; postea liberi, aut uxor, aut amicus: sed propter tuū risum cōseruantur, penitus felix es. At si, dum ægrotāt, rides: dum moriūtur, gaudes: & si quid malū audieris, exhilararis: pessimus es ò Democrite, & procul sanè à sapientia. Si uero putas hæc ipsa neq; mala esse, certe atra bile percitus es Democrite, periclitans ne & ipse Abderita sis: prudentior autem sit ipsa ciuitas. Cæterum de his exactius illic dicemus Damagete. At uero nauis etiam hoc tempus, quo hæc tibi scribo, remoratur. Vale.

Hippocrates Philopœmeni gaudium.

COgitās ac sollicitus de Democrito, illa ipsa nocte dormiens, sub ipsius aui
roræ initium, somniū mihi oblatū habui, ex quo puto nihil ualde pericu-
losi fore. Mirabiliter enim expergefactus sum. Videbar mihi uidere Aescula-
pium ipsum coram, & iam ad ipsas Abderitarū portas aderamus. Aesculapius
aut non ut imagines eū aliās ostendunt, mitis ac blandus apparebat: sed habitu
conciato, & aspectu horrendo. Sequebantur autē ipsum dracones reptiliū ge-
neris immanes, longum tractum ducentes, & horribile quiddam uelut in deser-
tis ac saltibus subsibilantes. Sequebātur & socij, pyxides medicamētarias pro-
be obsignatas gestantes. Deinde porrexit mihi manū deus: quā ubi libētissime
apprehēdissem, rogabam ut simul mecū pergeret, & ne me in medēdo desitue-
ret. Verum is: Nihil, inquit, in præsens me opus habes: sed hæc iminortalī ac
mortalium cōmunis dea te peregrinum deducet. Et ego cōuersus uideo mulie-
rem pulchram ac magnā, simpliciter ornatā, splendidam, cuius oculorū circuli
puro lumine micabant, ut stellarū fulgorem putares. Et deus quidem disparuit.
Mulier uero illa apprehēsum me manu, lento gradu benigniter per urbē duce-
bat. Et ubi prope domū essemus, in qua hospitīū mihi paratū esse putabam, ue-
lut spectrū disparuit, hoc saltē dicens: Cras te apud Democritū deprehendam.
Cum uero iam se illa cōuerteret: Rogo, in quā, optima scēmina, quæ nam es, &
quo nomīne uocari debes? Veritas, inquit illa. Cæterū quam accedentē uides
(& derepēte altera quædam mihi apparuit) neq; ipsa mala uidetur, audacior au-
tem aspectu & cōcitatio: Opinio, inquit, appellatur, & habitat apud Abderi-
tas. Ego igitur ubi de somno surrexissem, mihi ipsi somniū interpretatus sum,
q̃ non indigeret medico Democritus, quādo sanē ipse medendi deus discessis-
set, uelut qui medendi occasiōē & materiam non haberet. Sed ipsa quidē ueri-
tas, q̃ Democritus sanus sit, apud Democritū manet. Opinio uero, q̃ Demos-
critus ægrotet, reuera apud Abderitas habitat. Atq; hæc uera esse, mi Philopœ-
men, credo, & sunt sanē. Et nō contemno somnia, maxime ubi etiā ordinem
cōseruant. Medicina aut & uaticinatio ualde cognatæ sunt: quandoquidem &
pater ambarum artium unus est Apollo progenitor noster, & præsentes & fu-
turos morbos prædicens, & ægrotos & ægrotaturos sanans. Vale.

Hippocrates Crateuæ gaudium.

SCio te, o amice, optimū radicifecam esse, & propter tuam ipsius exercitatio-
nem, & propter progenitorū gloriā, adeo ut in hac facultate, Crateuæ pro-
auo minime cedas. Proinde nunc, si unquā aliās, herbas collige, quot & quales
poteris: urget enim necessitas: atq; has mihi trans mitte, ad uirum toti ciuitati
cōparandum, Abderitam quidem, uerum Democritū. Aegrotare enim ipsum
dicunt, & purgatione ualde opus habere, ut qui insania sit correptus. Non ute-
mur fortassis medicamentis, quemadmodū etiā credo. Attamen undiquaq;
instructum esse oportet. At uero rem herbariam apud te sæpe admiratū sum,
quemadmodū etiā uniuerforū naturam ac constitutionem, & facerrimū ter-
ræ fundamentū, ex qua animalia, & plantæ, & alimenta, & medicamēta, & for-
tuna, & ipsæ diuitiæ exoriuntur. Neq; em̃ aliās haberet ubi cōsisteret Auaricia,

neq; sanè Abderitæ nunc decem talentis inescassent me, pro medico mercenarium declarantes. Si uero possis Crateua amaram auaricię radicem excindere, ut nullæ ipsius reliquię restent: probe scito, q; hominũ unã cum corporibus etiam animas ægrotantes purgassemus. At hæc quidẽ uota sunt. Tu uero, quod fieri potest, nobis montanas maxime & in altis collibus nascẽtes herbas radicitus reseca. Sunt enim aquosioribus solidiores & acriores, propter terræ densitatem, & aeris tenuitatẽ. Nam quod attrahũt, frigidius est. Conare tamẽ ut etiam de his quæ circa stagna nascũtur, & de palustribus, & fluuiatilibus, aut fõtanis, flores colligas: quas sanè debiles, & exsolutas, ac dulcis succi esse scio. Omnia autẽ medicamẽta, quę succi et liquores fluidi sunt, in uitreis uasis ferãtur: quæ uero folia, aut flores, aut radices sunt, in fictilibus nouis probe obturatis: ut ne uẽtis perflata, medicamẽti uigorẽ, uelut in animi deliquiũ collapsa, amittãt. Cæterum statim nobis hæc mittito. Nam & tempus anni cõgruum est, & necessitas dictæ infaniæ urget. Ab omni equidẽ arte aliena res est dilatio, uerũ maxime à Medicina, in qua dilatio est animæ periculũ. Curationũ uero animæ sunt tẽporum opportunitates, quarũ observatio finis est. Spero quidem sanũ esse Democritum, etiã citra medelam. Si uero aliquis error naturæ, aut tẽporis, aut alterius alicuius causæ cõtingat: multa enim nos, qui mortales sumus, latẽt, utpote non omnino per ueritatẽ corroboratos: ad id quod obscurũ est, omnem uim cõgregatam esse oportet. Non enim cõtentsus est is, qui in periculo uersatur, his quæ possumus: sed cõcupiscit etiã ea, quæ nõ possumus. Et fermẽ semper ad duos fines militamus, alterũ hominis, alterũ artis. Quorũ alter obscurus est, alter sciẽtiæ determinatus. Opus est autẽ in utrisq; his etiam fortuna. Incerta enim est cõiectura eorũ, qui in purgationibus caute procedũt. Nam & stomachi adflictionem ueremur, & medicationis cõgruentiam, ad naturã ignotam coniectamus. Non enim una & eadẽ est omniũ natura, & aliud semper sibĩpsi decernẽs adsimilat ac familiare facit. Aliquãdo uero totũ perdit. Sed & herbis multa reptilia uenenũ immittunt, & hiatu suo internæ ipsarũ teneritudini adflictionẽ pro auxilio inspirant. Et huius rei ignorãtia erit, nisi sanè nota aliqua, aut macula, aut odor ferus et grauis, rei factæ indicationem fecerit. Deinde ipsa ars, propter fortunæ casum, à recte faciendi proposito aberrat. Stabiliore autem semper sunt purgationes per ueratrum, quibus etiam Melampus in Proeti filiabus, & Anticyreus in Hercule usi esse narrãtur. Minime uero utemur nos ullo aliquo ex his in Democrito: sed contigerit opto illi sapientia, efficacissimorum ac medicatissimorum pharmacorum finis. Vale.

Hippocrates Damageto gaudium.

HOcerat illud Damagete, quod cõiectabamus: nõ insanit Democritus, sed super omnia sapit, & nos sapientiores effecit, et per nos omnes homines. Remisi autẽ tibi amice reuera Aesculapeam nauẽ: cui cũ solis signo etiã sanitatis insigne apponito. Nã reuera secũdo numine uela fecit: & illa die in Abderã nauigauit, qua scripserã ipsis, me peruenturũ esse. Omnes igitur ante portãs congregatos inuenimus, nos, uelut uerissimile est, exspectantes, nõ uiros solũ, sed etiam mulieres: insuperq; senes et pueros, per deos, tristes, iteq; infantes. Atq; hi quidẽ sic habebãt, uelut ob Democritũ insanientẽ. Ille uero syncere tunc in philosophando

Iosophādo excellebat. Postq̃ aut̃ me uidissent, uisi sunt mihi paululū ad seipsos rediisse, & bonas spes ostentabant. At Philopœmen me ad hospitū ducere gestiebat, & hoc ab illis cōprobabatur. Ego uero: O uiri Abderitæ, inquā, nullum mihi maius operæ precii est, q̃ Democritū uidere. Illi uero hoc audito, collaudarūt, & gauisi sunt, & cōpendio duxerunt me per forū, partim sequentes, partim præcurrētes, alij ab utraq̃ parte: Serua, clamantes, auxiliare, medicare. Et ego adhortabar ipsos ut cōsiderent, tanquā fortassis nihil esset mali: aut, si quid esset, modicū id esset, & correctu facile, cōfusus horis anni Btelsis. Et simul hæc dicens ibam. Neq̃ enim procul erant ædes: immo neq̃ tota ciuitas. Aderamus igitur: propinquæ enim muro erāt, & me placide eò deducunt. At retro turrim collis erat altus, lōgis ac densis populis nigris umbrosus, unde Democriti habitacula cōspiciebātur. Et ipse Democritus sub ampla ac humilima platano sedebat, in ueste crassa citra humeros desinente, solus, discalceatus, super lapidea sede, ualde pallidus ac macilentus, promissa barba. Iuxta ipsum uero à dextra, tenuis aqua per decliū collem decurrēs leniter resonabat. Erat aut̃ delubrū quoddam super illū collem, quantū equidē coniectura assequor, Nymphis dicatum, sponte enatis uitibus circūdatum. Ipse uero cū multo ornatu super genibus librum habebat. Sed & alij quidā ex utraq̃ parte adiacebāt. Accumulata erant etiam animalia multa per totū resecta. Et ipse aliquando cōcitate incumbens scribebat, aliquādo quiescebat, diu multūq̃ se continens, & in seipso meditās. Deinde nō longe post, his peractis, exsurgens deambulabat, & uiscera animalium inspiciebat, & depositis ipsis digressus, rursus desidebat. At Abderitæ circumstātes me tristes, & nō procul à lachrymātibus oculos habētes: Vides, inquiūt, Hippocrates, Democriti uitam, q̃ insanit, & neq̃ quod uult nouit, neq̃ quod facit. Et quidā ex ipsis adhuc amplius ostendere uolens ipsius insanīā, alta uoce plorauit instar mulieris ob filij mortē lamentātis. Deinde rursus cū gemitu eiu lauuit, personā agens uiatoris, qui aliquid ex his, quæ portabat, amisit. Verū Democritus cū hæc audisset, partim ridebat, partim cachinnis explodebat, & nihil amplius scribebat. Caput aut̃ frequenter cōcutiebat. Ego uero: Vos, inquā, o Abderitæ, hic manete: ipse uero ubi & uerbis, & corpori uiri propior factus fuero, uideroq̃ ac audiero, cognoscā adfectionis ueritatē. Et hæc loquutus, placide descēdebam. Erat aut̃ locus ille asper ac decliuis. Itaq̃ uix me suffulciens penetraui. Cum aut̃ appropinquaassem, incidi in ipsum nescio quid, quasi ex nymis adflatu & cū concitatione scribentē. Stabam igitur isthic expectans tempus quietis ipsius. Ipse uero paulo post, intermisso scribēdi impetu, & stilo scriptorio deposito, respexit ad me accedentē, & Salue, inquit, hospes. Et ego: Plurimū & tu, inquam, Democrite uir sapientissime. At ille, uerecūdans arbitror, q̃ nō nomine me cōpellasset: Te aut̃, inquit, quo nomine uocabimus? Ignorantia enim tui nominis, causa erat cur te hospitē appellarem. Hippocrates, inquā, Medicus est mihi nomen. Is uero: Asclepiadarū, inquit, nobilitas, & magna sapientia tua in re medica gloria multum celebris, etiam ad nos peruenit. Quid autem negocij, o amice, te huc perduxit? Imō potius præ omnibus confide. Vides autē quod hæc sedes folijs instrata non est iniucunda, uiridis adhuc ac molliis, & ad insidendum lenior inuidiosis fortunæ sellis. Cum aut̃ consedissem, rursus inquit, Priuatum ne, aut publicū negociū agēs huc peruenisti? Dic aperte.

nam nos, quantū poterimus, adiuuabimus. Et ego: Quæ uera causa est, inquā, tui gratia huc uenio, ut sapientē uirum conueniam. Habet autē causam patria, cuius legatum ago. Ille uero: Hospitio itaq;, inquit, primū utere nostro. Ego uero per omnia uirū pertentans, etiā si iam mihi manifestū esset, ipsum non insani re: Philopœmenem, inquā, nosti ciuem uestrū? Etiam, inquit, ualde: Damonis filium dicis, qui habitat apud Hermaidem fontē? Hunc ipsum, inquam, cuius ego sum ex patribus peculiaris amicus. At tu Democrite potiore me hospitio excipe, & primū sanē quid sit hoc, quod hic scribis, dicito. Ille uero ubi paululum se cōtinuisset: De insania, inquit. Et ego: O rex Iupiter, in q̄, opportune profecto scribis cōtra ciuitatē. At ille: Qualē, inquit, ciuitatē Hippocrates? Ego uero: Nihil, inquā, ò Democrite, sed haud scio quomodo hoc uerbū mihi excidit. Verū quid de insania scribis? Quid em̄, inquit, aliud q̄ quid sit, & quomodo in hominibus generetur, & quomodo alleuetur. Nā animalia hæc, quæ uides, inquit, huius gratia refeco, nō q̄ odio habeam opera dei, sed bilis naturā ac sedē quærēs. Nosti enim q̄ hæc furoris hominū causa est, ubi nimīū redundarit. In omnibus equidem à natura inest: sed in quibusdā minus, in quibusdā amplius. At immodestia ipsius morbi sunt, ipsa uelut materia, aliquādo bona, aliquando mala subiacentē. Et ego, Per Iouem, inquā, ò Democrite, uere hæc & sapienter dicis. Quare beatū te iudico, qui tāta quiete frueris. Nobis autē huius participes esse nō permissum est. Interrogāte uero illo: Cur, ò Hippocrates, permissum nō est? Quoniā, inquā, aut agri, aut res domesticæ, aut liberi, aut usuræ, aut morbi, aut mortes, aut famuli, aut nuptiæ, aut eiusmodi quædā, opportunitatē nobis commodam eripiunt. Hic sanē uir ille ad solitā adfectionē delatus est, & ualde effusus risit, ac cachinnatus est. Et de cætero quiescebat. Et ego: Quid uero, inquā, Democrite rides? utrū bona quæ dixi, aut mala? Ille uero ad, uic magis ridebat. Et Abderitæ de colle id uidētes, partim capita sua cædebāt, partim frontē. Alij uero capillos euellebāt. Nam, uelut postea dixerūt, ampliorē, q̄ aliàs solitus esset, risum effuderat. At uero, inquā, sapientū optime Democrite, cupio causam huius tuæ adfectionis cognoscere: quo risu ego tibi dignus uisus sum, aut ea quæ dixi: quo hoc cognito, à causa desistam, aut tu reprehēsus, intēpestiuos risus coercēas. Ille uero: O Hercules, inquit, si me reprehēdere potes, curationē perficies, qualem nullam unquā, ò Hippocrates. Et quomodo nō reprehēdaris, ò optime? Aut nō absurdum te esse putas, dum rides hominis mortē, aut morbū, aut mētis emotionē, aut insaniam, aut atram bilem, aut cædē, aut aliud quid peius? Aut uice uersa nuptias, aut festiuitates, aut liberorū procreationē, aut mysteria, aut magistratus, aut honores, aut aliud quid omnino boni? Nā quorū misereri oportet, ea tu derides, & ob quæ lætari cōueniebat, ea itidē derides, adeo ut neq; bonū, neq; malū apud te sit discretū. At ille: Hæc quidē, inquit, recte dicis ò Hippocrates: sed nō nouisti risus nostri causam. Vbi uero cognoueris: satis scio q̄ meum risum, meliorē legatione medelā ac curationē, tuæ patriæ & tibi ipsi aure res, & alios prudētes facere poteris. Et pro hoc fortassis me uicissim medicinā docebis, ubi cognoueris quāto studio circa res nullo studio dignas uersantes, et ea quæ nullius precij sunt facere cōnātes, omnes homines uitā cōsumūt, risu digna tractātes. Ego uero, Dic, in q̄, per deos, nūquid uniuersus mūdus ægrotare se nō animaduertit, & nō habet quo legationē demittat ad sui curationē? Quid enim

enim extra ipsum esse poterit: Ille uero excipiens: Multae, inquit, sunt mundorum infinitates, & nequaquam, o amice, diuite naturam maligne extenues. At haec quidem, inquam, Democrite suo tempore docebis. Vereor enim ne forte dum infinitatem recensens, ridere incipias. Scias autem nunc, de tuo risu, ratione uitae te redere debere. Ille autem torue me intuitus: Duas, inquit, risus mei causas esse putas, bona & mala. Ego autem unum hominem rideo, dementia quidem plenum, rectis autem actionibus uacuum, in omnibus consilijs pueriliter ac stulte se gerentem, & nullius utilitatis gratia labores nunquam absoluendos tolerantem, fines terrarum & infinitos recessus ex immodicis cupiditatibus penetrantem, argentum & aurum quaerentem, & nunquam ab his adquirendis interquiescentem: sed semper circa plura adipiscenda tumultuantem, quo ipse inferior non sit, et neque pudeat, si non felix appelletur. Rideo item ipsum eo quod hiatum terrae effodit, manibus eorum perquirens, qui partim a laxa irruente terra oppressi sunt, partim diutissime in hac necessitate detenti, in supplicio uelut in patria permanent, argentum & aurum inquirentes, uestigia pulueris ac ramenta perscrutantes, arenam aliam aliunde eruentes, & terrae uenas excindentes, ad opulentiam semper glebas conflantes, ex matre terra hostilem terram, quum tamen eadem sit, facientes, & hanc admirantes pedibus calcant. Quanto uero risu dignum est, quod aerum osam & occultam terram amant, manifestam contumelia afficientes? Alij uero canes emunt, alij equos: alij multam regionem circumscribentes, propriam sibi inscribunt: et multis imperare uolentes, neque sibi ipsis imperare possunt. Vxoribus ducunt, quas paulo post eiciunt. Amant, deinde odio habent. Cum magna cupiditate liberos generant: deinde adultos eiciunt. Quae est illa uana ac absurda diligentia, nihil ab insania differens? Bellum intestinum gerunt, quietem non amplectentes. Reges alios deponunt, alios surrogant: occidunt homines: terram fodientes, argentum quaerunt. Argento reperto, terram emere uolunt. Empta terra, fructus uedunt: fructibus diueditis, rursus argentum accipiunt. In quot mutationibus uersantur: in quam malicia: dum opes non habent, opes expetunt: dum habent, occultant, dissipant. Rideo, dum improbe agentes uideo. Intendo risum, dum infelicitate agentes cerno. Veritatis enim Leges transgre-diuntur: contentionis studio hostilem inter se litem habent, & cum fratribus, & parentibus, & ciuibus: atque ad haec, pro eiusmodi opibus, quarum nemo, ubi mortuus est, dominus est, se mutuo occidunt. Illicitam uitam degentes, amicorum ac patriae penuriam contemnunt. Res indignas & inanimatas diuitiarum loco habent: pro uniuersa opulentia statuas emunt, quoniam effigies ita expressa est, ut loqui uideatur. Eos uero qui uere loquuntur, odio habent. Res insuper non faciles expetunt. Nam continentem habitantes, mare cupiunt. Et rursus, cum in insulis sunt, continentem desiderant, & omnia peruertunt ad propriam cupiditatem. Et in bello quidem fortitudinem laudare uidentur. Vincuntur autem quotidie a petulantia, ab auaricia. Ex omnibus adfectionibus aegrotant. Theriastae uero uitae omnes sunt. Cur uero meum risum reprehendisti o Hippocrates? Non enim quispiam suam ipsius dementiam, sed alius alterius deridet: hi quidem ebrios, cum ipsi sibi sobrios esse uidentur: alij uero amantes, quum ipsi grauiore morbo laborent: alij nauigantes: alij eos, qui circa agriculturam occupati sunt. Non enim concordant neque artibus, neque operibus. Ego uero: Haec quidem, inquam, uera sunt Democrite: neque alius aliquis conuenientior sermo esse poterit, ad mortalium miseriam declarandam: uerum ipsae res san-

ciunt necessitatē, & domesticā dispensationis, & nauium fabricationis gratia, reliquæ item uitæ, in quā necesse est hominem esse. Non enim ad ocium natura ipsum genuit. Ex his aut̃ rursus ambitio effusa, multorū recte sentiētem animā decepit, qui omnia quidē recte ac serio agere student, uelut re certa ac stabili futura. Non autē ita ualidi sunt, ut obscuritatē præuidere possint. Si enim quis o Democrite uxore ducens, separationē aut mortem timeret: aut quispiā liberos educans, ipsorū interitum: imò neq; in agricultura, & nauigatione, & regno, & magistratu, et omnibus quæ sunt in uita, ullus unquā de errore præsumpsit, sed unusquisq; horū bona spe alitur, deteriorū uero ne meminit quidē: nūquid igitur risus tuus his minime cōuenit. At Democritus: Valde, inquit, tardō ingenio præditus es, & longe à sententiā mea abes o Hippocrates, qui tranquillitatis & perturbationis modū non cōsideras, præ ignorātia. Si enim hæc ipsa prudenti mēte disponderēt: & ipsi facile liberarentur, & meū risum leuarent. Nunc aut̃, uelut rebus in uita firmis, demētes illi superbiunt, ob rationationis expertem mentē, inordinatū imperū suum ægre discētes. Sufficiens enim admonitio ipsis esset, OMNIVM RERVM uicissitudo, quæ subitis mutationibus irruit, & derepente omnigenam circūrotationem inducit. At ipsi, uelut hæc firma sit ac stabilis, oblitī adfectionū alsidue incidentium, aliter aliās ea, quæ tristitiam inferūt, cupientes, & quæ non cōferunt, quærētes, multis calamitatibus inuoluuntur. Si uero quis iuxta propriā facultatē omnia facere cogitaret: stabilē sanē uitā custodirer, seipsum cognoscēs, et sui ipsius cōparationē clare cōsiderans, & nō cupiditatis studiū in infinitum extēdens: sed opulentā naturā, & omnium nutriticē, per sufficientiā intuens. Quemadmodū aut̃ in optimo corporis habitu, adfectionū periculum manifestū est: ita successuū fortunę magnitudo periculosa est. Insignes aut̃ palam in infelicitatibus conspiciuntur. Alij uero uelut proximorum facta nō uidentes, à proprijs malefactis pereūt, tam manifesta, q̃ obscura nō præuidentes, quū longam uitā exemplū habeant eorū, quę fiunt, & quæ nō sunt, ex quibus etiā futurum cōsiderare oportebat. Hæc sunt quæ mihi risus materiā præbent, o demētes homines, prauitatis pœnas pendentes, auariciæ, insatiabilitatis, inimicitia, insidiarū, doli, inuidentia (difficile est enumerare multiplices malorū uersutias: sunt enim infinitæ) & in his dolosis uersutijs uicissim cōuersantes, & maligne sentientes. At uirtutis apud ipsos modus est, id quod deterius est. Mēdacij enim studiū exercēt, uoluptatē consecantur, legibus nō obediētes. Quidā uero ex ipsis præuidentiā in hominibus esse negat, ut qui neq; uisus, neq; auditus participes sunt. Solus aut̃ sensus hominis recta intelligētia lucidus, & præsens & futurū præuidet. In omnibus displicentiā habēt, & rursus ad eadē accedūt, abnegata nauigatione, nauigāt, reiecta agricultura, rursus agrum colūt, eiecta uxore, aliam inducūt, genitos sibi liberos sepe liūt: & his sepulcis, alios generāt, ac rursus educant. Senectam optant: ad ipsam aut̃ perueniētes, gemunt, in nullo rerū statu cōstantem mentē habentes. Principes ac Reges priuatum prædicāt: priuatus autē regnum appetit. Qui reipub. magistratum gerit, artificem laudat, uelut extra periculum constitutum: artifex autem illum, uelut per omnia potentem. Rectam enim uirtutis uiam, puram & leuem ac inoffensam, nō uident, quam nemo ingredi audet. Ferūt aut̃ in contrariam, difficilem & tortuosam, per aspera incedentes, lapsantes ac offendentes

tes: plerique uero excidētes, anhelantes uelut si qui persequatur, litigantes, modo posteriores existentes, modo præcedētes. Et quidam ipsorum petulanti alieni cubilis corrumpendi amore ardēt, per impudentiā inducti, alios auaricię morbus infinitus cōsumit, alij mutuo insidias struunt, alij ab ambitionis studio in aerem sublatis, per malicię grauitatē in profundū pernicię præcipites deferuntur. Quidam destruunt, deinde rursus ædificāt: largiuntur, deinde pœnitētia ducti, amicitia iura tollūt, malefici per inimicitia cognationis iura bello impetētes. Et horū omniū causa est Auaricia. Qua in re hi à pueris ludētibus differūt: apud quos consiliū quidem iudicio caret: quod uero se forte fortuna obtulit, id iucundum est. At uero in desiderijs quid brutis animātibus reliqui faciunt, q̃q̃ intra sufficientiam feræ ipsæ se cōtinent? Quis enim leo aurū in terram occuluit? Quis taurus uberioris alimēti gratia depugnauit? Quā pardalim unquā insatiabilitas cœpit? Sitit quidē aper, sed usq̃ ad aquæ appetentiā. Lupus autē, deuorato necessario alimēto oblato, quiescit. Si dies ac noctes cōiungat homo, nō sentit cōuiuandi satietatē. Et annuorum quidem tēporum ordo, terminus est brutis ad coitū: at homo perpetuo insano libidinis cestro stimulatur. Quæso te Hippocrates, nō ridere de beo plorantē propter amorē, eo, q̃ commodum suū exclusus est: maxime uero si quis periculorū contemptor sit, & per præcipitia, aut pelagi profunditates feratur, risum nō extendam? Non ridebo autē eum, qui nauē multis mercibus onustam demersit, deinde mari indignatur, q̃ ipsam plenam submersit? Ego quidē nequaquā mihi ridere uideor. Vellem autē potius aliquid molesti cōtra ipsos excogitare. At neq̃ medicinam pro his esse oportebat, neq̃ aliq̃ pæonia pharmaca præparantē: atq̃ huius rei documētū præbeat tibi tuus ille progenitor Aesculapius, qui dum seruaret homines, fulminis ictus gratiam accepit. Non uides quod & ego malicię pars sum, dum insanix causam inquirens, animalia mactō ac refeco? Oportebat autē ex hominibus causam perscrutari. Non uides quod etiā ipse mūdus odio in homines plenus est? Infinitas enim cōtra ipsum afflictiones accumulauit. Totus homo ex natiuitate morbus est. Dum educatur, inutilis est, & alienū auxiliū implorat. Dum crescit, proteruus, insipiens, pædagogo opus habens. Dum in uigore est, audax est. Dum decrescit, miserabilis, ubi labores suos imprudēter recolit ac iactat. Ex maternis enim uteri inquinamētis talis prodijt. Et propterea alij indignatiōe ac immodica ira pleni, in calamitatibus ac pugnis uersantur: alij semper in adulterijs & corruptendis puellis: alij in ebrietatibus: alij in rerum alienarum cupiditatibus: alij in suis prodigendis. Vtinam facultas esset nobis, uniuerforum habitationes reuelare, & nullum rerū in ipsis uelamentum dimittere, atq̃ ita ea, quæ intus aguntur, uidere: uideremus utiq̃ alios edentes, alios uomentes, alios supplicij torquentes, alios pharmaca miscētes, alios insidias cōstruētes, alios supputantes, alios gaudentes, alios plorātes, alios amicos accusantes, alios propter ambitionem amantes. Quanquam sint quædam actiones profundiores, quæ in animo occultantur. Et ex his quidam sunt iuuenes, quidam senes: petentes, negantes: pauperes, opulenti: fame pressi, luxu grauati: sordidi, uincti, alij delicijs diffuentes, famulitium magnum alentes: alij trucidantes, alij sepelientes: alij ea quæ habent contemnentes, & speratis possessionibus inhiantes: alij impudētes: alij parci: alij inexplēbiles: alij occidentes: alij uapulantes: alij superbientes

bientes: alij uana gloria elati. Et ex his aliqui apud equos spectatores consistunt: aliqui apud uiros, aut canes, aut lapides, aut ligna, aut aes, aut picturas. Et aliqui legationibus, aliqui militiæ, aliqui sacerdotijs præsumunt. Et alij coronas gestant, alij armati sunt, aliqui occiduntur. Singuli uero ex his feruntur, partim ad pugnam naualem, partim ad militiam, partim ad rusticationem: alij ad onerarias naues, alij ad forum, alij ad concionem, alij ad theatrum, alij ad fugam, alij alio. Et rursus, quidam ad uoluptatem deliciasque, ac intemperantiam: quidam ad ocium ac fœcunditatem. Quum igitur tot indignas ac infelices animas uideamus: quomodo non uitam ipsarum eiusmodi intemperantia præditam risu exhibilarimus? Quin & ualde timeo, neque medicinam tuam ipsis placere. Nam præ intemperantia omnia ipsis displicent, & insaniam sapientiam putant, profecto suspicor plerumque in scientia tua palam contumelia adfici, aut propter inuidiam, aut propter ingratitudinem. Aegrotantes enim simul ut seruantur, causam dijs aut fortunæ attribuunt. Plerique uero suæ naturæ hoc adscribentes, benefactori odio habent, & parum abest ut indigne ferant, si debitores esse putentur. Sed & plerique artis ignorantiam in seipsis habentes, & imperiti existentes, id quod melius est, purgant. Inter stupidos enim fiunt suffragia, & neque agroti attestari uolunt, neque eiusdem artis artifices testimoniū præbere. Inuidia enim obstat. Non autem inexpertus es tu talium nugarum: imò probe scio, ob hæc te sæpe in memorabilibus afflictionibus accersitum fuisse, & neque causam, aut inuidiam libenter derisisse. Veritatis enim neque cognitio ulla est, neque ullum testimoniū. Hæc autem cum diceret, subridebat, & mihi, o Damagete, diuina specie apparebat, & uelut qui priorē suam formam exuisset. Et ego: O magnifice Democrite, inquā, magna xenia & hospitalitatis tuæ munera, in Co mecum auferam. Multa enim me sapientiæ admiratio ne impleuisti, Discedo enim ueritatis tuæ præco, qui humanam naturam inuestigasti ac considerasti. Quum autem mentis meæ medelam à te acceperim, ab eo nunc tempore hoc expetente, itaque corporis curatione. Cras uero, & deinceps, hoc loco rursus conueniemus. Atque hæc loquutus, surrexi. Et ille paratus erat me sequi. Cum uero quidam accederet, haud scio unde, tradebat ipsi libros. Et ego concitatus festinaui, & ad Abderitas in specula me expectantes: Viri, inquā, pro legatione uestra ad me, magna sit uobis gratia. Vidi enim Democritum uirum sapientissimum qui solus potentissimus est homines prudentes facere. Hæc habui Damagete, quæ de Democrito ualde magna animi læticia tibi recensere uolui. Vale.

Democritus Hippocrati felicitatem.

Accelsisti ad nos uelut insanos, o Hippocrates, ueraciter nobis daturus, persuasus à uiris stolidis, apud quos labor uirtutis insania iudicatur. Tunc autem de mundi dispositione, & de polis ac astris cœlestibus scribebamus. Cum uero horum naturam cognouisses, quod omnia ualde commode essent creata, & quod procul ab insania ac desipientia abessent: meam quidem naturam laudasti: desipientes autem & crudeles ac furiosos illos iudicasti. Nam quæ simulachris per aerem uagantia nos decipiunt, quæ sanè mundus esse comprehenduntur, & uicissitudinem habentia creata sunt: ea mens mea, naturam perscrutata, uerè in lucem produxit. Cuius rei testes sunt libri à me conscripti. Oportebat igitur te, o Hippocrates, cum uiris eiusmodi moribus præditis minime congruere ac conuersari, quorum mens

mens superficialia & inconstans est. Si enim ab illis persuasus, mihi, uelut in sano, ueratrum bibendū dedisses, prudentia insania facta fuisset: & artem tuā reprehendissent, uelut quā insaniā fuisset causa. Veratrū enim sanis datū, menti tenebras offundit. Insanis aut ualde prodesse cōsuevit. Arbitror equidē, si non deprehēdisses me scribentē, uerum recubentem, aut fortē deambulantē, & mecum colloquentē, & nunc quidem indignantē, nunc uerō ridentem, ob ea, quā mente reuoluam, & familiaribus me alloquentibus non attendentē, sed cogitatione instantē, & mirum in modū speculantē: putasses sanē Democritū, iuxta oculorū iudicium, ex his, quā uidisses, insaniā imaginem prae se ferre. Oportet igitur Medicū non solum uisū adfectiones iudicāre, sed etiā re ipsa: & rythmos ac cōsonantias ut plurimū indagare: & utrū incipiat morbus, aut mediū teneat aut desinat, perscrutari: & differētia, ac anni tēpore & ætate obseruata, adfectionem curare: itēq; totius corporis naturā cōsiderare. Ex his enim omnibus facile morbū inuenies. Porro remisi ad te de insaniā tractationē à te conscriptā. Vale.

Hippocratis Coi, de insania scriptum.

Quemadmodū in libello de morbo sacro dixi, Insaniēti necesse est prae humilitate cerebrum, in quo animæ sunt opera, moueri: ubi uidelicet humidiūs q̄ pro natura fuerit. Eo uero cōmoto, neq; uisum, neq; audiū quiescere: sed aliās alia & uidere, & audire: & linguā talia loqui, qualia singulis uicibus uiderit ac audierit. Quandiu uero cerebrum quieuerit, tamdiu etiam homo sapit. Fit autem corruptio cerebri à pituita & bile. Vtriusq; uero cognitio sic contingit. Etenim qui à pituita insaniunt, quieti sunt, & nō uociferantur, neq; tumultuantur. Qui uero à bile, percussores sunt, & malefici, ac nō quieti. Et si quidem assidue insaniant, hæ causæ sunt. Si uero terrores & timores fuerint, à transmutatione sūt, cerebro à bile calefcente, quā ad ipsum per uenias sanguinarias procedit. Cū aut bilis discesserit rursus in uenas, etiā corpus quiescit. Tristatur aut & angitur homo, & prae tēporis rationē obliuiosus fit, dum cerebrū à pituita perfrigeratur, & prae solitū morem cōpingitur. Postquā uero cerebrū de repēte à bile calefactū fuerit, sanguine in prædictis uenis efferuescente: insomnia uident horrēda, & facies uelut in uigilante flāmescit, & oculi rubescūt, & mens aliquid mali operari cogitat. Atq; hoc in somno homo patitur. Cū aut sanguis rursus ad uenas dispersus fuerit, quiescit. Porro in quinto populariū morborū libro quendā recensui, cui fiebat uocis interceptio, ignorantia, frequētes delirationes, & reuersiones. Lingua aut dura, & nisi collutione usus esset, loqui non poterat, & plerūq; etiam ualde amara. Venæ sectio exsoluit, aquæ potius, aqua mulsa, ueratorū potiones. Hic ubi modicū tēpus superuixisset, mortuus est. Erat et alius quidā, quē, ubi noctu ad cōuiuū progrediretur, timor tibiciniē corripiebat, ubi audiret ipsam tibia canentē. Interdiu uero audiēs, nihil patiebatur.

Hippocrates Democrito felicitatem.

Artis Medicæ recta facta, o Democrite, pleriq; è uulgo hominum nō omnino laudant, uerū Dijs sæpe attribuūt. Si uero natura reluctata perdidit eum, qui curatur: medicos reprehēdunt, numen prætereūtes. Et ego sanē mihi uideor, maiōre reprehensionem q̄ honorē artis me assequutū esse. Ego enim

ad finē Medicinē nō perueni, etiā si iam senex sim. Neq̃ enim ipsius inuētor Aesculapius, sed & ipse in multis à seipso dissensit, quemadmodū nobis scriptorū libri tradiderūt. Proinde epistola à te ad nos missa, ueratri medicinā reprehēdebat. Inductus equidē sum, ò Democrite, uelut insanienti ueratrū daturus, non perscrutatus qualisquis tandē esses. Vbi uero tecum congressus, cognoui non per Iouē desipiētiae opus, sed fermē omni laude ac cōmendatione dignum, ualde laudauī naturā tuam, optimūq̃ naturæ ac mundi interpretem te iudicaui. Eos uero qui me induxerūt ad te, uelut insaniētes reprehendi. Nam ipsi medicamento opus habebant. Quandoquidem igitur casus nōs in idem coniunxit, recte feceris si ad nos frequentius literas dederis, & libros à te conscriptos imperitueris. Misi autem etiam ipse tibi de ueratri usu libellum. Vale.

Hippocratis De ueratri usu libellus.

HIs qui non facile sursum purgantur, ante potionē corpora prahumescere oportet uberiore alimento & quiete. Vbi uero quis bibit ueratrū, ad motus corporū magis ducere, q̃ ad somnos. Declarat autē nauigatio, q̃ motus corpora turbat. Cum ueratrū magis ducere uoles, corpora moueto. Veratrū periculosum est sanas carnes habētibus. Quicūq̃ in pharmacorū potionibus nō sitiunt, dum purgātur, non cessant purgari prius q̃ sitierint. Cōuulsio ex ueratro, lethale. In nimia purgatione, cōuulsio aut singultus succedēs, malum. Inurbationibus uentris, & uomitibus spōtaneis, si quidem qualia purgari oportet, purgētur, cōducit, & leuiter ferūt. Sin minus, uice uersa. Quemadmodū autē in prænotionibus dixi, purgatio sursum uersus cōmodat ei, in quo sine febre est cibi fastidiū, aut stomachi pūctura, aut uertigo, aut os amarū, & in summa doloribus supra septū trāsuersum: at deorsum uersus, ubi sine febre est tormēn, lūbōrū dolor, genuū grauitas, mēses ægre prodeūtes, dolores in partibus sub septo trāsuerso. Vitare uero oportet in pharmacorū potionibus eos, qui bonā habēt corpora, maxime autē nigros, et humida carne præditos, sed et sublicos, et balbos, ac blēfos. Quicūq̃ uero inflammata in principio morbi, uelut in libello de pitisana dixi, statim medicamēto soluere aggrediūtur, hi de eo quidē quod distētū est ac inflammātū, nihil auferūt. neq̃ em̄ remittit qui crudus est adfectus. Ea uero quæ morbo resistunt, & sana sunt, cōsumunt. Corpore uero debili fiēte, morbus superat, & immedicabile malū habent. Cæterū ueratrū his dare oportet, quibus de capite fluxus fertur. Non autem dandū est pectore suppuratis. Neq̃ medicamēta danda sunt decoloratis, raucosis, lienosis, exsanguibus, spiri-
tuosis & siccū tussientibus, siticulosis, flatuosis, & his qui præcordia, & lātera, ac dorsum distenta habent, & torpētibus, & obscure uidētibus, & quibus aurium sonitus sunt, & urinæ meatus impotētibus: neq̃ itē morbo regio laborantibus, aut uentre debilibus, aut his qui sanguinis eruptiones aut tubercula habent. Si uero medicandum esse uidebitur, ueratro securus sursum purga, deorsum uero nō. Optimū autē his est uictus rationē constituere. Quemadmodū autē in prædictionibus dixi, nō sunt medicamēta danda his qui nigra euomūt, neq̃ cibū auersantibus, neq̃ delirys & parū dormiētibus, neq̃ dolore uexatis, neq̃ uisum temerariū inclinātū habentibus, neq̃ tumefactis, neq̃ uertiginosis, neq̃ decoloratis, neq̃ his qui in febre æstuarii sunt ac cōfracti. Sicut autē de pitisana dixi, Sesamoides sursum purgat, potio eius est drachma dimidia in aceto mulso

trita. Commiscetur etiā ueratris tertia potionis pars, & minus suffocat. Purgat item quartanas diuturnas, & diuturna febrī lipyria uexatos : & eos, in quibus non est sitis, neq; excretio. Hos uero non ante tres hebdomadas. Aliquādo etiā pleuriticos ac uolulofos. Et sicut in muliebribus morbis dixi, purgandum est etiā si uterī purgatione opus habuerint.

Hippocrates ad Thessalum filium.

AD cognoscendam Geometriam & numerorū scientiam, mi fili multū stude, dii adhibeto. Nō enim solū uitam tuam illustrem, & ad multa cōmodam, in humanarum rerū statu efficiens: sed etiā animā acutiorem & clariorem reddent, ad omniū, quorum usus in medicina expetitur, utilitatem cōsequendam. Etenim Geometriæ cognitio, quæ multiformis ac uaria est, & omnia cū demōstratione transigit, utilis erit & ad oīiū situs, & ad exarticulationes, & reliquū membrorū ordinem. Nam ad multiplicē horum adfectionē, & articularum luxatorū repositione, & oīiū cōtritorum resectione, & perforatione, & cōpositione, & exēptione, ac reliqua curatione, maiore industria utetur quisquis nouerit qualis est locus, & quale est os, quod ex eo eluxatū est. At uero numerorū ratio, & ad circuitus, & ad trāsmutationes febrium præter rationē fientes, & ad iudicia ægotantiū, ac securitatis in morbis, sufficiens erit. Præclara enim res est, tale ministeriū in medicina habere, quod tibi partes intensiōis ac remissionis, cum ex parte inæquales fuerint, facile cognobiles exhibet, citra errorem. Quapropter ad huiusmodi experientiæ facultatē peruenire sedulo stude. Vale.

Democritus Hippocrati, De natura humana.

OMnes homines artē medicam nosse oportet, o Hippocrates. Est enim res honesta simul ac utilis ad uitam: & ex his maxime eos, qui eruditionis ac eloquētiæ cognitionem habēt. Nam sapientiæ cognitionē medicinæ sororem ac cōubernalem esse puto. Sapientia enim animā ab adfectibus liberat: Medicina uero morbos à corporibus aufert. Augescit autē intelligentia, præsentē sanitate: cuius prouidentia habere, honestum est, eos qui recte sentiūt. At ubi corporis habitus ægrotat: neq; mens ipsa alacritatem habet ad uirtutis meditationem. Morbus enim præsens animam uehemēter obscurat, intelligentiā ad adfectionem per cōsensum ducēs. Cæterū naturæ humanæ descriptio, eiusmodi speculationem habet. Cerebrū quidem supremam corporis partem custodit, & securitatis tutelam sibi cōmissam habet, intra mēbranas neruofas cohabitās. Super quod duplicatorū oīiū naturæ necessariæ firmatē, dominum mentis custodem, ipsum cerebrū tegunt. Pilorū decor est, cutem ornare. Oculorū uero uis uisua in multiplici tunica latitans, ob humoris instantias, sub frontē in medelam collocata est, & est uidendi causa. Pupilla uero syncera, palpebræ marginem opportunitatis custodem sustinet. Duplices autē nares olfactū dinoscētes, oculorum uicinatē dirimunt. Mollis uero labiorū contactus os circūplicans, uerborū sensum, exactamq; articulationē gubernans exhibet. Mentum autē in extremitatē desinens, ac lyræ simile, dentiū clauis coaptatum est. At sermonum receptacula aures, opifex aperuit: in quibus dum est sermo, non certus temeritatis minister existit. Loquelæ mater lingua, animæ nuncius, gustū custodiēs,

munitis dentium septis custodita est. Guttur aut & Gula inter se coniuncta, uicina sunt. Illud enim in uiam spiritus; hæc in profundū uentris, alimentū demittit, large id propellens. Regiū uero cor, cono ac pineæ nuci simile, iram nutriēs, aduersus omnes insidias thoracē induit. Frequenter aut flatuum cāuernæ, aere per ipsas erumpente, uocis causam flatum pariunt. Quod uero sanguinem supeditat, & in alimētum transmutat, cum apicibus sæpe uena caua circūfluum, hepar est, concupiscentiæ causa. Viridis autē bilis iuxta hepar manens, ubi superbullit, humani corporis corruptio est, & nocuius ac inutilis corporis humani inquilinus. Veruntamen uice uersa dormit, nullum negocium exhibens. Inter hæc autē medius omnia suscipiens uēter chorū ducit, & accumbit, concoctionem gubernans. Obnoxia uero uentris cōpositioni, per opificium cōuoluta, circum uentrem euoluūtur intestina, adsumptionis & excretionis causæ. Gemini autē renes in coxis firmati, & pinguedine intesti, ab urinarum excretionē non sunt alieni. At dominus totius uentris, qui Omentū uocatur, totum uentrem complectitur, solo splene excepto. Cōsequenter, neruosa uesica in coxa osculum firmatū habens, uenis complicatis, urinarum excretionis causa est. Huic autē uicina mater puerorum, uehemens illud malum, infinitarū ærumnarum in muliere causa, uterus ipse latitat. Pylorus autē siue lanitor, ex coxarum recessu emergens caro, neruis adstringitur. Verum de plenitudine naturæ uentris effundit, ex opificij prouidentia. Porro extra corpus penfiles domum incolunt, ad generationē destinati, cōditores testiculi, multis tunicis præditi. Lucundum ex uenis ac neruis plicamentū est pubes, quæ urinarum effusionē facit, & ad coitus ministeriū à natura creata est, & pubertatis appetentiam tegit. Crura uero & brachia, & extremæ partes his annexæ, totum ministerij principiū cōaceruatum habentes, tutum neruorū ministerium perficiunt. At uero in corpore in recessibus natura, omnifaria uiscerum genera fabricauit. Quæ sanè mors instans, celeriter à ministerio quæta reddit.

Hippocrates Cons, Demetrio regi gaudium.

NOs equidem etiam prius, o rex, studio habētes naturæ humanæ partes in summa cōsiderare, has cōscriptas quemadmodū uoluisti demisimus. Nūc aut ea, quorū maxime studiosos esse oportet prudētes, partim à prioribus trāsumpta, partim nūc per nos ipsos cōperta, tibi cōscripsimus. Quæ si tu priorū morborū signis fientibus sequutus, & iisdem sæpe usus fueris: per omne uitæ tempus morborū exfors esse poteris. Duo sunt morborū uniuersorum animælium genera: alterū secundum genus, alterum secundū adfectionē, inter se dissimilia. At uero concupiscentias iuxta alimentū, ex subcōtrarijs cognosces, dum ea quæ euacuātur, indicant ea quæ plena sunt: & quæ implent, cōiecturam præbent eorum quæ uacua sunt. Morbos aut omnes ex subcontrarijs constitutos cognosces, & morbos à morbis fieri. In conuulsionibus febris succedens, sistit morbū: capitis aut dolores, sanguis ex auribus erumpens, aut ex naribus. Conuulsionēs omnibus morbis atræ bilis succedentes, atrā bilem sedant. Et in summa, radix humanorū morborum est caput, & maximi morbi ex hoc accedunt. Quum enim ori uelut cucurbita medica incumbat: cōtingit, ut ipsum omnium eorū, quæ ingerūtur, superfluitates attrahat, & tenues humores. Oportet autē

animum

animum aduertere, & peculiariter uiuere, ubi teipsum praepraueris in has partes, quo morbi accidentes nullū augmentū capiant, per curam diligentē & per bonum ordinē apud te fientem: ita ut neq; rei uenerē intemperantia, neq; diuersorū eduliorum incōtinentia, neq; somnis immodicis, in exercitatio corpore utaris: sed signa in corpore contingentia sequaris, & uniuscuiusq; corporis occasionem conserues: quo morbum irruere parantem uites, et medelis, quas ego perscribo, utens, à morbis exfors perseueres. Vale.

Decretum Atheniensium.

Vlsum est ac decretū Senatui et populo Atheniensium. Quandoquidē Hippocrates Cous Medicus, & ab Aesculapio originem ducens, magnā beneuolentiam unā cum salute Græcis ostendit, quando etiam peste à Barbaris in Græciam proficiscēte, discipulis suis ad locos dimissis, indicauit quibus medelis uti oporteat, & accedentē pestem secure effugere, quo medicina Græcis data, ipsorū aegrotos tuto seruaret. Sed & scripta sua de arte medica exacta edidit, multos esse uolens Medicos qui seruare possent. Et Persarū rege ipsum accersente, & honores optimatibus Persarū aequales promittente, & dona quaecunque tandem ipse Hippocrates uellet offerente, Barbari promissiones contempsit, eo quod hostis & cōmunis inimicus Græcis esset. Quo igitur appareat, populum Atheniēsium semper ea quae utilia sunt Græcis cōsultare: & ut gratiam cōdignam Hippocrati pro benefactis referat: uisum est populo, ipsum publice magnis mysterijs initiare, quemadmodum Herculem filium Iouis: & coronare ipsum corona aurea mille aureorū: & ipsam coronā Quinquatrys magnis Mineruæ festis, in certamine gymnico per praeconem proclamare. Et licere omnibus Coorum liberis, ut Athenis pubescant, quemadmodū liberi Atheniensium: quandoquidē patria ipsorū huiusmodi uirum genuit. Esse uero Hippocrati, & uitam, & uictum prouisum in Pritaneo per omnem uitam.

Oratio Hippocratis ad aram consilientis.

OVos multi & multarū urbium habitatores, in magna dignitate constituti, cōmuni nomine Thessali, omnibus hominibus amara necessitas incūbit, ut quae à fatis statuta sunt ferant. Quapropter ego nunc cedens cum mea sobole, oleæ ramulis coronatus, ad Mineruæ arā supplex cōsisto. Quis sim, ignorantibus dicere oportet. Hippocrates, ò uiri, medicus Cous, nō per piā & honestam causam, me ipsum & liberos meos uobis commendo. Cognoscitis me ò plebs. Nam profecto uos estis uiri mihi familiares, inter quos, ut uerū dicam, inter plerosq; uestrū & in multis urbibus uestris cognitus sum, ut in summa dicam. At uero nomen meum longe ulterius, q̃ formæ meae aspectus, processit. Atq; hæc causa ex arte mea sanitatis ac uitæ ortū habuisse uidetur, q̃ nō solum hominibus uestram regionē habitantibus, sed etiā multis Græcis uobis uicinis cognitus sum. Iam uero qua de causa tantū negocium opere peragendum adsumpsi, referam. Athenienses male habebūt, ò uiri Thessali, qui Metropolitim ac patriā nostram Co deuantantes, in seruitutē redigunt ea, quae libera sunt ex progenitorū adquisitiōe, priuatim sibi parta faciētes: neq; cognationē reueriti, quæ ipsis est ab Apolline & Hercule, quæ sanè ad Aeniū & Sunium filios illorū per

uenit, neq; Herculis malorum domitoris beneficia mente recolunt, quæ ille cõmunis & uobis & nobis bene faciens deus, in illos cõtulit. At uos per Iouẽ supplicationibus colendum, & per cognatos deos, egredimini, uindicate, liberate, propriæ uirtutis memores, & nihil ad gloriam uestrâ spectans intermittentes.

Oratio Legati Thessali filij Hippocratis, ad Athenienses.

COnuenire arbitror uiri Athenienses, constitutum apud uos, qui nō omni multitudini cognitus est, primū indicare quis sit, & unde sit: postea uero reliquā orationē persequi. Mihi equidē pater est Hippocrates: qui quantam in medicina facultatē habeat, uos nouistis. Nomē autē est Thessalus. Cognitus uero & ego sum nō in postremis, neq; paucis uestrum. Patria uero mihi est Cos: quæ quomodo uobis cognata sit ab antiquo, alij dicūt, qui in recēsenda historia sunt præstatiores. Veni autē missus à patre, quatuor beneficia à nobis in uos collata prolaturus. Primū quidē uetus quoddā, tēpore progenitorū nostrorū, cōmune in omnes Amphictyonas, quorū uos nō minima pars estis. Alterū uero illo adhuc maius, & ad plurimos Græcorū progressum. Atq; hæc quidē urbis & progenitorū meorū esse apparebūt. Tertium autē patris propriū est, et tantū, quantū nemo unus uir, & uobis & multis Græcis cõtulit. Postremum uero ex quatuor cōmune est patris & meū, & quod nō ad plures, sed ad uos ipsos peruenit. Quod quidē priorū beneficiorum cōparatione exiguū uideri poterit: uerum ad aliorū beneficia collatū, magnum est. Et sanē huiusmodi beneficia sic se habēt, quemadmodū esse dixi, ut summatim dicā. Oportet autē non solū dicere, sed etiā demonstrare q̃ uera sunt. Principiū igitur sermonis, ipsum ministeriorum nostrorū principiū faciam. Vetustissima uero primū referā: in quibus fortassis longiora ac altius repetita me dicere deprehēderitis. At quisq; uetus dici expetit. Erat enim tēpus quādo Crisæa gēs erat, & habitabat quidē. circa pythi cū templū: terram uero habebat, quæ sanē nūc Apollini cōsecrata est. Appellatur autē Crisæus quidē campus, iuxta quē Locri habitāt, & cui Melæna adsunt: Cirrhæus uero mons, cui Phocēses adiacent. Hi porrō Crisæi cū essent aliquando populosi, & fortes, & opulēti, his bonis ad malū usi sunt. Per insolentiā em multa horrēda ac iniqua facta perpetrarūt, in deum impietatem exercētes. Delphos in seruitutē redigentes, uicinos deprædātes, agricolas spoliantes, uxores ac liberos abducētes, & corpora ipsorū constuprantes. Qua de causā Amphictyones ira cōmoti, & exercitū in terrā ipsorū inducto, & ipsis pugna deuictis, regionē deuastarūt, & urbes expugnarūt. Vbi sanē illi, qui multa & impia perpetrarūt, misere accepti sunt, nō minores pœnas persoluētes, q̃ ipsi alijs intulerāt. Felicissimi uero ex ipsis fuerūt, qui intra manus hostiū perierūt. Secūdo loco, qui manu capti sunt, & qui ad aliā regionē ac urbes transuerūt. Sua em mala ob oculos non habuerūt. Qui uero ex captiuis isthic manserunt, infelicissimi fuerūt, quicūq; in sua ipsorū regione torquebātur. Nam cū uxoribus & liberis, agros & urbes igni tradī uidebant. His uero adhuc peius debebant hi, qui intra moenia perseuerabant, quādo relata mala partim uidebāt, partim percūctabantur, plura ueris audiētes. Sic enim fieri solet. Et sanē malā salutis spem habebāt. Erat autē ipsis urbs prope hunc locū maxima, ubi nūc certamen equestre peragitur: cuius muros exstruxerāt, & eos qui ex alijs urbibus transfugerant, exceperant

rant. Inutilia uero eiecerāt, & necessaria importauerāt. Et cogitabant obsidionē sustinere, bona spe præditi, neq; manuū pugna, neq; lōgi tēporis obsidione, urbem capi posse. At uero Amphictyones, tū alia deuastarūt, tum ad hanc urbem præsidio cōstructo, & ad expugnationē præparato, reliquū exercitū per urbes dimiserūt. Temporis autē progressu, cū pestis in exercitū illapsa esset, & milites ægrotarēt: quidam uero etiā morerentur: alij uero, propter morbū, præsidium reliquissent: Amphictyones turbabātur. Et alij alia cōsultabant. Solet autē in rebus cōmunibus sic ferē fieri. Tandē uero afflictionē moleste ferētes, & de bello desperātes, deo rem commiserunt: & quid facere oporteret, interrogarūt. Ille uero bellū gerere iussit, & uictores fore promittebat, si ad Co profecti, cerui filiū in auxiliū adducerēt, cū auro: atq; hoc festinabūdī, ut ne Crisei prius in adytō tripodem depredarentur. Sin minus, urbē capi non posse. Ipsi uero, his auditis, & ad Co profecti, oraculū proposuerunt. Cum autē Coi dubitarent, & oraculum nō intelligerent: surrexit uir genere quidē Asclepiades, progenitor autē noster, Medicus uero Græcorū eius temporis omnium cōfessione optimus: nomen autē ipsi erat Nebrus: qui oraculū dicere inquit, ut ad seipsum uenirent. Nam deus, inquit, admonuit uos, ut profecti ad Co, cerui filiū in auxiliū adducatis. Cos equidē hæc est. Ceruorum autē filij Nebri appellantur, hoc est hinuli. Nebrus autē est mihi nomē. Quod uero aliud auxiliū potius cōtigerit exercitui ægrotanti, q̃ medicus? Et profecto nō uidetur mihi id cōsequens esse, q̃ in tantum diuitijs Græcos omnes superantes, deus ad Co proficisci iusserit, & aureū numisma petere. Verum hoc oraculū in meam domū progreditur. Chrysos enim, hoc est aurū, uocatur masculus meus filius natu minimus. Est autē omnino & corporis specie, & animi uirtute, quantū patri dicere licet, inter omnes ciues præcellens. Ego quidē igitur, nisi uobis aliud uideatur, & ipse proficiscar, & filium mecū adducam, naue quæ quinquaginta remis agatur instructa meis sumptibus & ministerijs medicis ac bellicis referta, quo in utrāq; partē auxiliū feramus. Et hic quidem dixit: illi uero approbauerūt, qui missi fuerunt. At Nebrus hic etiā uirum Calydoniū apud se educatū, in nauē adsumpsit: de quo statim, ubi res tulerit, dicemus. Cū igitur peruenissent hi uiri ad castra, deus gaudebat. Nam & mortes militū cessabāt, & cū diuina fortuna equus Eurylochi (qui belli dux erat, Thessalus genere, & ex Heraclidis ortū ducēs) canālē, per quem aqua in urbē ducebatur, ungula percussisset, ubi in puluere uolutari uoluisset: Nebrus aquā medicamētis infecit, unde uētres Criseorū corrupti sunt: & sanē multū contulit ad hoc ut ciuitas caperetur. Atq; hinc iam animi obsidentiu elati sunt, uelut deo iā manifeste auxiliū ferēte. Cū autē impetus facerēt, & præmia proponerēt his qui primi muros cōscēdissent: certamē erat fortissimū, et urbs capiebatur. Primus enī muros cōscēdit Chrysus, & turrim occupauit. Sequēbatur autē ipsum euestigio uir ille Calydonius, sub cōmuni scuto anxiliū ferēs, de quo antea dixi. Et Chrysus quidē hasta percussus cecidit ex summa turri: percussus est autē à Mermode Lyci fratre, qui lapidib. obrutus mortuus est, cū in adytū irrupisset tripodē depredaturus. Hi igitur ciuitatē sic coeperunt: & Nebri auxiliū cū Chryso, & secundū medicā, & secundū bellicā facultatē recte successit: et deus uera dixit, & quæ promiserat fecit. Qua de causa Amphictyones Apollini quidē templū cōsecrarūt, quod nūc est in Delphis: & certamē gymniciū

ac equestre prius nō peragētes, nūc peragūt : & Chriſæorū regionē uniuersam dicarunt deo cōtributori, reddentes ea quæ dedit in eo q̄ oraculū dedit. Et Nebri filiū Chrysum in circo equestri sepelierūt: & Delphis publice ipsi parentare præceperūt. Asclepiadis uero in Co attributa est prudētia uaticinādi, quemadmodū his qui mittūtur ex urbibus ad sacrū Amphictyonū conciliū: atq; hoc Nebri gratia. Calydonijs autē ab illo uiro & illo ministerio, etiā nūc in Delphis primæ uaticinandi partes, & alimēta dantur. Verū redeo ad nostra. Nam quod uera dico, hinc clarū est. Cū em̄ pater & ego accessissemus, Amphictyones hæc renouarūt, & attribuerunt, & in colūna descripta in Delphis dedicauerūt. Atq; huius quidē sermonis finis clare ostendit, nōstros progenitores esse uestros benefactores. Cæterū hoc relicto, aliū de iisdem, nō eundem sermonē, adsumam. Cū enim magnus ille rex cū Persis & alijs Barbaris bellū gereret contra Græcos, qui aquam & terram nō dedissent: patria nostra maluit in totū pessundari, ut ne contra uos, & eos qui uobiscum sentirent, hostilia arma sumeret, & in nauibus militare expeditionem mitteret. Sed abnuuit, honestū quid & dignum patribus meditata, qui Gigantes & Heraclidę esse dicūtur. Visum igitur est ipsis, cū quatuor essent muri in insula, omnes relinquere, & ad mōtes cōfugere, & salūtē tutari. Vnde sanē quid nō mali obuenit: dū regio fuit deualtata, & corpora libera mācipata, & hostili lege occisa, & urbs & alia munimēta, ac templa, ad fauillā exusta. Insuper autē & filiæ Lygdamis Artemisæ, circa patrū uictoriā datum est, omnia quæ reliqua essent expiscari ac exportare. Atenim, uelut apparet, à dijs nō sumus neglecti: uerū tēpestatibus ingētib; exortis, & naues Artemisæ omnes in periculo fuerūt, & multæ perierūt: et in exercitū ipsius multa fulmina inciderūt, quū insula nostra paucis fulminib; impeteretur. Dicitur etiā spectra Heroum mulieri cōspecta esse. Quorum sanē omniū timore perterrita, ab immedicabilibus cœptis destitit, amara confessione facta, quæ & relatu amara est. Quare omittatur. Attribuam autē & hic progenitorib; meis proprijs si me minime falsa, q̄ neq; cōtra uos, neq; cōtra Lacedæmonios, aliosq; Græcorum socios, Coi uolūtaria arma sumpserint: & quidē quum multi tum insulas, tum Asiam habitātes, cum Barbaris in bello cōiuncti fuerint, nulla uiolentia coacti. Equidē præfecti urbis tūc fuerūt Cadmus & Hippolochus. Verū autē est, & Cadmum & Hippolochū meos progenitores esse. Nam Cadmus, qui & Senatum regebat, matris meæ progenitor est: Hippolochus uero ex Asclepiadis, quartus à Nebro, cuius auxilio Crisæi sunt deualtati. Nos autē ex uirili genere Asclepiadæ sumus. Quare & hoc bonū à progenitoribus nostris profectū amplectimini. Redeo ad Cadmū. Hic sanē uir adeo cōmodi Græcorum studiosus fuit, ut cū regio ab Artemisæ obsidione liberata esset, isthic relicta uxore ac sobole, abiuerit cū his qui eadē sentirent in Siciliā, quo Gelonē & fratres eius prohiberet, ne amicitia cū Barbaris cōtraherent cōtra Græcos. Perpetrauit & alia multa egregia facta, quæ lōgius producere nō est tempestiuū. Atq; hæc quidē & huiusmodi multa sunt publica progenitorū nostrorū in uos & alios Græcos beneficia. Nam deficit me dicēdi facultas. Venio autē iam ad hoc, ut beneficium Hippocratis patris mei apud eos, qui id sciunt, producam: quod hoc modo recensens, uera dicere cognoscar. Cū pestis ex Barbaria adflueret, quæ supra Illyrios ac Pæonas sita est, & cū malū in hanc regionē uenisset: harū gentiū Reges

ad famā medicā, quā uera erat, & undiquaq; processerat, & ad patrē meū, nūncios miserunt in Thessaliā (illic enim pater meus & prius, & nunc domū habet) uocantes ipsum ad auxilium ferendū. Et non solum argētum, & aurum, & alias opes se missuros esse receperūt: sed etiā reportaturū esse quācūq; ipse uellet, si auxiliū tulisset. Ipse uero cū interrogasset quales motus partiales fierēt, & æstus, ac uētos, et caligines perscrutatus, itēq; alia quā habitus ex præsenti statu cōmouere solent: cū sanē omnia didicisset, illos quidē retro discedere iussit, & nullā sibi facultatē esse ad illorum regionē proficiscendi, pronunciauit. Verū ipse q̄ citissime Thessalis denūciare studuit, quibus modis malū accedens cauerent: & medelam conscriptā per urbes proponebat. Me uero in Macedoniā demisit. Cū regibus enim Heracidarū, qui isthic imperiū obtinēt, paterna nobis intercedit amicitia. Et ego quidē ibam à Thessalia eo, quo me pater iussit, auxiliū his qui isthic essent laturus. Iniunxit autē mihi ut etiā urbi uestræ opem ferrem. At fratrem meum Draconē ex Pagasis profectum, in Hellepontū nauigare iussit, cōsimili cōsilio instructū, quali etiam ipse utebatur. Nō enim omnes loci eadem auxilia ferūt, eo q̄ non omnis ambiens nos aer similis est. Polybium uero, qui filiam ipsius, meam autē sororē habet, & alios discipulos, ad alios aliorū cōuentus & uias profecturos emisit, quo q̄ plurimis opitularetur. Postquā autē ipse res in Thessalia perfecit, ad uicinas gētes auxiliū laturus proficiscebatur, et ad pylas profectus, Dorienſibus, & alijs, simulq; Phocenſibus auxiliū tulit. Et cum sanē ad Delphos peruenisset, supplicationē deo pro Græcis fecit: & sacrificio facto, iter ad Boetos arripuit. Et cū ipsis opem tulisset, similiter ad uos progressus est, & sufficientia uobis ad salutē, quā sanē nūc ego produco, ex animo penitus dixit. Arbitror autem multos uestrū nosse, q̄ uera dico. Non enim ita diu est, sed nonus hic est annus, quando abiui, & in Peloponesum missus sum, isthic habitātibus opem laturus, At uero undiquaq; nobis, & uerbis, & re ipsa, dignus honor cōtigit, ut minime pœniteat nos, q̄ nō hunc cū quæstu ex llyricis ac Pæonibus oblato permutauimus. Verū præ reliquis ciuitatibus magna sunt quæ à uobis data sunt. Nā & respub. uestra alias excedit. Athenæ enim altius quiddā sunt alijs urbibus, quātum ad gloriā attinet. Et corona illa antea in uestro theatro patri imposta, ad summā æmulationem ac felicitatē ipsum euexit. Sed & hoc beneficiū superastis, dum & patrē, & me publice Cereris & Proserpinæ mysterijs ac sacris initiastis. Atq; hæc quidē tria sunt beneficia, quantū ego uerbis cōsequi potui, et fracta uoce proferre, urbis, et progenitorū, et patris mei, in uos simulq; multos græcos. Quartū nūc dicere aggrediar, quod, uelut antea dixi, in uos ego et pater meus collocauimus. Cū em̄ Alcibiadē emitteretis in Siciliā, multa quidē potētia, nō autē ita multa, uelut admirāda: & sermo in cōcio ne incidisset de Medico, quē exercitū sequi oporteret: pater meus progressus, me ad curāda corpora uestra se daturū esse promisit, proprijs sumptibus instructū, & citra mercedis exactionē, q̄ diu clasis abesset, paruipēdens suā utilitatē, ut qui sibi persuasisset, hoc in uestrū cōmodū cessurū esse. Ego em̄ non solū res meas insumebā, id quod faciebā uobis inseruiēs: sed etiā ad alia magna opera destinatus fui. Et hoc minimū est ex his, quæ sum dicturus. Deceuit em̄ pater ob me filiū fortunæ fluctibus agitari, & in terra aliena, & in mari, & in periculis bellicis, & in ægritudinibus, quæ his qui erroneā uitā degūt, magis accedere solēt, quā in

q̄ his qui ordinatæ uitæ rationē habent. Nouit enim beneficiū beneficio metiri: & nō, uelut qui aliquid emisset, cōtractu ex manu in manū factō semel, discedere. Et hic quidē talia præstitit. Ego uero, ut qui filius illius sim, nihil studiū & artis prætermisi, auxilium ferens, & periclitatus uobiscum, si quādo occasio tuu-
 lisset. Et ad hæc ambo præstanda, neq; morbus, neq; afflictio, neq; timor in mari, & intra hostium manus, me prohibuit. Testes autem huius rei non alios aliquos, sed uos ipsos habeo. Quare si quis cōtradicare uolet, is nihil cūctatus exsurgat. Verū non puto me mentiri. Cum autē hæc præstitissem ad annos tres, & aurea corona coronatus, & adhuc pulchrius laudatus: domū redi ad nuptias, quo & artis, & generis nostri successores producerē. Et quæ quidē à ciuitate, à progenitoribus, à patre, & à me, uobis obtigerūt, hæc sunt. Dictū est autē & quæ nos à uobis oblata tulimus. Arbitror autē multos è uobis admirari, qua de causa hæc à me ex tam lōginquo principio repetita sunt. Quo igitur & uos cognoscatis, & mihi ea quæ cupio cōtingant: tempestiuū est ut hoc dicam. Pater meus, ò uiri Athenienses, & ego petimus uos (sic enim liberos & amicos loqui decet, quo id quod petunt ab amicis liberis cōsequantur) cōtra patriam nostrā hostilia arma ne sumatis. Si uero oportet, quemadmodū fortassis oportet eos, qui sua ipsorū causa progressi sunt, etiam rogamus, ut ne nos, qui eiusmodi & tam magna beneficia in uos priores contulimus, seruorū loco habeatis. Insuper autē (nam & sic dicere cōueniet) supplicamus, ut ne nostra faciatis uobis ipsis in bello captiua, si cōtigerit ut multo inferiores superetis. Verū & hoc cōsiderate, q̄ fortuna aliās alia cito uersat: et aliquādo magni paruis opus habuerūt: & fortē debiles salutē adepti sunt. Puto autē clarū esse, ut ne clarissimū dicā, q̄ ob unū uirū nō ciuitas, sed multę gētes iam quādoq; utilitatē in rebus bellicis cōsequutæ sunt. Et ubi ars in precio est, neq; nos contēnere poteritis. Nā neq; ita uiles ac cōtemnendi sumus, quemadmodū in uobis testimoniū sitū est. Verū ab initio quidē dei, unde genus nostrū esse gloriāmur, Aesculapius et Hercules in hominū utilitatē prognati sunt. Et hos propter uirtutē, quā hic exercuerunt, omnes deorū loco habent. Vrbs autē mea, & ego quī ad uos uerba facio, ad tales originē nostram referimus, quemadmodū sanē hominū traditiones habēt. Vnde profecto etiā pro Græcis ambo hac parte, & in omni bono, ad ipsos tutādos stetisse apparebimus. Nō enim fabula sunt res ad Troiā gestæ, sed facta, in quibus Cos cū insulis suis non minima, sed maxima ad ferendū auxiliū exsistit. Sic uero etiā Aesculapij filij, nō arte solū, sed etiam armis, Græcis auxiliū tulerunt. Machaon equidem animam in Troade deposuit, quando, uelut scriptores de his prodentes dicunt, ex equo in Priami urbē uenit. Proinde neq; eo quod contribules, neq; eo q̄ ex auxiliariorū numero, auxiliares etiam ipsi Græcis sumus, nos iniuria adfeceritis. Nō in longū extendam sermonem, res Crisæorum, aut Persicas iterū repetendo, quando et ipsas audiuitis, & in manibus magis sunt, q̄ ea quæ paulo ante relata sunt. Quin & sic cogitate, minime pium esse benefactores iniuria adficere. Nos autem benefactores esse, facta ipsa clamāt. Ex quibus patribus prognati esse uidebimini (quemadmodum fabulatores dixerūt) si iniuria adficere, quā benigni esse malueritis: Neq; enim amarulentius quicquam dicere uolo. Illi enim, ò uiri Athenienses, Heraclidis quidem gratias res penderunt. Alijs autē multis, beneficio adfecti, uicissim auxiliati sunt. Deficiat profe-

perfecto me dies longius narrantem, si recensere uelim quot hominibus quanta bona obuenerint, qui nihil de uobis bene meriti fuerunt. Circumspicite uos ipsos, & me nullo dicente, considerate qualia perpetretis. Mala res est potestas, o uiri Athenienses. Non enim quae sua sunt, mensura disponere nouit. Sed & urbes quasdam & gentes iam perdidit. Si uero ad alios uelut in speculū respexeritis, uideritis ipsi quae facitis, & ego uera dico. Quin & lex noua est: Quicumque felici rerum successu confusus, non etiam ad rerum difficultates respicit: Non est hoc uestrum uiri Athenienses. Multū enim etiam sic Deū tentaretis. Nullam uobis iniuriam intulimus. Si uero etiā intulimus: nō armis, sed uerbis iudicemur. Deprecamur autē uos etiam hoc, ut ne faciatis nos alijs gratiā debere, qui nobis auxiliū ferēt. auxiliū enim nobis ferent, si recte fecerint, et qui intra Thessaliā, Argos, Lacedaemona, Macedoniā, sunt reges, & sicubi alij Heraclidæ, aut Heraclidarum cognati habitant. Praestat citra uiolentiā, quā ui coactos facere quae iusta sunt. Non dico de insolenti aduersum uos rebellionē: uerū hoc uobis manifestum facio, quod multi nostri curam gerunt, aut certe curam habebunt, nisi undiquaque de terra perijt, benignos adhuc esse homines. Ego quidē igitur, exiguæ enim mihi sunt ad dicendum uires, utpote qui aliarum rerū studio sim addictus, hic desinam. Rogo autē uos per hospites nostros, & per eos qui nobis consiliarij esse cōsueuerunt, & per Deos, & Heroas, ac gratias, quae hominibus ab hominibus contingunt, ut inimicitias quidem uestras aduersum nos deponatis: ad amicitiam uero uos conuertatis. Si enim non in uestra ciuitate hæc cōsequemur: haud scio quo progressi, eorum, quæ cupimus compotes fitemus.

HIPPOCRATIS COI OPERVM QVAE AD
nos extant omnium finis, Iano Cornario
Medico Physico interprete.

INDEX IN OMNIA

Hippocratis scripta ordine
alphabeti

A

A Blafatio facilis ut fiat	74	Aesculapius fulmine ictus	683	Amamelides quid	327
Abortus duplicati situs	335	Aestas paucissimorum dierum ubi	114	Amarum inest homini	15
Abortus quae cōsistēde expellatur	335	Aestas pluuiosa in meridionalibus urbi-		Amaræ bilis potentia	17
Abortus quadragenarij	62. 63	bus quos morbos inducat	105	Amarulentia medico uitanda	21
Abortus ratio	68	Aestate pars terræ inferna frigida	51	Amazones	113
Abortus septem dierum, omnia mem-		Aestate sicca morbi sedatur citius	105	Amazones masculos infantes eluxant	
bra habet	60	Aestiuos morbos hyemis soluit	434	644	
Abortus species effluxus	63	Aetatis morbis omnibus apta quæ	583	Ambidextram nullam esse mulierem	
Abortui expellendi medicamenta	335	Aetatis humanæ septenarij	58	531	
Abortientis curatio	396	Aetates iuxta dietas idiotarum	37	Ambulandi ratio	37
Abcessus circa aurem	513	Aetatū circa uictū habenda ratio	518	Amicus ad custodiam uxoris quam pa-	
Abcessui expectationes	523	Aetatū mutatio	519	rentes diligenter	676
Abcessum iuxta aures futurorum nota-		Aetatū morbi	521	Amicitiam colere nouit medicus	25
tio	548	Affectio mutua partium corporis	88	Amor hoīs amorem suscitāt artis	28
Abcessum uariarum notæ	539	Affectiones hominū cognoscendæ	19	Anaxiridæ brachiarum genus	116
Acerbum inest homini	15	Affectiones iuniorum uehementiores		Angina	500
Acetabula duo	91	Affectiones letitiæ & iræ	461	Anginæ consideratio	576
Acetabula plena pituita	329	Affectiones non ars culpanda in Medi-		Anginæ generatio & cura	98
Aceti mulsi uires	498	cina	8	Anginæ species prima	501
ex Aceto uomitorum	487	Affectiones partium iuxta ipsarum fi-		Anginosorum affectiones	414
Acidum inest homini	15	guras	19	Anhelitui pueri quid medeatur	383
Acida pituitosa sunt	102	Affectiones pertinaciter adherent	23	Anima hominis	461
Acrium eius noxius	485	Affectiones phreniticæ	565	Animæ hominum differunt	555
Actiones absoluit ratio	8	Affusionis minores ab intemperstia		Animam sanguinem esse qui putet,	
de Actionibus diurnis insomnia	157	uel repletionē uel uacuatione	13	qua ratione ducit	32
Acuti morbi quatuor	246	Agrestem uictum qui temperauit, Me-		Animæ deliquium quando inducere co-	
Acuti morbi incerti	519	dicus bonus fuit	12	porteat	168
Acuti morbi in quibus multi	105	Alarum glandule	78	Animi molestiæ unde	169
Acuti morbi qui sint	489	Albus mulierum fluxus	353	Animaduertendū in calumniatores ar-	
Ad aliquid dici bona & mala	18. 162	ex Albo oui alii uolucres, opinio	54	tium	5
Ad aliquid omnia dici	163	Allij intritum Mytoton	103	Annus qualitātū omniū particeps	33
Aduersariorū mutatiōis occasio	493	Allij uires in cibo	507	Annus saluberrimus qui sit	109
Aer communissimum quid	34	Allij uires in defectu partus pueri	54	Anni ac dierū cōstitutiōes morbi	521
Aeris uis	118	Alimentum quid appellatur	161	Anni temporum ratio quam necessa-	
Aerem mutat uel stadij spaciū	106	Alimentum pulmonis	163	ria	104
in Aerem transit aqua pluuiæ	108	Alimenti distributio in omnes corpo-		Anni salubris aut morbosī prenotio	
Aegri quanta medico credant	21	ris partes	161	109	
Aegri quomodo affecti	7	Alimenti humidi uis	163	Anni tempora mutationes habet	104
Aegrorum aspectus multi	503	Alimenti pueri ratio	49	Anthinum oleum	323
Aegrorū negligentia mortis causa	9	Alimenti ratio & modus	58	Anticyreus	678
Aegroti facies in morbis acutis	533	Alimenti siccī uis	163	Antiqui difficilior curantur morbi quam	
Aegroti imparibus diebus moriuntur		Alimenta transmovent	101	recentiores	99
235		Alimentorum inuentum quibus refi-		Antiquos morbos recentes facere oportet	99
Aegrotorum peccata	26	rendum	12	Antiquitas medicinæ	11
Aegrotorum uictus	12	Alumen ad quid profit	103	Anxij quomodo curandi	99
Aegrotis gratificandum	460	Aluus profluens quomodo curanda	39	Aorte cordis	77
Aegrotis qui usus aquarum	107	& 447		Aorte pulmonis	94. 578
Aegrotat homo quando	31	Aluus pueri quomodo soluenda	383	Aphtha pulmonis	209
Aegrorum oboli	69	Alui egestionum notæ	536	Aphtha ulcus	584
Aegyptij forma sibiipsis similes	113	Alui egestionum species	167	Apollo Nemius	173
Aequinoctia periculosa	110	Alui profluij commutatio	514	Apoplexie generatio	80
Aeramento quando & in quibus medi-		Alui secessum sistit uomitus	445	Aqua de farina crassa in ipsa macerata	
co utendum	21	Alui egestionē uariæ	512	108. 471	
Aerea uasa ornatus onerosus	ibidem	Aluo fluida sanguis non detrahendus		Aqua ex niue & glaciatis	108
Aeruginose bilis potentia	18	Aluo liquida non proueniunt morbi a-		Aqua humoris species	40
		cuti	105	Aqua in uteris	299
		Aluum sistētia quæ sint	102	Aqua qualis egrīs exhibenda	21
		Aluum subducentia quæ sint	ibidem	Aqua quæ hauritur æstate frigida	51
				Aquæ calidæ usus	166

Aque fluxus ex pudendis	378	Arteria	56	Bilis fluxus spontaneus	99
Aque frigide usus	166	Arteria quam uena caua plus calidi ha-		Bilis fluxio periculosa	95
Aque generatio	250	bet	56	Bilis humoris species	40
Aque generatio et tractio ad splenem		Arteria uena principalis	86	Bilis quod recipiatur	333
Aque mulsæ uires	427	Arterie magna alimentum	77	Bilis superne ac inferne fluxus	252
Aque usus	332	Arterie structura	75	Bilem uteri que purgant	345
Aquam cur non olfacimus	59	Articulorum commissuræ ratio	656	à Bile plurime fibres.	36
ab Aqua spiritus omnes	51	Articulorum generatio	58	Biliosi menses qui	314
ex Aqua uomitorum	487	Articulorum glandule	78	Biliosa pregnant est	321
Aque è petris scatuentes	107	Articulorum in digitis luxatio	631	Bimestrem foetum que corripit	395
Aquarum differentie	104	Articulorum mucus	91	Bonus habitus natura quedam	29
Aque ex fructibus uarijs	508	Articulorum pedum repositio	657	Boni habitus cause	235
Aque inuacitæ	109	Articulationis tempus	46	Boni et mali obseruatio artem consti-	
Aque palustres ac stabiles	106	Ascarides	568	tuunt	10
Aquarum crudarum et durarum qua-		Ascarides in pudendo muliebri	376	Boni et mali ratio	195
litas	107	Asie ab Europæ diuersitas	111	Bones diuersationi obnoxij.	624
Aque pluuias coquende ac excolan-		Asie ac Europæ terminus et descri-		Brachij natura:	82
da	108	ptio	ibidem	Brachij luxati cognitio	625
Aquarum facultas medico probè tenen-	104	Asiani imbelles	111	Butorij genituræ ratio	41
da		Astra errantia uidere	158	Brutorum uictu usi sunt homines ab in-	
Aquarum morbi peculiare	108	Astra pura in coelo uidere	ibidem	tio	11
Aquarum naturæ	106, 107	Astra uidere aliquid pati quid	157	Bubuli stercoris suffitus usus	298
Aquarum pluuiarum usus	108	Astrorum obseruatio quæ necessaria	110	et 348	
Aquarum usus pro sanis	107	Athletica dispositio	162	Bubule carnes exacerbant	508
Aquas bonas que urbes habeant	105	Attenuationis causa	234	Bubule carnis pessus	349
Aqua intercus	329, 381	Attenuatorum resectio	518	Bulle ex æstu eorum qui in niue ambu-	
Aqua intercus in uteris	373	Atra bilis autumnio augetur	33	Larunt	16
Aque inter cutem notæ	535	Atra bilis in uteris	375	Bulbion quid	342, 375
Aque intercutem prænotio	171	Atra bilis prodiens letalis	523	Buprestis	338
Aquilonis effectus	520	Atra bilis uomitio uulnerato mortu-			
Arbor duo calida non perfert nec duo		fera	98	C	
frigida	51	Atrabiliarie affectiones uariæ	484	Alamitates carnis que	23
in Arboribus fructificandi ratio que	52	Auaritiæ radix	678	Calcanei contusio	658
Argenti et emptus medicinæ inest	24	Auditus ratio	59	Calculi generatio	109, 248
Argenti flos	298	Audiendi ratio	89	Calculorum duorum ac plurium gene-	
Aromatum suffitus	526	Augmentum ex temperamento	15	ratio	242
Ars magna medicina	6	Auris fracta	635	Calculi generationis modus	109
Artis pars magna iudicii recti	434	Auris doloris affectio	469	Calculosa uirgo	306
Artis quæq; pars magna iudicium de-		Auris doloris prænotiones	540	Calculosa non sunt mulieres	109
scriptis rectum	514	Aures cordis unde	179	Callosi ulceris cura	481
Artem que constituent	6, 10	Aurium fluxus curatio	42	Callosorum duritium: concretio	86
Artem facilem facit tempus	24	Aurium dolor	245	Callyphyllum	480
Artem manciam facit instrumentorum		Aurium glandule	78	Caléscentia spiritum habent	43
defectus	25	Auricule cordis	76	Caléscentia ad lateris dolorem	492
Artem medicinæ esse demonstrat Hip-		Aurum adulterinū in igne indicatur	24	Caléscentia: utrum que sint	103
pocrates	11	Austri effectus	520	Calor innatus quibus	518
ab Arte petere quod nō proficitur, de-		Auoritas inest medicinæ	24	Calor quando plurimus	518
mentis	7	Authoritatem medico quid cōparet	20	Calide aque noxæ	525
Arte in omni optima scienda	653	Autumni qualitas	33	Calide effectus	526
Artes substantias esse	5	Autumni ratio	520	Calidum et frigidum quid permittunt,	
Artium ignotarum calamnia proditio				et quid non	18
est insciæ	ibidem	B		Calidum frigidum nutrire	43
Artes quedam absq; igne ociose	9	Baculi usus	643	Calidum non simpliciter afflictionis	
Artium facultates opificem faciunt	7	Balneum aliquando sanat	6	causa	17
Artium uarietas	9	Belliosi homines ubi et quando, quan-	113, 116	Calidum quid ipsum in seipso non inue-	
Artium reliquarū dissimilitudo ad me-		do non	160	nitur	16
dicinam	9	Bibere per somnium	33	Calidi potentia	55
Artibus noia ex specie, imponuntur	5	Bilis æstate augetur	565	Calidi temperamentum frigido	16
Artificum proborum et improborum		Bilis atra prodiens letalis	17	Calida duo arbor non perfert, nec fri-	
differentia	24	Bilis amaræ potentia	18	gida duo	51
		Bilis eruginose facultas		Calidum	

I N D E X

Calidum facultatum in corpore impositissimum	16	Cavitates corporis	8	Clavicula	90
Caliditatis corporum primis diebus ratio	35	Causa morbi quomodo cognoscenda	117	Clavicula fracta duobus modis	627
Calui cur non fiant Euruchi	48	Causa morborum eadem	118	Clavicule luxatio	629
Caluites unde	ibidem	Causa malorum ex permutatione uicis	14	Clauicularum natura	82
Calumniator suam prauam naturam prodat	5	Causa morborum consideranda	318	Cnestrum	346
Canceri uino suffocati	305	Causa non spontaneum quod nobis spontaneum	161	Coacervata difficilius curantur diducitis	100
Cancer non congenitus non ante pubertatem	583	Cause quae rite dicantur	17	Coadiutrices habet medicina reliquas artes	9
Canceri occulti	529	Causa sudoris sine causa nihil fit	191	Coactionis osium ratio	644
Cancrorum oculorum generatio	359	Cedrus critica	297	Coctura omnia dulcia facit	108
Canceris unde	48	Cedrinum uinum quale	379	Celum morbi principium	237
Canis & hominis intestina similia	82	Celeritate medicina morbo praevaleat	9	Caeli & aeris potentiae medico dignoscenda	55
Cantharidum usus	338.509	Crebrum glandula est	79	Caelium rerum scientia incerta	11
Cantharidum uentres	382	Cerebrum in uacuo circulo conclusum	8	Cognitio suppuratorum	95
Caprae comitiales	177	Cerebrum metropolis frigidi & glutinosi	56	in cognitione morborum herere debet	9
Caprae Syriae	327	Cerebri affecti morbi	80	Cognoscibilia tantum quae existunt	5
Caprinae carnes flatuosae	508	Cerebri confusio ex ictu	582	Coituum prolis causa quando	316.318
Capillis defluvis medentia	376	Cerebri corruptio	569	Coitus mulierum Venerem excitat	49
Capillorum generatio	58.59	Cerebri membranae duae	89	Coitus quibus commodus	461
Caput calscientia pharmaca quae	98	Cerebri repletio dolorosa	218	Coitus uoluptas unde	40.87
Caput macrocephalorum formatum quomodo	112	Cerebri utilitas	178	Coitu uiri magis quam mulieres delectantur	41
Caput morbosum	232	Cerebro ex aere sapientia accedit	179	ex Coitu uno gemelli	54
Caput pregnantis pituitosum	320	Certitudo artis medicinae exacta diffinitio	14	Coituum preparatio	68.70
Capitis dolor	245	cilis	31	Collatio uicis egrorum ac sanorum	12
Capitis dolor & affectio ex parte ac toto	479	Certitudo doctrinae Hippocraticae	23	Collectio seminis ubi fiat	87
Capitis doloris praenotiones	540	Chirurgiam rite quis aggrediatur	23	Collectiones tuberculorum impedire posse artificiosum	22
in Capitis dolore urinae quales	487	Chirurgicum militare oportet	508	Colli consideratio	572
Capitis fluxiones septem	80.92	Cholera sicca	482	Colli glandulae	79
Capitis sutura	90	Cholericae affectiones unde	583	Collutiones fluxus uteri	377
Capitis glandulae	79	Chordapsus non ante pubertatem	118	Collutionum uteri mensura	383
ad Caput pharmacum nigrum	357	Cibus nutrimentum	234	Colocynthis silybistris & eius usus	69
Carcinoma curatum	487	Cibi inmunditas unde	39	Coloris corporum ratio	171
Carnis bubulae pessus	308.349	Cibum eructantes quomodo curandi	13	Coloris menstruorum ratio	103
Carnis generatio	45.57	Cibum quidam tantum semel in die accipiunt	8	Colores fluxionum observat medicus	10
Carnes bubulae atrabiliaria exacerbant	508	Cibum suspicientes uentriculi duo	13	Colorum consideratio	560
Carnes porcinae pravae	ibidem	Cibo familiares praeter morem ingestis noxiis	494	Colorum mutatio ex corde	88
Carnium utilitas	85	Ciborum facultatum coniectura unde sit	255	Colum intestinum	75
Carnositati prodest labor	645	Ciborum inmunditas spectanda	519	Columella in pudendis	304
Carthaginense corium	632	Ciborum mora in uentriculo nociva	234	Comissurae articularum ratio	656
Casei natura	18	Ciborum noxiorum appetentia in aegris	7	Comitas decet medicum	25
Casei repletio dolorem adfert	ibidem	Circuli rubicundi in tibis	574	Comitalis mutatio	520
Casei uires	507	ex Circumferentia astrae uidere excidere quid	158	Comitalis quibus mutetur	525
Castorij usus	481	Ciuitatum septentrionalium situs & accidentia	105	Comitales conuulsiones	478
Casus infortunatus	183	Ciuitatum situs uel boni uel mali qui	104	Complui sibi uideri quid sit	159
Casus non est spontaneus	7	Claritatem uocis observat medicus	10	Compositionis medicamentorum ratio	416.656
ex Casu gibbositas	636	Claudicationis ratio	91	Communicatio uenarum	90
Cataplasmata ad uteri fluxus	377			Conceptus mole	336
Cataplasmatum ratio	23			Conceptus falsa spes	559
Catuli fomentum	392			Conceptus tempus	65
Catulorum esus	70			Conceptui inuadendo quae sint	303.308
Cava uena	89			Conceptum impediencia	306
Cauarum partium generatio	56			Conceptum quae gestare nequeunt	319
Cauarum partium glandulae	78			Conceptio a mensibus purgatis	45
				Conceptio quando potissimum fit	319

I N D E X

Conceptionis experimentum	68	Corpus requiem habet in febre quōti-	Decimoquarto anno morbi rescriptum
non Conciptentium affectiones	315	diana	197
Conceptura preparatio	69	Corpus sibi simile ex toto	88
Concipiant quae difficilime	359	Corporis molestiae unde	169
Conciones forenses	452.475	Corp. natura medicae artis principii	89
Concoctio bona quae	18	Corporis partium nota	582
Concretio callosarum duritium	86	Corporis principium nullum	88
Concumbendum quando	316.318	Corporis ramificatio	45
Concusio cerebri ex casu	582	Corp. sensu uictus modus colligitur	13
Concusiois modus in suppuratis	226	ex Corporis locis consid. ulceru	555
Concusiois scale modus	637	Corpora sicca morbis obnoxia	88
Conditura gallinacei pulli cocti	276	Corpora mulierum laxa ac rara	81
Congelatio optima & tenuissima di-		Corpora scytharum fluida cur	114
spedit	108	Corpora è tribus constituuntur	465
Congenta homini quae	32	Corpora turbat motus	522
ad Coniecturam, quid significet	489	iuxta Corporu habitus idiotaru	dieta
Consolationes aegri quales sint	29	Corrosiua pharmaca	384
Conspiratio omnium una	162	Corruptionis foetus causa	320
Constitutiones pro temporibus	442	Coste uerae septem	90
Constitutiones temporum anni	59	Costarum contusio	648
Consuetudo uirtus adaucta & immi-		Costarum fractura	ibidem
nuta	493	Costarum natura	82. 637
Consuetudinis uis	466.520	Cotyledones duae	393
Consuetudinem mutare in aliam	564	Coxae os	82
Contemperamentum facientia	508	Coxendice dolēte quae uena secūda	35
Contemptus medicinae unde	3	Coxendicum articuli	91
Contentiosi medici qui	28.29	Coxendicum morbi consideratio	561
Continentia requiritur in medico	21	Coxendicum morbi generatio	92
Contraria ab iisdem fieri & à contra-		Coxendicum tabes	567
rijs rursum tolli	100	Crapula grauat	105
Contraria in somno uidere	160	Crasitie fluxionu obseruat medicus	10
à Contrarijs medicina	118	Crateus radicefeca	677
Contusio	658	Cretica cedrus	297
Cōtusiois costaru neglecte mala	642	Crudarum aquarum qualitas	107
Conuallium corpora breuiora	116	Cubiti gibbus luxatus	629
Conuenientia iubeant medici	7	Cucumeris syluestris medulla	69
Conuulsiois curatio	99	Cucurbitae fomentum quo parandū	103
Conuulsiois praenotiones	546	Cucurbitarum figura adtrahunt humo-	
Conuulsiois signa	565	rem	19
Coryza	375	Cucurbitarum ratio	22
Coquinaria ars cur excoGITata	11	Culicum punctura	482
Cor coloris mutati causa	88	Cuminum cum ouo sumptum	468
Cor figura pyramidis	75	Cuminum regium	169
Cor musculi est	76	Cura morbus difficilis	217
Cor nulli morbo obnoxium	232	Cura morborum uirilium & muliebr-	
Cor trahit sanguinem	231	um differt	331
Cordis aorte	77	Cura aggrediēti quid considerandū	34
Cordis aures unde	179	Curatiois modus	517
Cordis auricula	76	Cutis utilitas	85
Cordis calor spiritus & motus	57	Cutis morbi	253
Cordis constitutio	56.77	Cuspis à sexto anno exempta	450
Cordis fovea	76	Cynanche	196
Cordis humor	75	Cytisi folia	305
Cordis pellicula	77		
Cordis situs	88		
Cordis structura	75		
Cordis uentriculi duo	76		
Corde non sapius	179		
Corium Carthaginense	632		
Corpus frigidissimū quādo & cur	36		

D

Amma adferentia arti dant te-		Dieta idiotarū iuxta tempora	37
stimonium	6	Dieta non cito permutanda	34
Debilis foetus notae	321	Dieta pro mensibus	362
Debilitat fames	13	Dietam non esse causam morborū com-	
Decimus quartus annus omnibus mor-		munium	34
bis aptus	583	Dieteticæ medicinae cur nō putetur ars	

Digitorum articuli	91	Epigloſidis hederæ folio ſimilis officium	Febriſ ardentis generatio	508	
Digitorum articulorũ repositio	657	Epigloſidis officium	75 (243)	Febre ardente laborantium mors	193
Digitorum & manus offa	81	Equitationis incommoda	114. 115	Febriſ ſingultians	214
Dilatatio omni arti aliena res	678	Errores pariunt ſimilitudines	466	Febriſ tertiana	205
Diſcipulis imperitis nihil committendum	26	Erratĩa aſtra uidere in inſomnijs quid		Febre febricitantes ardenti nõ cito calo	
Diſſidentia ſoluenda	34	Erucae Tithymalidum	69 (158)	re liberantur	17
Diſſentiones ante & retro fietes	576	Erucentes cibum quomodo curadi	39	Febriſ quotidiana unde	36. 399
Diſtortio pedum & manuum inſanum facit	99	Eruptionis tardioris ac citioris nota	538	Febres æſtiue	247
Diſtortionum faciei conſideratio	561	Eryſipelas pulmonis	187. 211. 262	Febres æſtiuæ	248
Diuina quæ appellentur	180	Eteſia uenti	399	Febres bilioſe	204
Docendi alios ratio	29	Euanthemum	348	Febres hyemales	247
Doctrina dux medicinæ	3	Eunuchi cur non fiant calui	48	Febres tertianæ	399
Doctrina ineſt medicinæ	24	Eunuchi cur ſint depiles	ibidem	Febrium affectionis modus	519
Doctrina medicinæ non eſt ſtata neque certa	100	Eunuchi quare non coeant	40	Febrium dies indicatorij	516
Doctrinæ exercitatio iungenda	625	Eunuchi plurimi ſcytharum	115	Febrium generatio & curatio	97
ex Doctrina ſapientia	24	Eunuchi plurimum diuinitus ſcythis nõ accidere	115	Febrium modus ſemitertianus	398
Dolere unum nequit	30	Europa ab Aſia quantum differat	111	Febrium prænotiones	541
Dolori ex partu quò medendum	328	Europa ac Aſiæ terminus	111	Febriũ ſymptomatum conſideratio	566
Dolori ſedando commoda	272	Europa populorum diuerſitas	111	Febrientium potiones xxij	227
Dolores imparib. diebus maximi	235	Excandescentiæ utilitas	419	Fel bilem recipit	232
Dolores itinere contracti	507	Excitationes & ſomno turbulentiæ	546	Fel Bubulum caſcit uterum	103
Dolores noctu uexant	480	Exercitiorum ratio iuxta tempora	38	Fellis ſedes	87
Dolorum cum febre notæ	539	Exercitatio doctrinæ adiungenda	625	Femur biſidum	91
Dolorum curatio	509	Exeuſum oſium ratio	518	Femur & coxa elapſum modis quatuor	
Dolorum ratio	419	Experimentum menſum	347	Femoris ad coxam articulus in intro elapſus	642
Dolorum ſine febris conſid.	560	Experimentum temperamenti mulieris	307. 316. 319	Femoris ad coxam intro luxati repositio	643
Domus medici ut ſita eſſe debeat	21	Experimenta fecunditatis	306	ſitio	653
Dorſum ruptum	214	Expiaementorum ratio	174	Femoris caput extra elapſum	645
ad Dorſum pulmo uergit	8	Extenſio pernicioſa ad torturam	640	Femoris in anteriorem partem elapſi repositio	655
Dorſalis morbus	212	Extenſionum modi parabiles	656	Femoris in poſteriorem partem elapſi repositio	655
Duo in mundo	676	Extenuantia forinſecus intus tumefaciunt	102	Femoris offa	81
Duo magni momenti in medicina	21	Externi morbi manifeſti	8	Fera parue in ſcythia	114
Dubij morbi qui ſint	181	Exterſorijs qualibus utendum	21	Feritas innaſcitur Europæis	116
Dulce ineſt homini	15	Extremarum partium frigidit. notæ	535	Ferrum quomodo fiat	242
Dulce non dulce	162			Ferramenta uſtoria	626
Dulcia omnia facit coctura	108	F		Fidem quando amittit medicus	29
Duriterium calloſarum concretio	86	Facies ægroti in morbis acutis		Figura corporum uarie	19
Dysſenteria ante partum ſalubris	485			Figura humorem trahentes	19
Dysſenteria ex denigrationibus	652	Facies flores habens	579	Figura iuſta in omni arte ſeruanda	626
Dysſenteria maxime æſtate & uere inſiſtat	33	Facies diſtorte conſideratio	561	Figura poſitionis corporis iuſta	652
Dysſenterie conſideratio	558	Facies ornande quæ proſint	376	Figura uaria ad affectiones ſuſcipiendas	20
Dysſenterie inſuſo	385	Facies ſymptomatum ſignificationes	570	ex Figuris affectiones oriuntur	19
Dysſenteriam ſcortatio ſanat	488	Facilitas artis	184	Finis artis ratio	184
Dysſenterici affectio & curatio	468	Facilitas in medico contemnuntur	20	Fines duo medico propoſiti	678
E		Facultas in homine quid	19	Fiſtule plumbeæ ſubditio ad uteros	36
Ebríoſorum notæ	441	ex Facultatibus affectiones oriuntur	19	Fiſtularum notæ	583
Edacitas aliquando ſanat	6	Fames occidit aliquando, aliquando ſanat	13	Fiſtuloſa ulcera in profundum uerunt	22
Edulia ac coquinaria cur excogitata	11	Fames ſeptem dierum lethalis	60	Flatus notæ	536
Edulia ad uoluptatē parata ledunt	15	Famis uis	13	Flatuum indicia	582
Edulia fortiora ledunt maxime	12	Familiaria in ſomno uidere	160	Flatuoſa alium ſiſtunt	102
Edere per ſomnum quid ſignificet	160	Faſtidium ſalubris eſus in ægro	7	Fluxus ex partu	303. 326
Effluxus abortus ſpecies	63	Fauces exulceratæ qd præſignēt	540	Fluxus in mulieribus albus	350
Egeſtionum alui notæ	536	Faucium ſanguine repletarum coſid.	556	Fluxus ſanguinis ab articulis	35
Eglatium	69	Fauo ſimile eſt ſemen	82	Fluxus ſanguinis e naribus	568
Elementorum ſecretio	55	Febris ardens	247		
Engaſtrimythi	452. 475	Febriſ ardentis conſtitutio	426		

Fluxus saniosus	356	Fomēta uterorū sicca ac humida	299	Genitura quæ non bona	387
Fluxus uterorum	351	Fontes hyeme calidiores q̄ æstate	50	Genitura sex dierum	44
Fluxus sanguineus nō ante pubertatem		Fontes uitæ humanæ	76	Genitura statim elabens	317
Fluxus spinæ mala	95	Fontes quatuor ciborum incurritatem		Genitura spiritum habet	43
Fluxui rubro quæ prosint	376	indicantes	232	Genitura pericula	44
Fluxum sanguinis ē naribus soluit ue-		Formarum similitudinis ratio	42	Genitura secretio	39
ne sectio	548	Fortuna nullius imperio subest	102	Genitura uia in pudendo	40
Fluxum album purgātes glandulæ	71	Fortune cum scientia collatio	102	Genituram non continentium cura	396
Fluxio bilis periculosa	95	Fortune uis	6. 678	Genituram quæ corrumpant	395
Fluxiōis oculorū causa & curatio	17	Fortuna nihil moratur medicina	102	Genu biceps	91
Fluxionem singulorum locorum obser-		Fortuna non nihil in medicina posse	6	circa Genua luxationum ratio	644
uet medicus	10	Fortunate aliquid assequi quid	102	Germi natura species	5
Fluxiones capitis septem	80. 92	Fortuitus successus	183	Gestatio non ultra decimū mensem	53
Fluxionum in fauces ratio	0. 17	Fortia innoxia	641	Gibbus unde generetur	636
Fluxionum mala	80	Fortissima inter dulcia quæ	15	Gibbosi brevis uitæ	ibidem
Fluxionum ratio	91	Fori pleni tempus	474	Gibbositas ex casu	ibidem
Fluxionibus ex capite uomitus cōducit		Forenses conaciones	475. 452	Gibbositas in adultis	ibidem
Fluidum inest homini	15	Fracturæ capitis quomō curentur	98	Gibbositas supra septum	ibidem
Fœcunditatis signa	342	Frigus Scythicum	113	Gibbositatis occasio tubercula pulmo-	ibidem
Fœcunditatis experimentum	68. 306	Frigori stratum expositum habere, ul-		nis	ibidem
Fœmina calidior utro	310	cerat	415	Gibbositatum ut fiant modi	638
Fœminarum apud Sauromatas mores		Frigida uere remittunt	33	Gingiuvis tumidis quæ medeantur	481
113		Frigidi metropolis cerebrum	56	Glacialis aqua	108
Fœmella cur posterius articuletur	47	Frigide noxæ	526	Gladoli in sectione quō parandi	21
Fœmella in utero quare tardius formen-		Frigidum & calidum quæ permulent		Glandes quæ pueris in annum subdu-	
tur	63	& quæ non	18	tur	374
Fœminini conceptus ratio	41	Frigidi temperamentum à calido	16	Glādes subdititæ ad mēses quō forman-	
Fœtus immortuus expellendus quō	349	Frigidum facultatum in corpore im-		de 347	Vide etiam Pessi
Fœtus excindendus quomodo	72	tentissimum	16	Glandula est cerebrum	79
Fœtus retinendi modus	73	Frigidū hominē quādo cito affligat	16	Glandule albū fluxum purgantes	71
Fœtus in partu manum aut crus præ-		Frigidum quid ipsum in seipso non in-		Glandule cavarum partium	78
mittens	336	uenitur	16	Glandule iuxta aures	ibidem
Fœtus qua causa corrumpatur	320	Frigido calidum nutritur	43	Glandule pectoris mammae	81
Fœtus debilis notæ	321	Frigida alium subducunt	102	Glandule spongiæ dictæ	435
Fœtus immortui exsectione	336	Frigiditas pedum quid significet	502	Glandule sub alis	78
Fœtus in utero perfectio	163	Frigiditas extremarum partium	530	Glandule subdititæ ad uteros	103
Fœtus in utero putrefactio	67	Frigiditatis extremarum partium no-		Glandularū descriptio	78
Fœtus dum uertitur periculum	64	te	535	Glutinosi metropolis cerebrum	56
Fœtus mortui extractio	66	Frigefactorie potiones xxij. in febr-		Gracilis ut fias quid faciendum	37
Fœtus motus ac perfectio	417. 465	bus ardentibus	227	Gracilibus casus prodest	18
Fœtus prolapsus retrudendus quō	73	Fructus Asia	111	Gracilescit pulmo ex siccitate	97
Fœtus situs notæ	68	Fructificandi ratio in arboribus	52	Græcorum in Asia fortitudo	113
Fœtum bimestrem quæ corripiat	395	Frugi homines quō cognoscendi	24	Gratis curandum quando	28
Fœtum conceptus	336	Fusus fluxus	353	Gratificandum egrotis	460
Follis usus	222	Fullonum affectiones	482	Grauedinis causa & curatio	17
Follibus ferrarijs simile aliquid habet		Fungorum usus noxijs	486	Grauedini quō medendum	385
cor	77	Futura timet eger	7	Grauedinum notæ	537
Fomentū ad uteros per fœniculū	361	G		Grosi hybern	297
Fomentū ex suffimentis ad uteros	362	Albanum calfacit uterum	103	Grumi sanguinis in utero	301
Fomentum per cucurbitam	103	Galeancones mustella cubito		Gubernatori similis medicus	13
Fomentum per suffimentum	316	prediti	627	Gule structura	75
Fomenta ad fluxus uteri	377	Gallinacci pulli costis conditura	276	Gurgulionis affectio	196
Fomenta ad fluxus uteri	360	Ganglia quæ	635	Gymnasticæ medicinae contraria	99
Fomenta ad uteri conceptionem	69	Gelo Sicilie rex	692	H	
Fomenta ad uteros	299	Gemelli diuersi sexus quō generentur		Habitatus bonus natura quedam	
Fomenta humida ante pharmaca	272	Gemelli ex uno coitu	54	est	29
Fomenta per arundinem	307	Gemellorum partus	67	Habitatus bonorum	24
Fomenta qualia esse debeant	366	Genitura mulierum	40	Habitatus exercitantium	517
Fomenta uteri	380. 381	Generationis omnium ratio	31	Habitatus opinionis	677
Fomenta uterorum	307	Generationem ab uno non fieri ibidem		Habit ut submissus inest medicinae	24
				iuxta Habit	

I N D E X

iuxta Habitum corporis idiotarum dieta	Humanorum studiorum uanitas	681	Ignis sacer uariis	426
Habitudo medici 20 (37)	Humane etatis septenarij	58	Ignis feri collectio	473
Hæmorrhoids non ante pubertatem 583	Humane uitæ fontes	76	Ignominia poena medicinæ	3
Hæmorrhoidum affectio 447	Humerus summus auulsus	627	Ignorantia malum	544
Hæmorrhoidum bonum 171. 459	Humeri frequenter excidentis curatio	625	Ignorantia in precio	638
Hæmorrhoidum prænotio 547	Humeri repositi curatio	625	Imbres uere superueniunt	33
Hepar adhæret septo transuerso 418	Humoribus dolentium consideratio	561	ab Imbribus sanguis augetur ibidem	
Hepar dolores patitur uehementissimos 20	Humerales uenæ	85.89	Impar numerus maxime uerecundus	503
Hepar pueris cor dicitur 230	Humor diutius in corpore permanens	234	Imparis numeri uis	420
Hepatis extremitates quinq; 82	nocuus	234	Imparibus diebus morbi cur iudicentur	235
Hepatis structura 75	Humoris plus prodit q̄ accessit ibidem		Imperitia thesaurus malus	4
Hepati septum transversum adnatū 85	Humorē q̄ figuræ maxime trahūt	19	Imperitos medicus uitare debet	25
ab Hepate morbus regius & hydrops	Humores purgatur quatuor locis	233	Imperio nullius subest fortuna	102
Hepaticus morbus 272 (412)	Humorum fontes quatuor	228	Impetigines quid extrahat	376
Hepaticus morbus secundus 273	Humorum in homine distinctæ species		Impij deum nesciunt	173
Hepaticus morbus tertius 274	& nomina	31	Incogniti morbi curatio	99
Hepatici 580	Humorum mutatio	20	Indicum medicamentum	375
Hepatitis uenæ 84.192	Humorum species quatuor	40	Indicum oculorum pharmacum piper	
Hepatitis uenæ distributio 418	Humidum ipsum quid in seipso non inuenitur	16	Indicum Persis piper	381
Herba in farina 468	Humidum est calidum	57	Indoctus fortunate assequi potest nihil	
Herbæ montanæ 678	Humidi alimenti uis	163		102
Herbarum loci commodi ibidem	ab Humido prouenit genitura	39	Industria labore paratur	29
Herculeus morbus 314	Humidæ aluum subducunt	102	Industria medicinæ dux	3
Herodici medicus 459	Humiditatem Scythæ sibi exustionibus corporum detrahunt	114	Inedia aliquando sanat	6
Hilaritas nimia medicū onerosum reddit 21	Humectarum partium glandule	78	Inedia quibus perniciosa	14
Hippaces quid 113.238	Hydrops circa uentriculum solū	244	Inediæ imperatæ transgressæ signa	551
Hippocrates ignorantiam suam confitetur 418	Hydrops in utero	330	Infantes masculos Amazonides eluxat	
Hippocratis prædictiones quales 549	Hydrops testium	106	Infantium uictus	38
Hippocratis sententia de uarijs prædictionibus 549	Hydropis consideratio	552	Inflati uteri	301.304
Hippocratis somnium 677	Hydropis generatio	92.107	Infusa ad uteros	297
Hippocrati peplum quid 510	Hydropis liberatio	513	Infusorum ratio	38
Hippocraticæ doctrinæ certitudo 31	Hydropis species tres	244	Inguinum glandule	78
Holocoonitis radix 342	Hydropum naturæ duæ	508	Inoculationis ratio	52
Homo absq; congenitis uiuere nequit 33	Hydropicorum purgationes	510	Infantia magnum morbum soluit	513
Homo ad annum comparatur ibidem	Hyems perpetua scytharum	114	Infantiæ causa	178
Homo cur unum esse putatus 32	Hyems sicca ac borealis uer quale fit	109	Infantire facit Mandragoræ radix	99
Homo non est unum 30	gnet	109	Insomnia de diurnis actionibus	157
Homo quando optime dispositus 18	Hyems pluuiosa & australis uer quale inducat	110	Insomnia sanitatem significantia	159
Hominis anima 461	Hyeme lotus frigida magis calefcit indutus	16	Insomniorum ac somniorum differentia significationes	157 & inde
Hominis miseria 683	Hyeme pars terræ infirma cur calida		Institutio egregia dux medicinæ	3
Hominem qui non nouit medicinam nescit 18	Hyeme pituita augetur	32	Instrumentum coactorium	654
Hominem unum idq; infinitum esse dixit Melissus 30	Hyemales morbos soluit æstas	434	Instrumenti coactorij fabrica	629
de Hominis natura opiniones falsæ ibid.	Hypoglossis	203	Instrumento deficiente multæ artes quiescunt	9
Homines ab initio brutorum uictu uisunt 11			Instrumenta sua habet natura	7
Homines seipso negligunt 634	I		Instrumenta suffitus	316
Hom. cur non purgati ægrotent 236	Isteri curatio	97	Instrumentorum penuria medico detrimetosa	25
Hominū generatio par uolucrum 54	Idiotarum dieta iuxta tempora	37	Instrumentorum sectionis ratio	21
Hominū natura secundū regionē 111	Idonea in omni arte sequenda	653	Intemperantia mortis causa	7
Homin. plantarumq; eadē natura 52	Iecoris generatio	57	Intempesiuitas	182
Horæ tegendi & retegendi animaduertende 21	Ignauie quantā malitia	23	Interni morbi obscuri	8
Horror quid sit 191	Ignis extrema medicina	7.8	Interpretationis somniorum certitudo	
Humanum corpus quot ossa habeat 82	Ignis in medicina quid	157		
	Ignis sacer	529	Intestinum colicum	75
	Ignis sacer in utero	373	Intestina hominis uelut canis	82.460
			Intestinorum	

I N D E X

Intestinorum glandulae	79	Leuia quandoq; noxia	641	Mandragorae radix tristes sanat	99
Intestinorum leuitas	528. 581	Leuitas intestinorum	581	Manus articuli	91
Intestinorum leuitatis consideratio	558	Leuitatis intestinorum consideratio	558	Manus & digitorum ossa	81
Intestinorum humiditas	79	Lex omnia corroborat	39	Manuū ac pedum torturae curatio	99
Inuentio ars	5	Lex species rerum non sanxit	5	Manuum latio	534
Inuidia à ratione aliena	28	Liber Medicamentarius	248	Manifesti morbi qui	8
Inuidationē terrae uidere in somnis	159	Libri Democriti	684	Mare turbatum uidere	159
Inutile nihil neq; in arte medica neque in medicis	6	Lien durefcit & augetur humore	19	Marinus muscus	328
Irae affectiones	461	Lien figura spongiformis	19	Maritimus locus an salubris	30
Itinere contracti dolores quomodo curen- tur	507	Lienis structura	75	Masculini conceptus ratio	41
Iudicium inest medicinæ	24	Lienosa prægnans	321	Mater decorum	173
Iudicium de scriptis rectum magna ar- tis pars	514	Lienteria	251	Materijs multis & uarijs uarie artes constant	9
Iudicatio morbi quid	30	Ligamenta articularum quæ	8	Maxillam supernā non moueri	631
Iudicatio sine signo mala est	416	Lingua peripneumonicorum qualis	470. 473	Maxille luxatio	631
à Iudicatione relictæ	416	Linguae affectiones	571	Maxille repositio	631
Iudicationes unde fiat	517	Linguae indicia in peripneumonia	578	Maxille uenas habent	58
Iudicata non mouenda	518	Linguae notæ in pleuritide	577	Maza uino dulci nō subacta qualis sit	273
Iudicatoriorum dierum ratio	519	Linguae obscuritas unde	29	Maze inuentio	11
Inguialis sanguis quomodo & qualis profuit	32	Linguae signa	516	Mecon albus est peplus	299. 354
Iustum esse decet medicum	21	Lippitudinis generatio	80	& 510	
Iuuenilis ætas quartanis obnoxia	36	Locus studijs aptus dux medicinæ	3	Medicina à contrarijs	118
L		Loca in libris Hippocratis declarati	685. 686	Medicina arti exercitadi corpora con- traria	99
Labiorum signa	534	Locorum mutatio	461	Medicina artium præclarissima	3
Labor prodest carnositati	645	Locis corporis consideranda	555	Medicina cum sapientia copulada	24
Labor quid efficiat	237	Lumborum affectiones	574	Medicina cur male audiat	6
Labor sanat nonnunquam	6	Lumbrici lati generatio	241	Medicina deo adscripta cur	15
Laboris fortis studium subterfugien- dum	30	Lumbrici per os exeuntes	236. 335	Medicina deos reuerenter habet	25
Lac pueris calculum generat	109	Lux ægotantibus infesta	21	Medic. dieteticæ cur nō putetur ars	12
Lac quibus conuenit, quibus non	527	Luxationes quibus faciles uel difficiles	624	Medicina est secundum naturam	118
Lactis ac mammarum ratio	81	Luxationum circa coxas ratio	644	Medicina fortunā nihil moratur	102
Lactis generatio	48. 337	M		Medicina morbo celeritate præuadet	9
Lactis usus	332	Macrocephali	112	Medicina necessario inuenta	11
Lacti extincto quomodo medendum	305. 327.	Macrocephalorū forma ibid.	376	Medicina nec simplex nec facilis	13
Lacte curat Pythocles	482	Macule solares quomodo tollantur	376	Medicina nō utentes nihil deuitant	12
Lachrymari in febre quale signū	524	Meotis pulus	113	Medicina propter quid	7
Lacustres urbes afficiuntur mutatio- nibus	105	Magnanimi Europæi cur	116	Medicina quomodo inuenta & cur	12
Lactis affectiones	461	Maliciorij decoctum	468	Medicina rationes habet auxiliares	10
Lanarum humectarum usus	166	Mali & boni obseruatio artem consti- tuunt	10	Medicina uaticinationi cognata	677
Lapis i uescica post xl. annū nō fit	583	Mala ad aliquid dici	162	Medicina antiquitas	11
Lapis in utero	448	Mala ex mensuris retentis	45	Medicina contemptus unde	3. 684
Lasanum quid	67	Mala ex mensuris summa	538	Medicina definitio	5. 118
Lasitudo lauacionem requirit	97	Malleoli articuli quomodo reponantur	657	Medicina doctrina neque stata neque certa	100
Lateris dolor	545	circa Malleolū luxationis ratio	644	Medicina eduliorum inuentū refrenan- dum cui	12
ad Lateris dolorem calefactoria	492	Malleolorum articuli	91	Medicina ad uaticinationē similitudo	490
Leguminum uires	507	Mammæ figuræ spongiformes	19	Medicinae insunt omnia quæ ad sapien- tiam requiruntur	24
Lentis uires in esu	ibidem	Mammæ glandule pectoris	81	Medicinae exacta certitudo diffi-	14
Lenticule uasa testacea	299	Mammarum ac lactis ratio	ibidem	Medicinae poena unica ignominia	3
Lethargus morbus	214. 219	Mammariarum ac testium cōmunio	419	Medicinae certitudo	11
Lethargi cum peripneumonia coniun- ctio	219	Mammis asperis quomodo medendū	375	Medicinae principium	25
Lethargicorum symptomata	567	Mammis maximam partem prudentie in esse	421	Medicinae studiū cur sit difficile	100
Leuce non ante pubertatem	583	Mancorum partus ratio	62	Medicinae uarietas	6
Leucoplegmatias	581			Medicinas non constituent qualitates primæ	14.

I N D E X

absq; Medicina nemine posse sanari	6	Medicamenta ad ciendū purgationē	71	Mensura mensura iusta	313
Medicus ab obscuris morbis uinci haud debet	9	Medicamenta caput purgantia	93	Mensibus ciendis quæ apta	303, 304
Medicus anni temporum rationē in primis habere debet	104	Medicamenta emollientia	71	ex Mensibus suppressis tabes	553
Medicus deo equalis	24	Medic. fortia quando non danda	101	Mensura iuniorum et seniorum differunt	103
Medicus est natura	461	Medicamenta noxia	503	Menstruorum tempus	65
Medicus est Philosophus	24	Medicamenta purgantia dieb. imparibus non exhibenda	236	Menstruorum uirginum ratio	40
Medicus gubernatori similis	13	Medicamenta purgantia quando non danda	500	Mens hominis ubi sedem habeat	77
Medicus in principio morbi accersendus	9	Medicamenta subditiua ad purgandū uterum	71	Mentis motus	27
Medicus multarū rerū peritus sit	625	Medicamenta transmouent	101	Mentis oculus superat quæ oculus corporales effugiunt	9
Medicus qui laudandus	73	Medicamentorum componendorum ratio	416	Mentis sedes in sinistro cordis uentriculo	77
Medicus quō fiat inculpabilis	247	Medicamen. exhibendorū ratio	101	Mentem quiescere non patiuntur temporum mutationes	112
Medici animus modestus sit	20	Medicamentorū purgantū ratio	32	Mente corporeq; sanus esse debet medicus	7
Medici iustitia	21	Medicamentorū purgantū usus	522	Mercimonij alienitas in medicina	24
Medici ratiocinatio alteri nunquā inuidere potest	28	Medicament. purgatoriorū uis	242	Meridionalium ciuitatum situs	105
Medici uestitus	20	Medic. subditiuorum deligatio	302	Mesocolon quid	82
Medico cum imperitis non multum fabulandum	25	Medicamentarius liber	248	Metalloꝝ petrarū aque quales	107
Medico fines duo propositi.	678	Medicandum quatenus	462	Methodus artificialis	23
Medico non imputandū si morbus tardius agnoscat	9	Medela multifariam	31	Methodo uia medica inueniri potest	13
Medico obseruanda quæ	167	Medellarum forma ex terra multæ	6	Metropolis frigidi ac glutinosi cerebrum	56
Medico quæ circa egrum primum faciendā	503	Mederi gessit natura	9	Miliææ cutis aspretudines	415
Medico quæ cognoscendā	19, 685	Medulla spinalis	56	Milij natura et usus	492
Medico quid faciendum natura demonstrat	10	Medulle spinalis fluxus non antebertatem	583	Modestia decet medicum	20
Medico sublimia in aëre nosse quā necessarium	55	Mel simplicium duplo uino fortius	498	Mola quæ et patella	91
citra Medicum aliquem sanari posse	6	Melampus	678	Mole conceptus	336, 394
Medicum quæ scire oporteat	34	Melanthium ex tritico	337	Molestia animi et corporis unde	169
in Medico comitas insit	25	Meliceris quid	562	Montana herba aquosioribus præstat	678
Medici boni quales sint	7	Melissi de homine sententia	30	Montani maiora corpora gignūt	116
Medici cur tardius et contatius morbos aggrediuntur	10	Membra mulieribus in partu rumpuntur	54	Monstrosus puer	445
Medici differunt	10	Membræ omnia habet abortus uel septem dierum	60	Morbus fetibus in utero accides	175
Medici fama multi, re pauci	3	Membrana ante uteri osculum enata	304	Morbus Herculeus	314
Medici ignari	684	Membrana cerebri duæ	89	Morbus hereditarius sacer morbus	174
Medici personati	3	Membrarum generatio	56	Morbus regius	221, 518, 582
Medici potentes qui	8	Menses biliosi	314	Morbus sacer puerorum	105
Medici ueri qui	4	Menses ciendi quomodo	103	Morbi antiqui recentioribus difficilius curantur	99
Medici uulgo inferuientes	637	ad Menses detrahendos potiones	337	Morbi causa quō cognoscenda	118
Medicorum ignorantia	19, 643	Menses retenti dolorem inducunt	45	Morbi sacri consideratio	554
Medicorum opinionones falsæ de homine	30	Menses i pregnantibus non prodeunt	44	Morbi sacri multi	172
Medicorum ratiocinatio	9	Menses paucos habentes sine lacte esse	312	Morbi sacri species uarie iuxta uarios deos	173
Medica officina quō instruenda	20, 25	Menses pauciores	312	Morbi sacri superstitionis curatio	172
Medicæ artis principium quod	89	Menses pituitosi	315	Morbo celeritate medicina præualeat	7
Medicæ professionis propria	25	Menses plures	313	Morbum sacrum non diuini esse	173
Medicamentum ad menses uirginum ciendos	72	Menses pregnantis	396	Morbi contriti	461
Medicamentum ex sale	321	Menses pregnantibus prodeunt	320	Morbo magno liberat quartana	462
Medicamentum indicum	375	Menses quando non prodeant mulieribus	102	Morbum morbo succedere, letale	250
Medicamentum nullum adhibere, medicamentum auris	635	Menses relictī genituram corrumpunt	386	Morbum tardius agnoscere non medicum	9
Medicamentum subditiuum	72	Menses sistendi quomodo	103	Morbi a cerebro	39
		Menses suppressi	310	Morbi acuti incerti	519
		Menses suppressi cōceptui cōtrarij	387	Morbi acuti in quibus rari	105
		Menses terræ instar aceti radetes	315	Morbi affecti cerebri	80
		Mensū appropinquantū nota	68		
		Mensurum experimentum	347		

I N D E X

Morbi aquarum peculiares	108	Morum medico ratio habenda	29	N	
Morbi congeniti	552	Mortis causa intemperantia	7	N	Ascentia ex terra terram reser-
Morbi cur imparibus dieb. inducentur		Mortis modus	238		piunt
Morbi deservati ac negle-	(235)	Mortis, vite, sanitatis, ac morborum tem-			117
Gii medicis non imputandi	7	pora eadem	63	Nasus destillans malum	544
Morbi dubij qui sint	181	Mortui foetus notæ	321	Nasi affectio ex dentibus	455
Morbi duplices	8	Mortuus uidere in somnis	160	Nasi fractura	633
Morbi educendi quomodo	101	Morientes medicis non imputandi	7	Nasi polyposus	246
Morbi incogniti curatio	99	Motus foetuum	336.417	Narium fluxus curatio	92
Morbi in homine unde	11.30.34	Motus pueri in utero quando	48	Natura an morbo quædã adsint	464
Morbi manifesti quia	8	Mucus articularum	91	Natura corporis artis medicæ principia	
Morbi mulierum diversi à virilib.	464	Mucosi menses mulieribus senib.	103	pium	89
Morbi muliebres ab utero	102	Mucositatis detrimentum	642	Natura dux medicinæ	3
Morbi muliebres cogniti cur difficil-		Mulier barbata	467	Natura hominis ex quibus constet	31
les	331	Mulier coitu quàm uir minus delecta-		Natura imbecillis cito offenditur	14
Morbi non fientes ante pubertatē	583	tur	41	Natura medicus est	461
Morbi neruorum graues	90	Mulier semper eget moderatore	676	Natura nostra agro comparatur	3
Morbi obscuri qui	8	Mulier tenerior uiro	310	Natura plantarum eadē quæ hominum	52
Morbi omnes unde	170.181.245	Mulieres cur leues	48	Natura quæ sunt potentiora, ipsum le-	
Morbi periculosi uel idiotis manifesti		Mulieres medici	334	dunt	15
Morbi pituitosi hyeme fiunt	33	Mulieres non sunt calculosæ	109	Natura septenario subiecta	61
Morbi preoccupantes medicinam, melius celeriores	9	Mulieres quæ superfoetent	66	Natura sine doctore	162
Morbi prægnantium	320	Mulierum corpora mollia	81	Natura stimulata quæ medico faciendâ	
Morbi pubertate soluantur	522	Mulierum diæta	38	demonstrat	10
Morbi viij & xliij anno reuertuntur	197	Mulierum fluxus albus, fuluus & ruber	350	Natura lege nomina indita sunt	5
Morbi septenario dierum iudicantur	61	Mulierum genitura	40	Nature motus	27
Morbi uarij uterorum loco motorum	364	Mulierum morbi diversi à virilib.	464	Nature mulierum consideratio	351
Morborum causæ duæ	34	Mulierum rigores	417	Nature multitudo contraria	520
Morborum curationes medicus memoria tenere debet	25	Mulieribus in partu membra rumpuntur	54	Nature præstantia	24
Morborum differentia	162	Mulieribus menses quomodo obtinentur	102	Nature prudentia	9
Morborum differentia multiplices	189	Muliebres morbi ab utero	102	Nature scientia omni medico necessaria	18
Morborum generatio in pulmone	86	Muliebres morbi cur cogniti difficiles		Naturam cogit medicina	10
Morborum modus unus & causa eadem	118	331		de Natura hominis opiniones falsæ	30
Morborum principia consideranda	410	Muliebrum & uirilium morborum cura differt	331	Naturarum differentia	653
Morborum sanitatis uitæ ac mortis eadem ratio	63	Multitudo naturæ contraria	520	Navis bonæ descriptio	676
Mortuorum signa	162	Munditia inest medicinæ	24	Nebula quid	51
Morborum uitres & causæ consideranda	318	in Mundo res duæ præcipuæ	676	Necessitas actionum humanarum	681
Morborum uirilium ac muliebrum cura differt	331	Mundi infiniti	681	Negantes artem, medicinam tamen artem confitentur	6
Morbus à principio curare oportet	98	Musculus est cor	76	Neglecta mala perimunt progressu	26
Morbos ab agro tollere medicinam	5	Musculi corporis quid	8	Nephritis non ante pubertatem	583
Morbos enumerare non est facile	489	Musculus marinus	328	Nerui ex uena fit	86
in Morbis acutis uictus spectandus	494	Mutatio subita cauenda	35.494	Nerui in carne multi	8
Morbis incorrigibilibus medici manus non porrigunt	10	Mutatio in pueris et uiris piculosa	65	Neruorum consideratio	96
à Morbis qui superentur	90	Mutatio locorum	461	Neruorum distributio	418
Morbis quib. uena sectio cõpetat	500	Mutationis aduersariorum occasio	493	Neruorum generatio	56
Morbi anni prænotio	109	Mutationes cauendæ	459	Neruorum morbi graues	90
Mores Asiæ	111	Mutationes temporum	520	Neruorum ratio	83.85
Mores bonorum	24	Mutationes temporum mentem quicquid in Nite ambulantes cooperti à æstiu		Neruorum utilitas	85
Mores honesti medico edociliant autem	20	scere non patiuntur	112	Netopon quid	71
		Mutationes urine in febribus	512	Niger morbus	217
		Mutili cur gignantur	42	in Nite ambulantes cooperti à æstiu	16
		Mutilati integros gignunt	43	Nomadum scytharum mores & uita	113
		Myradanum, piper rotundum	381	Nomæ quæ letalissimæ	555
		Myrrha uirius	103	Noia artibus imponitur ex speciebus	5
		Myrti aquæ	508	Noia rebus indita lege naturæ ibidem	
		Mythoton alij intritum	103	Nomius Apollo	173
				ex Notis quod ars sit medicina, demonstratio	111

I N D E X

Nouimeſtris partus uitalis	60	Opinionis habitus	677	Partium corporis notæ	582
Nubecularum conſideratio	557	Opſithotonos	515	Partium extremarum frigiditatis notæ	
Numerus impar maxime uerendus	503	Opſithotoni affectio	476	535	
Numerus oſſū humani corporis	82	Optimum quod ſit	20	Partus nouimeſtris uitalis	60
Numerus uerticulatorum	90	Orientalium ciuitatū ſitus & acciden-		Partus octimeſtris lethalis	ibidem
Numeri imparis uis	420	tia	106	Partus pueri ex defectu alimenti	54
Nutritumētum eſt triplex	118	Origanum capitatum	261	Partus ſeptimeſtris uitalis	60
Nyſtalopum conſideratio	561	Origanum potus noxiuſ	451	Partus concuſſio	478
O		Os uteri diſtortum	317	Partus debilis ratio	42
Obluio malum	544	Os uteri concluſum	301	Partus mancorum ratio	62
Obluioſi unde ſiant	179	Os uteri genituram non ſuſcipiens	369	Partus purgamenta non purgatæ	323
Obſcari morbi qui	8	Os uteri ulceratum	303	& 324	
Ocaſio mutationis aduerſariorum	493	Oris uentriculi conſideratio	573	Partus purgamenta plura	325
Occidentalium ciuitatum ſitus & acci-		Oſculum uteri ad coxā inclinans	359	Partus ratio	53
dentia	106	Oſculum uteri ad coxā inclinans	359	Partus ſeptimeſtris ratio	61
Ocij deſectatio	23	Oſculum uteri complicatum	367	Partus auxiliaria	66
Ocio orti morbi labore ſanantur	34	Oſculum uteri inflammatum	362	ante Partum dyſenteria ſalubris	486
Octimeſtris partus mortalis	60	Oſculo uteri membrana præpoſita	319	à Partu quæ purgationes et cur ſequi	
Octimeſtris partus difficultas	62	Os appellatum dens	414	tur	46
Octimeſtres quare nō uitales	61.64	Os caulatum fractum	632	ex Partu quæ laborant maxime	54
Octimeſtrium afflictio	62	Os coxæ	82	Partus difficiles	322
Oculis à quibus ledatur	59	Os femoris	81	Parentibus uxorū caſtodia non com-	
Oculi conſtitutio	ibidem	Oſis raſura ad ſecūdum uſq; laminam		mittenda	676
Oculi quā ſint teneri	21	Oſſa auiſa integrè reſtitui non poſ-	201	Patella quæ & mola	
Oculorū cruento humore oppletorum		ſunt	627	Pati & agere propinqua	165
curatio	94	Oſſa digitorum & manus	81	Pauperes apud Scythas fecundiores di-	
Oculorum doloris curatio	529.531	Oſſa tibie duo	ibidem	uitibus cur	115
Oculorum fluxus unde fiat	43	Oſſa uerticulorum	82	Peccata in morbis non ſacilia cognitu	
Oculorum fluxionis cauſa & curatio		Oſium capitis ruptio	582	Pecora Aſie III	(550)
17. 93		Oſium coactuio	644	Pectoris dolor firmatus	574
ad Oculorum lachrymas ſtillamentum		Oſium generatio	56	Pectoris glandule mammae	81
166		Oſium humani corporis numerus	82	Pectoris natura	82
Oculorū lippitudinis cōſideratio	556	Oſium morbi obſcari	8	Pectoris rubores	579
Oculorum medela	510	Oſium utilitas	85	Pedis luxati reſpoſitio	658
Oculorum mentis acies	9	ex Oſi luteo uolucres	54	Pedum articuli	91
Oculorum ſigna	533	Ouorum quæ incubantur ſimilitudo ad		Pedum articuli quō reponendi	657
Oculorum tunica tres	89	puerum	52	Peſceni in ſtimento naſcantur	375
Oculorum ulcerationum conſid.	557	P		Pellicula geniturae	44
Ocularia medicamenta	384	Palati conſideratio	571	Pellicule cordis	77
Odores fluxionū obſeruat medicus	10	Palati inflammatio	203	Pellicularum generatio	58
Officina medica quō inſtrueda	20.25	Paluſtres urbes mutationibus afficiuntur	105	Pellicularū circa foetus diuerſarum ra-	
Officinae medicae ſitus	21	Palpebrarum ficus	427	tio	44
Oleum anthinum	323	Palpebrarum ſigna	533	Penicillus ſtanneus canis	208
Oleum Plateenſium	339	Palpitationes manuum	513	Peregrinis opitulandum medico	28
Oſſa ſtus ratio	59.89	Panis bis coctus	271	Perfrigeratio aquæ decoctæ	460
Omnia oportet eſſe mediocria	462	Panis boni notæ	256	Peripneumonia	222.516
Omnia quæ ſunt propter aliquid fi-		Panis differentia	15	Peripneumonia non ante pubertatem	
unt	7	Panis inuentio	11	583	
Opere medicum eſſe oportet non ſer-		Papula uaria	166	Peripneumonice conſideratio	577
uone	24	Paribus diebus deorſum prodeant quæ		Peripneumonice curatio	95
Operibus aliquando defectus imputan-		168		Peripneumonice generatio	94
dus	8	Parienti modus	54	Peripneumonice cum lethargo coniun-	
Opes infelices habent qui imperitiā		Pars terræ inferna, eſtate frigida	51	ctio	219
poſident	4	Partes corporis quædam ſunt quæ cele-		Peripneumonicus quidam	472
Opificum diſcrimen	10	riter ſanguinem emittunt	22	Peripneumonicorum lingua	470
Opificibus defectus nonnunquam im-		Partium affectiones iuxta ipſarum ſi-		& 473	
putandus	8	guras	19	Permutati uictus mala	14
Opinio uitio uertitur	24	Partium corporis mutua affectio	88	Peplus albus quid	354.150
				Peſſus bubule carnis	308

I N D E X

Pesſi nigri	306	Pleuritidis in tabem ac ſuppuratorem	Præoccupatio morbi unde	9
Pesſi ſaſſæ forma	309	transiitio	Præſentia & præterita conſiderat me-	
Pesſi ſubditiij	348	Pleuritidis ſpecies multæ	dicus	7
Phætuſa Pytheæ uxor ſecunda, barba		Pleuriticus quidam	Primipare citius pariunt	53
ta euſit	467	Pleuriticorum purgatio	Primip. ex partu laborat maxime	54
Phægedenæ unde oriuntur	105	Plumbi ad clauiculam fractam alligati	Principium corporis nullum	88
Pharmacum corroſiuum	384	tio	Principium medicinæ	25
Pharmacum familiariora trahit	32	Pluuia aqua in ærem tranſit	Principium morborum ſedandum	98
Pharmacum nigrum	384	Fluuia generatio	Principium uenarum nullum	85
Pharmacum nigrum ad caput	357	Pluuialium aquarum uſus	Principia morborum conſideranda	251
Pharmacum uis nimia perdit	446	Podagra non ante pubertatem	Principij artis ratio	184
Pharmaca purgatiua calſciunt capita		Podagricorum conſideratio	Principia morborum tria	237
Phar. quæ periculofa	253 (98)	Podagricorum reſtitutio	Principijs obſiſtendum	245
Pharmacis fortib. ubi abſtinentiâ	101	Potentia	Principalis uena arteria	86
Pharmacorum ſpecies ex terra multæ	6	Polypus uino ſuffocatus ad quid utilis	Profluuij alui curatio	39
Phaſis fluuius ſtagnantiſ.	112	303	Profluuiorum alui conſideratio	558
Philophus eſt medicus	24	Polypus naſi	Prolis cauſa quando concumbendum	
Philophorum de natura hominis opi-		Pomorum eſus noxiuſ	316 & 318	
niones falſæ	30	Porcinæ carnes prauæ	Promptitudo medici contemnuntur	20
Phrenes græcis unde	179	Porci eſus quid faciat	Prudentia naturæ quanta	9
Phrenitides	220	Potentia temporum anni medico ſcienti-	Prudentiam mammis inefſe	421
Phrenitidis generatio	193	da	Prurigo corporis	445
Phreniticorum prænotiones	642	ex Potentijs affectiones oriuntur	Prurigoſarum puſtularum medela	477
Phreneticorum mors	194	Poteſtas res mala	Ptiſana integra	214
Phyſici ſtudium	393	Potus nutrit	Ptiſana ſtatim à medicamento exhibenda	493
Pica prægnantium	68	Potus humores generat	Ptiſanæ dandæ ſcopus uires egri ſunt	
Picatum ceratum ad quid	366. 373	Potus ſanis & egriſ diuerſus	492	
Pili ex corpore quò extirpandi	385	Potus uberior ſanat aliquando	Pudendi notæ	536
Pili in glandulis	78	Potus appetentia	Pudenda ex ulcere obturata	326
Pilorum ratio & formatio	47	Potus temperamentum unde	ad Pudenda arcta medicamenta	367
Pinguis ut ſias quid agendum	38	Potu accruatum irruente tuſſis excitatur	Pudenda ulcerata quæ iuant	303
Piper indicu oculorum pharmaci	346	Potuum incontinẽtas ſpectanda	Puer alimentum unde habeat	49
Piper perſis quid	381	Potuum ratio	Puer monſtroſus	445
Piſcium pinguedo quæ peſſima	261	Potiones frigeſactoriæ xxij. in febris ardentibus	Puer procedit in caput	53
Pituita alba	216	Potiones paratas habere debet medicus	Pueri motus quando	48
Pituita augetur hyeme & cur	32. 33	Præcordij notæ	Pueri mortui in utero ſigna	67
Pituitæ coactiſ in nobis calor	10	Prædictiones ante morbi ſtatum non ſunt tutæ	Pueri in utero periculũ diu ueritũ	64
Pituita ex capite liqueſcens	194	Præeminẽtia diuina in medicina	Pueri ſitus in utero	52
Pituita frigidiſſima	32	Prægnans bilioſa	Pueri ſuſtus in utero	57
Pituita humoris ſpecies	40	Prædictiones uariæ	Pueri comitales	176
Pituita in utero	375	in Prædictionibus prudentia adhibenda	Pueri cur non coeant	40
Pituita p'ena acetabula	329	da	Pueris calculum generat lac	109
Pituita repleti uteri	329	Prægnantis caput quale	Pueris cor quod hepar	230
Pituita ſmilis genituræ	479	Prægnantis affectio & curatio	Pueris mutatio periculofa	65
Pituita uſcoſiſſima	32	Prægnantis cognitio	in Pueris quæ urina peſſima	471
Pituitæ deſluxus cauſa	177	Prægnantis menſes	Puerorum diete ratio	74
Pituitoſa prægnans	321	Prægnantium affectiones	Puerorum excrementũ primum	510
Pituitoſi menſes	315	Prægnantium morbi	Puerulorum infantium uicluſ ratio	38
Planities alta quos gignat	117	Prægnantium notæ	Puerpereæ recens enixe	72
Platæ ex terra familiariora trahunt	33	Prægnantium ſignamala	Puerperij purgationum meſura	327
Plantarum generatio ex ſeminibus	49	Prægnantium pica	Pulmonis figura ſpongiformis	19
Plantarum hominumq; eadẽ natura	52	Prægnantis ſuffocatio	Pulmo natura frigida	76
Plataenſium oleum	339	Prægnantis ſuffocatio	Pulmo natura ſiccus	97
Plechæ	645	Prægnantis ſuffocatio	Pulmo repletus	212
Pleuritis	246	Prægnantis ſuffocatio	Pulmo tumens præ calore	220
Pleuritis non ante pubertatem	583	Prægnantis ſuffocatio	Pulmonis cortæ	94. 578
Pleuritis ſine ſputo	192	Prægnantis ſuffocatio	Pulmonis alimentum	162
Pleuritidis conſideratio	576	Prægnantis ſuffocatio	Pulmonis Eryſipelas	187
Pleuritidis curatio	95. 492	Prægnantis ſuffocatio	Pulmonis generatio	57
Pleuritidis generatio	94. 191	Prægnantis ſuffocatio	Pulmonis	

Pulmonis hydrops	213	Quartana febres	399	Rigori ex partu que medentur	304
Pulmonis morbi unde generentur	86	Quatuor acuti morbi	246	Rigores in mulieribus	459
Pulmonis ruptio	210	Quatuor humores	228	Rigores quomodo fiant	528
Pulmonis structura	75	Quat. loci purgationis humoru	233	Riphei montes	114
Pulmonis tuberculum	187	Quatuor modi clapsi e coxa scemoris		Risus Democriti fustissimus	680
Pulmonis tubercula gibbositate occa-		Quatuor morbi regij	276	Risus insanie signum	676
sio	636	Quatuor species humorum	40	Risus medicum onerosum reddit	21
Pulsationes uenarum	163	Quatuor uie ulcerum	22	Risui desipere	529
Pulsatiles uene temporum	89	Quatuor uenarum paria	84	Robur ex temperamento cotingit	15
Puncturaru capitis consideratio	560	Quies sanat aliquando	6	Ruber fluxus mulierum	352
Pupillarum affectiones	557	Quies inest medicine	24	Rubores pectoris	579
Purgationi admittende inepti qui	509	Quinq; extremitates hepatis	82	Rubicundi circuli in tibijs	574
Purgationi uene sectio quando pre-		Quinq; morbi splenis	274	Ructus acidus	529
mitienda	501			Ructus acidus bonus	413
Purgamenta partus ad thoracem & ca-		R		Ructus acidus unde	417
put	326	Radix ita per se appellata inter		Ruptio pulmonis	210
Purgamenta partus non purgata	323	simplicia	356		
& 324		Radix nigra aspalathi ad quid profit			
Purgamenta partus pauciora	325	376		S	
Purgatoria mensium	308	Rasuram frigidificare	218	Acer morbus cur	172
Purgantia medicamenta quando no-		Ramorum generatio in arboribus	50	Sacri morbi presensio	177
xia	500	Ramificatio corporis partium	45	Vide in uoce Morbus	
Purgantium medicamentoru ratio	32	Ratio actiones absoluit	8	ex Sale uomitorium	487
Purgantium medicamentoru usus	522	Ratio alimenti	58	Salsum inest homini	15
Purgatiua pharmaca caput calfaciunt		Ratio artificum producit	24	Salsarum aquarum qualitas	107
98		Ratio exercitiorum iuxta tempora	38	Salsamentum Gaditanum	271. 274
non Purgari morbi principium	237	Ratio recta semper sequenda	520	Salua generatio in articulis	58
Purgandum superne & inferne quan-		Ratiocinatio in medicina quid	27	Salsuginosa calida	102
do	452. 480	Ratiocinatione morbi cognoscuntur	9	Salubris anni prenotio	109
Pus diffusum quando	187	Recentes morbi facilius curantur anti-		Saluberrimus annus qui sit	109
Pus in tunica quando	ibidem	quis	99	Sanguis a partu qualis esse debet	46
Puris eruptio ex pulmone	226	Recidua ex no sincere iudicatis	435	Sanguis autumnus paucissimus in ho-	
Puris natura	163	Recidua unde fiant	519	mine	33
Puris nota	535	Recordamur que libenter	11	Sanguis ex contrario erumpens ma-	
Pustule in uteri osculis	382	Rectum & non rectum artem consi-		lum	547
Pustule in fibris per totu corpus	566	tunt	6	Sanguis humoris species	40
Pustularu pruriginosaru medela	477	Rectum intestinum	75	Sanguis non est calidus natura	77
Putare, ignorantie signum	24	Recti & non recti ratio	182	Sanguis quando non congelatur	57
Pythodes medicus	45	Regio mutat naturam	117	Sanguis redundans alimentum	162
Pyramidis figura cor	75	Regio pinguis aquosa	ibidem	Sanguis uere auersit	33
		Regionum aridarum qualitas	ibidem	Sanguinis e naribus fluxus	568
		Regius morbus	516. 582	Sanguinis eruptiois futura signa	547
		Regij morbi curatio	97	Sanguinis filij qui	80
		Regij morbi quatuor	276	Sanguinis fluxus ab articulis	352
		sub Regibus uiuere homines facit imbel-		Sanguinis fluxum ex naribus soluit ue-	
		les	113	ne sectio	548
		Repleto Cerebri dolorosa	218	Sanguinis fluxio e nare astate contin-	
		Repositi humeri curatio	625	git	33
		Repositiones quibus faciles uel diffici-		Sanguinis generatio	231
		les	624	Sanguinis grami in utero	301
		Res preciosissima sanitas	39	Sanguinis puto conferentia	579
		Responsio ferox in moderato	543	Sanguinis sputum de hepate	580
		Resp. medicine preter ignominia nul-		Sanguinis stille male	564
		lam panam constituerunt	3	Sanguinis stillationes	575
		Reuerentia inest medicine	24	Sanguinis uomitus	559
		Rhenes urina percolant	83	Sanguinis uomitus de pulmone	586
		Rhenum generatio	57	Sanguinis uomitus ex partu	327
		Rhenum glandule	79	Sanguinis uomitus sterilibus commo-	
		Rhenum structura	75	us	585
		Ricini ulceris	210	Sanguini sistendo	509
		Rigoris significationes	563	Sanus homo temperamento facultat-	
				tum	31

I N D E X

Sanum ac egrotum ledunt edulia for-		Sententia Hippocratis de uarijs prædi-		Sorborum aqua	508
tiora	12	tionibus	549	Sorbtiones non cōducentes morbo in-	
Sanorum ac egrotū uictus collatio	13	Sermonis facultas unde	59	crementum præbent	12
Sanitas res præciosissima	39	Serpentis semen	352	Sorbtiones non primis diebus danda	
Sanitas unde fit	233	Serpiginosa ulcera quæ	23		
Sanitatis exercitium in duobus consi-		Septem costæ ueræ	90	Sorbtionum inuentum	12
stit	461	Septem dierum humana uita	60	Sphagittides uenæ	84
Sanitatis morborum uitæ ac mortis ea		Septem quadragenarijs decimefres pa-		Spes conceptus falsa	559
dem ratio	63	riuntur	65	Spine concussio	641
Sapientia ex doctrina	24	Septimo anno completio dentium	61	Spine fluxus mala	95
Sapientie dentes	58	Septenario dierū morbi indicatur	64	Spine medullæ affectus consid.	556
Sapientie medicina copulanda	24	Septenario natura subiecta	61	Spine natura	82. 637
Sapientie utilitas	23	Septenarij ætatis humanæ	58	Spine obliquo extra	639
Satyriasmus	522	Septimeftris partus ex pelliculis fece-		Spine obliquo intro	640
Sauræ uimineæ texturæ	657	dens	61	Spinam uenæ omnes petunt	86
Sauromatæ ac eorum foemina	113	Septimeftris partus uitalis	60	Spiritus ad manum	473
Scalpro ad scarificadum quō utendum		Septum transfuersum	75	Spiritus delator	10
Scapula	90	Septū transfuersum hepatis adnatū	85	Spiritus intus duplicatus	414
Scapulae natura	82	Sesamoidis usus	509	Spiritus nutrit	118
Scientia communis ars non est	12	Sex medicinae duces	3	Spiritus offendens	311
Scientia imperata facere cogitur	102	Siccum quid ipsi in seipso non inue-		Spiritus per uulnus	587
Scille pesti forma	309	nitur	16	Spiritus qui retrahitur	545
Scopus medicine qualitates nō sūt	14	Sicci alimenti uis	163	Spirit. simplex pro denso positus	94
Scortatio dysenteriam sanat	488	Sicca ledunt magis quam humida	12	Spiritus consideratio	572
Scribendi ratio et modus certus	100	Siccissima maxime resonant	59	Spiritus notæ	534
Scythiæ capræ	327	Silphium in lonia et Peloponoso non		Spirium habet genitura	43
Scythia in Europa	113	nascitur	229	Spiritu habent calefcentia	43
Scythæ filii	114	Silphij uires	508	Spiritus omnes ab aqua	51
Scythæ Nomades	113	Simile ad terram	229	Spirituosa præcordia	439
Secretionum species supernæ	167	Simile artificiosum	231	Spirituosi	509
Seftio dextrarum partium periculo-		Similia egregia	239-310	Spirationi umbilicus destinatus	44
sior	226	Similia semper accedunt similib.	46	Splen aquosus	330
Seftio et uelocitate et tarditate uti-		Similitudo uaticinatiōis ad medicinam		Splen cauius	232
tur	21		490	Splen magnus	249
Seftio uenæ nociua	582	Similitudinis formarum ratio	42	Splen uenofus	232
Seftiones multæ tardam chirurgiā uo-		Simplicium facultates memoria tenere		Splenis constitutio	57
lunt	21	debet medicus	25	Splenis magni consideratio	561
Secandi ratio	ibidem	Simplicium repositio	678	Splenis morbi quinq.	274
Secandi uenæ ratio	84	Singulus in febre ardente	513	Splenis uenæ	88
Secunda angine species	502	Siraum uinum	334	Splenem attenuantia	274
Secunda quando appellatur	45	Sitis exemptæ mala	585	Splenici affectio	487
Secunda relicta in utero	327	Sitis medela	39	Splenes parui	435
Secundæ exeuntis ratio	66	Sitis sanat aliquando	6	Splendor quis fugiendus	21
Secundæ extractio	67	non Sitire quæ faciant	459	Spontaneum nobis causæ non est spon-	
Secundæ hærentes	303	Smegma ad caput	197	taneum	161
Secundæ morantes quō trahendæ	327	Solem in somnis uidere quid pati	157	Spontanea quæ	183
Secundarum expulsiō	527	Solitudo scythica	113	Spuma in strangulatis	520
Selle medicorum	21	Solstitia periculosa	110	Sputi notæ	537
Semen ex omni corporis parte proce-		Somnus sanat aliquando	6	Sputa rotunda	463
dere	112	Somni notæ	536	Squatinæ pellis	72
Semen uelut fauus	82	Somni ratio	518	Scretio frequens	571
Seminis collectio ubi fiat	87	Somnium Hippocratis	677	Scripta aliena reprehendendi libido	578
ex Semine plantarum generatio	49	Somnia diuina quæ	156	Stadij spatium mutat aerem	106
Semiteriana febris	485	Somnia uenerica	40	Stercus bubulum calfacit uterum	103
Semiterianarum febrium modus	398	Somniorum ac insomniorum differen-		Stercoris bubuli forma ad suffitus	298
Semipfecta absolueret artis est	5	tia	157		348
Seniores comitales	176	Somniorū interpretat. certitudo ibid.		Stercus secunda die in sano exit bo-	
Seniorum affectiones mitiores	190	Sophistarum quorundam opinio de me		mine	236
Senectæ anguis quid	342	dico	18	Sternutationis causa	531
Sensu corporis uictus modus collig.	13	Soporis consideratio	569	Sternutationum notæ	537

Sterilitas accedit uenis quibusdam in-	583	Suspensio ex scala ad trabem	653	Terriculamenta uidere	168
cisis	115	Suture capitis	90	Tertiana febris	205. 248
Sterilitatem inducit equitatio	115	Suturarum lesarum cognitio difficilis		Tertiana exquisita	567
Stillationes sanguinis	575	448. 582		Tertiana febres	399
Stillamenti usus ad lachrymas oculo-		Sydus non paruum apparet in som-		Testacea lenticula nasa	299
rum	166	nis	437	Testium nota	536
Stomachus uesicae	314	Syder isti	219	Testium obligatio	70
Stomachus uteri	66	Syderati qui	219. 578. 581	Testudinis marinae cerebrum	343
Strangulatio uteri	378	Syderationum tempus	530	Testudinis marinae hepar	340
Strangulare se uolentium curatio	99	Symptomata cerebri	39	Thasi morbi	397
Stratum frigori expositum habere ul-		Symptomatum faciei significationes		Thersias omnes esse	681
cerat	415	570		Thorax hepar continet	8
Streptus apud egrotos uitandi	26	Symptomatum febrium consid.	566	Thorax maxime sensu praeditus	88
Struma ab anno quadragesimo non fi-		T		in Thoracem fluxus mala	94
unt	583	T Abes coxendicium	567	Tibiae ossa duo	81
Strumarum generatio	78. 79	Tabes quibus fit	525	Tibia genos	91
Studium medicine cur difficile sit	100	Tabes rhenalis	266	Tibicine formido	484
Subdititia ad purgationes	71	Tabis generatio	80. 94	Tonfille	79
Subdititium molliens	72	Tabidus morbus	563	Tonsillarum ulcera	74
Subite mutationes uitandae	494	Tabidorum nota	580	Torninum ratio	167
Sublimium locorum aque optime	107	Taciturnitas decet medicum	20	Torporum capitis consideratio	565
Subterraneanum rerum scientia in-		Talenta decem Hippocrati promissa		Tractio bilis ad felleculi i hepate	230
certa	11	678		Tranquillitas in morbo longitudinem	
Successus fortuitus	183	Tali subdititij nigri qui & pessi	348	significat	30
Successu memorabilem indoctus asse-		Tarditas in uestione laudabilis	21	Translatio culpe inconsiderata	7
qui nequit	102	Telorum extractio	23	Transmouiones uterorum uariae	358
citra Successum ratio sequenda	520	Templa dijs cur erigantur	174	Tremores conuulsorij	575
Suctus pueri in utero	57	Temporū dolentium consid.	561	Tres oculorum tunicae	89
Suctus in uentre	444	Tempus articulationis	46	Tribus constituuntur corpora	465
Sudor humorum calidorum exhalat-		Tempus dux medicine	3	Troxima quae sint	274
tio	10	Tempus in medicina quid	27	Tubercula circa aurem	460
Sudoris causa	191	Temporis circumstantia quantum in ho-		Tubercula pulmonis	579
Sudoris nota	534	mine possit	33	Tubercula supra inguen	311
Sudores indicatorij	510	Temporis uis	24. 492	Tuberculorum ratio	22
Sudores optimi qui	510	Tempora eadem alijs mortis, alijs ui-		Tuberculorum collectiones posse in-	
Sudores qui boni & contra	523	te	64	pediri	22
Sudorum significationes	512	Tempora naturam mutant	117	Tumor a fluxu uteri sedato	352
Suffusus ad uteros	70. 298. 377	Tempora uitae, mortis, sanitatis ac mor-		Tumores uulnerum ac ulcerum	418
Suffusio instrumenta	316	borum eadem	63	Tumores uteri ex partu	323
Suffusio ueteri	70	Temporum anni constitutiones	521	Tumorum inflammatorum nota	535
Suffusio praegnantis	322	Temporum anni ratio habenda me-		Tumorum mollium significationes ibidem	
Sulle carnes quales	508	dico	104	Tumorum significatio	528
Suffocatio uterorum repentina	319	Temporum cognoscendorum difficul-		Tusis excitatur potu acerratum irru-	
Summa repositionum omnium	656	tas	23	ente	76
Summa rerum fortissima	15	Temporum mutationes	526	Tusis in resolutionem desinens	442
Summa suppuratorum	538	Temporum mutationes mentem inquie-		Tusis permutatio	443
Superfœtationis ratio	66	tant	112	V	
Superstitionem rejicit medicina	24	Temporum occasiones	182	V Accae nigrae lac	345
Superstitiosa morbi sacri curatio	172	Temperata hominem non ledunt	15	Vaccinae nigrae lac quibus medea-	
Suppurati ex angina	201. 202	Temperata omnia meliora in homine		tur	303
Suppurati ex uulnere	579	præter frigidum & calidum	18	Vacuatio multa habet mala	13
Suppurati quò fiant	94	Tempestatu notiones ex morbis	171	Vacuitas thoracis	8
Suppuratorum cognitio & nota	95	Tensemus	251	Variae uteri affectiones	305
535. & 538		Terra similis uentriculo	160	Varietas medicine	6
Suppuratorum curatio	510	Terrae pars inferna hyeme calida cur		Varix circa tibiam non ante pubertate	
Suppuratorum interitutorum nota	538	Terrae qualitas consideranda	104. (50	tem	583
Suppuratorum sectio ac usio	529	Terram combustam uidere in somnis		Varices sanguinis fluxum non facile si-	
Suppuratiōes ex peripneumonia	578	159		stunt	22
Suppuratorum nota	535. 538	Terram moueri sibi uideri	159	Vasa uacuanda ab initio morborum not	
Surditatis significatio	543	Terram respiciunt terrae nascentia	117	sunt	495

Vaticinationi medicina cognata	677	Ventorum morbi	170	Vini albi uinofi uires	497
Vectum uariarum usus	654	Ventorum mutationes	178	Vini filii austeriores	497
Velocitas in unctione laudabilis	21	Ventorum ratio medico cognoscenda	104	Vini odor agrotis grauis	26
Vena caua	89	Ver conceptui aptum	70	Vini usus	166
Vena ex sinistris	38	Ver post siccam aut pluuiosam hyemem quale	109. 110	Vina ut caligentur	256
Vena hepaticis	84. 192	Ver sanguis augecit	33	in Vinos uomitus non sedandus	99
Vena humeralis	85	Veratri usus	678	Viri quam mulieres coitu magis delectantur	48
Vena magna	75	Veratri quibus dandum	506	Viri calidior femina	310
Vena nervus fit	86	Veratri usus sanis nocuus	685	Viro tenerior mulier	ibidem
Vena principalis arteria	ibidem	Veracundia inest medicinae	24	Viris mutatio periculosa	65
Vena sanguiflua	83	Veritatis cultus	677	Virilium morborum ac muliebrium cura differt	331
Vene secaderatio & modus	22. 84	Vermes carniū	339	Virge stannae ad formam acus intrumentum	203
Vene sectio nociua	582	Vermes stercorearum	69	Virgo calculosa	306
Vene sectio quam longissime à loco dolenti	84	Vetricis dolentis consideratio	561	Virgines menses quomodo ciendi	72
Vene sectio quando purgationi praemittenda	501	Verticula extra & intro non facile expelluntur	638	Virginum menstruarum ratio	40
Vene sectio soluit naris fluxum	548	Verticulorum numerus	90	Vires morborum considerande	318
Vene unctionis ratio	99	Verticulorum ossa	82	Vitrum agnoscendarum difficultas	23
Vene cauae due	56	Vertiginum consideratio	560	Viscerum dolor ex labore proueniens quomodo curandus	39
Vene crasse	84	Vesica intercepta	546	Visus quam auditus fidem syncretio rem facit	10
Vene infecundis reddentes	90	Vesicae fluxio morbos quomodo ostendat	10	Visus nutrimentum	89
Vene multa in carne	8	Vesicae inflammatae notae	539	Visus ratio	59. 89
Vene omnes spem petunt	85	Vesicae stomachus	314	Visum debilem infestat splendor	21
Vene splenis	88	Vesicae structura	75	Vita humana septem dierum	60
Vene temporum pulsatiles	89	Vesicam fibrae implent	91	Vitae humanae fontes	76
Vene ventris	84	ad Vesperam exacerbari quid	437	Vita, mortis, sanitatis ac morborum tempora eadem	63
Venarum communicatio	90	Vespera augeri mala	479	Vitiligo non ante pubertatem	583
Venarum declaratio	85	Veteris medicinae ars non rejicienda	14	Vlcus apthae dictum	584
Venarum distributio de capite	89	Via geniturae in pudendo	40	Vlcus callosi cura	99
Venarum generatio	56	Via medicinae certa	11	Vlcus ferini	209
Venarum morbi leues	90	Vitius afficit et alterat corpus	14. 15	Vlcus ferini curatio et generatio	98
Venarum paria quatuor	34. 84	Vitius aegris & sanis diuersus	11	Vlcus notae	534
Venarum principium nullum	85	Vitius modus ex sensu corporis colligitur	13	Vlcus reini	210
Venarum pulmotoris uarices	185	Vitius egrotorum	12	Vlcera calida gaudent	165
Venarum pulsationes	163	Vitius Nomadum	113	Vlcera carnem superexcrefcentia	23
Venarum ratio	47. 83	Vitius egrorum ac sanorum collatio	12	Vlcera in pudendis	304. 383
Ven. sectio iuxta aures infecunda	40	Vitius consueti mutatio	507	Vlcera in utero à partu purgantia	324
Venarum superuomitibus	195	Vitius permutati mala	14	Vlcera pudendorum quomodo sananda	349
Venarum utilitas	85	Vitius prioris consuetudo adauclata	493	Vlcera pharris commoda	175
Venas habent maxilla	ibidem	Vitius sanorum ratio	13	Vlcera tonsillarum	74
Veneris utilitas	481	ex Vitio ferino morbi	11	ad Vlcera uteri celluliones	344
Venerem magis excitat coitus multus		in Vitio consuetudo in morbis acutis	494	Vlcernum uteri cura pro ratione corporis	333
Venerca somnia unde	40	que spectant	514	Vlcernum inflammatio septenario finitur	61
Venter calidus est	102	Vituri ex morbo signa	514	Vlcernum oculorum confid.	587
Venter cibum & potum recondit	91	Vigilia sanat aliquando	6	Vlcernum tumoris	418
Venter proximus in doloribus purgandus	462	Vigilantiae laus	23	Vlcernum uiae quatuor	22
Ventris calidi colliquationes	508	Vilia uulgo putata difficilima	117	Vlcernum uteri illitio	332
Ventris structura	75	Vinum cedrinum	379	Vmbilicus spirationi destinatus	44
Ventris succus	444	Vinum Coume	271	Vmbilici dolor	479
Ventris uenae	84	Vinum meracum hominem debiliorem reddit	18	Vmbilico puerum nutrir	65
Ventriculi morbi obscuri	8	Vinum modicum quae ferre possint de qua	107		
Ventriculo in sinistro cordis mentis sedes	77	Vinum Pramnium	328		
Ventriculo similis terra	169	Vinum tedaceum	312		
Ventriculi corporis plures	8				
Ventriculi duo cordis	76				
Ventus in utero	378. 383				
Venticalidi qui	104				

INDEX


F I N I S

ERRATUM

SERIES CHARTARVM.

*abcdefghijklmnopqrstuxyz. ABCDEFG
HIKLMNOPQRSTVXYZ. Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo. Omnes terniones
præter Nn, qui est duernio.

BASILEAE PER HIERONYMVM FROB. ET NIC. EPI-
SCOPIVM MENSE MARTIO M. D. XLVI



REC

CH



